





FROM THE LIBRARY OF  
Professor Karl Heinrich Rau

OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG

PRESENTED TO THE  
UNIVERSITY OF MICHIGAN

BY  
Mr. Philo Parsons

OF DETROIT

1281



Conf. 12 H. 48 Jr.

QK

92

P47



10782  
SYNOPSE  
PLANTARUM,  
SEU



ENCHIRIDIUM BOTANICUM,

COMPLECTENS

ENUMERATIONEM SYSTEMATICAM SPECIERUM  
HUCUSQUE COGNITARUM.

CURANTE

DR. C. H. PERSOON,

DIVERSARUM SOCIETATUM MEMBRO.

---

In parvo copia. . .

---

PARS PRIMA.

PARISIIS LUTETIORUM,

Apud CAROL. FRID. CRAMERUM.

ET TUBINGÆ,

Apud J. G. COTTAM.

---

1805.

1871

---

## PRAEFATIO.

1240 f. 12. 19  
54454  
QUUM duo abhinc et quod excurrit annos, suasu cl.  
*Crameri*, amici conjunctissimi itidemque Botanices aman-  
tissimi, hocce quaecumque opusculum exarandum susci-  
perem, rei herbariae studiosis non melius posse consuli  
arbitrati sumus, quam si quæ hucusque in variis aut  
nimis voluminosis operibus descriptæ extant plantæ, in  
*excidiorum* colligerentur, quod excursionibus et visitandis  
hortis botanicis inservire possit; et luculentissima plan-  
tarum messis, Botanicorum solertia in dies crescens;  
angusto quasi horreo comprehenderetur. Quam ob rem  
non solum eligenda erat typographo minutissima, eoque  
elegantissima, libelli et characterum typographicorum  
forma, verum etiam auctori elaborandum, ut, omissis  
supervacaneis synonymis, amplisque vegetabilium descrip-  
tionibus, quibus in ingentem molem evadere solent spissa  
illa volumina, essentielles solum, quos vocant, exhibe-  
rentur characteres tum generici, tum specifici, atque pauca  
tantummodo laudarentur opera, in quibus icones inve-  
niantur, aut majores præsto sint plantarum adumbrationes.

\*

Quum vero haud raro sôlis ex phrasibus, ob earum brevitatem, non rite dignosci queant plantæ; non ex re fore putavi, si characteribus specificis aliquando subjicerentur observationes breviusculæ, aut, qui novissimis præsertim temporibus innotuere, stirpium virtutes tam medicæ quam physicæ, nec non usus œconomicus commemoraretur. Quod verò nec ubique, nec amplis verbis factum; quippe vetabat instituti nostri ratio.

Quantum vero fieri potuit, et per temporis huic operi perficiendo præscripti angustias licuit, definitum mihi fuit et propositum, in eo imprimis studere, ut, si non omnes, pleræque tamen cognitæ species, brevissimo coercerentur spatio. Quocirca non pauca consultanda erant opera, ex quibus summi LINNÆI *Species Plantarum*, ex curatione celeberrimi WILLDENOWII (cui plures observationes inde depromptas me debere, grata agnosco mente,) eo lubentius secutus sum, illudque opus, utpote locuples præ ceteris, allegavi, quo majorem ibi quisque synonymorum et descriptionum copiam pervolvere potest. Sed recentiora etiam bene multa scripta, quæ, si, vel novarum specierum, vel observationum quas continent.

gazam, aut iconum elegantiam et fidem spectes, ditissima sunt, in usum meum converti.

Quanto stirpium, tum plane novarum, tum ex laudatis operibus haustarum numero, Synopsis nostram augere et ornare contigerit, quisque facile intelliget, qui ejus comparisonem ad alia vel maximi voluminis opera instituere velit. Monendum tamen est, nonnulla recentiora Botanicorum scripta, quæ sub libelli confectionem in lucem prodire, nimis sero, quod doleo, aut nondum in manus mihi pervenisse: quæcunque igitur vel novæ ibi extant species, aut quæ ex industria nonnunquam hic sunt omissæ, accuratius adhuc requirentes examen, eas *Man-tissa* exhibebit, ad finem operis proditura.

In ingenti e contrario vegetabilium numero, quo scientia botanica nunc superbit, nullus iudex æquus gravi mihi, opinor, vertet vitio, si forsitan aliquæ species sub diverso aut eodem genere bis enumerentur, quarum nonnullæ inter *Emendanda* jam sunt adnotatæ. Etenim non unius hominis est, omnes examinare aut ex autopsia cognoscere plantas; sed plurimas fide auctorum adoptare necesse est, quarum descriptiones aut disse-

rentiæ aliquando nimis breves sunt , aut , forte pro speciminum conditione ad quæ sunt compositæ , inter se differunt. A Botanicorum humanitate hinc in scientiæ emolumentum petimus , ut tales nobis indicent operis defectus et hallucinationes , communicatis simul , si fieri possit , plantis , ut novis ab iis descriptis.

A systemate sexuali , omnium artificialium ceteroquin optimo , in eo recedere coactus fui , ut classem *Polydelphiam* et *Polygamiam* , cum Botanicorum ut credo consensu , supprimerem , quo plura genera vinculo naturali inter se connexa invicem magis approximarentur : ex. gr. ut unum exemplar omnium adducami , genera *Metrodiseros* e classe Polyandria , et *Melaleuca* ad Polydelphiam relata , quæ tantummodo inter se filamentis simplicibus aut ramosis differunt. Classis *Polygamia* partium abortu nec ratione solida innixa , plura talia offert specimina.

Characteres genericos et específicos , ubi hoc necessarium videbatur , ex meis aliorumque observationibus emendavi et auxi. Nomina , sic dicta trivialia , rarissime mutavi , nisi hoc aut error postularet , ubi nempe planta



quædam a patria plane diversa est denominata, (ex. gr. *Cruzita hispanica* L., quæ in America crescit; *Bergia capensis*, planta indica; *Rumex Britannicus* (nomen videtur pharmacopæum) in Anglia nondum detectus, sed Americæ indigena; *Erica caffra*, ex Europa australi,) aut si nomen nimis sesquipedale et minus sonorum videretur. E contrario in parenthesi nomen quasi secundarium passim addidi, quo idea plantæ forte distinctior concipi possit.

Ex stirpibus jam cognitis necessarium aliquando esse ratus sum peculiaria constituere genera, præsertim si natura fructuum aliarumque florum partium hoc requireret. Melius autem judicavi, eas species (nonnullis forte tamen excipiendis) ab aliis leviter in caractere generico aberrantes, imprimis si genus minus amplum sit, sub divisione peculiari aut subgenere, quo etiam nonnulla Botanicorum recentiorum genera relata sunt, comprehendere, ne ultra necessitatem genera multiplicentur; ad quod ceteroquin ætas nostra nimis proclivis videtur. Quo etiam spectat nimia facilitas aut abusus, quod plantæ sæpe induantur nomine hominum obscu-

rorum, aut aliis in artibus vel litteris, in re vero botanica non aut vix versatorum; unde nuncupationis ratio nec amplius incitamentum, nec merces laboris æstumari poterit.

Ad finem cujusve classis species illae anomalae enumeratae sunt, quæ si solummodo partium frutificantium numeri rationem habeas, ibi quærendæ sunt. Hæc a LINNÆO aliisque auctoribus, in clavi ita dicta generum, etiam inveniuntur adnotatæ.

Varietates præcipuæ et subspecies non omissæ sunt. Speciebus obscuris, aut quoad sedem dubiis, vel accuratiori indagationi subjiciendis, signa crucis seu asteriscum apposui.

Virorum meritissimorum conatus ac studium semper in eo collocatum fuit, ut methodus inveniatur, qua plantarum genera serie naturali in diversas disponantur tribus, quas facilius ob eorum multitudinem mente complecti et illorum diversitatem observare possimus. In systemate contra mere artificiali, a particulari plantarum parte, nec toto habitu simul considerato, composito, non raro genera immo et species in variis classibus, nec non ordi-

nibus, relationi, quæ inter ea obtinet, plane contrario, existunt dispersa.

Attamen negari non potest, in ipso systemate Linnæano, characteribus pluribus minusque variabilibus innitente, non solum plura genera, habitu naturali convenientia, juxta se invicem collocata, sed et integras classes, pauca genera intermixta si excipias, naturales esse, ex gr. *Didynamia*, *Tetradynamia*, *Monadelphia*, *Diadelphia*, *Syngenesia*, *Gynandriæ* prior ordo et *Cryptogamia*. Ubi nunc in prioribus classibus talium generum cohors occurrit, nomen familiæ s. ordinis naturalis plantarum cum suis characteribus succinctis in eorum gratiam anteposui, quibus methodus naturalis minus familiaris est. Hoc vero in *Hexandria* laud necessarium autumavi, cum plurima genera satis inter se congruant, et de eorum distributione aut potius limitibus auctores methodi naturalis adhuc dissentiant.

Ad hunc finem ill. A. L. DE JUSSIEU *Genera Plantarum*, opus vicissitudines in scientia sæpe obvias non facile subiturum, ut optimum secutus sum. Meum etiam est, celeberrimo ac humanissimo hujus libri auctori de

ejus in me beneficentia gratias reddere sincerrimas, quod herbarium suum, ut inter omnes constat, ditissimum, non raro perscrutari mihi permiserit.

Grata quoque mente laudanda est eorum virorum in me benevolentia, qui mecum aut observationes communicarunt aut novas plantas describendas concesserunt, vel rarioribus collectionem meam augere voluerunt; hi nomina sua singulis symbolis, mihi ab illis concessis, adscripta inventuri sunt.

C. H. PERSOON.

Dabam Parisiis, die 12 Martii, 1805.

7.

**COLLECTION**  
**D'OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES**  
**SUR DIFFÉRENTES SCIENCES,**

**ET**  
**D'AUTRES ÉCRITS RELATIFS A L'INSTRUCTION.**

~~~~~

**SYNOPSIS PLANTARUM,**  
**HUCUSQUE COGNITARUM;**  
**SECOND OUVRAGE, PREMIÈRE PARTIE.**

—————

**Éditeur,**  
**CH. FR. CRAMER.**

CETTE Collection est destinée aux Professeurs et Élèves des Écoles secondaires et des Lycées, aux Maîtres en général, ainsi qu'à tous ceux qui, privés des ressources de l'instruction publique, veulent y suppléer par des Manuels clairs et méthodiques, qui leur offrent les notions les plus nécessaires de Bibliographie et les élémens des principales sciences.

UNE grande partie de ces Manuels manque en France à l'instruction. A la vérité, il existe des Abrégés sur différentes matières qui en feront l'objet; mais ces Abrégés ne sont ni exacts, ni complets, ni méthodiques, et ils sont moins combinés pour l'avantage de ceux qui apprennent, que de ceux qui savent : au lieu que l'utilité de plusieurs de ceux qui composeront cette Collection est reconnue par l'expérience et leur usage habituel dans la plupart des écoles des nations éclairées qui avoisinent la France.

# SYNOPSIS SPECIERUM PLANTARUM.

## CLASSIS PRIMA.

### MONANDRIA.

#### MONOGYNIA.

*Scitamineæ* (Gen. 1-16.) *forte melius ad Gynandriam referendæ, caule sunt herbaceo, petiolis vaginantibus tecto, foliis nervosis: junioribus convolutis, floribus spathaceis, filam. ad styli basin inserto. Stam. duo in Globba.*

1. **CANNA.** Cor. 6-partita, erecta. Nect. bipartitum, revolutum. Styl. lanceolatus, corollae adnatus. Cal. 3-phyl. Caps. muricata.

1. *paniculata*, fol. ovatis, subtus lanatis argenteis; petalis interioribus brevioribus. Ruiz et Pavon. Flora Peruv. et Chilensis. vol. 1. p. 1. t. 1. f. 1. Hab. in Peruvia. Caps. obovata, echinata.  $\overline{\text{T}}$

2. *Tridiflora*, fol. ovatis acuminatis, lacinii tribus corollae interioribus majoribus. Flor. peruv. l. c. Hab. in Peruvia. Cor. laciniae 3 exteriores purpurasc. Caps. oblonga, maxima. Fol. subtus lanata.  $\overline{\text{T}}$

3. *indica*, foliis ovatis utrinque acuminatis costatis. C. fol. ovatis utrinque acuminatis nervosis. Willd. spec. plant. Linn. 1. p. 3. Knorr. del. hort. 2 t. C. 2. Rumph. amb. 5 p. 177. t. 71. t. 2. lacinii corol. subaequalibus. Fl. Peruv.  $\overline{\text{T}}$

4. *lutea*, petalis interioribus erectis luteis, nectarii lacinia revoluta lineolis ruficundis irrorata, foliis ovato-ellipticis. Ait. hort. Kew. 1. p. 1. Hab. inter tropicos Asiae, Africae, Americae.  $\overline{\text{T}}$

4. *coccinea*, fol. ovatis nervosis, bracteis ovatis pulverulentis. Mill. dict. Ait. l. c. Omnino species distincta videtur, cum humilior sit et jam primo vere floreat. Fol. breviora et latiora.  $\overline{\text{T}}$

5. *angustifolia*, foliis lanceolatis petiolatis costatis. Willd. loc. cit. Pis. bras. 213. Hab. inter tropicos Americae, in umbrosis spongiosis. C. indica humilior et angustior.  $\overline{\text{T}}$

6. *glauca*, fol. lanceolatis glaucis subtus enerviis. Willd. Dill. elth. 69. t. 59. f. 69. Hab. in Carolinae aquosis.  $\overline{\text{T}}$

7. *junceæ*, foliis linearibus nervosis. Retz. obs. fasc. 1. p. 9. n. 1. Hab. in China. Corolla parva obscure rufa.  $\overline{\text{T}}$

2. **HELLENIA.** Cor. limbus duplex, exterior subtrifidus. Nectar. diphyllum vel bifidum. Capsula trilobularis, coriacea, inflata, subglobosa. Calyx spathiformis, campanulatus bifidus.

1. *Allughæ*, nectarii diphyllis, capsulis subspongiosis, foliis integerrimis. Willd. spec. pl. 1. p. 4. Heretiera Allughæ Retz. obs. fasc. 6. p. 17. tab. 1. Rheed. mal. 11. p. 29. t. 14. Hab. in Zeylona. Inflorescentia totius generis paniculata.  $\overline{\text{T}}$

2. *alba*, nectarii diphyllis, capsulis striatis, foliis integerrimis. W. Heretiera alba. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. fasc. 3. p. 64. Hab. in China.  $\overline{\text{T}}$

3. *chinensis*, nectariis diphyllis, foliis ciliatis. W. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. Colitur in hortis Sinensium.  $\overline{\text{T}}$

4. *aquatica*, nectariis monophyllis bifidis, foliis margine denticulatis. W. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. Habitat in Indiae uliginosis inter frutices.  $\overline{\text{T}}$

3. **RENEALMIA.** *Cor.* trifida. *Nectar.* oblongum. *Cal.* monophyllus in 2 s. 3 dentes irregulares rumpens. *Anth.* sessilis, nectario opposita. *Bacca* carnosa.

1. *exaltata*. Willd. Sp. pl. 1. p. 6. Hab. in Surinamo. Arbor 20-pedalis.  $\overline{\text{T}}$

4. **AMOMUM.** *Cal.* 3-fidus, inaequalis, cylindricus. *Cor.* 3-partita, inaequalis, patens. *Nect.* 2-labiatum, erectiusculum.

1. *racemosum*, scapo spathis oblongis tecto, racemo composito Fl. peruv. 1. p. 2. t. 1. f. b. Copiose in Peruviae sylvis. Cannum refert. Caps. nigra leviter striata. Sem. acria oleosa.  $\overline{\text{T}}$

2. *thyrsoides*, scapo spathis oblongo-ovatis vestito, spica conico-thyrsoides. Fl. peruv. 1. c. t. 2. Cum priore crescit. Capsula magna ventricosa. Rad. tuberosa fasciculata.  $\overline{\text{T}}$

3. *Zingiber*, scapo mediocri, spica ovata, foliis lineari-lanceolatis. Swartz obs. p. 2. Rumph. amb. 5. p. 156. t. 66. f. 1. Willd. S. P. 1. p. 6.  $\overline{\text{T}}$

4. *Zerumbet*, scapo nudo, spica oblonga obtusa, squamis subrotundis, foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 3. Ehret. pict. t. 14. f. 1. Mill. dict. n. 2. ic. 17. t. 25. Blackw. Herb. t. 402. Hab. in India.  $\overline{\text{T}}$

5. *Zedoaria*, scapo nudo, spica laxa truncata. Berg. mat. med. p. 4. Amomum latifolium. Lamarck encyclop. 1. p. 133. Petiv. Gazoph. t. 23. f. 1. Rheed mal. 11. p. 13. t. 7. Hab. in India.  $\overline{\text{T}}$

6. *sylvestre*, scapo nudo, spica elongata, bracteis oblongis ventricosis, foliis lato-lanceolatis. Swartz prod. 11. Sloan. jurn. 61. hist. 1. p. 165. t. 105. f. 2. Hab. in sylvis Jamaicae.  $\overline{\text{T}}$

7. *Mioga*, scapo brevissimo, capsula ovata, foliis ensiformibus acutis. Thunb. Jap. 14. Kaempf. am. exot. 5. p. 86. Hab. juxta Nagasaki in Japonia. Proxime ad Amomum Cardamomum.  $\overline{\text{T}}$

8. *angustifolium*, scapo nudo brevissimo, spica capitata, fol. lineari-lanceolatis. W. l. c. p. s. Sonnerat it. tab. 137. Lamarck encyclop. 1. p. 132. Habitat in paludibus Insulae Madagascariacae. Caulis 8-vel 10-pedalis.  $\overline{\text{T}}$

9. *Cardamomum*, spica radicali sessili obovata, foliis obovato-ellipticis cuspidatis. A. scapo simplicissimo brevissimo, bracteis alternis laxis. L. Blackw. tab. 584. et 585. Rumph. amb. 5. p. 152. t. 65. f. 1.  $\overline{\text{T}}$

10. *villosum*, scapo vaginato brevissimo, spica subrotunda, bracteis lanceolatis flore longioribus. Willd. l. c. A. villosum, scapo brevi reclinato; bracteis linearibus, fructu villosi. Loureiro coch. A. p. 4. Rumph. amb. 6. p. 137. t. 61. f. 2. Hab. in montosis udus Indiae.  $\overline{\text{T}}$

11. *repens*, scapo ramoso decumbente, foliis lanceolatis. Sonnerat it. ed. germ. 2. p. 188. t. 136. Rheed. mal. 11. p. 9. t. 4-5. Hab. in montibus Gate Malabaricae.  $\overline{\text{T}}$

12. *Granum Paradisi*, scapo ramoso laxo, foliis ovatis. Blackw. t. 385. Rheed. mal. 11. t. 6. Hab. in Madagascar, Guinea, Zeylona.  $\overline{\text{T}}$

5. **HORNSTEDTIA.** *Cal.* bifidus. *Cor.* tubus longus filiformis, limbus duplex: exterior 3-partitus. *Nect.* tubulosum. *Capsula* trilobularis oblonga.

1. *Scyphus*, foliis subtus tomentosis. Retz. obs. fasc. 6. p. 18. Willd. S. P. p. 9. Hab. in nemorosis prope Malaccam.  $\overline{\text{T}}$

2. *Leonurus*, foliis glabris ciliatis. Retz l. c. Hab. in sylvis Malacca.  $\overline{\text{T}}$

6. **HEDYCHUM.** *Cal.* 1-phyllus duplex, 5-partitus. *Styl.* longissimus. *Nect.* 2-phyllum.

1. *coronarium*. Willd. l. c. p. 10. Retz. fasc. 3. p. 73. n. 20. Rumph. amb. 5. p. 175. t. 69. f. 3. Lam. ill. gener. p. 7. n. 16. t. 1. f. 3. In India, Java.  $\overline{\text{T}}$

7. **COSTUS.** *Cal.* 3-fidus gibbus. *Cor.* 3-partita, ringens. *Nectar.* 2-labiatum: labio inferiore maximo 3-lobo. *Bacca*?

1. *arabicus*, foliis utrinque glabris, spica pauciflora, squamis apice ciliatis, summis fastigiatis. Willd. l. c. Blackw. t. 364. Merian. surin. 36. t. 36. In America calidior.  $\overline{\text{T}}$

2. *spicatus*, foliis utrinque glabris, spica multiflora subovata arcte imbricata: squa-



mis ovatis simplicibus. Swartz prod. 11. *Alpinia (spicata)* floribus spicatis. Murr. S. V. p. 51. Jacq. amer. p. 1. tab. 1. Moris. hist. 3. p. 251. s. 8. t. 14. f. 8. Hab. ad ripas inque montosis insularum Caribaeorum et in Brasilia.  $\mathcal{T}$

3. *speciosus*, foliis subtus sericeo-villosis. Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 1. p. 249. Costus arabicus. Jacq. Icon. rar. vol. 1. tab. 1. *Amomum hirsutum*. Lamarck encyclop. 1. p. 134. tab. 3. Hab. in India orientali.  $\mathcal{T}$

4. *echinatus*, spica radicali, capsulis echinatis globosis. *Amomum echinatum*. Willd. spec. pl. L. 1. p. 3. *Globba uviformis* Rumph. 6. p. 134. t. 61. f. 1. In Indiae sylv. Planta obscura, forte distincti generis, cujus capsulam Rumphius l. c. ut baccam describit, quare eam hoc ad genus retuli.  $\mathcal{T}$

5. *scaber*, thyrsos conico, bracteis ovatis adpressis, corol. semiclausis. Fl. peruv. 1. p. 2. t. 3. In sylv. Peruvianis. Fol. subtus pubescentia, vaginae post eorum decalium scabrae. Cor. alba.  $\mathcal{T}$

6. *laevis*, thyrsos conico bracteis lanceolatis apice incurvis, cor. patentibus. Fl. peruv. p. 3. Cor. luteo-carnea.  $\mathcal{T}$

7. *argenteus*, thyrsos oblongo, bracteis reflexis, cor. patentibus. Fl. peruv. p. 3. t. 4. Hab. cum priore in Peruviae nemoribus umbrosis humilibus. Fol. pendula subtus argenteo-pubescentia. Cor. lutescens.  $\mathcal{T}$

8. *Zerumbet*, spica (racemo simplici) recurva laxa. *Zerumbet speciosum* Wendl. sert. hannov. fasc. 4. p. 3. t. 19. Flor. albedo-rosci. Carina (Nect. lin.) maxima, margine undulata flava. In China.  $\mathcal{T}$

8. *ALPINIA*. *Cal.* 3-dentatus aequalis tubulosus. *Cor.* 3-partitae qualis. *Nect.* 2-labiatum: labio inferiore patente.

1. *racemosa*, racemo terminali spicato, floribus alternis, nectarii labio trifido: foliis oblongis acuminatis Swartz obs. p. 5. Plum. ic. 10. t. 20. Sloan. jam. 61. hist. 1. p. 165. t. 105. f. 1. In sylv. depressis submontanis Americae calidioris.  $\mathcal{T}$

2. *Galanga*, racemo terminali laxo, floribus alternis, nectarii labio emarginato, foliis lanceolatis. Willd. Sp. p. 12. Rumph. amb. 5. p. 143. t. 63. In India orientali.  $\mathcal{T}$

3. *comosa*, spica terminali comosa, bracteis flore longioribus coloratis, foliis oblongo-ovatis pubescentibus. W. Jacq.

Icon. rar. vol. 3. Ad Caracas in America.  $\mathcal{T}$

4. *occidentalis*, racemo radicali composito erecto, nectario apice emarginato, capsulis trilocularibus, foliis lanceolato-ovatis glaberrimis. Swartz prod. 11. Hab. in sylv. Jamaicae et Domingo.  $\mathcal{T}$

9. *MYROSMA*. *Cor.* 5-partita irregularis. *Cal.* duplex: exterior 3-phyllus, interior 2-partit. *Caps.* 3-gona 3-locul. polysperma.

1. *cannaeformis*. L. Willd. 1. p. 13. Hab. in Surinamo.  $\mathcal{T}$  (Phrynio affinis.)

10. *MARANTA*. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-fida. *Nect.* 3-partitum, lacinia tertia superiori latere autherifera. *Caps.* 1 locul. 1-sperma.

1. *arundinacea*, culmo ramoso herbaceo, foliis ovato-lanceolatis subtus pilosiusculis. W. Sloan. jam. 22. h. 1. p. 253. 149. f. 2. Hab. in America calidiore.  $\mathcal{T}$

2. *Tonchat*, culmo ramoso fruticoso, foliis ovatis glabris. W. Rumph. amb. 4. p. 2. t. 7. Hab. in sylv. Indiae, Cochinchinae.  $\mathcal{T}$

3. *malaccensis*, culmo simplici, foliis oblongis petiolatis subtus sericeo pubescentibus. W. Rumph. amb. 5 p. 177. t. 71. f. 1. Hab. in Malacca.  $\mathcal{T}$

4. *capitata*, caule simplici apice florifero, capitulo globoso depresso. Flor. peruv. 1. p. 3. t. 8. In Peruviae umbrosis humilibus. *Caps.* 3-valv. 3-lombaris. Cor. lac. interne nectarium proprie repraesentant. l. c.  $\mathcal{T}$

5. *lateralis*, caule simplici ad medium florifero, capitulo globoso. Flor. peruv. 1. p. 4. Cum priore. An satis distincta?

6. *comosa*, acaulis, scapo nudo spicato comoso, comae foliolis reflexis. W. Hab. in Surinamo.  $\mathcal{T}$

11. *GLOBBA*. *Cal.* superus, 3-fidus. *Cor.* aequalis, 3-fida, *Caps.* 3-locularis. *Sem.* plurima. *Siam.* 2.

1. *Marantina*, spica terminali erecta Mant. p. 170. Willd. Spec. Pl. L. 1. p. 153. In India orientali. Spica terminali, fl. remotis.  $\mathcal{T}$

2. *nutans*, spica terminali pendula, fol. elliptico-lanceolatis Willd. l. c. Rumph. amb. 6. p. 140. t. 62-63. Cum prioris.

3. *Japonica*, spica terminali cernua, fol. ensiformibus, Thunb. Flor. Jap. p. 23. In Japonia.  $\overline{\text{T}}$

4. *uviformis*, spica laterali. Mart. p. 171. Rumph. amb. 6. p. 138. t. 69. f. 2 In India.  $\overline{\text{T}}$

12. *CURCUMA*. *Cal.* bifidus. *Cor.* 4-partita. *Nect.* 3-lobum. *Anth.* basi bicalcarata.

1. *rotunda*, foliis lanceolato-ovatis: nervis lateralibus rarissimis. Willd. S. P. p. 14. Rheed. mal. 11. p. 19. t. 10. Hab. in India.  $\overline{\text{T}}$

2. *longa*, foliis lanceolatis: nervis lateralibus numerosissimis. L. Mat. med. p. 35. Blackw. t. 396. Swartz. obs. p. 8. Amomum (*Curcuma*) scapo spathis laxis ex centro foliorum. Murr. S. V. p. 50. Jacq. hist. v. 3. t. 4. Rheed. mal. 2. p. 21. t. 10. In India.  $\overline{\text{T}}$

13. *KAEMPFERIA*. *Cal.* obsoletus. *Cor.* 6-partita: laciniis tribus majoribus patulis, unica bipartita. *Stigma* bilamellatum.

1. *Galanga*, foliis ovatis sessilibus. Hort. cliff. 2. t. 3. Rumph. amb. 5. p. 173. t. 69. f. 2. Kaempf. amoen. got. t. 502. Lam. ill. p. 7. Hab. in India.  $\overline{\text{T}}$

2. *rotunda*, foliis lanceolatis petiolatis. Blackw. t. 599. Rheed. mal. 11. p. 17. t. 9. Hab. in India.  $\overline{\text{T}}$

14. *THALIA*. *Cor.* 5-petala: duo interiora minora. *Nectar.* lanceolatum concavum. *Drupa* nucem unilocularem. *Cal.* triphyllus.

1. *geniculata*, corollis pentapetalis: nectario lanceolato. Plum. gen. 26. ic. 108. f. 1. Mart. Bras. 53. Hab. in America meridionali. Caulis humanam staturam superans, levissimus, simplicissimus. Rachis geniculato-flexuosus.  $\overline{\text{T}}$

2. *cannaeformis*, corollis hexapetalis: nectario bifido erecto. hort. prod. n. 3. Hab. in Mallicollo inter novas Helridas.

15. *PHYNIUM*. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3, aequalia, tubo nectarii adnata. *Nectarium* 1-phyllum, tubo filiformi, limbo 4-partito. *Caps.* 3-locul. *Nucis* 3.

1. *capitatum*. Willd. sp. 1. p. 17. Pontederia (ovata) foliis ovatis, floribus capitatis. Spec. pl. 412. Rheed. mal. 11.

p. 67. t. 34. Hab. in Malabaricae, Cochinchinae, Chinae locis umbris humidis.  $\overline{\text{T}}$

16. *PHYLLIDRUM*. *Spatha* 1-flora. *Cal.* o. *Cor.* 4-petala irregularis. *Capsula* 3-locul. polysperma.

1. *lanuginosum*. Gaertn. sem. 1. p. 62. tab. 16. fig. 10. Lam. ill. gener. n. 32. t. 4. Hab. in locis humilibus Cochinchinae et Chinae. Folia subulata crassa lanuginosa.

17. *CUCULLARIA*. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala inaequalis calcarata. *Filamentum* petalisforme. *Anthera* loculis discretis!

1. *excelsa*. Willd. sp. 1. p. 17. Vo-chisia. Lam. ill. p. 35. Aubl. gujan 1. p. 18. ab. 6. In sylvis Gujanae. Arbor.  $\overline{\text{T}}$

18. *QUALEA*. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* dipetala. *Bacca*?

1. *rosea*, petalo inferiore obtuso, foliis acuminatis. W. Aublet. guj. 1. p. 5. tab. 1.

2. *caerulea*, petalis emarginatis, foliis acutis. W. Aubl. guj. 1. p. 7. tab. 2. Hab. uti prior, in sylvis Gujanae.  $\overline{\text{T}}$

19. *LOPEZIA*. *Cal.* 4-phyll. *Cor.* 5-petala inaequalis. *Capsula* 4-locul. 4-valvis polysperma.

1. *racemosa*, caule herbaceo ramoso, foliis alternis ovato-lanceolatis serratis, floribus racemosis. Cavan. icon. 1. n. 16. t. 18. L. mexicana. Jacq. ic. v. 2. Willd. p. 8. Habitus Circaeae.  $\odot$

$\beta$  *hirsuta*, tenerior hirsuta. Jacq. coll. austr. suppl. p. 5. t. 15. f. 4. Crescit cum priore, qua multo minor et fragilior, prope Mexico. An mera varietas?

20. *USTERIA*. *Cal.* 4-dentatus: lacinia unica reliquis multo majore. *Cor.* infundibuliformis 4-dentata. *Caps.* 1-locul. 2-sperma. *Semina* aristata.

1. *guinensis*. Willd. in Act. Societ. Berol. 10. p. 52. tab. 2. Monodynamis Iserti. Omel. syst. veg. p. 10. Hab. in Guinea.  $\overline{\text{T}}$

*Obs.* Non est Usteria Cavanillesii, quae ad classem Dilynamiam pertinet; ac ab Jacquinio in ejus Horto Schoenbrunnensi *Maurandia* denominata est.

21. *POLLICIA*. *Cal.* 1-phyllus 5-dentatus. *Cor.* o. *Sem.* 1. *Recept.*

squamae baccatae, fructus includentes.

1. *campestris*. Aiton. Kewens. 1. p. 5. Hab. ad Cap. b. sp. Folia verticillata, lineari-lanceolata. Flores congesti in capitulum, axillas trium vel quatuor foliorum occupans. Ait.

22. *SALICORNIA*. *Calyx* ventricosus, integer. *Petala* o. *Sem.* 1.

1. *herbacea*, herbacea patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis, spicis axillaribus oppositis pedunculatis, squamis obtusis. W. Sp. P. 1. p. 23. Oed. Flor. dan. t. 303. Blackw. t. 568. Hab. in Europae litoribus maritimis, in Virginia. Diantra. ☉

2. *indica*, articulis clavatis, truncatis bifidentis, spicis cylindricis terminalibus solitariis obtusis Willd. in Nov. act. soc. Berol. 2. t. 4. f. 2. Ad littora maris prope Tranquebar. Antecedenti affinis, a qua squamis truncatis, colore glauco virescente differt.

3. *perennans*, herbacea patula, articulis apice compressis emarginato-bifidis, spicis axillaribus ternis pedunculatis, squamis acutis, radice perenni. W. Salicor. herbacea Pall. it. 1. app. n. 89. t. D. fig. 1. Hab. in Sibiria ad Jaikum in paludibus siccioribus. ☿

4. *fruticosa*, caule erecto fruticoso, articulis ramulorum ancipitibus, squamis foliaribus truncatis membranaceis. Willd. Gmel. sib. 3. p. 8. t. 1. f. 1? In Europae maritimis. ☿

5. *strobilacea*, caule prostrato fruticoso, articulis truncatis alternatim spiciferis, spicis nudis brevissimis oppositis. W. Pall. it. 1. app. n. 91. t. E. Buxb. cent. 1. p. 6. t. 10. f. 2. Hab. in praeruptis salinis Maris caspici. ☿

6. *virginica*, herbacea erecta, ramis simplicissimis. Lin. Hab. in Virginia.

7. *arabica*, foliis alternis vaginantibus obtusis dehiscentibus. Lin. Pall. it. 1. app. n. 92. t. D. f. 3. Moris. hist. 2. p. 610. f. 5 t. 33. f. 7. Hab. in Arabia. ☿

8. *foliata*, foliis linearibus alternis amplexicaulis-decurrentibus. Lin. suppl. 81. Pall. it. 1. app. n. 93. t. F. In Sibiria. Frutex lignosus. ☿

9. *amplexicaulis*, foliis cordatis amplexicaulis. Vahl. Symbol. 2. p. 1. Hab. ad littora lacus prope Bardo Tuneti. ☿

10. *caspica*, articulis cylindricis, spicis filiformibus. Lepech. it. 1. p. 254. Pall. it. 1.

app. n. 90. t. D. fig. 2. Hab. in squalidis maris Caspici et Mediac. ☿

23. *HIPPURIS*. *Calyx* (o. L.) obsoletus. *Petala* nulla. *Stigma* simplex. *Sem.* 1. inferum.

1. *vulgaris*, foliis octonis subulatis. Vaill. act. par. 1719. t. 1. f. 3. Hab. in Europae fontibus, fossis aquosis, lacubus. ☿

2. *maritima*, foliis stellatis subsenis: submersis spathulatis; emersis ovatis obtusis. Hellen. Diss. in Usteri Delect. opusc. 1. p. 11. tab. 1. Retz. obs. fasc. 3. p. 7. tab. 1. Hab. ad littora maris in Suecia, Finlandia circa Aboam. Fol. superiora 5-6. Hipp. *tetraphylla*. L. Suppl. ☿

24. *LACISTEMA*. Ament. *Anth.* remote 2-locularis. *Stigm.* 3 setacea. *Caps.* 1-locular. *Sem.* evalvis filispundula.

1. *myricoides*. Swartz prol. p. 12. Ejusd. Icon. fasc. 1. t. 1. Naematospermum laevigatum. Richard in Act. Soc. hist. natur. p. 105. Piper aggregatum Berg. Act. helv. 7. p. 131. tab. 10. Hab. in fruticetis montium Jamaicae, inque Surinamo.

## DIGYNIA.

25. *CORISPERMUM*. *Cal.* o. *Petala* 2. *Sem.* 1, ovale, nudum.

1. *hyssopifolium*, spicis terminalibus, foliis linearibus nervosis muticis. Pall. ross. 2. p. 112. tab. 98. Buxb. cent. 3. p. 30. t. 55. Hab. in Europae locis arenosis. ☉

2. *squarrosum*, spicis axillaribus squarrosis, foliis lanceolato-acuminatis pungentibus nervosis. Pall. ross. 2. p. 113. t. 99. Buxb. cent. 3. p. 30. t. 56. Hab. ad Wolgam Tartariae, inque desertis Cosacorum. ☉

3. *orientale*, fol. linearibus angustis, summitatibus floriferis subpaniculatis pubescentibus. Lam. ill. n. 44. Hab. in Oriente.

26. *CALLITRICHE*. *Cal.* inferus, diphyllus. *Caps.* membranacea marginata. (*Flor.* nonnulli monoeici.)

1. *verna*, foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. Oed. dan. t. 129. Hab. in Europae fossis aquosis. Verc florens.

2. *aestivalis*, fol. petiolatis subrotundis fructu tetragono. Thuill. Fl. par. p. 2. Vaill. botan. p. 190. t. 32. f. 10. In aquis frigidis. Floret Julio, Augusto.

3. *intermedia*, foliis superioribus ovalibus, caulinis linearibus apice bifidis. Schkuhr bot. Handb. t. 1. f. c. Hoffm. germ. 2. Cum priore.

4. *autumnalis*, foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis. Loesel. pruss. 140. t. 38. In fossis aquosis autumnno.

5. *tenuifolia*, fol. omnibus linearibus apice integris acutis, fructu 4-gono. Autumnno prope Fontainebleau observata a Thuill., secundum quem fructus *C. vernalis* et *autumnalis* compressi sunt.

27. BLITUM. *Cal.* 3-fidus. *Pet.* 0. *Sem.* 1, calyce baccato.

1. *capitatum*, capitellis spicatis terminalibus. Knorr. del. hort. 1. t. E. 3. B. fol. triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis nudis. Hort. cliff. 1. Hab. in Europa. (Tyrolia, Helvetia.) ☉

2. *virgatum*, capitellis sparsis lateralibus. B. fol. triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis foliosis. Hort. cliff. 495. Moris. hist. 3. p. 606. s. 5. t. 32. f. 2. Hab. in Tartaria, Hispania, Gallia Narbonensi. ☉

28. MNJARUM. *Involucr.* 4-phyllum. *Cal.* 4-partitus, superus. *Cor.* 0. *Sem.* 1.

1. *biflorum*, Lin. Suppl. p. 81. Forst. Corn. Göting. 9. p. 19. t. 1. Ditoca Gaertn. Hab. in Nov. Zeeland. et in Terra del Fuego. Minuartiae simile. ☞

29. CINNA. *Cal.* Gluma 2-valvis, uniflora. *Cor.* Gluma 2-valvis. *Sem.* 1.

1. *arundinacea*, glabra, panicula magna, multiflora capillari, valvula altera florali infra apicem embaristata. Michaux Flor. Carol. p. 38. Hab. in sinu Hudsonis ad Canadam. Ab Agrost. Mexicana omnino distincta!

30. JARAVA. *Cal.* Gluma 2-valvis, 1-flora. *Cor.* Gluma 1-valvis, papposa aristata.

1. *usitata*. J. Ichu, foliis convolutis subulatis, spica paniculata. Fl. peruv. 1. p. 5. t. 6. f. b. Hab. in alpebus regni peruviani. Varius et frequens hujus graminis usus est, qui l. c. perlegi potest. An *Alopecuri* species?

Ob minorem staminum numerum hanc ad classem adhuc pertinerent nonnullae ex aliis generibus species.

## M O N O G Y N I A.

*Mangifera indica*. Translescentia *monandra*. *Valeriana rubra*, *angustifolia*, *Calceitrapa*. *Aphanes arvensis*. *Polycnemum monandrum*, *Boerhaavia diffusa*. -- *Scirpi* et *Cyper*i nonnullae species.

## D I G Y N I A.

*Leersia monandra*. [Roibella 1-andra Cav. *Uniola latifolia* et *gracilis* Michaux.

# C L A S S I S I I.

## D I A N D R I A.

### M O N O G Y N I A.

31. SCHREBERA. *Cal.* 2-labiatus. *Cor.* 5-7-fida. *Caps.* pyriformis, 2-locularis; 2-valvis. *Sem.* 8-10, alata.

1. *Swietenicoides*. Roxb. Plants of the coast of Coromand. t. 101. Arbor excelsa. Schrebera *Schionoides* L. *Cuscutae* species est in *Myrica aethiopica* parasitica.

32. NYCTANTHES. *Cor.* hypocrateriformis: *Laciniae* emarginatae. *Caps.* bilocularis, marginata, bipartibilis.

1. *Arbor tristis*, caule tetracono, fol. ovatis acuminatis, pericarpis membranaceis compressis. Lam. illustr. p. 20. t. 6. Scabrita scabra. Syst. nat. ed. 12. p. 115. Rheed. mal. 1. p. 35. t. 21. Hab. in India.  $\mathcal{T}$

33. JASMINVM. *Cor.* hypocrateriformis, 5-8-fida. *Bacca* dicocca. *Semina* solitaria avillata.

\* *Folii simplicibus*. (Mogorium Juss. ob octonarium laciniarum numerum.)

1. *Sambac*, foliis oppositis simplicibus ellipticis ovatis subcordatisque membranaceis opacis, ramulis petiolisque pubescentibus, lacinii calycinis subulatis. Aiton. Kew. 1. p. 8. Willd. Sp. pl. 1. p. 35. Lam. ill. t. 6. f. 1. Rumph. amb. 5. p. 52. t. 30. Hab. in India. Odor gratus.  $\mathcal{H}$

2. *undulatum*, foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus. Nyctanthes undulata. Sp. plant. p. 8. Rheed. 6. p. 97. 55. Hab. in Malabar.  $\mathcal{T}$

3. *hirsutum*, petiolis pedunculisque villosis. Willd. l. c. 1. p. 36. N. hirsuta. Sp. plant. 2. p. 8. Hab. in India.  $\mathcal{T}$

4. *triflorum*, fol. (parvis) ovatis: inferioribus obtusis; superioribus acutis, cymis trifloris. Lam. illustr. p. 23. t. 6. f. 2. sub Mogorio. Nyct. angustifolia. L. Rheed. 6. t. 53. In Malabar.  $\mathcal{H}$

5. *acuminatum*, fol. ovatis acuminatis trinerviis, petiolis cirrhosis, dentibus calycinis setaceis. Lam. l. c. sub Mogorio. In insula Java.  $\mathcal{H}$

6. *trifoliatum*, fol. ternatis: foliolis ovatis, minoribus, calyce brevissimo. Lam. l. c. p. 27. cresc. In insula Mauritiana.  $\mathcal{T}$

7. *pubescens*, foliis oppositis ovatis cordatis utrinque pubescentibus. Willd. l. c. p. 37. Retz. Obs. bot. 5. p. 9. Hab. in Calcutta.  $\mathcal{H}$

8. *scandens*, foliis oppositis simplicibus ovato-oblongis attenuatis, paniculis brachiatis, lacinii calycinis setaceis reflexis. Vahl. symbol. 3. p. 2. Hab. in Bengal.  $\mathcal{T}$

9. *elongatum*, foliis cordatis lanceolatis acutis elongatis minoribusque, ramis teretibus. Willd. Nyct. elongata. Lin. suppl. 28. Berg. Act. angl. 1772. p. 250. t. 11. Hab. in India orientali.  $\mathcal{H}$

10. *glaucum*, foliis oppositis simplicibus lanceolatis nitidis, lacinii calycinis subulatis. Aiton. Kew. 1. p. 9. Jasm. ligustrifolium, foliis oppositis simplicibus lanceolatis crassiusculis. Lam. rck. encyclop. 3. p. 209. Nyctanthes glauca. Lin. suppl. 82. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{H}$

11. *trinerve*, foliis oppositis simplicibus ovatis attenuatis trinerviis, pedunculis axillaribus subunifloris. Vahl. symbol. 3. p. 2. Hab. in Java.  $\mathcal{H}$

12. *lanceolatum*, fol. oppositis lanceolatis, pedunculis axillaribus terminalibusque unifloris. Fl. peruv. 1. p. b. Hab. in Peru, locis umbrosis. Cor. alba subpurpurascens.

13. *australe*, fol. oppositis ovato-lanceolatis simplicibus. Forst. prod. n. 7. (simplicifolium.) Hab. in insulis Americarum. h

\*\*\* *Foliis ternatis.*

14. *angulare*, foliis oppositis ternatis: foliolis ovatis obtusis, ramulis angulatis petiolisque villosis, pedunculis axillaribus trifloris. Vahl. symbol. 3. p. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h

15. *auriculatum*, foliis oppositis ternatis, ramulorum floriferorum simplicibus, calycibus angulatis ramisque teretibus pubescentibus. Vahl. symbol. 3. p. 1. Hab. in hortis idolotrorum Malabaricae. h

16. *flexile*, glabrum, foliis oppositis ternatis, racemis axillaribus brachiatis, caule scandente, ramis teretibus. Vahl. symbol. 5. p. 1. Hab. in India orientali. h

17. *didymum*, glabrum, foliis oppositis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis, racemis axillaribus. Vahl. symbol. 3. p. 2. Hab. in Societatis insulis. h

18. *azoricum*, foliis oppositis ternatis: foliolis ovatis subcordatisque undulatis, ramis glabris teretibus, corollae laciniis tubo aequalibus. Aiton Kew. 1. p. 9. Pluk. alm. 185. t. 303. f. 1. Hab. in insulis azoricis. Flor. albi, odorati. Fol. magna. h

19. *fruticans*, foliis alternis ternatis simplicibusque: foliolis obovatis cuneiformibusque obtusis, ramis angulatis, laciniis calycinis subulatis. Aiton. Kewens. 1. p. 9. Jasm. luteum, vulgo dictum bacciferum. Bauh. pin. 298. Lam. illustr. n. 63. t. 7. f. 2. In Europa australi et toto Oriente. h

20. *humile*, foliis alternis acutis ternatis pinnatisque, ramis angulatis, laciniis calycinis brevissimis. Aiton. Kew. 1. p. 9. Knorr. del. hort. 1. tab. 1. Besl. cyst. activ. 1. 40. f. 2. Fl. lutei. h

21. *odoratissimum*, foliis alternis obtusiusculis ternatis pinnatisque, ramis teretibus, laciniis calycinis brevissimis. Ait. Kew. 1. p. 10. Hab. in Madera. Flor. flavi. h

\*\*\* *Foliis pinnatis.*

22. *officinale*, foliis oppositis pinnatis: foliolis acuminatis, gemmulis erectiusculis. Aiton. Kew. 1. p. 10. J. foliis oppositis: foliolis distinctis. Syst. Veg. p. 54. Blackw. t. 13. Hab. in India, inque Helvetia. Flor. albi, odorati. h

23. *grandiflorum*, foliis oppositis pinnatis: foliolis obtusiusculis, gemmis horizontalibus. Ait. Kew. 1. p. 10. J. fol. oppositis pinnatis: foliolis extimis confluentibus. Sp. pl. 2. p. 9. Mill. dict. n. 4 Merian.

surin. t. 46. Alced. mal. 6. p. 91. t. 52. Hab. in India. Cor. alba, subtus rubra. h

34. *GALIPEA*. Cal. 4-5-gonus, 4-5-dentatus. Cor. hypocraterif. profunde 4-5-partita. Stam. 4: duo sterilia.

1. *trifoliata*. Aubl. gujan. n. 2. p. 662. t. 269. Hab. ad fluviorum ripas Gujanae. h

35. *LIGUSTRUM*. Cor. 4-fida. Bacca 4-sperma.

1. *vulgare*, foliis lanceolatis acutiusculis, panicula coarctata. Willd. arb. berol. p. 169. Hab. in collibus glareosis, ad sepes. h

2. *japonicum*, fol. ovatis acuminatis, panicula divaricata. Willd. S. P. 1. p. 42. L. fol. ovatis acuminatis, panicula decomposita trichotoma. Thunb. jap. p. 17. t. 1. Hab. in Japonia. h

36. *PHILLYREA*. Cor. 4-fida: tubo brevissimo. Bacca 2-locularis: loculis 1-sperma: uno saepe abortivo.

1. *media*, foliis oblongo-lanceolatis integris serratisque. Ait. Kew. 1. p. 11. Willd. Sp. pl. 1. p. 42. Gaertn. de Fr. et Sem. 2. p. 71. t. 92. f. 5. Camer. epit. 50. 1c. Hab. in Europae australioris collibus. h

2. *angustifolia*, foliis lineari-lanceolatis integerrimis. Hort. cliff. 4. Lam. illustr. t. 8. f. 3. Cam. l. c. Hab. in Italia, Hispania et in Atlantide. h

3. *latifolia*, foliis ovato-cordatis serratis. Hort. cliff. 4. Lam. illustr. t. 8. f. 2. Clus. hist. 51. 1c. Hab. in Europa australi. Sempervirens. h

37. *OLEA*. Cor. 4-fida: laciniis subovatis. Drupa 2-sperma: uno abortante.

1. *europaea*, foliis lanceolatis integerrimis, racemis axillaribus coarctatis. Ait. Kew. 1. p. 12. Lam. l. c. t. 8. f. 1. Gaertn. 2. p. 75. t. 93. f. 4. Willd. l. 1. p. 44-46. Hab. in Europa australi, inque Africa boreali. h

β *verrucosa*, fol. lanceolatis planis subtus albidis, ramis verrucosis. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 44. O. europaea. Thunb. prodr. 2. Ad Cap. bon. spei. h

2. *capensis*, foliis ovatis integerrimis, racemis paniculaeformibus divaricatis. Aiton. Kew. 1. p. 13. Burm. afr. 233. t. 81. f. 1. Hab. ad Cap. b. Spei. h

3. *americana*, foliis lanceolato-ellipticis integerrimis, racemis angustatis, bracteis omnibus persistentibus connatis parvis. Ait. Kew 1. p. 14. Ligustrum lauri folio, fructu violaceo, baccis purpureis. Catesb. 1. p. 61. t. 61. Seeligm. Voegel. 3. t. 33. Hab. in Carolina. h

4. *cernua*, foliis oblongis lanceolatis obtusissimis, racemis axillaribus simplicibus, floribus cernuis. Vahl. symbol. 3. p. 3. Hab. in Madagascar. h

5. *apetala*, foliis ellipticis, floribus racemosis apetalis. Vahl. symbol. 3. p. 3. Hab. in Nova Zeelandia. h

6. *excelsa*, foliis ellipticis acutis, bracteis perfoliatis: infimis cyathiformibus, superioribus foliaceis magnis deciduis. Vahl. symbol. 3. p. 3. Hab. in Madera h

7. *fragens*, foliis lanceolatis serratis, pedunculis lateralibus aggregatis unifloris. Thunb. jap. 18. t. 2. Hab. in Cochinchina, China, Japonia. Flores ob odorem gratum ad potum Theae addibentur ab incolis. h

8. *emarginata*, fol. obovatis retusis emarginatis, panicula pauciflora terminali. Lam. illustr. p. 26. t. 8. f. 2. Hab. in insula Madagascariae. Arbor 40-pedalis.

9. *chrysophylla*, fol. angusto-lanceolatis utrinque acutis subtus aureo-nitidis, paniculis lateralibus. Lam. ill. p. 27 In insula Maritima. h.

10. *lancea*, fol. lineari-lanceolatis utrinque acutis, panicula terminali, drupis oblongis acutis. Lam. l. c. In insula Franciae. h

38. ORNUS. Cal. 4-partitus. Corol. 4-partita: petalis longis ligulatis. Filam. longa. Nux alata.

1. *europaea*. Fraxinus Ornus L. Mill. illustr. ic. arbor. Hab. in Italia et Hispania. (Cavan.) Floribus, sequenti generi fere similibus, plane differt a *Fraxinis*.

39. CHIONANTHUS. Cor. 4-fida: laciniis longissimis. Drupae Nucleus striato-fibillosus.

1. *virginica*, panicula terminali trifida, pedunculis trifloris, foliis acutis. Willd. Sp. pl. 1. p. 46. Lam. illustr. p. 30. t. 9. Hab. in America septentrionali. Variat corolla 4. 5. 6-fida et staminibus quatuor. h

2. *cotinifolia*, panicula terminali trichotoma, pedunculis trifloris, foliis obtusis. Willd. l. c. p. 47. Arbuscula zeylanica, cotini foliis subtus lanugine villosis, floribus

albis cuculli modo laciniatis. Pluk. alm. 44. t. 241. f. 4. Hab. in Zeylona. h

3. *compacta*, paniculis trichotomis, ultimis floribus subcapitatis, calycibus villosis, foliis lanceolato-oblongis, antheris acuminatis. Swartz prod. 13. Vahl. symbol. 2. p. 1. Jacq. Collect. 2. p. 110. t. 6. f. 1. *Ceranthus* Schreb. gen. Hab. in insulis Caribaeis. h

4. *zeylanica*, ramis paniculae axillaribus oppositis, floribus subsessilibus. Thounia nutans. Lin. suppl. 87. Hab. in Zeylone. h

5. *guianensis*, flor. corymbosis axillaribus, fol. alternis oppositisque ovato-oblongis. *Mavepa guianensis*. Aubl. guaj. p. 8. t. 1. 31. Flor. 4-andr. Schwarz. l. c. a. Hab. in Gujana. Cort. albicans. a. h

6. *incrassata*, paniculis decussatis fastigiatisque, cor. laciniis incrassatis, fol. oblongis. Swartz prod. p. 13. In Jamaica. Flor. 2-andri S. in Schrad. Journ. 2. p. 21.

7. *ligustrina*, fol. lanceolatis, paniculis ternis, floribus erectis subtripetalis. Richard. Thounia Swartz prod. p. 15. *Linociera* Schreb. gen. pl. L. n. 1709. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 154. Hab. in Jamaica. h

40. SYRINGA. Cor. 4-fida. Capsula bilocularis.

1. *vulgaris*, fol. cordatis. L. Willd. p. 48. Lilac vulgaris. Lam. ill. p. 26. t. 1. Du Hamel. arb. 2. t. 138. Ad sepes et in sylvaticis. h

2. *dubia*, fol. ovato-attenuatis. S. chinensis Willd. Sp. pl. L. 1. p. 48. Etiam in Gallia, ex gr. prope Rouen et circa Parisios sponte quasi crescit. An e China ad Europam prius apportata? h

3. *persica*, foliis lanceolatis integris pinnatifidisque. Lin. Hort. cliff. 6. Mill. dict. t. 164. f. 2. Hab. in Persia. Nunc frequens in hortis colitur. h

4. *suspensa*, foliis ovatis serratis ternatisque. Thunb. jap. 19. t. 3. Hab. in Japonia. Calyx profundius divisus et corolla campanulata. Thunb. h

41. DIALIUM. Cor. 5-petala. Cal. nullus. Stamina ad latus superius receptaculi.

1. *indum*, panicula simplici nutante. Hab. in India. h

2. *guinense*, panicula supradecomposita erecta. Willd. apud Roemer Archiv. 1. p. 31. t. 6. Hab. in Guinea. h

42. **PIMELEA.** *Cal.* nullus. *Cor.* 4-fida. *Stam.* fauci inserta. *Nux* corticata unilocularis.

1. *linifolia*, foliis lineari-lanceolatis latis, capitulis terminalibus involucrentis, corolla extus villosa. Smith. Nov. Holl. 1. p. 31. tab. 11. Hab. in Nova Hollandia.  $\bar{h}$

2. *Gaidia*, foliis oblongo-lanceolatis acutis glaberrimis, corolla extus villosa Willd. l. c. p. 58. Passerina Gnidia. Lin. suppl. 226. Hab. in Nova Zeelandia.  $\bar{h}$

3. *pilosa*, pilosa, foliis linearibus obtusis. W. Passerina pilosa. Lin. suppl. 226. Hab. in Nova Zeelandia.  $\bar{h}$

4. *prostrata*, pilosa, fol. ovatis sessilibus carnosius. Willd. p. 51. Lam. ill. p. 31. t. 6. f. 1. Passerina prostrata. Lin. suppl. 227. Hab. in Nova Zeelandia montibus aridis.  $\bar{h}$

43. **ERANTHEMUM.** *Cor.* 5-fida: tubo filiformi. *Antherae* extra tubum. *Stigma* simplex.

1. *capense*, foliis lanceolato-ovatis petiolatis. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 51-52. Herm. parad. 153. Hab. in Aethiopia. Habitus Chloroniae.

2. *angustifolium*, foliis linearibus remotis patulis. Syst. Veg. p. 55. Lam. ill. 1. p. 60. t. 17. f. 1. Selago dubia. Spec. plant. 2. p. 877. Burm. afr. 130. t. 4. f. 3. Plukn. mant. 180. t. 445. f. 6. Hab. in Aethiopia.  $\bar{h}$

3. *parvifolium*, foliis ovato-linearibus imbricatis. Mant. p. 171. Berg. cap. 2. Lam. l. c. f. 2. Comm. amst. 2. 119. t. 60. Hab. ad Cap. b. spec.  $\bar{h}$

4. *salsoloides*, fruticosum, foliis carnosius teretiusculis linearibus glaberrimis, racemis axillaribus calycibusque pubescentibus, tubo recurvo. Lin. suppl. 82. Hab. in Teneriffa prope St. Crux.  $\bar{h}$

44. **FONTANESIA.** *Cor.* dipetala. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Caps.* membranacea non debiscentis, 2-locularis: loculis monospermis.

1. *phillyreoides*. Billard. Icon. pl. Syr. Dec. 1. p. 9. t. 1. Duhamel arb. ed. nova. t. 5. Hab. in Syria inter Laodicam ad mare et montem Caspium.  $\bar{h}$

45. **CIRCAEA.** *Cor.* dipetala. *Cal.* 2-phyllus, superus. *Caps.* hispida bilocularis non dehiscens; loculis monospermis.

1. *luteiana*, caule erecto, racemis plu-

ribus, foliis ovatis. Oed. dan. 256. Lam. ill. 16. f. 1. Fol. pubescentia, etiam glabra. Kniph. orig. cent. 10. t. 22. Hab. in Europae et Americae borealis nemoribus.  $\bar{h}$

\* *intermedia*, major, fol. cordatis, repando-denticulatis acuminatis cauleque simplici glabro, capsulis ovato-globosis. Schumacher Flor. Saelland. 1. p. 5. Circaea luteiana Curt. Flor. Londini. In umbrosis humidis et in palustribus.

2. *alpina*, caule ramosissimo depresso, foliis cordatis dentatis nitidis glabris. Roth. germ. I. p. 13. Hab. ad montium radices in Europa.  $\bar{h}$

46. **VERONICA.** *Cor.* limbo 4-partito: lacinia infima angustiore. *Caps.* bilocularis.

\* *Spicatae.*

1. *sibirica*, spicis terminalibus, foliis septenis verticillatis, caule subhirsuto. Gmel. sib. 3. p. 217. Amm. Fl. ruthen. t. 4. Willd. Sp. 1. p. 54. Hab. in Dauria. Stamina et pistillum corolla duplo longiora.  $\bar{h}$

2. *virginica*, spicis terminalibus; foliis quaternis quinisque. Pluk. alm. 383. t. 70. f. 2. Hab. in Virginia et Japonia. Flor. albi.

3. *spuria*, spicis terminalibus, foliis lanceolatis aequaliter serratis. Roth. germ. I. p. 2. H. p. 5. Gmel. it. 1. p. 169. t. 39. Barr. ic. 801. Hab. in Europa australiore, Sibiria, Thuringia.  $\bar{h}$

4. *maritima*, spicis terminalibus, foliis subcordato-lanceolatis, inaequaliter serratis. Roth. germ. I. p. 5. Oed. dan. 374. Knorr. del. hort. 2. tab. V. 2. Hab. in maritimis Europae maris apricis. Fol. ovata. Var. ut antecedens et sequens species, fol. oppositis ternis quaternisque, flore coeruleo, coerulescente, incurvato, alboque. Willd.  $\bar{h}$

5. *longifolia*, spicis terminalibus, foliis lanceolatis acuminatis serratis in petiolum desinentibus. Roth. germ. I. p. 5. Sabbat. hort. rom. 2. t. 48. Hab. in Tartaria, Austria, Suecia.  $\bar{h}$

6. *incana*, spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis obtusis cauleque erecto tomentoso. V. spicata lanuginosa et incana, floribus coeruleis. Amm. ruth. 30. Hab. in Ucraina, Samara. Cinerascens.  $\bar{h}$

7. *spicata*, spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis apice integerimis caule adscendente simplicissimo. Oed. dan. 1. 52. Hab. in sylvaticis. Variat spicis pluribus.  $\bar{h}$

8. *hybrida*, spicis terminalibus, foliis



ellipticis obtusis inaequaliter crenato-serratis, caule erectiusculo. Smith. Flor. Brit. 1. p. 16. Willd. apud Schrad. Journ. de Bot. 1799. p. 288. t. 3. Antecedente major, spicis plurimis. In montosis Europae.  $\overline{\text{T}}$

9. *pinnata*, spica terminali, foliis linearibus pinnatifidis subfasciculatis: laciniis filiformibus divaricatis. Aiton Kew. 1. p. 19. Laxmann in Act. Petrop. 1770. p. 553. t. 29. f. 1. Hab. in Sibiria.  $\overline{\text{T}}$

10. *laciniata*, racemo subspicato terminali, foliis pinnatifidis laciniatis. Ait. Kew. 1. p. 19. Junghans. icon. rar. cent. 1. fig. 2. Hab. in Sibiria.  $\overline{\text{T}}$

11. *incisa*, spicis terminalibus, foliis lanceolatis inciso-pinnatifidis glabris. Ait. Kew. 1. p. 19. Hab. in Sibiria. Differt a praecedenti spicis nunquam solitariis semper aggregatis.  $\overline{\text{T}}$

12. *Catarractae*, racemis terminalibus flexuosis, caule suffruticoso, foliis lanceolatis serratis. Forst. prodr. n. 7. Hab. in Nova Zeelandia.  $\overline{\text{T}}$

13. *elliptica*, racemis lateralibus, caule fruticoso, foliis ellipticis integerrimis. Forst. prod. n. 10. Hab. in Nova Zeelandia.  $\overline{\text{T}}$

14. *macrocarpa*, racemis subterminalibus erectis, foliis lanceolatis integerrimis glabris planis, caule fruticoso. Vahl symb. 3. p. 4. Hab. in Nova Zeelandia.  $\overline{\text{T}}$

15. *salicifolia*, racemis lateralibus nantibus, foliis lanceolatis integerrimis, caule fruticoso. Vahl. symbol. 3. p. 4. Hab. in Nova Zeelandia.  $\overline{\text{T}}$

16. *parviflora*, racemis subterminalibus, foliis linearilanceolatis integerrimis glabris mucronatis, caule fruticoso. Vahl. symbol. 3. p. 4. Hab. in Nova Zeelandia.  $\overline{\text{T}}$

17. *officinalis*, spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis obovato-subrotundis pilosis annuis, caule procumbente hirsuto. Willd. p. 59. Flor. succ. 2. n. 12. Oed. dan. t. 248. Hab. in Europae sylvestribus sterilibus.  $\overline{\text{T}}$

18. *Allionii*, spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis subrotundis nitidis rigidis, caule glabra repente. Smith Act. Soc. Lin. Lond. 1. p. 190. Allion. pedem 1. n. 265. t. 46. f. 3. Pluk. phyt. 233. f. 1. Hab. in alpinis Galliae australioris Italiae, Helvetiae.  $\overline{\text{T}}$

19. *Michauxii*, pilosa, racemis lateralibus, For. subglomeratis, fol. ovatis dentatis sessilibus. Lam. ill. p. 44. In Oriente. Pili ulli glutinosi.

20. *decussata*, racemis axillaribus paucifloris, foliis ellipticis perennantibus integerrimis, caule fruticoso. Willd. arb. berol. p. 400. Moench. Weissenst. p. 137. Hebe magellanica. Jussieu. gen. Hab. in insulis Falklandiae inque freto Magellanico.  $\overline{\text{T}}$

#### \* \* *Corymboso-racemosae.*

21. *aphylla*, corymbo terminali, scapo nudo, caps. obcordatis. Bocc. musc. 2. p. 17. t. 1. et g. Pluk. alm. 384. t. 114. f. 3. Segui. Ver. 241. t. 3. f. 2. Hab. in Alpibus Europae australioris inque Asia boreali. Singularis pilis articulatis ut Conservae. V. Kamtschatica. L. suppl. hujus tantum varietas. Willd. p. 60. V. subcaulis. Lam. ill. p. 49. n. 171.  $\overline{\text{T}}$

22. *nudicaulis*, corymbo terminali, scapo nudo, caps. ovatis integris. Lam. ill. p. 46. Hab. in Europae alpinis.

23. *bellidioides*, corymbo terminali, caule adscendente diphylo, foliis obtusis crenatis, calycibus hirsutis. V. caule simplicis, foliis scabris serratis ovatis, spica pauciflora. Hall. helv. n. 543. t. 15. f. 1. Hab. in Pyrenaeis, alpinis Helvetiae imprimis Aquilegensibus.  $\overline{\text{T}}$

24. *gentianoides*, corymbo terminali, caule adscendente, foliis lanceolatis marginate cartilagineis: inferioribus connatis vaginantibus. Vahl. symbol. 1. p. 1. Buxb. Cent. 1. p. 23. t. 35. Hab. in Cappadocia, Armenia.  $\overline{\text{T}}$

25. *Ponae*, racemo terminali, caule simplicissimo, foliis cordato-ovatis dentatis sessilibus. Willd. p. 51. V. *Ponae*, spica terminali, foliis cordato-ovatis sessilibus summis alternis. Gouan. illust. p. 1. t. 1. f. 1. Pluk. phytog. t. 233. f. 3. Hab. in montosis Pyrenaeorum inque monte Baldo.  $\overline{\text{T}}$

26. *fruticulosa*, corymbo terminali, foliis lanceolatis obtusiusculis subdentatis, calycinis foliolis acutis, caulibus fruticulosus. W. Hall. helv. n. 545. t. 16. Jacq. collect. 4. p. 229. tab. 5. Hab. in alpinis. Facies Ver. serpyllifoliae.  $\overline{\text{T}}$

27. *saxatilis*, corymbo terminali, fol. ellipticis obtusis integerrimis ciliatis, calycinis foliolis obtusis, caulibus fruticosus. Willd. V. saxatilis, corymbo terminali, fol. oppositis glabrisculis, pedunculis folia floralia superantibus. Lin. suppl. 83. Oed. dan. t. 342. Hab. in alpinis. Caulis ramosi diffusi. Fl. magni, fauce rubra.  $\overline{\text{T}}$

28. *alpina*, corymbo terminali, foliis oppositis oblongo-lanceolatis acutis dentatis, calycibus hispidis. Oed. dan. t. 16. Fl. lapp. 7. t. g. f. 4. Hab. in alpinis Europae.  $\overline{\text{T}}$

29. *integrifolia*, corymbo terminali, foliis oppositis ellipticis obtusis integerrimis, calycibus pilosis. Willd. p. 63. V. alpina. Krockersiles. n. 28 tab. 3. Hab. in alpinis Salisburgensibus inque Sudetis.  $\overline{\text{T}}$

30. *tenella*, foliis oblongis crenatis, caulibus repentibus, calycibusque villosis. Vahl. symbol. 3. p. 5. Allion. pedem. n. 272. t. 22. f. 1. Pluk. alm. 384. t. 233. f. 4. Hab. in Pyrenaeis et alpinis Pedemontanis.  $\overline{\text{T}}$

31. *Beccabunga*, racemis lateralibus, ovis ovatis planis, caule repente. Oed. dan. 511. Curt. Fl. Lond. Hab. ad scaturigines vix congelandas.  $\overline{\text{T}}$

32. *Anagallis*, racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. Fl. Dan. 903. Hab. in Europa ad fossas et in Oriente.  $\overline{\text{T}}$

33. *scutellata*, racemis lateralibus alternis: pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. Oed. dan. 209. Hab. in Europae inundatis. Racemi capillares, laxi, divaricati.  $\overline{\text{T}}$

34. *Tenarium*, racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis dentatis obtusiusculis, caulibus adscendentibus. Rivin. t. 95. Hab. in Germ. Helvetia. (Specimen huius et sequentis Veronicae in herbario Linnaeano non invenit Smith.)  $\overline{\text{T}}$

35. *pilosa*, racemis axillaribus, foliis ovatis obtusis plicatis profunde dentatis, caule prostrato bifariam piloso. V. racemis subspicatis, foliis ovatis obtusis, plicatis, caule prostrato piloso. Sp. plant. 2. app. 1663? Hab. in Austria. Calyces sessiles, laciniis 2 exterioribus majoribus. Corollae albido-coerulescentes. W.  $\overline{\text{T}}$

36. *prostrata*, racemis lateralibus, foliis lineari-lanceolatis serratis, caulibus prostratis. Pollich. pal. n. 15. Riv. t. 95. Hab. in collibus.  $\overline{\text{T}}$

37. *pectinata*, racemis lateralibus, foliis oblongis pectinato-serratis, caulibus prostratis. Mant. p. 24. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 39. Hab. Constantinopoli. Tomentosa.  $\overline{\text{T}}$

38. *montana*, racemis lateralibus elongatis filiformibus, foliis ovatis petiolatis obtusis grosse serratis, caule petiolisque hirtis. Lin. suppl. 83. Jacq. austr. t. 109. Flor. dan. t. 1201. In umbrosis humidis. Caulis repens. Calyces 4-fidi. Fructus orbiculati.  $\overline{\text{T}}$

39. *Chamaedryx*, racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus rugosis dentatis, caule bifariam piloso. Oed. dan. 448. Hab. in Europae pratis, ad sepes.  $\overline{\text{T}}$

40. *pedunculata*, racemis lateralibus oppositis, fol. ovatis inciso-serratis, incisuris basi sublentatis, pedicellis filiformibus, calyc. 4-fidis subaequalibus. De Bieberstein Tableau des provinces occident. de la mer Caspienne. Petersbourg, 1798. Buxb. cent. 1. t. 42. fig. 1. In sylvis umbrosis circa Kurt-Butak.  $\overline{\text{T}}$

41. *orientalis*, racemis lateralibus, foliis pinnatifidis glabris acutis basi attenuatis, calycibus inaequalibus, pedicellis capillari-bus bractea longioribus. Ait. Kew. 1. p. 23. Salisb. icon. 1. p. 7. tab. 4. Hab. in Armenia, Iberiae graminosis. Fol. latiuscula.  $\overline{\text{T}}$

42. *multifida*, racemis lateralibus, foliis multipartitis, laciniis pinnatifidis, lobis decurrentibus, pedunculis brevibus, calyce glaberrimo, caule villosa. Willd. Sp. pl. 69. V. multifida, racemis lateralibus, fol. multipartitis laciniatis, caulibus erectis. Sp. plant. 17. Hab. in Sibiria. Fol. elongata.  $\overline{\text{T}}$

43. *austriaca*, racemis lateralibus, foliis pilosiusculis linearibus pinnatifidis, laciniis infimis longioribus divaricatis, calycibus pilosiusculis, pedunculis bractea brevioribus. Willd. p. 70. Jacq. austr. cent. 4. t. 329. Moris. hist. 2. s. 3. t. 23. f. 17. Hab. in Austria, Silesia, Carnioli. Caulis et folia pilis minutissimis adpressis tecta.  $\overline{\text{T}}$

44. *atlantica*, caule adscendente fruticoso, fol. pinnatifidis, racemis terminalibus. Def. Fl. atlant. 1. p. 13. V. rosea. Hab. in Atlante. Caul. filiformis. Corolla rosea.  $\overline{\text{T}}$

45. *taurica*, racemis lateralibus, foliis pilosiusculis linearibus indivisis et pinnatifido-denticulatis, pedunculis bractea longioribus, calyce quadrifido glabro. Willd. Sp. p. 70. Hab. in Tauria. Corolla rosea.  $\overline{\text{T}}$

46. *urticaefolia*, racemis lateralibus, foliis cordatis sessilibus argute serratis acuminatis, caule stricto, foliolis calycinis quaternis. Ait. Kew. 1. p. 24. Lin. suppl. 83. Jacq. austr. 1. p. 37. t. 59. Hab. in Helvetia, Bithynia, Austria, Bavaria.  $\overline{\text{T}}$

47. *latifolia*, racemis lateralibus, foliis cordatis sessilibus rugosis obtuse serratis, caule stricto, foliolis calycinis quinis. Ait. Kew. 1. p. 24. Jacq. austr. 1. p. 37. t. 60. Hab. in Austria, Germania. Fol. incisa.  $\overline{\text{T}}$

48. *paniculata*, racemis lateralibus longissimis, foliis lanceolatis ternis serratis, caule adscendente. Pall. it. 1. p. 196. Hab. in Tartaria, Bohemia. Calyces 4-fidi.  $\overline{\text{T}}$

\*\*\* *Pedunculis unifloris.*

49. *bitoba*, floribus solitariis, foliis cor-

dato-lanceolatis dentatis, calycinis aequalibus ovatis acuminatis trinerviis. Smith. Act. Soc. Linn. Lond. t. p. 193. V. floribus solitariis, foliis ovatis acutis serratis glabris, calycibus fructu bipartito majoribus Vahl. symbol. t. p. 1. Buxb. cent. 1. p. 24. t. 36. Hab. inter Cappadociae segetes. ⑤ Affinis V. arvensi. Capsulae bipartitae.

50. *agrestis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisus pedunculo reflexo brevioribus. Fl. suec. 17. 20. Oed. dan. t. 449. Hab. in Europae agris et arvis. Caul. procumbens, diffusus. ⑤

51. *arvensis*, floribus solitariis, foliis cordatis incisus pedunculo longioribus, caps. compressis sessilibus. Oed. dan. 515. In arvis cultis. Var. caule ramoso diffuso: V. *polyanthos*. Thuill. In gramnosis, ad sepes, in agris. ⑤

52. *serpillifolia*, floribus solitariis subspicatis, fol. ovatis inferioribus crenatis, caule basi repente. L. Flor. dan. t. 493. In sylvaticis, pratis, locis subhumidis. Habitus fere Lysim. nummulariae.

53. *hederifolia*, floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis pedunculo brevioribus, calycinis ovatis. Willd. Hab. in ruderalis, hortis, agris. ⑤

54. *rotundifolia*, floribus solitariis, fol. orbiculato-reniformibus crenatis, caule filiformi repente. Flor. Peruv. t. p. 6. In Peruviae uliginosis. Flores interdum 5-fidi, et Stam. 4. vid. l. c. ⑤

55. *Chamaepitys*, caule basi tenui ascendente, fol. sessilibus trifido-linearibus, flor. sessilibus minutis solitariis. V. *Chamaepityoides*. Hort. Par. Dumont Courset, Bot. cultivateus. 4. p. 39. In Europa. ⑤

56. *filiformis*, floribus solitariis, foliis cordatis crenatis pedunculo brevioribus, calycinis lanceolatis, pedunculo filiformi longissimo. Smith Soc. Linn. Lond. t. p. 165. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 40. f. 1. Hab. in Oriente. ⑤

57. *triphyllos*, floribus solitariis pedunculatis, foliis digitato-partitis, caule patulo. Oed. dan. t. 647. V. flor. solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. Fl. suec. 19. 20. Veronica folio rutae. Riv. t. 66. Hab. in Europae agris. Ramosa. ⑤

58. *verna*, floribus solitariis subsessilibus, foliis digitato-partitis summis indivisis, caule stricto. Willd. Oed. dan. t. 252. Hab. in Europae aridis apricis. Pervula, simplex. ⑤

59. *digitata*, floribus solitariis sessilibus, foliis omnibus digitato-partitis, caule

stricto. Vahl. symbol. t. p. 2. Hab. in agris Bohemae, Montepellii, Hispaniae. ⑤

60. *acutifolia*, floribus pedunculatis solitariis, foliis ovatis glabris crenatis, caule erecto subuloso, caps. compressis. Veill. paris. 201. t. 33. l. 3. ⑤

61. *praecox*, foliis cordatis sessilibus, proinde dentatis, caule erecto hirsuto ramoso, pedunculis folia adaequantibus, calycibus quadrifidis aequalibus. Schmitt bohem. t. n. 44. V. *Ocimumfolia*, flor. solitariis pedunculatis, caule erecto, foliis subtus rubris, flore caeruleo. Thuill. Flor. paris. p. 10. Bocc. Mus. t. 102. Hab. in agris cultis. Foliis incisus echinatus a priore et floribus pedunculatis a V. *arvensi* differt. ⑤

62. *peregrina*, floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis, caule erecto. Flor. dan. t. 407. Morris. hist. 2. p. 329. s. l. t. 34. f. 10. n. 56. V. *Marilandica*. Murr. Comm. Goett. 1782. p. 11. tab. 3. In Europae et Amer. septent. arvis. ⑤

63. *Bellarli*, floribus solitariis pedunculatis, foliis linearibus intererrimis hirtis flore longioribus, caule simplicissimo erecto. Willd. V. Bellardi hirsuta, caule erecto simplici toto florifero. Allion. pedem. t. n. 282. t. 85. f. 1. n. 57. V. polygonoides Lam. ill. n. 165. Hab. in pascuis Pedemontanis, et in Gallia. ⑤

47. COLUMELIA. Cal. 5-partitus. Cor. rotata. Caps. didyma: valvulis dupliantibus.

1. *arborescens*, foliis oblongis, floribus corymbosis. C. oblonga. Flora Peruv. 1. p. 28. t. 12 f. 2. Hab. in sylvis peruvianis.

2. *frutescens*, fol. obovatis serrato-dentatis integrisque, pedunculis subnullis. C. obovata Fl. peruv. t. 12. f. b. In collibus aridis in Peru. Amarissima. Cor. laciniatae patulae.

48. SARMIENTA. Cor. urceolata. Filam. 3 sterilia. Caps. 1-locularis, circumscissa.

1. *scandens*. Fewill. peruv. 3. p. 69. t. 43. sub Urceolaria. Sarmienta repens, fol. ovatis carnosius utrinque punctatis. Flor. Peruv. t. p. 8. t. 7. f. b. In nemoribus peruvianis. Planta parasitica scandens.

49. PAEDEROTA. Cor. ringens 4-fida: fauce nuda. Cal. 5-partitus. Caps. bilocularis.

1. *Ageria*, foliis ovato-acuminatis,

corollarum galea bifida. Willd. Sp. pl. 1. p. 77. *Paederota lutea*. Lin. suppl. 84. Scop. Jacq. hort. 2. t. 121. Hab. in Carniolia, Italia. ☉

2. *Bonarota*, foliis subrotundo-ovatis, corollarum galea integra. W. Jacq. austr. 5. app. t. 39. *Paederota caerulea* Lin. suppl. 84. Mich. gen. 19. n. 1. t. 15. f. 1. (Var.) Hab. in alpinis Austriae, Carnioliae, Italiae. ☉

3. *minima*, foliis oblongis integris oppositis, floribus axillaribus oppositis, calycum dentibus intus hirsutis. Retz. obs. fasc. 5. p. 10. Hab. in India. Facies *Elatines Hydropiperis*. Retz. ☉

50. **WULFENIA**. *Cor. ringens*: labio superiore brevi integro; inferiore 3-partito, sauce barbata. *Cal.* 5-partitus. *Caps.* 2-locul.

1. *carinthiaca*. Jacq. miscell. 2. p. 62. tab. 8. fig. 1. Icon. rar. 1. t. 2. *Paederota Wulfenia*. Lamarck. encyclop. tab. 13. fig. 2. Hab. in summis alpinis Carinthiae solo pinguisimo. Folia radicalia obovata obtusa. Flores pedunculati, secundi, caerulei. ☉

51. **GLOBIFERA**. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-partita subbilabata: lacinia superiore minore. *Filam.* incurva basi appendiculata. *Caps.* subglobosa polysperma.

1. *umbrosa*. Gmel. Syst. nat. Linn. 2. p. 32. *Micranthemum orbiculatum* Michaux Flor. Bor. Amer. 1. p. 10 t. 2. Caul. filiform. repentes. In udis opacisque sylvarum Carolinae et Georgiae. Aug. floret.

52. **GRATIOLA**. *Cal.* 7-phyllus: exterior patulus. *Cor.* resupinata. *Filam.* 7. sterilia. *Caps.* 2-ocular.

1. *officinalis*, fol. lanceolatis serratis, floribus pedunculatis. Oed. Flor. dan. 1. 363. Willd. Spec. pl. 1. p. 102-106. Hab. in Europae humilijusculis. Erecta. ☉

2. *carolinensis*, caule ut plurimum simplice, filamentis sterilibus nullis, capsula calyci subaequali. Michaux Flor. boreali-am. 1. p. 6. *G. officinalis*. Hab. in Virginia et Carolina. Distincta?

3. *quadridentata*, fol. lanceolatis acutis. 4-dentatis: dentibus binis ad apicem longioribus, caps. calyce triplo brevior. Michaux l. c. Hab. in Carol. inferiore.

3. *Anagallidea*, erecta glaberrima, caule 4-gono, fol. oblongo-ovalibus sub-

denticulatis flore brevioribus, calyce ebracteato. Mich. l. c. p. 7. Fol. obtusa. Corol. pallido-caerulescens. In humidis Carolinae.

4. *pilosa*, erecta ramosa pilosissima, fol. ovalibus subdentatis flore subsessili longioribus. Mich. l. c. C. peruviana tralthes. liab. cum priore. Caul. utrinque linea prominula, pilis articulatis hirsutus. M.

5. *aromatica*, fol. lanceolatis serratis sessilibus, pedunculis unifloris, caulibus fistulosis suberectis. Lam. Encycl. Hab. in Malabar. Tetrandra L.

6. *Monnicria*, fol. oblongis integris, pedunculis unifloris fol. longioribus, caule declinato. Swartz. obs. p. 15 Jacq. obs. 1. p. 4. t. 1. Ehr. pict. 14. f. 2. Sloan. jam. t. 129. f. 1. In aquis Antillarum et insulae Marchionis. Distincti generis? ☉

7. *repens*, fol. ovatis, caule repente calyce pentaphyllo, stylo bifido. Swartz prod. 14. Swartz Icon. p. 6. t. 3. Hab. in Jamaica, locis humidis. Differt a praecedente foliis tenuissime nervosis. W.

8. *rotundifolia*, fol. ovatis trinerviis. Mont. 174. Rheed. mal. 9. p. 111. t. 57. Hab. in Malabar. arenosis.

9. *lucida*, caule ramoso diffuso radicante, fol. cordato-ovatis dentatis, pedunculis axillaribus fol. longioribus. Willd.

10. *veronicifolia*, caule repente, fol. ovato-lanceolatis acutis serratis, floribus terminalibus oppositis. Retz. obs. fasc. 4. p. 8. Pluk. mant. 167. t. 186. f. 2. Rumph. amb. 5. p. 160. t. 170. f. 2. Rheed. mal. 9. p. 115. t. 55. Hab. in Indiae humidis. ☉

11. *hyssopioides*, fol. lanceolatis subseratis, articulo caulino brevioribus. Mant. 174. Pluk. a. m. 180. t. 143. f. 1. Roxb. 2. t. 128. Hab. in Tranquebariae et Coromandelae agris oryzaceis. Caulis filiformis erectus, articulis fol. pluribus longioribus.

12. *lobelioides*, caule subnudo stipulato, fol. oblongis integerrimis, panicula dichotoma, capsulis subglobosis. Retz. obs. bot. fasc. 4. p. 7. Prope Tranquebar. ☉

13. *trifida*, procumbens, fol. linearilanceolatis quaternis, apice dentatis, trifidisque, capsulis pilosis. Gratiola chamaedrifolia. Lamarck. encyclop. 3. p. 26. Rheed. mal. 9. p. 165. t. 85. Hab. in Malabar. arenosis. ☉

14. *virginica*, fol. lanceolatis obtusis subdentatis. Gron. virg. 6. Willd. sp. pl. Lin. p. 105. Hab. in Virginiae humidis.

15. *peruviana*, fol. ovato-lanceolatis serratis, floribus subsessilibus. Mill. dict. n. 3. Fawill. peruv. 3. t. 7. Flor. peruv. p. 7. In Peru. Fol. subamar.

16. *grandiflora*, caulibus decumbentibus, fol. ovatis serratis, pedunculis oppositis, capsulis subulatis. Retz. obs. fasc. 4. p. 8. Hab. in India. Flor. magni.

17. *oppositifolia*, caule ascendente, fol. lanceolatis serratis, pedunculis oppositifoliis. Retz. obs. fasc. 5. p. 8. Hab. ad Tranquebar.

18. *pusilla*, caule simplicissimo, fol. ovatis crenatis acutis, pedunculis axillaribus unifloris fol. longioribus. Willd. l. c. p. 105. In India ad scaturigines. Minutissima. ☉

53. BAEA. *Cal.* 4-5-partitus, (subtus in medio floris.) *Cor.* subringens aut. cymbiformis (labii non inflati.) *Stam.* incurva in medio corollae.

\* BAEA. Juss. gen. pl. *Caps. longo corniculata, contorta, 2-locularis, 4-valvis.*

1. *magellanica*, acaulis, fol. ovatis petiolatis integerrimis, scapo bifloro. Lam. encyclop. 1. p. 346. ill. t. 15. In rupibus humidis freti Magellanici. *Cor.* caeruleae lab. super. 3-dentatum; infer. planum 2-lobum. ☞

\* JOVELLANAE. Flor. Peruv. *Caps. ovato-conica, 2-sulca, 2-locularis, apice 2-valvis, valvulis bifidis.*

2. *plantaginea*, acaulis, fol. ovatis serratis hirsutis, scapis unifloris. J. scapiflora Flor. peruv. 1. p. 13. t. 18. f. 6. Calceolaria plantaginea. Smith ic. ined. 1. p. 2. t. 2. Lam. encycl. 1. p. 550. In alpinis peruvianis, in America meridionali et ad fretum magellanicum. *Cor.* lutea. ☉

3. *punctata*, caulescens, pedunculis multifloris cymosis, fol. ovato oblongis duplicato-serratis. Flor. peruv. l. c. f. 1. In Pera, praesertim provinciis Concept. Chili et Puchacay. Gaudet virt. depuratoria, in morbis venericis hinc utilissima. ☞

4. *alata*, caulescens, fol. oppositis ovato-acutis in petiolum alatum attenuatis, florib. paniculatis. *Calceolaria* petiolaris. Cav. hisp. 5. p. 30. t. 445. Hab. prope Guayaquil. *Cor.* bilabiata. Caul. herbaceus.

5. *violacea*, caule fruticoso, fol. oppositis ovatis dentatis, flor. terminalibus corymbosis. Cav. l. c. p. 31. t. 452. *Cor.*

campanulato-patens. In littore maris Talcahuani prope insulam Quiriquina. C.

6. *triandra*, fol. inciso-pinnatifidis, flor. triandris. Cav. hisp. 5. p. 32. t. 451. Hab. in Talcahuano. Caul. fruticosus. Conf. Flor. peruv. vol. 3. p. 11.

54. CALCEOLARIA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 2 labiata: labium inferius maximum inflatum. *Caps.* ovata, 2-locularis, 2-valvis.

1. *pinnata*, fol. pinnatis pinnatifidisque. Willd. Sp. pl. 106. Flor. peruv. 1. p. 14. t. 19. f. p. 14. Crescit, uti pleraeque species, quarum flores plerumque colore sunt luteo, Hab. in regno peruviano. ☉

2. *tripartita*, fol. tripartitis, pedunculis multifloris. Flor. peruv. 1. p. 14. t. 22. f. a. Herbacea. In nemoribus.

3. *lobata*, caule erecto dichotomo, fol. coriatis 5-lobis. Cav. hisp. v. 5. p. 26. t. 443. f. 1. Hab. in siccis. Fol. tomentosa.

4. *tomentosa*, fol. cordato-triangularibus duplicato-serratis, subtus tomentosis, petiolis connatis. Flor. peruv. p. 15. t. 22. f. 6. Sequenti affinis. Crescit in umbrosis. ☉

5. *perfoliata*, fol. sagittatis, petiolis alatis perfoliatis. Flor. peruv. p. 15. t. 21. f. a. Smith ic. ined. p. 4. t. 4. In lapidosis. Viscosa. ☉

6. *corymbosa*, fol. radicalibus ovatis cordatisque petiolatis crenatis: caulinis semiamplexicaulis. Fl. peruv. p. 14. t. 20. f. b. In umbrosis urbis *Concepcionis* Chile et in montibus *Cordillera*. Hirsuta. *Cor.* lutea, lineis et punctis sanguineis variegata. Caul. simplex. ☉

7. *paralia*, fol. oblongo-ovatis tomentosis dentatis superioribus, connatis, radicalibus petiolatis, capsulis tomentosis. Cav. hisp. 5. p. 29. t. 447. Hab. prope oppidum chilense Parali.

8. *verticillata*, fol. verticillato-ternatis cordatis acutis serratis, pedunculis quadrifloris. Flor. peruv. 2. p. 17. Hab. in Cantae praeruptis. ☞

9. *bicolor*, hirsuta, fol. ternis oppositisque petiolatis venoso-rugosis biserratis, pedunculis multifloris dichotomo-umbellatis. Flor. peruv. p. 16. t. 25. f. b. In praeruptis. *Cor.* ad basin alba. ☞

10. *multiflora*, fol. verticillatis ternis subsessilibus serratis, flor. paniculatis. Cav. l. c. t. 449. In siccis. Affinis antecedenti. *Cor.* prope calicem angustissima est in hac et in tribus sequentibus speciebus.

11. *gemelliflora*, fol. petiolatis verticillatis ternis ovatis serratis, pedunculis ternis bifloris. Cav. hisp. 5. p. 30. t. 450. f. 1. Fol. glauca. Hab. in saxosis.

12. *terniflora*, fol. verticillatis ternis sublanceolatis serratis, pedunculis ternis trifloris. Cav. l. c. t. 450. f. 2. Caul. fusco-violaceus. Cum priore. An a *glauca* satis diversa?

13. *angustiflora*, fol. ovato-lanceolatis oppositis ternatisque venosis, pedunculis quadrifloris. Flor. peruv. p. 17. t. 28. f. a. Fol. utrinque pubescentia. Cor. uii in 3 antecedentibus basi angustissima. Per totum fere annum floret in Cantae versuris.  $\overline{\text{T}}$

14. *trifida*, fol. oppositis ternatisque cordatis et ovatis crenato-serratis, pedunculis trifidis umbellatis. Fl. peruv. p. 17. t. 26. f. b. Petioli connati. Fetrifuga et antiseptica species. Hab. in Cheuchin locis umbris prope aquas.  $\overline{\text{T}}$

15. *virgata*, fol. oppositis ternatisque ovatis obtuse serratis, ramis flexuosis virgatis, pedunculis multifloris. Flor. peruv. p. 20. t. 31. f. a. *Melissae Calaminthae* habitu. Cor. parva punctis purpureis maculata.  $\overline{\text{T}}$

16. *glauca*, fol. ternis lanceolatis serratis, pedunculis umbellatis 3-4-floris, corollis maculatis. Flor. peruv. p. 17. t. 27. f. c. Suffruticosa. Filam. basi lata. Hab. in Cantae circuito.

17. *uniflora*, fol. (saepe ternis) ovatis, pedunculis longis filiformibus unifloris. Flor. peruv. l. c. p. 16. t. 20. f. c. In umbrosis *Tarmae* ad *Curis*. Flor. parvi.  $\overline{\text{T}}$

18. *biflora*, fol. ovatis serratis crenatisque petiolatis, pedunculis geminis filiformibus unifloris. Flor. peruv. l. c. f. a. G. *ovata*. Smith fasc. 1. p. 3. t. 3. Copiose in arenosis altis Limae. Caul. herbac. Fol. subtus venosa.

19. *polyrhiza*, fol. ovatis in petiolum alatum attenuatis, flor. umbellatis. Cav. p. 25. t. 441. Cor. punctis rubris variegata. In America meridionali.

20. *cana*, caule decumbente, fol. oppositis ovatis confertis crassis albo-lanatis, inferne attenuatis. Cav. hisp. 5. p. 27. t. 443. f. a. Rad. crassa. Caul. elongatus, nudus.

21. *racemosa*, fol. ovatis dentatis rugosis tomentosis, flor. terminalibus racemosis. Cav. p. 29. t. 448. Inter arbuta in Peru. Fol. opposita, prope basin numerosa.

22. *heterophylla*, fol. petiolatis ovatis

ellipticis subcordatisque serratis, pedunculis longissimis dichotomis. Flor. peruv. p. 16. t. 21. f. b. Hab. in Muna nemoribus. Hirsutissima, villis ferrugineis bifloribus.  $\odot$

23. *cuneiformis*, fol. cuneiformibus ovatisque inciso-serratis. Flor. peruv. p. 19. t. 27. f. 6. Rami bracteati scabri ferruginei. Fol. masticata tincturam luteam praebent. In Cantae et Tarmae Alpibus.  $\overline{\text{T}}$

24. *montana*, fol. radicalibus spathulatis. Cav. l. c. p. 27. t. 445. f. 1. Hab. in Cordillera chilensi.

25. *Fothergilli*, fol. spathulatis integerrimis, pedunculis scapiformibus unifloris. Ait. hort. Kew. 1. p. 30. t. 1. Willd. Spec. pl. Linn. 1. p. 108,  $\beta$  *Cavanillesii*, - fol. crenatis. Cav. p. 25. t. 442. f. 1. Hab. in insulis Falklandiae,  $\beta$  in Peru.

26. *flexuosa*, fol. cordatis crenatis pedunculis multifloris umbellatis. Flor. peruv. p. 19. t. 26. f. a. In praeruptis et aridis regni chilensis. Fol. superne, uti caulis, aspera, subtus venosa.  $\overline{\text{T}}$

27. *inflexa*, caule laevi scandente, fol. ovatis acutis crenulatis, pedunculis inflexis 3-4-floris. Flor. peruv. p. 17. t. 25. f. a. Rami bracteati. Petioli connati. Hab. cum priore.  $\overline{\text{T}}$

28. *involuta*, fol. ovatis acutis serratis, corollis involutis calycem semigentibus. Fl. peruv. p. 15. t. 23. f. a. In Panathus nemoribus.  $\overline{\text{T}}$

29. *bicrenata*, fol. ovatis bicrenatis subtus tomentosis, corollis sulcatis. Fl. peruv. l. c. f. b. In Cuchero nemoribus. Cor. magna, quoad iconem, sulcata, subinvoluta, apice crenata.

30. *anomala*, cor. labio inferiore explanato apice crenato. G. *crenatiflora*, fol. ovatis, parce tomentosis, cor. 3-crenata. Cav. hisp. 5. p. 28. t. 446. Secundum figuram ab omnibus differt speciebus labio infero non inflato s. calceiformi. In humidis St. *Caroli* de *Chiloe* inter montium radices et mare. An hujus generis?

31. *oblonga*, caule erecto simplicissimo, fol. latis serratis, pedunculis trifidis, cor. intus punctatis. Fl. peruv. p. 15. t. 24. f. b. Rad. fasciculata.  $\odot$

32. *punicea*, caule repente, fol. ovalibus serratis, cor. puniceis. Fl. peruv. l. c. f. a. Rad. fasciculata fibrosa. Fol. superne glabra.

33. *viscosa*, fol. ovatis serratis viscosis. Fl. peruv. p. 18. t. 30. f. a. Planta suffruticosa, viscoso-resinosa, amara et. fol. tritis,

tritius, *Teucrium Marum* redolent. (loc. cit.) Hab. in Peruviae alpinis.

34. *dentata*, viscosa, fol. ovatis argute bidentatis. Fl. peruv. p. 18. t. 29. f. b. Fol. sapore amarissimo uti in *cortice peruviano* fere. Crescit in Conceptionis Chili sylvis, et in Paral vicinis. ¶

35. *deflexa*, fol. ovato-lanceolatis serrulatis, flor. terminalibus corymbosis, pedicellis 4-5-floris nutantibus. Flor. peruv. p. 18. t. 20. f. 6. Fol. deflexa. Cor. luteo-crocea. In humidis et inundatis. ¶

36. *salviaefolia*, fol. lanceolatis bidentatis, petiolis connatis alatis, pedunculis dichotomis multifloris. C. *rugosa*. Fl. per. p. 19. t. 28. f. b. Calceolaria *salviaefolia* Fewill. peruv. 3. p. 13. t. 7. C. *integrifolia* Lin. Willd. spec. pl. p. 107. Cor. luteo-rufesca. Fol. varia pro soli natura et plantae aetate. Cav. Hab. in *Conceptionis Chile* aridis et praeruptis. ¶

37. *salicifolia*, fol. lanceolatis serratis, pedunculis geminis terminalibus umbellatis dichotomisque. Flor. peruv. p. 18. t. 19. f. b. Caul. duplici cortice tectus; Rami subteragoni; teneri viscoso-resinosi. Flor. magni. Hab. in Peruviae praeruptis et uliginosis. ¶

38. *sessilis*, fol. lanceolatis serratis semiamplexicaulibus rugosis canescentibus. Flor. peruv. p. 18. pedunc. umbellati, longi. In locis aridis prope *Conceptionem Chile*.

39. *lanceolata*, parva, fol. lanceolatis integerrimis, pedunculis terminalibus unifloris solitariis. Cav. hisp. 5. p. 27. t. 444. f. 2. Lab. superius breve. Cresc. in America meridion. 7 in insulis *Maclovianis*.

40. *pulverulenta*, fol. oblongo-lanceolatis dentato-serratis albidis, ramis canescente-pulverulentis. Fl. peruv. p. 18. Pedunc. axillares subquadrif. In Cantae praeruptis. ¶

41. *scabra*, fol. brevibus subovatis venoso-lineatis, caule aspero. Fl. peruv. p. 18. t. 29. f. a. Caul. 3-pedal. Rami breves. Fol. margine revoluta. In praeruptis. ¶

42. *ferruginea*, fol. linearibus, margine revolutis subtus rufo-tomentosis, umbellis terminalibus binis. Cav. p. 27. t. 445. f. l. Fol. longa. Caul. durus, tomentosus. Hab. in inundatis in *Cordillera* non tradicibus. Sequenti affinis.

43. *rosmarinifolia*, fol. linearib. integerrimis, margine revolutis, subtus tomentosis, caul. glabro Lam. encycl. meth. bot. 2. p. 556. Folia praesertim juniora viscosa, subtus albo-tomentosa. L. In Peru. An a praecedente satis diversa?

44. *alternifolia*, caule tomentoso, fol. linearibus alternis margine revolutis, sparsis, flor. pedunculatis, axillaribus trifloris. Cav. l. c. p. 28. t. 445. f. 2. Fol. angustissima, cum floribus alternatim sparsa, subtus tomentosa. Cresc. in Regni peruviani siccis.

45. *pinifolia*, fol. confertis linearibus integris, margine revolutis subteretibus. Cav. l. c. p. 26. t. 442. f. 2. Rad. crassa. Flor. terminales; pedunc. elongati, dichotomi. In monte *Cordillera*.

46. *alba*, fol. linearibus denticulat. flor. racemoso-paniculatis. Flor. peruv. 1. p. 20. t. 27. f. 6. Planta suffruticosa, viscoso-resinosa, odore rosmarini. Fol. amara, ex axillis fasciculata habitu Pini. Flor. subthyrsoidei. Frequens dicitur in collibus aridis *Kese* provinc. regn. *Chil.* ¶

Obs. Botanicorum praesertim hispanicorum studio hujus generis species, quarum Linnæo tantummodo 3 innouerunt, ad ingentem accreverunt numerum. Nonnullae tantummodo varietates videntur. Quamvis secundum icones, quae in opere *Cavanillesii* et in *Flora peruviana et chilensi* occurrunt, inter se collatas differant, posterioris operis (vid. vol. 3. p. xij) auctores de speciebus *Cavanillesii*, argumentis vero desiderandis, tamen pronunciant, plures easdem esse ab iis jam antea descriptas plantas.

55. PINGUICULA. Cor. ringens, calcarata. Cal. bilabiatus, 5-fidus. Caps. 1-locularis.

1. *Iusitanica*, scapo nutante pubescente, nectario conico-subulato, foliis reticulato-venosis, caps. globosa. Willd. spec. pl. p. 109. Sowerby engl. bot. Ic. t. 145. Smith Fl. angl. l. p. 26. Pinguicula villosa. Lightf. scot. 1. p. 77. t. 6. f. 1. In Anglia, Lusitania et in Scotia. ¶

2. *vulgaris*, nectario conico recto longitudine petali, labio superiore bilobo, caps. ovata. Willd. l. c. p. 110. Oed. dau. t. 93. In Europae uliginosis praesertim montosis. ¶

3. *grandiflora*, nectario subulato recto longitudine floris, labio superiore patente emarginato. Willd. Lamarck encyclop. 3. p. 27. tab. 14. fig. 2. In alpinis Galliae australior. Labium superius dilatatum emarginatum; inferius amplum trilobum. ¶

4. *elatior*, scapo pubescente, calyce glanduloso pubere, coroll. majusculae tubo inflato. Mich. Flor. p. 11. In palud. apricis Georg. et Carol. cor. amethysteo rubens. Fol. ut in P. vulgaris.

5. *campanulata*, scapo subvillosa, co-

rolla campanulata dentata, calcare recurvo. Lamark in Journ. d'Hist. nat. N.º IX. p. 336. t. 18. f. 1. Hab. in Carolina. Fl. flavus erectus. Cal. villosus-pulverulentus. l.

6. *lutea*, scapo glabriusculo, cor. majuscula : laciniis crenatis, calcare subsiliiformi tubum subaequante. Mich. l. c. In pinetis Carol. infer. cor. lutea. Folia obovalia.

7. *alpestris*, nectario conico coroll. breviori, labro superiore bilobo, inferioris laciniis lateralibus obtusis : intermedia emarginata. Willd. in Nov. act. soc. Nat. 2. t. 5. f. 1. (P. *purpurea*). P. *alpina*. Schrank primit. Salisb. n. 257. alpinus salisburgensibus. Flos recentis in statu *ochroleucus*. Flörke in Hoppe Taschenb. 1800, purpureus. Willd. l. c.

8. *alpina*, nectario conico gibbo adscendente, labro superiore emarginato, inferiore laciniis truncatis. Willd. l. c. t. 5. f. 3. Hab. in Europae alpinis. Flos albus, capsula rostrata. Sowerby engl. Bot. p. 145.

9. *involuta*, nectario conico longitudine petali, scapo unifloro villosa, fol. ovatis margine involutis. Flor. peruv. 1. p. 20. t. 31. f. c. In altis frigidis et humidis regni peruviani. Flos cernuus viol.

10. *villosa*, scapo stricto pubescente, nectario subulato recto brevissimo, foliis nervosis. Willd. spec. pl. l. p. 111. Lin. Fl. lappon. p. 13. t. 12. f. 2. In Lapponia et Siberia. P. *vulgari* sextuplo minor, caps. compressa.

11. *acutifolia*, pusilla glabra, fol. erecto-rosulaceis sessilibus ovalibus acutissimis. Mich. Flor. 1. p. 11. Circa lacus Mistassins.

12. *pumila*, scapo brevi glabello, corolla oblongiuscula tubulata, calcare tubo breviori. Mich. l. c. In humidis Georgiae. Cor. parva, dilute violacea.

56. **UTRICULARIA.** *Cal.* 2-phyl-lus aequalis. *Cor.* ringeus calcarata. *Caps.* 1-locularis.

1. *grandiflora*, nectario subulato, fol. ovatis integerrimis. U. *montana* Jacq. Amer. pict. t. 8. U. *alpina* Lin. Willd. spec. pl. 1. p. 111. Hab. in Martinicae alpinis. Flos albus, maximus.

2. *unifolia*, scapo squemato unifloro, calyce (maximo) cordato, fol. radicali unico lanceolato. Fl. peruv. 1. p. 20. t. 31. f. b. In Panao montib. altis.

3. *furcata*, aphylla, scapo 2-4-floro squamis totidem apice furcato. U. *aphylla*. Fl. peruv. l. c. f. d. p. U. *tenuis*, scapo

sesquipollicem alto unifloro. Cav. icon. 5. p. 24. t. 440. f. 2. vid. Ruiz in Flor. per. vol. 4. p. xi. Hab. in regni peruviani inundatis.

4. *cornuta*, aphylla, scapo rigido summitate bifloro, cor. labio inferiore amplissimo, calcare porrecto acuto. Michaux Flor. amer. 1. p. 12. Hab. in Canada.

5. *setacea*, aphylla minuta, caule tenui setaceo 2-3 floro : floribus pellicellatis, calcare longiusculo. Michaux. In ud. Carolinae inferioris.

6. *hispida*, scapo filiformi paucifloro inferne hispido, fol. lineari-subulatis. Lam. illustr. 1. p. 50. Hab. in Cayenna. Rich.

7. *foliosa*, nectario conico, fructibus cernuis, radiculis utriculis destitutis. Lin. Loess. iter. p. 281. Plum spec. 6. ic. 165. f. 2. In America australi. Rad. repens.

8. *vulgaris*, nect. conico, labio superiore integro palato aequali, fol. pinnato-multifidis, laciniis capillaribus. Heyne in Schrad. Journ. bot. 1800. p. 17. t. 6. f. A. Hab. in aquis stagn. Utriculi foliis adhaerent. T.

9. *intermedia*, nect. conico, labio superiore integro palato duplo longiore, fol. 3-partitis : laciniis capillaribus dichotomis. Heyne l. c. p. 18. t. 5. U. *minor*. Flor. dan. t. 128. Rarius in inundatis Tunio. Germen subrotundo-ovatum.

10. *minor*, nect. carinato, labio superiore emarginato, palato aequali, fol. tripartitis, laciniis capillaribus dichotomis. Heyne l. c. p. 22. t. 6. f. B. Cum antecessentibus.

11. *obtusa*, nectario inflexo obtuso subemarginato. Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 41. Hab. in rivulis Jamaicae. Flor. parvi. Palat. fulvum : striis purpureis, capsula subrotunda.

12. *ceratophylla*, fol. ad superficiem aquae seno-verticillatis pinnatifidis : laciniis capillaceo-multi-partitis, flor. subcorymbosis. Michaux l. c. p. 12. In stagnis Carolinae inferioris.

13. *subulata*, nectario subulato. In Virginia. Flores albi.

14. *gibba*, nectario gibboso, scapo nunc unifloro, nunc bifloro. Gron. virg. 121. Cum priore.

15. *bifida*, scapo nudo bifido. Osb. it. 243. t. 3. f. 2. In China.

16. *capillacea*, scapo nudo capillari subridulo, floribus nutantibus, capsula



subulata. Willd. l. c. p. 113. In Indiae locis scaturiginosis. Planta viz uncialis, radice nuda subramosa.  $\bar{h}$

17. *caerulea*, scapo nudo, squamis alternis vagis subulatis. Fl. veyl. 23. Rheed. mal. g. p. 137. t. 701 In Zeylona.

18. *stellaris*, verticillo utriculario bracteatum ciliari. Lin. suppl. 86. In Indiae agris oryzaceis, in aquosis profundioribus. Corol. destitutae nectario: labio inferiori saccato.

57. **JUSTICIA.** *Cal.* simplex duplexve. *Cor.* 1-petala ringens aut subaequalis. *Caps.* ungue elastico dissilens: *dissepimentum* contrarium adnatum. (Flor. bracteati.)

\* *Calyce duplici. Monantherae.*

1. *fastuosa*, thyrsis terminalibus, floribus secundis, foliis lanceolato-ellipticis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Willd. Sp. p. 79. Hab. in Tranquebaria.  $\bar{h}$

2. *Forskalei*, thyrsis axillaribus terminalibusque, fol. ovatis acuminatis. Vahl. l. c. 2. p. 13. In Arabia felici et India.  $\bar{h}$

3. *purpurea*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis lanceolatis glabris, ramis pubescentibus. Vahl. symbol. 2. p. 13. Rumph. amb. 6. p. 52. t. 22. f. 2. Hab. in China.

4. *verticillaris*, villosa, floribus axillaribus verticillatis, calycibus exterioribus muticis, foliis ovatis. Vahl. 3. p. 13. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *aristata*, villosa, floribus axillaribus verticillatis. calycibus exterioribus aristatis, fol. ovatis. V. 2. p. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *chinensis*, pedunculis axillaribus verticillatis trifloris, bracteis ovatis mucronatis basi coloratis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Burm. ind. 8. t. 4. f. 1. Hab. in China et Arabia felici, locis aquosis.

7. *triflora*, pedunculis axillaribus elongatis trifloris, bracteis linearilanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Hab. in montibus Arabiae felicis.

8. *serpens*, floribus axillaribus solitariis, caule repente. Vahl. 2. p. 2. In insula St. Mauritii. Variat foliis rotundioribus.

\*\* *Calyce duplici. Diantherae.*

9. *sulcata*, spicis terminalibus, floribus verticillatis, foliis ovato-cordatis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Hab. in Arabia felici Perianthium exterius quadripartitum.

10. *malabarica*, paniculis axillaribus dichotomis. Vahl. symbol. 2. p. 13. Justicia (agulata) foliis ovatis acutis: floribus paniculatis bicalyculatis, lacinia dorsali majore. Cavan. icon. 1. p. 52. t. 71. *Dianthera malabarica*. Lin. suppl. 85. In graminosis Malabaricae, et Arabiae.

11. *bivalvis*, pedunculis axillaribus trifidis, pedicellis lateralibus bifloris, bracteis ovatis aristatis nervosis. Vahl. 2. p. 13. Sp. pl. 23. Rumph. amb. 6. p. 51. t. 22. f. 1. Hab. in Arabia et India.  $\bar{h}$

12. *falcata*, floribus axillaribus subsessilibus, fol. ovato-lanceolatis. Willd. Sp. 83. *J. falcata*, dianthera fruticosa, fol. ovato-lanceolatis petiolatis, floribus bicalyculatis, labio superiore corollae longissimo. Lam. encyclop. 1. p. 622. Hab. in insula Mauritii.  $\bar{h}$

\*\*\* *Calyce simplici, corollis bilabiatis: labiis indivisis.*

13. *sexangularis*, pedunculis trifloris, bracteis cuneiformibus, foliis ovatis Vahl. symbol 1. p. 13. J. annua sexangulari caule, foliis Circaeae conjugatis, flore miniato. Amm. herb. 274. Hab. in Vera cruce, Jamaica.  $\odot$

14. *scorpioides*, fruticosa, fol. lanceolato-ovatis hirsutis sessilibus, spicis recurvatis. Lin. Sp. plant. 21. Banks Reliq. Houst. p. 3. t. 1. Hab. in Vera cruce.  $\bar{h}$

15. *gangetica*, foliis ovatis, racemis simplicibus longis, floribus alternis secundis, bracteis obsoleteis. Willd. 1. p. 83. Burm. ind. 9. tab. 4. fig. 2. Hab. in India.

16. *assurgens*, spicis axillaribus terminalibusque ramosis, floribus alternis, bracteis linearibus. Vahl. 2. p. 13. Justicia assurgens, fol. ovatis integerrimis, bract. subulatis, ramis hexagonis. Amoen. acad. 5. p. 391. Brown. Jam. 110. t. 2. f. 1. Hab. in Jamaica et in insula St.-Cruzis.

17. *humilis*, herbacea assurgens, fol. ovalilanceolatis, bract. minutissimis, flor. subbinis, capsula compressa pedunculata. Mich. Flor. 1. p. 8. In sylv. paludib., a Carolina ad Floridam. Basi repens.

18. *lineata*, herbacea, fol. ovatis acutis lincolis pellucidis, pedunculis terminalibus paniculatis, flor. spicatis. Flor. Per. 1. p. 9. t. 13. f. a. In nemoros, ad Cuchero vicum.

\*\*\*\* *Calyce simplici, corollis bilabiatis: labiis divisis. Monantherae.*

19. *hispida*, pedunculis terminalibus multifloris, calycinis foliolis et bracteis

linearis-subulatis ciliatis, foliis oblongo-lanceolatis, ramis hispidis-pubescentibus. Willd. p. 84. In Sierra Leona. Flores albi in corymbo brevi terminali.

20. *Ecbolium*, spicis terminalibus tetragonis, bracteis ovatis imbricatis ciliatis mucronatis, corollam galear lineari reflexa Vahl. symbol. 2. p. 14. Burm. zeyl. 7. t. 4. f. In Arabia, Malabar, Zeylona. Anthera ad refracturam labii superioris. L. h

21. *tetragona*, spicis terminalibus tetragonis, bracteis ovatis quadrifariam imbricatis carinatis ciliatis, foliis crenatis glabris. Vahl. symbol. 3. p. 5. Hab. in Cajenna. h

22. *coccinea*, spicis terminalibus, foliis bracteisque ellipticis margine nudis, corollam galear lanceolata apice reflexa. Vahl. symbol. 3. p. 6. J. *coccinea*, fruticosa, corollis bilabiatis; labio superiore indiviso, foliis bracteisque spicarum ellipticis acuminatis, antheris parallelis. Aiton Kew. 1. p. 26. Smith. icon. p. 8. In Cajenna ad ripas. h

23. *pulcherrima*, spicis terminalibus axillaribusque, bracteis ovatis imbricatis ciliatis muticis, corollam galear lanceolata liffida erecta. Vahl. 2. p. 14. Jacq. amer. p. 6. t. 2. f. 4. Icon. rar. In America calidior. h

24. *carthagenensis*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis oblongis imbricatis ciliatis. Vahl. 2. p. 14. Jacq. amer. 11. t. 5. In Carthago, Martinica. h

25. *hirsuta*, spicis axillaribus terminalibusque tetragonis, bracteis ovatis imbricatis hirsutis, foliis dentatis. Vahl. symbol. 2. p. 3. Hab. in Java.

26. *sphaerosperma*, spicis axillaribus oppositis utrinque geminis, bracteis linearibus elongatis, seminibus globosis nitidis. Vahl. symbol. 2. p. 3. Hab. in Caribaeis.

27. *Gendarussa*, spicis terminalibus foliosis, floribus verticillatis, foliis lanceolatis elongatis. Vahl. symb. 2. p. 14. Lau. suppl. 85. *Gendarussa sosa*. Rumph. amb. 4. p. 70. t. 28. et p. 72. t. 29. In Zeylona, Java, Malabar. h

28. *procumbens*, spicis axillaribus terminalibusque, calycibus tetraphyllis ciliatis, bracteis longitudine calycis, foliis lanceolatis. Pluk. alm. 142. t. 56. f. 2. Hab. in Zeylona. h

29. *diffusa*, spicis axillaribus terminalibusque, calycibus tetraphyllis glabris, bracteis calyce brevioribus, foliis ellipticis. Willd. p. 87. Euphrasia sinica Parietariae.

foliis rubiae modo spicatis. Pluk. alm. 83. t. 392. f. 4. Hab. in India. h

30. *echioides*, spicis axillaribus oppositis secundis adscendentibus linearibus hirtis. Vahl. 2. p. 14. Euphrasiae affinis indica echioides. Herm. luglb. 668. t. 669. In Malabar, Zeylona subhumidis. h

31. *longifolia*, spicis axillaribus geminis oppositis secundis, foliis lanceolatis elongatis. Vahl. symbol. 2. p. 4. Hab. in insula Mahé.

32. *latifolia*, spicis terminalibus subramosis, floribus inferioribus verticillatis, foliis ovatis acuminatis. Vahl. symbol. 2. p. 4. Hab. in India orientali. h

33. *picta*, racemis axillaribus terminalibusque, floribus verticillatis, foliis ovatis pictis. Vahl. symbol. 2. p. 14. *Justicia picta* fruticosa, foliis lanceolato-ovatis pictis, corollis saepe inflatis. Sp. pl. 21. Rumph. amb. 4. p. 73. t. 30. Hab. in Asia. Foliorum discus macula lucida. h

34. *nitida*, racemis terminalibus subramosis, floribus subverticillatis, foliis lanceolato-ellipticis utrinque attenuatis. Vahl. symbol. 2. p. 5. Swarz. prod. 13. Hab. ad ripas torrentum insularum Martinicae, St. Crucis, Guadeloupa. h

35. *rubra*, racemis terminalibus solitariis, bract. actaeis, fol. lanceolatis. Vahl. Eclog. amer. Fasc. 2. Hab. ad St. Martham. Fol. angustiora quam in *J. bracteolata* Jacq. h

36. *variegata*, spicis terminalibus axillaribusque simplicibus, floribus oppositis, calycibus hispidis, foliis ovatis sessilibus. Aubl. guj. 1. p. 12. t. 4. Hab. in Gujanae sylvis. h

37. *stricta*, racemis axillaribus bipartitis, floribus secundis, foliis lanceolato-ellipticis, filamentis glabris. Vahl. symbol. 2. p. 6. Hab. in Malabar.

38. *paniculata*, paniculis axillaribus terminalibusque dichotomis, floribus secundis, filamentis hirsutis, capsulis compressis, foliis lanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 5. Rheed. mal. 4. p. 109. tab. 56. Hab. in India orientali. Differt ab omnibus mihi notis, capsulis plano-compressis undique ejusdem latitudinis nec basi angustatis. V.

39. *nutans*, racemis terminalibus, apice nutantibus, floribus resupinatis, foliis dentatis. Vahl. symbol. 2. p. 6. Burm. ind. 10. tab. 5. fig. 1. Hab. in Java.

40. *nasuta*, foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pedunculis dichotomis, cor.

*galea linear erecta*, Sp. pl. 23. Rheed. mal. 9. p. 135. t. 66. Hab. in India. h

47. *scandens*, pedunc. axillaribus trichotomis divaricatis, foliis ovatis acuminatis subrepandis, ramis villosis. Vahl. symb. 2. p. 7. In Malabar. Affinis *J. nasutae*. h

49. *ciliaris*, herbaecea hirta, fol. lanceolatis, flor. oppositis sessilibus, bracteis calycibusque setaceis hispulis flore longioribus. Lin. suppl. 84. Jacq. hort. 2. p. 7. t. 104. ☉

\*\*\*\* *Culcyce simplici, cor. bilabiatis, labiis divisis. Diantherae.*

43. *secunda*, racem. terminalibus compositis: racemulis secundis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis. Vahl. symbol. 2. p. 7. In insula Trinitatis.

44. *debilis*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis ovatis imbricatis ciliatis. Vahl. symbol. 2. p. 15. In Arabia felici. h

45. *violacea*, spicis terminalibus, bracteis lanceolatis imbricatis ciliatis, foliis lanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 15. Cum priore. h

46. *bracteolata*, racemo terminali, pedunculis trifloris, foliis utrinque attenuatis oblongis, caule tetragono, margine scabro. Willd. p. 91. Jacq. coll. 3. p. 253. Icon. rar. Ad Caracas in America. h

47. *Rohrii*, spicis terminalibus compositis imbricatis pubescentibus, bracteis ovatis, fol. ellipticis integerrimis. Vahl. symb. 3. p. 6. In Cayenna.

48. *polystachia*, spicis axillaribus oppositis secundis, bracteis ovatis hirsutis, fol. lanceolato-ovatis. Vahl. 2. p. 7. t. 26. In Cayenna.

49. *retusa*, spicis terminalibus, bracteis obovatis subretusis imbricatis, fol. ovatis acuminatis. Vahl. symb. 2. p. 8. In insula St. Crucis.

50. *flava*, spicis terminalibus, flor. geminis, bracteis lanceolatis obtusis, foliis lanceolato-oblongis. Vahl. symb. 2. p. 15. In Arabia felici. h

51. *pedunculata*, glabra, caul. herbaeae erectis, fol. erectis lineari-lanceolatis utrinque angustatis, spicis alternis longissime pedunculatis paucifloris. Mich. Flor. 1. p. 7. Dianth. americana. L. In littoribus inundatis fluminum Ohio, Mississippi. etc.

52. *punctata*, spicis terminalibus, flor. remotis subverticillatis, bracteis lanceolatis

acuminatis, fol. lanceolato-ovatis. Vahl. 2. p. 15. Hab. in Arabia felice.

53. *eustachiana*, spicis axillaribus terminalibusque, floribus inferne geminis, superne solitariis, bracteis cuneatis. Vahl. 2. p. 15. Jacq. amer. p. 4. t. 4. In insula St. Eustachii. Flor. saepe gemini, vel 3 intra involucrium 6-phyllum. V. h

54. *caracasica*, spicis axillaribus terminalibusque, bracteis acuminatis calyce brevioribus, foliis ovatis acuminatis undulatis pubescentibus. Willd. p. 93. Jacq. Collect. 4. p. 116. Icon. rar. Hab. ad Caracas in America. h

55. *pectoralis*, panicula terminali dichotoma. Vahl symbol. 2. p. 15. J. caule herbaceo adscendente, fol. lanceolato-linearibus subpaniculatis. Swartz. prod. 13. Jacq. amer. 3. t. 3. In Domingo, Martinica. h

56. *comata*, spicis terminalibus filiformibus, spiculis verticillatis. Vahl. symb. 2. p. 15. Antirrhinum minus angustifolium, flore dilute coerulesco. Sloan. jam. 49. hist. 1. p. 160. t. 103. f. 2. In aquis et humidis Jamaicae. h

57. *undulata*, pedunc. terminalibus umbellatis simplicibus trifidisque, fol. lanceolatis undulatis. Vahl. 2. p. 8. Burm. ind. 11. tab. 5. f. 1. In Java, Malabar. h

58. *frondosa*, umb. axillaribus compositis pedunculatis, pedunculis elongatis, bracteis obovatis rhombeis obtusis glabris. Vahl. 2. p. 8. In insula Otaheite.

59. *pubescens*, pedunc. axillaribus oppositis quadrifloris pedicellatis, bracteis ovato-subrotundis mucronatis pubescentibus. Vahl. symb. 2. p. 9. In Botanices insula australi. h

60. *cuspidata*, pedunc. axillaribus verticillatis subtrifloris pedicellatis, bracteis cuneatis aristatis, antheris geminis. Vahl. 2. p. 9. Forst. descr. 9. 22. In Arabia felici. Similis *chinensi* ut fere mera varietas: differt modo figura bractearum et numero antherarum. Vahl.

61. *lithospermifolia*, pedunc. axillaribus verticillatis unifloris, bracteis lineari-lanceolatis, foliis oblongis scabris. Willd. p. 95. Jacq. hort. Schoenbrun. Hab. h

62. *biflora*, pedunc. axillaribus bifloris foliis ovatis aequantibus, bracteis subulatis. Vahl. 2. p. 9. In India orientali. h

63. *pauciflora*, flor. axillaribus sessilibus solitariis, fol. ovatis, caule erecto. Vahl. eclog. p. 1. In ins. St. Crucis.

corollarum galea bifida. Willd. S  
p. 77. Paederota lutea. Lin. suppl.  
Jacq. hort. 2. t. 121. Hab. in C  
Italia. (C)

2. *Bonarota*, foliis subrotundo-  
corollarum galea integra. W. Jacq.  
app. t. 39. *Paederota caerulea* Lin.  
Mich. gen. 19. n. 1. t. 15. f. 1.  
Hab. in alpinis Austriae, Car-  
Italiae. ☉

3. *minima*, foliis oblongis interpositis, floribus axillaribus oppositum, calycem dentibus intus hirsutis. R. fasc. 5. p. 10. Hab. in India. *Elatines Hydropiperis*. Retz. ☉

50. WULFENIA. *Cor.* ringens  
superiore brevi integro; in-  
3-partito, fance barbata  
5-partitus. *Caps.* 2-locul

1. *carinthiaca*. Jacq. miscell. tab. 8. fig. 1. Icon. rar. 1 t. derota Wulfenia, Lamarek. tab. 13. fig. 2. Hab. in summis Carinthiae solo pinguissimo. Folia l. obovata obtusa. Flores pedu secundi, caerulei. ☉

51. *GLOBIFERA*. *Cal.* 4-p.  
*Cor.* 4-partita subbilabiata.  
cinnia superiore minore.  
incurva basi appendiculata  
subglobosa polysperma.

1. *umbrosa*. Gmel. Syst. nat. I  
p. 32. *Micranthemum orbiculat*  
chaux Flor. Bor. Amer. 1. p.  
Caul. filiform. repentes. In u  
cisque sylvarum Carolinae et  
Aug. floret.

52. GRATIOLA. Cal. 7-8  
exterior patulus. Cor. res  
Filam. 2. sterilia. Caps. 2

1. *officinalis*, fol. lanceolatis  
floribus pedunculatis. Oed. Flor. d  
Willd. Spec. pl. 1. p. 102-106. H  
ropae humidiusculis. Erecta. ☉

*β. carolinensis*, caule ut plurice, filamentis sterilibus nuda calyci subaequali. Michx boreali-americana 1. p. 6. G. et Hab. in Virginia et Carolina.

2. *quadridentata*, fol. lanceo  
4-dentatis : dentibus binis ad a  
gioribus, caps. calyce triplo be  
chaux l. c. Hab. in Carol. inf

3. *Anagallidea*, erecta  
caule 4-gono, fol. oblongo-ov

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... de ...  
...  
...  
...  
...

... 1944 ...  
... 1945 ...

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

[illegible]

*[Faint handwritten notes at bottom:]*

M... ..  
M... ..  
M... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

[illegible]

El arroyo, (trueno sobre, colli  
Nuestro querido arroyo en la Sierra  
El río p. de la república

85. *acicularis*, fruticosa difusa spi-

1898

spinis setaceis, flor. pedunculatis  
tribus solitariis. Swartz. l. c. p. 13.  
29. Hab. in calcar. fruticetis Jamaic.  
nl. Flor. parvi albidii.

34. *Willdenovium*, praeunte *Vahl.*  
his sequentes species seorsim enumerare  
his duxi, quam male collocare, cum  
eres affinitatem cum jam cognitis spe-  
bus haud adnotaverint.

\* *Justicia*.

35. *spicata*, herbacea, fol. lanceolato-  
angustis, spicis oblongo-ovatis, bracteis  
ovatis. Flor. peruv. l. p. 8. t. 9. f. a.  
Poguzo nemoribus. Cor. longissima  
violetacea. h

36. *mucronata*, fol. oblongo-ovatis den-  
tato-spinosis. Fl. P. t. 10. f. b. In Peru-  
vianis nemoribus. Spica terminal. fere pe-  
dicata.

37. *longistaminea*, herbacea, fol. ses-  
silibus oblongis utrinque acutis subrepandis,  
paniculis dichotomis. Flor. p. t. p. 8. t. 10.  
In Pilluo nemoribus. Fl. purpurei.

38. *sericea*, fruticosa, fol. lanceolatis  
angustis, margine reflexis, pedunc. axillarib.  
seriatis. Flor. P. t. p. 9. t. 9. f. 8. Hab.  
aridis et agrorum versuris peruvianis.  
Cor. magn. extus hirsuta coccinea. Ad  
peruianam usurpatur.

39. *racemosa*, herbacea, fol. ovato-  
oblongis, pedunc. dichotomis, flor. rac-  
emosos. Fl. p. l. c. t. 11. f. b. In Peruviae  
nemoribus. Cor. punicea, 2-labiata. T

40. *tenuiflora*, herbacea, foliis lanceo-  
latis, panicula terminali brachiata dichot-  
omaque, flor. sessilibus. Fl. p. p. t. 12.  
a. Ad Cuchero vicum in nemorosis. Cor.  
agiss. angusta 2-labiata. T

\*\* *Dianthera*.

41. *multiflora*, herbacea, fol. oblongis,  
ped. ternis, 2-4-fidis, flor. 2-3 in singulis  
binis bracteis. Fl. p. l. p. 10. t. 14. f. b.  
sub genere *dianthera* uti sequentes hujus  
operis species. In umbrosis Peruviae. Cor.  
ringens. Fol. edulia sunt. Rad. ad mun-  
dificandos dentes inservit. ☉

42. *repens*, suffruticosa, foliis ovatis  
acutis, pedunculis solitariis geminisque 4-  
5-fidis, flor. 2-3 in singulis binis bracteis.  
Flor. peruv. t. 15. f. b. In rupium fissuris  
Lima, etc. Bractee glandulosae. Flores  
rubri, passim lutei.

43. *acuminata*, herbacea hirsuta, fol.  
oblongo-lanceolatis acuminatis, verticillis  
subsessilibus multifloris, bracteis ciliatis.

Flor. p. t. f. 166. In Huannuci et Huarua  
circum ad margines segetum per totum  
annum floret. Incolae mucilaginem plantae  
ad condiendum cibi ( *locro*, nominati )  
genus extrahunt.

44. *cuspidata*, herbacea, hirsuta, fol.  
ovatis mucronatis, flor. verticillatis, brac-  
teis ovatis ciliatis mucronatis. Fl. P. p. 11.  
t. 16. f. a. Crescit cum priore, cui similis.  
Faux dilatata.

45. *hirsuta*, herbacea, hirsutissima,  
fol. ovatis acutis, pedunculis geminis, flor.  
duobus in singulis binis bracteis. Fl. p. 11.  
p. 11. t. 13. f. b. In Peruviae nemoribus.  
Folia tincturam caeruleam, uti *Indigofera*  
*Anil*, praestant. l. c.

46. *secundiflora*, herbacea, fol. lanceo-  
lato-oblongis obsolete crenatis, pedunculis  
solitariis polystachiis, flor. secundis. Fl. p.  
p. 11. t. 15. f. a. Hab. in Poguzo nemori-  
bus. Planta colorans.

*Obs.* Antherae in hac et a sequentibus  
speciebus caudatae sunt.

47. *ciliata*, herbacea, fol. lanceolatis,  
flor. spicatis confertis, bracteis calycibus-  
que ciliatis. Fl. p. p. 12. t. 14. f. a. Crescit  
cum priore. Cor. purpureo-violacea.

48. *appendiculata*, herbacea, foliis  
lanceolatis undulatis, basi appendiculatis,  
pedunculis solitariis ternisque 3-5-fidis pa-  
rallelis. Flor. peruv. p. 12. t. 11. f. a. Hab.  
in iisdem cum a antecedentibus locis. Cor.  
purpurea, calyce duplo longior.

58. *Elytraria*. *Cal.* coriaceus,  
4-partitus: lac. antica fissa. *Cor.*  
5-fida: laciniis subaequalibus.  
*Filam.* 2-castrata. *Stigmata* ligu-  
lata. *Caps.* oblonga, 2-locularis,  
2-valvis: valvis semiseptiferis.  
( *Scapus radicalis bracteatus.* )

1. *carolinensis*, fol. superne integris,  
nervis sultus glabris. *El. virgata*. Michaux  
Flor. t. p. 9. t. 1. *Tubiflora* carolinensis.  
Gmel. S. N. L. 2. p. 27. Crescit in humidis  
Carolinae inferioris. Scapi longissimi.

2. *indica*, fol. crenatis, nervis subtus  
villosis. *Justicia* acaulis. Lin. Vahl. symb.  
2. p. 3. Pluck. Amalt. t. 458. f. 1. In Tran-  
quebaria.

3. *imbricata*, acaulis fol. lanceolatis in-  
tegerrimis, squamis floriferis 3-dentatis.  
Vahl. Eclog. amer. t. p. 1. et Icon. t. 1.  
Antecedentis facie. Rad. in summitate non  
lanata. V.

64. *sessilis*, flor. axillaribus solitariis sessilibus, foliis ovatis crenatis. W. Sp. 93. Sp. plant. 1663. J. *sessilis*. Jacq. amer. 3. tab. 2. fig. 2. In insulae St. Eustachii scopulis et fruticetis. h

\*\*\*\*\* *Calyce simplici; cor. riugentibus.*  
*Monantherae.*

65. *Adhatoda*, arborea, fol. lanceolato-ovatis, bracteis ovatis nervosis persistentibus, coroll. galea concava. Flor. zeyl. 16. Herm. lugdb. 642. t. 643. Pluk. alm. 9. t. 173. f. 3. In Zeylona. h

66. *Betonica*, spicis terminalibus, bract. ovatis acuminat. venoso-reticulatis coloratis. Rheed. mal. 2. p. 126. t. 21. In India. h

67. *repens*, spic. axillaribus terminalibusque glabris, bract. dorsolibus bifariis margine membranaceis. Vahl. 2. p. 16. *Adhatoda* spicata, flosculos ex foliolis membranaceis. Burm. Zeyl. 7. t. 3. f. 2. In Zeylona. T

68. *sanguinolenta*, pedunc. axillaribus solitariis unifloris alternis, fol. oblongis, caule repente. Vahl. 2. p. 10. In umbrosis Zeylonae. Tota colore sanguineo. V.

\*\*\*\*\* *Calyce simplici, cor. ringentibus.* *Diantherae.*

69. *peruviana*, fol. ovatis acutis, spicis brevibus axillaribus et terminalibus, flor. tribracteatis. Cavan. Icon. 1. p. 17. t. 28. Lamarck. encyclop. 1. p. 626. In Lima. T

70. *Ryani*, pedunc. axillaribus terminalibusque oppositis trifloris, bracteis linearibus, fol. ovato-lanceolatis attenuatis. Vahl. Flog. amer. Fasc. 1. p. 1. In Montverrat legit Nyan. J. *peruviana* affinis. V.

71. *crinita*, pedunc. axillaribus alternis subquadrifloris pedicellatis, bracteis lanceolatis, ciliatis. Vahl. 2. p. 16. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 338. Jap. 21. t. 4. In Japonia. ☉

72. *trisulca*, pedunc. axillaribus subtrifloris, flor. sessilibus, foliis oblongis obtusis. Vahl. symbol. 2. p. 10. In Arabia felici. h

73. *hyssopifolia*, pedunc. axillaribus subunifloris, fol. lineari-lanceolatis obtusis. Vahl. symb. 2. p. 16. Just. fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculis trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus. Spec. plant. 21. Mill. dict. t. 13. Pluk. alm. 132. t. 280. f. 1. Habitat in Canariis. h

74. *periptocifolia*, florib. axillaribus

solitariis subsessilibus, fol. ovatis acuminatis. Willd. sp. 1. p. 58. Jacq. collect. supp. p. 5. t. 7. f. 2. Ad Carracas in America torrida. J. *peruviana* varietas.

75. *orchioides*, pedunculis unifloris axillaribus, foliis lanceolatis rigidis utrinque acutis. Vahl. symbol. 2. p. 10. Lin. suppl. 85. Ad Cap. b. spei. h

76. *madurensis*, pedunculis axillaribus unifl., fol. oblongis dentatis. Vahl. 2. p. 17. Burm. ind. g. t. 4. f. 3. Petiv. gazoph. t. 2. f. 8. In Madura. h

77. *cuneata*, flor. axillaribus solitariis sessilibus, fol. obovatis emarginatis. Vahl. symb. 2. p. 10. Ad Cap. b. spei. h

78. *tranquebariensis*, flor. axillaribus solitariis sessilibus, fol. obovatis, ramis inanis. Vahl. symb. 2. p. 17. Lin. suppl. 85. J. *parvifolia*. Lam. encyclop. 1. p. 620. In Tranquebaria. h

79. *odora*, flor. axillaribus sessilibus oppositis, foliis subrotundis, ramis glabris. Vahl. symb. 2. p. 11. Hab. in Arabia felici. Frut. cortice cinereo, ramosus.

\*\*\*\*\* *Calyce simplici, cor. subaequalibus.*

80. *infundibuliformis*, spicis terminalibus, foliis lanceolato-ovatis quaternis. Vahl. 2. p. 17. Rheed. mal. g. 127. tab. 62. In India. Corolla speciosa alba. h

81. *sinuata*, pedunc. axillaribus trifidis, fol. linearib. sinuato-pinnatifidis. Vahl. 3. p. 11. Forst. prod. n. 13. In insula Tanna. Folia tripollicaria vel ultra. h

82. *vincoides*, pedunculis axillaribus subunifloris, foliis ovatis, caule inermi. Willd. p. 100. Lam. encyclop. 1. p. 621. In Madagascaria. Planta ramis parum verrucosis. h

83. *spinosa*, pedunc. subunifloris, foliis (fasciculatis) oblongis, spicis axillaribus. Vahl. symb. 2. p. 17. Swartz. obs. 12. Jacq. amer. 2. tab. 2. f. 1. In America meridionalis calcaris maritimis. h

84. *microphylla*, foliis aggregatis oblongis subcuneatisque, pedunc. unifloris longitudine foliorum, spinis axillaribus brevissimis rigidis. Vahl. clog. amer. 2. Lam. encyclop. p. 37. Hab. in insula St. Crucis. T

85. *armata*, fruticosa aculeata, foliis oblongis emarginatis coriaceis nitidis. Swartz prod. 1. p. 13. Ej. Flor. p. 28. In rupibus montium Jamaic. septent. Fl. cocciuei. Acul. gemini. An var. prioris? h

86. *acicularis*, fruticosa diffusa spi-

nota : spinis setaceis, flor. pedunculatis axillaribus solitariis. Swartz. l. c. p. 13 Fl. p. 29. Hab. in calcar. fruticetis Jamaic. austral. Flor. parvi albi.

*Obs. Willdenovium*, praeunte *Vahl.*, secutus sequentes species seorsim enumerare melius duxi, quam male collocare, cum auctores affinitatem cum jam cognitis speciebus haud adnotaverint.

\* *Justicia.*

87. *spicata*, herbacea, fol. lanceolato-oblongis, spicis oblongo-ovatis, bracteis inflexis. Flor. peruv. l. p. 8. t. 9. f. a. In *Poguzo* nemoribus. Cor. longissima punicea. h

88. *mucronata*, fol. oblongo-ovatis dentato-spinosis. Fl. l. t. 10. f. b. In Peruviae nemoribus. Spica terminal. fere pedalis.

89. *longistaminea*, herbacea, fol. sessilibus oblongis utrinque acutis subrepandis, pedunculis dichotomis. Flor. p. l. p. 8. t. 10. f. a. In *Pilluo* nemoribus. Fl. purpurei.

90. *sericea*, fruticosa, fol. lanceolatis sericeis, margine reflexis, pedunc. axillaribus solitariis. Flor. p. l. p. 9. t. 9. f. 8. Hab. in aridulis et agrorum versus peruvianis. Cor. magn. extus hirsuta coccinea. Ad pleuritidem usurpatur.

91. *racemosa*, herbacea, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. dichotomis, flor. racemosis. Fl. p. l. c. t. 11. f. b. In Peruviae nemoribus. Cor. punicea, 2-labiata. ¶

92. *tenuiflora*, herbacea, foliis lanceolatis, panicula terminali brachiata dichotomaque, flor. sessilibus. Fl. p. p. q. t. 12. f. a. Ad Cuchero vicum in nemorosis. Cor. longiss. angusta 2-labiata. ¶

\*\* *Dianthera.*

93. *multiflora*, herbacea, fol. oblongis, ped. ternis, 2-4-fidis, flor. 2-3 in singulis binis bracteis. Fl. p. l. p. 10. t. 14. f. b. sub genere *dianthera* uti sequentes hujus operis species. In umbris Peruviae. Cor. ringens. Fol. edulia sunt. Rad. ad mundificandos dentes inservit. ☉

94. *repens*, suffruticosa, foliis ovatis acutis, pedunculis solitariis geminisque 4-5-fidis, flor. 2-3 in singulis binis bracteis. Flor. peruv. t. 15. f. b. In rupium fissuris Lima, etc. Bractee glandulosae. Flores rubri, passim lutei.

95. *acuminata*, herbacea hirsuta, fol. oblongo-lanceolatis acuminatis, verticillis subsessilibus multifloris, bracteis ciliatis.

Flor. p. t. f. 166. In Huannuci et Huaruae circuitu ad margines segetum per totum annum floret. Incolae mucilaginem plantae ad condiendum cibi (*locro*, nominati) genus extrahunt.

96. *cuspidata*, herbacea, hirsuta, fol. ovatis mucronatis, flor. verticillatis, bracteis ovatis ciliatis mucronatis. Fl. p. p. 11. t. 16. f. a. Crescit cum priore, cui similia. Faux dilatata.

97. *hirsuta*, herbacea, hirsutissima, fol. ovatis acutis, pedunculis geminis, flor. duobus in singulis binis bracteis. Fl. p. l. p. 11. t. 13. f. b. In Peruviae nemoribus. Folia tincturam caeruleam, uti *Indigofera Anil*, praestant. l. c.

98. *secundiflora*, herbacea, fol. lanceolato-oblongis obsolete crenatis, pedunculis solitariis polystachiis, flor. secundis. Fl. p. p. 11. t. 15. f. a. Hab. in *Poguzo* nemoribus. Planta colorans.

*Obs.* Antherae in hac et a sequentibus speciebus caudatae sunt.

99. *ciliata*, herbacea, fol. lanceolatis, flor. spicatis confertis, bracteis calycibusque ciliatis. Fl. p. p. 12. t. 14. f. a. Crescit cum priore. Cor. purpureo-violacea.

100. *appendiculata*, herbacea, foliis lanceolatis undulatis, basi appendiculatis, pedunculis solitariis ternisque 3-5-fidis parallelis. Flor. peruv. p. 12. t. 11. f. a. Hab. in iisdem cum a antecedentibus locis. Cor. purpurea, calyce duplo longior.

58. *Elytraria*. *Cal. coriacea*, 4-partitus : lac. antica fissa. *Cor.* 5-fida : laciniis subaequalibus. *Filam.* 2-castrata. *Stigmata* ligulata. *Caps.* oblonga, 2-locularis, 2-valvis : valvis semiseptiferis. (*Scapus radicalis bracteatus*.)

1. *carolinensis*, fol. superne integris, nervis sultus glabris. *El. virgata*. Michaux Flor. p. p. 9. t. 1. *Tubiflora* carolinensis. Gmel. S. N. L. 2. p. 27. Crescit in humidis Carolinae inferioris. Scapi longissimi.

2. *indica*, fol. crenatis, nervis subtus villosis. *Justicia* acaulis. Lin. Vahl. symb. 2. p. 3. Pluck. Amalth. t. 458. f. 1. In Tranquebaria.

3. *imbricata*, acaulis fol. lanceolatis integerrimis, squamis floriferis 3-dentatis. Vahl. Elog. amer. t. p. 1. et Icon. t. 1. Antecedentis facie. Rad. in summitate non lanata. V.

59. **SANCHEZIA.** *Cal.* 5-partitus : laciniae obtusae. *Cor.* tubulosa, lacin. aequales. *Filam.* 2 castrata. *Anth.* calcarata. *Stigm.* 2-fidum. *Caps.* oblonga, 2-locular., 2-valvis. (*Flor. involuerati.*)

1. *hirsuta*, foliis ovatis utrinque acuminatis, coroll. hirsuta. *S. oblonga.* Flor. peruv. 1. p. 7. t. 8. f. b. In Peruviae stagnantibus et umbrosis. Flor. ut in sequente flavi.

2. *glabra*, fol. ovatis, coroll. glabra. *S. ovata.* Flor. per. l. c. f. c. Cum priore. Pl. herbacea ut prior.

60. **LYCOPUS.** *Cal.* tubulosus. *Cor.* tubulosa subaequalis : lacina tunica emarginata. *Stam.* distantia.

1. *exaltatus*, foliis basi pinatifido-serratis. Lin. suppl. p. 87. In Italia et Hungaria. Caul. altissimus. *Cor.* 4-fida, rubro-punctata.  $\overline{\text{T}}$

2. *vulgaris* (*europaeus* L.), foliis sinuato-serratis appendiculatis. Hall. helv. n. 220. Curt. Flor. Lond. fasc. 3. t. 2. Fol. subtus resinoso-punctata, menthis affinis. In lacubus, ad ripas; etiam in America.  $\beta$ . Fol. tenuis laciniosis. Pluckn. alm. t. 45. f. 1.  $\overline{\text{T}}$

3. *virginicus*, fol. lato-lanceolatis serratis basi integra angustatis, calycibus brevissimis muticis. Michaux Flor. carol. p. 14. In Nova Anglia ad Carolinam.  $\overline{\text{T}}$

4. *uniflorus*, pusillus, radice tuberosa, fol. ovalibus simplicib. obtusis subdentatis. Michaux. loc. cit. Ad lacus St. Johan. et Mistassins. Axillae uniflorae.

61. **AMETHYSTEA.** *Cal.* campanulatus. *Cor.* tubulosa subbilabiata : lacin. infima patentiore concava. *Stam.* approximata.

1. *corymbosa* (*caerulea* Lin.). *Amethytina montana*, fol. exiguis digitatis 3-fidis serratis, flosc. cum coma e caeruleo janthinis. Amman Flor. ruthen. p. 70. Hall. act. ups. 1742. p. 51. f. 1. In Sibiriae montosis.  $\odot$

*Obs.* Nomine generico jam colorem exprimente, illud specificum mutandum putavi.

62. **MONARDA.** *Cal.* cylindricus, striatus. *Cor.* ringens. lab. supe-

riore lineari, filam. simplicia involvente.

1. *fistulosa*, flor. capitatis, fol. cordato-lanceolatis villosis, caule obtusangulo. Hort. ups. p. 12. Mill. dict. t. 122. f. 2. In Canada.  $\overline{\text{T}}$

2. *oblongata*, foliis ovato-lanceolatis villosis planis. Ait. Hort. Kew. 1. p. 36. In Amer. boreali. Flores minores quam in No. 1.

3. *didyma*, (*coccinea*), fol. ovatis glabris, capitulis verticillatis, florib. subdidynamiis, caule acutangulo. Willd. S. pl. 1. p. 125. Mill. dict. n. 2. et ic. 122. f. 1. Trew. chret. 32. t. 66. In Pennsylvania, Novboraco, et in rivulis montium Carol.  $\overline{\text{T}}$

4. *rugosa*, fol. ovato-lanceolatis cordatis glabris rugosis. Aiton. Kew. 1. p. 36. In America boreali. Flores albi.  $\overline{\text{T}}$

5. *clinopodia*, flor. capitatis, foliis ovato-lanceolatis, basi rotundatis inaequalibus glabris. Willd. l. c. In Virginia. Flores in capitulum bracteis radiatum, pallidi.  $\overline{\text{T}}$

6. *punctata*, floribus verticillatis, coroll. punctatis, bracteis coloratis. Hort. ups. 12. In Virginia, Florida. Corollae luteae punctis purpureis. Cal. apice barbatus.  $\odot$

7. *allophylla*, fol. variis oblongis acute serratis, calycibus ad limbum barbatis, cor. elongatis gracilibus. Michaux 1. p. 16. In America septentr. Cor. carnea.

8. *ciliata*, canescens, bracteis ciliatis, floribus verticillatis, corollis involu. ro longioribus. Pluk. alm. 10. t. 164. f. 3. Moris. hist. 3. p. 374. s. 11. t. 8. f. 6. In Virginiae montosis. Cor. parva alba.

63. **ROSMARINUS.** *Cor.* ringens, labio superiore bipartito. *Filam.* longa, curva, simplicia cum dente.

1. *officinalis.* Var. fol. utrinque virentib. et subtus canis. Miller.

64. **SALVIA.** *Cor.* ringens. *Filam.* transverse pedicello affixa.

1. *aegyptiaca*, foliis lanceolatis denticulatis, basi ciliatis, floribus pedunculatis. Jacq. hort. t. 108. Willd. spec. pl. p. 127. In Aegypto et insulis Canariensibus. Flor. parvi. Corolla alba.  $\odot$

2. *dentata*, fol. lineari-oblongis dentatopinnatifidis, verticillis bifloris, lacinis calycinis obtusis. Aiton. Kew. 1. p. 37. Ad Cap. b. spec. h



3. *cretica*, fol. lineari-lanceolatis, flor. digynis, calycibus diphyllis. Willd. arberol. p. 352. *S. tenuifolia*. Riv. monop. t. 128. In Creta. h

4. *leucantha*, foliis lineari-lanceolatis crenulatis rugosis, flor. verticillato-spicatis, calycibus tomentosis. Willd. l. c. p. 129. Cavan. Icon. t. p. 16. t. 24. In Mexico. Cal. violaceus. T

5. *revoluta*, fol. lineari-lanceolatis crenatis venosis, margine revolutis, floribus spicatis, verticillis secundis. Flor. peruv. t. p. 28. t. 41. f. b. In praeputis Cantae. Fl. Jan. et Febr. h

6. *angustifolia*, fol. lanceol.-oblongis, inferioribus parce serratis, superioribus subintegris, verticillis 6-floris. Cavan. ic. 4. p. g. t. 317. In Nova Hisp. T

7. *acuminata*, fol. radicalibus cuneatis, caulinis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis, flor. paniculatis, caule altissimo. Venten. descript. p. 50. t. 50. In Carolina meridionali. Flor. cyanei. Styl. apice barbatulus, ut in priore. T

8. *nivea*, fol. lanceolatis integris albotomentosis, ramis divergicatis. Thunb. prodr. p. 56. Ad Cap. b. spei. h

9. *rigida*, fol. lanceolat. dentatis tomentosis, ramis erectis virgatis. Thunb. prodr. p. 56. Cum priore. h

10. *punctata*, caule stricto fragili, fol. ovato-lanceolatis serratis, cal. punctato. Fl. peruv. t. p. 27. t. 39. f. b. In collib. altis Huannei. Foetida, ferruginea. h

11. *officinatis*, foliis lanceolato-ovatis crenulatis, verticillis paucifloris, calycibus mucronatis. Etling. Salv. n. 1. Blackw. t. 10. In Europa australi. Var. fol. auriculatis, angustis et eleganter purpurascens. h

12. *Clusii*, foliis ovato-lanceolatis integris crenulatis, superioribus ramulorum auriculatis ternatisque. Cav. descript. p. 16. Jacq. hort. Schoenbr. 2. p. 37. t. 195. *S. pomifera*. Clus. hist. p. 343. In ins. Archipel.

13. *syplea*, tomentosa, foliis petiol. lanceolatis auriculatis rugosissimis, calyce plicato-striatis obtusiusculis. Lam. ill. gen. p. 68. In Oriente. A sequente diversa. h

14. *triloba*, tomentosa, fol. petiolatis rugosissimis trilobis, lobo intermedio producto oblongo; lateralibus ovatis obtusis. Lin. suppl. 88. *S. baccifera*. Etling. Salvia. n. 4. *S. quinquefolia*. Riv. monop. t. 131. In Creta, Syria. h

15. *pomifera*, fol. lanceolato-ovatis integris crenatis, floribus spicatis, calycibus obtusis. Tournef. cor. 10. itin. t. p. 92. t. 92. Rivin monop. t. 124. Hab. in Graecia, Syria. Fol. gallas ab insectis ortas profert, unde nomen.

16. *urticifolia*, foliis ovato-oblongis, duplicato serratis, calycibus tridentatis; lacin. summa tridentata Gron. virg. 8. Moris. hist. 3. p. 395. S. 11. t. 13. f. 31. In Virginia, Florida. Fol. rhomboideo-ovalia, subtus punctata. Michaux. Corollae minutae. T

17. *occidentalis*, fol. ovatis serratis, spicis laxis, bracteis cordatis subtrifloris. Swartz prod. n. 14; et Fj. Fl. t. p. 43. In campestris. Ind. occident. ☉

18. *polystachia*, caule 4-cono, liis ovato-acutis serratis, subtus glaucis, spicis numerosis terminalibus. Cavan. ic. t. p. 17. t. 27. In imper. Mexicano. Coroll. parva Coroll. caerule. T

19. *tiliaefolia*, foliis cordatis rugosis acutis, crenato-serratis, floribus spicatis. Cavan. description etc. p. 14. Vahl. symb. 3. p. 7. Hab. in Mexico. Differt a sequente lineis calycinis tantum pilosis, nec viscosis. Vahl.

20. *serotina*, fol. cordatis serratis mollioribus, floribus racemoso-spicatis: corollis vix calycem excedentibus. Mant. 25. Jacq. Collect. 1. p. 140. Icon. rar. 1. t. 3. Ard. spec. 1. p. 10. t. 1. Hab. in Chio. ☉

21. *chamaedryoides*, caule decumbente, fol. ovatis crenatis, subtus tomentosis. Cav. Icon. 2. p. 77. t. 197. In nova Hispania caerule.

22. *procumbens*, fol. ovatis aut ellipticis, caule ramosissimo radicante, spicis gracilibus assurgentibus. Fl. P. p. 27. t. 39. f. a. In versuris et rudicatis Linnæ, etc. Cal. villis glanduliferis. Cor. albo-caerule. Ad obstructions usurpatur. T

23. *tenella*, fol. cordatis, caule filiformi repente, spicis adscendentibus. Swartz prod. 14. Icon. tab. 2. et Flora p. 45. In montibus graminosis Jamaicae austral. ☉

24. *rhombifolia*, fol. rhombeis cordatis serratis, spicis terminalibus ternis, verticillis 4-8-floris. Flor. peruv. p. 26. t. 36. f. b. In Peruviae collibus arenosis. Cal. viscos. Cor. fauce plicata.

25. *papilionacea*, fol. ovato-lanceolatis serratis, utrinque acutis, coroll. limbo 4-fido. Cav. icon. 4. p. g. t. 319. In nov. Hip. Laciniae lineares corollae in cruce ut plurimum expansae desiderantur in aliquo flore. C. T

26. *viridis*, fol. oblongis crenatis, corollarum galea semiorbiculata, calycibus fructiferis reflexis. Jacq. misc. 2. p. 366. Icon. rar. 1. tab. 4.  $\beta$ . Desf. atlant. p. 90 t. 1. In Italia et circa Tunetum. An Var. sequentis? ☉

27. *Horminum*, foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis. Horminum coma purpureo-violacea Tournef. inst. 178. Barr. obs. 226. ic. 1233. Lob. ic. 535. In Graecia, Apulia. Bract. rubrae et violac. ☉

28. *virgata*, fol. oblongis cordatis rugosis crenatis, pilis caulis calycis apice glandulosi. Aiton. Kewens. 1. p. 39. Jacq. hort. 1. p. 14. t. 37. In Armenia. ☿

29. *sylvestris*, fol. cordato-lanceolatis undulatis biseriatis maculatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus. Scop. carn. ed. 2. n. 32. Jacq. aust. 3. p. 7. t. 212. In Austriae, Bohemiae agrorum marginibus, vineis. ☿

30. *nemorosa*, foliis cordato-lanceolatis planis subsinuatis, bracteis coloratis, corollae labio infimo reflexo. L. In Austria, Tartaria. Spicae autem florescentiam tetragonae. ☿

31. *syriaca*, fol. cordatis dentatis: inferioribus repandis, bracteis cordatis brevibus acutis, calycibus tomentosis. Sp. pl. 36. Bauh. prodr. 114. t. 114. Statura S. praeceus. Corollae albae, parvae.

32. *viscosa*, fol. oblongis obtusis eroso-crenatis viscidis, florib. verticillatis, bracteis cordatis acutis. Jacq. ic. rar. 1. t. 5. misc. 2. p. 328. In Italia. ☿

33. *haematodes*, fol. cordato-ovatis rugosis tomentosis, calycibus hispulis, radice tuberosa. Horminum sylvestre maculatum tuberosum. Moris. hist. 3. p. 394. s. 11. t. 14. f. 15. In Italia, Istria. Caulis viscidus. Folia longissima obtusa. ☿

34. *pratensis*, foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis cala subviscosa. Bull. herb. t. 35.  $\beta$ . foliis in profundas lacinias incis. Tournef. inst. 179. Ad margines viarum, ad sepes in pratis, per totam aestatem florentes.

*Y. praecox*, minor, fol. radical. profunde sinuatis obtuse dentatis. S. pratensis minor. Savi Flor. pisan. 1. p. 22. In Palazzetto et Migliarino crescit. Febr. et Mart. floret, 5 poll. modo alta, et cor. lab. super. glandul. destituta. Distincta spec. videtur.

35. *indica*, fol. cordatis lateralibus sublobatis: summis sessilibus, verticillis sub-

nudis remotissimis. Mant. 318. Jacq. hort. t. 78. Moris. hist. 3. s. 11. t. 13. f. 16. In India. Corolla magna, caerulea; Lab. sup. falcato compresso emarginato: L. inferiore trifido, intermedia magna saecata biloba; fundo albedo: lobis maculis violaceis, margine albo, mox luteo: lacinii lateralibus horizontalibus lanceolatis porrect. replicatis; adeoque labium inferius rapraesentat Fucum s. Apem. Linn. ☿

36. *dominica*, fol. cordatis obtusis cren. subtomentosis, corollis calyce angustioribus. Mill. Swartz. obs. 18. t. 1 f. 1. In camp. et fruticeis Indiae occidentalis. Col. uno latere viridi-rubens. ☿

37. *lyrata*, hirsuta, fol. variis: radical. lyrato-sinuosis, caul. simplicibus subdiphyllis, spica interrupta, cal. 5-spinescentibus. Mich. Flor. amer. In Canada. Vere flor.

38. *Verbenaca*, fol. serratis sinuatis laeviusculis, coroll. calyce angustioribus. Virid. cl. Horminum, Verbenacae lacinii, angustifolium. Triumpheti obs. 65. t. 66. In Europae et Orientis pascuis. Quoad folia variat. Desf. atlant. p. ☿

39. *runcinata*, scabra, foliis runcinato-pinnatifidis dentatis, floribus spicatis verticillatis. Lin. suppl. 89. Ad Cap. b. spei.

S. *clandestina*, fol. serratis pinnatifidis rugosis, spica obtusa, corollis calyce angustioribus. Sp. plant. 36. Barr. rar. 24. t. 220. In Italia, Africa. Calyces pilis glutinosis, labio superiore plicato. ☿

40. *austriaca*, foliis ovatis cordatisque eroso-sinuatis; radicalibus (terrae adpressis) petiolatis, caule subaphyllo, staminibus corolla duplo longioribus. Jacq. aust. 2. p. 8. t. 112. In Austria, Hungaria, Moldavia. ☿

41. *pyrenaica*, fol. obtusis erosis, staminibus corolla duplo longioribus. Roy. Hormin. pyrenaicum glutinosum Anguria folio. Herm. parad. 187. t. 187. In Pyrenaeis. Fol. lata, sinuata.

42. *disermas*, foliis cordato-oblongis erosis, staminibus corollam aequantibus. Sp. plant. Arduin spec. 1. p. 9. t. 1. Barr. ic. 187. In Syria. Odor gratus. ☿

\* *rugosa*, foliis oblongo-lanceolatis eroso-crenatis rugosis pilosiusculis, staminibus corolla brevioribus. Aiton. Kewens. 1. p. 42. Ad Cap. b. spei. ☿

43. *nubia*, foliis oblongis subcordatis inaequaliter rugosis crenatis basi subauratis. Aiton. Murr. comm. goett. 1778. p. 90. t. 3. In Africa. ☿

44. *nilotica*, foliis sinuatis angulatis crenato-dentatis, calycum dentib. spinosis, angulis margineque faucis ciliatis. Murr. comment. goett. 1778. p. 88. t. 2. Jacq. hort. 3. t. 92. In Aegypto. ¶

45. *mexicana*, fol. ovatis utrinque acuminatis serratis. Cavan. icon. 1. p. 16. t. 26. Dill. elth. 319. t. 254. f. 330. In Mexici humentibus. Cor. caerulea. ¶

46. *amethystina*, fol. cordatis acutis serratis subtus lanatis, verticillis nudis, calycibus trifidis, corollis pubescentibus. Smith. icon. ined. fasc. 2. p. 27. t. 27. In Nova Granada. ¶

47. *fulgens*, fol. cordatis acutis crenatis rugosis subtus tomentosis, verticillis nudis, calycibus trifidis, corollarum galea villosa. Willd. spec. pl. 1. p. 150. Cavan. icon. 1. p. 15. t. 23. In Mexico. ¶

48. *acuminata*, fol. latis cordatis serratis acuminatis, flor. verticillatis, cor. longis glabris, bracteis rhomboideis coloratis deciduis. Fl. per. 1. p. 24. t. 37. b. In praeruptis Cantac. Cor. incarnata. Viscosa, hirsuta. ¶

49. *nodosa*, fol. cordatis, superioribus ovatis serratis, pedunculis axillaribus apice nodosis. Flor. peruv. 1. p. 25. t. 41. f. a. S. *formosa*, L'Héritier; *leonaroides*, Gloxin. In Peru. Cor. coccinea, galea hirsuta. ¶

50. *longiflora*, fol. cordatis acutissimis bicrenatis, spicis longis nutantibus, cor. longissimis, cal. inflato bracteisq. coloratis. Fl. peruv. p. 23. t. 40. f. a. In praeruptis profundis Tarmae. Cor. color. laccae. ¶

51. *tubiflora*, fol. cordatis crenatis subpilosis, calycibus trifidis, cor. longissimis tubulosis, staminibus exsertis. Smith. icon. ined. fasc. 2. p. 26. t. 26. Habit. Huauae agro Linnensi. Cor. coccinea. ¶

52. *tubifera*, fol. ovatis acutis serratis mollibus, floribus spicatis erectis, tubo longissimo. Cavan. icon. 1. p. 16. t. 25. S. *longiflora*. Willd. s. pl. p. 141. In Mexico. Cor. coccinea pubesc., lab. inf. reflexum. ¶

53. *oppositiflora*, fol. ovatis crenatis rugosis, spicis terminalibus, flor. oppositis. Flor. per. p. 26. t. 43. f. a. Hab. in locis altis Tarmae. Cor. turgida, coccinea, cal. 4-plo longior. ¶

54. *excisa*, foliis cordatis obtusis basi inaequalibus serratis, spicis nutantibus, flor. oppositis binis verticillatisque, cor. hirsutae lab. infer. concavo recto. Flor. per. p. 25. t. 36. f. a. In Peruviae montibus praenosis. Cor. coccinea.

55. *coccinea*, fol. cordatis acutis tomentosis serratis, corollis calyce duplo longioribus angustioribus. Ait. Kew. 1. p. 43. Murr. comment. goett. 1778. p. 86. t. 1. Hab. in Florida juxta fluvios. ¶

56. *pseudococcinea*, fol. ovatis acutis serratis basi inaequalibus, caule piloso, corollis calyce duplo longioribus. Willd. l. c. foliis ovatis acutis serratis, utrinque villosis, racemo terminali verticillato, caul. piloso. Jacq. ic. rar. 2. tab. 209. Collect. 2. p. 302. In America calidior. ¶

57. *plumosa*, fol. cordato-ovatis venosis, pedunc. 4-5-axillaribus, cor. tubulosa hirsuta, stylo plumoso. Flor. peruv. p. 26. t. 37. f. a. In Tarmae praeruptis. Cal. tubul. venosus. ¶

58. *integerrima*, fol. ovatis integerrimis aveniis subrepandis, spicis brevibus, cor. longis, staminibus exsertis. Fl. per. 1. p. 26. t. 35. f. b. In Peruv. juxta aquas thermal. Cheochin et ad rupes. Cor. croceo-lutea. ¶

59. *racemosa*, fol. cordatis acutis sublanecolatis serratis, racemis terminalibus compositis. Flor. per. p. 25. In versuris et ruderalis Huanaei. Primo vere floret. Cor. obscure caerulea. Fol. saepius purpureo aut livido maculata. ¶

60. *violacea*, hirsuta, foliis ovatis crenatis, flor. spicatis, verticillis 6-floris, cor. inferiore lato dependente. Fl. per. 26. t. 43. b. Cum priore. ○

61. *hispanica*, foliis ovatis, petiollis utrinque mucronatis, spicis imbricatis 4-gonis, calycibus trifidis. Kniph. orig. t. 2. n. 78. Salb. hort. rom. 3. t. 22. Ard. spec. 10. t. 2. In Italia et in Hispania. Spica tetragona, bracteis ovatis, longitudine calycum, ciliatis. Cor. parva caerulea.

62. *prismatica*, fol. ovato-acutis serratis, spicis primo prismaticis, inferne nudis, terminalibus. Cav. descrip. p. 14. In Mexico. Cor. caerulea.

63. *circinata*, pilosa, fol. longe petiolatis cordatis crenatis, bract. ovato-acutis ciliatis, cal. lobis obtusis, cor. galea emarginata. Cav. icon. 4. p. 9. t. 318. In Mexico. Cor. caerulea. ¶

64. *abyssinica*, fol. inferiorib. lyratis, summis cordatis, floribus verticillatis, calycibus mucronatis ciliatis. Jacq. ic. rar. 1. tab. 6. In Africa. ¶

65. *mitis*, fol. ovatis acutis serratis tomentosis, spicis terminalibus: intermedia longiori asphylla, verticillis multifloris. Fl. peruv. p. 27. In Cantae praeruptis calidis. Vere. Styl. villosus. Sem. fulva, venosa. ¶

66. *verticillata*, fol. cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollae labio inferiori incumbente. In Germania, Austria, Helvetia.

67. *napifolia*, foliis cordatis crenato-dentatis, inferioribus hastatis lyratisque, verticillis subnudis, labio superiore brevior. Aiton. Kewens. p. 44. Jacq. hort. 2. p. 71. t. 152. In Italia, Gattina.  $\overline{\text{T}}$

67. *glutinosa*, fol. cordato-sagittatis, serratis acutis. Horminum flore luteo. Riv. t. 57. Moris. hist. 3. p. 304. s. 11. t. 13. f. 18. In Europae lutosi. Cor. falcata.  $\overline{\text{T}}$

68. *triangularis*, herbacea, villosa-hispida, fol. triangularibus dentatis, ramis patulis. Thunb. prod. p. 96. Ad Caput bonae spei.

69. *deltoidica*, fol. deltoidicis crenatis, cal. tubulosis venosis, coroll. ventricosa. S. Negla. Cav. ic. 5. p. 33. t. 455. Habit. in fundo de Negla, in regno Mexic. Cor. coccinea.  $\overline{\text{T}}$

70. *sagittata*, viscosa, hirsuta, foliis sagittatis crenatis acutis. Flor. per. 1. p. 23. t. 35. f. 2. In ruderalis Tarmae regni Per. Cor. obscure violacea. Semen corpori glandul. insidet.  $\overline{\text{T}}$

71. *cuspidata*, fol. cordato-sagittatis inaequaliter serratis, spicis longis, verticillis multifloris remotis, calyc. cuspidatis. Flor. peruv. l. c. t. 40. f. b. In collibus prope Cheuchin. Apr. Maj.

72. *patens*, villosa, foliis subhastatis crenato serratis, flor. oppositis, cor. laciniat. latissima. Cav. ic. 5. p. 33. t. 454. In Novae Hisp. umbrosis.

73. *Barrelieri*, foliis inaequaliter dentatis acuminatis cordatis, basi angulato-hastatis, verticillis subnudis. Willd. l. c. p. 143-144. Eling. Salv. n. 46. Barr. rar. p. 236. t. 186. In Hispania.  $\overline{\text{T}}$

74. *canariensis*, fol. hastato-triangularibus oblongis crenatis obtusis. Kniph. orig. cent. 6. t. 77. Pluk. alm. 185. t. 301. f. 2. In Canariis. Petioli longi. Calyx 5-fidus, hispidus.  $\overline{\text{h}}$

75. *aurita*, villosa herbacea, foliis ovatis dentatis auriculatis, flor. verticillato-spicatis. Lin. suppl. Ad Cap. b. spei.

76. *africana*, fol. subrotundis serratis: basi truncatis dentatis. Hort. diff. 13. Mill. dict. n. 11. ic. 150. t. 225. f. 1. S. 101. cuneiformib. serratis subtus tomentosis. Thunb. prod. p. 96. Comm. hort. 2. p. 187. t. 91. In Cap. b. spei locis argillosis.  $\overline{\text{h}}$

77. *aurea*, frutescens, fol. subrotundis integerrimis: basi truncatis dentatis, cal. campanulato 3-lobis. Eling. Salvia n. 9. Comm. hort. 2. p. 183. t. 92. Ad Cap. b. Spei juxta rivulos.

78. *colorata*, fol. ellipticis subintegerrimis tomentosis, calycis limbo membranaceo colorato. Mill. ic. 150. t. 225. f. 2. Moris. hist. 3. s. 11. t. 16. f. ult. Ad Cap. bonae spei arenosa, maris littora. Cal. campanulati laciniis rotundatis, sanguinei.  $\overline{\text{h}}$

79. *acetabulosa*, fol. obovatis dentatis, calycibus campanulatis patentibus pilosis, caule fruticoso. Mant. 25. S. *syriaca*, cissi feminae foliis, acetabulis (calycibus) Molluccae. Moris. hist. 3. p. 399. In Oriente.  $\overline{\text{h}}$

80. *paniculata*, fol. obovato-cuneiformibus denticulatis nudis, caule frutescente. Mant. 25 et 511. Thunb. prod. p. 96. S. minor aethiopica, fol. chamaeleagni asperis. Breyn. cent. 169. t. 5. Moris. hist. 3. s. 11. t. 16. f. 1. Mill. ic. 150. t. 225. f. 1. Ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{h}}$

81. *spinosa*, fol. oblongis repandis, cal' spinosis, bracteis cordatis mucronatis concavis. Mant. 511. Jacq. ic. rar. 1. tab. 7. Moris. hist. 3. p. 392. s. 11. t. 16. f. 2. In Aegypto. Calyx fructus aridus, compressus, striatus, dentibus subulatis, ut in Hyosicamo pungentes.  $\overline{\text{h}}$

82. *tingitana*, foliis cordatis eroso-dentatis, calycibus spinosis, bracteis integerrimis cordatis mucronatis concavis ciliatis. Willd. l. c. p. 147. Roth. Alb. p. 25. Riv. t. 62. In Africa boreali. Planta foetidissima.  $\overline{\text{h}}$

83. *Sclarea*, fol. rugosis cordatis oblongis villosis serratis, bracteis floralibus calyce longioribus concavis acuminatis. Sclarea vulgaris. Blackw. t. 122. Lobel. ic. 556. In Syria, Italia.  $\overline{\text{h}}$

84. *involverata*, foliis ovato-lanceolatis serratis, florib. spicatis terminalibus, bract. maximis coloratis. Cav. ic. 2. P. 3. t. 105. In Mexico. Plan. a pulcherrima numero atque florum magnitudine, quarum spica terminatur bracteis in strobilum dilute roseum complicatis. Cav.  $\overline{\text{T}}$

85. *Aethiopis*, fol. oblongis erosis lanatis, bracteis recurvatis subspinosis. Ja q. austr. t. 211. In Africa, Gallia, Austria. Labium inferius antice cohaeret et saccum format.  $\overline{\text{h}}$

86. *foetida*, fol. cordato-ovatis rugosis-villosis, flor. verticillato-spicatis, cal. fructiferis compressis. Desf. atl. p. 24. In agro tunetano.  $\overline{\text{h}}$

17. *compressa*, fol. ovali-oblongis crenatis rugosis, flor. verticillato-paniculatis: summis sterilibus, cal. fructiferis compressis. Venten. descr. p. 59. t. 59. Hab. prope Mossoul in Bagdad. Stam. 4: duo ster. Panic. contracta. ♂

88. *atlantica*, viscosa, fol. radicalibus cordatis lanatis sinuato-erosis, bracteis concavis mucronatis, flor. summis evanidis. S. patula. Desf. l. c. 25. Tota villosa, caul., rami et cal. glutin. ♂

89. *bicolor*, fol. cordato-oblongis multifidis hirsutis, verticillis omnibus fertilibus, bracteis reflexis calyce brevioribus, cor. lobo intermedio saccato. Desf. atl. 1. p. 22. t. 2. Schousboe observ. ed. germ. Lips. p. 5. Jacq. Schönbr. 1. p. 4. t. 7. Inter segetes circa Flemsen. D. In ruderalis urbis Tingidis. S. ♂

90. *algeriensis*, fol. integris, inferioribus ovatis in petiolum decurrentibus, cal. dentato-spinosis nutantibus, bracteis reflexis. Desf. loc. cit. p. 23. t. 3. Prope Macane Algeriae. ☉

91. *crassifolia*, caule erecto, fol. crassis cordatis lobatis acutis, cor. lab. inferiore brevior. Cavan. descr. p. 15. Habitat? Cor. caerulea.

92. *phlomoïdes*, foliis lanceolatis subintegris, cauleque simpliciter lanato-viscosis. Vahl. symbol. 1. p. 7. Introd. in Orvet. arrag. 158. t. 4. Roemer script. pl. hisp. lussit. 10. t. 1. f. 1. Hab. in montibus circa Siguentam Hispaniae.

93. *argentea*, fol. dentato-angulatis magnis eros. lanatis, vertic. summis sterilibus, bracteis concavis. Boerh. lugdb. 1. p. 163. Media inter *S. Sclaream* et *Aethiopsis*.

94. *pinnata*, fol. pinnatis: pinnis villosis eros. extrema majore ovata. Elling. Salv. n. 14. Boerh. lugdb. 1. p. 167. t. 167. Cal. ovatus inflatus, corolla non falcata.

95. *japonica*, fol. bipinnatis glabris. Thunb. jap. p. 22. t. 5. Kaempf. amoen. fasc. 5. p. 887. In Japonia. *S. pinnatae* affinis. ☉

96. *incarnata*, foliis pinnatis serratis, caulibus procumbentibus hirsutis, bracteis lanceolatis longis. Moris. hist. 3. p. 394. s. 11. t. 13. f. 19. Pluk. alm. 186. t. 194. f. 6. W. In Oriente. Caules procumbentes. Flores verticillati magni carnei. Edl. ♀

97. *rosaeifolia*, foliis pinnatis incanis, foliolis serratis, calycib. ringentibus. Smith. icon. ined. fasc. 1. p. 5, t. 5. In Armenia. ♀

98. *Scabiosae*, villosa, foliis subbipinnatis: pinnulis 2-3-partitis integris dentatisque. Lam. Journ. d'hist. nat. p. 44. t. 27. In Peru. ♀

99. *habliziana*, villosa, fol. pinnatis integerrimis: foliolis lanceolatis subaequalibus, superioribus geminatis. Willd. in Schrad. bot. Journ. 1. p. 289. t. 2. In Tauria. Fol. subtus incana. Cor. magna. Cal. campanul. W. ♀

100. *interrupta*, fol. interrupte pinnatis, caule erecto. Schousb. p. 6. t. 1. Cor. magna, caeruleo-alba, odorata. In Barbaria. ♀

101. *ceratophylla*, foliis rugosis pinnatifidisque lanatis: verticillis summis sterilibus. Lin. Kniph. cent. 6. t. 78. In Persia. ♂

102. *ceratophylloides*, fol. pinnatifidis rugosis villosis, caule paniculato ramosissimo. Arduin. spec. 2. p. 12. t. 12. β? *S. exasperata*. Cav. ic. 6. p. 38-39. t. 558. In Sicilia, Aegyptio. ♂

103. *Forskaelei*, fol. lyrato-aureolatis, caule subaphyllo, corolla calca semilifida. S. bifida. Forsk. descr. p. 202. Habit. in Oriente. Facies *S. nutantis*. ♀

104. *nutans*, foliis cordatis inaequaliter basi excisis, caule subnudo, spicis ante florescentiam cernuis. Sp. pl. 39. Kniph. cent. 7. t. 79. Hall. Comment. goett. 1. p. 210. t. 11. In imperio Rutheno et in Hungaria. β. *S. nutans*, fol. oblongo-cordatis, caule simplicissimo subaphyllo, racem. florentibus pendulis. Plant. rarior. Hung. Dec. 7. p. 63. t. 62. Flor. major. An β diversa? ♀

65. *COLLINSONIA*. Cor. inaequalis: labio inferiore margine multifido-capillari. Scm. 1, perfectum.

1. *canadensis*, foliis cordato-ovalibus calycis dentibus brevibus subulatis tubo subaequalibus. Michaux Flora 1. p. 17. Willd. Sp. pl. 1. p. 152. In Americae sylvis umbrosis. ♀

2. *tuberosa*, radice tuberosa, foliis ovalibus utrinque angustato-acutis, calycis dentibus setaceis tubo longioribus. Mich. 1. p. 17. In Carolinae umbrosis. Sept. fl. ♀

3. *scabra*, fol. ovatis subcordatis pilosisculis, caule pilosiusculo scabrido. Ait. Kew. l. c. Habit. in Florida. ♀

66. **MORINA**. *Cor.* inaequalis. *Cal.* fructus 1-phyllus, dentatus; *Cal.* floris bifidus. *Sem.* 1, sub calyce floris.

1. *persica*. Linn. M. orientalis, earlinae folio. Tourn. cor. 48. it. 3. p. 132. t. 132. In Persia ad Hispaham.  $\overline{\text{T}}$

67. **SCIURIS**. *Cal.* 5-fid. *Cor.* inaequalis: labio superiore trifido; inferiore bifido brevior. *Stam.* 5: 3 castrata, villosa. *Caps.* 5, coalitae.

1. *aromatica*. Willd. sp. pl. 1. p. 153. *Raputia aromatica*. Auhl. gujan. 2. p. 60. t. 272. Lam. illustr. 1. p. 32. t. 10. Habit. in sylvib. Gujanae. Frutex bipedalis, ramis oppositis divaricatis. Folia ternata. Spicae axillares nutantes. Willd.  $\text{h}$

68. **LITHOPHILA**. *Cal.* infer., triphyllus. *Cor.* tripetala. *Nectar.* diphyllum. *Pericarp.* biloculare?

1. *muscoides*. Swartz Fl. Ind. occid. 1. p. 48. Hab. in Navazae rupibus. Pl. minutissima.

69. **MARGYROCARPUS**. *Cal.* 4-5-partitus. *Cor.* o. *Sigm.* peltatum. *Drupa* 1-sperma.

1. *setosus*. Flor. per. 1. p. 28. t. 8. f. J. Hab. in Regni chilensis collibus aridis. Aest. Caul. procumb. ramosiss. Fol. pinnata.  $\text{h}$

*Obs.* Huc etiam retulit: *Empetrum* pinnatum. Lam. 2. *Ancistrum barbatum*. Ej. ill. gen. p. 77. Cl. Willdenow in Nov. act. Nat. curios. Berol. v. 2.

70. **ANGISTRUM**. *Cal.* 4-phyllus: aristis hamatis. *Cor.* o. *Stigma* multipartitum. *Drupa* exsucca, hispida, 1-locularis.

1. *Sanguisorbae*, caulib. decumbentibus, foliis obovatis aequaliter dentatis, subtus sericeo-pubescentibus, spicis globosis. Willd. spec. pl. 1. p. 154. *A. anserinaefol.* Lam. ill. p. 44. t. 12. f. 1. In Nov. Zeelandia. Pet. ovata. *Stigma* penicill.

2. *repens*, caulibus repentibus, foliol. ovato-oblongis argute serratis lineatis, capitulis globosis. Venten. hort. cels. p. 6. t. 6. Habitat in Peru. Suffrutex. Pet. oblonga. *Stigma* cristatum.

3. *magellanicum*, foliol. ovato-incisopinnatifidis, spica capitato-globosa. Lam. l. c. f. 2. Hab. in freto Magell.  $\beta$ . *hu-*

*mile*, foliol. latoribus serratis. *Poteriuna*. H. P. Lam. l. c.

4. *lucidum*, caul. subdemersis, pedunc. scapiformibus, spicis ovatis, foliol. oblongis integerrimis acutis subfasciculatis. Aiton. Kew. 1. p. 15. Hab. in insulis Falklandiae. *Stigmata* fasciculata, atrosanguinea.  $\overline{\text{T}}$

5. *latebrosus*, caul. demersis, pedunc. scapiformibus, spicis elongatis, foliol. oblongis incisis villosis, fructibus undique armatis. Aiton. Kew. 1. p. 16. *Agrimonia decumbens*. Lin. suppl. 25: Ad Cap. b. spei. Folia radicalia Potentill. *Anserinae*.  $\overline{\text{T}}$

71. **ARUNA**. *Cal.* 5-partitus: laciniis reflexis. *Cor.* nulla. *Bacca* unilocularis, 1-vel 2-sperma.

1. *guyanensis*. Auhl. guj. 1. p. 16. t. 5. Habit. in sylvib. desertis remotis Gujanae. Arbor ramis divaricatis.

## D I G Y N I A .

72. **ANTHOXANTHUM**. *Cal.* Gluma bivalvis, uniflora. *Cor.* Gluma bivalvis, acuminata, aristata. *Sem.* 1.

1. *oloratum*, spica oblonga ovata, flosculis subpedunculatis arista longioribus. Fl. dan. t. 666. Schreb. gram. t. 5. Hab. in pratis, sylvib.  $\overline{\text{T}}$

2. *indicum*, spica lineari, flosculis sessilibus arista longioribus. Flor. reyl. 25. Pluk. alm. 177. t. 119. f. 1. In India.

3. *crinitum*, panicula coarctata, aristis longissimis. Forst. prod. n. 18. Lin. suppl. 50. In Nova Zeelandia. Gramen altum.

4. *avenaceum*, spica secunda, calycib. pilosis, flosculis arista longa torta geniculata. Retz. obs. 3. p. 8. Hab. in Malabaria. Facies Avenae. Gramen semipedale. Retz.

73. **GUNNERA**. *Ament.* thyrsoidaeum. *Cal.* superus, bidentatus. *Cor.* o. *Sysl.* 2-partitus. *Drupa* 1-sperma, coronata.

1. *perpensa*, foliis cordatis laevibus. Lin. Syst. pl. ed. Reich. 4. p. 42. Pluk. alm. p. 68. t. 18. f. 12. *Perpensum* blitisperrum. Burm. prod. p. 26. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. radical. dentato-crenata. Scap. nudus.  $\overline{\text{T}}$

2. *scaltra*, foliis palmatis scabris. Fl. per. 1. p. 29. t. 44. f. 2. *G. chilensis*. Lam. encycl. bot. 3. p. 1. Panke tinctoria. Molin. Chil. p. 150. t. 1. In palustrib. Chili.

3. *magellanica*, dioica, fol. reniformib. Lam. l. c. Hab. in freto Magellanico. Fol. radical. venosa crenata Tussil. *alpinæ* fere. — Lamarckius putat hocce genus potius ad Classem dioeciam pertinere.

## TRIGYNIA.

74. PIPER. *Spadix* amentiformis. *Cal.* o. *Cor.* o. *Styl.* brevissimus. *Stigm.* 3. manifesta; aut (in *Peperomiis*) punctum vel maculam 1-2 tantum sistentia. *Bacca* 1-sperma. (*Stamina* 2, 4, 5 et 6.)

1. *nigrum*, foliis ovatis subseptemnerviis glabris, petiolis simplicibus. Flor. zeyl. 26. Willd. sp. pl. Lin. p. 159. *P. aromaticum*. fol. ovatis acutis 5-nerviis glabris, petiol. simplicissimis, spicis inferne substerilibus. Lam. illustr. p. 79. t. 23. Blackw. t. 348. Hab. in India. *h*

2. *sylvestre*, fol. subcordatis obliquis 5-nerviis, spic. fructiferis laxiusculis. Lam. l. c. In insul. Franciæ, Malabar. Flor. dioici. L.

3. *Belle*, fol. ovatis oblongiusculis acuminatis septemnerviis, petiolis bidentatis. Burma. zeyl. 193. t. 82. f. 2. *Betela-codi*. Rhecl. mal. 7. p. 29. t. 15. Habitat in India. *h*

4. *Cubeba*, foliis oblique ovatis s. oblongis venosis acutis, spica solitaria pedunculata oppositifolia, fructib. pedicellatis. Lin. suppl. 50. Hab. in Javæ et Guinæe sylvis. Flor. dioici. Lam.

5. *capense*, fol. ovatis nervosis acuminatis; nervis villosis. Lin. suppl. 90. Ad Cap. h. spec. Distinguitur veuis pagina inferiori villosis. L.

6. *Malamis*, fol. ovatis acutiusculis subtus scabris; nervis quinque subtus elevatis. Rumph. amb. 5. p. 336. t. 116. f. 2. In India utraque.

7. *discolor*, foliis lato-ovatis quinque-nerviis glaberrimis, postice discoloribus, spicis laxioribus, flosculis remotioribus. Swartz prod. 15. et Flor. l. p. 52. G. et L. in N. Comm. Petrop. v. 12. t. 10. Hab. in Jamaica, montib. aliis.

8. *medium*, fol. ovatis acuminatis obliquis, basi subcordatis, quinque-nerviis, spicis axillaribus nutantibus. Will. loc. cit. p. 150. Jacq. Icon. rar. t. 1. 8. Collect. 1. p. 147. Affine sequenti.

9. *Amalago*, fol. lanceolato-ovatis quinque-nerviis rugosis. Mill. dict. n. 3. Swartz

obs. p. 19. Sloan. hist. 1. p. 134. t. 87. f. 1. Pluk. alm. 297. t. 215. f. 2. In fruticulis montosis Jamaicae et Hispaniolæ. *h*

10. *Siriboa*, foliis cordatis subseptem-nerviis venosis. Rumph. amb. 5. p. 340. t. 117. f. 2. In India. *h*

11. *excelsum*, foliis orbiculato-cordatis subseptem-nerviis, pedunculis terminalibus solitariis bifidis, caule arboresco. Forst. prod. In Nova Zeelandia. *h*

12. *longum*, fol. cordatis petiolatis sessilibusque. Blackw. t. 356. Rumph. amb. 5. p. 335. t. 116. f. 2. In India. *h*

13. *methysticum*, fol. cordatis acuminatis multinerviis, spicis axillaribus solitariis brevissimis pedunculatis patentissimis. Forst. plant. escul. aust. p. 76. n. 50. In insulis Societatis, Americarum, et Sandwichiæ. *h*

14. *latifolium*, fol. orbiculato-cordatis novem-nerviis, spicis axillaribus aggregatis pedunculatis. Forst. prod. n. 22. Lin. suppl. 91. Folia magna profunde cordata.

15. *decumanum*, fol. cordatis novem-nerviis reticulatis. Jacq. Collect. 4. p. 128. Icon. rar. Plum. amer. 59. t. 76. Habit. in Martinica et ad Caracas. Affine nimis *P. reticulato*. *h*

16. *ovatum*, fol. ovatis venosis multinerviis basi aequalibus, bacris pedicellatis distantibus, ramis leevibus. Vahl. Eclog. 1. t. 1. In insul. Trinit. *h*

17. *Nhandi*, foliis cordatis novem-nerviis venosis glabris attenuatis basi sinu profundo. Vahl. l. c. (*P. caudatum*). Act. Soc. hist. nat. 1. p. 105. Ind. occid.

18. *reticulatum*, fol. cordatis septem-nerviis reticulatis. Swartz. obs. p. 19. Plum. amer. 57. t. 75. Hab. in Martinicæ Brasiliæ et Hispaniolæ fruticetis. *h*

19. *mite*, fol. cordatis-acutis 15-16-nerviis reticulatis, spicis longioribus subulatis erectis. Flor. peruv. l. p. 37. t. 48. f. a. In sylvis Cuchero. Rami mites. *h*

20. *Carpupija*, foliis cordatis acutis acuminatisque coriaceis, margine revolutis, spicis erectis. Fl. peruv. t. 63. f. b. Hab. cum priore. Arbor 3-oryalis. Fol. fragrantissima; ad indigestiones ab incolis adhibentur, et laudati auctores iis ad animalia dissecta a blattis præservanda usi sunt.

21. *obliquum*, fol. oblique cordatis obtusis, spicis longissimis dependentibus. Fl. peruv. l. c. f. a. Hab. In Cuchero sylvis ad Caryumba terminum. Fol. subtus 11-15-nerviis,

22. *acutifolium*, fol. cordatis acutissimis, spicis erectis cylindricis brevibus. Fl. per. p. 38. t. 67. f. a. In Cuchero et Pozuzo sylv. Fol. alternatim 13-17-nervia, subius pubescentia. h

23. *angustifolium*, foliis cordato-lanceolatis acutis rugosis, spicis recurvis foliorum longitudine. Fl. peruv. t. 57. f. a. In Peruvianis sylv. et ripis. Stigmata hispida. Decoctum contra morbos venericos adhibetur. h

24. *granulosum*, fol. cordato-lanceolatis obliquis rugosissimis, supra scabris, nervis alternis, spicis uncinatis. Fl. peruv. t. 64. f. b. Hab. in Pillao nemoribus. Fol. bipalmata, 13-17-nervia. Filam. articulata. Fol. odore grato.

25. *aduncum*, fol. oblongo-ovatis acuminatis basi inaequalibus venosis, spicis solitariis axillaribus uncinatis. Willd. l. c. p. 162. Jacq. Collect. 5. p. 6. Icon. rar. Hab. in Jamaica. h

26. *scabrum*, fol. lato-ovatis acuminatis obliq. rugosis scabris, spicis erectis. Swartz Flor. Ind. occid. 1. p. 59. In montosis Jamaicae temperatoris. Fol. fusco-viridia. h

27. *macrophyllum*, fol. elliptico-ovatis acuminatis glabris, basi inaequalibus venosis. petiolis appendiculatis, spicis axillaribus solitariis. Willd. p. 161. Swartz prod. p. 15. et Flor. 1. p. 54. In Jamaicae montib. petrosis. Spec. minus fragilis. S.

28. *microstachyum*, fol. oblongis laevib. acuminatis, basi aequalibus, subius venosis, spicis brevissimis mucronatis. Vahl Eclog. amer. 2. Hab. in Cayenna. h

29. *rugosum*, fol. ovato-oblongis venosis glabris, basi subaequalibus subius reticulatis (rugosis), ramis laevibus. petiolis simplicibus. Vahl Eclog. 1. t. 2. Hab. cum priore. h

30. *aequale*, fol. elliptico-lanceolatis venosis attenuatis, basi aequalibus glabris, ramis laevibus geniculatis. Vahl. l. c. t. 3. Crescit in Montserrat. h

31. *Churumaya*, arborescens, fol. ovatis acutis, spicis erectis. Flor. peruv. p. 35. t. 38. f. b. Hab. in Huassahuassi nemoribus. Vernacule *churumaya* i. e. fluvii flagellum.

32. *gracile*, fol. ovato-lanceolat. acutis rugosis, spicis gracilibus erectis. Fl. per. t. 59. f. b. Hab. in Cuchero sylv. Rami tenri hispiduli. h

33. *dichotomum*, foliis oblongo-lanceolatis, venis alternis, spicis cylindricis

fol. brevioribus. Flor. peruv. p. 35. t. 60. f. b. In sylv. peruv. Fol. ejusdem usus aci n°. 20. h

34. *lineatum*, fol. ovato-oblongis acutis lineatis subplicatis spicis recurvatis. Fl. p. l. c. f. a. In Peru ad margines fluviorum.

35. *cracatum*, fol. ovato-oblongis acutis utrinque rugosis supra asperis, spicis erectis foliorum tere longitudine. Fl. per. t. 55. f. a. In Pillao nemorib. Siam. 4. h

36. *lanceolatum*, fol. lanceolat. acutis utrinque rugosis punctatis, spicis brevibus erectis. Fl. per. p. 36. t. 61. f. b. h

37. *bullatum*, hirsutum, foliis ovato-lanceolatis bullato-rugosis supra nitidis, nervis vagis. Lam. ill. p. 81. *P. rugosum*. Hab. in Cayenna. h

38. *angustifolium*, fol. linearib. utrinque acutis subsexisilibus. nervis vagis, spicis minimis ovatis lateralibus. Lam. l. c. In Guiana. Spicæ magnitud. grani tritici. h

39. *geniculatum*, fol. oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, caule ramisque geniculatis. Swartz prod. 15. et Ej. Flor. 1. p. 57. Hab. in Jamaica, sylv. lapidosis. Caul. debilis. S. h

40. *praemorsum*, fol. lanceolato-ellipticis attenuatis glabris, basi altero latere brevioribus, spicis superne recurvatis. Vahl. l. c. Roib. Surin. p. 16. In Surinamo. h

41. *verrucosum*, arborescens, fol. oblongis acuminatis obliquis multinerviis venosis, glabris coriaceis maximis, caule ramisque verrucosis. Swartz prod. 15. Sloan. cat. 25. list. 1. p. 135. t. 88. f. 1. In Jamaica, Gujana etc. Flor. spirales. h

42. *hirsutum*, fol. ovatis acuminatis obliquis rugosis geniculisque hirsutis, spicis erectis. Swartz. Flor. In occid. 1. p. 60. *P. hispidum*. Sw. Prod. p. 15. Pedunc. hispidi. h

43. *nitidum*, foliis lanceolato-ovatis, basi obliquis glabris nitidis. Swartz prod. 15. Flor. 1. p. 58. In Jamaicae umbros. montosis. h

44. *pellucidum*, fol. cordatis petiolatis, caule herbaceo. Jacq. obs. 1. p. 16. Hort. cliff. 6. 4. 4. Plum. amer. 54. t. 72. In America calidiore ☉

45. *alpinum*, herbaceum, caule erecto simplicisculo, foliis ovato-subrotundis acutis, subius aveniis, spicis axillaribus. Swartz prod. 15. Sw. Flor. 1. 62. Hab. in Jamaica, summis alpib. h

46. *hispidulum*, herbaceum, fol. subrotund. petiolat. tenuissimis, superne hirsutis, caule



caule erectiusculo. Swartz Flor. 63. Icon. tab. 4. Hab. in nemorosis humidis montium Jamaicae. Fl. caerulei. Pl. pusilla. ☉

47. *tenellum*, herbaceum, fol. distichis ovatis aveniis, margine ciliatis, spica adscendente, caul. simplici decumbente. Sw. Flora p. 65. In Jamaicae montib. supra truncos putridos.

48. *blandum*, foliis ternis lanceolatis acuminatis trinerviis ciliatis subtus punctatis. Willd. p. 164. Jacq. collect. 3. p. 211. Icon rar.

49. *curvatum*, fol. oblongis acuminatis laevibus subtus punctatis nudiis, spicis brevibus curvatis. Flor. Per. p. 36. t. 64.

50. *obovatum*, fol. obovatis acuminatis utrinque attenuatis, spicis erectis, inferioribus incrassatis, superioribus tenuibus. Flor. Per. p. 36. t. 53. b. E

51. *punctatum*, fol. oblongis acuminatis venosis utrinque punctatis, spic. foliis brevioribus. Flor. Per. t. 64. a. In Peruviae nemoribus. Stylus crassus.

52. *heteromallum*, foliis oblongis acuminatis glabris laevibus, spic. filiformibus secundis. *P. secundum*. Flor. Per. l. c. f. b. Spic. oppositifoliae.

53. *asperifolium*, fol. ovatis oblongisque acuminatis asperis, spic. junioribus curva is, adultioribus erectis. Flor. Per. p. 37. t. 56. b. Hab. cum priore. Anth. cordato-reniformes.

54. *longifolium*, fol. oblongo-ovatis acuminatis utrinque nudis venosis, spicis recurvatis. Flor. Per. l. c. t. 61. a. Stylus longus, stigm. erectiuscula. Hab. in nem. Pillao ad Icutanam. Fl. autumn. h

55. *heterophyllum*, fol. ovalibus acuminatis venosis utrinque punctatis, spicis curvatis. Fl. Per. 34. t. 56. a. In Peruv. nemorib. Stigm. 3. h

56. *callosum*, fol. ovalib. acuminatis basi callis duobus, spicis brevib. subchinatis. Flor. Per. p. 34. t. 53. a. Habit. in nemorib. Pillao. Styl. 1, longus, stigm. 2. Stam. 4. h

57. *excavatum*, fol. ovatis acuminatis subrepandis, spic. cylindricis foliis duplo longiorib. Flor. Per. l. c. t. 54. f. b. In Cuchero nemorib. Fol. nervis supra excavatis. h

58. *asperum*, fol. ovatis acutis rugosis, subtus pubescentib., supra asperis, spicis erectis. *P. scabrum*. Flor. Peruv. 1. p. 34. t. 55. b. In nemorib. Spatha villosa. Stigm. 3, reflexa. h

59. *unguiculatum*, fol. subcordatis 5-nerviis, acumine unguiculato basi utrinque revolutis, spic. erectis. Fl. Per. 34. t. 57. b. Crescit in Poguzo sylvis. Stam. 4, 5 et 6. Drupa 3-4-5-gona. Stigm. totidem.

60. *amplexicaule*, subherbaceum, fol. lanceolato-ovatis amplexicaulibus nervosis carnosius, caule erecto simplici. Swartz prod. 16. et Flor. p. 67. In India occidentali, Jamaica, in arborib. moribundis.

61. *pallidum*, foliis alternis obovatis, spicis solitariis. Forst. prod. n. 24. Hab. in insulis Societatis.

62. *obtusifolium*, fol. obovatis enerviis subcarnosis. Lam. ill. p. 81. Plum. amcr. 51. t. 70. p. *P. clusiae-folium*. Jacq. coll. 3. p. 209. ic. rar. v. 2. In America calidiore.

63. *retusum*, fol. obovatis retusis. Lin. suppl. 91. Hab. ad Cap. bonae spei.

64. *glabellum*, herbaceum, fol. ovatis acuminatis, caule declinato radicante ramosissimo. Swartz prod. 16. et Fl. p. 68. Hujus varietas simplex est: *P. scandens*. Swartz prod. p. 16.

65. *serpens*, herbaceum, fol. subrotundo-acutis planis discoloribus, caule repente. Swartz prod. 16. et Flora 69. Habit. in Jamaicae frigilior. sylvat. petrosis.

66. *cordifolium*, herbaceum, foliis obverse cordatis petiolatis plano-convexis carnosius, caule repente. Swartz prod. 16. In Jam. sylvis antiquis super arbores. Acre.

67. *obovatum*, foliis ternis petiolatis ovatis emarginatis glabris, caule repente. Vahl. Eclog. Fasc. 1. Hab. in Montserrat.

68. *nummularifolium*, herbaceum, fol. orbiculatis convexo-concavis, caule filiformi repente radicante. Swartz prod. 16. Hab. in Jamaica, in ramis arborum.

69. *rotundifolium*, herbac., fol. subrotund. plan. carnosius, caule filiformi repente. Sw. obs. 20. Jacq. obs. 1. p. 17. Plum. Am. 52. t. 69. Sloan. Jam. 45. hist. 1. p. 137. In Americae calidioris montosis muscosis.

70. *peltatum*, fol. peltatis orbiculato-cordatis obtusis repandis, spicis umbell. tis. L. Plum. amer. 56. t. 74. Hab. in Jamaica, Domingo. p. *P. reniforme*, fol. cordato-reniformib. acuminatis 17-13-nerviis, pedunc. polystachiiis, spic. fasciculatis inaequalibus. *P. peltatum* Flor. Peruv. 1. p. 38. t. 57. a. In Peruv. nemorib. ad Cuchero vicin. Spicae ad 20 usque ex pedunc. communi. *A. peltato* L. diversum videtur.

71. *distachyon*, fol. ovatis acuminatis,

spicis conjugatis, caule radicante. Swartz obs. 21. Plum. amer. 51. t. 67. Habit. in Americae calidioris montibus.  $\overline{\text{T}}$

72. *umbellatum*, fol. orbiculato acuminiatis venosis, spicis umbellatis, caule erecto sulcato. Willd. l. c. p. 167. Swartz obs. 21. Jacq. collect. 2. p. 335. Plum. amer. 53. t. 73. In Indiae occidentalis ruderais.  $\overline{\text{h}}$

73. *trifolium*, fol. ternis subrotundis. Plum. amer. 52. 68. Hab. in America.

74. *pereskiaefolium*, fol. verticillatis ternis quaternisve ellipticis glabris, spica terminali solitaria, caule maculato. Willd. l. c. Jacq. collect. 4. p. 126. Icon. rar. Hab. in insula Venezuela.  $\overline{\text{h}}$

75. *polystachyon*, fol. verticillatis rhombo-ovatis integerr. trinerviis pubescentib. Aiton. Kew. In Jamaica.  $\overline{\text{T}}$

76. *quadrifolium*, fol. quat. cuneiformibus obovatis emarginatis subsessilibus, caule erecto. Swartz obs. 22. Plum. amer. t. 242. f. 3. In Americae meridionalis montibus nemorosis altissimis.

77. *verticillatum*, fol. verticillatis quaternis ellipticis obtusis trinerviis. Willd. l. c. p. 168. Amoen. acad. 5. p. 391. Syst. 3. p. 60. Hab. in Jamaica.  $\odot$

78. *stellatum*, herbaceum, fol. verticillatis oblongis acuminiatis trinerviis glabris, caule erecto. Swartz Flor. p. 74. Jacq. collect. 2. p. 212. Icon. rar. conf. Willd. l. c. Hab. in Jamaica, sylv. alpium.  $\overline{\text{T}}$

79. *reflexum*, fol. quaternis rhombeis carnosius reflexis patulisque, caule repente. Swartz obs. 23. Lin. suppl. 97. Habitat in India occidentali, ad Cap. bonae spei, et in insulis maris pacifici ad arborum truncos muscosos.

80. *pulchellum*, fol. quaternis subsessilibus oblongis enerviis integerrimis, spicis terminalibus. Ait. Kew. 1. p. 50. Hab. in Jamaica.  $\overline{\text{T}}$

81. *filiforme*, herbaceum, fol. linearib. oblongis obtusis: summis verticillatis, caule filiformi repente. Swartz prod. 16. Icon. t. 5. et Flor. p. 73. In Jamaicae montibus, in muscosis. Bacc. oblonga. stigm. villos. Sw.

PEPEROMIA. Cal. o. Cor. o. Stigma: punct. 1-2, in apice geminis; vid. Prodrom. Flor. peruv. p. 8.

Obs. Auctores operis laudati differentiam à Piperibus Lin. sequenti modo exhibent: differt strobis ovatis minimis, staminibus

germine longioribus, et stigmate. Porro omnes sunt herbaceae, carnosae. Caules aut scapi cnoles erecti, scandentes aut repentes. Color ut plurimum ruber. — Forte nonnullae jam enumeratae species, praesertim herbaceae, huc quoque pertinent. Summam ob affinitatem, praesertim quoad habitum, Peperomias cum Piperibus adhuc conjungere melius duxi, usque dum amarum divisionum species rite examinatae sint.

82. *scutellatum*, radice tuberosa, fol. peltatis scutellaeformibus. Peperom. *scutellaeifolia*. Flor. Peruv. 1. p. 29. t. 44. f. b. Hab. in Peruviae collib. ad Atiquipa.

83. *umbilicatum*, rad. tuberosa, fol. peltatis orbiculato-umbilicatis aveniis, scapo laxo. Fl. Per. p. 30. t. 45. b. In Lima collib. supra saxa.

84. *secundum*, fol. cordato-subrotundis, flor. paniculatis secundis. Fl. Per. l. c. f. a. In montib. Pillao.

85. *foliiflorum*, fol. umbellatis cordatis. basi floriferis, spicis aggregatis flexuosis. Fl. Per. l. c. f. c. In Chinchoa montib. nemorosis, supra saxa et arbores.

86. *crystallinum*, fol. oblongis subtus punctato-excavatis, spicis oppositifoliis compressis. Flor. Per. p. 31. Habitat in collib. Lima. Olor Anisi.

87. *inaequalifolium*, fol. verticillatis obovatis: floralib. majoribus, spicis terminalibus inaequalibus subquaternis. Flor. Per. 1. p. 30. t. 46. a. In Peruviae locis saxosis et supra arbores, frequens.

88. *rhombeum*, fol. quaternis oblongo-rhombicis, spicis terminalib. solitariis. Loc. cit. p. 31, f. b. Cresc. in sylvis prope Pillao.

89. *filiforme*, foliis verticillatis subrotundo-obovatis, spic. terminalib. oblongis. Flor. Per. 31. t. 47. b. In Chinchoa nemoribus supra saxa et arb. Fl. aest.

90. *concavum*, fol. oppositis verticillatisque ovalibus subtus convexis 5-nerviis, spic. terminalib. solitariis. Flor. Per. 31. t. 46. c. Cum priore.

91. *tetragonum*, fol. oblongis 5-nerviis acutis, spic. terminalib. longissimis geminis. Flor. Per. l. c. t. 47. Caul. basi ramosus, punctatus.

92. *septemnerve*, fol. lanceolat. 7-nerviis coriaceis, spic. subulatis fol. longiorib. l. c. f. c. Ad Poguro.

93. *pubescens*, fol. ovatis 3-nerviis, subtus pubescentib. spic. ternis: intermedia longissima. Flor. Per. p. 31. In Peruviae montib. umbrosis.

94. *alatum*, fol. lanceolatis 5-nerviis, caule alato, spic. subulatis. Fl. Per. 31. t. 48. b. In Poguzo nemorib.

95. *purpureum*, fol. ovatis acuminatis venosis, spic. laxis pendulis. l. c. p. 32. t. 49. b. Hab. in umbros. prope Chinchao. Caul. apice divisus.

96. *pilosum*, fol. oblongo-lanceolatis acutis, basi inaequalib. pilosis, spic. solitariis axillarib. Flor. Per. 31. t. 50. a. In Pozugo sylvis, umbrosis.

97. *trinerve*, fol. ovalib. acutis triner-viis, spic. axillarib. solitariis, binis terminalib. erectis. Flor. Peruv. l. c. f. b. Cum priore crescit.

98. *obliquum*, fol. obovato-oblongis obliquis nervosis, spic. furcatis filiformib. Fl. Per. t. 51. c. Piper acuminatum. Lán. Plum. Amer. p. 54. t. 71. In Peru.

99. *acuminatum*, fol. obovatis acuminatis, spica filiformi acuta. Flor. Per. 32. t. 51. a. Petioli alati.

100. *striatum*, fol. ovato-oblongis acutis utrinque pubescentib. petiol. subtus striatis,

spic. compositis terminalib. Fl. Per. 32. t. 52. b. In Cochero et Chinchao umbros.

101. *scandens*, fol. cordato-subrotundis, caule scandente, spicis axillarib. solitariis. Hab. cum anteced. Fol. avenia.

102. *dependens*, fol. cordatis 13-nerv. dependentib., spic. terminalib. subulatis. Flor. Per. p. 31. t. 48. a. In Poguzo umbrosis. Inodorum. Caul. raticans.

103. *emarginatum*, fol. obovatis emarginatis aveniis, peduncul. furcatis bispicatis. Flor. Per. l. c. t. 49. a. Supra saxa cum priore. Fol. basi carinata. Spic. longae, crassiusculae. Caul. teres, repens.

104. *variegatum*, fol. cordato-ovatis pel-tatis, spic. geminatis. Flor. Per. t. 52. f. a. *P. maculosum*. L. Plum. Amer. p. 60. t. 66. In montib. Pillao. Fol. subtus albida. Petioli macul. purpur. variegati.

105. *monostachyum*, fol. obovatis ovatisque, caule simplicissimo, spica 1, terminali. Flor. Per. p. 33. Hab. in montib. Chinchao, supra arbor. vetustarum truncos. Longitudine bipalmari.

## M O N O G Y N I A.

Hemimeris *tabulosa*, *diffusa*, *montana*. Bignonia *Catalpa*, *longissima*. Polydenum *sclerospermum*. Valeriana *Cornucop.* Boerhaavia *erecta*, *hirsuta*, *scandens*. L. Commelina *polygama*. Roth Collisia *umbellul.* Schoenus *Mariscus* L. Sc. Cladium Sw. *setaceus*. Sw. Kyllinga *pumila*, et *Scirpæ* adhuc nonnullae.

## D I G Y N I A.

Crypsis *aculeata*, Holcus *odoratus*, Festuca *diandra*, Saccharum *cylindricum*, Thunbergii. Agrostis *diandra*, Bromus *rigidus*, *diandrus* Rothii, etc.

# C L A S S I S   I I I .

## T R I A N D R I A .

### M O N O G Y N I A .

75. **BOERHAAVIA.** *Cal.* margo tubuloso-obconicus, integerrimus. *Cor.* 1-petala, campanulata, plicata. *Fruct.* tuberculatus. (*Stam.* 1, 2, 3, 4 et 10.)

1. *erecta*, caule tetragono glabro: internodiis viscosis, floribus corymboso-paniculatis. Willd. phytog. 1. n. 1. Jacq. hort. t. 5 et 6. Pluk. alm. 349. t. 226. f. 7. Hab. in Vera Cruce, Jamaica, etc.  $\overline{\text{L}}$

2. *ascendens*, fol. oblongo-ovatis subcarnosis, floribus paniculatis, pedunculis bifloris, caule ascendente. Willd. Sp. pl. L. 1. p. 19. Hab. in Guinea.

3. *laxa*, fol. suborbiculato-cordatis obtusis, panicula laxa, assurgente, aphylla. *B. paniculata* Richard in Act. Soc. Nat. Paris. p. 105. Hab. in Cayenna. Basi decumbens.

4. *diffusa*, caule procumbente diffuso, fol. ovatis repandis, umbellulis pedunculatis lateralibus. Lam. ill. gen. p. 10.

5. *hirsuta* L. pubescens, fructibus ciliatis. cfr. Swartz obs. bot. p. 11. et Lamarck l. c. secund. quem et *B. repens*. Lin. *B. diffusa* tantum varietas est. Hab. in Amer. austral., Jamaica, Peru.  $\overline{\text{L}}$

6. *polymorpha*, diffusa prostrata, fol. plerisque acutis, capitulis sparsis fasciculatisque. Richard l. c. Hab. in Cayenna.

7. *plumbaginea*, fol. subcordatis, orbiculato-acutis subtus pubescentibus, floribus umbellatis. Willd. Cavan. ic. 2. n. 121. tab. 112. Hab. in Hispania ad radices Orcellitani montis.  $\overline{\text{L}}$

8. *scandens*, caule erecto, floribus umbellatis diandris, fol. cordatis. Willd. phytog. 1. n. 4. Jacq. hort. t. 4. Pluk.

alm. 381. p. 113. f. 7. Hab. in saxosis maritimis Jamaicae et in Peru? cfr. Flor. peruv. p. 4. ubi flos 3-andrus legitur.  $\overline{\text{h}}$

8. *excelsa*, caule erecto, fol. inferioribus cordato-ovatis, summis ovatis, floribus umbellatis triandris. Willd. phytog. 1. p. 5. *Cor.* duplo major anteced. purpurea. W.  $\overline{\text{h}}$

9. *repanda*, caule erecto, fol. cordatis repando-sinuatis, floribus umbellatis triandris. Willd. Sp. pl. p. 22. *Valeriana chinensis* Lin. Burm. ind. 15. tab. 6. fig. 3. In India, China.

10. *arborescens*, caule arborescente, fol. ovatis integerrimis villosis, flor. umbellatis subdecandris. Cav. description. etc. p. 6. Hab. in N. Hisp. in vicinis Salvator.  $\overline{\text{h}}$

11. *tetrandra*, caule repente, floribus tetrandris. Forst. prod. 2. Hab. in insulis Societatis.

76. **CALYMENIA.** *Cor.* infundibuliformis, plicata. *Nur* 1-sperma, calyce persistente ampliato membranaceo circumdata.

1. *viscosa*, floribus paniculatis fol. cordatis, staminib. corolla duplo longioribus. Flor. Peruv. 1. p. 46. *Virabilis viscosa* Cav. ic. 1. p. 83. t. 10. *Oxybaphus* L'Herit. Monog. ic. Willd. Spec. 1. p. 195. Hab. in Peru. Orgyalis.

2. *ovata*, flor. dichotomo-corymbosis, fol. ovatis viscosis hirsutis, stam. corollae fere longitudine. Fl. p. r. 1. p. 45. t. 75. f. b. Cum priore 3-petalis.  $\overline{\text{L}}$

3. *expansa*, flor. dichotomo-corymbosis, fol. ovatis subrepandis glabris, staminibus corollae longitudine. Fl. Per. 1. c. f. a. 6-petal.  $\overline{\text{L}}$

4. *prostrata*, caule tereti articulado, flor.

subcorymbosis, fol. cordatis ovatisq., stam. corolla brevioribus. Fl. per. 1. p. 46. t. 75. f. c. In collib. peruvianis. Herbac. tripetalis.

5. *corymbosa*, caule 4-gono dichotomo, fol. cordatis, flor. corymbosis. Cav. ic. 4. p. 55. t. 379. Hab. in Nov. Hispania. Stam. cor. subbreviora. C.  $\mathcal{T}$

6. *aggregata*, calycibus trifloris. Cav. loco cit. 5. p. 22. t. 437. Calyx hym aggregata. Dec. 7. p. 81. t. 11. Hab. in Nov. Eisp. in vicinis St. Augustini. Cal. villosus, semiquinquepartitus, globosus, non vero expansus in pelam uti in reliquis. C.

77. *VALERIANA*. Cal. o, aut margo minimus. Cor. 1-petala, subinfundibuliformis. 5-fida, basi hinc gibba, supera. Sem. 1. (Stam. 1, 2, 3 et 4. exserta.)

\* *Valerianae*.

1. *rubra*, flor. monandris calcaratis, foliis lanceolatis integerrimis. Willd. Sp. pl. 1. p. 175. Hort. cliff. 15. Moris. hist. p. 102. s. 7. t. 14. f. 15. Hab. in Europae, Orientis ruderatis, et in Atlante. Var. flor. rubris et albis.  $\mathcal{T}$

2. *angustifolia*, florib. monandris calcaratis, fol. linearibus integerrimis. Cav. ic. 4. p. 32. t. 353. Desf. Fl. atlant. 1. p. 28. Allion. pedem. n. 2. *V. monandra*. Villars delph. 2. p. 280. Moris. hist. 3. p. 102. s. 7. t. 14. fig. 16. Pluk. 319. t. 232. f. 3. In alpinis Europae, et in Barbaria.  $\mathcal{T}$

3. *pilosa*, flor. triandris, fol. lanceol. connatis integerrimis, margine revolutis. Flor. Per. 1. p. 59. t. 66. f. a. Hab. in Tarmae locis frigidis. Flor. capitato-corymbosi. Caulis elongatus, subnudus. Plantag. albicantis habitu.  $\odot$

4. *connata*, flor. triandris, fol. lanceolatis integerrimis, spicis verticillatis. Fl. per. l. c. t. 67. c. Cum priore. Suffrutic. Polyg. Persicar. habitu.

5. *Calceitrapa*, flor. monandris, foliis pinnatifidis. Hort. ups. 14. Moris. hist. 3. p. 101. s. 7. t. 14. f. 7. In Lusitania, Barbaria et Oriente.  $\odot$

6. *dioica*, flor. dioicis, fol. pinnatifidis subtus venosis, inferiorib. ovatis integerrimis. Flor. dan. t. 687. Roth. germ. II. p. 37. In Europae et Orientis uliginosis. Fl. corymbosi.  $\mathcal{T}$

7. *brachiata*, fol. inferioribus lanceol. integerrimis, reliquis pinnatifidis laciniatis, panicula brachiata. *V. pinnatifida*. Flor. Peruv. 40. t. 69. b. Hab. in collib. albis

Limae. Succosa. Rad. tuberosa, odore V. Phu.  $\odot$

8. *virgata*, fol. pinnatis, foliol. 2-3-fidis, laciniis linearibus, panicula subcorymbosa. Fl. Per. l. c. t. 66. f. b. In Cantae praeruptis, in Peru. Tagetis minutae habitu.  $\mathcal{h}$

9. *capensis*, fol. pinnatis, foliol. ovatis dentatis. Thunb. profl. p. 7. Ad Cap. bonae spei.  $+$

10. *globifera*, fol. pinnatis aequalib., foliol. angustis sinuato-dentatis, peduncul. radicalibus, flor. capitatis. Fl. per. 1. p. 43. t. 65. b. In Cantae et Tarmae alpinis. Rad. crassiuscula.

11. *sanguisorbae*, fol. imparipinnatis foliol. ovatis dentatis, flor. paniculatis. Cav. ic. 5. p. 34. t. 456. Hab. in alpinis Cordilleras. Fl. Jan.

12. *decussata*, foliis imparipinnatis, foliol. lanceolatis, suprema majore, panic. divaricato-dichotoma. Fl. per. p. 42. t. c. f. b. In Huanacae locis petrosis. Incana.

13. *paniculata*, fol. radicalib. indivisis cordatis acutis, caulinis pinnatis, panicula diffusa. Flor. per. 41. t. 70. f. a. In Peruviae uliginosis et petrosis. Villosa, radice odore foetido uti in V. Phu. Cor. subcalcarata.

14. *hyalinorhiza*, fol. radical. subrotundis crenatis, caul. pinnatifido-dentatis, panicula terminali. Flor. per. 41. t. 67. b. Hab. in arenosis concent. Chili. Rad. tuberosa, hyalina, alba.

15. *chaerophylla*, fol. radical. subrhombis incisus, caul. imparipinnatis, foliol. laciniatis, stylo semitrifido. *V. laciniata*. Flor. Per. 1. p. 42. t. 69. a. *V. chaerophyllodes*. Smith ic. ined. p. 53. t. 53. Boerhaavia Willd. Sp. 1. p. 22. Cresc. in collib. et nemorib. Limae et Chancay.  $\odot$

16. *Phu*, fol. caulinis pinnatis, radicalibus indivisis, caule laevi. Blacw. t. 250. In Alsatia, Silesia, et in Peruviae collibus.  $\mathcal{T}$

17. *officinalis*, fol. omnibus pinnatis, foliol. dentat. lanceolatis, caul. sulcato, Blacw. t. 251. Flor. dan. 570. In nemoribus paludosis, et in Peruvia.  $\mathcal{T}$

18. *tripteris*, fol. dentatis: radicalibus cordatis, caulinis ternatis ovato-oblongis. Jacq. austr. t. 3. Pluk. alm. 380. t. 231. f. 8. Barrel. t. 742. In alpinis Helvetiae, Austriae. Involucra diphylla setaceae.  $\mathcal{T}$

19. *pauciflora*, caulib. simplicibus, fol. radicalibus pinnatis, caulinis trifoliatis, foliolis ovalib. serratis, panicula pauciflora.

Michaux Flor. 1. p. 18. In Americae bor. montosis.

20. *montana*, fol. ovato-oblongis dentatis, caule simplic. Jacq. Flor. aust. t. 269. Hall. helu. n. 212. Habitat in Europae Alpibus. ☞

21. *celtica*, fol. ovato-oblongis obtusis integerrimis, caulibus linearibus. Jacq. collect. 1. p. 24. t. 1. Hall. Helu. n. 209. In alpib. Helvetiae, Austriae, Valesiae. Fl. verticillati. ☞

22. *tuberosa*, fol. radicalib. lanceolatis integerrimis, reliquis pinnatifidis. Ger. prov. 218. In Dalmatia, Sicilia, Galloprovincia. ☞

23. *saxatilis*, fol. subdentatis, radicalibus ovatis, caulibus linearibus lanceolatis. Jacq. Fl. austr. 3. t. 267. Clos. hist. 1. p. 56. bona. Pluk. alm. 180. t. 212. f. 2. In alpib. Europae australioris. Rami brachiatii. ☞

24. *elongata*, fol. radicalibus ovatis : caulibus coriatis sessilib. inciso-subhaetatis, flor. racemosis. Jacq. austr. 3. t. 219. In alpibus Schneeberg Austriae inferioris. ☞

25. *pyrenaica*, foliis caulibus coriatis dentatis petiolatis : summis ternatis. Lin. Sp. plant. 46. Pluk. alm. t. 232. f. 1. In Pyrenaeis. Fol. maxima uti in Lunaria. ☞

26. *scandens*, fol. ternatis, caule scandente. Loeff. it. 235. Hab. in Cumana. +

27. *supina*, flor. 3-4-andris, fol. integris ciliatis : radicalibus rosaceis obovatis. Wulf. in Jacq. Misc. 2. p. 114. t. 17. f. 2. Willd. Sp. pl. 1. p. 180. Arduini Spec. 2. p. 13. t. 3. Habit. in Italiae et Austriae alpinis. Stam. regulariter 3. styl. simplex. Flor. corymbosi rubelli : singulus intra bracteolas (male involuorum nuncupatas), lineari-lanceol. sessilis. Wulf. ☞

**\*\* Fedia. Semina nuda aut dentibus coronata.**

28. *villosa*, flor. tetrandris aequalibus, foliis inferioribus auriculatis, superiorib. dentatis villosis. Thunb. jap. 32. t. 6. Willd. Sp. pl. Lin. 1. p. 181. Hab. in Japonia.

29. *polystachya*, flor. triandris, foliis pinnatis, spica composita vert. illata. Smith. Icon. ined. 3. p. 51. t. 51. In agro Bonariensi, locis aquosis.

30. *sibirica*, flor. tetrandris aequalibus, foliis pinnatifidis, seminibus paleae ovali adnatis. Gmel. sib. 3. p. 123. t. 24. *Valeriana rupest. is*. Pall. itin. 3. p. 215. In Sibiriae campis. Cor. lutea.

31. *ruthenica*, flor. tetrandris, foliis ovatis carnosius pinnatifido-dentatis, seminibus paleae ovali adnatis. Willd. l. c. p. 181. *V. lutea humilis*. Amman ruth. 18. n. 25. t. 3. Hab. in Sibiria. ☞

32. *carnosa*, flor. triandris, fol. ovalibus dentatis carnosius glaucis. Smith. Icon. ined. fasc. 3. p. 52. t. 52. In America meridion. ad fretum Magellanicum. ☞

33. *Cornucopiae*, flor. dian-drus ringentibus, fol. ovatis sessilibus. Kniph. orig. cent. 10. n. 91. Salbat. hort. rom. 2. t. 19. Hab. in Armeniae, Mauritaniae, Siciliae, Hispaniae et regni Chilensis arvis et locis arenosis. Pedunculi incrassati. ☉

34. *serrata*, foliis lanceolato-spathulatis superne serratis, spiciis verticillatis. Flor. per. 40. t. 68. c. In Peruviae subalpinis. Rad. crassa. Caul. plures. Sem. squamis coronata.

35. *coarctata*, fol. lanceolato-spathulatis integris, margine ciliato-denticulatis, spica coarctata (vericillis contignis). Flor. per. l. c. f. c. Rad. subfusiformis, ramosa, quae ut remedium specificum ad fracturas perhibetur. Fl. hyeme in Tarmae locis altis frigidis.

36. *echinata*, flor. triandris regular., fol. dentatis, fructu lineari tridentato : extimo majore recurvato. Colum. ceph. 1. p. 204. t. 206. Hab. in Italiae et Mo speli umbrosis. Cor. infundibuliformis, regularis. Stigma trifidum. Pedunculi incrassati. ☉

37. *olitoria*, caul. dichotomo, fol. linearilanceolatis integerrimis, fructu nudo. Willd. l. c. p. 182. *Valeriana Locusta*. Län. flor. succ. 32. 36.  $\beta$ . Foliis summis dentatis. Inter segetes Europae et Barbariae. ☉

38. *dentata*, caule dichotomo, fol. lanceolatis, fructu tridentato : dentibus binis brevissimis. Willd. Hall. helu. n. 215. Cum priore. Variat foliis subdentatis. W. ☉

39. *vesicaria*, caul. dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu inflato globoso. Willd. *V. cretica*, fructu vesicario. Tournef. cor. 6. Boerh. lugdb. 1. p. 75. t. 75. Hab. in Creta. Calyx infl., dentibus setaceis 6. ☉

40. *coronata*, caul. dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu sexdentato. W. *Valerianella* semine Scabiosae stellatae. Colum. ceph. 1. 207. t. 209. In Lusitania. ☉

41. *discoidea*, caule dichotomo, fol. lanceolatis dentatis, fructu duodecimidentato, dentibus uncinatis. Moris. hist. 3. p. 104. s. 7. t. 16. f. 29. In Italia, Hispania. ☉

42. *radiata*, fol. spathulato-oblongis

subintegris, fructu pubescente sub-4-gono, capitulis involucreatis. Mich. Flor. 1. p. 18. *Valeriana Locusta* radiata. Sp. plant. 48. In apricis Carol. infer. ¶

43. *pumila*, caule dichotomo, fol. imis dentatis, summis linearib. multifidis. Sauv. monsp. 13. Thuil. Flor. par. p. 16. Hab. Mompeli et Parisiis. ☉

78. PHYLACTIS. Flor. involu-  
crati : *Involucrum* 1-phyllum,  
vaginans. *Cal.* margo nutius.  
*Cor.* trifida. *Sem.* 1. (Genitalia  
exserta.)

1. *rigida*, acaulis, radice crassa, fol. radiantibus brevibus lanceolato-linearib. mucronatis. *Valeriana rigida* Flor. per. 1. p. 34. t. 65. f. c. Hab. in Tarmae provinc. alpinis. Fl. Octob., Novemb. Fol. vix disco longiora. ¶

2. *tenuifolia*, acaulis, radice fusiformi, fol. radiantibus longis lineari-subulatis gracilibus. *Valeriana tenuifolia* Flor. per. 1. c. f. d. In Tarma et in Huasochiri provinciis Peruv. Nov. Dec. ¶

3. *spatulata*, caespitosa, fol. spatulatis. *V. spatulata*, fol. spatulatis sublineari-  
busque obtusis, cor. 3-fidis, umbella sessili involucreta. Flor. per. 1. p. 40. t. 68. b. Hab. in Tarmae alpinis ¶

Obs. Duae praesertim priores species flores compositos mentientes, habitu a Valerianis nimis recedunt, ut cum iis conjugui possent.

79. TRIPTERELLA. *Cal.* 6-fidus, alato-angulosus, supra basin solidam tubulosus. *Cor.* nulla. *Stigm.* 3. *Caps.* 3-quetra, 3-locul. polysperma. (*Stam.* inclusa.)

1. *capitata*, setacea, fol. subulatis, florib. in capitulo terminali fasciculatis, calyce angulis subaptero. Michaux Flor. 1. p. 19. t. 3. Hab. in Carolinae et Cayennae udis. Simplex, subaphylla. An *Vogelia* Gmel. S. N. L. 2. p. 107?

80. OLAX. *Cal.* integer. *Cor.* infundibuliformis, 3-fida. Nectar. 4-phyllum.

1. *zeylanica*. Amoen. acad. 1. p. 187. Vahl. symb. 3 p. 7. In Zeylona. Arbor ramis flaccis rugosis Visci.

81. MACROLOBIUM. *Cal.* duplex : exterior 2-phyllum, interior tur-

binatus oblique 4-fidus. *Petalum* 1. *Legum.* mono-permum. *Stam.* longa.

1. *bifolium*, fol. binatis, foliol. ovatis acuminatis obliquis, legumine oblongo basitricarinato. Willd. Sp. pl. 1. p. 186. Vonnapa bifolia. Aubl. guj. 1. p. 25. t. 7. Lam. Illustr. p. 97. t. 26. In sylvis Cajennae, Gujanae ad ripas fluviorum. h

2. *sphaerocarpum*, fol. binatis, foliol. ovatis acuminatis reticulatis, legumine subrotundo compresso. Willd. 1. c. Vonnapa Simira. Aubl. guj. 1. p. 27. t. 8. V. violacea Lam. 1. c. In sylvis Gujanae. h

82. OUTEA. *Cal.* 5 dentatus bi-bracteatus. *Petala* 5 : superiore maximo, Filam. sterile recondente. *Legumen* pedicellatum. *Stam.* longissima.

1. *guianensis*. Aublet p. 29. t. 9. Lam. illustr. p. 97. t. 26. *Macrolobium* pinnatum. Willd. Sp. pl. p. 186. Habitat in Gujana. Arb. fol. impari-pinnata. Flor. racemoso-spicati.

83. TAPURA. *Cal.* campanulata, 6-partit. basi tribract. *Cor.* 5-pet. bilabiata. *Stigm.* 3, revoluta.

1. *gujanensis*. Aubl. t. 48. *Rohria petioliflora* In sylvis Gujanae. Fol. alterna acuminata integerrima venoso-reticulata. h

84. RUMPHIA. *Cal.* 3-fidus. *Petalata* 3. *Drupa* 3-locularis.

1. *amboinensis*. R. tiliaefolia Lam. ill. p. 66. t. 15. Rheed. mal. 4. p. 25. t. 11. In India. Arbor procera. Racemi axillares. h

85. CNEFORUM. *Cal.* 3-4-fidus. *Petala* 3-4, aequantia. *Stam.* 3-4. *Drupa* 3-4-cocca.

1. *tricocon*, foliis glabris, florib. axillaribus. Lin. Lam. ill. p. 99. t. 27. Hab. in Gallia meridion., Hispan. et Barbar. Acris. Fol. lanceolata, sempervirens. h

2. *pulverulentum*, fol. cinereo-pulverulentis floriferis, petalis staminibusque 4. Ventenat Pl. du Jard. de Cels. p. 77. t. 77. Hab. in Teneriffa. Fl. aest. h

86. COMOCLEADIA. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-partita. *Drupa* oblonga : nuce biloba.

1. *integrifolia*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis ovatis acumin. integerrimis. Willd.

Sp. pl. p. 187. Jacq. amer. 12. Sloan. jam. 184. hist. 2. p. 131. t. 222. f. 1. In America calidiore. h

2. *dentata*, fol. pinnatis, foliol. petiolat. oblong. spinoso-dentat. basi cuneatis. Willd. l. c. p. 88. Jacq. amer. 13. t. 173. f. 4. In America meridionali. Arbor odore stercoreis. h

3. *ilicifolia*, fol. pinnatis, foliol. sessilibus ovatis tridentatis basi subrotundis. Willd. l. c. p. 188. Swartz profl. et Flor. 75. Hlex Dolonaca. Lin. Sp. Plant. 2. p. 180. Plum. gen. 20. icon. p. 108. t. 118. f. 1. In insulis Caribaeis et Antiquae petros. calcareis. Arb. Flores racemosi ut in Rhoe.

4. *angulosa*, fol. pinnatis: foliol. sessilibus subrotundis spinoso-dentatis. Willd. Lam. encycl. t. 27. f. 2. In America. h

87. *WILLICHIA*. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Caps. 2-locularis, polysperma.

1. *repens*. Hab. in Mexico. Mutis. Planta obscura videtur. Folia orbiculata, subpelata, hirsuta, subtus rubescentia. Flores parvi, rosei, calyce hirsuto. ☉

88. *ROTAIA*. Cal. tubulosus, 3-dentatus. Cor. o. Caps. 3-locularis, polysperma.

1. *verticillaris*, fol. verticillatis. Mant. 175. Hab. in India orientali. Fol. quaterna, rarius in ramis 5-8. Clyx capsulam obvestiens, membranaceus. ☉

89. *ORTEGIA*. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. apice 3-valvis. 1-locularis, polysperma. Sigm. 1 et 3.

1. *hispanica*, caule ramoso, pedunculis multifloris. Willd. Sp. 1. p. 190. Cav. ic. 1. p. 35. t. 47. Desf. atl. 1. p. 31. In Hispania et Barbaria. h

2. *dichotoma*, caule dichotomo, pedunc. unifloris. Willd. l. c. Allion. stirp. ped. 176. t. 4. f. 1. In Italia. Statura Galii. Affinis Polycarpo. h

90. *LOEFLINGIA*. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala, minima. Caps. supera, 1-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *hispanica*, foliis subulatis mucronatis basi setosis, floribus axillaribus sessilibus. Willd. Spec. pl. p. 191. Loefl. it. 113. t. 1. f. 2. Cavan. ic. 1. p. 64. t. 94.

In Hispaniae collibus apricis, et prope Mascar in Barb. Desf. Facies Scleranthi, ramis diffusis. ☉

2. *indica*, fol. oblongis, florib. axillaribus cymosis. Willd. l. c. Reiz. obs. 4. p. 8. Pharnaceum depressum. Lin. Mant. alt. p. 564. Hab. in India orientali. Caul. numero-i prostrati simplices. Planta Mollugini similis.

91. *POLYCNEMUM*. Cal. 3-phyllus. Pet. 5, calyciformia. Sem. 1, subnudum. (Stam. 1, 2, 3 et 5.)

1. *monandrum*, monandrum, fol. linearibus, acutis caule erecto. Willd. Sp. pl. 192. Pall. itin. 1. app. n. 94. tab. G. f. 1. In Sibiria, locis aridis subsalsis. h

2. *sclerospermum*, diandrum, fol. teretibus carnosius, caule erecto ramoso. Willd. l. c. Pall. itin. 3. app. n. 84. t. M. fig. 2. E. c. In limosis salis Sibiriae. ☉

3. *arvense*, triandrum, fol. subulatis triquetris, caule diffuso. Willd. l. c. In Europae arvis. ☉

4. *salsum*, triandrum fol. filiformibus carnosius vaginantibus, caule diffuso. Willd. l. c. *P. triandrum*. Pall. itin. 1. app. n. 95. tab. G. fig. 2. et H. fig. 1. Hab. in locis subsalsis Sibiriae.

5. *oppositifolium*, pentandrum, fol. oppositis carnosius semicylindricis, caule erecto. Willd. p. 193. Pall. itin. 1. app. 98. t. H. fig. 2. Hab. versus mare caspium. ☉

92. *HIPPOCRATEA*. Cal. 5-partitus. Petala 5, apice foveata. Caps. 3, compressae, bivalves: valvis carinatis. Sem. hinc alata.

1. *scandens*, fol. ovato-lanceolatis serratis, racemis corymbosis, capsulis obcordatis. Lam. ill. gen. 1. p. 100. t. 28. f. 1. (*H. obcordata*.) Jacq. Am. t. 12. Hab. in Amer. australi. h

2. *ovata*, fol. ovalibus leviter dentatis, caps. ovatis. Lam. l. c. f. 2. *H. volubilis*. β. L. Willd. Sp. 1. p. 193. Plum. gen. 8. ic. 88. Cum priore. h

3. *comosa*, paniculis comosis, pedunc. multifidis capillaribus, fol. ovatis integris. Swartz Flor. Ind. occid. 1. p. 77. Plum. ic. 77. t. 88. f. 2. b. *H. multiflora*. Lam. l. c. p. 101? Loefl. it. p. 314. In Hispaniolae interioris sylvis. Fl. Febr. Nuclei albi, subdulces. h

4. *verticillata*, flor. verticillatis. α. *senegalensis*, fol. ovatis leviter dentatis,



ramulis punctatis, flor. verticillatis. Lam. ill. p. 101. h

♂ *madagascariensis*, fol. ovatis acutis nitidis subintegerrimis, ramulis leprosis, flor. verticillatis. Lam. l. c.

5. *viridis*, scandens, corymbis dichotomis, fol. ovatis obtuse acuminatis. Flor. Per. t. p. 43. t. 74. f. a. In Andium nemorib. ad Pozuzo. h

6? *Anthodon*, flor. ciliato-dentatis. *Anthodon decussatum*, scandens, corymbis dichotomis, fol. oblongis laeviter serratis. Flor. Per. t. p. 45. t. 74. f. b. Cum priore.

93. TONSELLA. *Cal.* 5-partitus, *Petala* 5. *Nect.* urceolatum. *Bacca* 1-locul., 4-sperma.

1. *scandens*, fol. integerrimis acuminatis. Willd. l. c. p. 194. Vahl. symb. 2. p. 17. Tontlea scandens. Aubl. gu. t. p. 31. tab. 10. In Gujana et insula Trinitatis. h

94. FISSILIA. *Cal.* urceolatus, integer. *Cor.* tubulosa, petalis 3, conniventibus: binis bifidis. *Stam.* 8: 5 sterilia. *Nux* 1-sperma, glandiformis.

1. *Psittacorum*. Lam. ill. p. 102. t. 28. Willd. Sp. pl. 194. In insula Bourbon. Pedunculi axillares uni- bi- vel triflori.

† *IXIDEX* (Gen. 95-112.) *Cor.* supera, tubulosa, 6-partita, rarius 6-petala, limboaequalant subingente. *Caps.* interna, 3-locularis, 3-valvis, polysperma, in affinis supera. *Filam.* 3, in nonnullis connata. Flores spathacri. *Fol.* ut plurimum ensiformis. *Radix* fibrosa, tuberosa, plerumque bulbosa, *perennis*.

95. CROCUS. *Spatha* radicalis. *Cor.* infundibuliformis: tubo longissimo gracili. *Stigmata* profunde incis, cristata (crocea).

1. *officinalis*, foliis linearibus mar. ine revolutis, stigmate exserto: segmentis longissimis linearibus. Smith Flor. angl. t. p. 39. Engl. bot. t. 343. *C. sativus*. Willd. Sp. t. p. 194. Hab. in Oriente, nunc in hortis ob usum colitur.

2. *vernus*, fol. linearib. planis, stigm. incluso: segmentis incrassatis brevissimis. Smith. l. c. 40. Engl. bot. t. 344. Curt. bot. mog. t. 45. Hab. in Europaeis alpinis, in pratis anglicis rarius et in Atlante. (Desf.)

3. *nudiflorus*, apophyllis, stigmate incluso trifido, segmentis capillaceo-multifid. Smith loco citato, p. 41. *C. multifidus*. Ramond

in Bulletin des Sciences, n<sup>o</sup>. 41. t. 8. f. 1. p. 129. Cresc. in Anglia, in Pyrenaeis et in Gallia circa Dax. autumnis flores, folia vere Colchici ad instar profert.

96. GALAXIA. *Spatha* (subradicalis) 1-valvis. *Cor.* infundibuliformis: tubo longo. *Filam.* connata. *Stigmata* 3, lobata-simbriata. (Plantulae subacaules; flor. plerumque lutei.)

1. *ovata*, fol. ovatis margine cartilagineis glabris. Th. diss. acad. t. p. 49-50. Jacq. coll. p. 137. Ic. rar. 2. t. 291. Willd. Sp. 3. p. 583. Ixia. Lin. Suppl. p. 93. In Cap. bon. spei collibus, cum sequentib. *Cor.* flava, passim et violacea.

2. *ciliata*, fol. elongatis ciliatis. *G. ovata*, fol. ovatis margine ciliatis, cor. longissimis arcuatis flavis. Andrew Reposit. t. 94.

3. *graminea*, foliis linearibus subulatis. Thunb. l. c. Fol. basi dilatata. Stigm. infundibuliforme, lacero-multifidum. Jacq. coll. 2. p. 341. t. 189. f. 3.

97. ARISTEA. *Cor.* (caerulea) tubo breviusculo. *Stigma* simplex, obtuso-subconcaevum: *Sem.* compressa, scabrida.

1. *eriophora*, florib. pedunculatis, spathis villosis-lacris. *A. cyanea*. Aiton. Kew. t. p. 67. Andrew t. 10. Willd. Spec. 223. Ixia *africana* L. Gramen eriophorum etc. Pluck. mant. 58. Hab. ut et sequentes species, quibus coroll. plus minusve cyanea est, ad Cap. b. Spei.

2. *spicata*, fol. ensiformibus, floribus spicatis confertis. *A. major*. Andrew t. 160. Spatha diphylla, parva. Stigma orbiculare, marginatum. Flor. sessiles.

3. *bracteata*, fol. linearibus distichis, caule subpaniculato, floribus pedunculatis bracteis latis inclusis. *Moraea caerulea* Thunb. diss. acad. 2. p. 289. n<sup>o</sup>. 15. t. 2. f. 2. Spathae universales (bracteae) naviculares, partial. ovatae. Th.

4. *spiralis*, scapo compresso articulo, fol. erectis, cor. ternis subsecundis. Thunb. Diss. n. 2. Diss. acad. 2. p. 281. Cor. albidocaeerulea, intus basi macula cordata. Stigm. truncatum, villosum. Th.

5. *fruticosa*, caule ramoso fol. imbricato. Thunb. diss. de Ixia. t. 1. f. 3. Flor. *caerulei*, tubus filiformis, Stigm. simplex Thunb. Hoc inter et sequens genus intermedia species videtur.

98. WITSENA. *Spatha* nulla? Cor. tubo ut plurimum longo, laciniisque rectis, inter folia disticha. *Stigm.* emarginatum, ant. subtrifidum.

1. *Maura*, floribus discoloribus extus tomentos. Thunb. Nov. gen. pl. afr. diss. ac 1. p. 33. Antholyza L. *Ixia disticha* Lam. encycl. 3. p. 333. secundum quem (contra *Thunbergium*) *stigm. trifidum* et *germen inferum*, uti in confinis. In montosis nemorosis Cap. b. Sp. Coll. atrum, limbus luteus.

2. *magellanica*, cor. tubo brevissimo profunde partito. Tapeina Jussieu gen. pl. p. 59. *Ixia* Lam. l. c. Moraea Willd. Sp. Galaxia Cav. Dis. 6. t. 189. f. 4. In fretu Magellanico. Fol. minima. Flor. parvuli, subsessiles inter folia spatharum aemula. Juss. An, uti et sequens, hujus generis?

3. *pyramidalis*, caule subramoso, fol. nearib. striatis distichis patentissimis: superioribus spathacris. Lam. enc. 3. p. 334. sub *Ixia*. Hab. in Mauritiâ. Tub. longissimo filiformi, lacinia unica strictiore (ut in Antholyzis nonnullis.) Stigmata 3-bifida. Lamarck.

99. ANTHOLYZA. Cor. (stipitata) longe tubulosa: tubo recurvo subcylindrico laciniae ovato-lanceolatae: suprema fornicata longiore. Spatha bivalvis, ovata. (Genitalia exserta, Anth. saepius caeruleae. Stigmata 3-6.)

1. *Canonia*, cor. subpapilionacea, lacin. duabus externis latioribus ascens. lentibus. Lin. Willd. Sp. pl. t. p. 222. Mill. ic. 75. t. 113. Decand. et Relouté Liliacées, t. 12. Cor. peculiari est structura, intus nectarifero, colore coccineo. Hab. cum caeteris speciebus. a1 Cap. bonae Spei.

2. *aethiopica*, fol. ensiformib. attenuatis, spica disticha. Thunb. prod. p. 7. Andrew. Bot. Repos. t. 210. Spath. foliola connivent. Cor. flavo-coccinea, lacin. lanceolatis: superiore genial. longiore.

3. *ringens*, fol. ensiformib. plicatis, flor. subsessilib. scapo colorato. Andrew. t. 32. Spath. longior, patula. Cor. lacin. superiore genial. brevior. Scap. purpureo.

4. *plicata* (hirta), fol. ensiformib. plicatis, spicis secundis, spathis ovatis villosis. Thunb. l. c. caule ramoso hirsuto, cor. ringente staminibus brevior. Lin. Suppl. p. 96.

5. *abbreviata*, fol. linearib. 4-gonis, spatha cor. tubum subaequante. Gladiolus *abbreviatus*. Andrew. t. 166. Cor. habitu praecedentium: lacin. breviusculae, ovatae.

100. WATSONIA. Cor. recurvata tubuloso-cylindrica. aut (plerumque) tubuloso-dilatata, infundibuliformis: laciniis omnibus aequalibus strictis. (Spica disticha saepius, foliolis sparsis oblecta, Genitalia exserta.)

1. *tubulosa*, flor. distichis, cor. tubuloso-clavata: laciniis brevibus ovatis, spatha 2-valvi, fol. lanceolatis. Andrew. t. 174. Flor. geniculati rosei, alboque variegati. Cum sequentibus ad Cap. b. Spei.

2. *Jacquini*, flor. secundis, cor. tubulosa: lacin. rectis minutis ovatis, spatha trivalvi, fol. linearibus. Gladiolus *tubulosus*. Jacq. Coll. 4. p. 155. Ic. pl. rar. Flor. rubicundi Alocen referentes.

3. *fulgens*, flor. distichis cernuis: fauce ampla, fol. lanceolatis longissimis. Andrew. t. 172. Flor. coccinei, lacin. subreflexae; anth. caeruleae. Fl. maio.

4. *lucens*, fol. basi filiformib. apice linearibus nervosis, spica oblonga disticha. Anthol. *Lucidor* Lin. fil. Th. prod. p. 17. An hujus generis? Flor. oblongi, parum incurvati, lac. lanceolatis, subinaequales cfr. Willd. Sp. 221.

5. *praecox*, fol. ensiformibus, apice lineari-cruciatis, flor. subsecundis parvis, Gladiolus. Andrew t. 38. Cor. rubra, subcompiculata, petal. non undulatis, sed semina marginata.

6. *revoluta*, cor. infundibulif., fol. linearibus revolutis. Gl. Watsonius. Thunb. Jacq. Coll. 3. p. 257. Ej. Ic. rar. 2. Pet. angusta. Fl. coccinei.

7. *humilis*, cor. infundibulif., fol. lineariformib. pilosis. Watsonia humilis. Mill. ic. t. 297. f. 2. Anth. *Merianella* L. Glad. Thunb. Willd. t. p. 214. Hab. in Cap. b. Sp. summis montib. Cor. hypocrateriformis, tubo purpurascens, lacin. flavis.

8. *Meriana*, cor. subinfundibulif., fol. ensiformibus glabris. Lin. Gladiolus Th. Jacq. ic. rar. 2. t. 230. Coll. 4. p. 150. Plantae liliacées, t. 11. Flor. rubri. Cor. Polyanthis.

9. *marginata*, spica longissima, flor. alternis cernuis, fol. ensiformib. multinerviis marginatis. Thunb. diss. n<sup>o</sup> 20. Willd. 218, sub Gladiol. Antholyza caryophyllea Houtt. Syst. Lin. t. 79. f. 3.

10. *iridifolia*, cor. cernuis, lacin. oblongis campanulatis, fol. ensiformib. spathisque distichis. Jacq. coll. 4. p. 451. Ic. rar. 2. Glad. *cardinalis*. Geuns et Schneev. ic. t. 27. Styl. ramosus.

11. *laccata*, cor. infundibulif. cernuis, lac. ovatis planis, fol. lineari-ensiformib. obliquis. Gladiolus. Jacq. l. c. 171. ic. rar. Cor. laccæ florentinae colore. Jacq.

12. *palustris*, fol. lineari-ensiformib., scapo polystachio altissimo, spicis pendulis. *Ixia pendula*. Thunb. Willd. Sp. 1. p. 204. Lin. Suppl. p. 91. Cresc. in locis ulis prope Kromrivier ad Cap. b. Sp. Canl. teres ramosus, ramis filiformib. duris. Cor. campan. sanguin. pet. lanceolatis. Tb.

13. *recurva*, fol. ensiformibus, flor. pendulis subaequalib. lanceola is recurvis. Gladiol. Lin. mant. 28. Mill. ic. t. 235. f. 2.

14. *Hyacinthoides*, spica multiflora, cor. pedicellatis campanulatis suberectis, fol. falcatis brevibus. A. *spicata*. Andrew. t. 56. Cor. incarnata pallida, crassinervula, lacinis ovatis, spatha rubro-marginata, vaginans: valvula altera linearis parva.

15. *umoena*, fol. ensiformi-linearibus glabris, caule ramoso, spathae valvula inferiore apice bifida. Glad. *roseus* Jacq. Coll. Suppl. p. 22. ic. rar. t. 261. Willd. Spec. 1. p. 217. G. *amoenus*. Ehrh. Caul. flexuos. Spatha scariosa, straminea cum rubore. Flor. spicati, secundi, inodori. Jacq.

β *rosea*. Gladiolus *roseus*, fol. lanceolatis tortis rubro-marginatis pubescentib. flor. roseis odoratissimis. Andrew. t. 11. Fl. maj., jun.

101. GLADIOLUS. Cor. tubulosa varia, erectiuscula; laciniae ovato-lanceolatae, undulatae. Genitalia adscendentia, pistill. pone stamina versus laciniam superiorem. (Spatha 2-3-valvis, valvulae ut plurimum lanceolatae magnae. Stigm. 3. Sem. in multis alata.)

\* Cor. ringens; laciniae inaequales. Tubus incrassatus, subincurvus.

1. *flexuosus*, cor. ringentis tubo spatha duplo longiore, scapo flexuoso. Thunb. Diss. de Glad. n.º. 2. t. 1. f. 1. Ejsad. diss. acad. 2. p. 160 et 163. et prod. p. 29. Crescit uti caeterae fere omnes species ad Cap. bonae spei. Fol. sub florescentia nulla. Cor. albo-incarn. Th.

2. *tristis*, cor. cernuis, tubi simplici,

fol. trinerv. bisulcis linearib. (Thunb. l. c.), fol. lineari-cruciatis, cor. campanulatis, spatha 3-valvi. Jacq. coll. 4. p. 157. ic. rar. Trew. t. 39. Numerosas hujus speciei varietates vid. ap. Thunb. diss. acad. p. 165-166. Flor. pauci odoratiss. Cor. uni-color ochroleuca, incurva, laciniae planae. Jacq. *Antholysis* hinc valde affinis. Cor. lacin. summa latissima, subornata, infima angustissima. Thunb., quo cum Hebeis convenit.

3. *spiralis*, fol. linearibus spiralibus, cor. fauce infundibulit., lacin. punctatis, spatha bivalvi 1-diphylla. Gl. tristis. β Jacq. coll. 5. p. 10. ic. rar. Cor. leucophaea, lacin. 3 superior. parum latiores.

4. *pterophyllus*, fol. linearib. quadrilatis, cor. infundibulif. subringente, spatha bivalvi. Glad. *tristis*, var. Lin. Jacq. coll. 4. p. 158. Scap. gracilis, superne inflexus, uniflor. plerumque, fol. vaginatus. Cor. triste caerulesc., lacin. crispulatae, flavesc. cum adpersis punctis atropurpureis. Jacq.

5. *punctatus*, fol. lanceolato-linearib. planis basi vaginantib., scapo alioracemoso cor. infundibuli ormi compressula. Jacq. coll. 4. p. 160. ic. rar. t. 247. Cor. caerulea, sti. in. lacin. latrescentes. Fol. infimum maculis punctisque variegatum.

6. *gracilis*, fol. linearib. vaginantibus, cor. subringente, lac. obtusis, scapo flexuoso subdifloro geniculato. Willd. sp. 1. p. 211. Jacq. coll. 2. p. 159. ic. rar. t. 276. Bulb. pisi magnitudine. Flor. subcernui 1-2. Spatha 2-valvis, longa lanceolata. Cor. tub. albus, fauce violacea vel caerulea. Jacq.

7. *violaceus*, odoratus, cor. ringente, caule basi colorato punctato, fol. linearib. G. *ringens*. Andrew. G. fol. longissimis, lacin. infer. flavesc. t. 27. β fol. caul. flexuosum ad dimidium adaequant, lacin. 3 infer. striato-punctatis. t. 227. Col. violaceo-purpureo. Odor violae fortissimus. Species inter antecedentem et sequentem intermedia.

8. *brevifolius*, cor. subringente, spathis tubo brevioribus, flor. secundis, fol. lineari-convolutis vaginatis brevissimis. Willd. p. 213. Jacq. ic. rar. 2. t. 249. Collect. 4. 156. Hab. ad Cap. b. spei. Similis sequenti, sed foliis satis distinctus. W.

9. *communis*, cor. subringente, spathis tubo longioribus, flor. secundis, fol. ensiformibus nervosis. Willd. Fol. ensiformibus distantibus. Hort. cliff. 20. Bull. herb. ic. Roth. germ. 1. p. 18. Hab. in Europa australi et in Barbaria.

10. *carneus*, cor. subringente, fol. ensiformibus striatis glabris ad oras cartilagi-

neis, scapo flexuoso erecto, florib. cernuis. Jacq. ic. rar. 2. t. 255. Collect. 2. p. 370. Andrew. t. 240. Burm. prod. cap. 2. Hab. ad Cap. bonae Spei. T.

**\*\* HEBEA.** *Cor. tubo brevi, lacin. divaricatis. supra lanceolata fornicata, laterales obovatae, 3 inferiores angustae, pendulae subunguiculatae.*

11. *formosus*, cor. divaricata ringente, lacinii sublinearib. alternis crispis, foliis lanceolato-ensiformibus crispis ciliatis. G. *striatus*. Jacq. coll. suppl. p. 28. ic. rar. 2. t. 260. Willd. 1. p. 210. Cor. tubus caeruleus, lacin. interior. undulato crispae, lutae basi rubicundae.

12. *alatus*, cor. divaricata ringente, lacin. summa falcata, fol. lineari-ensiformib. scapo ramoso. Jacq. coll. 4. p. 165. ic. t. 259. Willd. p. 216. Fol. linearia, longiss. Flor. odore corticis citri, tub. pallet. limb. cinerascit. Jacq.

13. *gateatus*, fol. ensiformib. obtusis, petalis laeralibus latissimis. L. Jacq. coll. 4. p. 167. ic. rar. t. 258. Cor. violae co-pallens.  $\beta$  Andr. t. 122. lacin. summa rotundata. Cor. ruf. ro-punica, lacin. infer. sursum virescent.

14. *tabularis*, fol. lanceolatis nervosis, scapo aphylo, cor. tubo spatha aequali. G. *montanus*. Thunb. Diss. n. 1. t. 1. f. 4. Willd. Sp. 1. p. 208. Hab. in monte Tabulari ad Cap. B. Sp. Fol. radical. linearia, longitudine fere scapi.

15. *orchidiflorus*, spica multiflora, flor. secundis, fol. lineari-lanceolat. Andr. t. 241. Hab. ? Cor. fusco-fulginea; lac. inferior. luteo-maculata. Stigm. 6. Flor. mari.

16. *bicolor*, cor. ringente, spathis lacero-aristatis. Thunb. Jacq. coll. Suppl. 25. ic. rar. t. 240. Cor. flavesc. lacin. apice caeruleis.

**\*\*\* LYMONIA.** *Cor. campanulata, tubo subbrevis parum incurvo, lacinii profundis subaequalibus ovatis.* (Pourret in act. Tolos. vol. 3. p. 13.)

17. *tenellus*, cor. subringente infundibuliformi, fol. linearibus convolutis. Jacq. ic. rar. 2. t. 248. Coll. 3. p. 255. *Var.  $\beta$  flava*. Coll. 4. p. 169. t. 3. f. 1. Cor. ochroleuca, cum linea sordide violacea, laciniae a fauce punctatae. Cor. in  $\beta$  flava cum striis fusciscentibus, fol. lanceolato-linearia.

18. *strictus*, foliis linearibus lanceolatis, tubo spatha aequali. Ait. Kew. 1. p. 61. Willd. Sp. 220. Jacq. ic. rar. 2. t. 218. *Var. cor. saturate caerulea aut pallide purpurasc.*

19. *plicatus*, cor. ringente-subcampanulata, flor. subsecundis, spatha trivalvi, fol. ensiformibus plicatis hirsutis. Jacq. coll. 4. p. 155. Ic. rar. 2. t. 217. Thunb. Diss. n. 24. Willd. Sp. 1. p. 220. Cor. subviolacea, lacin. superior curvata; inferiores reliqua paulo breviores, macula oblonga albida. Germ. hirsutum. Ixiama aut Antholyza refert. Th.

*\* nervosus*, fol. ensiformibus plicato-nervosis villosis, racemulis plurib. alternis, tubo spathis brevior. Lam. enc. 2. p. 724. Flor. majores. Spath. pubescens.

20. *hyalinus*, cor. ringente; lacin. planis, scapo stricto paucifloro. Willd. Sp. 1. p. 211. G. *strictus* Jacq. coll. 4. p. 175. ic. rar. 2. t. 242. Cor. tub. caeruleo, limb. subpellucidus; lacin. vmm. latior albida cum reliquis flavescens. striis punctisque purpurasc. J. cq.

21. *punicus*, fol. linearibus, flor. horizontalib. secundis immaculatis, petal. inferioribus paulo longiorib. Lam. enc. 2. p. 727. Pluck. t. 187. f. 4. Breyn. prod. t. 12 f. 1.

22. *crocatus*, fol. ensiformib., flor. alternis, cor. campanulata, lacin. ovatis, basi hyalinis. Wendl. obs. bot. p. 5. t. 4. Ixia *crocata* Lin. Willd. p. 205.

*Obs.* Ob stigma pone stamina incurva huc relat. est haec species cui quoque forte associandae essent Ixia *deusta* et *squalida*. Ait.

23. *sulphureus*, cor. infundibuliformi campanulata, lacin. lanceol. obtusiolis, fol. ensiformib. margine villosis. Jacq. coll. 3. p. 258. ic. rar. Cor. tub. incurvus violaceus, lacin. sulphur. Stigm. dilatata.

24. *mucronatus*, cor. subringente campanulata, lacin. mucronatis, fol. ensiformib. villosis, spatha trivalvi villosa. Jacq. coll. 4. p. 162. Ic. rar. 2. t. 253. Cor. flavesc. lacin. cuneiformes; 3 superiores purpureo-violaceae. Stigm. incrassata.

25. *nanus*, fol. lanceolatis plicatis pilosis scapum multiflorum aequantib., spatha crassa i-valvi. Andrew. t. 137. Spath. basi ventricosa, apice scariosa. Cor. caerulea, in medio macula lineari rubra. Pet. repanda, submarginata. Stigm. incrassata.

26. *grandiflorus*, fol. ensiformib., scapo subtrifloro, petalis aequalibus emarginatis. Andrew. t. 118. Cor. sordide purpurascens; anth. coerul. Stigm. 6. An Watsonia?

27. *campanulatus*, fol. lanceol. glabris scapo subtrifloro fol. longiore, cor. subcampanulata. Andrew. t. 187. Flor. maj. Flor. purpurascens, valde aperti.

28. *versicolor*, fol. lineari-cruciatim, flor. magnis versicolorib., spatha tubo longiore. Andrew. t. 10. Color floris durante anthesi valde variabilis. Andr.

29. *albidus*, cor. subringente, lacin. acutis : 3 inferioribus, apice conniventib., fol. ensiformib. glabris subobliquis. Jacq. ic. t. 256. Coll. suppl. p. 21. Fol. plura, disticha. Stigm. apice latescentia, bilamellata. *β. blandus*, fol. lineari-lanceol. Ait. Kew. t. 1. p. Andrew. t. 29. Cor. alba : macula bina sanguinea.

30. *falcatus*, cor. limbo patente, fol. lanceolato-falcatis. Thunb. diss. n. 4. t. 1. f. 3. Lin. suppl. 66. Cor. caerule. Ixia excisae affinis. Thunb.

31. *biflorus*, cor. erectae limbo campanulato, scapo bifloro, fol. linearibus. Thunb. diss. n. 5. Hab. ad Iretum Magellanicum. Scapus totus vaginis foliorum tectus. Flor. termin. bini, coloris iris. Th.

32. *dichotomus*, cor. erectae limbo campanulato, scapo bisdichotomo quadrifloro, fol. linearibus. Thunb. diss. n. 6. Habitat? Spathaceum fol. lineare acutum subdichotomis. Flores secundi erecti. Thunb. l. c. An hujus gen.?

\*\*\*\* Cor. tubo elongato substricto, infundibuliformi dilatato, spathis multo longiore : laciniae (inferiores) plerumque medio macula (rubra) varia distinctae, lanceolatae, patulae.

33. *cuspidatus*, fol. subcernuis, cor. subringente : lacinis lanceolat. attenuatis, fol. lineari-ensiformibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 257. Coll. suppl. p. 17. Andrew. t. 147. Spath. vaginans, longa. Cor. rubicunda : macula subcordiformi.

34. *affinis*, fol. ensiformib., cor. infundibuliformi recta, lacin. undulato-crispis, spath. valvulis aequalib. *β. cuspidatus*. *β.* Andr. t. 219. Cor. flavesce.

35. *crispus*, cor. tubo subgracili longissimo : lacin. subaequalibus, superioribus obovatis, fol. crispis. Thunb. Jacq. coll. suppl. 27. *β.* Andrew. t. 142. Fl. Jul.

36. *paniculatus*, scapo ramosissimo : ramis bifloris tubo stricto cylindrico, fol. ensiformibus undulatis. *β. polystachyus*, Andrew. t. 66. Cor. lacin. patulae subaequales : unica macula arcuata rubra.

37. *angustus*, flor. secundis, cor. lacin. ovatis planis, fol. linearibus. L. Willd. l. c. p. 218. Mill. ic. 142. f. 2. Thunb. diss. n. 21. Cor. lacin. inferiores macula subrhomboidca.

38. *trimaculatus*, fol. lineari-lanceolatis, tubo curvo limbo vix longiore, petalis 3 macula cordiformi inscriptis. Lamark encycl. 2. p. 727. Gladiolus flor. patentib. externe carnis, interne candidis, stella maculisque purpureis insignitis, suprema lacinia maxima. Brey. prodr. p. 21. t. 7. f. 2. Anteced. affinis.

39. *bimaculatus*, fol. lineari-angustissimis, petal. superiorib. breviorib. patentib. reflexis, 3 inferiorib. sublinearibus. Lam. l. c. Mill. diet. t. 236. f. 1. Cor. albidorubra, patens.

40. *ventricosus*, fol. ensiformib. nervosis glabris tuberculosis : cor. limbo ventricoso, stigm. lacinis dilatato-membranaceis spathulatis. Lam. l. c. Cor. tubo infundibulif. spath. subaequilis, lacin. valde inaequales.

41. *resupinatus*, cor. subringente campanulato resupinato, fol. lineari-ensiformib. glabris, scapo ramoso. Jacq. ic. rar. 2. t. 241. Coll. suppl. p. 26. Cor. lacin. macul. longitudinali atro-purpurea, lateral. interdum fascia marginali, fulva. Stigm. incrassata. J.

42. *tubiflorus*, polystachyus, corollae limbo subcampanulato, tubo filiformi longissimo, spathis villosis, fol. lineari-ensiformibus hirsutis. Willd. p. 219. Thunb. diss. n. 23. t. 2. f. 2. Lin. suppl. 66. Hab. ad Cap. b. Spei.

43. *tubatus*, polystachyus, cor. limbo sublabiato, tubo longissimo, spathis, foliisque oblongis plicatis hirsutis. W. Cor. tubo gracili longissimo, lacinis alternis mucronatis, fol. latis ensiformib. plicatis hirsutis, spatha bivalvi. Jacq. ic. rar. 2. 264. Collect. suppl. 18. *β. longiflorus*. Andrew. t. 5. Cor. purpurea : lacin. 3 in medio macula rubra, cordiformi. Ad Cap. bonae Spei. T.

44. *floribundus*, polystachyus, corollae limbo patenti subreflexo, spathis tubo longioribus, fol. lanceolatis ensiformibus nervosis glabris. Willd. Flor. erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 253. Collect. 4. p. 162. *β. striatus* Andrew. t. 111.

45. *securiger*, fol. lineari-ensiformibus planis, cor. labio superiore trilaminato : laminis unguiformibus perpendicularibus, bract. obtusis. Ait. Kew. t. p. 63. Ixia gladiolatis. Lam. enc. 3. p. 34. An potius Ixia? Cor. pallide fulva. Lacin. oblongo-ovatae, passim submarginatae. Ait.

*β. flavus*, fol. lanceolato-ensiformibus planis, cor. labio superiore trilaminato : laminis unguiformibus perpendicularibus, bracteis acuminatis. Ait. p. 65. Willd. t. p. 218. Antecedenti affinis.

46. *spathaceus*, fol. ensiformib. plicatis hirsutis, spathis membranaceis aristatis glabris. Thunb. diss. n°. 25. Lin. suppl. p. 56. Flor. albif. tubo cor. spathis multo longiore. Gl. pl. a. o. et tubifloro similis. Th.

47. *longiflorus*, cor. tubo gracili substricto, lacin. obtusis, fol. ensiformi-linearibus, scapo ramoso. Thunb. diss. n°. 22. Jacq. coll. suppl. 23. ic. rar. 2. t. 262. et β. t. 263. Ixia Ait. Willd. 1. p. 201. Cor. albidoincarnata, striis purpurasc. in fauce fascia flava, lacin. sublineares, quasi truncatae.

\*\*\* Cor. tubo gracili subfiliformi, lacin. patulis subregularibus. (Flor. parvuli, Ixias referentes. PEXOUSIA. Pourret in Act. Tolos. 3. p. 15.)

48. *anceps*, cor. tubo filiformi, scapo ancipiti flexuoso, fol. ensiformibus, margine crispis glabris. Willd. p. 216 Jacq. ic. rar. 1. 269. Thunb. diss. n°. 17. t. 2. f. 3. \* Lam. enc. 2. p. 728.

49. *fissifolius*, cor. tubo filiformi, scapo ancipiti, fol. ovatis amplexicanalib., margine undulatis, subtus hirtis. Willd. Gl. tubo filiformi longissimo, florib. sessilib. axillaribus, fol. hirtulis, in superiore margine fissis, superiorib. quidem ad oppositum marginem usque, inferiorib. autem ad apicem indivisis. Jacq. ic. rar. 2. t. 208. Collect. 4. p. 164.

50. *silenoides*, cor. tubo filiformi, scapo compressiusculo, fol. linearis-ensiformibus planis striatis glabris. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 270. Collect. 4. 168. Pet. rubra, 3 infer. basi macul. flava.

51. *juncus*, polystachyus, flor. secundis, fol. lanceolatis. Thunb. diss. n°. 18. Gl. fol. lato-lanceolatis, culmo ramoso, floribus secundis, stylo sexpartito. Lin. suppl. 44. Flor. caerulea.

(β ? *marmoratus*, fol. ensiformib. nervosis glabris maculosis, flor. distichis, stylo sexpartito. Lam. enc. 2. p. 727. Fl. violacei.

\*\*\*\* *Spica disticha, spathis imbricatis, flores parvi sessiles. Stigmata* ? (Micranthus.)

52. *alopecuroideus*, cor. erectis, spica simplici imbricata, disticha, fol. linearibus. Ixia alopecuroides, L. suppl. p. 62. Glad. spicatus. Thunb. lx. spicata. Willd. sp. 1. p. 200. Spica ovata. Hab. in Cap. bon. Sp. summis montibus.

53. *plantagineus*, spica imbricata disticha subramosa, fol. ensiformib. nervosis. Willd. 1. c. Glad. alopecuroides. L. Phalangium spicatum. Houytuyt syst. Lin. t. 80. f. d. Ixia plantaginea. Ait. 1. p. 59. Hab. in

C. b. Sp. collibus, viis. Var. scapo simplici et ramoso, flor. albis et caeruleis. Thunb.

54. *rossicus*, flor. imbricatis secundis, fol. ensiformib. Gl. imbricatus. Lin. Willd. 212. β ? *parviflorus*. Jacq. obs. bot. 4. p. 2. t. 78. Georgi iter 1. p. 196. Habitat in Russia.

\*\*\*\*\* AGLAEA. Cor. subcampanulato-bilabiata sessilis, s. tubo vix ullo. Caps. triloba, retusa. Sem. subrotunda, mucronata. Spatha duplex, 2-valvis sub corolla, 2-3-valvis ad basim pedunculi.

55. *gramineus*, cor. tubo brevissimo, lacinis lanceolatis, subaequalib. aristatis, scapo paniculato. Jacq. ic. rar. t. 236. Coll. 2. p. 203. Willd. 1. p. 221. Andrew. t. 62. Phalangium. Burm. prodr. u°. 3. Asphodelus Mill. Flor. pedunculati, gemini.

Obs. Eadem ratione ac Moraeae, quo accedit forma capsulae, a Gladiolis separari posset.

102. IXIA. *Spatha* 2-3-valvis ovata, brevis. Cor. tubulosa: tubo subgracili cum genitafibus recto, laciniae hypocrateriformes, subellipticae, planae. Stigm. subfiliformia. (Filam. stylum includentia, in nonnullis connata.)

\* ROMULEA. Cor. campanulata sessilis, fol. linearia.

1. *minuta*, scapis unifloris longitudine foliorum, fol. linearis-setaceis. Willd. sp. 1. p. 196. Thunb. diss. n°. 2. t. 1. f. 1. Ad Cap. b. Spei (uti fere omnes species), locis arenosis, inundatis. Cor. albida, striis purpur.

2. *rosea*, scapo unifloro breviss. aphylo. Syst. veg. 75. Mill. ic. 160. t. 240. Ait. Kew. 1. p. 56.

3. *chloroleuca*, scapo unifloro, fol. linearibus margine revolutis longissimis. Willd. 1. c. Jacq. ic. rar. 2. 272. Collect. 4. p. 180. T.

4. *Bulbocodium (europaea)*, scapo 1-floro, fol. linearib. canaliculatis, cor. subcampanulata sessili. L. Jacq. ic. rar. 2. t. 271. Coll. 3. p. 265. Willd. sp. 1. p. 196. *Crocus* spatha diphylla flori approximata. Lin. sp. pl. ed. 1. p. 36. Romulea Mill. ic. t. 240. Bulbocodium crocifolium. Tournef. cor. p. 50. Hab. in Europa australi, Gallia, Italia, et in Barbaria. Stigm. 6. Var. quoad magnitudinem, cor. caeruleam aut dilute purpuream, in fundo tantum aut ad medium usque croceam. Conf. Schousboe Ma-

roc. t. p. 25. Ob cor. profunde partitam sessilem forte melius una cum *Ixia* n. 2, 3 et 5 ad *Moraeas* amandanda, aut omnes *Moraeae* cum *Ixiis* conjungendae essent, quod omnino ulterius requirit examen.

β. *capensis*, flor. subnutante. scapo folioso. Andrew. t. 170. An species diversa ab *Europaea*?

5. *cruciata*, scapo unifloro, fol. linearib. basi attenuatis quadratarinatis. Willd. l. c. p. 197. Jacq. ic. 2. t. 200. Collect. suppl. p. 16. Hab. in Cap. b. Spei.

6. *fragrans*, scapo simplici subbifloro, fol. linearibus. Willd. Jacq. ic. 2. t. 274. Collect. suppl. p. 9. Cor. immaculata, lutea. Caps. subrotundo-ovata.

7. *humilis*, scapo ramoso, floribus secundis, fol. falcatis erectis. Thunb. diss. n. 4. In Cap. b. Spei.

\*\* *Scapo hirsuto, foliis longiore.*

8. *pilosa*, fol. linearibus pilosis, florib. alternis. Lin. suppl. 92.

9. *hirta*, fol. ensiformibus hirtis, florib. secundis. Thunb. diss. n. 6. *Ixia* secunda. Jacq. ic. rar. 2. t. 277. Collect. 4. p. 180. In arenosis humidis Cap. b. Spei.

10. *secunda*, fol. elliptico-ensiformibus, scapo villosa-scabro. Thunb. diss. n. 7. Caule ramoso erecto, floribus secundis, stigmatibus latis membranaceis. De la Roche diss. 17. Houttuyn. t. 1. f. 1. *scillaris*. L. Sp. pl. t. 527. Flor. sessilis, parvi, caerulei: tubo brevi, spathae foliola longa. Lam. enc. 3. p. 336.

\*\* *Scapo glabro foliis longiore, foliis crispis.*

11. *crispa*, fol. linearibus crispis, flor. spicatis alternis. Thunb. diss. n. 8. t. 2. f. 3. Lin. suppl. 91. Ad Cap. bonae Spei. Spatha hyalina. Tub. filiformis. Limb. lacin. obovatis oblongis.

12. *cinnamomea*, fol. lanceolat. crispis, flor. alternis. Thunb. diss. n. 2. t. 2. f. 1. Linn. suppl. 92. In collib. Leuwestaart Cap. b. Spei. Flos cinnamomi odore, praesertim vesper. Th.

13. *corymbosa*, fol. lanceolatis crispis, scapo ancipiti. Thunb. diss. n. 10. Jacq. ic. rar. 2. t. 284. Collect. 4. p. 179. Pluk. alm. 87. t. 275. f. 1. In sabulosis et ipsis viis Swartlandiae ad Cap. b. Spei. Flor. caerulei. parvi. Planta palmaris.

14. *fastigiata*, fol. ensiformib. linguatis nervosis crispis, caule flexuoso ancipiti, flor. glomerato-fastigiatis. Lam. enc. 3.

p. 33. Ad C. b. Spei. Bulb. reticulatus. Cor. ex flavo purpurascens. L.

15. *heterophylla*, fol. radicalib. lineariformibus striatis planis, floralib. linearibus obtusis undulatis floribus aggregatis longioribus. Willd. l. c. p. 199. *Galaxia plicata* foliis plicatis Jacq. ic. rar. t. 297. Collect. suppl. 10. Habitat in Cap. b. Spei. Ab omnibus foliis et inflorescentia distincta. Spatha univalvis. Cor. lactea: tub. longus, lacinii basi puncto nigro. Stamina libera Willd.

\*\*\* *Scapo glabro foliis longiore, foliis planis.*

16. *anemonaeiflora*, scapo unifloro, fol. lineariformibus, superne obliquis, longitudine scapi erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 283. Collect. suppl. 10. Ad Cap. b. Spei. Cor. limbus magnus planus. Fol. glauca. W.

17. *coelestina*, scapo unifloro, foliis lineariformibus, scapo multo brevioribus. W. Sp. pl. 200. Bartram. itin. Habitat in Carolina.

18. *linearis*, fol. linearib. angustissimis convexis, scapo simplici erecto. W. Thunb. diss. n. 11. In Cap. b. Spei.

19. *pusilla*, fol. sublinearibus costatis crassis, scapo bifloro. Andrew. t. 245. Floret April. Stigmata crassiuscula. Fl. caerulei.

20. *filiformis*, fol. ensiformibus acuminate, scapo filiformi, spica nutante, tubo petalis brevior. Ventnat. descr. pl. p. 48. t. 48. Hab. ad C. b. Spei. Floret Majo. Tub. subincurvus.

21. *speciosa*, fol. linearibus costatis gramineis, scapo filiformi bifloro, cor. subcampanulatis. Andrew. t. 186. Fl. coccinei, tub. brevis, spath. 3-valvis.

22. *incarnata*, scapo simplici erecto, fol. ensiformibus ad oras revolutis, florib. secundis spicatis. Jacq. ic. 2. t. 281. Collect. suppl. 13.

23. *patens*, fol. ensiformibus glabris, racemo terminali, cor. campanulatis patulis, lacinii alternis angustioribus. Ait. Kewens. t. p. 59.

24. *capillaris*, fol. linearibus, scapo polystachyo, spathis scariosis. Thunb. diss. n. 12. t. 2. f. 2. Lin. suppl. 12. Hab. in arenosis humidis Cap. bonae Spei.

25. *flexuosa*, foliis linearibus, racemo flexuoso multifloro. Ait. Kew. t. p. 58. Mill. ic. 156. f. 2.

26. *angusta*, fol. linearibus acutis,

<sup>a</sup>scapo flexuoso simplici, limbo subreflexo. Willd. sp. p. 202. Bulbo conico. Jacq. ic. rar. 2. t. 279. Collect. 4. p. 183.

27. *radiata*, fol. linearibus obtusis, scapo flexuoso geniculato simplici. Limbo corollae patentis. Willd. p. 202. Bulbi conici basi plana excurrente in orliculum dentato-radiatum. Jacq. ic. rar. 2. t. 280. Collect. suppl. 15.  $\beta$  l<sup>ix</sup>a *fistulosa*. Andrew t. 57. Stigm. longissima incurva. Flor. pedicell.

28. *scillaris*, fol. linearibus, floribus secundis, rachide flexuosa. Houttuyn t. 77. f. 2. afr. Lam. enc. p. 338.

29. *leucantha*, scapo polystachio erecto, foliis lineari-ensiformibus obliquis erectis striatulis, flor. secundis nutantibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 278. Collect. suppl. 11. In Cap. bonae Spei.

30. *polystachya*, fol. linearibus, scapo spicis pluribus. Sp. pl. 51.  $\beta$ . *incarnata*, flor. incarnatis; antheris conniventibus. Andrew t. 128. j. Cor. majore striata rubra, spath. valvula bifida? Jacq. coll. suppl. t. 2. Petala alba. Inter stylum tripartitum stamina eriguntur, quasi styli exteriores essent.

31. *maculata*, fol. ensiformibus, scapo polystachyo, flor. alternis, cor. versicolorib. basi maculatis. Thunb. diss. n<sup>o</sup>. 19. Willd. p. 215. Fol. Gladioli glabris, flor. corymbosis terminalibus. Mill. ic. 156. f. 1. *maculata*, fol. ensiformibus, glabris, scapo duplo brevioribus, flor. alternis subspicatis, petalis basi obscuris ovatis concavis, stigm. bifida. Andrew. t. 156. Spath. 3-valvis. Quoad colorem floris valde variat.

32. *capitata*, fol. lineari-ensiformibus, flor. majusculis subcapitatis, spatha polyphylla. Andrew t. 129, qui adhuc plures, forte distinctas, delineavit varietates; vid. tab. 23, 50, 129 et 232 ejus opris.

33. *viridiflora*, fol. linearibus striatis, spica simplici longissima. Lam. ill. 1. p. 112. I. *spicata*. Andrew. t. 29. Ad Cap. b. Spei. Spica pedalis. Flor. virescent, limbo nigrescent.

34. *lancea*, fol. ensiformibus, flor. secundis, scapo simplici flexuoso. Thunb. diss. n<sup>o</sup>. 21. Jacq. ic. 2. t. 281. Collect. suppl. 13.

35. *pentandra*, fol. ensiformibus, flor. pentandris. Thunb. prod. 10. Staminibus curvis. Lin. suppl. 92. Hab. prope Groene Kloof in collibus. †

36. *aulica*, flor. racemosis, bracteis integris, fol. ensiformibus planis nervosis lacubus. Aiton. Kew. 1. p. 57.

37. *falcata*, scapo subpolystach. flexuoso, fol. ensiformibus striatis scapo brevioribus, rachis erecta. Jacq. ic. 2. t. 276. Collect. 4. p. 183. Lin. suppl. p. 92. In collibus Cap. b. Spei.

38. *excisa*, fol. ovatis, flor. secundis, scapo flexuoso. Thunb. diss. n<sup>o</sup>. 24. t. 1. f. 4. Lin. suppl. 92. Ad Cap. b. Spei. Cor. limbus violaceus. Var. glumis lanceolatis, floribus uno s. duobus. Th.

### \*\*\* Eurydice, filamentis connatis.

39. *columnaris*, flor. subcapitatis, filam. ultra medium tantum connatis. Andrew. t. 203. Cum sequenti. ad Cap. b. Spei.

40. *angustifolia*, fol. linearibus, flor. unicolorib. rubris, spatha trifida? Andrew fig. cit. et *versicolor*, petalis luteis basi nigrescentibus, spatha pluries incisa. Andr. t. 211.

$\beta$ . *latifolia*, fol. lato-lanceolatis falcatis. Andr. t. 213. Flor. caeruleascentes.

40. *grandiflora*, fol. linearibus longissimis, filam. totis connatis. Andrew. t. 250. Flor. violacci.

\*\*\*\* BELFUCANDIA. Cor. tubo subbrevis, apice dilatato, limbo inciso subcampanulato. Laciniae ovatae. Stam. in nonnullis subincurva, in tubi medio.

41. *chinensis*, cor. subhexapetala, caule flexuoso. Morea *chinensis*. Thunb. Willd. Sp. 1. p. 245. Rheed. hort. 11. t. 37. Sponte in Indiae arenosis crescit.

42. *deusta*, fol. lanceolatis nervosis, flor. alternis sessilibus, petalis obtusis; exterioribus basi nigro-maculatis. Ait. p. 60. Andrew. f. 134. Cor. crocea. Fl. majore.

43. *squalida*, fol. lineari-lanceolatis, flor. alternis sessilibus, tubo bracteis longiore, pet. ovato-oblongis. Ait. 61. Cor. pallide lutea; venis obscuriorib.

44. *caerulescens*, fol. oblongo-lanceolatis, villosis, spathis tubo aequalibus, cor. campanulata. Jacq. ic. rar. 2. t. 204. Willd. p. 198. (I. *villosa*.) Coll. 3. p. 267.

45. *cyanea*, fol. oblongo-lanceolatis villosis, spathis tubo brevioribus, limbo patentissimo. Jacq. ic. rar. 2. t. 285. Coll. 3. p. 268. I. rubro-cyanea. Willd. sp. 1. p. 198.

46. *punicea*, fol. oblongis villosis, scapo ramoso, flor. secundis; petalis mucronatis. Willd. Jacq. ic. t. 287. Coll. suppl. p. 12.

47. *purpurea*, fol. ensiformibus subvillosis, vagi is glabris, scapo ramoso, limbo patentissimo. Jacq. t. 286. Coll. 3. p. 268.

Obs.



*Obs.* In 4 hisce speciebus spatha 3-valvis est et folia plicata disticha.

48. *aristata*, fol. ensiformibus falcatis glabris, scapo subulifero, spathis laceris. Thunb. diss. n.º 15. Andrew. t. 87. *β. uniflora*. Lin. mant. p. 27. Jacq. ic. t. 283. Cor. purpurea, magna.

49. *fimbriata*, fol. ensiformibus, caule angulato flexuoso, spathis fimbriato-laceris. Lam. enc. 3. p. 339. Mill. ic. t. 237. f. 1. et 2. Bel. *semi-flexuosa*. Mönch. meth. pl. suppl. p. 214. Cor. flava.

50. *bulbifera*, fol. lineari-lanceolatis subfalcatis, spathis membranaceis setaceo-laceris. Thunb. Andr. t. 487 Mill. t. 236. f. 2. Axillis bulbiferis, stam. lateralibus. Lin. am. acad. 4. p. 300. Cor. sulphurea. Spatha in Andrewii fig. tota integra picta.

103. MORAEA. Cor. hexapetala patentissima tubo subnullo. *Stigm.* 3-6, filiformia. *Caps.* oblonga. (*Flor.* marcescendo in spiram saepius convoluti. *Filam.* in nonnullis connata et petala alterna minora.)

1. *lugens*, s. apo ancipiti, petal. discoloribus alternis majorib. Linn. suppl. p. 99. *M. melaleuca*. Thunb. diss. n.º 1. t. 1. f. 3. Ejusd. diss. acad. 2. p. 277. Willd. sp. 1. p. 240. Hab. (cum caeteris speciebus) ad Cap. b. spei, inter frutices. Pet. exteriora majora alba, interiora nigra.

2. *polyanthos*, scapo tereti, fol. flexuoso-erectis, petal. alternis minoribus. Thunb. n.º 14. Lin. suppl. p. 99. *Stigm.* 6. Cor. caerulea, subregularis. Flor. in ultimis ramulis capillaribus. Th.

3. *collina*, scapo tereti, fol. dependente, lacin. cor. subaequalib. Thunb. n.º 13. Jacq. ic. rar. 2. t. 226. *Sisyrinchium*: Cav. diss. bot. 6. p. 346. In collib. Cap. b. spei frequens. Cor. rubicunda.

4. *virgata*, fol. linearib. longissimis, scapo ramosissimo virgato, flor. solitariis. Jacq. coll. 3. p. 104. Ic. rar. 2. t. 228. *Ixia* Willd. 1. p. 202 *Stigm.* lacin. 6, involutae. Germen lineare.

5. *longifolia*, scapo tereti articulo flexuoso, fol. revolutis laxis. Thunb. diss. n.º 12. Lin. suppl. (*M. flexuosa*). *Ixia* longifolia. Jacq. hort. 3. p. 47. t. 60. Cor. lutea, tubo satis longo. *Stigm.* 6.

6. *elegans*, scapo tereti, fol. unico lineari-ensiformi procumbente, petal. eglandulosis. Jacq. hort. Schoenbr. 1. p. 6. t. 12.

*Sisyrinchium*. Willd. sp. 3. p. 577. Flor. unicus, terminalis. magnus, flavus; in medio petal. exteriorum macula magna viridis.

7. *grandiflora*, scapo tereti simplici, petal. obovatis, fol. lanceolatis plicatis. Willd. sp. 3. p. 578. Cavan. diss. 6. p. 346. t. 192. f. 2. sub *Sisyrinchio*. Spatha 3-flora. Cor. lutea. Petala obtusissima. W.

8. *umbellata*, scapo tereti striato, spic. umbellato-paniculatis, involucr. diphrellis longissimis. Thunb. diss. n.º 16. Flor. caerulei, in apicib. solitarii.

9. *crispa*, scapo tereti articulo, fol. convoluta crispo reflexo. Thunb. l. c. Flor. pauci, pedunculati, caerulei.

10. *pusilla*, scapo ancipiti, fol. distichis, flore subsolitario. Thunb. diss. n.º 1. Thunb. prod. 11. Fol. radicalia lineari-lanceolata subfalcata. Cor. caerulea, lacin. alternae angustiores.

11. *gladiata*, scapo folisque compressis, spica laterali solitaria, involucri duplo brevior. Thunb. diss. n.º 8. Thunb. prod. 11. *Ixia* gladiata, stylis tribus. Lin. suppl. 93. Cor. flava, patens. Bractea ensiformis, corolla lutea extus rubra.

12. *aphylla*, scapo nudo folisque compressis, spica laterali solitaria, involucri multoties brevior. Thunb. diss. n.º 9, t. 2. f. 1. Lin. suppl. 99. Cor. flava. Flores, ut in Junco, laterales.

13. *filiformis*, scapo folisque compressis subfiliformibus, flore solitario terminali. Thunb. diss. n.º 10. tab. 1. f. 2. Lin. suppl. 100. In Cap. b. spei. Flores cum spathis referunt fl. Dianthi. Cor. lutea. Th.

104. SISYRINCHIUM. Cor. hexapetala. Stam. ut plurimum connata. Germen subrotundo-triquetrum, pedicellatum, extra spatham. (Petala in nonnullis aristata.)

1. *capitatum*, scapo ancipite, fol. ensiformibus plicatis, flor. capitatis, flamm. liberis. Moraea palmifolia. Thunb. n.º 16. *M. plicata*. Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 82. Willd. sp. pl. L. 1. p. 241. Plum. amer. p. 35. t. 45. f. 2. *Ixia* americana. Aubl. Guian. p. 33. Hab. in Jamaicae paucis montosis. Pet. alba, basi germini contigua. Sw.

2. *racemosum*, scapo teretiusculo nudo, flor. racemosis secundis, fol. ensiformib. plicatis. Jacq. coll. 3. p. 102. Ic. pl. rar. 2. t. 227. (*Moraea palmifolia*) *Sisyrinch.* palmifolium. Willd. sp. 3. p. 579. Cav.

diss. 6. p. 348. t. 191. f. 1. Linn. Mant. 122. Ency. syn. Hab. in Brasilia. Flor. parvi albi.

3. *spathaceum*, scapo foliisque teretibus filiformibus, spicis lateralibus aggregatis. Thunb. diss. n<sup>o</sup>. 11. Ej. diss. acad. 2. p. 286. In coll. C. b. spei frequens. Pet. lutea, vix basi connata, filam. libera. Hujus loci *Borbatia indica*. L. cfr. Willd. sp. pl. 1. p. 242.

4. *striatum*, scapo ancipiti ramoso alato, fol. ensiformibus sulcatis scapo brevioribus, flor. terminalibus subumbellatis. *S. striatum* Smith, spicatum Cavan? et reticulatum Quor. Hab. in Mexico. Flor. subventricosi, flavescentes, subtus fusco-lineati. Caul. 2-pedalis. Bract. 1-phylla.

5. *mucronatum*, fol. scapisque simplicibus subsetaceis, spatha colorata: valva altera in mucronem longum desinente. Mich. Flor. 2. p. 33. Hab. in Pennsylvania. Fol. ima parte glumisque amethysteis.

6. *Bermudianum*, fol. ensiformibus, caule ancipiti ramoso, spathis muticis, flore brevioribus. Lam. enc. 1. p. 403. Cav. diss. 6. p. 346. t. 192. f. 1. Dill. Elth. t. 41. f. 48. Hab. in Bermuda.

7. *anceps*, scapo simplici alato, spathis inaequalibus, flores superantib. Lam. enc. 1. p. 403. Cav. diss. 6. p. 345. t. 190. f. 2. Willd. sp. 3. p. 570. *S. gramineum*. Curtis bot. mag. t. 464. In Virginia et Canada. Petala caerulea, apice in medio, uti prioris, cristata.

8. *micranthemum*, radice fibrosa, caule ancipiti, fol. canaliculatis, petalis linearibus. Cav. diss. 6. p. 345. t. 191. f. 2. In regno peruviano.

9? *ixioides*, fol. ensiformib. distichis, panicula trichotoma, petalis exterioribus brevioribus. Forst. prodr. Morae. Thunb. n<sup>o</sup>. 7. Ferraria. Willd. 3. p. 582. In Nova Zeelandia. Pedunc. capillares, spathis longiores.

105. *TIGRIDIA*, Spatha bivalvis. *Cor.* campanulata, 6-petala: petala 3 interiora minora hastata (marginē nectarifera). *Filam.* connata. *Stigm.* 3, bifida, *Caps.* oblonga, angulata.

1. *Pavonia*. Moraea Th. Ferraria L. Andrew. t. 178. Tigridia Juss. gen. Redouté Iliac. Hab. in Mexico. Cor. rubra fundo et petala, praesertim minora, guttato-variegata. Intra 6 horarum spatium corolla speciosa evanescent. Fl. aetate.

106. *FERRARIA*. *Spatha* 1-phylla. *Cor.* 6-petala: petal. inaequalibus undulato-crispis. *Filam.* connata. *Stigm.* lacinae penicillatae.

1. *minor*, caule simplici, flor. inodoris. Moraea Ferrariola Jacq. coll. 4. p. 141. Ferraria Ferraria. Willd. sp. 3. p. 581. Hab. ad Cap. b. spei. Pet. unguis virescent, intus striis atropurpureis. Pet. angustiora immaculata; latiora flavovirent, striis punctisque violaceis. Jacq.

2. *punctata* (undulata L.), caule ramoso, fol. punctatis. Moraea undulata. Thunb. n<sup>o</sup>. 21. Diss. acad. p. 298. Ferraria de Cult. flor. p. 168. t. 171. Iris stellata Barr. ic. Prope Leuvenstuart C. b. spei. Col. subtus flavo-nigrescit, fasciis purpureis supra purpureo-fuscis, margine subolivaceo. Oler *Stapeliae* cadaverosus muscus alliciens. Th.

107. *IRIS*. *Cor.* 6-petala: laciniis alternis reflexis. *Stylus* o. *Stigm.* petaliformia. Stamina incurbentia.

\* *Barbatae*, foliis ensiformibus.

1. *ciliata*, barbata, fol. ensiformibus ciliatis. Thunb. diss. de Iride, n<sup>o</sup>. 1; et ejusd. diss. acad. 2. p. 101. Willd. sp. pl. p. 224. In collibus Cap. b. spei.

2. *minuta*, barbata, foliis ensiformib. glabris, scapo unifloro, petalis oblongis acutis. Thunb. diss. n<sup>o</sup>. 2. Lin. suppl. 98. Hab. in monte Icuvestart ad Cap. b. spei. Flor. lutei, scap. vaginatus.

3. *pumila*, barbata, scapo unifloro, fol. ensiformibus glabris brevioribus, tubo exserto, petalis oblongis obtusis. Willd. l. c. Jacq. aust. t. 1. Lam. encycl. 3. p. 285. Hoffm. germ. ed. 2. p. 13. Hab. in Germaniac, Austriae, Galliae, Pannoniae collibus. muris. Flor. versicolores, plerumque purpureo-caerulei. Scap. fol. vaginantib. cinctus.

4. *lutescens*, barbata, scapo subunifloro, fol. ensiformibus glabris longiore, tubo spathis incluso, petalis oblongis obtusis. Willd. sp. p. 225. Lam. encycl. Hab. in Germaniac, Galliae montosis. Panila. Cor. albedo flavescens, laciniis exterioribus basi violaceo-reiculatis undulato-emarginatis. W.

5. *cristata*, barbata, barba cristata, scapo subunifloro longitudine foliorum, germinib. trigonis, petalis subaequalib. Willd. sp. p. 225. Aiton. Kewens. 1. p. 70. Hab. in America boreali, in montib. umbrosis Carolinae. Radix repens. Caulis vix digitalis

1-a-florus. Cor. laciniae fascia subtrifariam undulato-crenata. Michaux. p. 22.

6. *susiana*, barbata, fol. ensiformibus glabris, scapo unifloro, petalis rotundatis. Thunb. diss. n.º 4. Decand. et Redouté. Liliac. t. 18. I. *susiana* flore maximo ex albo nigricante. Bauh. pin. 31. Hab. in Oriente.

7. *florentina*, barbata, fol. ensiformib. glabris, scapo subbifloro brevioribus, floribus sessilibus. Lam. ill. p. 121. Morison sect. 4. t. 5. f. 5. Hort. cyst. vern. 8. p. 4. f. 3. Cor. alba, lacin. latae, infer. vultu pallide luteis pictae. Stigm. crenulata. Rad. odorata. Desf. Hab. in Europa australi et in Barbaria.

8. *alba*, barbata, caule multifloro fol. altiore, spatib. basi foliaceis, apice margineque scariosis, cor. tubo germine longiore. Savi. Flor. Pisana. 1. p. 32. Lob. ic. 59. Hab. prope Pisam.

9. *flavissima*, barbata, fol. ensiformib. glabris, brevioribus scapo bifloro, germine obtuse trigono. W. Jacq. icon. rar. 3. t. 220. Collect. 4. p. 68. Gmel. sib. 1. p. 31. t. 5. f. 2. Hab. in Sibiriae locis subhumidis. Scap. basi tantum vaginatus.

10. *arenaria*, barbata, scapo bifloro toto vaginato fol. ensiformibus brevioribus, flor. superiore abortiente. Walldst. et Kitaib. Pl. rar. Hong. p. 57. t. 57. Pumila flava, scapus vix pollice longior. Pet. basi venis subviolaceis.

11. *biflora*, barbata, fol. ensiformibus brevioribus, scapo subtrifloro, germine tereti. Thunb. diss. n.º 6. Resh. cyst. vern. 114. Hab. in Lusitanie rup. vibos et ad lacum Baikal Sibiriae. Cor. violacea non emarginata. Floret quotannis bis.

12. *aphylla*, barbata, fol. ensiformib. glabris aequantibus scapo multifloro subn. lo. Thunb. diss. n.º 7. *J. radialis*, corollis barbatis, scapis antheris nudis submultifloris vix longitudine foliorum, spatib. ventricosis viridibus. Lam. encyc. 3. p. 284. Habitat?

13. *variegata*, barbata, fol. ensiformib. glabris, aequantibus, scapo multifloro. Th. diss. n.º 8. Curt. mag. t. 16. Habitat in Hungaria. Cor. alba, apice purpurea, venis atro-purpureis, lacin. erectae flavae acutae; stigmata flava. Willd.

14. *squalens*, barbata, fol. ensiformib. glabris erectis brevioribus scapo multifloro, lacin. cor. deflexis replicatis, erectis emarginatis. Thunb. diss. n.º 11. I. *variegata*.

Jacq. aust. 1. p. 7. & 5. In Europa australi. Cor. lacin. erectae emarginatae luteae, stigmata sordide lutea. W.

15. *plicata*, barbata, caule multifloro foliis altiore, petalis undulato-plicatis erectis latioribus. Lam. ill. p. 121. Colitur in hortis. Pet. albo et violaceo variegata, basi venis obscure purpur. Odor flor. gratus.

16. *Swertii*, barbata, caule trifloro fol. altiore, petalis undulatis replicatis subemarginatis. Lam. l. c. et encycl. 3. p. 196. Swert. florileg. t. 41. f. 1. In hort. colitur, Pet. albida, stigm. dilute purpur.

17. *japonica*, barbata, fol. ensiformib. falcatis glabris, brevioribus scapo compresso multifloro. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 327. Hab. in Japonia. Flores axillares. Corolla alba. Thunb.

18. *sambucina*, barbata, fol. ensiformibus glabris erectis, brevioribus scapo multifloro, lacin. corollae deflexis planis. Thunb. diss. n.º 10. Jacq. 1. p. 1. t. 2. J. latifolia germanica sambuci odore. Bauh. pin. 31. Hab. in Europa australi. Similima I. germanicae, sed deflexa petala saturatius violacea. Stigmata serrata.

19. *lurida*, barbata, fol. ensiformib. glabris erectis, brevioribus scapo multifloro, lacin. corollae exterioribus revolutis. Willd. l. c. p. 229. Ait. Kew. 1. p. 68. Hab. cum priore. Petala exteriora reflexa atropurpurea, petala interiora, lamina purpurascens; ungue aqualide lutescente. Forte varietas Ircos sambucinae, sed in flora. Ait.

20. *ambriata*, fol. ensiformib. glabris brevioribus scapo multifloro, cor. patulis, stigm. sinbriato. Ventenat. descr. p. 9. t. 9. Hab. in China. Moraeis subaffinis. Corolla dilute caerulea; petal. margine denticulata.

21. *germanica*, barbata, fol. ensiformib. glabris falcatis, brevioribus scapo multifloro, tubo germine longiore. Thunb. diss. n.º 9. Blackw. t. 66. Hoth. germ. l. p. 17. II. p. 41. In Europa australi. Versicolor. Rad. (sicca) odoratis. Stigm. dentata. Petala interiora non emarginata.

22. *pallide caerulea*, barbata, fol. ensiformib. glabris falcatis, brevioribus scapo multifloro, tubo longitudine germinis. Willd. l. c. p. 230. I. *pallida*. Lam. enc. 3. p. 291. I. *dilute caerulea*, involucri albo. Tabern. ic. 647. Hab. in Italia, in monte Pisan. Savi.

Obs. Secundum Willd. l. c. a *germanica* constanter distincta, et quoad observationes

Dom. Courset (Bot. cultiv. 1. p. 518) tantum ejus varietas.

21. *compressa*, barbata, fol. ensiformib. glabris, caule paniculato compresso. Th. diss. n.º 12. Lin. suppl. 98. Hab. in interioribus regionibus Cap. b. spec. h

22. *dichotoma*, barbata, fol. ensiformib. glabris, caule paniculato tereti. Thunb. diss. n.º 13. Lin. suppl. 97. Pall. it. 3. app. n.º 61. t. A. f. 2. Hab. in rupestribus apricis totius Davuriæ. Refert Ixiom. Flor. longe pedunculati, omnium congenerum minimi, dilute purpurascens.

**\*\* Barbatae, foliis linearibus.**

23. *tripetala*, barbata, fol. lineari scapo unifloro longiore, petalis alternis sululatis. Thunb. diss. n.º 14. Lin. suppl. 97. Jacq. ic. 2. t. 24. Collect. 3. p. 272. Hab. in Cap. b. spec. Var. florib. caeruleis, violaceis et carnis.

24. *tricuspis*, barbata, folio lineari scapo subbifloro longiore, petalis alternis trifidis. Thunb. diss. n.º 15. Lin. suppl. 98. Houtt. 11. t. 80. f. 1. Ad Cap. b. spec. Cor. albo, luteo et purpureo variegata.

**\*\*\* Imberbes, foliis ensiformibus.**

25. *plumaria*, barbata, fol. linearibus, scapo multifloro, stigmatib. multifidis. Th. diss. n.º 16. Moraea *tripetala*. L. suppl. p. 100. Willd. sp. p. 244. Ad Cap. b. spec.

26. *Northiana*, barbata, scapo foliisque falcatis linearibus, petalis exteriorib. pendulis, interiorib. suberectis apice revolutis. Moraea *Northiana* Andrews. t. 255. Hab. in Brasilia. Hab. Junci. Flor. 2. sub apic. scapi foliiformis. Pet. exteriora alba, interiora flavo-caerulea.

27. *orientalis*, barbata, scapo tereti, fol. distichis linearibus decrescentib., flore subsolitario terminali. Thunb. diss. n.º 18. (M. *iridioides*) Willd. p. 244. Mill. ic. t. 239. f. 1. Iris *orientalis*. Till pisan. 89. t. 33. Hab. in Oriente, Constantinop. Pet. interiora alba, immaculata, patentia. Stigm. caerulea. petaloidea. Th.

28. *Xiphium*, imberbis, fol. ensiformib. canaliculato-subulatis, scapo bifloro, petal. stigmatate fere angustioribus, germine teretitrigono. Ehrh. Beitr. 7. p. 139. Iris *variabilis*. Jacq. collect. 2. p. 321. Besl. aest. t. 4. f. 2. t. 6. f. 2. 3. t. 10. f. 1. Hab. in Hispania, Sibiria. Quoad color. variat.

29. *Xiphioides*, imberbis, fol. ensiformibus canaliculato-subulatis, scapo bifloro, petalis stigmatate latioribus, [germine acute

angulato. Ehrh. Beitr. 7. p. 140. Iris *Xiphium* Jacq. Collect. 3. p. 320. Besl. cyst. aest. t. 7. f. 1. t. 8. f. 1. t. 9. f. 1. Hab. in Hispania.

30. *Pseud-Acorus (paludosa)*, imberbis, fol. ensiformibus, petalis alternis stigmatate minoribus. Thunb. diss. n.º 18. Fl. dan. t. 493. Roth. germ. t. p. 17. II. p. 43. Acorus adulterinus. Bauh. pin. 34. Hab. in paludosis, aestate.

31. *foetida*, imberbis, fol. ensiformibus, scapo uniangulato. Thunb. diss. n.º 19. Cor. imberbis petalis interioribus patentissimis, caule uniangulato, fol. ensiformibus. L. Hort. cliff. 19. Moris. S. 4. t. 5. f. 2. mala. Hort. cyst. 8. f. 1. Hab. in Gallia, Anglia, Hetruria, Hungaria et Barbaria. Cor. caeruleo-tristis. Petala exteriora, ungue subtus plicis rugoso. Fol. foetidiss., obscure viridia.

32. *virginica*, imberbis, fol. ensiformibus, scapo folioso ancipiti. Thunb. diss. n.º 20. Jacq. Collect. 2. p. 322. Cor. lacin. 3 fascia mucido-tomentosa, caps. trigona: angulis sulcatis. Mich. Fl. amer. p. 22. Hab. in Virginiae et Carolinae palustribus.

33. *versicolor*, imberbis, fol. ensiformibus, scapo tereti flexuoso, germinibus subtrigonis. Thunb. diss. n.º 21. Curt. mag. t. 21. Hab. cum priore. Petala apice obscure violacea basi flavescuntibus venis violaceis, interiora carnea. Stigmata alba. Willd.

34. *halophila*, imberbis, fol. ensiformibus, radicalibus longissimis, scapo tereti, germinibus hexagonis. Ait. Kew. p. 72. Pall. it. 3. app. 63. t. B. fig. 2. In Sibiriae locis depressis salis.

35. *ochroleuca*, imberbis, fol. ensiformibus depressis striatis, scapo subtereti, germinibus hexagonis. Thunb. diss. n.º 22. Act. Petrop. 1781. t. p. 252. t. 8. Hab. in Oriente. Petala reflexa, basi dilatata venis obscuriorib., limbo flavo marginib. albo; erecta nivea, basi venis flavescuntibus. Stigmata nivea. Affinis I. spuria.

36. *spathacea*, imberbis, fol. ensiformibus rigidis, scapo tereti bifloro, spathis longissimis. Thunb. diss. n.º 23. *Spathulata*. Lin. suppl. 99. In interioribus regionibus Cap. bonae spec.

37. *ramosa*, imberbis, fol. ensiformib., caule paniculato multifloro. Lin. suppl. 99. In Schwartzlandiae arenosis ad Cap. b. spec.

38. *stylota*, aculis imberbis, fol. ensiformibus, cor. lacinis subaequalibus: tubo longissimo. Desf. l. c. t. 5. I. *ungicularis*. Lam. ill. p. 124. In Algeria, in sepiibus. Cor. caerulea. stigma angusta.

\*\*\* *Imberbes*, *fol. linearibus*.

39. *scorpioides*, *caulis imberbis*, *fol. canaliculatis*, *cor. laciniis tribus erectis minimis: tubo longissimo*. Desf. l. c. t. G. I. *microptera*. Lam. l. c. Hab. in Algeriae humilis. Fl. hyme. Stigm. maximum, profunde bifidum. D.

40. *junceae*, *imberbis*, *bulbo tunicato*, *caule subbifloro*, *fol. subulatis canaliculatis*, *spatha diphylla acuta*, *cor. tubo elongato*. Desf. atl. p. 39. t. 4. Poir. iter. ed. germ. t. 1. (mala.) Hab. in collibus aridis in Atlante. Cor. lutea. Caps. longa. D.

41. *Sisyrinchium*, *imberbis*, *fol. linearibus undulatis reflexis*, *scapo unifloro*. Thunb. diss. n.º. 25. Hab. in Hispania, Lusitania, Barbaria. Petala purpurea, macula lutea loco barbae. Bulbi ex gemino bulbo altero alteri impositi.

42. *longifolia*, *fol. linearibus canaliculatis longissimis glaucis*, *scapo multifloro*. Andrew. Repos. t. 45. Hal. in Cap. bonae spei. Flor. et Bulbi ut in antecedente. Fol. 3-petalia. Cor. macula lutea oblonga.

43. *verna (nana)*, *imberbis*, *fol. linearibus planis*, *scapo unifloro*, *lac. corollae alternis aequantibus*. Thunb. diss. n.º. 26. Pluk. alm. 138. t. 166. f. 6. Habitat in Virginia. Pusilla. Fol. lineari-gladiata. Rad. fibrosa. Michaux p. 22.

44. *persica*, *imberbis*, *fol. linearibus planis*, *scapo unifloro*, *petalis interioribus brevissimis patentissimis*. Syst. veg. p. 79. Lam. ill. t. 33. f. 3. Rudb. elys. 2. p. 10. f. 9. Hab. in Persia.

45. *angusta*, *imberbis*, *folio filiformi lineari erecto glabro*, *scapo subunifloro*, *spathis obtusis*. Thunb. diss. n.º. 28. Hab. ad Cap. b. spei.

46. *setacea*, *imberbis*, *fol. filiformi-lineari erecto glabro*, *scapo glabro subunifloro*, *spathis acutis membranaceis*. Th. diss. n.º. 29. t. 1. f. 2. I. *setifolia*. Lin. suppl. 99. Cum priore.

47. *tenuifolia*, *spatha biflora*, *folio longissimo filiformi*, *cor. tubo filiformi elongato*. Lin. suppl. 97. Pall. it. 3. app. n.º. 66. tab. C. fig. 2. In arenosis Davuriae et ad Wolgam. Cor. pallide caerulea, odore caryophylleo fragrans.

48. *ventricosa*, *imberbis*, *fol. linearib.*, *scapo subbifloro*, *spathis ventricosis*, *tubo elongato*, *germine trigono*. Willd. l. c. p. 236. Pallas itin. 3. app. n.º. 62. t. B. f. 1. Cum priore. Cor. pallide caerulea. Germen lateribus sulco bipartitis. Pall.

49. *elegans*, *imberbis*, *fol. gramineis attenuatis*, *scapo subbifloro*, *spatha ventricosa*, *germine trigono*, *stigm. crenatodentato*. In hortis rarius obvenit. Caul. 2-petalis. Cor. magna elegans, lac. exter. flavesce. in medio macula lata fulva. Stigm. sulphur. margine caerulese.

50. *graminea*, *imberbis* *fol. linearibus* *scapo subbifloro* *ancipiti superantibus*, *germinibus hexagonis*. Thunb. diss. n.º. 31. Jacq. aust. t. 2. Hab. in Austria.

51. *ensata*, *imberbis*, *fol. linearibus*, *scapo subbifloro tereti*, *germinibus hexagonis*. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 328. I. *graminea*. Thunb. jap. 34. Habitat in Japonia.

52. *spuria*, *imberbis*, *fol. linearibus*, *scapo subbifloro tereti*, *germinib. hexagonis*. Thunb. diss. n.º. 32. I. *spathulata*, *imb. fol. ensiformib. caule subbreviorib. pet. majorib. spathulatis*. Lam. enc. 3. p. 300? Jacq. aust. t. 4. Hab. in Germaniae, Galliae, Sibiriae et Hungariae pratis.

53. *orientalis*, *imberbis*, *fol. linearib.*, *scapo subbifloro tereti articulatulo*, *germinib. trigonis*, *corollis fusco-reticulatis*. I. *sibirica*. Thunb. jap. 33. Hab. in Japonia. Spathae fol. siniles.

54. *pratensis*, (*sibirica* L.) *imberbis*, *fol. linearibus*, *scapo fistuloso subtrifloro tereti*, *germinibus trigonis*. Thunb. diss. n.º. 33. Lam. encycl. 3. p. 300. Jacq. aust. t. 3. Roth. germ. l. p. 18. II. p. 43. Hab. in Germaniae, Austriae, Helvetiae, Galliae, Sibiriae pratis. Fol. plana cuberecta, caule breviora.

\* *odorata*, *imberbis*, *fol. gramin.* *caule subaequantib. attenuato-pungentib.*, *caule tereti bifloro*, *germine trigono*, *cor. venosis*. In horto quodam cultam inveni. Caul. subarticul. Flor. obscurae caeruleae: pet. exteriora medio lin. fulva, intus crispa. Odor gratus.

55. *martinicensis*, *fol. linearibus*, *pet. foveolis glandulosis*, *germinibus trigonis*. Thunb. diss. n.º. 34. Jacq. amer. 7. t. 7. Xiphion flore ex luteo nigricante. Plum. spec. 8. ic. 260. t. 261. f. 1. Hab. in Martinica.

56. *crispa*, *imberbis*, *fol. linearib. crispis*. Thunb. diss. n.º. 36. In collib. Cap. b. spei.

57. *pavonia*, *imberbis*, *folio lineari glabro*, *scapo subunifloro*. Thunb. Jacq. Coll. suppl. p. 8. Hab. ad Cap. b. spei. Caulis submentosus. Flos aurantiacus aut albus, macula baseos caerulea. Filam. connata.

58. *papilionacea*, *imberbis*, *fol. linearibus reflexis liris*. Thunb. diss. n.º. 37.

t. 2. f. 1. Jacq. Collect. suppl. p. 159. t. 3. f. 2. \* Hab. ad Cap. b. spei.

59. *fugax*, imberbis, scapo tereti, fol. radicalib. lanceolato-linearib. canaliculatis, flor. terminalibus, stigmatib. erectis profunde bifidis. Moraea *fugax*. Andrew. t. 83. Ad Cap. b. spei. Rad. bulbosa, fol. interiora sublinearia. Flos *fugax*, 3 tantum horas durans.

60. *edulis*, imberbis, folio lineari pendulo glabro, scapo glabro multifido. Th. diss. n°. 38. Moraea *fugax*. Syst. veg. g3. Jacq. Hort. 3. t. 20. In campis arenosis Cap. b. spei.

61. *tristis*, imberbis, fol. linearibus glabris, scapo hirsuto ramoso. Thunb. diss. n°. 39. Moraea *sordescens*. Jacq. ic. rar. 2. t. 225. Ad Cap. b. spei.

62. *polystachya*, imberbis, fol. linearib. planis, scapo glabro ramoso. Thunb. diss. n°. 41. I. *lacera*, spatibus laceris. Lam. ill. 125. Cum prioribus.

63. *viscaria*, imberb., fol. linearibus planis, petalis patentibus, caule viscoso. Lin. suppl. 98. In Cap. b. spei locis arenosis ad Saldahna bay. Odor bituminosus.

64. *bituminosa*, imberbis, fol. linearib. spirialibus, scapo viscoso. Thunb. diss. n°. 43. t. 2. f. 2. Petalis reflexis. Lin. suppl. 98. Ad Cap. b. spei. An varietas?

\*\*\*\* *Imberbes, foliis tetragonis.*

65. *tuberosa*, imberbis, fol. tetragonis. Thunb. diss. n°. 43. Moris. hist. 2. p. 348. s. 4. t. 5. f. 1. Hermodactylus. Tournef. cor. 50. In Arabia, Oriente.

108. **MARICA.** Cor. 6-petala, sup-  
pera: laciniis interioribus mi-  
noribus. *Stylus* crassus. *Stigma*  
petaloideum, trifidum: laciniis  
indivisis acutis. *Spatha* magna  
flor. involvens.

1. *paludosa*, Willd. Sp. 246. Cipura pa-  
ludosa. Aub. guj. 1. p. 38. t. 13. Lam. ill.  
p. 107. t. 30. Hab. in pratishumidis Gujanæ.  
Folia graminea. Flores albi vel caerulei,  
spatibus cincti. W.

109. **DILATRIS.** Cor. 6-petala su-  
pera hirsuta. *Filam.* tertium reli-  
quis minus. *Stigma* simplex. *Caps.*  
globosa, coronata, infera, trilo-  
cularis.

1. *corymbosa*, petalis ovatis, panicula  
hirsuta. Thunb. Act. Societ. Berol. 4. p. 46.

Berol. cap. g. t. 3. f. 5. Dilatris *umbellata*,  
petalis ovatis, corymbo fastigiato hirsuto.  
Lin. suppl. 101. In anbulosis Cap. bonæ  
spei. Corollæ atropurpureæ, petalis  
connexæ. Stam. 3, longitudine petalorum.  
Stigma trigonum. Mant. T.

2. *leioides*, panicula ovata villosa,  
petalis ovalibus externe barbatis, stam.  
corolla longioribus. Lam. ill. p. 127. Hab.  
ad Cap. b. spei.

3. *viscosa*, petalis linearibus, panicula  
villosa-viscida. Thunb. prod. 10. Thunb. l.  
cit. 4. p. 48. Lam. ill. t. 34. In monte ta-  
bulari Cap. b. spei. T.

4. *paniculata*, petalis lanceolatis, caule  
paniculato. Thunb. l. cit. 4. p. 51. Hab. in  
arenosis Cap. b. spei. Flor. purpureo-fla-  
vescentes. T.

5. *Heritiera*, fol. angustis irideis erectis,  
panicula subcorymbosa, petalis 3 linea-  
ribus, 3 alternis interiorib. lanceolat.  
*Heritiera* Gmelini. Mich. Flor. amer. 1.  
p. 2. Her. tinctorum. Bull. des Sp. n°. 19.  
Hab. in Carolinae uliginosis. Cal. rubens.  
Cor. subcampanulata, tomentosa. Stigm.  
subtrilobum. Caps. 3-quetra. M.

110. **WACHENDORFIA.** Cor. 6-pe-  
tala, inaequalis, infera. *Caps.*  
trilocularis, supera.

1. *thyrsiflora*, scapo subsimplici, pani-  
cula coarctata, fol. ensiformibus quinque-  
nerviis plicatis glabris. Th. prod. 12. Lam.  
ill. 1. p. 127. Burm. monogr. 2. f. 2. Ad  
Cap. b. spei, cum sequentibus omnibus.

2. *paniculata*, scapo polystachyo, pa-  
nicula patente, fol. ensiformibus trinerviis  
plicatis glabris. Th. prod. 12. Smith. ic.  
pict. 1. p. 5. t. 5. Lam. ill. t. 34. f. 1.  
Erythrobulbus hellebori albi plicatis foliis.  
Pluk. mant. 70.

3. *hirsuta*, scapo polystachyo, panic.  
patente, fol. ensiformibus trinerviis pli-  
catis villosis. Th. prod. 12.

4. *tenella*, scapo subpolystachyo, pa-  
nicula patente, fol. linearibus trinerviis  
glabris. Th. prod. p. 12.

5. *graminea*, scapo polystachyo, panic.  
patente, fol. ensiformib. canaliculatis glabr.  
Th. prod. 12.

111. **XIPHIDIUM.** Cor. 6-petala,  
aequalis. Stam. recta. *Caps.* su-  
pera, 3-locul., polysperma. Spa-  
tha s. cal. o.

1. *album*, fol. glabris, petalis lineari-

lanceolatis. Willd. Sp. 248. X. floribundum. Swartz prodr. 17. et Flor. 1. p. 80. In Cumana, Amer. meridionali.

2. *caeruleum*, fol. hirsutis, pet. ovatis. Willd. l. c. X. *caeruleum*, florib. paniculatis, flore et fol. pilosis. Aubl. guj. 1. p. 33. t. 11. In pratis Gujanæ.

112. COMMELINA. Cor. 6-petala.

*Nect.* 3, cruciata, filam. propriis inserta. *Caps.* subglobosa, 3-locularis.

\* *Dipetalæ*, ob duo petala majora.

1. *communis*, corollis inaequalibus, fol. ovato-lanceol. acutis, caule repente glabro. Hort. ups. p. 18. Willd. sp. pl. 1. p. 249. Dill. elth. 93. t. 78. f. 89. Habitat in America. ☉

2. *polygama*, cor. inaequalibus diandris hermaphroditis et masculis, ramis prostratis radicantibus. Roth. catal. bot. 1. p. 1. et 2. p. 1. Kaempf. amoen. 88g. Hab. in Japonia.

3. *cayennensis*, procumbens, fol. ovato-lanceolatis acutis glabris: vaginis ciliatis, nectariis bilobis. Richard in Act. Soc. Lin. Paris. p. 106. In Cayenna.

4. *pilosa*, pumila diffusa, fol. lanceolatis, vaginis involucrique pilosis. Rich. l. c. Hab. cum priore.

5. *africana*, cor. inaequalibus luteis, fol. lanceolatis glabris, caule decumbente. Hab. in Aethiopia.

6. *bengalensis*, cor. inaequalibus, fol. ovatis obtusis, caule repente. Murr. comm. goett. 1799. p. 18. t. 5. Pluk. alm. 1. p. 27. f. 3. In Bengala.

7. *erecta*, cor. inaequalibus, fol. ovato-lanceolatis, caule erecto scabro simplicissimo Dill. elth. 94. p. 77. t. 88. Hab. in Virginia.

8. *virginica*, cor. subaequalibus, fol. lanceolatis subpetiolatis ore barbatis, canibus erectis. Lin. Hab. in Virginia. Fol. supra retrorsum scabra: vaginis nervosis, ore barbatis pilis ferrugineis. ☿

♂ *longifolia*, caule stricto pubescente, fol. lanceolatis longissimis: vaginis rufobarbatis, pet. ternis subaequalib. Michaux Flora p. 23. In umbrosis sylv. Virginiae et Carol. Julio. Sem. compressa subelliptica.

9. *angustifolia*, assurgens, debilis, fol. lineari-lanceolatis acutis planis, petalis duobus. Mich. l. c. p. 24. In Carolinae

campestrib. Majo. Sem. cylindrica. Bract. subcordatae.

10. *longicaulis*, cor. subaequalibus, fol. lineari-lanceolatis sessilibus, vaginis ciliatis, caule decumbente. Willd. l. c. p. 251. pedicellis guminis filiformib. geniculatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 264. Collect. 3. p. 234. Hab. in humidis ad Caracas. ☿

11. *mollis*, cor. subaequalibus, foliis petiolatis ovatis pubescentibus, caule repente. Willd. Jacq. ic. rar. 2. p. 293. Collect. 3. p. 235. Cum priore. ☿

12. *vaginata*, cor. aequalibus, fol. linearibus, flor. diandris involucreo vaginatis. Mant. 177. Pluk. alm. t. 174. f. 3. In India orientali. Pedunc. terminati involucreo convoluti. Corpuscula linearia. Antherae flavae, nigromaculatae. ☉

13. *nudiflora*, cor. aequalibus, pedunc. capillaribus, fol. linearibus, involucreo nullo, flor. diandris. Mant. 177. Pluk. alm. 135. t. 27. f. 4. In Indiae orientalis aridis graminosis. Flor. nutantes. Corpuscula deltoidea. ☉

14. *cucullata*, cor. aequalibus, foliis ovatis, involucreo cucullat. turbinate. Mant. p. 176. Lam. enc. 1. p. C. *nervosa*. Burm. ind. 18. t. 7. f. 3. cfr. Loureiro Flor. Cochinchin. 1. p. 39. In India orientali. Involucra margine laterali coadito. Flores minuti.

15. *japonica*, fol. ovato-lanceolatis undulatis, caule erecto angulato piloso, flor. paniculatis. Th. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 332. In Japonia.

16. *bracteolata*, cor. aequalibus, fol. lanceolato-linearib. undulatis subrispis, pedunc. paniculatis bracteis semivaginatis. Lam. ill. gen. 1. p. 129. Habitat in India.

17. *spirata*, cor. aequalibus, fol. lanceolatis, flor. paniculatis, pistillo convuluto. Mant. 2. p. 176. In India orientali ad rivulos et locis humentibus. ☉

18. *hispida*, cor. aequalibus, fol. ovato-lanceolatis obtusis hispida, pedunc. subquiescentis. Flor. per. 1. p. 43. t. 73. f. a. Hab. in collibus provinc. Camanae. Stigm. subcapitatum. ☉

19. *fasciculata*, cor. aequalibus, fol. lanceolatis acutis, vaginis ciliatis, caule assurgente, rad. fasciculata. Flor. per. 44. t. 72. b. In collib. et arvis Limaë. Pet. interiora caerulea, exteriora breviora, albidula. ☿

20. *nervosa*, cor. subaequalibus, fol. lan-

ceolatis 16-nerviis : vaginis hirsutis, caule erecto. Fl. per. l. c. Hab. in umbrosis ad Cuchero vicum peruvianum.

21. *gracilis*, cor. aequalibus, fol. ovatis acutis, margine scabris : vagin. longis ciliatis, caul. repente. Fl. per. l. c. t. 72. f. a. Cresc. in Peruv. cultis et humidis. Pet. exteriora albida.

22. *serrulata*, pedunc. axillarib. sub-solitariis multifloris, fol. lanceolatis marginatis serrulato-scaberrimis, vagin. ciliatis. Vahl. eclog. amer. fasc. 2. In Cayenna.

113. *CALLISIA*. Cal. 3-phyllus. Pet. 3. Anth. geminae. Stigm. penicilliformis. Caps. compressa, 2-locularis. Nect. o.

1. *repens*, flor. axillaribus subsessilib. caule laevi, fol. glabris. Lam. enc. p. 563. ill. gen. t. 35. f. 1. Hapalanthus Jacq. amer. pict. p. 12. t. 12. Hab. in Amer. meridionali, locis udis.

2. *ciliata*, fol. cordatis vaginantibus denticulato-ciliatis, vaginis subtrifloris. C. *repens*. Flor. per. 1. p. 43. t. 73. f. b. Habitat ad urbem Huancac in Peruv. in fruticetis.

3. *umbellata*, caul. sursum pedunculisque villosis, florib. umbellulatis diandris. Lam. ill. p. 130. t. 35. f. 2. In America meridionali observata a cl. Richard.

114. *LEPTANTHUS*. Spatha 1-flora, hinc delibescens. Cor. tubo longo gracili : limbo sexpartito. Stam. laciniis inserta. Anther. lineares, aut bifformes triangulares. Caps. intra spatham, coronata, 3-locularis, polysperma, angulis delibescens.

\* *Antherae uniformes lineares, filamenta aequalia.*

1. *ovalis*, foliis ovalibus petiolatis. Michaux Flor. am. bor. t. 1. p. 25. t. 5. f. 1. Hab. in paludib. Illinoensib. Flos ex imo petiolo erumpit.

2. *graminea*, fol. linearibus, caul. fluitante dichotomo. Mich. l. c. Cresc. in flumine Ohio. Potam. *graminei* habitus.

\*\* *HEPTANTHERA*. Filam. longitudine inaequalia, antherae bifformes.

3. *peruviana*, fol. lato-reniformibus, spatha subquadriflora. H. *reniformis*. Fl. per. 1. p. 43. t. 71. f. a. In Peru. Caul. repens. †

4. *virginica*, fol. orbiculato-reniformibus, spatha 1-flora. Michaux l. c. t. 1. p. 25. In Pennsylvania, Virginia.

115. *SYENA*. Cal. 3-phyllus. Petala 3. Antherae oblongae. Caps. 1-locularis, 3-valvis.

1. *fluviatilis*. Willd. sp. p. 254. Mayaca fluviatilis. Aub. guj. t. p. 42. t. 15. M. *Aubletii* Michaux. In rivulis Guianae, et in Carphina. Planta muscosa. Fol. capillacea verticillata. Flor. axillares albi. W.

116. *XYRIS*. Glumae bivalves in capitulum. Cor. 3-petala, aequalis. Caps. supera, 1-locularis, 3-valvis.

1. *indica*, fol. ensiformibus scapum vaginantibus, capitulo globoso, squamis subrotundis. Willd. phytog. t. p. 2. n°. 6. Vahl symbol. 2. p. 7. Pluk. alm. 170. t. 416. f. 4. Moris. hist. 3. p. 229. s. 8. t. 9. f. 28. In Indiis. †

2. *pauciflora*, fol. linearibus subulatis scap. vaginantibus, capitulo oblongo, squamis ovatis obtusis. Willd. l. c. n°. 7. t. 1. f. 1. In Malabar. †

3. *americana*, fol. triquetris linearibus subulatis basi distinctis, capitulo oblongo, squamis lanceolatis acutis. Willd. sp. pl. t. p. 255. Aubl. gujan. t. p. 40. t. 14. In America cali bore. Flor. caerulei. †

4. *cappensis*, fol. linearibus brevissimis, capitulo ovato acuto, squamis obtusis. W. l. c. Thunb. prod. 12. Hab. ad Cap. bonae spei. †

5. *subulata*, fol. distichis subulatis, scapo 1-2-phyllis, spica 2-3-flora. Flor. per. 1. p. 46. t. 71. b. Habitat in Peruviae montosis humidis.

6. *brevifolia*, fol. subulato-gliadiatis, scapo teretiusculo, capitulo globoso. Michaux Flor. p. 23. In pratis udis Georgiae inferioris.

7. *anceps*, fol. linearibus obtusiusculis, scapo apice dilatato ancipiti, capit. squamis rotundatis. X. Jussieu. Mich. l. c. Cresc. a Marilandia ad Floridam.

† FLORES GLUMACEAE. 1.) *Scirpoidei* Caulis cylindrici aut triquetri, farcti, nodos, rarius articulati. Flor. spicati, squamis s. paleis imbricati, monogyni, stigm. 2-3; filam. numero et situ variant, ut plurimum tria. Sem. unicum, nudum, basi involuicello setulae lanace-palae-ariliformi aut nullo cinctum Iluc quoque per-



binerent *Carices*, quae vero ob staminum situm ad classem monoeciam a Linnaeo relatae sunt.

117. *KYLLINGIA*. *Spica* (Amentum L.) subrotunda aut oblonga sessilis, aut umbellata constans ex spiculis subimbricatis: *Cal.* 2-valvis: valvula inaequali, 1-flor. *Cor.* 2-valvis, cal. major. Sem. triquetrum. (Stam. 1-3. Stigm. 2-3.)

1. *monocephala*, culmo filiformi triquetro, capitulo globoso sessili, involucrio triphylo longissimo. Lin. suppl. 104. Rottb. gram. p. 13. t. 4. f. 4. Willd. sp. pl. 256. Schoenus coloratus. Lin. ? Rumph. amb. G. p. 8. t. 3. f. 2 ? In humidis Indiae orientalis et Americae.  $\overline{\text{T}}$

2. *brevifolia*, culmo setaceo monophyllo, involucrio triphylo brevi, capitulo terminali sessili. Rottb. loc. cit. f. 3. In India orientali.

3. *pumila*, involucrio triphylo plano, flor. diandria. Michx. Flor. siner. 1. p. 29. In Shavaniensis regione ad amnem Scioto. Styl. bifidus uti in sequente.

4. *maculata*, involucrio triphylo patentissimo, capitulis 3 glomerato-sessilibus, monandris. Michaux 1. c. Hab. in Carolina. Sequenti affinis dicitur.

5. *ovularis*, spicis umbellatis globoso-oroidis, glumis lanceolatis, valvulis exterioribus ovalibus, stylo 3-fido. Michaux 1. c. In Georgia, et Carolina.

6. *nivea*, capitulis terminalibus subternis glomeratis sessilib. Lin. suppl. 104. Rottb. G. (K. triceps.) L. Schoen. niveus Scheuchz. Agrost. 401. t. 9. f. 11. Pluk. phytoz. t. 197. f. 7. In humidis Americae et Indiae orientalis. Gramen laevissimum. Capitul. terminale (lateralibus 3 approximatis) ovatum sessile niveum. Stylus semibifidus. L.  $\overline{\text{T}}$

7. *panicæ*, umb. terminali simplici, spicis sessilibus pedunculatisque cylindricis imbricatis, involucrio universali subterphylo, partiali nullo. Lin. suppl. 105. Rottb. 1. c. f. 1. In India, Oriente.

8. *filiformis*, umb. terminali simplici, spicis sessilibus pedunculatisque ovatis, spiculis ovatis acutis, involucrio triphylo, partiali nullo. Swartz prod. 20. Ej. Flor. p. 121. In Hispaniolae, Jamaicae camp. graminosis. Fol. lineari-convoluta. Invol. 3-fhyl.

9. *umbellata*, umb. terminali, spicis

sessilibus pedunculatisque cylindricis squarrosis, involucrio universali polyphylo, partiali triphylo. Lin. suppl. 105. Rottb. 1. c. f. 2. Scirpus cyperoides. Lin. Mant. 181. Rheed. mal. 12. p. 116. t. 63.  $\beta$ . *Kyllingia sumatrensis*, involucrio partiali nullo. Retz. obs. 4. p. 13. In India orientali,  $\beta$ . in Sumatra.

10. *cyperina*, culmo triquetro striato basi folioso, umb. simplici, spicis strictis sessilibus, involucrio universali polyphylo longissimo, partiali nullo. Retz. obs. 6. p. 21. In India orientali. Fol. culmo duplo fere longiora.

11. *incompleta*, culmo triquetro folioso, umb. composita, involucrio universali et partiali polyphylo, calyce univalvi. Willd. 1. c. p. 258. Jacq. ic. rar. 2. t. 300. Collect. 4. p. 101. Hab. cum priore.

*Obs.* An ad hoc genus quoque pertinet *Carex hermaphrodita*. Jacq. ?

118. *MAPANIA*. Involucr. magnum triphyllum. Flor. capitati. *Cal.* 6-valvis, imbricatus, dentatus. *Cor.* o. Semen involucrio (perispermio) paleaceo involutum. Richard.

1. *sylvatica*. Aubl. gujan. 2. 47. t. 17. Willd. sp. 1. p. 258. Habitat in sylvis udibus Gujanæ. Culm. basi squamis vel foliis imbricatis lanceolatis vestitus. Kyllingiam fere refert. W.  $\overline{\text{T}}$

119. *REMIREA*. Spiculæ in capitulum congestæ. *Cal.* 2-valvis. *Cor.* 2-valvis, cal. minor; palea intima. (s. nectar. Schr.) semen non dimittente. Filam. longiss. na.

1. *maritima*. Aubl. Guj. 1. p. 44. t. 16. Lam. 1. p. 314. t. 137. Miegia Schreb. Willd. Sp. 1. p. 317. Hab. in arenosis maritimis Gujanæ et Cayennæ. Radix s. stirps repens. Culm. foliosi.

120. *DICHROMA*. Spica ovata s. capitata involucriata. Squamæ (paleæ) multis membranaceæ subcongestim imbricatæ. Styl. setaceus; Stigm. 2. Sem. nudum, rugulosum, apice tuberculo lunatum cincto. (Fol. floralia s. involucrium basi discolora ut plurimum allicantis.)

1. *leucocephalum* (glabra), erecta glabella, capitulo involucrio inferne can-

*d. idis.* Michaux Flora. 1. p. 37. Hab. in Carolina et Georgia.

2. *ciliatum*, involuero foliisque basi ciliatis, spiculis oblongis attenuatis. Schoenus stellatus. Swartz prodr. p. 19. Willd. t. sp. 1. p. 264. Spica compacta alba, fol. ad spicam partim albis partim viridibus. Sloan hist. 1. p. 119. t. 78. f. 1. Hab. in Florida et insul. Caribaeis. Kyll. *triceps* refert. Sw.  $\mathcal{T}$

3. *reptans*, humilis reptans, fol. serrulatis glabris, involucri subtriphylo breviusculo. Richard in Act. Soc. Paris. 1. p. 106. sub Scirpo. Hab. in Cajenna.

*Obs.* Forte nonnulli *Schoeni* auctor. Scirpus *radiatus* Thunb. Willd. 1. p. 289, et Cyperus leucocephalus. Retz. obs. 5. p. 11. huc quoque pertinent.

121. **SCHOENUS.** Spicul. subconvolutae, acutae. Squamae fasciculatim congestae, exteriores steriles, nitidae. Cor. o. Sem. 1, subrotundum nudum, aut setis cinctum. (Stam. 2-3.)

\* *Culmo tereti.*

1. *Mariscus*, culmo tereti folioso, fol. margine dorsoque aculeatis. Flor. succ. p. 35. Jacq. collect. 3. p. 72. Willd. sp. pl. 1. p. 250. Scheuchz. gram. 375 t. 8. f. 7-11. Moris. hist. 3. p. 237. s. 8. t. 11. f. 24. Hab. in Europae paludibus.  $\beta$ . *effusus*. Sw. Flor. Ind. occid. 1. p. 98. Cresc. in inundatis maritimis prope Vera Cruz.

2. *juncus*, culmo tereti subnudo, umbella sessili laterali. Willd. phytog. 1. p. 2. n. 9. t. 1. f. 4. In Guinea.  $\mathcal{T}$

3. *mucronatus*, culmo tereti nudo, spiculis ovatis fasciculatis, involucri subhexaphyllo patente, fol. canaliculatis. Syst. veg. p. 81. Schousboe Maroc. 2. p. 28. Cyperus aegyptiacus. Gloxin. obs. bot. p. 20. t. 3. Moris. hist. 3. p. 227. s. 8. t. 9. f. 6. In Europae australioris et Barbariae maritimis.

*Obs.* Gramen quoad sedem dubium, non male quoque ad Scirpum S. Mariscum Hall. referri posset.

4. *pilosus*, culmo tereti, vaginis pilosis, flor. fasciculatis. Willd. Phytog. 1. p. 3. n. 10. t. 1. f. 3. In Guinea.  $\mathcal{T}$

5. *filiformis*, culmo tereti capillari, capitulo oblongo, involucri triphylo. Thunb. prod. 16. S. *indicus*. Lam. enc. Plukn. amalth. 113. t. 1. 416. f. In Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

6. *striatus*, culm. tereti, capitulo ovato, involucri triphylo. Thunb. prod. 16. Ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

7. *Capitellum*, culmo tereti, capitulo ovato, involucri diphylo. Thunb. prod. 16. Ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

8. *scariosus*, radice bulbosa, scapis teretibus, canaliculatis, fol. setaceis rigidis, spica cylindrica terminali, squam. margine scariosis. Rottb. gram. 46. t. 16. f. 2. (Scirp. bulbosus). Willd. sp. 1. p. 261. Thunb. prodr. In India orientali et Cap. b. spei. Facies Scirpi palustris. Fol. radicalia copiosa conferta filiformia, basi membrana lata alba.  $\mathcal{T}$

9. *nigricans*, culmo tereti nudo, capitulo ovato, involucri diphylli ovati valvula altera subula longa terminata. Moris. hist. 3. p. 233. s. 8. t. 10. f. 28. Hab. in paludibus et maritimis. *Var.* culmo fol. longiore aut iis brevior.  $\mathcal{T}$

10. *ferrugineus*, culm. tereti nudo, involucri valvula majore lanceolata spicam aequante. Moris. hist. 3. p. 254. s. 8. t. 12. f. 40. In Gotlandiae, Helvet. paludibus.  $\mathcal{T}$

11. *fuscus*, culmo teretiusculo aggregato, stricto foliisque canaliculatis setaceis, flor. fasciculatis, involucri (bractea) diphylo longissim. Willd. sp. 1. p. 262. S. *setaceus*. Thunb. Flor. Paris. ed. 2. p. 19. Hab. in paludibus. A. S. *albo* differt praeter colorem fuscum flor. acutis et bract. his quadruplo longioribus; has species vero inter se non differre affirmat cl. Smith. Fl. Brit. 1. p. 46.

12. *rufus*, culmo tereti nudo, spica subdisticha involucri triphylo obtuso longiore, spiculis paucifloris, fol. canaliculatis. Smith l. c. p. 45. Light. Scot. t. 24. f. 2. Hab. in Scotiae paludibus. Rad. repens. Sem. setosum.

13. *tristachyos*, culm. tereti articulado laevi, capitulis tribus terminalibus. Thunb. prod. 16. Ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

14. *cuspidatus*, culm. teretibus subnudis, panic. linearis, bract. annularib. obliquis brevissimis, mucrone longissimo terminat. Rottb. 66. t. 18. f. 3. Ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

15. *aristatus*, culmo tereti aphylo, spicis aggregatis, involucri monophyllo, glumis cuspidatis. Thunb. prod. 16. Ad C. b. spei.  $\mathcal{T}$

16. *compar*, culmo tereti aphylo, spicis aggregatis, involucri brevioribus, glumis acutis. Thunb. prod. 16. Rottb. p. 65. t. 18. f. 4. Ad Cap. b. spei. Spiculae binae in singulo rachaeos denti sessiles.

17. *flexuosus*, culmo tereti folioso, spicis paniculatis, glumis mucronatis. Th. prod. 16.  $\beta$ ? *involucratus*, panicula foliosa nutante, spicis congestis aristatis sub-

distichis, floriculis gemellis nectariferis. Rottb. 64. t. 19. f. 1. Ad Cap. b. spei. ¶

18. *capillaceus*, culmo tereti folioso, spicis subracemosis, glumis cuspidatis, fol. capillaribus. In Cap. b. spei. ¶

19. *ustulatus*, culmo tereti folioso, spicis peduncul. pendulis oblongis aristatis. Mant. 178. Rottb. 63. t. 18. f. 1. ? Ad Cap. bonae spei. Folia caulina pauca. ¶

20. *thermalis*, culmo tereti folioso, spic. peduncul. alternis aristatis. singula composita spiculis plurimis per totidem bracteas interstinctis. Rottb. p. 63. t. 18. f. 2. Willd. sp. 1. p. 267. Ad aquas calidas Cap. b. sp. Spic. turgidae, glum. mucrone longo.

21. *spicatus*, culm. tereti capillari, capitulis spicatis involucreis. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

22. *Bobartiae*, culm. compresso, capitulo terminali, involucre pentaphyllo. Retz. obs. 4. p. 9. In Zeylona. ¶

23. *hirsutus*, pedunc. axillaribus terminalibusque, pedicellis racemosis trispicatis. Vahl. Elog. 1. Hab. in America meridionali.

24. *bulbosus*, scapis foliisque setaceis basi alatis, capitulis glomeratis, per bracteas setaceas interstinctis. Willd. 1. p. 264. Ad Cap. b. spei Radix bulbosa. Folia numerosa, setacea, basi interstincta ramentis membranaceis albis. Facies Junci bulbosi. An hujus generis?

25. *inanis*, culm. tereti aphylo, spicis paniculatis, glumis acutis. Thunb. prod. 16. In Cap. b. spei ¶

\* \* Culmo triquetro.

26. *cephalotes*, culm. folioso triquetro: involucre tetraphyllo longissimo, deflexo, capitulo oblongo terminali. Rottb. 61. t. 20. In Surinamo. A Scirpo cephalote distinctus. Willd. sp. 1. p. 265. Habitus recedit. ¶

27. *cyperoides*, culm. triquetro folioso, umbella terminali, spiculis glomeratis. Swartz prod. 19. Ej. Flor. p. 110 Jacq. icon. rar. 1. t. 10. ? Collect. 1. p. 113. ? In Jamaicae austral. montib. Stigm. cirrhosa. Setae 2. Sw. ¶

28. *cymosus*, culm. triquetro folioso, umbella terminali composita, spiculis ovatis striatis glomeratis. Willd. sp. pl. 265. In America boreali. Fol. linearia cypripina numerosa. Spic. minutae, tres semper glomeratae sessiles. Involuc. universale polyphyllum inaequale. W. ¶

29. *glomeratus*, culm. triquetro folioso, flor. fasciculatis, fol. planis, pedunculis lateralibus geminis. L. Willd. p. 266. Swartz obs. 29. In Jamaica et America boreali. Scm. basi setis cinctum.

30. *Cladium*, culm. obtuse triquetro folioso laevi, fol. antrorsum aculeatis panic. diffusis, spiculis unisporis sessilibus diandris. Swartz prod. 19. Ej. Flor. 1. p. 97. Cladium culmo nudo, flor. quasi umbellatis, umbellis gradatim assurgentibus. Brown. jam. 114. In humidis Jamaicae. ¶

31. *Restioides*, culm. inferne compresso - anticipibus glaberrimis, flor. paniculatis, vaginis apice lanceolatis. Swartz prod. 19. et Flora. p. 104. In India occidentali. A caeteris differt habitu.

32. *corymbosus*, culm. folioso triquetro, pedunc. corymbosis, inferib. alternis distantibus, superiorib. confertis. Swartz prod. 19. et Flora Ind. occid. 1. p. 99. Willd. p. 266. Rottb. 68. t. 21. f. 1. (S. surinamensis.) Scirpus *corymbosus*. Lin. Willd. sp. 1. p. 308. Fol. vaginae ventricosae, uno latere mucrone obtuso, altero fol. longissimo lineari instructae. R. Hab. in utraque India, in montosis.

33. *rugosus*, culm. triquetro folioso, pedunc. corymbosis distantibus, spicul. ovatis acutis, sem. unilato-rugosis. Vahl Elog. Amer. 2. Hab. in Amer. meridionali. Anteced. affinis.

34. *polyphyllus*, culm. triquetro folioso, fol. carinatis, dorso marginibusque scabris, spicis decompositis axillarib. Vahl. l. c. Hab. in Montserrat. S. Marisco similis.

35. *polycephala*, culm. triquetro folioso, pedunc. axillaribus et terminalib. capitulis plurimis globosis: intermedio sessili. S. triceps. Vahl. L. c. S. Holoschoenoides Rich. in Act. Soc. nat. Paris. 1. p. 106. Hab. in Amer. meridionali et Cajenna. Capit. ad 10-12.

36. *laevis*, culm. trigono folioso, capitulis lateralibus, glumis mucronatis, spicis ovatis. Thunb. prod. 17. Ad Cap. b. spei.

37. *lanceus*, culm. trigono folioso, spicis paniculatis lateralib. glumis spiculisque lanceolatis. Thunb. prod. 17. Ad Cap. b. spei.

38. *albus*, culm. subtriquetro folioso, flor. fasciculatis, fol. setaceis, involucre flor. subaequali aut nullo. Fl. auct. 34. Fl. dan. 320. Rottb. germ. II. p. 49. Hab. in Europae et Americae paludibus turfosiss. ¶

39. *sparsus*, culm. folioso triquetro, paniculis multifloris, spiculis sparsis, ovatis, minutis, semine transverse ruguloso. Michaux Flora 1. p. 35. Hab. in umbrosis Carolinae. Styl. bifidus.

40. *longirostris*, culm. triquetro, umb. foliosis, spicul. fasciculatis, semine compresso : mucrone longissimo. Michaux. 1. c. In Virginia et Carolina. Fol. lata. Setulae perispermatae 6, subulatae.

41. *inexpansus*, culm. obsolete triquetro, paniculae remotae ramulis approximato-erectis, spiculis fusiformibus. Michaux. 1. c. Sem. suboblongum, mucrone brevi, setul. 6. Panic. contracta.

42. *rariflorus*, culm. fol. setaceis, paniculis paucifloris; spiculis ovatis, turgidis, sem. obovato rugoso. Michaux. 1. c. Panic. parvulae, spicul. pellicellatae.

43. *capitatus*, culm. triquetro, capitul. alternis, spicul. oblongis, semine stipitato, setulis retrorsum muricatis. Michaux. p. 36. Fol. angusta. Capit. interdum geminata. Sem. obovatum. M.

44. *ciliaris*, fol. linearib. obtusiusculis, bracteis ciliatis, semine lentiformi. Michaux. 1. c. Hab. in Florida. Flor. fascic. terminales. Setulae brevissimae sursum bispidulae. Spic. dorso pubentes.

45. *distans*, flor. fascicul. subcapitatis lateralibus; spiculis remotis, ovatis glabris, sem. lentiformi setul. longitudine. Michaux 1. c. Hab. in Carolina.

46. *fascicularis*, flor. fascicul. lateralibus et terminali, bract. brevibus; spic. oblongis : squamis mucronatis, setulis semine laevi duplo longioribus. Mich. 1. c. p. 37. Hab. in Carolina.

47. *gracilis*, culm. triquetro folioso longissimo filiformi, spicis lateralibus pedunculatis tereti-linearib. Swartz prod. 19. Ej. Flora p. 109. In Jamaica.

48. *setaceus*, culm. triquetro debili, fol. alternis distantib. setaceis, spiculis aggregatis, flosc. diandris. Swartz prod. 20. Willd. sp. 268. Rottb. 6a. t. 21. f. 2. *Triodon* Richard ob. sem. 3-dentata, glumas aristatas et stam. 2. In pratis Jamaicae et Surinami.

49. *pusillus*, culm. triquetro nudo filiformi, spicul. terminalib. subfasciculatis sessilib. foliolo subjecto, spicam aequante. Swartz. prod. 20. Ej. Icon. fasc. 1. p. 7. tab. 6. et Fl. p. 112. In graminosis montium Jamaicae australis. Sem. scabrum.

122. CYPERUS. *Glumæ* paleaceae distiche imbricate. Cor. o. Sem. 1, nudum. Spicula compressa.

\* *Culmo tereti.*

1. *minimus*, culm. capillari spica solitaria geminaque, involucri monophyllo. Thunb. prod. 18. Willd. sp. 1. p. 269. *Scirpus setaceus* (L. Rottb. gram. 47. t. 15. f. 4. Pluk. 176. t. 300. l. 4. 5. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 120. t. 75. f. 3. In Jamaica, Africa.

2. *setaceus*, culm. setaceis striato-angulosis nudis, spica terminali subquadriflora nuda. Retz obs. 5. p. 10. In graminosis humidiusculis Calcuttae.

3. *arenarius*, culm. compresso nudo, spicis capituli glomeratis sessilibus, involucri submonophyllo. Retz. obs. 4. p. 9. Pluk. almag. 178. t. 300. f. 7. In arena mobili Indiae orientalis.  $\mathcal{T}$

4. *prolifer*, culm. tereti, capitulo globoso prolifero. Thunb. prod. 18. Rottb. p. 55. t. 17. f. 2. In Cap. b. speci.  $\mathcal{T}$

5. *effusus*, culm. tereti subligneo; umb. rara, spicis conglomeratis, involucri subulato triphylo. Rottb. p. 22. t. 12. f. 3. Ad Meccam in Arabia.

6. *articulatus*, culm. tereti nudo articulato Sp. pl. 661. Rottb. p. 26. Vahl. symbol. p. 7. C. niloticus. Forsk. Sloan. jam. 36. p. 121. t. 81. f. 1. In Jamaicae, Aegypti, Indiae rivulis.  $\mathcal{T}$

7. *marginatus*, culm. tereti aphylo, umb. composita, spicul. oblongis brunneis. Thunb. prod. 18. In Cap. b. speci.  $\mathcal{T}$

8. *complanatus*, culm. compresso plano nudo, umb. composita involucri diphylo, partiali brevissimo polyphylo, foliolis setaceis basi membranaceis. Willd. spec. 1. p. 270. *Scirpus complanatus* Retz. obs. 5. p. 14? Hab. in Java. Spiculae brunneae. Singulare gramen, culmo foliaceo lato compresso. W.  $\mathcal{T}$

9. *texilis*, culm. tereti, umb. decomposita, involucri dodecaphylo laevi brevioris spiculis oblongis. Thunb. prod. 18. In Cap. b. speci. rivulis.  $\mathcal{T}$

10. *compactus*, culm. tereti folioso, umb. decomposita, involucri pentaphyllo, spiculis congestis subspiralibus. Retz. obs. 5. p. 10. Hab. in China.

11. *atropurpureus*, culm. tereti subfolioso retrorsum scabro, fol. subulatis canaliculatis. C. *striatus*, Flor. peruv. 1. p.

47. Hab. in collib. aridis Tarmæ oppidi. Glum. ovatae, atropurpureae. Fol. vaginantis, ad medium inferne margine ciliata. Flor. sine hyemis.

**\*\* Culmo triquetro, spiculis simplicibus.**

12. *distachyos*, culm. triquetro filiformi basi folioso, spicis binis sessilibus involucri brevioribus. Willd. l. c. p. 272. Hab. in Italia. Culmus basi folio unico gramineo angusto instructus. W.

13. *triflorus*, culm. triquetro nudo, umbel. tristachya, intermedia sessili, spiculis laevigatis. Mant. 180. Schoenus cyperoides. Retz. obs. 4. p. 8. In pascnis aridis Indiae. Involuc. diphyllum.

**\*\*\* Culmo triquetro, umbella glomerata sessili.**

14. *nanus*, culm. triquetro setaceo, umb. sessili capitata involuc. diphylla, glumis nervosis. Willd. l. c. Pluk. t. 417. f. 8. Hab. in Guinea.

15. *filiformis*, culm. triquetro nudo filiformi, fol. setacis, spicis terminalibus sessilib. confertis tereti-subulatis. Swartz. prod. 20. Ej. Flor. p. 120. In Jamaicae austral. numerosis.

16. *dubius*, culm. setaceo triquetro, capitulo terminali, involucri tetraphyllo longissimo. Rottb. 20. t. 4. f. 5. Willd. p. 273. Cyperus leucocephalus. Retz. obs. 5. p. 11. In Malabar.

17. *capitatus*, culm. subanguloso striato medio folioso, capitulo terminali triphylla, spicis sessilib. Retz. obs. 4. p. 9. Hab. in India?

18. *niveus*, culm. triquetro filiformi nudo, umb. terminali sessili diphylla, spicis compressis lanceolatis. Retz. obs. 5. p. 12. In nemorosis ad Midnapour, Tschandranconae Indiae. T.

19. *pannonicus*, cespitosus, culm. obsolete triquetro prostrato, spicis subquaternis subovatis sessilib. Ait. Kew. 1. p. 79. glumis lateralibus sphacelatis Lin. suppl. 103. Jacq. aust. 5. p. 29. app. t. 6. In Austria, Hungaria. ©

20. *junciformis*, culmo subtereti, spiculis aggregatis; spatha diphylla: foliolo altero spiculis brevior. Desf. atl. t. 7. f. 1. Cavan. ic. 3. p. 2. t. 204. f. 1. Hab. in Barbaria et Hispania. Spiculae nigrae. Cav.

21. *mucronatus*, culm. nudo vaginato triquetro, involucri monophyllo stricto, spicis lateralib. sessilib. Rottb. p. 19. t. 8. f. 4. Vahl. symbol. 1. p. 7. Hab. in Arabia,

India. Culmus, inferne teres est. Spiculae saepe 4, 6, 8. Vahl.

22. *laevigatus*, culm. trigono, capitulo glomerato globoso obliquo, involucri diphylla, glumis obtusis. Thunb. prod. 18. Rottb. 19. t. 16. f. 1. Ad Cap. b. spec. Involuc. foliolis plano-canaliculatis longis, majore erecto, inferiore patulo. Folia nulla in flore graminea aënat, vidi tamen squamas unciales emarcidas lineares. Willd. T.

23. *ornithopus*, culm. cespitosus incurvis, umb. sessili sublaterali, spic. teretiusculis sublinearib., involuc. 3-phylla longissimo. Hab. in paludosis exsiccatis ad St. Domingo. Spic. acuminatae: squam. subamplexantes.

24. *squarrosus*, culm. triquetro nudo, umb. tetraphylla glomerata, spiculis ovatis, glumis mucronatis. Willd. p. 274. Cyperus (squarrosus) culmo triquetro nudo, umbella foliosa glomerata, spicis striatis squarrosis. Amoen. acad. 4. p. 303. Cyperus pygmaeus. Rottb. 20. t. 14. f. 4 et 5. Hab. in India. Involuc. 3- s. 4-phyllum.

25. *pygmaeus*, culmo triquetro folioso, capitulo globoso, involucri 6-7-phylla: foliol. 3 longissimis. Cavan. ic. 6. p. 65. t. 568. f. 2. Hab. in Mauritania juxta flum. Sebæ.

26. *nitens*, culm. triquetris basi foliosis, umb. subsimplicibus, involucri triphylla, flor. monandris. Retz. obs. 5. p. 13. Willd. Sp. 1. p. 275. Hab. in India.

27. *fascicularis*, culm. triquetro, involucri polyphylla, spicis lineari-lanceolatis corymbosis confertissimis. Rottb. 30. t. 11. f. 1. Desf. Atl. p. 44. Lam. ill. t. 38. f. 2. Cyperus polystachyos. Willd. Sp. 1. p. 275. Pluk. mant. 97. t. 416. f. 6. Hab. in India, ad Cap. b. spec. et in Barbar. T.

28. *conglomeratus*, culm. subtriquetris fol. fasciculatis semiteretib. a. canaliculatis breviorib. capitulo paniculato terminali triphylla. Rottb. 21. t. 15. f. 7. Hab. in Arabia. Fol. tenuis. margine punctis scabra, vagina atropurpurea. R.

29. *cruentus*, culm. triquetro, involucri polyphylla longo. umb. simplici, spicis conglomeratis, floscul. sulcato-punctatis. Rottb. p. 21. t. 5. f. 1. Vahl. symbol. 1. p. 8. Cyperus globosus. Forsk. p. 13. Hab. in Arabia. Spic. lineis et Ochreae punct. cruentis distinctae. T.

**\*\*\* Culm. 3-quetro, spic. umbellato-capitatis sessilib. et pedunculatis.**

30. *aristatus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spic. cylindraceo-spicatis,

glumis subulatis uncinato-mucronatis. Willd. p. 275. Rottb. 23. t. 6. f. 1. Scirpus intricatus. Lin. Mant. 182. In Ind. orientali et Cap. b. spei. Fol. graminea laevia. Involuc. triphyllum. Umb. spicis saepius pedunculatis, quartaque sessilib. Spicae ovatae cylindricae obtusae.

31. *Luzulae*, culm. triquetro, umb. simplici, spiculis ovatis capitato-spicatis, involucro polyphylo. W. p. 276. Rottb. t. 13. f. 3. Sloan. jam. t. 79. f. 1. In Amer. calidiore.

32. *conoidens*, culm. triquetro folioso, umb. simplici, spiculis compactis obtuse conicis. Richard in Act. soc. Lin. Paris. p. 106. Hab. in Cayenna. Affn. antecedenti.

33. *confertus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici foliosa, spiculis ovatis conglomeratis, glumis apice recurvis acuminatis. Swartz. Flor. Ind. Occid. t. p. 115. In Jamaica australi. Involuc. 3-phyll. longissimum.  $\mathcal{T}$

34. *Brisneus*, culm. triquetro, fol. angustis, umbellulis confertis aphyllis, spiculis oblongo-ovatis obtusis. Richard in Act. Soc. Lin. Paris. p. 106. Hab. in Amer. meridion. Spiculae subbrizaeformes.

35. *viscosus*, culm. subcompresso basi viscoso, fol. asperis, umb. foliosa composita, spiculis subconglobatis obtusis. Ait. Kew. p. 70 Swartz Flor. Ind. occid. t. p. 113. Hab. in in arenosis, subhumidis Jamaica australi. Hujus loci est Cyp. elegans, Rottb. gram. p. 34. t. 6. f. 1. secundum Vahl Eclog. Amer. fasc. 4. Forte non diversus est a Cyp. odorato. L.

36. *ligularis*, culm. triquetro, umb. composita, flor. pedunculatis, spiculis paucifloris spicatis, glumis obtuse mucronatis, involucro polyphylo longissimo. Willd. p. 277. C. ligularis, culmo triquetro nudo, umbell. spiculis capitatis oblongis sessilibus, involucris longissimis serrato-asperis. Lin. Amoen. acad. 5. p. 39. Rottb. 35. t. 11. f. 2. Hab. in Jamaica et ad C. b. sp.

37. *cinnamomeus*, culm. triquetro folioso, umbell. spiculis capitatis ovatis pedunculatis sessilibusque, involucro pentaphyllo serrulato-scabro. Retz obs. 4. p. 10. Var. prioris?

38. *alopecuroides*, culm. triquetro, umb. supradecomposita, spicis digitatis oblongis, spicul. confertissimis imbricatis erectis. Rottb. 38. t. 8. f. 2. C. glomeratus. L. Willd. 277. alopecuroides, culmo trigono, umb. decomposita involucro polyphylo serrato brevioris, spiculis cylindricis. Thunb. prodr. p. 16. Hab. in Arabia felici, India et Cap. b. spci. Planta speciosa.  $\mathcal{T}$

39. *imbricatus*, culm. triquetro nudo, umb. decomposita, umbellularum radiis imbricatis, involucris hexaphyllis foliis tribus longissimis, tribus brevissimis. Retz obs. 5. p. 12. In India.

\* \* \* \* \* Culmo triquetro, umbella composita et decomposita, spiculis divaricatis.

40. *maderaspatanus*, culm. triquetro, umb. composita, spiculis linearibus, glumis lanceolatis uncinato-muricatis, involucro triphylo longissimo lanceolato. W. l. e. p. 278. Cyperus squarrosus. Rottb. 25. t. 6. f. 3. Pluk. amalth. 114. t. 397. f. 2. Hab. in India. Parvulus.  $\odot$

41. *castaneus*, culm. triquetro, umb. composita, spiculis linearib. multifloris, glumis obtusis recurvato-mucronatis, involucro triphylo longissimo convoluto-setaceo. Willd. 278. Hab. in India.

42. *elegans*, culm. triquetro, umbell. subtriradiatis, spiculis subternis linearib. squamis oboeolatis substantib. mucronatis patulis, involucris planis. Vahl. Eclog. 2. Lin. Willd. spec. p. 278. Sloan. jam. t. p. 117. t. 75. f. 1. Hab. in Jamaicae paludosis.

43. *scopellatus*, umb. subhexaphyllis, radiis alternis confertis ramosis, fasciculatis aphyllis, spiculis linearilanceolatis. Vahl. Eclog. 2. Richard in Act. Soc. hist. nat. Paris. t. p. 106. Hab. in Martinica.

44. *surinamensis*, culm. triquetro, umb. decomposita, spiculis ovatis, glumis acuminatis imbricatis, involucro triphylo W. p. 279. Rottb. 35. t. 6. f. 5. Hab. in Surinamo.

45. *Awidus*, culm. triquetro striato, umb. composita triphylla, spicis lanceolatis, monandris. Retz. obs. 5. p. 13. In India.

46. *flavescens*, culm. triquetro nudo, umb. sub composita triphylla, spicis confertis lanceolatis, glumis obtusis. Willd. p. 279. Roth. germ. II. p. 50. Desf. Atl. t. p. 46. Moris. hist. 3. p. 236. t. 8. t. 11. f. 37. Hab. in Europae et Barbariae paludosis.  $\odot$

47. *fuscus*, culmo triquetro, umb. composita, triphylla, spicis linearibus confertis glumis acutis imbricatis. Willd. 280. Flor. dan. t. 179. Leers. herb. t. 1. f. 2. Roth. germ. II. p. 50. Hall. helv. n. 1349. Moris hist. 3. p. 236. t. 8. t. 9. f. 38. Hab. cum priore, culm. subflaccidis.  $\odot$

48. *viridis*, culmo triquetro, umb. composita triphylla, spicis linearibus confertis, glumis acutis patulis. Willd. sp. t. p. 280. Cyperus viridis. Krock. siles. n. 69.

t. 13. Hab. in montosis Silesiae et circa Argentoratum. Culm. subrigidus. ☉

49. *difformis*, culm. triquetro nudo, umb. diphylla simplici trifida, spicis cuspidatis, intermedia sessili. Amoen. 4. p. 102. Rottb. 24. t. g. f. 2 Pluk. alm. t. 192. f. 3. Hab. in India. Spicae numerosae, squamis ovatis concavis obtusis, latere scuriosis.

50. *jemicus*, culm. triquetro seminudo basi bulloso, involucri diphylla, umb. subsimplici, spiculis linearibus. Retz. obs. 4. p. 11. Rottb. 25. t. 8. f. 1. In Arabia felice, in regione Jeminiensi inque graminosis Zeilonae. ☿

51. *strigosus*, culm. triquetro nudo, umb. subsimplici, involucr. 4-phylla, spiculis linearib. confertissimis horizontalibus. Lin. Sp. plant. 65. Rottb. 40. t. 11. f. 3. Sloan. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 2. 3. In Jamaicae, Virginiae paludibus, inque India. Radix sul rotunda.

52. *tenuis*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spiculis subulatis confertis horizontali-reflexis, involucr. polyphylla foliol. lineari-setaceis. Swartz. Flor. 3. p. 119. In Jamaicae occident. gramin. montosis.

53. *tuberosus*, culm. triquetro basi folioso, involucri triphylla, umb. composita, spicis lanceolatis teretiusculis. Rottb. p. 28. t. 7. f. 1. In India.

54. *pumilus*, culm. folioso triquetro, involucri tetraphyllo, umb. composita, spicis alternis ovato-lanceolatis nitulis. Rottb. 29. t. 9. f. 1. β? Cyper. pumilus. L. Sp. plant. 67. Amoen. acad. 4. p. 302? Hab. in India. In β involucr. 2-phyllum dicitur.

55. *stoloniferus*, culm. nudo triquetro, umb. composita involucriata, spiculis lanceolatis. Retz. obs. 4. Hab. in India. ☿

56. *compressus*, culm. triquetro nudo, umb. universali triphylla, glumis mucronatis, lateribus membranaceis. Sp. 68. Rottb. 27. t. g. f. 3. Sloan. hist. 1. p. 117. t. 76. f. 1. Hab. in pratis Jamaicae et Amer. septentr. Spicae radii 4, longe pedunculati, umb. media sessili.

57. *pulcher*, culm. trigono, umb. decomposita involucri subhexaphyllo breviori, spiculis ovatis Thunb. prod. 18. Hab. in Cap. b. spci

58. *monandrus*, culm. inferne folioso obtuse triangulo, umb. polystachia decomposita, spicis lanceolatis confertis sessilib. flor. monandris. Rottb. catal. 1. p. 3. C. vegetus. Willd. Sp. 1. p. 283. Amiss videtur praecedenti. An varietas C. glabri? W.

59. *albidus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, pedunculis corymbosis, involucri polyphylla longissimo. Retz. obs. 6. p. 21. Hab. in India.

60. *hexastachyos*, culm. triquetro nudo fol. graminis linearibus molliusculis glaucis, umb. simplici flaccida, spicis linearibus alternis subsemit. Rottb. 28. t. 14. f. 2. Sw. Fl. ind. occid. 1. p. 117. Hab. in India et Jamaica. C. rotundus. L. sp. pl. ed. 1. diversus est. Sw. ☿

61. *hydra*, culm. triquetro laevigato, umb. simplici sessili et 1-2 pedunculatis, spicul. linearib. fol. radical. recurvatis, radice repente tuberosa. Michaux. 1. p. 27. Hab. in cult. Amer. boreal. spic. castaneae. Planta tuberib. facillime renascens maximo agris damno. M. Praecedenti affinis.

62. *tetrastachyos*, culm. triquetro. involucri sub-4-phyll. corymbo breviori, spic. subquaternis arcuatis, acutis. Desfont. atl. 1. p. 45. t. 8. Hab. in Algeria ad ripas flum. Taddah. An prioris varietas?

63. *glaber*, culm. triquetro nudo laevi, umb. triphylla, flor. glomeratis, inferiorib. brachiatis, fol. glabris. Lin. Mant. 179. Segn. suppl. 66. t. 2. f. 1. Allion. pedem. p. Hab. in Veronae et Pedemont. humentibus. Culm. palmaris. Involucr. triphyllum culmo longius, praeter 3 foliola subulata brevia.

64. *branneus*, culm. triquetro nudo, fol. laeo-linearib. planis, umb. 8-phylla, spic. subsessilibus: glumis striatis. Swartz. l. c. p. 116. Hab. in Ind. occident. Setae 2. latiusculae ad latera germinis. Sw.

65. *odoratus*, culm. triquetro nudo, umb. decomposita simpliciter foliosa, pedicellis distiche spicatis. Lin. Sp. pl. 68. Rottb. p. 38. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 1. In America ad fluviorum ripas. ☿

66. *esculentus*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa, radicum tuberibus ovatis, zonis imbricatis. Morist. hist. 3. p. 2364. 8. t. 11. f. 10. Desf. atl. 1. p. 41. Villars Dauph. 1. p. Hab. Monspelii, in Italia, Oriente et Barbaria. ☿

67. *tenuiflorus*, culm. triquetro, fol. linearibus, umb. decomposita, spiculis linearib. acutis angustissimis. Rottb. gram. 30. t. 14. f. 1. Jacq. ic. rar. 2. t. 256. Collect. 3. p. 150.

68. *badius*, culm. triquetro nudo, fol. serrulatis, corymbo terminali, spicul. linearibus subulatis congestis, involucri pedunculis longiore. Desfont. Atl. 1. p. 45. t. 7. f. 2. Ad. ripas rivulor. Algeriae. Involucri 4-5

*Phyll. Spicul. ferrugineae. Affinis C. tenuifloro. Rottb. T.*

69. *pallescentis*, culm. triquetro basi folioso, pedunc. supradecompositis, spiculis linearis-subulatis rectis distinctis, involucr. sub-4-phylo umb. brevior. Desf. l. c. t. 9. Hab. ad lacuum ripas prope la Calle. Spic. primo albidæ deinde pallide rufæ. T.

70. *Pangorei*, culm. triquetro basi folioso, involucri triphylo, umb. universalis decomposita: partialibus subtrifidis. Retz. obs. 4. p. 10. Rottb. 31. t. 7. f. 3.

71. *flavicomus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, involucri longissimo sub-5-phylo. Michaux. l. c. In Carolina. Umb. ramuli ab ipsa basi floriferi, spiculae patentæ, flavae oblongae 7-florae. M.

72. *virens*, culm. triquetro, umb. composita subnuda, involucri polyphylo longissimo peduncul. s. ramis divaricato-ramosis. Michaux. l. c. In Carolina. Majusculus. Spicul. fasciculatae, virentes ovatae planae. M.

73. *strigosus*, culm. triquetro nudo, umb. composita, involucri longissimo, spic. teretiusculis, patentissimis. Mich. l. c. Cum priore.

74. *lanceus*, culm. trigono folioso, umb. composita, involucri duplo breviori, spicul. oblongis. Thunb. prod. 18. C. denudatus. Linn. suppl. 108? Hab. in Cap. b. spei.

75. *longus*, culm. triquetro folioso, umb. foliosa supradecomposita, pedunculis nudis, spicis alternis linearib. Jacq. icon. rar. 2. t. 297. Collect. 3. p. 191. C. odoratus radice longa. Moris. hist. 3. p. 237. s. 8. t. 11. f. 13. Hab. ad rivulus Europ. austral. Spic. brunnae, nitidae.

76. *fastigiatus*, culm. triquetro, umb. decomposita, pedunculis longissimis filiformibus subquinq. fidiis, spicis plurimis linearib. sparsis. Rottb. 32. t. 7. f. 2. Burm. ind. eo. t. 8. f. 2. Hab. in India. T.

77. *canaliculatus*, culm. triquetro canaliculato nudo, umb. decomposita, pedunculis racemosis, involucri polyphylo longissimo. Retz obs. 6. p. 20. Hab. in India orientali.

78. *Monti*, culm. triquetro, umb. decomposita paniculata, spiculis ovatis floicul. distinctis, involucri hexaphylo. Willd. p. 286. Linn. suppl. 102. Rottb. 31. serotinus C. serotinus odoratus, radice longa, paniculae locustis laetis ferrugineis compactis. Mont. gram. 12. t. 1. f. 2. In mariis Italiae et Tergesti. T.

79. *niger*, culm. triquetro nudo glabro, fol. ensiformib. umb. foliosa, pedunc. plurimis longis, spicis laxis nigricantibus. Flor. Per. 1. p. 47. Hab. in inundatis Prov. Cercado et Chancag. C.

80. *Iria*, culm. triquetro seminudo, umb. foliosa decomposita, spiculis alternis, granis distinctis. Rottb. gram. 41. Willd. l. c. p. 286. Pluk. alm. 179. t. 101. f. 7. Iria s. Balar. Reed. mal. 12. p. 105. t. 56. Hab. in India. Distinctus spicul. linearibus, flor. dentium pectinis instar, parum distantibus. W.

81. *Santonici*, culm. triquetro, umb. supradecomposita verticillata paniculata. Willd. p. 287. Rottb. 41. t. 9. f. 1. Hab. in India.

82. *corymbosus*, involucri polyphylo, umb. supradecomposita, pedunc. filiformibus corymbosis strictis. Rottb. gram. 42. t. 7. f. 4. Cyperus, culmo trigono aphylo, umb. decomposita involucri breviori, spicis linearib. Thunb. prod. 18. Hab. in Asia et Cap. b. spei.

83. *racemosus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, pedunc. ramosis racemosisque, involucri polyphylo longo. Retz. obs. 6. p. 20. In India orientali.

84. *Haspan*, culm. triquetro folioso, umb. supradecomposita, spiculis umbellato-sessilibus. Rottb. 36. t. 6. f. 2. Pluk. alm. 179. t. 192. f. 2. Hab. in India, Aethiopia. T.

85. *elatus*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa supradecomposita, spicis sessilib. digitalibus imbricatis, spiculis subulatis. Amoen. acad. 4. p. 301. in Hab. India. Gramen magnum. Involucri universale polyphyllum longissimum, partialia spicis breviora. Spicae longitudine digiti, ferrugineae, imbricatae ex spiculis teneris distichis. L.

86. *distans*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa supradecomposita, spicis alternis, filiformibus, flosc. distantib. Linn. suppl. 103. Jacq. ic. rar. 2. t. 299. Collect. 3. p. 189. Cyperus elatus. Rottb. gram. 37. t. 10. Hab. in insulis Caribaeis. T.

87. *diphyllus*, culm. subtriquetro diphylo, umb. supradecomposita, spiculis teretiusculis subpinnatis. Retz. obs. 5. p. 11. Hab. in Indiae orientalis rivulis.

88. *Papyrus*, culm. triquetro nudo, umb. involucri longiore, involucriis triphyllis setaceis longioribus, spiculis ternis. Syst. veg. 97. Rottb. gram. 32. Mich. gen. 44. t. 19. Papyrus. Bruce itin. 5. p. 1. t. 1. In fluviis Calabriae, Siciliae, Syriae, Aegypti. Involucri. 8-phyllum umbella brevius:



Brevius: foliolis exterioribus 4 latioribus. 4 pedes et ultra altum. In caldariis colitur. Spic. tenerae.

89. *flabelliformis*, culmo sulcato triquetro: involucri polyphylo, foliol. alternis, lanceol. longissim. pedunc. axillaribus umbellato-corymbiferis, spicul. 4-6 ovatis. Rottb. 42. t. 12. f. 2. In Arabia felici. Caul. crass. contortus. Fol. floral. pedalia.

90. *alternifolius*, culm. triquetro, fol. alternis, in summo culmi confertis, umb. axillarib. compositis, spic. linearibus. Willd. Sp. 1. p. 289. Jacq. ic. rar. 2. t. 298. Coll. 2. p. 306. In insula Madagascari. Culmi nudi, apice fol. alternis confertis ensiformibus gaudet. Pedicelli aliquot e basi spicae, apice ferentes spicam similem.

† 111A. *Spica simplex*, squamis subdistichae imbricatis summis congestis; infimis aristatis. Stam. 1. Stigm. 2. Sem muticum. (Richard.)

91. *caribaeus* caespite laxo, squamis binis infimis aristatis. Rich. Cyperus *monostachyos*. Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 271. excl. syn. Rottb. Sloan. jama. 1. p. 120. t. 73. f. 2. Hab. in pascuis aridis Amer.

92. *indicus*, caespite stricto, squamis pluribus aristatis. Rich. Cyperus *monostachyus*. Rottb. gram. p. 18. t. 13. f. 3. Hab. in India orientali.

127. **DULICHIMUM**. Spicae subracemosa, ex axillis foliorum. *Spicule* lineari-lanceolatae subcompressae: squamae subdistichae amplexantibus appressae. *Stylus* longissimus, bifidus. Germ. setulae retrorsum asperae. (Richard. Pleuranthus. Mst.)

1. *spathaceum*, culm. triquetro folioso, spiculis patulis, subsexfloris. Pleuranthus *floribundus*. Rich. Cyperus *spathaceus*, racemis axillaribus. Willd. Spec. pl. 1. p. 289. Schoenus *spathaceus*. L. Scirpus *spathaceus*. Michaux. Hab. in Virginia.

2. *canadense*, racemis simplicibus pedunculatis, spiculis paucis erectis sublecefloris. Richard. Michaux. Hab. in Canada.

123. **SCIRPUS**. *Glumae* paleaceae 5. squamulae undique imbricatae. Cor. o. Sem. 1, nudum aut villis 5. setulis brevioribus cinctum.

\* *Monostachyi*.

1. *mutatus*, culmo triquetro nudo,

spica cylindrica terminali. Amoen. acad. 5. p. 391. Willd. Sp. pl. 1. p. 290. Hab. in Jamaica. Similimus S. geniculatus, sed triquetris, molliusculus, nec articulatus. T.

2. *spiralis*, culm. aggregatis subnudis triquetris, spica cylindrica terminali, flosc. cuneiformibus truncatis spiralter dispositis. Rottb. gram. p. 45. t. 75. f. 1. Hab. in India. T.

3. *articulatus*, culm. fistuloso tereti nudiusculo subarticulato, capitulo glomerato laterali. Sp. plant. 70. Vahl. symbol. 1. p. 8. Rheed. mal. 12. p. 135. t. 71. In Malabaricae aquosissarenosis. Spicae laterales in capitulum semiverticillatum collectae. L.

4. *plantagineus*, culm. tereti ventricosus nudo, spica cylindrico-subulata terminali. Swartz. Flor. p. 123. Retz. obs. 5. p. 14. Rottb. gram. 45. t. 25. f. 2. Hab. in India et Jamaicae inundat. argillosis.

5. *nutans*, culmo compresso subtetragono nudo, spica ovata solitaria terminali nutante. Retz. obs. 4. p. 12. In uliginosis Malacca. T.

6. *quadrangulus*, aphyllus, culm. tetraquetro nudo stricto, spica cylindrica, squamis rotundato-obtusis. Michaux. Flor. 2. p. 30. Hab. in Carolina.

7. *tuberculosis*, culmo nudo, spicis turghis ovatis, semine tuberculo terminato. Mich. l. c. cum priore.

8. *capillaceus*, minutus, culm. foliisque capillareis, spica oblongo-ovata acuta. Mich. l. c. Hab. in Nova Anglia. Affinis S. aciculari dicitur. Spic. squamae paucae, oblongae, castaneae. M.

9. *palustris*, culm. tereti nudo, spica ovato-oblonga subtereti, glumis acutis, rad. repente. Flor. dan. t. 271. Leers. t. 1. f. 3. Hoffm. germ. ed. 2. p. 21. Smith. Flor. brit. p. 48. Hab. in fossis.

10. *multicaulis*, culm. tereti basi vaginato, spica ovata terminali: glum. obtusis aequalib. radice fibrosa. Smith. Flor. brit. 2. p. 48. Flor. dan. t. 167. Rel. Rudb. 28. f. 2. Rupp. Flor. Jen. ed. Hall. p. 319. Hab. in paludosis turfosis Angl., Danicae et Germaniae rarius. Spic. ferruginea ad basin saepius vivipara. Flor. Julio. S.

β ? *intermedius*, aphyllus, spica oblongo-ovata subacuta, bract. rotundatis, glumis obtusiusculis castaneis. Thuill. Flor. Paris. ed. 2. p. 21. Hab. in paludibus prope Raincy non procul a Parisiis. Fl. Maio.

11. *reptans*, radice ( stirpe ) reptante, culm. caespitosus: plurimis sterilib. recur-

E

vatis, spic. oblonga: squamis lanceolatis acutissimis. Thuillier. l. c. p. 22. Hab. ad ripas Sequanae.

12. *geniculatus*, culmo tereti nudo, spica oblonga terminali. Rottb. gram. p. 44. Sloan. jem. 37. hist. 1. p. 122. t. 75. f. 2. et t. 81. f. 3. Hab. in Jamaica.

13. *caespitosus*, aphyllus, culmo tereti sulcato rigido basi vaginato multiplici-squamoso, spica terminali glumis exterioribus maximis. Smith. l. c. t. 1. p. 48 Roth. Catal. 1. p. 7. Hab. in ericetis turfosis, montosis. Glum. inaequales ovali oblongae: majore spicam aequante Roth.

14. *Bacothryon*, aphyllus, culmo striato tereti, basi vaginato, squamis radice lib. annullis, spica terminali, gluma exteriorib. longiore. S. *pauciflorus*. Smith. l. c. p. 50. Lightf. 1788. Lin. suppl. p. 103. S. *Halleri*. Villars delph. 2. p. 188. Hab. in palustrib. montosis. Stam 3 longa, villosa. Hoffm. Glumae obtusiusculae membranaceae; altera majore spica brevior.

15. *turgidus*, caespitosus, culm. confertis nudis, spica turgide ovata: squamis ovalibus obtusis. Thuill. l. c. p. 22. Hab. in paludosis prope Meudon; etiam prope Argentoratum (Strasbourg) crescit. Spicae subrotundae fere.

16. *campestris*, culm. striato nudo, spica terminali calycem bivalvem vix superante, glumis oblongis membranaceis obtusis subaequalibus. Roth. Catal. 1. p. 5. et V. 2. p. 2. Hoffm. germ. ed. 2. p. 22. Flor. dan. t. 167. Scheuchz. t. 7. f. 19. Hab. in ducatu Oldenburgensi et in Francia. Culm. 2-5, setacei fol. longior. Styl. 3-fidus. Sem. triquet. ¶

17. *capitatus*, culm. tereti nudo setiformi, spica subglobosa terminali, stylo trifido. Sp. pl. 70. *Scaribaeus*, culmis fasciculatis setaceis sulcatis triquetris, spica minima ovata terminali. Rottb. p. 46. t. 15. f. 3. In Virginia inque insulis Caribaeis. ¶

18. *ovatus*, culm. subcompresso nudo filiformi, spica ovata terminali nuda, floribus diandris, stylo bifido. Roth. Catal. 1. p. 5. Willd. Sp. 1. p. 194. *Scirpus capitatus* plur. auctorum. Moris. hist. 3. p. 233. f. 8. t. 10. f. 34. Hab. in Germaniae humidis. Setae 6. ¶

19. *atropurpureus*, culm. setaceis teretibus fasciculatis, spicis terminalibus ovatis solitariis, flor. 1-andris. Retz. obs. 5. p. 14. Hab. in uliginosis Indiae.

20. *polytrichoides*, culm. compressis

setaceis, spicis terminalib. solitariis subnutantibus 1-andris. Retz. obs. 4. p. 11. Rumph. amb. 6. p. 17. t. 7. f. 1. Hab. in pascuis depressis subulis Zeylonae.

21. *acicularis*, culm. quadrangulo nudo setiformi, spica terminali ovata bivalvi, seminibus nudis. Lin. Flor. dan. t. 287. Moris. s. 8. t. 10. f. 37. Hab. in humidis inundatis ericetis, etiam in Amer. ¶

22. *fluitans*, culm. teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido. Scheuch. t. 7. f. 20. Moris. hist. 3. p. 230. s. 8. t. 10. f. 31. Pluk. alm. t. 35. f. 1. β. *stolonifer*, culmo canaliculato, basi folioso, spica terminali bivalvi subbiflora. Roth. in Usteri Neu. Bot. Annal. 4. p. 30. Hab. in ulis. An styl. 3 fidus in β?

23. *compressus*, culmo teretiusculo nudo, spica compressa ex spiculis pluribus subdistichis composita, involucri. monophyllo. S. Caricis Retz. Willd. Sp. p. 292. *Schoenus compressus* L. Leers. t. 1. f. 1. Hab. in pratis, et turfosis. Sem. basi satis cinctum.

\*\* Culmo tereti polystachyo.

24. *fragrans*, culmo tereti striato nudo, spicis ovatis pedunculatis inaequalibus, terminalib. umbellatis. Flor. Peruv. 1. p. 47. Hab. in nemorum runcationib. Pillao. Rad. fascic. fibrosa odoratissima. Fol. setacea, pubescentia. Stigm. 3.

25. *glomeratus*, culm. nudo teretiusculo, umb. glomerata, involucri diphylllo brevi, floribus diandris. Retz. obs. 4. p. 11. Hab. ad agrorum margines Zeylonae. ¶

26. *arvensis*, culmis compressis striatis, umb. simplicibus, involucri monophyllo brevi. Retz. obs. 4. p. 11. Hab. in Zeylonae arvis.

27. *truncatus*, culm. tereti, capit. glomerato-globozo, involucri diphylllo, foliis linearibus. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. spei, cum 4 sequentibus.

28. *laciniatus*, culm. tereti, capit. triangulari, glumis ovatis, involucri diphylllo. Thunb. prod. 17.

29. *membranaceus*, culm. tereti, capit. angulato, glumis ovatis membranaceis, involucri triphylllo. Thunb. prod. 17.

30. *pilosus*, culm. compresso, capit. ovato, glumis lanceolatis ciliatis, involucri tetraphyllo. Thunb. prod. 18.

31. *Histrie*, culm. capillari, capit. subdistachyo, glumis acuminatis squarrosis,

involucro monophyllo. Thunb. prod. 17. Hab. in Cap. b. spei.

32. *domingensis*, culm. tereti nudo altissimo, flor. corymbosis, pelliculis umbellatis simplicibusque, spic. teretiusculis, involucri corymbum aequante. Hab. in St. Domingo. Culm. 4-dripetalis et ultra, pro parte tenuis. Fol. radicalia canaliculata laevissima, basi spadicea; spic. brunneae oblongae, squam. obtusis.

33. *lacustris*, culm. tereti elongato nudo, spicis ovatis sessilib. pedunculatisque terminalib. L. Willd. Sp. p. 266. Mich. Flor. Amer. t. p. 131. p. minor involucri rigidioribus pungentib. Roth. germ. p. 57. Flor. dan. t. 454. Hab. in Europa, Canada et Barbaria, aquis stagnantib. Caul. sursum attenuatus, 2-3 pedalis.

34. *Holoschoenus*, culm. elongato tereti nudo, spicis subglobosis pluribus glomeratis pedunc. sessilibusque, involucri diphyll. inequali mucronato Pluk. Phyt. t. 40. f. 4. Roth. Beyträge p. 86. Scheuch. t. 8. f. 2, 3, 4 et 5. Hab. in Europa australi, et in paludib. Algeriae.

35. *australis*, culm. tereti nudo, capit. laterali sessili, bractea reflexa, fol. canaliculatis. Syst. Veg. 85. Pluk. Phyt. t. 40. f. 5. Obs. cl. Roth. l. c. et Smith Flor. brit. t. p. 53. hunc et sequentem pro varietate prioris habent. Culmi laeves, vix pedales.

36. *romanus*, culm. tereti nudo, capitulo laterali sessili conglobato, bractea reflexa. Jacq. aust. 5. p. 23. t. 448. Scheuch. gram. 171. t. 8. f. 6. Hab. in Galloprovincia, Sibiria et Romae. Obs. Huic culmi filii crassitie; Sc. holoschoeni vero crassi ut in S. lacustri et apice pungentes. Lin.

37. *nodosus*, culmo compresso nullo, capitulo glomerato mucronato. Roth. gram. 12. t. 8. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei.

38. *radiatus*, culm. tereti, capitulo hemisphaerico, involucri polyphyllo. Thunb. prod. 18. Schoenus radiatus. Lin. suppl. 101. Hab. ad Cap. b. spei. Culmus aphyllus palmaris striatus. Folia linearia canaliculata. Semina absque pappo.

39. *setaceus*, culm. nudo folisque setaceis, spic. lateralib. subgeminis sessilibus. Flor. dan. t. 311. Leers herb. n. 35. t. 1. f. 6. Hab. in uliginosis. Plant. tenera, minuta. Spicula non terminal. uti vult Linnaeus, sed sub apice culmi laterales. Sem. nuda.

40. *supinus*, culm. tereti nudo, spicis sessilibus in medio culmo glomeratis. Dalib.

paris. 16. Roth. germ. II. p. 58. fol. rotundo teretibus. Tournef. inst. 528. Hab. in Gallia et in Murcia.

41. *natans*, culm. compresso foliis flexuoso-erecto, spic. 2-lateralibus. Thunb. prod. 17. Hab. in aquis Cap. b. spei.

42. *vaginat*, culm. filiformi, capit. lateralibus alternis involucri brevioribus. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. spei.

43. *tristachyos*, culmo capillari capit. tristachio laterali, glumis integris, involucri diphyll. Thunb. prod. 17. Lin. suppl. 103. Roth. 48. t. 13. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. An involucri potius 1-phyllum?

44. *uncinatus*, pilosus, culm. tereti folioso, spicis in capitulum conglomeratis terminalibus axillaribusque. Willd. Sp. p. 300. Pluk. 178. t. 190. f. 7. Hab. in India. Culm. biuncialis. Squamae mucronatae uncinatae elevato-nervosae. W.

45. *aristatus*, culm. striato tereti folioso, panic. terminali diphylla, spicul. ovatis squarrosis - echinatis. Willd. l. c. Scirpus pilosus. Retz. obs. 6. p. 19. Hab. in India.

46. *autumnalis*, culm. ancipiti nudo, umb. decomposita, spiculis ovatis. Mant. 180. Hab. in Virginia et Jamaica. Culmi palmares, compressi, altero latere subcarnati. Facies Junci pilosi.

47. *diphyllus*, culm. semicylindricis striatis diphyllis, umb. composita involucri diphyllio longiore. Retz. obs. 5. p. 15. Hab. in Tranquebaria.

48. *fastigiatus*, culm. filiformi, capitulo convexo compresso, glumis eximis mucronatis, involucri nullo. Thunb. prod. 18. Hab. in Cap. b. spei.

49. *globulosus*, culm. compresso nudo, panic. terminali, spicula unica sessili; pedunculatis pluribus globosis Retz. p. 19. obs. 6. Hab. in India.

50. *globiferus*, culm. nudo tereti, umb. terminali composita, capitulis globosis, ex spiculis pluribus arcte congestis. Lin. suppl. 104. Hab. in Tenariffa. Culm. aphyllus, terminatus spatha. Pedunc. terminati globulis ex spicis brevissimis congestis. Hi circa basin emittunt novos radios globiferos, iterum similiter dividendos, unde inflorescentia ex umb. basi proliferis constat. Lin.

51. *capillaris*, culm. nudo folisque capillaribus, spicis pedunculatis tenuis, intermedia sessili. Mant. 321. Tur. Ze l. 108. t. 47. f. 2. Foliol. setaceum sub umb. spicis longius.

\*\*\* *Culmo triquetro, panicula nuda.*

52. *trispicatus*, culm. angulato nudo, spicis terminalibus ternis sessilibus nullis. Lin. suppl. 103. Thunb. prod. 17. Hab. ad Cap. b. spei. Folia vix ulla, nisi squamae ferrugineae radicales. Involucrum polyphyllum, foliis subulatis brevissimis.

53. *lateralis*, culm. triquetris nudis, spicis subternis lateralibus, involucro monophyllo brevi. Retz. obs. 4. p. 12. et 5. p. 16. Hab. in Zeylona.

54. *triqueter*, culm. triquetro nudo, spicis lateralib. subsessilibus pedunculatisque, mucronem rectum aequantibus. Lin. Mant. 29. Willd. Sp. p. 302.

α. *S. trigonus*, culm. trigono nudo, spicis lateralib. ovatis fasciculatis sessilib. pedunculatisque, mucrone erecto. Roth. Beyträge 2. P. 60. *S. triquetris* Lin. Willd. Sp. pl. 1. p. 302. Hab. in Europa australi ad paludes. Gluma calycina corollas aequans. Ro h.

β. *S. triquetris* (triangularis), culm. triquetro nudo, spicis lateralib. sessilib. ovali-acuminatis, mucrone erecto Roth. l. c. p. 61. *S. mucronatus*. Roth. Flor. germ. Pollich. Cresc. cum prior. Spicae duplo acutiores quam praecedentis. Gluma corollis duplo fere major. Roth.

55. *mucronatus* (*tricarinatus*), culm. trigonulo acuminato, spic. lateralib. ovatis sessilib. mucrone horizontali. Roth. l. c. Willd. Sp. l. c. Hab. rarius in stagnis. Omnib. in partibus crassior a antecedentibus. Caul. mollis, semen nigrum. Micheli gen. P. 47.

56. *americanus*, culm. acute triquetro nudo, spiculis sessilibus conglomeratis, oblongo-ovatis mucrone brevioribus. *S. triquetris*. Michaux Flora 1. p. 20. Hab. in Carolina inferiore. Ab Europaeo diversus videtur. Spiculae majores.

57. *dichotomus*, culm. triquetro nudo, umbella decomposita, spicis ovatis, dichotomiae sessilib. L. Flor. zeyl. 40. Rothb. Pluk. alm. 1. 1. 116. f. 3. Hab. in India, Arabia et Aegypto.

58. *annuus*, culmo triquetro nudo multifloro, involucro diphylo, umbel. simplici spicis solitariis peduncul. intermedia sessili Allion. Pedem. 2. p. 277. t. 88. f. 3. Desfont. Atl. 1. p. 51. Hab. in Helvetia, Pedemontano et Barbariae agris. Culm. plures ex una radice. Spic. ovato-acuminatae, unica in centro umb. selet. A.

59. *echinatus*, culm. triquetro nudo, umb. simplici, spicis ovatis. Fl. zeyl. 38.

Pluk. alm. 179. t. 91. f. 4. Hab. in India utraque.

60. *retrofractus*, culm. triquetro, umb. simplici, spicarum flosculis retrofractis. Sp. pl. Pluk. phyt. 415. f. 4. In Virginia. T

61. *ferrugineus*, culm. triquetro subnudo, involucri longitudine paniculae ciliatis. Willd. Sp. 1. p. 304. Schoenus polymorphus. Rothb. gram. 67. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 36. t. 77. f. 2. Hab. in Jamaicae paludibus et in siccis. T

62. *pubescens*, fol. radical. angustis, umbel. terminali sparsa spicul. crassiusculis ovatis, squamis subpubescentib. ovalibus. Mich. Flora. p. 31. Hab. in Carolina et Georgia.

63. *castaneus*, fol. radicalib. angustis, erectis, culmo subtereti striato, umbel. terminali bracteis involucreta, spicul. subrotundo-ovatis, squamis suborbiculatis. Michaux. l. c. Squamae nitentes, badiac. Hab. in Florida.

64. *Michauxii*, fol. radical. planis, culm. nudo subarcepiui, umb. composita laxa, spicul. oblongo-ovatis: squamis lanceolatis, carina prominente discoloris in mucronem desinente. *S. mucronulatus*. Mich. p. 32. Hab. in Carolina montib. Sem. nudum. Styl. trifidus.

65. *spadicus*, culm. semitereti nudo retrosum scabro, umbel. composita, spic. oblongis dichotomis sessilib. involucre brevibus. Vahl. Eclog. Lin. Willd. Sp. 1. p. 305. Hab. in America meridionali, Jamaicae fluviis.

66. *miliaceus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis subglobosis parvis intermediis sessilib. involucre setaceo. Sp. pl. 75. Retz. obs. 5. p. 16. Rothb. p. 57. t. 5. f. 2. Hab. in India Pedunc. dichotomi. Culm. tenuis. Spicae pedunculatae, et solitariae sessiles in ramificationibus umbellae, minutissimae ut semina Milii. Lin.

\* *bengalensis*, culm. tenni nudo, umb. supradecomposita, involucro tetraphyllo, spicul. intermediis sessilib. ovatis (minutis): squamis concavo-carinatis mucronatis. Communis a cl. Richard, qui cum ex Bengalica accepit. An diversa species?

67. *maritimus* (*riparius*), culm. triquetro, panic. globata foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata, involucro polyphylo Hab. in lacub. et fossis. 2-3 pedalis.

β. *macrostachyus*, culm. acute triquetro folioso, bracteis plurib. longissimis,

spic. sessilib. pedunculatisque crassis ovatis squamis subaristatis. Michx. Flor. p. 32. Hab. in Carol. paludib. salis.

68. *compactus*, minor, spiculis omnibus sessilib. squamis trifidis, involucri diphyllo. Kroecker Flor. Siles. t. 15. Flor. dan. t. 937. Hab. in uliginosis subexsiccatis. Tum ob locum, quam parvitatem ab antecedente diversus.

69. *grossus*, culm. triquetro nudo, umb. supradecomposita, spicis pedicellatis, involucri triphylo lanceolato-subulato longissimo. Lin. suppl. 104. Hab. in India. Culmus orgyalis. Involucrum foliol. unico longissimo. Simillimus *S. miliaceo*, sed magnitudine diversus. L.

70. *Luzulae*, culm. triquetro nudo, umb. foliosa prolifera, spiculis subrotundis. Lin. Pluk. mant. 97. t. 417. f. 3. Hab. in India. Involucrum universale polyphyllum: fol. ensiformib. umb. longioribus; partialia vix ulla. Capit. subrotunda, glomerata ex spiculis subrotundis.

71. *sylvaticus*, culm. triquetro folioso, umb. foliacea, pedunc. nudis supradecompositis dichotomis, spicis confertis. Flor. dan. t. 307. Leers. t. 1. f. 4. Michx. Flor. t. 1. p. 33. *β. radicans*, culm. triquetro folioso, umb. foliacea, culmis sterilibus deflexis apice radicanlib. Schkuhr. Hoffm. germ. p. 26. Hab. in sylvarum fossis. T.

72. *aestivalis*, culm. depressis triquetris nudis, umb. compositis involucriatis. Flor. monandris. Retz. obs. 4. p. 12. Hab. in fundo fluviorum exsiccatorum Zeylonae. T.

73. *squarrosus*, culm. triquetro nudo folisque setaceis, spicis ternis sessilibus ovatis squarrosis. Mant. 181. Rottb. p. 49. t. 17. f. 5. Hab. in Ind. orientali. Involucrum diphyllo; spicae squam. subulatis; exstantibus, basi nodosis, valde imbricatis.

74. *dipsaceus*, culm. setaceis triquetris, umb. simplici, capitulis oblongis squarrosis, flosc. subulatis recurvis diandris, germine echinato. Rottb. gram. 56. t. 12. f. 1. Hab. in India. Parvus. Involucrum 3-4 phyllo.

75. *junciformis*, culm. nudo filiformi subtrigono, paniculae spiculis sessilibus pedunculatisque, involucri diphyllo. Retz. obs. 6. p. 19. Hab. in China. -

76. *michelianus*, culm. triquetro, capitulo globoso, involucri polyphylo longo. Lin. Bot. Annal. t. 1. p. 20. t. 2. Desf. atl. t. 1. p. 51. Till. pis. 51. t. 27. f. 5. Buxb. cent. t. p. 34. t. 55. f. 1. Hab. in Europa Aegypto et in Marocco.

77. *ciliaris*, culm. triquetro folioso, umb. sparsis, squamis calycinis aristis ciliatis. Mant. 182. Rottb. t. 17. f. 1. *S. pubescens*. Desf. Atlant. t. p. 52. Schousboe Maroc. ed. germ. p. 19. Hab. in India orientali et in Barbaria. Culmi palmares laxi. Spicae ovatae, hirtae pilis raris. Involucrum loco saepe foliola 1. seu 2. parva.

\*\*\*\*\* *Culmo triquetro, Capitulo terminali.*

78. *hottentottus*, culm. triquetro folioso, capitulo globoso, squam. lanceolatis hirtis. Lin. Mant. 182. Thunb. prod. 18. Ad Cap. b. spei locis paludosis. Folia caulina, 3. remotissima. Involucrum capituli triphyllum.

79. *antarcticus*, culm. triquetro nudo folisque filiformib. capitulo globoso, involucri triphylo. Mant. 181. Thunb. prod. 17. Scirpus barbatus, vaginis suboppositis ora superiori barbatis. Rottb. gram. 52. t. 17. f. 4? Pluk. alm. 179. t. 299. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei et in Guinea. Spicae ovatae, trifariam imbricatae triquetrae.

80. *argenteus*, culm. setaceis triquetris, involucri tetraphyllo longissimo, spic. cylindricis plurimis in capitulum glomeratis. Rottb. p. 51. t. 17. f. 6. Rheed. mal. 12. p. 101. Hab. in India.

\* 81. *monander*, culm. triquetro, involucri triphylo longo, capitulo sessili glomerato, flosc. monandris. Rottb. p. 50. t. 14. f. 3. Hab. in India. Spic. ovato-teretes.

82. *cephalotes*, culm. triquetro nudo, capitulo ovato squarroso, involucri triphylo longo. Lin. Willd. Sp. t. 1. p. 311. Houttuyt t. 88. f. 3. Hab. in India.

124. **TRICHOPHORUM**. Spicul. subovatae, squamis undique imbricatis. Sem. setulae capilliformes (nec lanam densam referentes) denum longe exserte numero definito sex. (Genus intermedium inter Scirpura et Eriophorum.)

1. *cyperinum*, culmo triquetro folioso, panicula decomposita, spiculis confertis ovatis. Scirpus Eriophorum. Michx. Flor. t. 1. p. 33. Eriophorum cyperinum Lin. Willd. Spec. t. 1. p. 313. Hab. in Amer. boreali. Gram. altum.

2? *lineatum*, culm. folioso paniculato, spicul. ovato-oblongis; squamis lanceolatis subcarinatis. Scirp. lineatus. Michx. t. 1. c. Hab. in Carolina. Priori simile.

3. *alpinum*, parvum, culm. nudo angulato spicato. Erioph. alpinum. Lin. Flor. dan. t. 620. Sowerb. engl. bot. t. 311. Hab. in Europae subalpinis.

♂ *hudsonianum*, majus, culm. nudo triquetro, fol. canaliculato - setaceis. Michaux. p. 34. Hab. ad sinum Hudsonis.

125. ERIOPHORUM. Glumæ paleaceæ undique imbricatæ. Sem. lana densa longissima cinctum.

\* *Monostachya*.

1. *vaginatum*, culmis vaginatis teretibus, foliis triquetro - canaliculatis, spica ovata. Roth. N. Bot. Beyträge, t. p. 95. Willd. Spec. t. p. 312. Flor. dan. t. 236. Hab. in montosis uliginosis. Glum. acuminatæ.

2. *Scheuchzeri*, culm. basi vaginatis teretib., fol. tereti - canaliculatis, spica rotunda. Roth. l. c. Scheuchz. Agrost. app. t. 7. E. capitatum, Hoffm. Flor. germ. ed. 2. p. 26. Hab. in alpib. rhaeticis et Salisburg. Glum. obtusar.

\*\* *Polystachia*, culm. foliosis teretibus.

3. *virginicum*, fol. angustis planis, spicis pluribus sessilibus. Willd. l. c. p. 373. Roth. l. c. p. 96. Hab. a Canada ad Carolinam. Flor. diandri Lana fulvescens, Mich.

4. *vulgare*, (polystachyum L.) fol. planis: mucrone triquetro, spicis pedunculatis nutantib. involucreto subaequantib. Leers herb. t. 1. f. 5. Engl. bot. t. 563. Cresc. in paludosis. Involucr. basi membranaceo-dilatatum, 2-3-phyllum.

5. *angustifolium*, fol. canaliculato-tri-quetris, spicis pedunculatis, seminib. ovatis. Roth l. c. p. 94. E. *polystachyon* Huds. Curt. Flor. lond. t. 9. Involucr. 3-phyll. foliol. linearia: unico spicis multo longiore. Cum priore; etiam in America crescit.

6. *gracile*, fol. triquetris sursum canaliculatis, spicis pedunculatis, sem. linearibus, involucreto panicula uplo brevior. Roth. p. 95. Ejusd. Cat. 2. append. E. triquetrum. Hoppe. Hab. in Palatinatu et alpib. salisburgensib.

126. VAGINARIA. Spica ovata squamis undique imbricatis. Stigm. 3. Seminibus involucrellum (Perispermium) alternatim tripaleaceum et trisetum.

1. *Richardi*, Fuirena *scirpoidea*, culmo aphylo vaginato, spica unica:

squamis lanceolato - spathulatis. Michaux, Flor. p. 38. Hab. in Florida. Obs. Characteres hujus sequentiumque, ab eo constitutorum generum, concinnavit celeb. Richard.

127. FUIRENA. Squamæ mucronatæ in spiculas undique imbricatæ. Sem. involucrellum latum, paleaceforme, sæpius aristatum.

1. *umbellata*, umbellis compositis, spicis oblongis aggregatis sessilibus, fol. lanceolatis. Vahl. Eclog. Amer. 2. Rottb. gram. p. 70. t. 19. f. 3. F. *paniculata*. Lin. suppl. p. 105. Hab. in utraque India.

2. *obtusiflora*, umb. subcompositis, spic. cylindricis utrinque obtusis squarrosis. Vahl. l. c. In Amer. meridionali. Fol. glabra? An a sequente diversa?

3. *squarrosa*, fol. ciliatis, spic. squarrosis, squamis petiolato-spathulatis. Michaux. Flor. t. p. 37-38. Hab. in Georgiae et Carolinae paludosis. Squamæ mucrones longi strigososquarrosi.

4. *canescens*, subtomentoso-canescens; spicul. glomeratis, squamis mucrone erecto. Richard. Hab. in Africa.

128. HYFOLYTRUM. Spicula squamis undique imbricatis. Sem. involucrellum glumam 3-4-valvem mentiens. Stam. 2-3. Stigm. 1-2.

1. *latifolium*, maximum glabrum, fol. latis trinerviis, corymbo decomposito. Hab. in India. Stam. 2. Rich.

2. *senegalense*, spicul. pluribus capitatum congestis, squamis subacuminatis. Hab. in Senegal. Stam. 2. Stigm. 3. Rich.

3. *gracile*, fol. angustis, caule debili, spicul. 3. sessilibus subgloboso-ovatis, squamis spathulatis. Richard. Stam. 1. Stigm. 2.

129. DIPLASIA. Spica squamis undique imbricatis. Involucrellum glumam 4-valvem mentiens. Stam. 7. Stigm. 2.

1. *Karataefolia*, fol. longissimis carinis marginque aculeatis, umb. decomposita. In Gujana. Fol. Bromeliae Karatas. Richard.

130. LEPIRONIA. Spicul. squamis orbiculatis cartilagineis. Sem. involucrellum 16-paleaceum. Stam. 4-6.

1. *mucronata*. Hab. in Malagascar.

**Aphylla.** Culm. nodosus infra apicem *stachyus*. Spica ovato-oblonga. Rich.

**131. CHRYSITRIX.** Spica imbricata squamis coriaceis setaceis. *Stam.* multa, inter singulas squamas singula.

1. *capensis*, Lin. fl. gen. gram. p. 27. f. 1. 2. Hab. ad. Cap. b. spei. Spica lateralis. An antecedens luxus generis?

\*\* **GRAMINA.** Flor. glumacei, 3-andri.

*Rad.* fibrosa. *Culmi* ut plurimum fistulosi, articulati, simplices aut basi ramosi. *Fol.* linearia, vaginantia, vagina latere fissili, apice membrana albidula distincta, quae *ligula* aut stipula nuncupatur. *Flor.* spicati, racemosi, plerumque paniculati, rarissime foliis involucri (uti in priore familia); nonnulli saepe abortivi; alii polygami; pauci monoici. *Stam.* in plurimis tria (qualia gramina hac in serie solummodo enumerantur), in nonnullis sex (v. l. Clas. Hexandrium), aut plura. *Styl.* communiter duo, in quibusdam 1. plerumque tamen bifidus. In unico tantummodo granine stigmata tria observata sunt. Glumae interiores in multis semen maturum incrustant et cum eo indurantur.

MONOGYNIA.

**132. LYGEUM.** Flores intra spatham convolutam gemini. *Cal.* basi in tubum 2-locularem villosum conerescens, 2-valvis.

1. *Spartum*. Lin. Willd. Sp. 1. p. 316. Richard in Act. Soc. Hist. nat. Paris. p. 28. 1. 3. Hab. in Hispania. T. Flor. omnium graminum maximi, interdum 3 intra involucrium. *Styl.* longus.

**133. CORNUCOPIÆ.** Involucr. cyathiforme. *Cal.* 1-phyllus, 2-partitus. *Cor.* 1-valvis, superne hinc fissi. *Styl.* brevis; *Stigm.* 2. (raro 1.) longissima. (Richard.)

1. *cucullatum*, spica mutica, involucrio crenato. Lin. Smith spicil. bot. t. 14. Willd. l. c. p. 313. Hab. in Oriente. ☉

2. *alopecuroides*, spica aristata. Lin. Mant. p. 29. Hab. in Italia. Similis *Alopec. pratensis*, vagina supremi fol. ventricosa. Involucr. hemisphaericum integerrimum. Lin.

**134. CENCRHUS.** Involucr. laciniatum, echinatum 3-4-florum. *Cal.*

2-valvis, 2-florum. *Cor.* 2-valvis, mutica. *Styl.* 2-fidus.

1. *lappaceus*, paniculae patentis ramis simplicissimis, cor. retrorsum hispidis, cal. trivalvibus bifloris Lin. Willd. Spec. 1. p. 316. Hab. in India. *Fol.* cordato-lanceolata. Involucrio 6? Hujus generis non videtur. An Panicum?

2. *capitata*, spica ovata simplici. Col. ecph. 1. p. 340 t. 318. f. 1. Barr. rar. t. 28. f. 1. *Echinaria capitata*. Desf. atl. 2. p. 382. Hab. in Gallia, Italia et Barbaria. ☉

3. *echinatus*, spica oblonga conglomerata, involucr. subgloboso 10-partito. Schreb. gram. g. t. 23. f. 1. Cav. ic. 5. p. 39. t. 462. Pluk. alm. 177. t. 92. f. 3. Hab. in Americae et Barbar. arvis.

4. *tribuloides*, spica glomerata. glumis femineis globosis muricato-spinosis hirsutis. L. Michaux Fl. 1. p. 61. Sloan. jam. 30. hist. 1. p. 108. t. 65. f. 1. Moris. hist. 3. p. 125. s. 8. t. 5. f. 4. Hab. in Virginiae maritimis. ☉

5. *caliculatus*, culm. simplici erecto, spica glomerata, involucrio polyphylo setaceo. Cav. l. c. 1. 463. Hab. in Americor. insula Bahio. Fl. aestate. Involucr. foliola subduodecim setulis rigilis, tomentosa, apice glabra. C.

6. *spinifex*, culmo ramoso, fol. brevibus cordato-lanceolatis, involucr. integerrimo echinato. Cav. ic. 5. p. 38. t. 461. Hab. in regno chilensi, et in Montevideo. Flor. januario.

7. *rufescens*, fol. glabris, spica elongata, involucr. confertis setiformibus (rufescentib.) inferne villosis, cal. sub-2-floro. Desf. atl. 2. p. 388. Hab. in arenosis prope Mascar.

8. *hordeiformis*, fol. retrorsum asperis, involucr. setosis flore 4-plo longioribus, inferne (albis) villosis, cal. 1-2-floro. Desf. l. c. (C. *asperifolius*). Willd. sp. p. 318. *Alopecurus hordeiformis*. Lin. Hab. in Asia et Africa.

9. *geniculatus*, racemo spicato simplici, flor. involucrio polyphylo scabro, culmo geniculato. Thunb. prod. 24. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *purpurascens*, racemo spicato simplici, flosculis circumvallatis aristis longissimis, culmo erecto. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 329. Willd. l. c. In Japonia. Arist. purpureae.

11. *frutescens*, capit. lateralibus sessilibus, fol. mucronatis, caule fruticoso.

Lin. Alpin. exot. t. 104. Hab. in Armenia.  $\frac{1}{2}$

135. PENNISETUM. *Involucr.* multisetum. *Cal.* 2-valvis, 2-florus: flor. altero hermaphrodito; altero masculo (rarius neutro) utroque sessili. (Flor. spicati polygami. In plerisque speciebus involucr. heterochæton, setisque nonnullis inferne plumosis.)

1. *typhoideum*, fol. latis glabris, spica crassa cylindrica, involucr. pedicellatis pennatis. Holcus *spicatus* L. Pluk. alm. t. 32. f. 4. Hab. in India. Styl. villosus.  $\odot$

2. *setosum*, fol. basi villosis, spic. subsessili imbricata, involucr. sessilibus: setis nonnullis longissimis, stylo bifido. Cenchrus *setosus* Swartz. Flor. Ind. occid. t. p. 211. secundum quem Panicum *polystachium* L. eadem species est. Hab. in Ind. occid. solo cretaceo.

3. *cenchröides*, culm. geniculato, involucr. alternis dupla flor. longiusculine: setarum una subulato-paleacea longiore. Cenchr. *ciliaris* L. Gisecke ic. t. 23. Desf. atl. 2. p. 387. Hab. ad Cap. bon. sp. et Barbariae arenosis. Fol. villosa.  $\odot$

4. *orientale*, fol. subsetaceo-subulatis, involucr. sparso stipitato: setis parvis flore longioribus plumosis. Cenchrus *orientalis*. Willd. (ined.) Hab. in Oriente.

5. *violaceum*, caul. ramoso, fol. vaginisque pilosis, spic. cylindrica, involucr. sessilibus flor. æquantibus simplicibus. Panicum *violaceum*. Lam. ill. gen. 1. p. 169. Hab. in Senegal.

*Obs.* Characterem hujus generis, nec non specierum differentias communicavit clar. Richard. Ob affinitatem cum *P. setoso* forte huc quoque referendus *Alopecurus indicus*. L.

136. SESLERIA. *Cal.* 2-5-florus. *Cor.* 2-valvis, apice dentata. *Stigm.* subglandulosa. (Flor. spicati, sæpius cærulei basi involuerati.)

1. *cærulea* (*calcaria*), spica ovato-oblonga, fol. planis, involuero integro. Cynosurus *cæruleus*. L. Willd. Sp. 1. p. 414. Ardun. spec. 2. p. 18. l. 6. Hab. præsertim in montosis calcareis, et in præsiis.

2. *sphaerocephala*, spica globosa (albida), involucr. ovalis subdentatis, cor. acuminatis. Hoffm. germ. ed. 2. p. 49.

sub Cynosuro. Hab. in Germaniæ sulbalpinis. Carinth. Tyrol.

3. *microcephala*, involucr. subdentato, cor. aristatis, spicis subrotundis. Hoffm. l. c. Cynos. *sphaerocephalus*. Wülf. ap. Jacq. Misc. 2. p. 71. Hab. cum priore.

4. *disticha*, involucr. nullo, spica disticha. *Poa disticha*. Wülf. Jacq. ic. v. 1. t. 19. Fol. setacea. In Carinthia, etiam in Pyrenæis crescit.

137. LIMNETIS. *Spica* lateriflora: flosculis subhifariam imbricatis. *Cal.* 2-valvis: valv. 1. minore. *Cor.* 2-valvis, mutica, compressa, carinata. *Styl.* longus. Nect. o. (Flor. paniculati, stricti.)

1. *pungens*, fol. convolutis pungentibus, spicis paucis appressis pubescentibus, cal. carinis inermibus. *Dactylis stricta*. Smith. Flor. Brit. Engl. bot. t. 380? *Spartina stricta*. Roth N. Beyträge p. 101. Hab. in Gallia et Anglia, ad littora maris.

2. *juncea*, fol. distichis breviusculis setaceo-convolutis, spicis paucis remotis patulis, cal. acuminati carinis asperis. *Trachynotia juncea*. Michaux. Flor. 1. p. 64. Hab. in siccis maritimis Carolinae Georgiæ.

3. *cynosuroides*, subglauca, fol. longissimis, spic. plurimis alternis secundis, cal. subaristato-acuminato carinis aculeatis. *Dact. cynosuroides*. Lin. Hab. in Amer. boreali.

4. *polystachia*, fol. latis, spicis plurib. undique versis longis linearibus: carinis aculeatis. *Trachynotia*. Michaux l. c. Hab. in inundatis maritimis Nov. Angliæ.

*Obs.* Horum graminum ad oras maris crescentium, unde nomen inditum, differentias observationibus cl. Richardi debeo.

338. NARDUS. *Cal.* 1-florus, 1-valvis. *Cor.* 1-valvis, inclusa. *Stigm.* 1. (Spica flor. alternis sessilibus.)

1. *stricta*, spica setacea recta, flor. secundis. Flor. dan. t. 1022. Willd. spec. 1. p. 314. Schreb. gram. t. 2. Leers t. 1. f. 7. Hab. in arenosis et collibus aridis. Var. magnitudine.  $\frac{1}{2}$

2. *aristata*, spica setacea, calic. aristatis, (Lin.) corollis lineis inæqualiter pedunculatis aristatis, squamula suffultis. Vill. delph. 2. p. 58. t. 2. Eocc. mus. 2. p. 74.



.57. Hab. in Europa australi. Spica subente tenuissime pilosa.

3. *ciliaris*, spica incurva ciliata. Hab. in India. Folia graminea plana. Spica dimidiata. Lin.

139. ORYZOPSIS. Cal. 1-florus, 2-valvis, latus, obovalis. Cor. coriacea, subtereti-ovata, 2-valvis: valv. exteriore apice aristata. Nect. 2-paleaceum lineare. (Richard.)

1. *asperifolia*, culm. subnudo, fol. subpungentibus asperis. Michaux Flor. 1. p. 51. t. 9. Hab. per tractus montium a Sinu Hudsonis ad Quebec.

D I G Y N I A.

140. MATRELLA. Cal. o. Cor. cartilaginea s. indurata, compressa, mutica, 2-valvis: valv. demum connata?

1. *junceae*, Agrostis Matrella. Lin. Willd. sp. pl. 1. p. 36? A. juncea. Lam. ill. gen. t. 41. f. 2. Hab. in Malabarici mariis. Flor. subnitentes, 10-12 in rachi alternatim sessiles. Fol. disticha, punctata.

141. MUHLENBERGIA. Cal. minutissimus, 1-2-valvis. Cor. 2-valvis, basi pilosa: valv. exteriore apice aristata. (Flor. paniculati.)

1. *diffusa*, culmo debili ramoso foliisque glabris: panicula coarctata, cal. 1-valvi. Richard. Roth. N. bot. Beiträge 1. p. 96. Dilepyrum minutiflorum Michaux. Flor. amer. bor. 1. p. 40. Hab. in apricis et pratis region. Kentucky in Amer. bor.

2. *aristata*, culmo firmo subsimplici foliisque pubescentibus, panicula laxa, cal. 2-valvi, arista longissima. Richard. Michaux l. c. M. erecta, culmo erecto, fol. lanceolatis: ligula oblonga barbata, panic. laxa. Roth. l. c. p. 97. Hab. in umbrosis Georgiae et Carolinae. T.

142. TRICHODIUM. Cal. 2-valvis: valvul. subaequalibus acutis: carina spinulosa. Cor. brevior, 1-valvis mutica. Stigm. subsessilia hispidula. (Flor. paniculati.) Richard.

1. *laxiflorum*, culm. erectis, fol. angustis breviusculis: vagina subaspera. Mi-

chaux Flor. amer. bor. 1. p. 42. t. 8. Cornucopiae hyemalis, Walter. Hab. in humidis et pratis sinus Hudsonis. ♂.

2. *decumbens*, culm. decumbentib. fol. patulis: vagina laevi. Michaux l. c. C. perennans. Walt. Agrostis anomala Willd. Sp. 1. p. 30. Hab. in Virginiae maritimis, ad ripas. ♂.

143. LEERSIA. Cal. o. Cor. 2-valvis, clausa: valvul. compresso-navicularibus, muticis.

1. *Oryzoides*, panicula effusa, spiculis triandris patulis, glumis oblongo-ovalibus, carina ciliatis. Willd. Sp. 1. p. 325. Swartz prod. 21. Michaux. p. 39. Phalaris oryzoides. Lin. Schreb. gram. 6. t. 22. B. l. virginica. Willd. l. c. Hab. in paludosis et ad margines fluvior. passim; etiam in America. Gram. asperum.

2. *lenticularis*, panic. ramis subsolitariis, spicul. imbricatis, glumis orbiculatis ciliatis majusculis. Michaux 1. p. 32. Hab. in paludosis Illinoisensib. in Amer. boreali.

3. *monandra*, panicula effusa, spicis remotis laxis, spiculis secundis subrotundis monandris, glumis laevibus. Swartz prod. 21. (j. Fl. p. 130. Hab. in Jamaicae nemorib. cretaceis. Vere.

4. *hexandra*, panic. effusa, spiculis alternis hexandris, glumis sublaevibus. Swartz prod. 21. Stigm. pallide purpurea. Hab. in Jamaicae aquis.

144. ZOYDIA. Cal. 1-valvis, carinatus. Cor. 1-valvis, membranacea.

1. *pungens*. Willd. in Nov. Act. Nat. cur. Berol. v. 3. Hab. in Malabarici mariis. Nardum refert.

145. MILIUM. Cal. 2-valvis, 1-florus, ventricosus. Cor. 2-valvis, brevissima. Stigm. penicillata, S. villosa.

1. *nigricans*, flor. paniculatis confertis, valvulis calycinis nitidis nigrescentibus, fol. ensiformibus longissimis. Flor. per. 1. p. 47. Collitur in Pillao, Cuchero ubi Maiz de Guinea audit. E seminib. torrefactis Peruviani farinam praeparant, ex qua potum et cibum conficiunt.

2. *capensis*, panic. capillari, calycib. acuminatis, cor. arista terminali incurva. Lin. mant. p. 185. Willd. Sp. 1. p. 358.

Hab. ad Cap. b. spei Cul. palmares. Fol. angusta subtus pilosa.

3. *punctatum*, panic. ramis simplicissimis, flor. alternis geminis secundis. Amoen. acad. 5. p. 392. Hab. in Jamaicae graminosis, udis.

4. *lentigerum*, panicula subspicata, flor. aristatis. Schreb. gram. 14. t. 23. f. 3. Vahl. symbol. 2. p. 18. Agrostis australis. Lin. Mant. 30. Gouan. hort. 36. t. 1. f. 2. Alopecurus ventricosus. Huds. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 6. Hab. Mospellii, in Anglia et Aegypto.

5. *compressum*, spicis subternis, flosc. alternis muticis rachi adpressis, culmo medio articulato-compresso, pedunc. longissimis. Swartz prod. 24. Fl. p. 183. Hab. in Jamaica et India occidentali. Sem. compressum. S. T.

6. *digitatum*, spicis digitatis subquaternis subsessilib., flosc. muticis appressis secundis. fol. margine carulaginato-serratis. Swartz. Flor. p. 181.

7. *cimicinum*, racemis digitatis, calyc. valv. exteriore ciliata. Mant. 184. Panicum Retz. Obs. 3. p. 9. Hab. in Malaharia. Flor. cum semine lapsi ob cilia cimicem quamdam referunt. Lam. enc. 1. p. 59. n. 19. In Jamaica, pratis aridis. ☉

8. *panicum*, spicis subdigitatis alternis patentibus filiformibus; flosculis secundis muticis pedicellatis trigonis. Swartz Flor. p. 179. Hab. in Jamaica. Distinctum a M. cimicino. L.

9. *effusum*, flor. verticillato-paniculatis dispersis muticis. Lin. Flor. dan. t. 1143. Leers. t. 8. f. 7. Hab. in nemoribus. T.

10. *confertum*, asperum, panicula coarctata, flor. coloratis muticis. Mill. dict. n. 4. Hab. in Helvetia et Gallia. Distincta species.

11. *globosum*, panic. patula, glumis muticis, pedicellis cingulo luteo. Thumb. jap. p. 49. Hab. in Japonia.

12. *caerulescens*, flor. paniculatis aristatis, aristis gluma breviorib. Schousb. magoc. 7. p. 34. Desf. atlant. t. p. 66. t. 12. In fissuris rupium Atlantis et circa urbem St. Crucis.

13. *paradoxum*, flor. paniculatis aristatis. Schreb. gram. t. 28. f. 2. Agrostis. Sauv. Mosp. 45. Hab. in Gallia meridionali, Carniola. Panicula alba. Semen nigrum.

14. *villosus*, panicula laxa, flosc. muticis, calycibus lanatis. Swartz prod. 24. Andropogon insulare. Lin. Amoen. acad.

5. p. 412. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 43. t. 14. f. 2. Hab. in Jamaica. ☉

15. *ramosum*, culmo ramoso, flor. paniculatis subulnatis hirsutis. Retz. obs. 6. p. 22. Hab. in India orientali.

146. AGROSTIS. Cal. 2-valvis, uniglumis, valv. acutis. Cor. 2-valvis. Stigm. longit. linaliter hispida, s. plumosa. (Flosc. patententes.)

\* *Aristatae.*

1. *Spica venti*, petalo exteriore arista recta stricta longissima, panicula patula. L. Willd. Sp. 1. p. 361. Leers herb. t. 4. f. 1. Hab. inter segetes. ☉

2. *interrupta*, petalo exteriore aristato, panic. attenuata coarctata interrupta. Vaill. 88. t. 71. f. 4. (bona.) Hab. in Europa australiori. Virescens. Aristae longiusculae.

3. *spicaeformis*, panic. spicaeformi, flosc. biaristatis: arista altera receptaculo inserta geniculata longiori, altera infra apicem corollae rectis, cor. hirsutis. Lin. suppl. p. 108. Hab. in Teneriffa.

4. *hirsuta*, panic. subspicata, culmo foliisque hirsutis, cor. dorso aristatis, apice bifidis. Lin. suppl. 108. Cresc. cum. priore.

5. *miliacea*, petalo exteriori arista terminali recta meliiori, flor. ovatis lacubus. Gouan. illustr. 3. Hab. in Hispania, Gallia et Sibiria. T.

6. *bromoides*, panic. simplici angustata, cor. pubescente: arista recta calyce longiore. Mant. 30. Gouan. illustr. 3. t. 1. f. 3. Hab. Mospellii. Cor. arista recta, scabra, calyce duplo triplove longior ut in Bromis. L.

7. *arundinacea*, panic. oblonga, petalo exteriore deorsum villosa, basi aristato, arista torta calyce longiore. Lin. Calamagrostis arundinacea. Roth. germ. t. 33. II. 89. Hab. in rupestrib. sylvis, glareosis juniperetis. Palleascens. T.

8. *Calamagrostis*, panic. incrassata, petalo exteriore toto lanato apice aristato, culmo ramoso. Hab. in Helvetiae, Veronae alpinis. Panic. densa.

9. *serotina*, panic. flosculis oblongis mucronatis, culmo obiecto fol. brevissimis. L. Mant. 30. Segu. ver. 3. p. 146. t. 3. f. 2. Hab. Veronae. Fol. brevia, vix articulis longiora, patentia.

10. *rubra*, panic. primo contracta: florente patentissima, petalo exteriore glabro. arista terminali tortili recurva.

Roth. germ. 1. 31. II. 81. Hab. in Anglia, Suceia vulgaris. Panic. rubescens.

11. *stricta*, panic. elongata stricta, cor. calyce minoribus, arista e basi petali, torilli, flore longiore. Willd. Sp. 1. p. 366. Hab. in America boreali. Affinis praecedenti. Fol. plana angusta linearia. Ligula lacera. Cor. tenera membranacea. W.

12. *ovata*, petalo exteriori ante apicem aristata; panic. ovata coarctata spiciformi. Forst. prod. n. 40. Hab. in nova Zeelandia.

13. *canina*, calycib. ovatis coloratis, arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. Leers. t. 4. f. 2. Smith. brit. 78. Hab. in pascuis graminosis. Arista setacea alba, medio notata geniculo fusco. L.

14. *alpina*, fol. setaceis, panicula coarctata; calycib. hispidiusculis coloratis; petalo exteriori truncato, arista dorsali geniculata. Leysser. halens. n. 61. ed. 2. p. 34. Scheuch. gram. prod. 22. t. 4. f. 1. Hab. in albis inque montibus Saxoniae. ☉

15. *rupestris*, fol. filiformi - setaceis, panicula patula, calycib. hispidiusculis patentibus coloratis, petalo exteriori arista dorsali geniculata flore duplo longiore. Willd. p. 369. Allion. pedem. n. 2161. Hab. in Helvetiae, Bohemiae, Italiae rupestribus. Flosculi stramineo-fusci nec violacei. W. ☉

16. *setacea*, cal. lanceolatis, cor. basi aristata: arista geniculata, fol. radicalibus setaceis. Smith. brit. p. 79. Curt. Flor. lond. t. 12. Agr. alpina. Withering. Hab. in Angliae ericetis aridis. Fol. glaucescentia.

17. *littoralis*, cal. lineari - lanceolatis aristatis, cor. nuda, arista subterminali recta, culm. decumbentibus. Smith. Fl. brit. 1. p. 78. Withering Flor. t. 23. Hab. in littoribus marinis luteis. Flor. angust.

18. *compressa*, panic. coarctata, calycib. aequalibus laevib. cor. infra apicem brevissime aristatis. Willd. A. *lubia*, cal. aequalibus laevib. cor. infra apicem mucronatis, fol. setaceis. Leers herb. t. 4. f. 4. Hab. in Germania.

19. *vincalis*, calycib. coloratis, petalor. arista dorsali longitudine fere calycis, culmis adscendentibus. Schreb. spicil. 57. n. 977. Hoffm. germ. 35. Hab. Lipsiae in agris, collib. passim. Var. flosc. muticis. Priori affinis ☉

☉ ? *gigantea*, panic. parte superiore patentissima, calycibus hispidis, petalo teriore glabro, dorso superne subaristato,

culmo erecto. Roth. Fl. germ. I. p. 31. Willd. l. c. Crescit ad ripas fluviorum. ☉

\* \* Muticae.

20. *capillaris*, panic. capillari patente flexuosa, calycib. subulatis aequalibus glabris coloratis muticis. Smith. ic. ined. fasc. 3. p. 54. t. 54. Willd. l. c. Agrostis capillaris. Lin. Sp. plant. ed. 2. p. 93. Hab. in Lapponiae albis, etiam in Lusitania secundum Swartz in bot. Journ. 2. p. 22.

21. *vulgaris*, panic. patente, ramulis divaricatis capillariis, cal. aequalibus, petalo interiore duplo brevioris retuso. Smith. brit. 1. p. 79. Hoffm. germ. ed. 2. p. 36. A. *hispida*. Willd. Spec. 1. p. 370. Ag. *capillaris* Auctorum. Leers. t. 4. f. 3.

☉. *pumila*. Lin., minor, culm. fasciculatis, sem. utriusque coarctatis inclusis. Lightf. Scot. ic. in titulo. v. 2.

☉. *sylvatica*, panic. coarctata, cal. aequalibus virgineis cor. brevioribus, locundatis (ustilago) duplo longioribus. Lin. vid. Steinbuch im Naturforscher (promtuarium germanic.) Fasc. p. 233. t. 5. Smith. l. c.

22. *stolonifera*, panic. coarctata, culm. ramoso repente, flor. congestis, cal. aequalibus lanceolatis pubescentibus. Smith. l. c. Martin Flor. rustica t. 120.

☉ ? *coarctata*, panic. contracta, cal. subaequalibus, cor. brevioribus obtusis hispidulis: fol. angustis Hoffm. l. c. 37.

☉. *dulcis*, panic. densa breviuscula interrupta, flor. fasciculatis subsessilibus.

☉. *gracilis*, caespitosa, culm. gracili subdecumbente, panic. in spicem cylindricam coarctata, flosc. glabris subnitidis. Hab. in arvis, pratis, sylvaticis, collibus. Obs. An recensitae varietates huc aut ad *albam* pertineant, aut distinctae species sint, determinare hactenus nequeo. var. ☉ sub nomine Agr. *dulcis Sibthorpii* hinc inde colitur, etiam e Silesia habeo. In var. ☉, quam circa Lugdunum Gallorum collegi, glumae glaberrimae sunt, sed pellicelli subincrassati hispiduli ut vere in A. *alba*.

23. *pyramidata*, panic. patente parva pyramidata, cal. cor. longioribus vaginis ore pilosis. Lam. Ill. gen. p. 161. Hab. in Amer. meridionali.

24. *barbata*, panic. contracta subapicata, cal. inaequalibus, vaginis barbatis. A. littoralis Lam. Ill. p. 161. Hab. in Amer. meridional. Rich.

*β. senegalensis*, ramis panicula longioribus. Lam. l. c. In Senegal.

*25. alba*, panicula laxa, calycibus muticis aequalibus, culmo repente.

*α. palustris*, panic. coarctata mutica, cal. aequalibus hispidiusculis, culm. repente. Huds. angl. 27. Flor. opaci subpurpureas. demum pallascunt.

*β. verticillata*, panic. subinterrupta, flor. fasciculatis subsessilibus nitidis, glum. muticis. Villers. Dauph. 2. p. 74. Flor. virescunt. Cacteris speciebus europaeis major. Hab. in pratis humilibus.

*26. diandra*, panic. elongata contracta, floribus subulatis muticis diandris, foliis convolutis. Retz. obs. 5. p. 19. Hab. in India.

*27. ciliata*, panicula mutica, gluma calycina angulata ciliata. Thunb. jap. 49. Hab. in Japonia.

*28. capensis*, panicula spicata cylindrica mutica, culmo nutante. Willd. A. spicata. Thunb. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spici.

*29. pungens*, panic. contracta spicaeformi, fol. involutis rigidis pungentibus. superioribus oblique oppositis, culmo ramoso. Schreb. gram. 2. p. 46. t. 27. f. 3. Lam. enc. 1. p. 59. A. Virginica Lin. Willd. sp. 1. p. 373. Hab. in maritimis Hispaniae, Galliae australis, etiam in America, Africa et Orienta. ¶

*30. spicata*, panic. spicata, fol. involutis rigidis, in geniculis coarctatis, ramis infractis. Vahl. symbol 1. p. 9. A. Virginica sarmentis repentibus fol. convolutis ciliatis. Forsk. descript. p. 20. Hab. in Arabiae desertis. ¶

*31. maritima*, panic. spicata, ramulis brevissimis, cal. muticis laevibus aequalibus fol. involutis. Lam. ill. p. 167. enc. 1. p. 61. In arenosis maritimis prope Narbonne. Spic. fere ut in *Poa cristata* L. Hab. in desertis arenosis Arabiae. ¶

*32. mexicana*, panicula oblonga congesta, cal. corollisque acuminatis subaequalibus. muticis, radice tuberosa. Hab. in America californica. Corollae basi pilosae. Aristae nullae. Facies Cinnae. ¶

*33. co-umandolina*, panic. ovata patente, pedunc. simplicibus, flor. secundis muticis, cal. aequalibus acutis nitidis. Retz. obs. 4. p. 19. Vahl. symbol. 1. p. 10. Hab. in aridis duris Malabaricae, Arabiae.

*34. tenacissima*, panic. contracta

filiformi, flor. muticis linearibus valvulis parallelis. Lin. suppl. 107. Hab. in India orientali. Radix dura caespitosa, culmis pluribus. Panic. filiformis, floribus adpressis.

*35. purpurascens*, panic. coarctata elongata, ramis adpressis erectis, flosc. inaequalibus acuminatis. Swartz. prol. 25. et Flor. p. 185. Hab. in Jamaica. Facies *Airae caespitosae*. Sw. Sequenti affinis.

*36. indica*, panic. contracta spicaeformi longissima, ramis vaginantibus spicam subaequantibus. Sloan. jam. 35. list. 1. p. 115. t. 73. f. 1. A. elongata. Lam. ill. p. 162. Hab. in Indiae occidentalis subhumidis. Panic. oblonga viridis et racemis lateralibus alternis, rachis approximatis. Lin.

*37. procera*, panic. pedunculis racemosis erectiusculis, flor. hirsutis muticis lanceolatis. Retz. obs. 4. p. 19. Hab. in graminosis subhumidis Malabaricae.

*38. linearis*, spic. subquaternis digitatis, flosc. unilateralibus alternis adpressis muticis. Retz. obs. 4. p. 19. Hab. in India ad vias tempore pulviscoso.

*39. lenta*, spic. subternis umbellatis, flosc. muticis oblongis acutis, valvulis cal. subaequalibus, fol. vaginisque glabris. Ait. Kew. 1. p. 96. Hab. in India. ☉

*40. stellata*, spic. quaternis umbellatis, flosc. muticis ovatis compressis, valvulis cal. inaequalibus, fol. vaginisque glabris. Willd. p. 36. Hab. in Insula St. Helenae. Spicae quaternae basi folio involutae. W.

**147. STURMIA.** Cal. 2-valvis: valv. aequalibus truncatis. Cor. minor, 2-valvis ovata lanuginosa, mutica. (Spica filiformis, flor. alternis sessilibus.)

*1. verna.* Agrostis minima. L. Willd. Spec. 1. p. 372. Hoppe in Sturm. Flor. germ. icon. Hab. in Europ. australis agris, rudertis; Vere.

**148. AIRA.** Cal. nitens, 2-valvis, 2-florus. Cor. 2-valvis, mutica aut basi aristata.

#### \* Muticae.

*1. arundinacea*, panicula oblonga secunda mutica imbricata, foliis planis. Sp. pl. 95. Willd. Sp. 1. p. 376. Hab. in Oriente.

*2. minuta*, panicula laxa subfastigiata ramosissima, flosc. muticis. Loefl. it 117. Schreb. gram. t. 21. f. 2. Hab. in Elisp.

3. *aquatica*, panic. patente, flor. minus laevibus cal. longiorib., fol. planis L. Poa airoides. Koeler. Vall. paris. 8q. t. 17. f. 7. *Obs.* An ob affinitatem cum Poa distante ad Poas amandanda? Hab. in aquis.

4. *caerulea*, panicul. coarctata, flor. conico-cylindricis. Melice. Lin. Leers. t. 4. f. 7. Molinia caerulea. Koeler gram. p. 145. Hab. in pratis, pascuis sylvisque utilis. Halitus arundinaceus, var. praesertim major sylvatica. Culm. fere enodus. Forte distincti generis. Interdum flosc. incompleti rudimentum adest.

5. *melicoides*, panic. subracematim coarctata, flor. majusculis linear-lanceolatis muticis basi villosis: rudimento flosculi pedicellato. Michaux l. c. Hab. in Canada.

*Obs.* Ex secundi flosculi basi nascitur pedicellus elongatus villosus floris rudimento vix perceptibili terminatus Mich. l. c.

6. *obtusata*, panic. oblonga racemosa, fol. angustis, cal. valv. altera linearis: altera obovali, flor. muticis apice compressis, Michaux Flor. p. 62. Hab. in Carolinae aridis.

7. *involutrata*, panic. patente, basi setaceo-involutrata, flor. muticis longitudine cal., fol. convolutis. Willd. l. c. Cavan. ic. t. p. 33. n. 48. tab. 44. f. 1. Hab. in collibus sterilibus Hispaniae. ☉

\*\* *Aristatae.*

8. *subspicata*, fol. planis, panic. spicata flosc. medio aristatis: arista reflexa laxiore. Lin. Planta adhuc dubia, forte Köeleriae generis? Hab. in Helvetiae, Lapponiae alpidibus. ☿

9. *cespitosa*, fol. planis nervosis, panic. patente, petalis basi villosis aristatisque: arista recta brevi. Lin. Leers t. 4. f. 8. Hab. in Europae pratis. Panic. nitens. Fol. scabra, plicata. ☿

10. *ambigua*, fol. subsetaceis, panic. ampla pyramidalata, glum. flavescentibus, petalis basi brevioribus villosisque. Mich. p. 61. Hab. circa lacus Mistassins.

11. *flexuosa*, fol. setaceis, culmis subnullis, panic. divaricata, pedunc. flexuosus L. Flor. dan. 157. Leers. t. 5. f. 1. Scheuch. gram. t. 6. f. 1. Hab. in arenosis.

12. *montana*, fol. setaceis, panic. coarctata flosc. basi pilosis aristatis: arista tortili longiore. Leers t. 5. f. 2. Hab. in montosis. An prioris junior planta?

13. *alpina*, fol. subulatis, panic. densa

flosc. basi pilosis aristatis: arista brevi. Scheuch. gram. 222. Hab. in alpidibus.

14. *antarctica*, fol. planis, panic. compressa patente, calycib. trifloris, flosc. medio aristatis, arista elongata recluscula. Forst. prod. 41. Hab. in Nova Zeelandia. An Avena?

15. *canescens*, fol. setaceis: summo spatheo paniculam inferne involvente, aristis clavatis cal. brevioribus. Hab. in arenosis, Panicula deflorata e vagina exit. Fol. glauca.

16. *articulata*, paniculata, cal. flosculo longiore acuto, arista clavata medio nodosa e basi glumae prodeunte. Desf. Atl. t. p. 70. t. 13. Prope Mascara in arvis. Fol. glauca lata: spica convoluta. D.

17. *chinensis*, fol. setaceis, panicula erecta, flosc. aristatis villosis. Retz. obs. 3. p. 10. Hab. in China.

18. *praecox*, fol. setaceis: vaginis angulatis, flor. subspic. flosculis basi aristatis. Flor. dan. t. 381. Smith angl. t. p. 87. Hab. in campis arenosis et sylvaticis. Flosc. basi nudis, dorso aristatis. Smith.

19. *caryophyllea*, fol. setaceis, panic. divaricata trichotoma, flor. aristatis distantibus. Leers t. 7. f. 7. Hall. helv. n. 148a. Hab. in Angliae, Germaniae, Galliae glareosis. ☉

20. *setacea*, fol. setaceis, panic. diffusa, flosc. basi pilosis: inferiore mutico, superiore arista brevi. Retz. obs. 3. p. 10.

140. MELICA. Panic. spicae aut racemiformis. Cal. coloratus, 2-valvis, 2-florus: glum. laxae, obtusae membranaceae, inaequales. Cor. 2 valvis, ventricosa, minor. Rudim. floris.

1. *ciliata*, spicata, flosculi inferioris petalo ciliato L. Hab. in collibus sterilib. saxosis. Pallescens. ☿

2. *decumbens*, corol. hirsutis, flor. racemosis nutantibus, culmo decumbente. Thunb. prod. 21. Ad cap. 6. Sp.

3. *racemosa*, corol. hirtis, racemis ceruvis, culmo erecto. Thunb. prod. 21.

4. *nutans*, cal. bifloro, petalis imberbibus, panicula nutante simplici. Schreb. gram. 62 t. 6. f. 2. M. montana. Lam. enc. Hab. in Europae frigidioris sylvaticis montosis. Flor. subsecundi majusculi pedicellis breviusculis. Cor. subsulcata. Cum sequente ut plurimum confunditur.

5. *uniiflora*, panic. suberecta divisa cal. unifloro. Retz. obs. 1. p. 10. Willd. Spec. 1. p. 383. M. Lobelii, panic. ramosa, fol. vaginis acuminata oppositifolia, radice repente. Villars delph. 2. p. 90. t. 3. f. 3. Passim cum priore, cui similis. ¶

6. *minuta*, culmo ramoso, fol. setaceis, petalis imberbibus. Lin. Mant. 32. Hab. in Italia. Racemi simplices, capillares, pauciflori. Cal. bivalvis oratus, flosculis dimidio brevior. Planta dubia.

7. *setacea*, flor. racemosis, fol. setaceis subdistichis, petalis subbarbatis. Hab. in Gallia prope Beaucaille. Fol. laevia.

8. *aspera*, fol. angustis conniventibus, panic. patente pyramidata, glumis imberbibus. Desf. Atl. 1. p. 71. Barrel. t. 95. f. 1. Hab. in fissuris rupium in Atlantic. Vag. striata. Flor. racemosi, unilaterales. Cal. 3-florus. Desf.

9. *pyramidalis*, panic. patente pyramidata, glumis variis, fol. latiusculis subconvolutis. Lam. ill. p. 179. Morison sec. 8. t. 7. f. 1. Hab. in Barbaria, et Europa australi. B. Cor. subvillosis. Gmel. sib. 1. t. 19. f. 1.

10. *laxiflora*, panic. ramis divaricatis capillarib. multifloris, cor. altera ciliata. Cav. ic. 5. p. 48. t. 473. f. 2. Hab. in regno Chilensi.

11. *glabra*, tota alabra. panic. erecta laxa: ramulis simplicibus paucifloris, flor. glumis imberbibus. Michaux Flor. p. 62. Morris. hist. 3. s. 8. t. 7. f. 51. In Virginia et Florida.

12. *papilionacea*, calycis valvula inferiore maxima colorata, petalo exteriori subciliato. L. Mant. 31. in brasiliana. Ard. spec. 2. p. 17. t. 6. f. 1. 2. Hab. in Brasilia. Forte una ex sequentibus huc pertinet.

13. *aurantiaca*, panic. subspicata, cal. valvula exteriori maxima aurantia. Cav. ic. 5. p. 46. t. 472. f. 1. Lam. enc. 4. p. 70. Hab. in vicinis Montevideo in Amer. Fol. subvillosa.

14. *violacea*, panic. subspicata secunda, cor. violaceis ciliatis, calyc. valvula exteriori argentea apice denticulata. Cav. l. c. Hab. in regno Chilensi. Priori affinis.

15. *rigida*, panic. subspicata secunda, cal. corollis aequali: harum valv. altera ciliata. Cav. ic. 5. p. 47. t. 472. f. 1. Crete. in Montevideo. Fol. superioris vagina spatulaeformis; ligula multifida. Cav.

16. *altissima*, panic. coarctata spicaeformi, petal. imberbibus. Willd. spec.

p. 385. Gmel. sibir. 1. p. 98. t. 20. Hab. in Sibiria. Flosc. majusculi oblongi pallidi.

β. *interrupta*, spica elongata interrupta flosculis oblongis linearibus coloratis imberbibus. In hortis subinde colitur.

150. **HOLCUS.** Flor. (polygamus) paniculati. Cal. 2-florus, 2-valvis, (opacus, nervosus). Cor. minor: valv. altera aristata. Nectar. lineare, 2-partitum. Stigm. subsessilia.

1. *lanatus*, glumis villosis mucronatis, flor. masculi arista incurva, fol. vagina tumida villosa. Lin. Leers t. 7. f. 6. Schreb. gram. t. 20 f. 1. Hab. ubique in pratis. Rad. fibrosa. Glumae calycinae mucrone longiusculo distinctae.

2. *mollis*, subglabra, rad. repente, glum. nudiusculis, arista geniculata exserta. Lin. Smith. angl. 1. p. 89. Schreb. l. c. f. 2. Cort. Lond. ic. Hab. in arvis et nemorosis. Panic. subflavescentes demum. Flor. omnes hermaphroditi.

Obs. Reliquas Linnæi species, quarum descriptiones vide apud Reichard, Syst. pl. 4. p. 307-309, omisi, cum nesciam an jure sub hoc militent genere: forte pleraque Airæ sunt. *Sorghii* species vide infra.

151. **PHALARIS.** Cal. 1-florus, 2-valvis: valvulis subovatis dorso membranaceo-carinatis, aut lanceolatis, aequalibus, nervosis. Cor. inclusa, 2-valvis, basi pilosa (sæpius.)

1. *arundinacea*, panicula oblonga venetricosa coarctata, glumis acuminatis. Lin. Arundo colorata. Aiton. Willd. Spec. 1. p. 457. Hab. in praes-humidis et ad ripas. In hortis colitur var. fol. lineis albis pictis. Semina nitida. Holcum refert.

2. *canariensis*, panic. spiciformi ovata, glumis calycinis navicularibus integris, cor. 4-valvi: valvulis exterioribus lanceolatis glabris, interioribus villosis. Act. Kew. 1. p. 85. Willd. Sp. 1. p. 326. Schreb. t. 10 f. 2. Hab. in Canariis inter segetes, hinc inde in Europa colitur. ☉

3. *aquatica*, spica cylindrica glum. navicularibus denticulatis, cor. 3-valvi: valvulis interiorib. villosis: exteriori minuta subulata. Act. l. c. p. 86. Ph. minor. Retz. Obs. 3. p. 8. Barr. rar. t. 700. f. 1. Hab. in Aegypto et ad Tiberim.

4. *sativa*, spica cylindrica, glumis ca-

rinatis glabris margine membranaceis. P. *Bellardi*. Willd. in N. Act. berol. v. 3. (P. *Bulbosa*. Lin. Hab. in Italia, Oriente et etiam his in locis quasi sponte. Pro avicularum canariensium nutrimento in nonnullis regionibus colitur, et in Europam deportatur, cfr. Desf. Atl. 1. p. Rad. in paucissimis bulbosa seu fibrosa.

5. *tuberosa*, spica mutica subcylindrica glumis apice crenatis, culmo basi globoso-tuberoso. Ph. *bulbosa*. Cav. ic. 1. p. 46. t. 64. Hab. in Hispania. Culm. basi bulbis saepe tribus globosis, concatenatis. C.

6. *capensis*, panic. spicata ovata, glum. integris, culmo geniculato decumbente. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei.

7. *arenaria*, spica obovata, glumis cal. integerrimis ciliatis, vagin. ventricosa. Phleum spica ovata ciliata, caule ramoso. Lin. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 8. Crypsis. Desf. Atlant. 1. p. 61. Hab. in Europae et Barbar. arenosis. Cal. cor. multo major: glumis lanceolatis. ☉

8. *alpina*, panic. cylindrica spiciformi, glumis calycinis mucronatis carinatis dorso ciliatis. Willd. l. c. Hab. in alpihus.

9. *paradoxa*, panic. mutica oblonga spiciformi, glumis calycinis navicularibus unidentatis, corolla bivalvi glabra, flosc. infimis praemorsis. Ait. l. c. Linn. fil. dec. 35. t. 18. Schreb. gram. t. 12. Ph. praemorsa. Lam. ill. p. 164. Hab. in Oriente et Lusitania.

10. *ericaeformis*, panicul. secunda linear, cal. 1-2 floris. Lin. Cynosurus ericaeformis. Ait. Willd. Sp. 1. p. 412. Barr. rar. t. 26. Gmel. sib. 1. t. 25. Hab. in Europa australi, Sibiria et ad fretum Hudsonis.

11. *villosa*, panic. multiflora stricta, flor. obovatis villosis. Michaux Flor. p. 43. In sylvis Carolinae. Habitu recedit.

152. *CRYPISIS*. Cal. 2-valvis. Cor. 2-valvis, longior. Stam. 2-3. Spica folior. vagina involucreta; seu flor. in capitulum foliatum congestis.

1. *aculeata*, caule ramosissimo, spic. capitato - hemisphaericis, fol. vaginantibus brevibus pungentibus cinctis. Willd. Spec. p. 158. Lam. ill. gen. 1. p. 166. t. 42. f. 2. Anthoxant. aculeatum. L. Moris. hist. 3. p. 165. s. 8. t. 5. f. 3. Hab. in Europae australis locis petrosis glaucosis, etiam in Barbaria. ☉

2. *Schoenoides*, spic. ovatis vagina fo-

liacea cinctis, caul. romoso procumbente. Lam. l. c. f. 1. Phleum schoenoides. L. Jacq. Fl. austr. app. 1. 7. Spartina phleoides. Roth N. Bot. Beytr. 3. p. 101. Hab. in Italia, Gall. australi, Hisp. et Smyrnae Antecedente dimidio fere major. ☉

153. *PHLEUM*. Cal. (induratus) 2-valvis: valv. linearibus, apice retuso seu carina prominente utrinque bicuspidato. Cor. inclusa. (Flor. spicati.)

\* *Spica composita.*

1. *Phalaris*, spica composita cylindrica, glumis ciliatis carinatis mollioribus. Phalaris *phleoides* L. Flor. dan. t. 531. Engl. bot. t. 459. Hab. in versuris agrorum. Cal. minus retuso et teretior Phalaridi affine. ☉

2. *asperum*, spica composita cylindrica, cal. gibbo aspero. Villars dauph. 2. p. 61. t. 2. f. 4. Ph. *viride*. Allioni. Phalaris. Retz. Willd. Sp. 1. p. 328. Hab. in Europa australi. Cal. subcartilagineus, fere glabra. ☉

3. *dentatum*, spic. subpaniculata cylindrica, glumis serratis, culm. geniculato. Thunb. prod. p. 19. Lin. suppl. p. 106. sub Phalar. Hab. ad Cap. b. spei. Glum. carina cartilaginea dentata: dentib. globosis. ☉

\*\* *Spica simplice.*

4. *pratense*, spica cylindrica ciliata elongata, culmo erecto. Lin. Leers. Herb. t. 3. f. 1. Schreb. gram. t. 14. Hab. in pratib. ad versuras. ☉

5. *alpinum*, spica villosa ovato-cylindrica. L. P. spicis ovatis hirsutis, locustis longe bicorniatis. Hall. helv. n. 1529. Hab. in alpihus. Spica nigrescens s. atro-purpurea.

6. *Gerardi*, spica subrotunda, glumis ciliatis, culmo simplici, vaginis ventricosis. Gerard prov. 78. n. 4. Jacq. ic. rar. 2. t. 301. Hab. in summis alpihus Europae austral. Stylus unicus? cfr. Jacq. ic. 301

7. *nodosum*, spica subcylindrica parva, culm. adscendente, fol. obliquis radice bulbosa. Flor. dan. t. 380. Leers t. 3. f. 2. Gram. nodosum, spica parva. Bauh. Hab. in collib. graminosis. Spica glabra.

154. *ALOPHCURUS*. Spica. Cal. 2-valvis. Cor. 1-valvis, basi aristata, aut mutica.

1. *bulbosus*, culmo erecto, spica cylindrica, radice bulbosa. Gouan. monsp. 37. Willd. Sp. 1. p. 336. A. culmo erecto,

spica simplicissima attenuata, glum. calycinis distinctis (nec basi connatis.) Smith Flor. brit. 1. p. 74. Barr. ic. Gog. f. 1. Hab. in Galliae, Angliae pratis.  $\overline{\text{T}}$

2. *pratensis*, culmo erecto, glumis villosis, cor. muticis. Hab. in Europae pratis.  $\overline{\text{T}}$

3. *capensis*, spica cylindrica, glumis glabris muticis. Thunb. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spei.

4. *antarcticus*, culm. erecto, spica ovata, glumis hirsutis, cor. aristatis: aristis cal-longioribus. Vahl. symbol. 2. p. 18. Hab. ad fretum Magellanicum.

5. *agrestis*, culm. erecto, spica cylindrica (purpurascens) glum. laevib. Leers t. 2. f. 5. Schreb. gram. 140. t. 19. f. 2. Hab. in agris.  $\overline{\text{T}}$

6. *subaristatus*, culm. erecto, glumis ovalibus obtusis, arista vix exserta. Mich. Flor. amer. 1. p. 43. Hab. in Canadae paludosis.

7. *geniculatus*, culm. spicato infracto, cor. muticis. Leers t. 2. f. 7. Roth. germ. 2. p. 78. Hab. in uliginosis  $\overline{\text{T}}$

8. *echinatus*, panic. spicata ovata, glum. punctatis ciliatis, culmo geniculato. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spei.

9. *utriculata*, spica ovata, valv. calycinis compressis subcallosis, carina pilosis, arista articulata, fol. vag. superne utriculata. Phalaris utriculata. Lin. Scop. delic. insubr. t. 12. Tozzetta pratensis. Savi in act. ital. v. 8. p. 477. Hab. in Anglia; praesertim vero in Italia in pratis Mediolanensib. et Ticinensibus quae Marzitia vocantur. Scop. An distincti generis cum sequente?

10. *ventricosa*, elongata, spica cylindrica, glumis villosis, cor. aristatis, vagina ventricosa. Hab. in Gallia. Phal. *utriculata* quorundam. Cor. uniglumis uti in priore. A. *pratensi* affinis.

155. POLYPOGON. Cal. 2-valvis, aristatus, uniflorus. Cor. 2-valvis: valvula exteriori aristata.

1. *monspeiliense*, (*crinitum*), panicula coarctata subspicata, calycib. subpubescentibus margine ciliatis. Willd. in Act. nov. Soc. Nat. Berolin. vol. 3. Desf. atl. 1. p. 67. Alopecurus Lin. *Pleurum crinitum*. Schreb. gram. t. 20. f. 3. Smith. Flor. brit. 1. p. 71.  $\beta$ . *panicum* Alop. *panicum*, minor, glumis villosis Lin.

syst. veg. Barrel Ic. t. 115. f. 1. Hab. in Galliae et Angliae maritimis.

2. *maritimum*, panicula coarctata subspicata ovata, cal. hirsutis margine ciliatis, culmo geniculato. Willd. l. c. Hab. ad oras maris circa Rochelle. Bonpland.

3. *vaginatum*, panic. coarctata subspicata ovata, val. villosis, vaginis inflatis. Willd. l. c. Alopecurus. Pallas in Nov. Act. Petropol. 10. p. 304. Cresc. in Tauria, locis siccis.

4. *fasciculatum*, panic. subracemosa, cal. valvula exteriori longissime aristata, interiore mucronata. Willd. l. c. (*P. subspicata*). Chaeturus fasciculatus. Link in Schrad. Bot. Journ. 1793. 2. p. 313. Crescit in Estremadura Hispaniae, in agris.

156. CHRYSURUS. Flor. spicato-racemosi. Spiculae bifformes: *steriles* pendulae muticae multivalves ad basin fertilium involucrium mentientes: *fertilium* Cal. 2-valvis, 2-3-florus. Cor. 2-valvis: valvula exteriori longe aristata.

1. *Cynosuroides*. Cynosurus aureus. Lin. Willd. 1. p. 418. Koeler gram. p. 377. Barr. rar. t. 4. Hab. in Europa australi ad rupes, Barbaria et in Oriente. Spic. densa, flavo-virens.

157. PANICUM. Inflorescentia varia. Cor. 3-valvis: valvula tertia dorsali minima. Cor. 2-valvis.

#### \* Spicata.

1. *polystachyon*, spicis teretibus, involuclis unifloris fasciculato-setosis, culmis erectis superne ramosis. Lin. Willd. Sp. p. 333. Hab. in India et Aegypto. *P. glauco* similis. Stigm. sanguinea.  $\odot$

2. *purpureum*, spic. tereti, involucl. 1-2-setis inaequalib. flosculo majoribus 1-floris, culmo tereti ramoso. Flor. Per. 1. p. 48. Hab. in praeruptis Tarmae. Stigm. plumos., purpureum.

3. *sericeum*, spica tereti, involucl. setaceis villosis unifloris longitudine flosculorum, fol. planis. Ait. Kew. 1. p. 88. In Ind. occidentali.  $\odot$

4. *verticillatum*, spica verticillata, racemulis quaternis, involucl. unifloris bisetis, culm. diffusis L. Roth. germ. 2. p. 60. Curt. Lond. ic. Hab. in Europa australi et Oriente.  $\odot$

5. *helvolum*,



5. *helvolum*, spica tereti, involuclis unifloris fasciculato-setosis, seminibus nervosis. Lin. suppl. 107. Hab. in India orientali. Simillimum *P. glauco*. Culm. serpealalis, ramosus. Folia versus basin pilis albis, patentibus. ☉

6. *glaucom*, culm. basi decumbente, spica subovata tereti, involucl. unifloris fasciculato-pilosis, seminibus undulato-rugosis. Leers. t. 2. f. 2. Schreb. gram. t. 25. *β. elongatum*. culm. longiore erecto. Hab. in agris post messem frequens; etiam in India. *β. ex America*. Pedunc. sulcatus, spica lutescens. ☉

7. *viride*, spica cylindrica, involuclis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. Leers t. 2. f. 2. Flor. dan. t. 852. Cum priore.

8. *germanicum*, spica composita coarctata, spiculis glomeratis, involuclis setaceis flore longioribus, rachi hirsuta. Willd. spica composita ovata, setis brevioribus, pedunculo hirsuto. Roth. germ. I. p. 27. II. p. 71. Hab. in Europa australi. ☉

9. *italicum*, spica composita basi interrupta nutante, spiculis glomeratis, involuclis setaceis, flore multo longioribus, rachi tomentosa. Willd. Sp. 1. p. 336. Rumph. amb. 5. t. 75. f. 2. Hab. in Indiis et Europ. australi.

10. *setosum*, spica composita, spiculis paniculato-fasciculatis, setis flosculis immixtis longissimis, pedunculis subglabris. Swartz prod. 22. Flor. ind. occid. p. 139. Hab. in Jamaicae montosis fruticetis.

11. *lanceolatum*, spic. alternis, calyc. valvula extima ciliata aristata, fol. lanceol. Retz. obs. 5. p. 17. Hab. in India.

12. *stagninum*, spic. secundis alternis, calycib. bifloris aristatis hispidis. Retz. obs. 5. p. 17. Hab. in stagnis Indiae orientalis.

13. *Crus corvi*, spic. alternis secundis spiculis subdivisis, glumis subaristatis hispidis, rachi trigona. Sp. plant. 84. Hab. in Indiis. Sequentie tenerius. Aristae longae.

14. *Crus galli*, spic. alternis conjugatisque secundis; spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari. Leers herbora. n. 41. t. 2. f. 3. Curt. lond. ic. Hab. in Europae, et Virginiae cultis. Var. aristis subnullis. ☉

15. *muricatum*, humifusum, glumis turgidis, muricato-hispidis. Michaux Flor. p. 47. Hab. in Canada ad ripas. Cenchrum refert.

16. *setigerum*, spic. remotis, flosc. secundis, racheos dentibus setigeris. Hab. in China.

17. *colonom*, spic. alternis secundis muticis ovatis scabris, rachi teretiuscula. Lin. Vahl. symbol. 1. p. 9. Pluck. alm. 174. t. 189. f. 5. Ehret. pict. t. 3. f. 3. Hab. in Indiae cultis. Spiculæ sessilibus absque fasciculis pilosis. ☉

18. *fluitans*, spic. alternis sessilibus secundis, valv. calycina tertia minuta. Willd. Sp. p. 338. Retz. obs. 3. p. 8. et 5. p. 13. Vahl. symbol. 1. p. 8. Pluk. Am. 110. t. 417. f. 7. In Madagascar, Arabia, India.

19. *brizoides*, spic. alternis sessilibus secundis, valv. calycinis binis corolla multo brevioribus retusis tertia longitudine corollae. Willd. l. c. Retz. obs. 5. p. 18. Pluck. alm. 174. t. 192. f. 1. Hab. in India. Obs. An. cum priore potius ad Digitarias perlinet?

20. *paspalodes*, spic. alternis muticis appressis sessilibus, glum. ovatis mucronatis glaberrimis. Pan. Britoides. Lam. l. c. Hab. in India.

21. *granulare*, spic. alternis muticis erectis sessilibus, glum. laevibus subglobois, culm. ramoso. Lam. ill. gen. p. 170. Hab. in Insula Franciae.

22. *flavidum*, culm. folioso, spicul. remotis sessilibus appressis secundis paucifloris. Retz. obs. 4. p. 15. Hab. in Zeylona Antecedenti affine.

23. *dimidiatum*, spic. dimidiato-secunda, spiculis quinquefloris, rachi excavatae alterne appressis. Retz. obs. 6. p. 23. Idem. Syst. veg. 13. p. 60. Burm. ind. 25. t. 8. f. 5. Hab. in India. Spiculæ flosculis 5; cal. singuli flosculi lanceolatus; valvula extima minuta obtusa L.

24. *pilosum*, spic. paniculatis alternis secundis, spiculis geminis, altero minore, acuminatis laevibus, rachi compressa pilosa, culmo divaricato geniculato. Swartz. prod. 22. Ej. Flor. p. 141. In Jamaicae paucis sylvis.

25. *molle*, spic. paniculatis alternis secundis patentibus, spiculis approximatis pedicellatis secundis muticis, culm. adscendente, fol. villosis. Swartz. flor. p. 143. In pratis Jamaicae fertiliorib. Culmi quasi succulenti. Sw.

26. *fasciculatum*, spic. paniculatis alternis erectis subfastigiatis, spiculis secundis subrotundis. Swartz. prod. 22. Ej. Flor. p. 145. Hab. in Jamaica, gramin. depressis

27. *scabrum*, spic. alternis, crassis subsecundis scabris, glumis aristatis hispidis, rachis tuberculata. Lam. ill. p. 171. Hab. in Senegal.

28. *barbatum*, spic. alternis subdivisis, glumis glabris aristatis subaristatis; rachis vaginisque fol. barbatis. Lam. l. c. In Insula Franciae.

29. *pyramidale*, spic. alternis numerosis pyramidalis, glumis muticis sublaevibus, fol. glaucis. Lam. l. c. Hab. in Senegal et in America occident.

30. *plicatum*, spic. alternis remotis muticis brevibus, cor. rugosis, fol. plicato-sulcatis. Lam. l. c. In Insul. Franciae?

31. *chartagenense*, spic. paniculatis, fol. brevioribus, spiculis secundis ovatis acutis, culm. prostrato-ramosis. vag. pubescentibus. Swartz. Flor. 1. p. 148. Hab. in America meridionali, Chartagena. Tr.

32. *conglomeratum*, spic. secunda subovata floscul. obtusis. Mant. 524. *indicum* racemo spicato simplici, culmo filiformi repente ramosissimo. Mant. 184. Retz. obs. 3. p. 9. Hab. ad villas et plateas Indiae orientalis. Racem. terminalis, pedunculatus, subspicatus, folio brevior, stigm. plumos., magnitudine totius floris.

33. *interruptum*, spic. simplici interrupta, spiculis bifloris pedicellatis nudis. Willd. sp. p. 341. *P. caudatum*. Thunb. prod. 19? Hab. in Indiae stagnis. Nodi culmi nigri. Fol. longa linearia. Spica simplicissima, pedalis. Pedunc. uniflor. Willd.

\*\*\* *Spic. composita, spicul. compressis secundis.*

34. *hirtellum* (undulatifolium), culm. repente, foliis latiusculis undulatis, spica composita? spicul. appressis alternis, cal. geminis: valv. omnibus aristatis; extima longissima. Lin. Amaen. acad. 5. p. 391. Wulf. et Jacq. Coll. 1. p. 263-264. Allion. pedem. 2. p. 270. *P. undulatifolium*. Arduin. spec. 2. t. 4. Hab. in India, Austria. infer. et Italia.

35. *setarium*, spic. alternis brevissimis subtrifloris sessilibus, cal. aristatis; extima singissima. Lam. ill. p. 170. In Amer. meridionali.

36. *bromoides*, spic. alternis sessilibus, cal. aristatis, involuc. setosis; fol. brevibus. Lam. l. c. Hab. in Insul. Franciae.

37. *cespitosum*, spic. alternis erectis, spicul. secundis ovatis, culm. subramoso repente, ramis diffusis filiformibus, fol. ovato-

lanceolatis. Sw. Flor. Ind. occid. 1. p. 146. Hab. in pascuis sicciorib. Jamaicae.

38. *Ioliaceum*, spic. secundis alternis longis sessilibus, flor. distichis geminis remotis, cal. aristatis. Lam. ill. p. 170. In India.

39. *compositum*, culm. repente, spica composita, spiculis linearibus secundis floscul. geminis remotis, calycibus aristatis. L. Willd. sp. p. 346. Fl. zeyl. 42. Houttuyn. t. 90. f. 1. Hab. in Zeylona. Spiculae 4. 5. alternae, rachis adpressae, unilaterales.

40. *elatus*, culmo erecto, spica composita, spiculis oblongis sparsis adpressis, flosculis confertis, calycibus mucronato-aristatis. Linn. suppl. 107. Habit. in Malabaria. ☉ Spiculae 12 in omni latere racheos, nec secundae.

\*\*\* *Paniculata.*

41. *dichotomum*, paniculis simplicibus, culmo ramoso dichotomo. L. Gron. Habit. in Virginia. Refert arbusculum.

42. *ramosum*, panicula ramis simplicibus, flor. subternis: inferiore subessili, culmo ramoso. Mant. 29. Hab. in utraque India. Fol. margine fauceque ciliata.

43. *deustum*, panicula potenti, flor. sessilibus, glumis glabris apice purpureis. Thunb. prod. 19. Hab. ad Cap. b. spei.

44. *coloratum*, panic. patente, staminibus pistillisque coloratis, culmo ramoso ram. filiformibus. Mant. 30. Jacq. Misc. v. 2. p. 365. Icon. rar. 1. t. 12. Hab. Cairi. Antherae crocae et Pistilla saturate violacea.

45. *repens*, panic. virgata fol. divaricatis, culm. basi repente. L. Willd. p. 347. Cav. ic. t. 110. Desf. Atl. 1. p. 60. In India Barbaria et Hispania. ☉ Fol. inferiora, undique canum vaginis pubesc. vestientia potentissima.

46. *numidianum*, culm. erecto, flore paniculato-racemoso secundis geminis: altero sessili. Desf. l. c. t. 11. Lam. ill. n. 503. Hab. rope la Calle in arenis humidis.

47. *ischaemoides*, panic. erecta contracta, calycibus bifloris polygamis acutis, culmo simplici, fol. distichis rigidis. Retz. obs. 4. p. 17. Hab. in Malabaricae locis udis.

48. *remotum*, panic. ramis triquetris, floscul. subgeminatis, altero pedicellato, culmo ramoso tetragono-compresso. Retz. l. c. In India orientali.

49. *aristatum*, culmo repente radican-

te, panic. ramis indivisis, flosc. linis sessilibus aristatis. Retz. l. c. Hab. in China.

50. *Milium (miliaceum. L.)*, panic. laxa flaccida, fol. vaginis hirtis, glumis mucronatis nervosis. Hab. in India; nunc ubique colitur. ☉

51. *laeve*, panic. laxa subflaccida, glum. oblongis laevibus, fol. vaginis glabris. Lam. ill. gen. 1. p. 172. Hab. ad St. Domingo. Cal. interdum 4 valvis.

52. *miliare*, panic. laxa subflaccida, glum. subconferiis acutis striatis, vaginis glabris. Lam. l. c. p. 173. In India.

53. *antidotale*, panic. nutante, calycib. bifloris polygaminis acutis, culmo erecto ramosisimo. Retz. obs. 4. p. 17.

54. *notatum*, panic. patente: axillis notatis, fol. lanceolatis ciliatis. Retz. obs. 4. p. 18. In Sumatra.

55. *muricatum*, panic. patente, flor. solitariis muricatis, culmo radicante adscendente. Retz. l. c. Hab. in India.

56. *capillare*, panic. capillari ramosissima patente, flor. minutis; pedunc. strictis, calyc. acuminatis laevibus, vaginis hirsutissimis. Retz. obs. 3. p. 6. Lin. Syst. veg. 106. Michaux Flor. p. 48. Habit. in Virginia, Pennsylvania, Jamaica. Simile Poae capillari, sed totum hirsutum. ☉

57. *capillaceum (filamentum)*, panic. capillacea patente, glumis obtusis minimis, fol. latis basi vaginisque ciliatis. Lam. ill. p. 173. Sloan. t. 72. f. 3. Cal. 1-florus. Lam.

58. *tenellum*, glaberrimum, panicul. parva patente, glum. obtusis curvatis, culm. ramoso filiformi. Lam. l. c. Hab. in Sierra Leona. Cal. valv. aequales. Lam.

59. *flexuosum*, panic. capillari patente, pedunculis flexuosis, calycibus ovatis, geniculorum barba reflexa. Retz. l. c. Hab. in India. Var. glabra. Retz. obs. 4. p. 16.

60. *grossarium*, panic. ramis simplicibus, flor. geminis pedicello altero brevissimo, altero longitudine floris, culm. erecto. Amoeu. acad. 3. p. 32. Hab. in Jamaica.

61. *maximum*, panic. ramis simplicibus pedunculis capillaceis adpressis bifloris trifloris, fol. lineari-lanceolatis, culmo erecto. Jac. ic. rar. 1. t. 13. Collect. 1. p. 76. Hab. in insula Guadeloupe. Stigm. plumosa purpurea. ¶

62. *hirsutum*, panic. composita capillari patente, culm. vaginisque setoso-hirsutis, fol. lanceolatis acuminatis nervosis strictis. Sw. Flor. Ind. occident. l. p. 173.

Hab. in Jamaicae et Hispaniolae graminosis. Priori affine.

63. *jumentorum*, panic. composita capillari patente, flosc. polygaminis, ramis racemosis, nodis articulorum hirsutis. P. *polygamum*. Swartz. prodr. p. 24. Frequens ad animalia domestica nutrienda in Amer. meridionali colitur. Genuinus locus natalis est Africa septentr. unde ab incolis *Guinea-Gras* nuncupatur. A. P. maximo. Jacq. diversum.

64. *nemorosum*, panic. simplici, ramis distantibus erectis flosc. remotis sparsis ovatis acuminatis; culmo decumbente geniculato, vaginis colloque pilosis. Sw. prodr. 22. In Jamaica, Domingo, nemorib. montosis.

65. *acuminatum*, panic. simplicib. fol. brevioribus, ramis capillaribus diffusis, spiculis remotis obovatis, culmo decumbente geniculato remoto, fol. lanceolato-subulatis cretatis, vaginis villosis. Swartz. prodr. 23. ej. Fl. p. 150. In Jamaicae montosis, campis arenosis. Stigm. villosa atropurpurea.

66. *rigens*, panic. simplici rigida patente, culmo ramoso decumbente, fol. horizontalibus scabris. Swartz. l. c. Ej. Flor. p. 154. Hab. in Jamaica.

67. *fusum*, panic. simplici, ramis cretatis, flosc. secundis geminis, altero brevius, pedicellato, cumulo erecto subdiviso, fol. lato-lanceolatis. Swartz l. c. Ej. Flor. p. 156. Hab. in Jamaicae graminosis uliginosis. P. carthagensis simile. S.

68. *laxum*, panic. simplici nutante, ramis capillaribus, spiculis approximatis alternis adpressis, culmo simplici filiformi flaccido, fol. lineari-lanceol. Swartz. l. c. Ej. Flor. p. 157. Hab. in Jamaica, nemorib. aridis. Sub fine anni flor. Sw.

69. *latifolium*, panic. racemis lateralibus, simplicibus, fol. ovato-lanceolatis collo pilosis. Moris. s. 8. t. 5. f. 4. Hab. in America boreali, in pratis sylvaticis. ¶

70. *avescescens*, panic. simplici erecta stricta, ramis subfastigiatis, infimis oppositis, spiculis approximatis secundis, pedicelli bifloris. Swartz. Flor. p. 158. In Jamaicae austral. aridis varius.

71. *diffusum*, panic. simpliciuscula capillari patente, spiculis distantibus, culmo decumbente simplici, fol. linearibus, collo pilosis. Swartz. 21. Flor. p. 160. Hab. in Jamaicae graminosis siccis. Vulgare. P. *rejenti*. affin. L. S.

72. *Oxyoides*, panic. subsimplici, ramis

erectis, flosc. remotiusculis ovatis acutis, culmo erecto indiviso, fol. lato-lanceolatis basi rotundatis, vaginis sulcato-striatis. Sw. Flor. p. 16a. In Jamaica, nemoros. montosis. Spiculae maximae.

73. *clandestinum*, panic. racemis occultatis in foliorum vaginis. Hab. in Pennsylvania.  $\frac{1}{2}$

74. *arborescens*, panic. ramosissima, fol. ovato-oblongis acuminatis. Liu. Habit. in India.  $\frac{1}{2}$

75. *glutinosum*, panic. composita patente, ramis flexuosis, glum. ovatis viscosis, majusculis, culm. subramoso. Lam. ill. gen. p. 177. t. 43. f. 3. fol. lato-lanceolatis Swartz. Flor. Ind. occid. t. p. 174. Hab. in Amer. meridion.

76. *curvatum*, panic. racemosa, glumis curvatis obtusis nervosis Liu. Syst. Nat. 12. p. 710. Hab. in India orientali. Culmi filiformes, folia lanceolata. Frutescentes calyces evasere triplo majores, multisulcati, purpurascetes. L.

77. *virgatum*, panic. virgata, glumis acuminatis laevibus: extima dehiscente, fol. longissimis planis. Sp. pl. 87. Michaux p. 48. Habit. in Virginia ad ripas fluviorum.  $\frac{1}{2}$  Gramen altissimum.

78. *patens*, panic. oblonga flexuosa capillari patente, calyeb. bifloris, fol. linearilanceolatis, culm. radicante. Habit. in India.

79. *trigonum*, panic. erecta, pedunc. bifloris, calyeb. obtusis hispidis unifloris, seminibus trigonis. Retz. obs. 3. p. 9. P. patens. Burm. ind. 26. t. 10. f. 2. Hab. in Ind.

80. *patens*, panic. composita ovata, ramis confertis erectis, spiculis ovatis subulatis, culm. subdiviso geniculato, fol. ovato-lanceolatis, vaginis collo margineque ciliatis. Swartz. prol. 23. Flor. p. 164. Apluda Zeigera. Aubl. gujan. 2. p. 333. In Jamaicae nemorosis. Fol. basi obliqua.

81. *anceps*, panic. interrupte racemosis, fol. longis: vagin. pilosis ancipitibus. Michaux l. c. In Carolinae herbosis humidis sylvaticis.

82. *scoparium*, villosum, fol. lanceolatis, panic. erecta ramosissima, pedunc. setaceis, glumis tergidis pubescentibus, Michaux p. 49. Hab. cum priore, in apricis caes. itosis.  $\odot$

83. *pubescens*, ramosissimum foliosum, subpubescens, fol. lanceolatis ciliatis, panic. minimis nudis, flor. subglobosis, Michaux. In herbosis sylvarum Carolinae.

84. *nitidum*, panic. capillari ramosissima, flor. minutis ovatis obtusis, fol. lanceolato-linearibus remotis. Michaux l. c. In Pennsylvania et Carolina.

85. *barbatum*, parvulum, culm. graciliter subramoso: nodis barbatis, fol. lanceolato-linearibus, panic. capillari parvula. Mich. Cum priore.

86. *ramulosum*, parvum, culm. gracilliter ramuloso geniculisque glabris, panic. parva capillari, flor. ovatis obtusis minutis, fol. subtus pilis sparsis ciliatis. Mich. l. c. p. 50.

87. *melicarium*, caul. debili, fol. angustis, panic. contracta, glum. membranaceis lanceolatis subaequalibus, rudimento flosculi stipitato. Michaux l. c. In Georgia et Carolina.

88. *lanatum*, panic. composita erecta glabra, spiculis ovatis, culmo ramoso, fol. ovato-lanceolatis: ubescentibus, vaginis lanuginosis-lirsutis. Swartz. prol. 24. et Fl. p. 168. Hab. in Jamaicae subalpinis.

89. *arundinaceum*, panic. composita patente, ramis strictis capillaribus, spiculis subrotundis, culm. geniculato, fol. lanceolatis acuminatis rigidis. Swartz prod. 24. Hab. in Jamaica.

90. *radicans*, paniculatum, culmo ramoso radicante, fol. basi vaginisque longitudinaliter ciliatis. Retz. obs. 4. p. 18. Hab. in China.

91. *trichodes*, panic. ramosissima patente, ramis ramulisque subdivisis capillaribus, culmo declinato geniculato, foliis ovato-lanceolatis glaberrimis. Swartz Flor. p. 176. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 86. 115. t. 72. f. 3. Pluck. alm. 176. t. 136. f. 4. P. brevifolium. Lin. Willd. Sp. p. 353. cfr. Sw. l. c. p. 178. Hab. in Jamaicae Hispaniolae subalpinis.

92. *divaricatum*, panic. brevibus muticis, culmo ramosissimo divaricatisimo: pediculis bifloris: altero brevior. Amoen. acad. 5. p. 292. Hab. in Jamaica.

158. DIGITARIA. Cal. 2-3-valvis, concavus: valvula extrema minutissima, aut o secunda variabili, intima longitudine corollae. Cor. 2-valvis, oblongo-ovata, teres mutica. Styli longissimi. Nectar. fissum. Spicae digitatae, lineares: flor. geminatis: altero subsessili. (Richard.)

1. *sanguinalis*, culm. repentibus, flor. imbricatis, vaginis folisque papilloso-pilo-

*sis. Panic. sanguinale. Lin. Willd. Sp. 1. p. 346. Schreb. gram. t. 16. Leers t. 2. f. 6. Curt. Lond. ic. Hab. in Europa australi et Amer. ☉*

*Obs. Var. fol. longis et brevibus sub-lanceolatis. Vix specie diversum est Panicum filiforme, quod idem videtur esse ac Panic. debile. Desf. Atl. 1. p. 59.*

2. *humifusa*, ramosissima effusa tota glabra, spicis paucioribus subalternis. Hab. in arenosis circa Parisios. Rich. Priori similis, sed specie diversa.

3. *appressa*, spicis pluribus sessilibus alternis culmo adpressis, flor. ovatis acuminatis bifariis. Lam. ill. 1. p. 176. sub Paspalo. Hab. in Amer. meridion.

4. *villosa*, culm. erectis, fol. vaginisque villosis, spic. plurib. setaceis. Michx. Flor. Amer. bor. 1. p. 45. Syntherisma villosa Walter. Hab. in sabulosis sylvarum Carolinae.

5. *scrotina*, culm. decumbente, fol. vaginisque villosis, spic. pluribus setaceis, flor. binis minutis pedicellatis. Michaux p. 46. Syntherisma Walter. Gmel. Syst. N. Jan. 2. p. 154. Hab. in Carolinae graminosis humidis.

6. *umbrosa*, spicis subquaternis remotis, flosc. geminis inaequaliter pedicellatis, culm. repente flaccido. Retz. obs. 4. p. 16. Hab. in Indiae graminosis umbrosis. T.

7. *ciliaris*, spicis subligitatis approximatis erectis filiformibus, rachi flexuosa, dentibus bifloris, flor. pedicellatis, valvula exteriore ciliata, culmo folisque pilosis. Willd. Sp. 1. p. 344. sub Panic. Retz. obs. 4. p. 16. Hoffm. germ. 2. p. 31. Hab. in Java et China. ☉

8. *linearis*, spicis digitatis subquaternis linearibus, flosc. solitariis secundis muticis. Burm. ind. 25. t. 10. f. 3. (Panicum.) Hab. in Indis. Culmi prostrati, laeves, ramosi.

9. *distachya*, spicis subternis secundis laevibus, fol. planis, brevibus margine scabris. Lin. Mant. p. 138. Lam. ill. t. 43. f. 2. In India orientali. Facies Pasp. distichi. Spic. saepius 3 et 4. Retz.

10. *paspalodes*, culm. repentibus, fol. vagin. collo villosis, spic. geminis basi subvillosis, rachi latiuscula. Michaux Flor. 1. p. 76. Hab. in Amer. bor. pascuis aridis.

11. *longiflora*, spic. duabus sessilibus erectis, flosc. ovali-oblongis, culm. adscendente ramoso. Willd. Sp. 1. p. 332. Retz. obs. 4. p. 18. Sub Paspalo Hab. in Malabaria ad agrorum margines.

159. *CYNODON. Cal. 2-valvis, patens, lanceolatus. Cor. major, 2-valvis: valv. exteriore maxima ovoidae. Nect. truncatum. Spica digitata, florib. unica serie imbricatis, solitariis. (Richard.)*

1. *Dactylon* (sarmentosum), spicis digitatis patentibus, basi interiore villosis, flor. solitariis, sarmentis repentibus. Lin. Monti ic. 59. Wither arrang. t. 21. sub Panic. Hab. in arenosis, etiam maritimis. Ex radice dura perenni sarmenta exerit longissima fol. vaginis cincta.

160. *TRACHYS. Spic. digitata: flosc. in rachi membranacea 1-laterales; pedicellis pinnatis Bract. s. involucrum ovatum cartilagineum. Cal. 1-florus, 2-valvis. Cor. 2-valvis.*

1. *mucronata*. Cenchrus mucronatus. L. Panicum squarrosus. Retz. obs. 4. p. 15 et fasc. 5. t. 1. Willd. spec. t. p. 545. Hab. in Malabariae arenosis. Involuc. Retzii est pedicell. ramosus et cal. exterior, qui in Panicis minimus esse debet, revera involucri species. Flor. indurati. ☉

161. *LAPPAGO. Cal. subtrivalvis muricatus. Cor. 2-valvis, resupinata.*

1. *racemosa*. Willd. sp. 1. p. 484. Cenchrus racemosus. Lin. Tragus. Hall. Schreb. gram. t. 41. Hab. in Europa anstrali, Arabia et utraque India. Spiculae semina Cauliculis referunt. ☉

162. *CERESIA. Flosc. laterales bifarii sub Rachi lata membranacea cymbiformi. Cal. 2-valvis, 1-florus, lanatus.*

1. *elegans*. Paspalum membranaceum. Lam. ill. gen. p. 177. t. 43. f. 2. Hab. in Peru. Rachis tenuis subhyalina, fuscescens. Anth. bifurcatae.

163. *PASPALUM. Cal. 2-valvis, aequalis orbiculatus. Cor. ejusdem magnitudinis. Stigm. penicilliformia. Flor. 1-laterales.*

1. *dissectum*, spicis alternis, rachi membranacea, floribus alternis apice pilosis. Lin. Willd. Sp. 1. p. 330. Pluck. mant. 94. t. 356. Houttuyn. t. 89. f. 2. Hab. in America calidior. Gramen prostratum foliorum vaginis fere spathaceis. L. ☉

2. *scrobiculatum*, spicis alternis, rachi membranacea, floribus alternis, calycibus multinerviis extus scrobiculatis. Mant. ag. Houttuyn l. t. 89. f. 3. Hab. in India orientali. Culmi erecti, basi hirsuti, vagin. purpurascens, margine ciliatae.  $\overline{\text{T}}$

3. *villosum*, spicis alternis secundis: rachi hirsuta, flor. villosis duplici ordine, alternis secundis. Thunb. jap. 45. t. 8. Paspalum distichum. Houttuyn tab. 8. f. 4.

4. *virgatum*, spicul. paniculatis alterni basi villosis flor. geminis. Syst. Veg. 89. Jacq. Collect. 1. pag. 112. Gaertn. de fruct. 2. p. 1. t. 80 f. 1. Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 112. t. 69. f. 1. Hab. in Jamaica.  $\overline{\text{T}}$

5. *floridanum*, erectum, fol. inferioribus pilosis, vaginis longissimis, spicis erectis, glum. biseriatis suborbiculatis majusculis. Michaux Flor. 1. p. 44. Hab. in Florida et Georgia.

6. *plicatum*, erectum glabrum, spic. pluribus alternis erectis glum. subriseriatas ovatis (subrufescentibus), valv. plana margine plicatula. Michaux l. c. p. 45.

7. *strictum*, paniculato-polystachium, spicis approximatis, vaginis longis hirsutis, ligula villosa. Hab. in Insul. Antill. et ad St. Domingo. Gram. magnum.

8. *paniculatum*, spicis paniculatis verticillatis aggregatis. Sp. pl. 81. Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 115. t. 72. f. 2. Hab. in Jamaica.  $\odot$

9. *stoloniferum*, spicis numerosis subverticillatis, rachi undulata, flor. alternis secundis: glumis plicato-crispis, caule geniculato, stolonifero. Willd. Sp. p. 331. P. purpureum. Flor. Per. 1. p. 48. Milium latifolium Cav. ic. 3. p. 37. t. 273. P. racemosum. Jacq. ic. 1. 302. Praestantissim. hoc pabulum s. ante inter segetes Limae etc. crescit, ibique ter per annum metitur, quapropter in Europa propagari meretur. In locis calidis et maritimis per totum fere annum floret. Fl. Per.

10. *repens*, spicis paniculatis subverticillatis instantibus, culmo repente. Berg. Act. helv. 7. p. 129. t. 7. Habit. in Surinamo.  $\overline{\text{T}}$

11. *hirsutum*, spicis alternis subbinatis, rachi membranacea, calycibus multinerviis laevibus, fol. pedicellis hirsutis. Retz. obs. 2. p. 7. Hab. in China.

12. *Kora*, spic. alternis subbinatis, rachi membranacea, calycib. subrotundis quinque-nerviis, culmo foliisque glabris. Habit. in India.

13. *distichum*, spic. duabus erectiusculis

sub4-gonis, altera sessili, flosculis oblongis glabris, culmo adscendente, fol. planis? Sw. obs. 15. t. 2. f. 1. Hab. in Jamaicae graminosis subhumilis. Fol. involuto-subulata.  $\overline{\text{T}}$

14. *confugatum*, spic. duabus horizontalibus contiguis, spicul. ovatis culmo erecto fol. involutis. Swartz prod. 21. Bergius Act. helv. 7. p. 129. t. 8. P. tenue. Gaertn. Hab. in Jamaica, Surinamo.

15. *vaginatum*, spic. duabus, spiculis bifariis acuminatis, culm. ramoso geniculato, geniculis vaginatis. Swartz prod. 21. Ej. Flor. 1. p. 135. Hab. in Jamaica.

16. *filiforme*, spica subsolitaria lineariseccunda, spiculis ovatis compressis, culm. foliisque filiformibus. Swartz prod. 22. Ej. Flor. 1. 136. Hab. in Jamaicae campis. Vulgare.

17. *decumbens*, spica unica secunda, pedunculis longissimis, spiculis alternis orbiculato-acuminatis glabris, culmo procumbente. Swartz prod. 22. Flor. 1. p. 136. Hab. in Jamaicae campis apricis montosis.

164. CYNOSURUS. Cal. 2-valvis, multiflorus; Recept. proprium unilaterale foliaceum, s. spiculæ bracteis subjecta.

1. *cristatus*, bracteis pinnatifidis. Schreb. gram. 69. t. 8. f. 1. Willd. Sp. p. 411. Hab. in Europae pratis.  $\overline{\text{T}}$

2. *effusus*, panic. laxa, bract. lanceolatis acutis, fol. planis. Link in Bot. Journ. 2 p. 315. Hab. in Lusitaniae pr. tis.

3. *echinatus*, bracteis pinnato-paleaceis aristatis. Hab. in Europa australiori, Oriente.  $\odot$  Racemus glomeratus, secundus.

4. *paniculatus*, spica composita ovata, calyce multifloro, gluma altera mucronata, corollis basi pilosis. Thunb. prod. 23. Hab. in Cap. b. spei.

5. *Lima*, spica secunda, calycis gluma interiore spiculis subjecta. Loeff. ii. 41. Cavan. ic. 1. p. 62. t. 91. Desf. Atl. t. 19. Habit. in Hispania et Barbaria.

6. *retroflexus*, spica composita, spicul. aggregatis, calycibus bifloris aristatis, flosculis. Vahl symbol. 2. p. 20. Habit. in India orientali.

7. *Uniolae*, spica solitaria disticho-secunda, cal. multifloro mucronato, cor. basi villosis. Thunb. prod. 23. ebracteatus, spica secunda, spiculis bifariis alternantibus adpressis ovatis carinatis obliquis. Jdn. suppl. 110. Hab. ad Cap. b. spei. Facies Uniolae,

sed calyx bivalvis, nec multivalvis. Spica linearis. L.

*Obs.* An hujus generis una cum sequentibus?

8. *filiformis*, spica solitaria disticha, calycis subulatis trifloris, flosculo sterili mutico. Vahl. symbol. 2. p. 20. Hab. in Ind.

9. *monostachyos*, spica terminali, calyc. subulatis subtrifloris, flosculis aristatis unilateralibus. Vahl. l. c. Cum priore.

10. *roccifolius*, spicis linearibus rectis, fol. conduplicatis, margine alterne barbatis. Vahl. symbol. 1. p. 10. Forsk. descr. ar. n. 73. Hab. in Arabia.

11. *elegans*, panic. ovata laxa, flor. fasciculatis, cal. valva altera aristata, bracteis setiformibus. Desf. Atl. 1. p. 82. t. 17. Hab. in Algeria.

165. ELEUSINE. Spicæ digitatæ. Flor. secundi, mutici. Cal. multiflorus. Cor. 2-valvis mutica. (Flor. omnes hermaphroditi.)

1. *corocana*, spicis incurvatis, culm. compresso erecto sarcto, fol. suboppositis. Lin. sub Cynosuro. Schreb. gram. 2. p. 71. t. 35. Gaertn. 1. p. 8. t. 1. fig. 2. Rumph. t. 76. f. 2. Hab. in aren. ad maris littora in Ind. ☉

2. *aegyptia*, spic. quaternis obtusis patentibus dimidiatis, cal. mucronatis, caul. repente. Lin. Willd. spec. 1. p. 416. E *cruciata*. Lam. ill. t. 48. f. 2. Cum priore in Bhrbaria et in Aegypto. Spic. cruciatim dispositæ. ☉

3. *indica*, spic. digitatis strictis, spicul. subsexfloris, fol. vaginis compressis, collo pilos. Michaux. Flor. 1. p. 64. Cynosurus indicus. Lin. Hab. in India e America bor.

4. *mucronata*, spic. numerosis filiformibus panicatis, spicul. minutissimis, cal. mucronato quadrifloro, flor. muticis. Mich. l. c. Hab. in cultis Illinoensisibus.

5. *domingensis*, panic. ramoso-digitata, ramis simplicibus, spiculis subquinqüefloris, flosc. aristatis. Jacq. ic. rar. 1. t. 22. Mich. 2. p. 361. Hab. in Jamaica, St Domingo. An cum sequente hujus generis?

6? *virgata*, spicis alternis gracilib., spiculis purpurascensibus subsexfloris aristatis: floscul. ultimis submuticis. Lam. ill. gen. p. 189. sub Festuca. Cynosurus. Lin. Willd. Sp. 1. p. 417. Sloan. Jam. 1. t. 70, f. 2.

7. *filiformis*, panic. ramosissima coarctata: ramis simplicibus filiformibus spiculis alternis (purpurascensibus) 2-4. floris mu-

ticis, vaginis subpilosis. Hab. in America meridion. Pili in vaginis e glandulis sub lente percipiendis proveniunt.

166. CHLORIS. Polygama. Spica ut plurimum digitata unilateralis. Cal. 2-valvis, 2-6-florus (flor. dissimilibus); valv. carinatae muticæ aut aristatæ.

1. *monostachya*, spica unica, spicul. subsexfloris, florib. aristatis margine barbatis, glum. calycis exteriori scrobilato-glandulosa dorso aristata. Michaux. Flor. amer. 1. p. 59. Hab. in sylv. Carol. inferioris. Sapor piperinus.

2? *villosa*, monostachya, culmo compresso, flor. dense spicatis, glumis cor. villosis, flor. omnibus aristatis. Tetrapogon villosum Desf. Atl. 2. p. 389. t. 255. In arenis prope Cassam.

3. *falcata*, spica subsolitaria falcata, calyc. quadrifloro, glumis cor. margine carinaque ciliato-villosis. Swartz in Nov. Act. Soc. Berol. 3. p. 159. t. 1. f. 1. Cynos. falcatus. Willd. sp. 1. p. 411. Hab. ad Cap. b. spei. ☿

4. *cruciata*, spic. subquaternis cruciatis, flosc. acuminatis. Swartz Prodr. p. 25. et Ejusd. Flor. 1. p. 192. Agrostis cruciata. L. Hab. in Jamaicae campis aridis.

5. *petraea*, spicis 4-6 strictis erectis, flosculis imbricatis subglabris muticis, glum. calycis exteriori aristata, culm. compresso. Swartz Flor. 1. p. 194. Cynos. paspaloides. Vahl. symb. 1. p. 21. t. 27. Cresc. in Jamaic. littorib. petraeis etiam ad Cap. b. sp.

6. *mucronata*, culm. repente, spic. plerumque 4: rachi triangulari mucronata, spic. subquadrifloris, glum. exteriori aristata. Michaux. Flor. l. c. Pluck. t. 300. f. 8. Cresc. in Carol. infer. cultis. ☉

7. *ciliata*, spiculis digitatis subquinis erectiusculis, glum. coroll. interioribus margine ciliatis. Swartz Flor. 1. p. 197. Andropogon pubescens. Ait. Hab. in aridi. Antillarum, Jamaicae. ☉

8. *penicillata*, spic. digitatis, cal. 4-floris dorso aristatis, petal. exterioribus hermaproditis aristatis, penicillis barbatis. Vahl symb. 2. p. 21. sub Cynosuro. Hab. in India orientali.

9. *polydactyla*, spic. plurimis fasciculatus laxis, glum. interioribus ciliato-villosis. Swartz l. c. p. 199. Andro. polydactyl. Lin. Sloan. jam. p. 31. Hist. 1. p. 111. t. 65. f. 2. In Amer. australioris collib. gramin.

10. *barbata*, spic. plurimis fasciculatis laxiusculis, glum. barbatis: masculinis ventricosius aristatis. Sw. p. 200. Androp. barbatum. L.

11. *radiata*, spic. plurimis fasciculatis erectiusculis, flosc. subulatis glabris. Swartz p. 201. Agrostis radiata et Androp. fasciculatum. L. Cresc. frequens in Indiae orient. cultis.

12. *virgata*, spic. plurimis fasciculatis erectis, glum. exteriore aristata, interiore gibbosa ciliata; aristis longioribus. Swartz p. 203. Hab. in Antigua. Cal. distichis aristatis a priore differt. S.

13. *curtipendula*, culm. ascendente racemoso, spicul. plurimis brevibus distichis pendulis. Mich. Flor. 1. p. 59. In aridis regionibus Illinoensis. Habitus recedit festuroides.

167. DACTYLIS. Cal. 2 valvis, compressus; altera valvula majore carinata. Spic. aggregatae et capitatae.

1. *cespitosa*, panicula ovata coarctata, undique spiculis imbricata. Forst. Comm. genit. vol. 9. p. 22. Willd. 1. p. 407. Hab. in Novi Anni insulis.

2. *glomerata*, panic. secunda glomerata. Schreb. gram. t. 8. f. 2. Leers t. 3. Hab. in ruderalis, et sylvis.

3. *littoralis*, panic. spicata, culmo repente, fol. ramorum sterilius distichis: vaginis pilosis. Willd. 1. c. 408. Poa littoralis. Vahl. symbol. 2. p. 19. Gouan. monsp. 470. Pluck. Alm. t. 35. f. 3. Hab. in maris littora Tergesti, Galliae australis, Hispan. et Sisarae Tuneti. Calycis valvulae sunt carinatae, inaequales, undecimflorae. W. T.

4. *laevis*, panic. coarctata, glum. laevibus. Thunb. prod. 22. D. capitata. Lin. sup. 110. Cap. b. spei. T.

5. *spicata*, panic. spicata cylindracea basi interrupta, corol. apice aristatis. Willd. in N. Act. Berol. v. 3. Pluck. phytog. t. 150. f. 6. In agris oryzaceis Malabaricae crescit.

6. *villosa*, panic. spicata, glumis villosis. Thunb. prod. 22. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *serrata*, panicula coarctata, glumis carina serrulatis. Thunb. prod. 22. Ad Cap. b. spei.

8. *ciliaris*, spic. capitata secunda, calycibus trifloris, caule repente. Mant. 185. Thunb. prodr. p. 22. Caules articulati, radiculis longis albis. Hab. ad Cap. b. spei.

9. *hispida*, panicula spicata ovata nuda, calyce hispido, geniculis barbatis. Thunb. prodr. 22. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *Jagopoides*, spica subrotunda, cor. basi margineque villosis, pedunc. glabro, fol. margine hispidis culm. basi ramoso. Willd. in N. Act. Berol. 2. Lin. mant. p. 55. Burm. Ind. t. 12. f. 2. Hab. in Malabarica c. sequente.

11. *brevifolia*, spica globosa secunda, cor. pilosiusculis, pedunc. pubescente, fol. convolutis rigilis, culm. decumbente ramoso. Willd. 1. c. et Ejusd. sp. 1. p. 410.

12. *repens*, culm. repente, ramis fasciculatis, fol. villosis subulatis rigidis, flor. spicato-capitatis secundis. Desf. Atlant. 1. p. 79. Hab. ad maris litora in deserto. T.

13. *pungens*, culm. erecto superne nudo, spicul. terminalibus sessilibus in capitulum congestis, involucri squamoso. Desf. 1. c. p. 80. t. 16. Sesteria echinata. Lam. ill. t. 147. f. 2. Hab. in arenis prope Mascara. Involuc. squamulis plurim. ovatis. Styl. 2. barbati. Desf. ☉

168. POA. Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula ovata mutica: valvulis margine scariosis (discoloribus.)

1. *aquatica*, altissima, panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. Lin. Willd. sp. 1. p. 385. glumis nervosis obtusis. Moris. hist. 3. p. 201. s. 8. t. 6. f. 25. Hab. ad ripas, fluviorum.

2. *domingensis*, alta, panic. ramosissima subcontracta, spiculis parvulis 4-floris, fol. lanceolatis longissimis. Hab. in arenosis maritimis ad St. Domingo. (Poiteau.) 4-pedalis. Fol. basi subplicata.

3. *maritima*, panic. subsecunda disticha subcoarctata, spicul. 5-floris, floscul. obtusiusculis obsolete quinquenerviis, radice repente, fol. involutis. Smith. brit. 1. p. 97. Flor. dan. t. 251. Willd. sp. 356. Hab. in arenosis maritimis.

4. *distans*, panic. ramosa effusa, spicul. 5-floris, floscul. obtusiusculis distantibus obsolete 5-nerviis nitidis, fol. planiusculis. Lin. Willd. 1. c. t. p. 401. Smith. 96. P. salina. Poll. P. arenaria. Lam. Aira aquatica. (Schreb. Hnds. P. retroflexa Curt. Hab. in pratis, locis salinis et ruderalis maritimis.

5. *divaricata*, panic. divaricata, pedicellis incrassatis, spicul. quadrifloris, fol. filiformibus. Gouan. illustr. 4. t. 2. f. 1. Willd. 402. Hab. Monspelii et Marpurgi.



6. *bulbosa*, panic. subovata, spiculis 4-flor. subcorollatis pubescentibus; glumis interioribus margine villosis ciliatis, culm. subnudo basi tuberoso. Gramen vernum, radice ascalonica. Vaill. Bot. Paris. t. 17. f. 8. P. trivialis Koeler. Hab. primo vere, in graminosis colliculosis; colore plerumque fuscolulente.

7. *crispa*, elatior, spiculis glabris in foliola cornuta excrecentibus. Thuill. Paris. p. 45. Moric. t. 5. f. 14. Vill. delph. 2. p. 131. In sylvaticis, ad saepes. Primo intuitu a prioribus diversa videtur.

8. *alpina*, panic. subovata, spicul. 6-floris cordatis, culmo basi crassiusculo, radice densa fibrosa P. alpina, spic. 3-floris apice retusis, valv. corol. exteriorib. ovalis pilosis interiorib. ciliatis. Braun. Flor. Salz. p. 67. Hab. in montosis, subalpinis. Var. quoque spicul. in folia excrec. seu viviparis.

9. *laxa*, panic. contracta subracemosa, spiculis trifloris, basi dorsoque pubescentibus, ra. lica repente. Willd. p. 386. Haenke audet. p. 118. Scheuchz. it. VI. p. 45. t. 6. f. 16. Hab. in alpinis Europ. Priori affinis.

10. *hirta*, panic. patula virgata, calycib. subtrifloris angulatis, vaginis punctato-ciliatis. Willd. 307. Hab. in Japonia.

11. *trivialis*, panic. subdiffusa, spicul. trifloris basi pubescentibus, culmo scabro subcapite, ligula longa. Curt. Lond. ic. P. pratensis Leysser. P. dubia, vaginis foliisque subtus scabris. Leers. t. 6. f. 5. P. palustris quorumd. P. scabra. Ehrh. Hab. in pascuis, ruderalis et humilis. Spic. atrovirentes. Fol. subtus scabra, passim cum vagin. laeviuscula.

12. *angustifolia*, panic. diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti laevi, fol. radicalib. filiformi-involutis. Län. Willd. p. 387. Flor. auct. 77. 81. Pollich. pal. Leers. t. 6. f. 3. Hoffm. germ. p. 43-44. Poa glabra. Ehrh. Hab. ad agrorum versuras et in muris, et pratis. Fol. caulina. breve, latiusculum. ¶

13. *pratensis*, panic. diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti glabro, ligula brevi truncata, fol. planis. Curt. Lond. ic. Hab. in pratis et sylvaticis. Spic. 4-florae glum. 5-nerviis villosis connexis. Smith, secundum quem antecedens hujus sentum varietas est.

14. *cillianensis*, panic. elongata ramosa flexuosa, spicul. quadrifloris glabris. Willd. l. c. p. 389. Allion. pedem. n. 2207. t. 91. f. a. Barr. obs. 3. t. 743. In Italia. ¶

15. *caesia*, panic. diffusa, spic. ovatis quinquefloris, glum. lanceolatis subsericeis

liberis, stipulis brevissimis obtusis. Smith. l. c. p. 103. P. glauca. Wither. arrengr. p. 248. Hab. in Scotiae montosis. Herb. glauca; vag. striata, subscabra. S. ¶

16. *flexuosa*, panic. flexuosa, spic. trifloris, glumis ovatis basi villosis connexis, ligula lanceolata caulinarum passim lacera. Smith l. c. p. 101. In Alab. scoticis. Glauca. Fol. supra scabra. S.

17. *variegata*, fol. involutis, panicula oblonga contracta, spicul. 3-4-floris teretiusculis purpureo-maculosis. Lam. ill. 1. p. 182. P. cinerea Villars. Hab. in Arveniae et Delphinat. subalpinis. Fol. latus cinerea. V

18. *hydrophila*, panic. subattenuata, spiculis parvis subtrifloris apice lutescentibus, ligula elongata. Cr. sc. in aquosis. Huc pertinent P. crocea. Michaux et P. palustris quorumd. Fol. subscabra.

19. *debilis*, fol. longo-linearibus, panic. debili multiflora spicul. 3-4-flor. parvulis albido-viridulis. Thuill. Flor. Paris. Hab. in pratis. Uti et antecedens P. nemoralis affinis.

20. *palustris*, panic. diffusa, spicul. subtrifloris pubescentibus, fol. planis demum involutis subtus scabris. Hoffm. germ. ed. 2. p. 43. Willd. sp. 1. p. 391. P. trivialis. Leers. t. 6. f. 2. Cresc. in humilis ad ripas. Gramen dubium. Spicul. spadicco-purpureae, apice flavae. H.

21. *biflora*, panic. densa, cal. subbifloris glabris, culmo adscendente. Retz. obs. 5. p. 19. Hab. in India.

22. *nemoralis*, panic. attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culm. tenui, fol. patentibus, ligula brevissima. Leers. t. 5. f. 3. In nemorosis, ad rupes umbrosas.

23. *contracta*, panic. contracta, flosc. lanceolatis trifloris nudis sessilibus, fol. filiformibus. Retz. obs. 3. p. 11. Hab. in India.

24. *filiformis*, panic. patenti, spiculis acutis quadrifloris, fol. filiformibus. Thunb. prod. 21. Hab. in Cap. b. spci.

25. *lineata*, panic. debili pendula spicul. subquadrifloris, floscul. subdistantibus glabris manifeste striatis. P. striata. Michaux. Flor. 1. p. 69. Hab. in Amer. boreali. Glumae fere ut in P. ciliati L. transversae, obtusae.

26. *striata*, panic. diffusa capillari, spic. glabris subquingueflor. cor. exquisitestriatis. Lam. ill. gen. 1. p. 183. Hab. in Virginia. Cal. brevis. Cor. majuscula ovata.

27. *nervata*, panic. stricta, spiculis glabris quinquefloris nervosis. Willd. sp. 1. p. 389. Herb. in America boreali. Panic. fere

*sempedalis*, ramis capillaceis ramosis adpressis. W.

27. *trinervata*, panic. diffusa, spiculis subquinquefloris acutissimis scabris corollae gluma exteriori tri-, interiori binervata. Schrad. spicil. p. 3. Willd. l. c. Ehrh. Beib. 6. p. 131. Poa sylvatica. Poil. palm. n. 87. Roth. gerin. l. p. 43. H. p. 117. Hab. in sylvaticis. W.

28. *sudetica*, panic. erecto-patente, spic. trifloris alaberrimis mucronatis, culm. erecto compresso, vaginis laxis ancipitibus. Haenke sudet. p. 100. P. quadripedalis. Ehrh. Hab. in montibus Silesiae. Gramen altum quadripedale, fol. latis, culm. ancipiti, spiculis lacte viridibus. W.

β *atrata*, fol. planis latiusculis obtusis, culmo laevi compresso. panic. diffusa, spic. ovatis subquinquefloris atrovirescentibus. P. *sylvatica*. Villars delph. 2. p. 128? Hab. in montosis, subalpinis pratis. Culm. basi arundinaceus.

29. *anceps*, panic. diffusa, spiculis quinquefloris, acutis, basi pubescentibus, culmo ancipiti. For t. prod. n. 43. Hab. in nova Zeelandia.

30. *annua*, parvula, fol. margine subundulatis, panic. diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culm. obliquo compresso. Leers. t. 6. f. 1. Hab. ad vias, locis irrigatis vulgaris. ☉

31. *flava*, panic. diffusa, spiculis ovato-oblongis nitidis. Sp. pl. 100. Hab. in Virginia.

32. *compressa*, panic. secunda coarctata, culm. adscendente compresso, flor. 3-9 angulosi basi villo connexis. Smith. brit. 1. p. 99. Lin. Willd. sp. 1. p. 397. Cresc. in muris, pascuis, et agrorum veruris.

33. *barbata*, panic. patula capillari, spiculis sexfloris oblongis, glumis glabris carinatis, genicul. barbatis. Thunb. jap. 50. t. 10. Willd. l. p. 391. Hab. in Japonia. ☉

34. *pilosa*, panic. patente stricta: ramificationibus primariis pilosis. Sp. plant. 100. Hab. in Italia, Carniola.

35. *glutinosa*, panic. patente stricta, spiculis subnovemfloris hirsutiusculis glutinosis, culm. simplici, fol. subulosis Swart. prodr. 26. et Flor. p. 214. Sloan. hist. 114. t. 71. f. 2. Hab. in Jamaica.

36. *prolifera*, panic. patente stricta, spiculis multifloris, (18-20.) culmo ramosissimo nodoso, ad nodos prolifero. Sw. prod. 27. et Ej. Flor. p. 216. Hab. in insulis Cari-

beis, Guadeloupe. Genicula junioris plantae originis. quae prolifera. Sw.

37. *thermalis*, panic. conferta ovata, spiculis undecimfloris distichis ovatis, basi pubescentibus. Willd. sp. p. 392. (P. *badensis*.) Hab. in rupibus ad thermas Badenses in Austria inferiori.

38. *amabilis*, panic. patente, spiculis octodecimfloris linearibus. L. Fl. zeyl. 46. P. *rubens*. Lam. ill. t. 45. f. 2. ? Hab. in India.

39. *Eragrostis*, panic. patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris (9-15), glumis trinerviis. Sp. pl. 100. Schreb. gram. 2. p. 81. t. 38. Hab. in Helvetia, Italia, Barbaria et Sibiria. Vag. scutulis coronata. An. P. *ferruginea*. Thunb. jap. p. 50. Willd. l. p. 388. neca varietas?

40. *brisoidea*, panic. racemosa, spiculis ovatis compressis 8-9-floris, culm. compresso. Lin. suppl. Briza capensis Thunb. Willd. p. 404. Hab. in Cap. bon. sp.

41. *cynosuroides*, panicul. composita stricta pyramidalis, pedunc. patentissimis, spiculis dependentibus distichis. Retz. obs. 4. p. 20. Uniola bipennata panic. subsupicata, racemis pinnatis, subus imbricatis L. Sp. pl. 104. Briza bipinnata. Amoen. acad. 4. p. 450. Hab. in Aegypti et Indiae aridis. Gramen speciosissimum.

42. *unioloides*, panic. erectiuscula, spiculis subdecemfloris ovatis, calyc. inferioribus multivalvibus. Retz. obs. 5. p. 19. Hab. in India. An potius Uniola?

43. *cyperoides*, panic. spicato-glomeratis spiculis 11-floris, culmo ramoso, foliis subulatis. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. spei.

44. *racemosa*, panic. coarctata, spiculis ovatis novemfloris, pedunculis brevissimis. Thunb. prod. 21. Hab. ad Cap. b. spei.

45. *verticillata*, panic. patente capillari flexuosa, spiculis undecimfloris lineari-subulatis. Willd. sp. 1. p. 393. Cav. ic. 1. p. 63. t. 93. In Hispania.

46. *megastachya*, panic. patente, pedicel. subsolitariis, spiculis lanceolatis 15-20-floris, seminib. reticulato-rugosis. Koeler. Gram. p. 181. Briza Eragrostis. Lin. Poa Eragrostis. Cav. ic. t. 92. Schreb. gram. t. 38. Hab. in Europae et Barbariae agris et arenosis.

47. *atrovirens*, tota glabra, culmo erecto, panic. patente, spic. planis linearibus 8-10-floris, fol. subrigidis. Desf. Atl. 1. p. 73. t. 17. In arvis incultis prope la Calle in Atlantic. T.

48. *hypnoides*, spicul. linearibus subsessilibus confertis longissimis sub 50-floris, culm. brevissimo ramoso. Lam. ill. 1. p. 185. Hab. in Amer. meridion.

49. *aspera*, panic. patente ramosissima, pedunc. asperis, spicul. 10-floris vaginis antice hirsutis. Lam. l. c. Jacq. hort. 3. t. 56.

50. *tremula*, ramosissima capillari patente, spicul. linearibus glabris sub 30-floris. Lam. l. c. Hab. in Senegal.

51. *madagascariensis*, panic. ramosa laxa patentissima, spic. subro-floris, vagin. nudis, culm. simplice. Lam. l. c. Hab. ad Madagascar.

52. *subsecunda*, panic. oblonga laxa, spicul. linearibus acutis multifloris, lateralibus extror um versis. Lam. ill. p. 184. Hab. in China. Spiculae glabrae, 15-30-florae. L.

53. *pectinacea*, panic. laxa pyramidata, spicul. linearibus subro-floris, rachis demum valvul. interiorib. persistentibus pectinata. Mich. Flor. Am. bor. 1. p. 69. Hab. in arvis Illinoensibus. Spiculae 7-13-florae.

54. *elegans*, panic. elongata angustata interrupta, spic. subdecemfloris, cor. valvis intus carinatis. Lam. Poiret. Hab. in Portorico.

55. *reptans*, culm. reptante, panic. coarctata, spic. 6-12-floris sublinearib. fol. distichis subconvolutis. flor. dioicis. Mich. Flor. 1. p. 69. t. 11. Ad ripas regionis Illinoensis. Spiculae faemineae majores.

56. *abyssinica*, panic. capillari laxa erecta, spicul. quadrifloris laevibus linearilanceolatis, fol. glabris subconvolutis. Ait. Kew. 1. p. 100. Jacq. ic. rar. 1. tab. 17. Colitur in Abyssinia. ☉

57. *hirsuta*, culmo crasso simplici, vagina hirsuta, panic. ramosissima capillari, spicul. 5-floris. Michaux. p. 68. In Carolina inferiore. Habitus Panicis capillaris.

58. *malabarica*, panic. ramis simplicissimis, florib. sessilibus, seminibus distantibus, culmo repente. L. Willd. l. c. Sp. pl. 100. Hab. in Indiae arenosis.

59. *tenella*, panic. oblonga capillari subverticillata, flor. sexfloris minutissimis nutantibus. (P. P. Jacq. onica. Thunb. jap. 51. Pluck. alm. 176. t. 300. f. 2. Burm. zeyl. 170. t. 47. f. 3. Rumph. amb. G. t. 4. f. 3. Hab. in India. Panicula ad pedunculorum basin fasciculos gerit e pilis longis 3-16 candidissimis. Retz. ☉

60. *nutans*, panic. contracta apice nutante, spicul. decemfloris, valvulis reversis. Retz obs. 4. p. 19. Hab. in India ad agrorum margines.

61. *punctata*, panic. diffusa, spiculis duodecimfloris. florib. diaphan. laevibus, puncto intus fusco. Lin. suppl. 109. Hab. in Malabaria. Spiculae 12-14 florae. Flosculi diaphani, cum puncto intus fusco, et stria viridi utrinque. L.

62. *spinosa*, paniculae ramis alternis, compressis spinescentibus, spiculis alternis pedunculatis 10-floris, culmo ramoso Willd. p. 397. Thunb. prod. 22. Festuca spinosa, frutescens, ramis ramulisque spinosis, pedicellis aculeatis. Lin. suppl. 111. Hab. in Cap. b. spei. ☿

63. *sarmentosa*, panicula coarctata, spicul. lanceol. decemflor., culmo sarmentoso. Thunb. prod. 21. Hab. ad Cap. b. spei. ☿

64. *amboinensis*, panic. coarctata secunda, culmo tereti. L. Mant. p. 557. Retz. obs. bot. 4. p. 20. Rumph. amb. 6. p. 12. t. 7. f. 3? Hab. in India. Antecedenti similima.

65. *viscosa*, panic. oblonga patente, spiculis inferioribus trifloris, superioribus 12-floris, culm. rigidis demum viscosis. Retz. obs. 4. p. 20. In Malabariae aridis. ☿

66. *peruviana*, panic. spicata, spiculis quinquelfloris ovatis, fol. culmisque procumbentibus hirsutis. Willd. p. 400. Jacq. ic. rar. 1. t. 18. Collect. 1. p. 107. Hab. in Peru. ☉

67. *glomerata*, panic. spicata glomerata, spicul. quadrifloris, corollis ciliatis. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. spei.

68. *ciliaris*, panic. contracta, glumarum valvula interioribus piloso-ciliatis, apice mucronatis. L. Syst. Veg. 69. Jacq. Coll. 2. p. 338. In India occidentali. Spicula demum purpurascens i glumis membranaecis laxis. Koeleris affinis.

69. *plumosa*, panic. diffusa, cal. 6-floris, valv. coroll. interioribus linearibus recurvis dorso ciliatis. Retz. obs. 4. p. 20. Hab. in India. Flosc. cum seminibus pellucidis. R.

70. *panicæ*, panic. ramis subbinatis remotis filiformibus, cal. 2-floris vaginis punctato-pilosis. Retz. obs. 3. p. 11. In India. Panic. pedalis tenuissima. Flor. pedicellati. R.

71. *chinensis*, panic. ramis simplicissimis, flor. sessilibus, culm. erecto. Burm. ind. t. 11. f. 3. P. sessilis. Lam. ill. p. 185. Hab. in Ind. Vulg. quoque in Amer. insulis.

72. *bifaria*, spic. sessilibus distichis, in-

ferioribus remotis effectis superioribus approximatis recurvatis. Vahl. symb. 2. p. 19. In Ind. orientali.

73. *bromoides*, subspicata, spicul. lanceolatis 35-floris, inferioribus breve pedicellatis, superioribus sessilibus, fol. bifariis involutis. Vahl. symb. 3. p. 10. Hab. in Lima?

74. *sicula*, spica disticha compressa, spicul. lanceolatis oblongis sessilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 303. Triticum unioides. Willd. sp. 1. p. 488. Scop. delic. t. 11. Hab. in Italia et Barbariae maritimis.

75. *loliacea*, spica simplici secunda, flosculis ovatis, culm. cespitoso. Huds. Triticum. Smith. brit. 1. p. 159. Engl. bot. t. 221. Hab. in arenosis maritimis.

Obs. Non vera Poa est, quod valet de priore et sequē tibus quoque, nec bene ad Tritica pertinet. Forte distincti generis, si characteres modo sufficient.

76. *subverticillata*, panic. laxa basi verticillata, pedicellis elongatis, spicul. raris subquinq. floris, cal. crassiusculis subangulatis obtusis. Lam. ill. 1. p. 183. (P. *laxa*.) Hab. in Virginia. Tritico maritimo L. affinis videtur.

77. *rigida*, panic. lanceolata distichosecunda coarctata glabra: rachi marginata, spic. 6 floris, flosc. teretibus enerviis. Smith. brit. p. 99. Lin. Willd. Curt. Lond. ic. Hab. in maris, arenosis. ☉ Var. rachi subsiliiformi, an distincta?

78. *procumbens*, panic. lanceolata secunda coarctata scabra: rachi tereti, spic. subquinq. floris, floscul. obtusiusculis nervosis. Smith. l. c. Curt. Lond. ic. Sowebl. engl. bot. t. 532. P. *rupestris*. Wither. arraes. t. 26. In Angliae ruderalis, maritimis. ☉

169. BRIZA. Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula disticha: valvulis ventricosis cordatis, obtusis: interiore minuta.

1. *minor*, spiculis triangulis, calyce flosculis (7) longiore. Schenchz. gram. 205. t. 4. f. 9. Hab. in Europa et ad Cap. b. spci. Glum. margine inflexae. ☉

2. *virens*, spic. ovatis, calyce floscul. (7) aequali. Sp. pl. Hab. in Oriente, Hispania et ad Cap. b. spci. ☉

3. *canadensis*, erecta longifolia, panic. laxa, spicul. erectis 4-10-floris, cal. parvulo, cor. valv. exteriori ovali acuta. Michaux. Flor. p. 11. Hab. in Canada. Spicul. virescent.

4. *media*, spicul. ovatis, calyce flosculis (7) brevior. Flor. dan. t. 258. Leers. t. 7. f. 2. Hab. in pratis, sylvis. Var. spicul. purascentibus et albidis. ☉

5. *geniculata*, spicul. ovatis, calyce flosc. brevior. culmo geniculato. Thunb. prod. 21. Hab. ad Cap. b. spci.

6. *erecta*, panic. subspicata, spicul. ovatis erectis subnovemfloris, cor. acutiusculis laevibus. Lam. ill. 1. p. 187. Hab. in Montevideo. Glum. albidae.

7. *rubra*, panic. subsimplici, spicul. cordato-ovalibus erectis 9-floris, glum. margine rubris. Lam. l. c. Hab. in India. Cor. subpubescens.

8. *maxima*, spic. cordatis: flosculis septendecim. L. Lam. ill. t. 45. f. 2. Hab. in Italia, Lusitania, Cap. b. spci, India. Cal. spadicis. ☉

170. UNIOIA. Spiculæ multifloræ, planæ ancipites, ovate: Cal. multiglumis. Cor. 2-valvis, mutica: valv. interiore minore, intra exteriorem recumbente. Stam. 1-3. Appendices 2, subbicoracae ad basin germinis. Stigm. longa, muricata.

1. *latifolia*, fol. latis planis, panic. laxa, cal. trivalvi, spiculis longe pedicellatis, flor. monandris. Michaux. Flor. Amer. bor. 1. p. 20. Hab. in Amer. montibus Alleghanis. In hortis sub nomine U. *paniculatae* colitur.

2. *maritima*, fol. convolutis, panic. longa, spiculis subsessilibus, cal. multivalvi, flor. 3-andris. Michaux. l. c. p. 71. U. *paniculata*. Lin. Will. spec. 1. p. 406. Hab. in Virginiae littoribus arenosis.

171. FESTUCA. Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula oblonga, teretiuscula aut divergens, mutica aut arista terminali instructa.

#### \* Spica simplice.

1. *loliacea*, spic. elongata, spiculis alternis sessilibus muticis. Huds. Smith. brit. 1. p. 112. Curt. Lond. ic. F. *elongata*. Ehrh. E. Phoenix. Thuill. Hab. in pratis et pascuis humidis. An potius Lolium? quod refert; sed cal. 2-valvis, quod etiam passim obtinet in L. temulento.

2. *monostachya*, culm. filiformi, fol. ciliatis, spicula unica terminali longe aristata. Desf. Atl. p. 92. t. 24. f. 2. Hab. in arvis prope La Caillie.

3. *cynosuroides*, spicul. breviter petiolatis secundis compressis aristatis. Def. l. c. p. 88. t. 21. In arenosis prope Casam. ☉

Obs. Ob affinitatem cum *Festuca ovina* huc forte melius collocandum esset *Tritium tenellum*.

\*\* *Panicula plus minusve ramosa secunda coarctata.*

4. *magellanica*, panic. secunda stricta subspicata, spicul. violaceo-fuscis aristatis subsexfloris, fol. radicalibus setaceis. Lam. ill. 1. p. 189. Hab. in fretu Magellanico.

5. *capillata*, panic. angusta subsecunda, spicul. sub4-floris aristatis, culm. laevi uniformi, fol. capillaribus. Lam. l. c. p. 190. Hab. in umbrosis et nemoribus. F. *ovinae* affinis. †

6. *tenuifolia*, panic. subsecunda coarctata mutica, culm. 4-gono apice submentoso, fol. capillaribus. Hoffm. germ. p. 51. Leers. t. 8. f. 4. In collibus et sterilibus.

7. *ovina*, cespitosa, panicula secunda coarctata, floscul. teretiusculis basi glabris, culmo tetragono glabro, fol. omnibus setaceis scabris. Smith. brit. 1. p. 113. Willd. Sp. 1. p. 410. Leers. t. 8. fig. 3. Habit. in collibus aridis, etiam in sylvaticis. Rad. fibrosa nigrescens.

8. *vivipara*, panic. secunda coarctata, floscul. compresso-carinatis muticis calyceque subpubescentibus, culm. 4-gono, fol. setaceis laevibus. Smith. l. c. Raj. synopsis. t. 22. f. 1. Scheuchz. prodr. t. 1. f. 2. Hab. in subalpinis. In hortis vivipara manet S. An F. *ovinae* tantum varietas?

9. *rubra*, panic. secunda, flosc. teretiusculis aristatis, fol. linearib. aequalibus supra pubescentibus, radice late repente. Smith. l. c. p. 116. Stilling fl. Misc. t. 9. Habit. in pascuis, montosis, sylvaticis, etiam in arenosis maritimis, ubi radicis flagellis longissime per arenam mobilem extensis. Sm.

Obs. F. *rubra* Auct. diversa videtur.

10. *duriuscula*, panic. secunda diffusa, floscul. aristatis, culm. tereti, fol. caulinis planis, radice fibrosa. Smith. l. c. p. 115. Leers. t. 8. f. 2. Engl. bot. t. 470. β *dumetorum*, flosculis mollissime pubescentibus. Lin. Flor. dan. t. 700. Hab. in pratis et pascuis siccioribus β in dumetis. Videtur F. *rubra* plurium auctorum.

11. *glauca*, panic. secunda subspiciformi, spic. laevibus subquingefloris subaristatis, fol. glaucis rigidis subulatis. Lam. ill.

1. p. 190. t. 46. f. 3. Hab. in Europ. australiori; in hortis ad latera areolarum etiam colitur.

12. *cinerea*, fol. subulatis recurvis, panic. subsecunda, spicul. subhirsutis aristatis 5-floris. Villars delph. 2. p. 98. Hab. in montosis Galliae austral. An a priori satis diversa?

13. *varia*, fol. setaceis duriusculis, panicula collecta, spiculis teretibus subquadri-floris subaristatis. Vill. delph. 2. p. 102. (F. *pumila*). Willd. sp. 420. F. *varia*. Jacq. Collect. 2. p. 94. Hab. in alpihus Delphinatus, Helvetiae, Styriae. T.

14. *amethystina*, panicul. flexuosa, spiculis secundis inclinatissimis submuticis, fol. setaceis. Lin. Gramen montanum, panicul. heteromalla spadicea et velut amethystina. Scheuchz. gram. 276. Habit. in montosis. Species dubia.

15. *reptatrix*, panic. ramis simplicibus, spiculis subsessilibus, fol. involuto-filiform. Sp. pl. 108. Willd. p. 421. Hab. in Arabia, Palaestina. Radix longissima reptans sub terra, vestigia latiss. foliorum rudimentis. T.

16. *heterophylla*, fol. radicalibus setaceis, caulinis planis latioribus, panic. rara secunda, spiculis subsexfloris lanceolatis glabris aristatis. Jacq. Collect. 2. p. 93. Vaill. bot. Paris. t. 19. f. 6. F. *memorum*. Leyss. Hab. in sylvaticis. T.

17. *Myurus*, panicula spicata longa nutante calycibus minutissimis muticis, flor. scabris; aristis longis, fol. setaceis. Leers. t. 3. f. 5. Gramen murorum, spica longissima. Moris. s. 8. t. 7. f. 43. Habit. in pratis arvis, muris. ☉

18. *alopecurus*, racemo subspicato, spicul. alternis distichis aristatis, cor. villosa-ciliatis. Schousb. Maroc. 1. p. 281. Hab. in arenosis prope Tingidem. In planta culta racem. transit in paniculam secundam. Roth.

19. *bromoides*, panic. erecta secunda laxiuscula, spiculis laevibus, flosc. longissime aristatis. Lam. ill. p. 189. t. 46. f. 4. Willd. sp. 1. p. 418. F. panic. secunda erecta, flosc. subulatis aristatis apice scabris, fol. setaceis vagina brevioribus. Smith. brit. 1. p. 117. Pluck. Phyt. t. 33. f. 10. Bromus. *dertonensis*. Allioni. B. *ambiguus* Cyrtilli. Hab. in muris et arenosis. Valv. interior margine pubescens. An F. *sciuroides*. Roth. Willd. 1. p. 423. eadem species?

20. *uniglumis*, panic. secunda erecta subsimplici, flosc. subulatis compressis arista-

tis, cal. valvula altera brevissima. Smith. p. 118. Raj. Syn. t. 17. f. 2. Lolium Bromoides. Huels. Stipa *membranacea* Linn.? Hab. in Angliae arenosis maritimis. Fol. laeucolata subinvoluta striata.

21. *ciliata*, culm. adscendente, fol. subconvolutis, spic. racemosa, cal. valva altera minima: corollinae exteriori margine ciliata. Link. in Schrad. Journ. 2. p. 315. Habit. in Lusitaniae litore arenoso fluv. Douro, et in Gallia meridionali.

22. *Halleri*, minuta, fol. setaceis duris, panic. stricta, spicul. teretibus hirsutis, longius aristatis. Vill. delph. 2. p. 103. Hall. Helv. n°. 1441. Allion. pedem. 2215. Cresc. in subalpinis. Culm. 2-3. unc. longus. Spic. griseae. V.

23. *montana*, panic. secunda depauperata, spicul. solitaris quadrifloris hirsutis, fol. linearib. rigidis pilosis. Savi. Pis. 1. p. 118. Hab. in monte Pisano. ¶

24. *stipoides*, panic. erecta secunda, spicul. subquinq. floris, glum. breviter aristatis, pedicellis ensiformibus. Desf. atl. 1. p. 91. Bromus stipoides. Lin. Mant. p. 557. Barrel. t. 96. f. 1. Hab. in Majorca et prope Mascar. Aristae ex apice. ☉

25. *rubens*, panic. fasciculata secunda, spicis subsessilibus villosis rubescentibus aristis rectis elongatis. Brom. rubens. Linn. Hab. in Hispania.

Obs. Aristas in hac et antecedente specie terminales observavi. Forte Br. *rubens*. Cav. ic. 1. p. 34. t. 45. f. 2. est Brom. scoparius L., species adhuc dulcis.

26. *scabra*, panic. secunda coarctata, spiculis compressis scabris flosc. scabris. Vahl. symb. 2. p. 21. Hab. ad. Cap. b. spei.

### \*\*\* Panicula aequali.

27. *fusca*, panic. erecta ramosa, spiculis sessilibus carinatis muticis, fol. involutis. Lin. Sp. pl. 109. An. F. fascicularis. Lam. ? Hab. in Palestina. Culmus altus. Spiculae erectae longae, flosc. 16. s. 24. L.

28. *decumbens*, panic. erecta, spiculis subovatis muticis, calyc. floscul. majore, culmo basi decumbente. L. Fl. succ. p. 92, 93. Leers. t. 7. f. 5. Bromus decumbens. Koel. gram. p. 242. An potius Bromus ? Valv. corollinae enim margine versus basin ciliatae. Hab. in sylvaticis, pascuis. ¶

29. *pauciflora*, panic. patula, spiculis subquadrifloris aristatis scabris, fol. villosis. Thunb. jap. 52. Hab. in Japonia.

30. *elatior*, panic. secunda suberecta,

spiculis obtusiusculis: exterioribus teretibus. Leers. t. 8. f. 6. Hab. in pratis fertilissimis. Est F. *elatior* plurium auctorum.

31. *spadicea*, panic. contracta subcunila, spicul. compressis, quadrifloris muticis (coloratis), fol. linearib. demum convolutis. Smith. in Act. Lin. 1. p. 113. Willd. Sp. 1. p. 421. Hab. in Galliae montosis. Cal. valv. altera minor.

32. *arundinacea*, panic. erecta stricta, spic. oblongis erectis 4-floris brevissime aristatis. Hoffm. germ. Schreb. spicul. p. 57. Hab. in humidis ad margines rivulorum. Hujus loci. F. *elatior* Curtis. Smith. brit. 1. p. 124 ?

33. *caerulescens*, fol. hinc striatis rigidis, panic. secunda coarctata, spicul. subtrifloris, glumis acutis muticis. Desf. Atl. 1. p. 87. Hab. in Algeriae arvis.

34. *gigantea*, panic. secunda nutante ramosa laxa, floscul. lanceolatis ventricosis aristatis, fol. ensiformibus laevib. Smith. l. c. p. 120. Br. *giganteus*. Linn. Habit. in sylvis umbrosis humitiusculis. Glum. interior non pectinato-ciliata ut in Bromis. S. ¶

35. *poaeformis*, fol. longissimis, panic. ramosissima pallida, spiculis oblongis subduodecimfloris obtusius muticis. F. Poaeoides. Thuill. Paris. p. 51. Hab. in sylvaticis siccis, Spic. primo subtretes ut in F. lolioides.

36. *poaeoides (americana)*, glaberrima, culm. geniculato sublinodi, panicul. subconserta: ramis inferioribus simplicibus, spiculis oblongis 9-10-floris muticis. Michaux, p. 67. Hab. ad ripas fluv. St. Laurentii.

37. *polystachya*, panic. erecta coarctata, ramis s. pedicellis simplicibus: spiculis tenuibus unilateralibus 8-10-floris, fol. longissimis glabris. Michaux, p. 66. In America boreali.

38. *calamaria*, panic. secunda erecta ramosissima coarctata, flosc. parvis oblongis angularis muticis, fol. ensiformib. striatis. Smith. brit. 121. Hab. in sylvat. subalpinis Scotiae. Spic. virescent 3-5-florae. Culm. teres, vag. longae. ¶

39. *fluitans*, culmo adscendente, panic. ramosa r. mis patentibus, spiculis subsessilibus adpressis teretibus muticis. Schreb. gram. 37. t. 3. Leers. t. 8. f. 5. Poa fluitans. Smith. brit. 1. p. 95. Glum. margine scariosae s. coloratae ut in Pois. Hab. in fossis et paludibus. ¶

40. *dviaricata*, culm. basi geniculato

spicul. teretibus elongatis muticis paniculato-dichotomis. Desf. Alt. 1. p. 89. t. 22. Hab. in Barbariae arenosis maritimis.

41. *misera*, panic. coarctata, glum. aristatis scabris, culmo geniculato, fol. ensiformibus. Thunb. jap. 52. Hab. in Japonia.

42. *indica*, panic. contracta erecta, spicul. compressis subaristatis subsexfloris. Retz. obs. 4. p. 21. Willd. p. 427. Rheed. mal. 1a. p. 75. t. 45. Hab. in India, in agris oryzaceis. Colore coerulescenti-viridi e longinquo dignoscitur. R.

43. *calycina*, panic. coarctata, spiculis linearibus, calyce flosculis longiore, fol. basi barbatis. L. Cavan. ic. 1. p. 33. t. 44. f. 2. Lam. ill. 191. t. 46. f. 5. Hab. in Hispania. P. pilosa quorundam.

44. *pungens*, spica glomerata ovata. spicul. sexfloris teretibus lanuginosis. fol. involutis rigidis. Vahl. symbol. p. 10. t. 2. F. mucronata. Forsk. descr. 22. n°. 74. Hab. in Arabia. ¶

45. *phalaroides*, spica brevi densa lobata secunda, spicul. 2-3-floris hirsutis breviter aristatis. Lam. ill. 1. p. 160. Hab. in Gallia australi. An potius Dactylis?

172. **BROMUS.** Cal. 2-valvis, multiflorus. Spicula oblonga, disticha: arista infra apicem saepius bifidum, (glum. interior pectinato-ciliata. Smith.)

1. *secalinus*, panicula nutante, spiculis ovatis glabris compressis glumis nudis distinctis, aristis subulatis brevioribus flexuosis rectis. Lin. Willd. sp. 1. p. 428. B. vitiosus. Weigel. obs. p. 4. t. 1. f. 2. Hab. in agris inter segetes. Arist. subobsoletae. ©

2. *multiflorus*, panic. patente, spiculis pubescentibus lanceolatis compressis, glumis nudis marginatis imbricatis, aristis capillaribus aequalibus rectis. Roth. germ. I. 47. Weigel. obs. bot. p. 2. t. 1. f. 1. Leers. herb. t. 11. f. 2. Scheuchz. gram. t. 5. f. c. Inter segetes: priore rarior observatur.

3. *mollis*, panic. erecta coarctata, pedunculis ramosis, spic. ovatis (subturgidis) pubescentibus: glumis ellipticis, vaginis foliisque mollissime villosis. Lin. Smith. brit. 1. p. 126. Ubique frequens. Fol. pilis longis distincta, quo sequentes varietates? quoque conveniunt.

β *leptostachys*, cespitosus, panic. stricta pedunc. subsimplicibus, spic. ovato-linearibus glaberrimis subquinquefloris, glumis nervosis aristisque purpurascens, vag. foliisque pilosis. Hab. in pratis et sylvaticis.

Obs. An huc pertinet Br. pratensis Ehrh? cui spicul. quoque glabrae nitidae, uno latere subspadicaceo et pedic. simplices sunt.

γ *conglomeratus*, cespitosus, spicul. ovatis 8-floris in capitulum conglomeratis vaginisque tomentosis. Prope Montpellier lectus a Cl. Thibaud. Pedalis. Glum. minus latae.

4. *erectus*, elongatus, panic. stricta, pedunc. subsimplicibus, flosc. coloratis aristatis hirtis, fol. radicalibus angustis pilosis. Smith. brit. 1. p. 131. B. pratensis. Lam. B. perennis. Villars. B. agrestis. Allion. B. arvensis. Poll. In Europ. australioris pratis frequens. B. *inermis* similis. Spiculae saepe quasi truncatae apparent fusco-purpureae, divergentes ut in Festucis, quibus valde affinis. ¶

5. *racemosus*, panic. erectiuscula diffusa, pedunc. simplicibus, spicul. ovatis sexfloris, floscul. imbricatis depressis nervosis glabris. Smith. Brit. 1. p. 128. Moris. s. 8. t. 7. f. 19. Hab. in Angliae et Galliae pascuis, sylvaticis. Spicul. viridi alboque vittatae. Sm.

6. *canadensis*, panic. luxa capillari pendula, spiculis subsexfloris compressis, flosc. valva exteriori breviter aristata margine villosa. Michaux. Flor. 1. p. 63. Hab. in Canada.

7. *pectinatus*, panic. patente, spiculis ovatis glabris, corollae valva interiore ciliata mutica. Thunb. prod. 22. Hab. in Cap. b. spici.

8. *lanceolatus*, panicul. ramosa erecta patente, spiculis lanceolatis glabris subcompressis, aristis floralibus rectis, seminalibus refractis. Roth. Cat. 1. p. 18. Hab. locis aridis circa mare Caspium. ©

9. *squarrosus*, panic. nutante, spiculis ovatis: aristis in spica matura divaricatis, pedunc. simplicibus. Schenck. gram. t. 5. f. 11. Hab. in Europ. australi. ©

10. *japonicus*, panic. patente ramosa, spiculis oblongis glabris, aristis divaricatis. Thunb. jap. p. 52. t. 11. Hab. in Japonia. ©

11. *alopecurus*, fol. villosis, panicula coarctata erecta. spicul. 15-floris subsessilibus pubescentibus, aristis basi contortis. Desf. Atl. 1. p. 95. t. 25. B. (*contortus*). Poir. iter. Hab. prope la Calce. ©

12. *macrostachys*, culmo basi geniculato, spic. maximis teretibus glabris, aristis rigidis patentibus. Desf. l. c. p. 6. t. 19. f. 2. In Atlante prope Flemscn. Spicul. maximae, glabrae inferiores nutantes. ©

13. *turgidus*, panic. ramosa stricta, spic.

turgidis 6-floris subvillosis, aristis divaricatis subserratis. B. *squarrosus*, var.  $\beta$ . Lam. ill. Buxb. Cent. 5. t. 38. f. 1? Hab....

14. *simplex*, panic. simplici, spicul. sessilibus 8-10-floris glabris aristis subdorsalibus divaricatis, vaginis villosis. Hab....

15. *purgans*, panic. nutante crispa, fol. utrinque nudis: vaginis pilosis, glumis villosis. Sp. pl. 113. Willd. sp. p. 411. Hab. in Canada. Kalm. Tl. Folia latitudine atundinis, supra fere nuda. L.

16. *catharticus*, panicul. patente erecta subsimplici, spiculis lato-lanceolatis striatis scabris, aristis brevibus rectis. Vahl. symb. 2. p. 22. Few. peruv. 705. t. 1. Hab. in Lima. Differt a priore vaginis non ciliatis.

17. *inermis*, panic. erecta, spiculis subteretibus subulatis nudis submuticis. Roth. germ. 1. p. 48. Schreb. gram. t. 13. Speciosa. Schreb. spicil. p. 59. Hab. in Germania, Helvetia. Tl.

18. *asper*, panic. ramosa nutante scabrinscula, spiculis linearibus subteretibus decemfloris pilosis aristatis, culmo foliisque lirtis. Aiton. Kew. 1. p. 109. B. *ramosus*. Lin. Syst. veg. ed. 13. p. 102. Nec Mant. p. 34. B. hirsutus. Curt. lond. fasc. 2. t. 8. Hab. in sylvis, ad saepes. Pili sparsi, deorsum spectant. ♂

19. *verticillatus*, panic. aperta pedunculis horizontalibus verticillatis, elongatis simplicibus ramosisque. Cav. ic. 6. p. 66. t. 560. Hab. in Regn. Aragonensis agris. Cal. 12-florus. C. Br. *sterili* affinis.

20. *pallens*, panic. erecta subcontracta, pedunc. inaequalibus, spicul. 5-floris: aristis capillarib. longissimis. Cav. l. c. p. 66. t. 591. f. 1. Hab. in Manilae vicinis.

21. *littoreus*, panic. erectiuscula scabra, spiculis oblongis subquadrifloris (4-6) glabris muticis. Retz. scanl. ed. 2. n. 140. B. *arundinaceus*, panicul. erecta contracta, spic. oblongis scabris subaristatis paucifloris. Roth. Flor. germ. 2. p. 141. Gmel. fib. 1. p. 110. n. 44. t. 21. Scheuchz. gram. 266. t. 5 f. 8. Hab. in Suecia, Pomerania, Helvetia, Sibiria. Tl. Maximus omnium.

22. *ciliatus*, panic. nutante, fol. utrinque vaginisque subpilosis, glumis ciliatis. L. Hab. in Canada. Culmi tenues.

23. *arvensis*, panic. nutante, spiculis ovato-oblongis glabris. Weigel. obs. p. 6. t. 1. f. 3. Leers. t. 11. f. 3. B. *versicolor*. Pollich. Palat. n. 109. Hab. ad versuras agrorum. Ant. puniceae. Spic. purpu rasc. rarius viridis. ♂

24. *sterilis*, panic. patula subsimplici pendula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. Leers. t. 11. f. 4. Hab. in agris, sylvis, ad vias. Pedicelli asperi. ♂

25. *tectorum*, panicula nutante ramosa, spiculis pubescentib. linearibus. Leers. t. 10. f. 2. Hab. in collibus siccis, tectis et muris. Panic. debilis, a minimo vento mobilis. ♂

26. *geniculatus*, panic. erecta, flosc. distantibus, pedunculis angulatis, culmo genu procumbente. Mant. p. 33. Schreb. gram. 2. p. 60. t. 31. Hab. in Lusitania. ♂

27. *rigens*, panic. spicata: spiculis subsessilibus erectis pubescentibus subquadrifloris. Mant. 33. Hab. in Lusitania. Vaginae totum culmum tegentes.

28. *scoparius*, panic. fasciculata, spic. subsessilibus glabris, aristis paululis. Amoen. acad. 4. p. 206. Conf. Cav. ic. 6. p. 65. t. 589. f. 2. Hab. in Hispania.

29. *madritensis*, pubescens, panic. patula subsecunda, spic. linearibus retrorsum scaberrimis, aristis longissimis scabris. Vahl. symbol. 2. p. 23. Cav. ic. 6. p. 67. B. panicula rariore patulo-erecta, spic. linearibus, intermedium geminis, pedicellis superne incrassatis. Lin. Amoen. acad. 4. p. 265. B. *diandrus*, flosc. lanceolatis nervosis dian-drus. Smith. Flor. brit. 1. p. 135. B. *rigidus*. Roth. Catal. 1. p. 17. B. *maximus*. Desf. Atl. t. 26. Hab. in Anglia, et in suburbis Matriti, et in regno Valentino. ♂

\* Culm. panic. simplici.

30. *gracilis*, villosus, spica simplici gracili, spicul. alternis sessilibus teretibus longius aristatis. Weig. obs. p. 15. B. sylvaticus. Smith. brit. 1. p. 136. In nemorib. Vagin. et fol. magis lanata.

31. *pinnatus*, glaber, spic. simplici disticha, spicul. alternis subsessilibus teretibus longis subaristatis, culm. nodis pubescentibus. Lin. Willd. sp. 1. p. 438. Triticum Hall. Festuca Kohl. Hab. in graminosis sylvaticis.

32. *longifolius*, culm. basi ramoso, fol. involuto-subulatis culmum sequantibus, spicul. teretibus recurvatis. Schousb. Marroc. ed. germ. p. 31. In Barbaria.

33. *retusa*, caespitosa, culm. elongato simplice, fol. subulatis breviusculis, spic. teretibus submuticis, glum. apice retusis mucronatis. Hab. in Gall. meridionali, in maritimis. B. *ramosus* L. Willd. sp. 1. p. 437? B. *caespitosus*. Desf. Atl. 1. p. 91?

34. *distachyos*, spiculis ut plurimum duabus



*Anabus erectis alternis.* Lin. *Festuca ciliata*. Gouan. Hab. in Europa australi et Oriente. Ver. spicul. 1, 2 et 3. *B. polystachyos.* Lam. ill. 1. p. 195.

*Obs.* Quae hac in subdivisione enumeratae species eodem jure ad *Festucas* aut ad *Tritica* amandari possent. Valvula interior pectinato-ciliata certius Bromi indicium praebet, quam aristae insertio, dicit cl. Sm. (Flor. Brit. 1. p. 137), quae in his terminalis est.

173. *KOELERIA.* Cal. multiflorus, 2-valvis, compresso-carinatus. Cor. 2-valvis, brevi-aristata: glumis nervosis. (Spica composita ex spiculis compressis, saepius pubescentibus sessilibus.)

1. *gracilis*, spica basi interrupta elongata subramosa, spicul. bifloris nitidis muticis. Poa nitida. Lam. ill. 1. p. 182. Poa cristata. Krock. sil. ic. An *Aira* subspicata. L? Hab. in sylvaticis. Fol. angusta, dein convoluta.

2. *cristata*, spica laxiuscula, spiculis divergentibus 3-4-floris subaristatis rugulosis carina subciliatis. Poa cristata auctorum. Fol. plana vag. et culm. apice pubescens.

*A. grandiflora*, spiculis magnis dilatatis. Ex Helvetia. Richard.

3. *pectinata*, panic. spicata nitida, glum. patulis pectinatis subquinguefloris, culm. superne villosi. Lam. 1. c.

4. *pyramidata*, panic. pyramidalis, glum. laevibus nitidis muticis trifloris, vagin. villosa-pubescentibus. Lam. 1. c. p. 183.

5. *tuberosa*, spica elongata densa, spic. 2-floris subciliatis, culm. basi tuberoso, fol. linearibus. *Aira vallesiaca* Allioni? *Aira cristata*. Smith. brit. 1. p. 83. etiam hujus loci. Hab. in Italia, Anglia et Helvetia.

6. *setacea*, rad. tuberosa, fol. brevibus duris setaceis, spica cylindrica, cal. 2-3-floro subovali obtusiusculo inermi glabro, cor. subaristata. Richard. Hab. in Pyrenaeis. An auctores varietes?

7. *Phleoides*, spic. cylindrica, spicul. 5-floris aristatis, glumis sublancoatis nervosis hirsutis exasperatis. *Festuca*. Villars. Dauph. 2. p. 95. *Avena pumila*. Lam. 2. videtur. Poa cristata. Linnæi. Hab. in Gallia meridionali et in Barbaria.

8. *villosa*, vagin. subturgi la folisque pubescentibus, spica orata, spicul. 2-floris villosa-hispidis. Phalaris pubescens. Poir. *Aira pubescens*. Vahl. symb. 3. p. 5. Desf.

Atl. 2. p. 446. Hab. in Europa et Barbaria ad maris litora.

174. *TRisetum.* Cal. 2-3-florus, acuminatus, carinatus. Cor. aristis 2 terminalibus subdentiformibus (glum. apice setoso-bifidis), 1 dorsali recta nec contorta, flosc. ut plurimum glabris. (Spiculae compressae, pallescentes.)

1. *striatum*, panicula tenui, pedicellis brevibus incrassatis, col. glumis nervosis, 2-3-floris striatis, floscul. basi villosis. *Avena striata*. Lam. ill. 1. p. 200. *β. A. dubia*. Leers, *tenuis*. Willd. 1. p. 448. *γ. hirta*, fol. hirsutis. *A. triaristata*. Villars. Huc quoque pertinere videtur *Bromus triflorus*. L. Cir. Koel. gram. p. ... Hab. in Europa austr.

2. *villosum*, panic. trichotoma, cul. bifloris, cor. (triaristatis), aristis lateralibus basi villosis brevioribus. Thunb. prod. p. 22. *Avena tristata*. Hab. cum sequente ad Cap. b. spci.

3. *nudum*, panicula trichotoma, cal. 2-floris, aristis nudis: intermedia longiore. Av. pallida. Thunb.

4. *nitidum*, panic. spicata, glumis membranaceis nitidis villosis (triaristatis) Desf. Atl. 1. p. 102, t. 31. f. 2. In arenosis prope Mascar. Spicul. majusculae.

5. *lateum*, panic. patente, cal. 2-floris subulatis, cor. nudis triaristatis: arista intermedia flexuosa. Lin. suppl. p. 112. In insula Martinica.

6. *parviflorum*, fol. pubescentibus, panic. laxa, cal. 2-3-floris, arista brevi setiformi infra glumae apicem. Desf. 1. c. 103. t. 32. Hab. inter segetes in Atlantide.

7. *pratense*, panic. subcontracta, spic. nitidis, vagin. longis striatis glabris, fol. superne villosis. Av. *avescens*. L. Leers. t. 10. f. 5. In pratis frequens. An *Bromus bifidus*. Thunb. jap. hujus quoque loci.

8. *panicum* (lusitanicum), panic. contracta, vaginis hirsutis. Link. in Schrad. bot. journ. 8. p. 314. Hab. in Lusit. Sequen. affine?

9. *hispanicum*, panic. subspiciformi vaginis folisque subpilosis. Av. Loedingiana. L. A. panicea. Lam. ill. p. ... non multum differt. Habitat in Hispania.

10. *pisanum*, panic. ex spicis densis composita, spicul. subquadri-floris, fol. sublancoatis vaginisque pilosis. Av. neglecta. Sav. Flor. Pis. 1. p. 132. t. 1. f. 4. Hab. in campis prope Pisan frequens. Communicatum a cl. auctore.

16. *ovatum*, spica ovata densa, spiculis 3-5-floris, fol. villosis brevibus. Cav. ic. 6. p. 67. t. 591. f. 2. sub Bromo. Cresc. in Hispaniae collibus. Spic. saepius quoque globosa, pallide virens.

17. *Aristidoides*, panic. trichotoma, cal. bifloris, cor. bifidis aristatis. Thunb. prodr. 22. sub Avena. Ad Cap. b. spei.

Obs. Nonnullae generis *Avenae* species ex. gr. *Av. pensylvanica*, lupulina et purpurea huc quoque pertinere videntur, quae ulterius examen hinc merentur.

175. *LAGURUS*. Cal. 2-valvis, 1-florus: aristis villosis. Cor. gluma exterior aristis 2 terminalibus, tertia dorsali retorta.

1. *ovatus*, spica ovata villosa. L. Schreb. gram. t. 19. f. 3. Smith. Brit. t. p. 143. Alopecuros. Moris. s. 8. t. 4. f. 1. Habit. in Europ. austral. campis arenosis.

176. *PAPPOPHORUM*. Cal. 2-valvis, 2-florus. Cor. 2-valvis, multiaristata.

1. *alopecuroidum*, Vahl. symbol. 3. p. 10. t. 51. Saccharum pappiferum. Rich. Lam. ill. t. p. 159. Hab. in Americ. Folia convoluta-subulata.

177. *ARISTIDA*. Cal. bivalvis, uniflorus. Cor. 1-valvis: aristis tribus terminalibus.

1. *adscensionis*, panicula ramosa, spicis sparsis. L. Willd. sp. 1. p. 458. *Aristida paniculata*. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 16. i. 2. f. 56. Hab. in Jamaicae australis locis sabulosis et insula Adscensionis.

2. *americana*, panic. simplicis, cor. bivalvibus, altera aristis dorsalibus, altera terminalibus. Swartz. obs. 41. t. 2. f. 2. Lin. Amoen. acad. 5. p. 393. Hab. in Amer. calidioris sabulosis.

3. *gigantea*, panic. elongata effusa secunda, aristis subaequalibus rectis. Lin. suppl. 113. Hab. in Teneriffa. Gram. altissimum, glaberrimum.

4. *Hystrix*, panic. divaricata patentissima, flosc. simplicissimis glabris, aristis rectis divaricatis. Linn. suppl. 113. Pluck. alm. 174. t. 191. f. 3. Habit. in Malabar et ad Cap. b. spei. Gramen repens stoloniferum.

5. *pallens*, panic. pauciflora, pedicellis alternis bifloris approximatis, aristis capillaribus longissimis. Cavan. icon. 5. p. 43,

t. 468. f. 2. Habit. in regno Chilensi. Fol. filiformia.

6. *vestita*, panic. trichotoma patenti, aristis aequalibus glabris, calyce inaequali. Thunb. prodr. 19. Hab. in Cap. b. spei.

7. *dichotoma*, cespitosa, culm. dichotomis subspicatis, arista contorta gluma brevioris lateralibus brevissimis. Mich. Flor. t. p. 41. Hab. in Carolinae superioris glareosis.

8. *stricta*, culm. foliisque pubescentibus strictis, racemo in spicam elongatam coarctato, aristis gluma longioribus. Mich. l. c. In Carol. infer. Var. fol. planiusc. et convolutis.

9. *oligantha*, culm. stricto subramoso, fol. convuluto-filiformibus, flor. distantibus solitariis. Michaux. l. c. Hab. in pratis Illinoensibus. Fol. longissima.

10. *rigida*, panic. contracta, fol. rigidis acuminatis glabris culmo parallelis, aristarum media duplo longiore. Cav. icon. 5. p. 44. t. 469. f. 2. Hab. in insul. Philippicis.

11. *vagans*, panic. ramis divaricatis paucifloris, cor. calyce longiore, aristis brevibus: media productiore, fol. subulatis. Cav. 5. p. 45. t. 471. f. 2. Hab. in Nov. Hollandia.

12. *laxa*, panic. laxa: pedicellis nudis elongatis bifidis, spicis terminalibus, aristis lateralibus brevissimis. Cav. l. c. t. 470. Hab. prope Monteideo. Arista glum. longior basi contorta.

13. *Luzonensis*, culm. ramoso, panic. contracta, spiculis alternatim pluribus: aristis subaequalibus. Cav. l. c. t. 470. f. 2. Hab. in ins. Philippica Luzow. Cor. marginem involuta et in matris in cylindrum convoluta punctisque fuscis variegata. C.

14. *ternipes*, panic. coarctata longissima: ramulis alternatim ternis capillaribus: aristis a lateralibus brevibus. Cav. l. c. p. 46. Fol. convolutum subulatum. +

15. *murina*, panic. densa spicaeformi: ramis alternatim binis subquinquefloris, calycibus violaceis. Cav. l. c. p. 44. t. 469. f. 1. Hab. in Mandanao insula. Hordeum refert. Palmaris.

16. *caerulescens*, panic. coarctata elongata arcuata subsecunda interrupta, aristis laevibus subaequalibus, fol. glabr. Desf. Atl. 1. p. 109. Habit. in arvis prope Kerwan. +

17. *elator*, caule ramoso altissimo, panic. elongata, cal. violaceis, aristis aequalibus. Cav. ic. 6. p. 65. t. 580. f. 1. In Hispaniae aridis prope mare Malachianum, etiam in regno Valentino.

18. *arundinacea*, paniculata, arista in-

*termedia* longiore laevi. Lin. Mant. p. 186. In India. Arist. subcurvata; ad hujus basin utrinque arista minuta vix manifeste. L.

19. *depressa*, culm. trifido-ramosis decumbentibus, aristis scabrinis. Retz. obs. 4. p. 22. In Malabarica sterilibus.

20. *setacea*, culm. stricto simplici, aristis scabrinis. Retz. l. c. + Cor. basi lanata uti in precedente. An ambae species satis distinctae?

21. *interrupta*, panic. ramis interruptis, fol. vaginantibus subulato-longissimis, aristis ciliatis. Cav. ic. 5. p. 45. t. 471. f. 2. Hab. in Mexico.

22. *lanata*, arista intermedia longiore lanata, culmis villosis. Vahl. symbol. 1. p. 11. t. 3. Lam. ill. t. 41. f. 1. *lanata*, panicula ramosa, arista medio lanata. Forsk. descr. 25. n. 87. Hab. in Armenia, et in regno Tunetano. Desf. p. 109. Aristis lanatis refert Stipam pennatam.

23. *capensis*, panicul. trichotoma patente, aristis omnibus villosis. Thunb. prod. 19. *Avena capensis*. Lin. suppl. 112. Hab. ad Cap. b. spec.

24. *pungens*, culm. fruticoso, fol. subulatis rigidis; panic. laxa, aristis plumosis. Desf. Atl. 1. p. 109. t. 35. Hab. in Barbariae arenis humidis. h

178. STIPA. Cal. 2-valvis, 1-floris.

Cor. brevior, 2-valvis: valv. involutis truncatis. *Arista* terminalis, basi contorta, decidua, longissima.

1. *pennata*, foliis filiformibus, aristis plumosis basi glabris. L. Willd. sp. 1. p. 430. Lam. ill. t. 41. f. 1. Hab. in Germania et Suecia. h

2. *barbata*, fol. rigidis striatis, aristis longissimis totis barbatis. Desf. Atl. 1. p. 97. t. 27. Hab. in Barbariae collibus. h

3. *humilis*, flor. panic. spicatis vagina subinclusis, aristis pennatis. Cav. ic. 5. p. 41. t. 466. f. 1. In Americ. meridionali. *Arista* medio pilis longis barbata.

4. *tortilis*, panic. spicata basi involuta, cal. interiore villosa, aristis tortilibus. Desf. l. c. p. 99. t. 31. f. 1. Hab. in arvis. Flosce. decidui vestimentis adherent cutimque pungunt viatorum damno. D. ©

5. *juncea*, fol. convolutis filiformibus, panic. laxa elongata, aristis longis pubescentibus. Desf. Atl. 1. p. 98. t. 28. (3. Stipa *juncea*, aristis nudis rectis, cal. semine

longioribus. Lin. Willd. sp. 1. p. 44. in collibus aridis. h

6. *capillata*, aristis nudis curvatis, calycibus semine longioribus, fol. intus pubescentibus. Lin. Hab. in Germania, Galia. An Var. prioris? h

7. *tenacissima*, aristis basi pilosis, panicula subspicata, fol. filiformibus. Amoen. acad. 4. p. 266. Desf. l. c. p. 99. t. 50. Hab. in Hispania et Barbariae collibus arenosis. Panic. flavesce. h

8. *capensis*, aristis basi pilosis, panic. spicata, foliis ensiformibus. Thunb. prod. 19. Hab. in Cap. b. spec. h

9. *spicata*, aristis basi pilosis, racemo spicato secundo. Thunb. profl. 20. Linn. suppl. 111. Hab. ad Cap. b. spec. h

10. *bicolor*, aristis nudis, seminibus obovatis basi barbatis. Vahl. symbol. p. 24. Cav. ic. 5. p. 42. t. 466. f. 2. Hab. in Brasiliae monte Video.

11. *eminens*, aristis nudis, seminibus tomentosis, fol. striatis. Cav. l. c. t. 467. f. 1. Hab. in Mexico. Panic. laxa, pedalis. C.

12. *virginica*, panic. pauciflora, calyc. majusculis, cor. stipitata: stipite barbato. Mich. Flor. 1. p. 51. Hab. in sylv. Virginiae et Carol. superioris. *Arista* crassa, longissima. Stipa avenacea. Walt. St. barbata. Michaux.

13. *sibirica*, paniculata, aristis nudis cal. duplo longioribus, seminibus lanatis. Lam. ill. 1. p. 158. *Avena sibirica* Lin. Hab. in Sibiria.

14. *Aristella*, aristis nudis rectis cal. subduplo longioribus, germinibus laxatis. Lin. Hab. Monspeii prope Foulon. h

15. *avenacea*, aristis nudis, calycibus semen aequantibus. Sp. pl. 116. Andropogon folio superiore spithaceo, peduncul. lateralibus oppositis uniuersis, aristis flexuosis. Gron. Virg. 138. Hab. in Virginia.

16. *parviflora*, fol. radicalibus rigidulis filiformibus, panicula diffusa, aristis medio capillaribus. Desf. p. 98. t. 29. In Barbariae collibus aridis. h

179. AVENA. Cal. 2-valvis, multiflorus: arista dorsali, contorta. (Glumae membranaceae subfolliculosae.)

1. *stipiformis*, panic. calycib. bifloris, aristis semine duplo longioribus, culmo ramoso. Lin. Mant. p. 34. Willd. sp. 1. p. 444. Hab. ad Cap. b. spec. Culmi saepe reclinati, geniculis fuscis. Ramus etiam florifer. L.

2. *pensylvanica*, panic. attenuata, cal. bifloris, seminib. villosis, aristis calyce duplo longioribus. Lin. Sp. l. 117. Hab. in Pensylvania. ☉

3. *brevis*, paniculata, calycib. subtrifloris, seminib. brevibus obtusis, apice bidentatis, arista dorsali scabra. Roth. germ. l. 40. Hab. inter segetes ducatus Bremensis.

4. *alba*, paniculata, calyc. bifloris, corol. pilosis, altera aristata. Vahl. symb. 2. p. 24. Hab. in regno Tunetano. Fol. glauca. Petala villis candidissimis ad basin pilosa. Vahl.

5. *strigosa*, panic. oblonga contracta secunda, flosc. geminis apice biaristatis, dorso arista geniculata. Schreb. spicil. 52. Retz. obs. 1. p. 11. Hab. inter segetes. ☉ An Trisetum?

6. *orientalis*, panic. coarctata secunda, spiculis bifloris horizontalibus parallelis, seminibus laevibus. Schreb. spicil. 52. A. racemosa. Thuil. Paris. p. 59. Hab. in cultis.

7. *sativa*, paniculata, calycib. dispersis, seminibus laevibus altero aristato. Originem habet ex insula Juan Fernandez versus Chili. L. Var. flor. muticis et seminibus nigris. ☉

8. *Forskalei*, paniculata, calycib. trifloris cor. hirsutis aristatis, culmo ramoso, fol. involutis rigidis. Vahl. symbol. 2. p. 25. *Avena pensylvanica*. Forsk. 23. n°. 81. Hab. in Aegypto.

9. *nuda*, paniculata, calyc. trifloris receptaculo calycem excedente, petalis dorso aristatis; tertio flosc. mutico. L. Sp. pl. 118. Hall. comm. nov. Goett. VI. p. 19. t. 2. et 4. Moris. 6. 8. t. 7. f. 4. Hab. ? Affinis A. sativae, sed semina decorticata decidunt. ☉

10. *fatua*, paniculata, calyc. trifloris, flosculis patulis omnibus aristatis basi que hirsutis. Schreber. gram. 109. t. 15. Habit. in agris inter segetes. ☉ Gram. altum. Flosc. barba lutesc.

11. *sterilis*, panicul. cal. 5-floris, flosc. pilosis; interioribus muticis. Lin. Pet. Gaz. t. 38, f. 7. In Europa austr. Var. prioris? ☉

12. *elephantina*, panic. composita, cal. quadrifloris corol. pilosis bifidis aristatis. Thunb. procl. 23. Hab. in Cap. b. spei.

13. *sequitertia*, paniculata, cal. subtrifloris, flosc. omnibus aristatis, receptaculis barbatis. L. Mant. 34. Schencht. gram. 220. t. 4. f. 17. Hab. passim in agris. Flor. pilosi videntur, sed pili omnes insident pedicellis & receptaculis intra calycem. L.

14. *elator*, panic. subcontracta nutante,

glumis bifloris: flosc. hermaphrodito submutico; masculo aristato, culm. geniculis elabris, radice repente. Willd. in N. Act. Soc. Berol. v. 2. Schreb. gram. t. 1. t. 1. Leers. t. 10. f. 4. Holc. *avenaceus* quorund. In pratis et pomariis frequens. ¶

15. *bulbosa*, panic. verticillata, glumis bifloris polygamis, genicul. pubescentibus, radice nodosa bulbosa. Willd. l. c. Av. praecatoria. Thuill. Hab. passim in agris et arenosis. An varietas?

16. *sempervirens*, panic. subpatula, cal. trifloris hermaphroditi basi lanatis, fol. rigidis subinvolutis intus striatis. Villars. Delph. 2. p. 140. t. 5. Hab. in montosis apricis Delphinatus. (p. *striata*, fol. longissimis intus striatis, cal. 2-floro. Lam. ill. gen. Cresc. cum priore et in H. P. colitur.

17. *pallens*, panic. ramis erectis, cal. bifloris, cor. hirsutis, fol. setaceis. Link. in Bot. Journ. 2. p. 314. Hab. in Lusitania. Av. *elatiore* minor dicitur.

18. *setacea*, fol. setaceis, vagin. lanuginosis, panic. purpurascens, flosc. majusculis, val. 3-floris, aristis nigris recurvis. Villars. p. 144. t. 5. A. *subulata*. Lam. ill. 201. A. *aurata*. Allioni. Habitat. in Helvetiae, Italiae et Gall. meridion. alpinis.

19. *odorata*, glum. trifloris acuminatis, flosc. diandris, arista inclura recurva. Hof. germ. ed. 2. p. 58. Holc. *odoratus*. L. Flor. dan. t. 661. Savastana hirta. Schrank. Flor. bav. 1. p. 337. In pratis pascuis montosis Europae australioris.

20. *redolens*, fol. involutis, glum. 3-floris, flosc. lateralibus mascul. aristatis margine pilosis. Vahl. symb. bot. 2. p. 102. Sub Holco. Hab. in Terra del Fuego.

21. *palustris*, fol. planis linearibus, panic. confertiuscula, glum. 2-floris flosc. glabris: altero mutico, altero ad apicem tenuissime aristato. Michaux. Flor. p. 72. In Gergor. et Carol. paludosis.

22. *pratensis*, panic. erecta, cal. subquinquefloris, recept. pilosis, fol. involutis serrulatis glabris. Smith. brit. p. 141. Leers. tab. 9. f. 1. Hab. in pratis et pascuis. Spic. majusc. purpureo-argent. ut in sequente.

23. *pubescens*, panic. erecta subim-plici, cal. subtrifloris, recept. barbatis, fol. planis vaginisque pubescentibus. Smith. l. c. p. 140. Leers. f. 2. In pratis, collibus et fruticetis.

(p. *montana*, fol. caespitosis planis subhirsutis rigidis, panic. erecta remosa, spicul. pedunculatis subtrifloris. Vill. delph. 1. p. 151. Hab. in pratis montosis. ¶

24. *versicolor*, subspicata, calyc. subquinquefloris, rachis pilosa. Willd. sp. 1 p. 452. Panic. spicata flavescens, spiculis sex-floris distinctis, rachis hirsuta, pedunc. longitudine spicularum. Vill. delph. 2. p. 142. t. 4. f. 5. Avena Scheuchzeri. Allion. pedem. 2259. Scheuchz. it. alp. 6. p. 455. t. 19. Hab. in Alpihus.

25. *distichophylla*, panic. subspicata, calyc. trifloris, flosculis basi pilosis, culmo basi ramoso, fol. distichis. Willd. sp. 452. A. culmis basi ramosis, foliis fasciculatis distiche patentibus, paniculae spiculis binatis trifloris. Villars. 1. c. p. 144. t. 4. f. 4. Hab. in alpihus Helvetiae. Delphinatus. T.

26. *pumila*, flor. paniculato - spicatis, spicul. sub 4-floris, glum. dorso ciliatis aristam setiformem aequantibus. Desf. Atl. 1. p. 103. Hab. in Barbariae arenosis.

27. *hispida*, spic. racemosa (simplice) cal. 3-floris piloso-hispidis. Thunb. prodr. p. 22. Willd. sp. 1. p. 451. *Av. capensis*. Burm? Ad Cap. b. Spec. Vag. pilosa.

28. *mollis*, tota mollissime pubescens, panic. racemoso spicata, cal. 2-floris. Michaux, p. 72. Hab. in Canada.

29. *lupulina*, panic. coarctata ovata, cal. 3-4 floris lanceolatis, cor. villosis, gluma exteriori bisubulata, arista intermedia reflexa, vagin. tomentosa. Lin. suppl. 113. Thunb. prodr. p. 23. Hab. ad Cap. b. spec. Panic. lutea, arcte coarctata in figuram Coni lupulini.

30. *purpurea*, glaberrima, panicula coarctata, calyc. quadrifloris, cor. villosis aristatis, culmo decumbente. Lin. suppl. 112. Cum priore. Glum. calycinae purpureae. Flor. lanugine alba vestiti.

31. *antarctica*, panic. coarctata, calyc. quadrifloris, cor. bifidis aristatis. Thunb. prodr. 22. Hab. in Cap. b. spec.

32. *striata*, panic. coarctata rariflora, glum. 5-flora, flosc. subimberbibus, valv. exteriori striata, dorso longe aristata, sem. nudo. Michaux, Flora p. 73. Hab. per tractus montium a sinu Hudsonis ad Canadam.

33. *glumosa*, panicul. rariflora, gluma calyc. flosc. 6 longiore, cor. valv. exteriori ex apice bicornis aristata. Michaux. For. p. 72. Avena spicata. Lin. Willd. 1. p. 453. Hab. in Pensylv. et Carol. Infloresc. revera panicula nec spica. Arista-basi spiralis. T.

34. *calycina*, spicata, gluma flosc. 5 aequantibus. A. *calycina*, fol. planis basi pilosis, panic. simplici spicul. 5-floris longitudine calycis. Vill. delph. 2. p. 148. t. 9. f. 9. Hab. in Delphinatu. Spic. secundae. ©

35. *fragilis*, spicata, spica fragili articulata, cal. 4-floris flosculo longioribus. Lin. Mant. p. 326. Schreb. gram. 1. 24. f. 3. Hab. in Europa australi. Triticum non male refert. ©

36. *bromoides*, subspicata, spiculis pluribus subconvolutis teretibus 8-floris, aristis divaricatis. Lin. Monti. prodr. t. 66. In Helvetia, Monspelii, et in Algeriae collihus. T.

180. **SORGHUM.** Flor. polygami, paniculati. Flosc. gemini : altero hermaphrodito sessili, altero postico pedicellato masculino neutrove.

*Hermaphr.* Cal. 2-valvis. Cor. 3-valvis : valv. secunda aristata, tertia nectaria villosa connectens. Cor. in masc. mutica. Sem. majuscula.

1. *vulgare*, panic. coarctata ovali : matrescente cernua, seminib. nudis utrinque subcompressis. Holc. Sorghum. Lin. H. Dora. Mieg. in Act. Helv. 8. t. 4. f. 3. Hab. in India. Sem. alba, puncto umbilicali nigro.

2. *bicolor*, glumis glabris nigris, seminibus globosis albis aristatis. Lin. Mieg. 1. c. p. 126. t. 4. f. 4. Gaertn. de sem. 2. p. 3. Hab. in Persia.

3. *rubens*, glumis glabris dilute castaneis semine dimidio brevioribus, seminibus nudis obovatis rutilantibus. Gaertn. 1. c. Besl. Eyst Autumn. II. t. 13. f. 17. In Africa.

4. *saccharatum*, panic. subverticillata patentissima, sem. ellipticis glumis villosis persistentibus tectis. Mieg. 1. c. p. 119. t. 4. f. 17. Altitudo humana. Fol. Sacchari, linea longitudinali alba. Lin.

5. *halapense*, panic. sparsa, glumis oblongis glabris, flor. hermaphroditis lanceolatis muticis, foemineo aristato. Lin. Schreb. gram. p. 129. t. 18. Mieg. t. 4. f. 2. In Syria et Mauritania. Sem. oblonga, complanata. Fol. acuminato-setacea.

6. *nitidum*, glumis 1-floris villosis, flor. omnibus muticis, culm. geniculis barbatis. Vahl. symb. p. 112. Sub Holco. Hab. in India.

181. **MIEGIA.** Stigmata tria. Flor. polygami paniculati. Cal. multiflorus, 2-valvis, brevis, inaequalis. Cor. 2-valvis (mutica). Appendices bini, lato-lanceolati,

acuti, plani in utroque flore.  
Sem. nudum, maximum.

1. *macrosperma*. *Arundinaria macrosperma*, altissima glabra, fol. linearilanceolatis subulstichis. Michaux. Flor. amer. 1. p. 74. Ad ripas flum. Mississippi. Martio florens. Habitus Bambois aut Nasti. Ab omnibus hucusque cognitis graminibus tum sign. 3, tum semine grandi sane differt.

182. *TRICHOON*. *Cal.* 2-valvis, 1-florus. *Cor.* 2-valvis, cal. duplo major : uterque nudus. *Germen* lana cinctum.

1. *Karka*. Roth. Catal. 2. p. 2-3. *Arundo karka*. Retz. obs. 4. p. 21. Vulgare in India orientali, ubi ad tecta adhibetur.

*Obs.* In *Saccharo Calyx*, in *Arundine Corolla*, in *Trichoo Germen* tantummodo lana est cinctum.

183. *ARUNDO*. *Cal.* 2-valvis, 1-multiflorus, glaber. *Cor.* lana (longa) cincta.

1. *Donax*, cal. quinqueflor. panic. diffusa, culmo suberuticoso. L. Willd. sp. 1. p. 454. Hab. in Europa australi et Barbaria, Carniola, collibus calidis. Gram. altum. Var. fol. pictus.

2. *mauritanica*, culmo fruticoso, flor. paniculatis, cal. 1-3-floris, glum. exteriori subaristata. Desf. atl. 1. p. 103. *A. micranthus*. Lam. Monti prodr. t. d. f. Habit. in Algeria. Priori affinis sed tenerior, hortis sepiendis inservit. h

3. *festuoides*, spicul. compressis subquadrifloris, glumis mucronatis, fol. asperis striatis. Desf. atl. 1. p. 168. t. 34. *A. biflorus*. Lam. A. mauritanica. Poir. A. tenax. Vahl? Hab. in Barbariae collib. incultis, ubi densissimo caespite crescit. ¶

4. *Phragmites*, calycib. quinquefloris panicula laxa. Hab. in Europae et Barbariae lacubus, fluviis. ¶

5. *bifaria*, culmo erecto folioso, fol. bifariis, panic. coarctata, calycib. trifloris. Retz. Hab. in fossis Indiae orientalis.

6. *benghalensis*, calycib. bifloris, paniculae erectae pedicellis trifloris. Retz. obs. 5. p. 20. Hab. in Bengala. Culmi alti inanes crassi foliosi. R.

7. *sagittata*, altissima, cal. 2-floro; panic. densa nutante, fol. lanceolatis longissimis serrulato-aculeatis. *Saccharum sa-*

gitatum. Aublet Guian. 1. p. . . . Habit. in Gujana et St-Domingo. Gram. altissimum.

8. *conspicua*, calycib. unifloris, panic. erecto-patente, petali exterioris arista reflexa longissima. Forst. prod. n°. 48. Habit. in Nova Zeelandia.

9. *Episcjos*, calycib. unifloris, panicula erecta, fol. subius glabris lanceolatis. L. Smith. brit. 1. p. 145. Hab. in collibus aridis. ¶ Flosc. minus papposi.

10. *stricta*, cal. 1-floris, cor. lanceolata glabris : exterioris arista dorsali erecta, panic. coarctata spiciformi, culm. simplici. Timm. in Roth. N. Beytr. 1. p. 118. Habit. prope Mecklemburg. ¶

11. *Calamagrostis*, cal. unifloris laevibus, cor. lanuginosis, culmo ramoso, fol. linearibus. Smith. l. c. Engl. bot. t. 403. Flor. Dan. t. 280. Hab. in uliginosis.

12. *bicolor*, panic. coarctata elongata, cal. 2-floro : flosc. altero sterili, alum. subaristatis. Desf. l. c. p. 107. t. 33. Habit. prope la Calle. ¶

13. *arenaria*, cal. 1-floris cor. longioribus, panic. spicata, flor. erectis muticis, fol. involutis pungentibus. Lin. Smith. brit. 1. p. 148. Flor. dan. t. 917. Moris. sect. 8. t. 4. f. 16. Antiquus generis? Phal. *arundinaceae* affinis. Ligula lanceolata, quae in Ph. arundinacea brevissima. In arenosis maritim.

184. *SACCHARUM*. Flor. omnes hermaphroditi. *Cal.* lanugine longa involucreatus, 2-valvis. *Cor.* 1-2-valvis, mutica, aut aristata. *Stam.* 1-3.

1. *Teneriffae*, foliis subulatis planis, flor. paniculatis muticis, involucro piloso nullo, calyce villosissimo. Lin. suppl. p. 106. Willd. sp. 1. p. 320. Hab. in Teneriffa.

2. *japonicum*, racemis fasciculatis, petalis ciliatis : exterioribus aristatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 328. S. polydactylon. Thunb. jap. p. 42. Houttuyn. t. 89. f. 1. Hab. in Japonia.

3. *spontanum*, fol. convolutis, panicula effusa : spicis capillaribus simplicibus, flor. remotis involucreatis geminatis; altero pedunculo. Lin. suppl. 106. Hab. in Malabaricae aquis. ¶ Culmi 1-2-pedales.

4. *officinatum*, flor. paniculatis geminatis : altero sessili, altero pedicellato, cor. 1-valvi mutica. Lin. Hort. cliff. p. 26. Rumph. amb. 5. p. 186. t. 74. f. 1. In utraque India. β. *violaceum*, fusco-violaceum, culm. nodis magis approximatis. Habit. in

India. Ulterius examinandum, et determinandum gramen.

5. *arundinaceum*, paniculae confertae pedunculis divisis, flosc. geminis sessili pedicellatoque, coroll. trivalvibus polygamis. Retz. obs. fasc. 4. p. 14. n°. 34. Hab. prope Tranquebar. Styli nigricantes. Culmi ad tectorum stratum adhibentur. Retz.

6. *polystachyon*, flor. paniculatis, spicis filiformibus longissimis fastigiatis, flosc. remotiusculis. Swartz. prod. 21. Ejusd. Flor. p. 127. In insula St. Christophori, Ind. occid. Rachis filiformis.

7. *benghalense*, panicul. confertae pedunculis divisis, flosc. geminis sessili pedicellatoque, coroll. bivalvibus hermaphroditis. Retz. obs. fasc. 5. p. 16. Hab. in Bengal. A priore differt: cor. bivalvibus, et stigmatibus flavescentibus. Retz.

8. *repens*, panic. patula, flosc. geminatis sessilibus aristatis, fol. planis, vaginis pilosis. Willd. p. 322. Hab. in Guinea. Culm. pedalis simplex. Panic. patens, magnitudine Holci lanati. W.

9. *Ravennae*, panic. laxa: rachil lanata, flor. aristatis. Andropogon Ravennae. Lin. Spec. p. 1481. A. farcta alium Ravennae. Zanon. hist. 1. p. 64. t. 24. Moris. 6. 8. t. 8. f. 32. Hab. in Italia.

\*\*\* IMPERATA: spic. cylindrica, flor. 2-andris.

10. *cylindricum (europaeum)*, panic. spicata cylindrica sericea, ramulis brevissimis composita, flor. muticis diandris, fol. convolutis. Linn. encyc. 1. p. 588. t. 40. f. 2. Lagurus cylindricus. Lin. S. Sica. Cav. ic. 4. t. 2. S. Thunbergii. Willd. 1. p. 323? Imperata arundinacea. Cyrill. ic. rar. 2. fasc. 2. t. 11. Hab. Monspelii, in Italia, Africa, Hispania et Barbaria. Habitu a Saccharis recedit. Spica nivea lanata. T.

11. *Koenigii (indum)*, panic. spicata cylindrica, flor. diandris, culmo geniculis barbatis, fol. planis. Retz. obs. 5. p. 16. Hab. in India.

\*\*\* ERIANTHUS. Cal. gluma bivalvis, mutica, valvis lineari-oblongis canaliculatis, basi villis densis involucreta. Cor. bivalvis: valva anteriore longe aristata. 1-andra.

12. *giganteum*, vaginis lanatis, gluma villis brevioribus, valvis exterioribus villosis. Mich. Flor. Boreal. Amer. p. 55. Anthoxanthum giganteum. Walt. Gram. 6-3-pedale. Hab. in Carolinae humidis.

13. *brevibarbe*, vaginis collo subvillosis,

gluma villis longiore, valvis acutissimis nudis. Michaux. l. c. In collib. Tennessee et Carolinae.

185. PEROTIS. Cal. nullus. Cor. bivalvis: valvae aequales aristatae, lanugine involucreta.

1. *latifolia*, culmo simplici, fol. undulatis, geniculis glabris. Willd. Sp. 1. p. 301. Saccharum spicatum, flor. spicatis, fol. undulatis. Lin. Sp. pl. 79. Thunb. prodr. 1. p. 20? Pluck. alm. 177. t. 199. f. 1. Rheed. mal. 12. t. 62. p. *Burmanni*, foliis planis lanceol. Willd. l. c. Burm. ind. tab. 9. f. 3. Hab. in Indiae petrosis, et ad Cap. b. spei. C.

2. *polystachya*, culmo ramoso, fol. planis, geniculis barbatis. Willd. l. c. Saccharum panicum, floribus spicatis aristatis, culmo ramoso polystachyo. Lam. encyc. 1. p. 588. t. 40. f. 3. Hab. in India.

186. ANDROPOGON. Flor. polygami, geminati: altero hermaphrodito sessili; altero masculo rarius neutro pedicellato mutico.

HERMAPH. Cal. 2-valvis, 1-florus. Cor. 3-valvis: valv. secunda minore aristata, tertia minima minuta. Stam. 1-3. Recept. s. rachis plerumque villosa. Involuer.: villi fasciculus ad basin spicularum, in nonnullis fol. cymbiforme.

1. *filiforme*, spica simplici imbricata 1 seriebus binis florum aristatorum sessilium; binis pedicellatorum muticorum, cal. univalvibus. A. serratum. Retz. obs. bot. 5. p. 21. Cresc. ad oras flum. in Bengal. Arista longa.

2. *crinitum*, spic. solitaria hirsuta, aristis nudis geniculatis longissimis. Thunb. Flor. jap. p. 40. Hab. in Japonia.

3. *caricosum*, spica solitaria imbricata, seminibus hirsutis, aristis nudis contortis. Lin. Rumph. amb. t. 7. f. 2. A. Hab. in India. Gram. 4-5-pedale.

4. *divaricatum*, spica oblonga, flor. lanatis remotis divaricatis, arista flexuosa nuda. L. Reich. syst. 4. p. 299. Lagurus. Gron. Virg. p. 135. In Virginia.

5. *Gryllus*, panic. pedunc. simplicissimis trifloris, flosc. hermaphrodito aristato ciliato basi barbato. Lin. Amoen. 4. p. 332. Festuca utriculis lanugine flavescentibus. Bauh. pin. Hab. in Europ. australi et in Barbaria.

6. *serratum*, panic. laxa, flosculo altero sessili, altero pedicellato, pedicellis hirsutis. Thunb. jap. 41. Hab. in Japonia.

7. *cotuliferum*, panic. paula villosa, arista tortili nuda, pedicellis incrassatis pateriformibus. Thunb. l. c. Hab. in Japonia.

8. *avenaceum*, fol. asperis, panic. oblonga subcoarctata, flor. breviusculis villosis, arista contorta Michaux, Flor. 1. p. 58. Hab. in pratis Illinoensib. in America.

9. *saccharoides*, panic. ramis simplicibus, flosc. geminatis: hermaphrodito aristato sessili, altero mutico tabescente, pedicellis rachibusque lanatis. Swartz prodr. p. 26. et ejusl. Flor. 1. p. 205. Hab. in siccis montosis Jamaicae australis. Vag. nodi villosi.

10. *fastigiatum*, panic. spicis solitariis, pedunc. elongatis subfastigiatis, rachi laxata, floscul. utrisque lanatis. Swartz. l. c. p. 207. Crescit cum priore. Glum. calycinae purpurascent. Sw.

11. *Nardus*, panic. ramis supradecompositis proliferis. Lin. Flor. Zeyl. p. 45. (*sub Laguro*). Rumph. amb. 4. p. 22. t. 6? Hab. in India. Rad. odorata carminativa. Culm. arundinacei, alti. An *Nardus indica officinarum*? Vid. Lam. encycl. 2. 375.

12. *glaucum*, invol. cymbiformi, panic. foliacea, involuclis calycibusque bifloris, flor. sessiliuscul. cal. trivalvibus. Retz. obs. bot. 5. p. 20. Hab. in India. Anthistirii affine.

13. *lanigerum*, fol. convolutis, spicul. lanuginosis vagina cinctis, cal. exteriore nullo, flor. hermaphrodito aristato. Desf. Atl. 2. p. 379. In montib. prope Cassam. Styl. 1. Rachis villosa. D. An hujus generis?

14. *macrourum*, fol. vaginis villosis, panic. lateralibus fasciculato-polystachyis, flor. 1-andris. Michaux. p. 56. In Carolinae humidis.

15. *dissitiflorum*, vagin. glabris, culm. stricto, spicul. lateralibus dissitis, flor. 1-andris. Michaux. Cum priore sed in sylvis. Involucr. etiam cymbiforme.

Obs. Utraque species a Waltero ad *Cin-nam* relata.

16. *scoparium*, vagin. villosis, panic. oblongata stricta, spicul. simplicibus 3-andris, flosc. neutro aristato. Michaux. l. c. Hab. in aridis sylvarum Carolinae.

17. *cymbarium*, panic. sparsa, bracteis cymbiiformibus, flor. transversis aristatis ternis. Maui. 303. Hab. in India orientali.

Culmi origiales, farcti. Bractea triflora, cymbiiformis.

18. *distachyum*, spicis binis terminalibus, culmo indiviso. Ger. prov. 106. t. 3. f. 2. Jacq. Coll. 1. p. 165-166. Ic. var. Desf. Atl. 1. p. 377. Scheuchz. gram. p. 95. Bocc. sicc. 20. t. 11. Hab. in collibus Algeriae, Siciliae, Galliae. Fol. vaginantia. Aristae spicae accumbunt, in sicca planta recedunt. Jacq.

19. *Schoenanthus*, panic. spicis conjugatis ovato-oblongis, rachi pubescente, flosc. sessilibus, arista tortuosa. Rumph. amb. 5. t. 72. Ventenat. Descr. 88. Hab. in Indiae maritimis. In hortis colitur ob odorem gratum. Spiculae post anthesin reflexae pendulae.

20. *incurvatum*, spicis filiformibus subdigitatis, flor. geminatis: foemineo pedicellato aristato; masc. sessili mutico, cal. 1-valvibus. Retz. obs. bot. 5. p. 21. Habit. in Tranquebaria juxta flumine. Arista longa torta partim fusca, partim albida. R.

21. *binatum*, spicis geminatis lanatis, cal. valvula altera acuminata: altera truncata 3-dentata, petalo majore aristato. Retz. l. c. Culm. filiformis. Racheos dente lanugine flava fasciculata. Species ulterius examinanda.

22. *virginicum*, panic. spicis conjugatis: pedunculis simplicibus, rachi lanata, flosc. muticis: masculo tabescente. Sloan. hist. 1. p. 110. t. 68. f. 2. Hab. in America.

23. *bicorne*, paniculae spicis conjugatis, pedunculis ramosisimis, rachi lanata, flosc. arista caluca: masculo tabescente. Forsk. aegypt. cent. 6. p. 173. Sloan. 1. hist. p. 42. t. 15. Hab. in Brasilia, Jamaica.

24. *hirtum*, panic. spicis conjugatis, calycibus hirsutis. L. Roy. Lugd. B. 53. Pluck. aln. 175. t. 92. f. 1. Bocc. Mus. 315. t. 8. f. 1. In Lusitania, Sicilia, Smyrnae, et Algeriae collib. Pedunculi hirti, uti et rachis et glumae.

25. *muticum*, spicis digitatis subternis: flosc. alternis sessilibus muticis. Hab. ad Cap. b. spei. Petala contraria calyci, colorata, tenera. Aristae nullae. L.

26. *Ischaemum*, spicis digitatis plurimis, flosc. sessilibus: aristato muticoque, pedicellis lanatis. Hab. in Europae australioris aridis, collibus et arvis.

27. *provinciale*, spicis pluribus, fasciculatis laevibus, floscul. alternis subsessilibus secundis aristatis. Retz. obs. 3. p. 43. An provinciale, spicis digitatis, floscul. alternatim geminis, masculo mutico pedunculo.



culato. Ger. prov. p. 107. t. 4. Hab. in Gallia meridionali.

28. *undulatum*, spic. digitatis plurimis, flosc. obtusis sessilibus aristatis pedicellatis muticis, geniculis barbatis. Vahl. symb. p. 102. In Ind. orientali. Ligula membranacea nuda.

29. *pertusum*, spicis digitatis, glumis valvula pertusa. Lin. Mant. p. 301. Sub Holco. Hab. in Ind. orient., ad Madagascar. Petal. exterius in flore masculino non pertusum. Spic. 5. L.

30. *muricatum*, panic. contracta, spic. strictis verticillatis, cal. muricatis muticis. Retz. obs. 3. p. 43. A. squarrosus. Linn. suppl. 433? In India. Radix ob odorem gratum usitatissima apud incolas.

31. *ambiguum*, panic. coarctata, ramis setaceis, cal. 1-floro, cor. imberbi longe aristata. Mich. For. 1. p. 58. In Carolinae sabulosis.

Obs. Haec antecedensque species, quo Phalaris hispida. Thunb. Flor. jap. p. 44. pertinere videtur, aliud ad genus forte amandanda.

187. ANTHISTIRIA. Flor. polygami fasciculati in panicula laxa. *Masc.* 4, sessiles, verticillati, *Neutr.* 2, pedicellati, 3-valves, mutici. *Hermaphr.* centralis, 2-valvis. Arista tortilis e fundo corollae.

1. *imberbis*, culmo ramoso. glumis imberbibus. Desfont. in Journ. de Physiq. vol. 40. p. 292. t. 1. A. *imberbis*; fol. involucrique nudis. Retz. obs. 3. p. 11?

2. *ciliata*, glumis barbato-glandulosis, vaginis glabris. Desf. l. c. Andropogon *nuttans* et 4-valve. Lin. Hab. in Virginia et Jamaica.

3. *barbata*, glumis vaginisque barbato-glandulosis. Desf. l. c. t. 2. Gaertn. desc. 2. p. 465, t. 175. Androp. *ciliatum* panic. cernuus, cal. exteriore multifido ciliato, aristis contortis pilosis. Thunb. jap. p. 40. In Ind. Japonia. An prioris varietas?

4. *prostrata*, culmis ramosissimis radiceantibus prostratis, fol. laevibus margine scabris. Androp. *prostratum*. Lin. Mant. p. 304. Hab. in India orientali.

5. *glauca*, culmo ramoso compresso, glumis imberbibus, arista inferne villosa geniculata. Desf. Atlant. 2. p. 380 t. 254. Stipa *paleaceus*. Poir. iter. 2. p. 107. Habit. in collib. arenosis in Barbaria.

6. *gigantea*, culmo altissimo arundinaceo, fol. canaliculatis, calycibus pilosissimis, flor. panic. Cav. icon. 5. p. 36. t. 458. Hab. in ins. Philippica Luzon. Culm. 10-pedalis. Arista o. An hujus generis?

Obs. Forte nonnullae species ex affini genere Andropogon huc quoque pertinent.

188. APLUDA. Flor. polygami. *Involucr.* 2 - phyllum : foliol. 1 majus parum distans. *Cal.* 4-florus, cartilagineus, b' lamellatus s. 2-valvis : valv. anteriore truncata. *Flosc.* inferiores gemini : altero *hermaphrodito*, altero *femineo*; prioris cor. 1-valvis, navicularis, striata, 3-dentata dente intermedio aristata. *Stigm.* crassa hirsuta. *Flosc.* superiores *masculi*. valv. truncatae insistentes (vid. Gaertn. de Sem. et fruct. plant. 2. p. 466. t. 175.)

1. *mutica*, foliis lanceolatis, flosc. omnibus muticis. Lin. syst. pl. ed. Reich. 4. p. 311. Culmi longissimi, debiles, glabri, geniculis tumidis. Panicula angusta, lateribus exiens ex vaginis foliorum minorum uti Andropogon.

2. *aristata*, foliis lanceolatis, flosculis masculis muticis : sessili arista terminali. Amoen. acad. 4. p. 301 Scheuch. gram. 118-119. t. 3. f. 2. Hab. in India.

3. *Zeugites*, fol. ovatis flosc. masculis muticis : sessili arista terminali. Amoen. acad. 6. p. 412. Zeugites arundinaceus ramosus minor rufescens, panicula sparsa terminali. Brown. jam. 341. t. 4. f. 3. Hab. in Jamaica.

189. ISCHEMUM. Flor. polygami. *Hermaphrod.* *Cal.* 2-florus, 2-valvis : valv. subaequalibus cartilagineis; exteriore subovata gibba apice bifida. *Cor.* minor 2-valvis : valv. exteriore ventricosa, mutica aut aristata, bifida. *Nectar.* foliolis 2, spatulatis, truncato-emarginatis. *Masc.* Flor. idem sed. mutici. Flor. spicati, geminati. *Schreb.*

1. *muticum*, floribus muticis. Lin. Retz. obs. bot. 6. p. 34. Hab. in India. Fol. in haec et sequentibus lanceolata. *T.*

2. *imberbe*, floscul. nudis, cal. sessilis valvula exteriori utrinque binodulosa, corollae arista tortili elongata. Retz. l. c. p. 35. J. aristatum. Lin. Hab. in China. h

3. *barbatum*, cal. bifloris, basi barbatis, margineque ciliatis: sessilis margine utrinque binoduloso, arista torta geniculata. Retz. l. c. Hab. in Java. Spic. racheos dentes ciliato-barbati.

4. *ciliare*, culm. decumbente, cal. bifloris, pedicellis ciliatis, flore utroque foemineo, arista torta geniculata. Retz. l. c. p. 36. Hab. in China. Culm. genicula pilosa.

190. MANISURIS. Flor. polygami spicati. *Hermaphr. Cal.* 1-florus, 2-valvis: valv. inaequales, variae. *Cor.* 2-valvis, inclusa. Masculi et neutri *Cal.* regularis s. uniformis.

1. *granularis*, spicis pluribus, flor. hermaphroditii valvula exteriori orbiculari punctato-callosa. Cenchrus granularis. Lin. Swartz. Flor. 1. p. 186. Gaertn. de Sem. 2. p. 468. t. 175. Roxb. Corom. 2. fasc. 1. p. 11. t. 118. Panicum clandestinum Lin. ? Hab. in siccis Jamaicae et in Indiae fruticetis.

2. *Myurus*, spicis solitariis, flor. hermaphr. valv. late marginata laevi. Lin. Mant. p. 300. Roxb. l. c. t. 117. In Indiae siccis et arenosis. Valv. apice lateribusque emarginatae.

191. PÔMMEREULLA. *Cal.* 2-valvis, subdistans, 4-florus, (lavo-lucr. Lin.) *Cor.* 2-valvis: valv. altera major, 5-dentata: dente intermedio aristato. *Styl.* 2. Spica unilateralis? (Ex Roxburgh Plant. coromand. vol. 2. Fasc. 2. t. 131.)

1. *Cornucopiae*. Lin. suppl. p. 105. Willd. sp. 1. p. 319. Hab. in Indiae fruticetis et locis incolis. Stirps repens. Culm. brevis foliosus. Spic. vaginae fol. partim inclusa. Linnaeus (filius) perperam hoc genus ad 2-andriam 1-gyniam retulit.

192. ROTTBOELLA. Flor. polygami. *Rachis* articulata teretiuscula, in pluribus filiformis. *Cal.* ovato-lanceolatus planus univ. vel bivalvis. *Cor.* minor, 2-valvis. *Flosc.* alterni in rachi flexuosa.

1. *incurvata*, spica tereti subulata in-

curvata, gluma bipartita subulata adpressa. Willd. sp. 1. p. 463. Lin. suppl. 114. Flor. Dan. t. 918. Cav. ic. t. 213. Aegilops incurvata. Lin. Moris. hist. 3. s. 8. t. 2. f. 8. Hab. in Europae maritimis.

2. *filiformis*, spica recta subcompressa subulata, gluma calycina ensiformi adpressa, bipartita obtusa. Roth. Catal. bot. 1. p. 21. Ejusd. N. Beitr. p. 120. Barr. ic. 1164. t. 117. f. 1. Hab. in Europa australi. T

3. *biflora*, spic. tereti subulata erecta, cal. 2-floris 2-valvibus, glumis obtusis adpressis, margine scariosis. Roth. N. Bot. Beytr. 1. p. 121. Hab. in Hungaria. Ligula longa. C

4. *monandra*, spic. tereti subulata erecta, glum. calycina 1-valvi integra, flosc. aristatis. Roth. l. c. floribus distichis. Cav. ic. n.º. 41. t. 39. f. 1. Hab. circa Madritum. C

5. *setacea*, spica setacea secunda subincurva. Roxb. Corom. 2. p. 18. t. 132. Nardus indica. Lin. In Indiae vallibus. Cor. hirsuta.

6. *fasciculata*, spic. axillaribus aggregatis arcuatis, flor. 4-fariam dispositis. Desf. Atl. 1. p. 110. t. 36. Cresc. ad lacum ripas prope la Calle in Barbar. T

7. *repens*, spica tereti subulata, gluma calycina univalvi indivisa. Forst. prod. n.º. 151. Hab. in insulis maris pacifici.

8. *laevis*, pedunc. longissimis, spica flosculis binatis lateralibus, calycibus ovatis impunctatis laevibus. Retz. obs. 3. p. 11. Hab. in Tranquebaria.

9. *Thomaea*, minuta, spica simplici subulata, fol. pilosis brevioribus, culmo vaginis tecto. Willd. 1. p. 465. (R. pilosa). Roxb. Coromand. 2. t. 132. Hab. in Malabar et Tranquebaria.

10. *compressa*, spica compressa subulata, gluma calycina lanceolata plana indivisa. Lin. suppl. 114. Retz. obs. 3. p. 12. R. *Tripsacoides*. Lam. ill. p. 205. t. 48. f. 1. B? Hab. in Indiis.

11. *hirsuta*, spica subulata hirsuta, flosc. hermaphroditis patentibus, sterilibus pedicellatis adpressis. Vahl. symb. 1. p. 11. Hab. in Aegypto. T

12. *Coelorachis*, spica tereti unilaterali, flosc. geminis, altero pedicellato, calyce bivalvi. Forst. prod. n.º. 49. Hab. in insula Tanna. An sequentis varietas?

13. *dimidiata*, culm. decumbentibus, spica dimidiata compressa lineari, latere exteriori aggregato-flosculosa, inferiori

laevi nudo. Lin. suppl. 114. Mich. 1. p. 60. Hab. in utriusque Indiae arenosis et maritim.

14. *exaltata*, spica tereti-filiformi undique flosculosa, glumis ovatis obtusis, vaginis punctato-hirsutis. Lin. suppl. 114. Hab. in Indiis. Gramen altum culmo farcto. Vaginae sulcatae punctatae, punctis elevatis, seta terminatis.

15. *corymbosa*, spicis aggregatis lateralibus filiformibus, flosc. bifariis patentibus, fol. basi ciliatis. Lin. suppl. 114. R. punctata. Retz. obs. 3. p. 12. Aegilops exaltata. Lin. Hab. in Malabar ad fossas agrorum.

16. *muricata*, spicis teretibus pluribus longe pedunculatis, cal. ciliato-aculeatis, neutris bifidis. Retz. obs. 3. p. 12. Hab. in India orientali.

17. *sanguinea*, panic. spicis aristatis alternis simplicibus pedunculatis, bract. laterali ciliata. Retz. L. c. p. 25. Habit. in China.

193. **COLLADEA**. Flor. spicati, rachis flexuosa. Cal. 2-4-partitus: laciniis subovatis basi sinu (dente) distinctis, 2-florus. Cor. 2-valvis, cal. brevior, mutica aut aristata.

1. *distachya*, aristata. Colladea culm. ramoso, fol. cordatis lanceolatis acutissimis, vaginis cymbaeformibus. Cav. ic. 5. p. 37. t. 460. Hab. in humidis insulae Mindanae in America. Arista tortilis prope germen inserta. C.

2. *monostachya*, mutica. Tripsacum hermaphroditum. Lin. Dec. pl. t. 9. Hab. in Jamaica.

Obs. A Tripsaco tam ob habitum, quam ob glumas calycinas paritas omnino diversa.

194. **ÆGILOPS**. Cal. subtriflorus, coriaceus latissimus multiaristatus, aristis rigidis divergentibus. Cor. 2-valvis: valva exteriore ovata, aristis 2-3 terminata. Flor. polygami et hermaphroditi spicati.

1. *ovata*, spica brevi ovata, cal. omnibus 3-4-aristatis. Lin. Gaertn. 2. t. 175. Moris. s. 8. t. 7. f. 10. Hab. in Europa meridionali et in Barbaria. Glauca. Rach. compressa. ☉

☿? *geniculata*, culm. elongato, geniculato, fol. villosis, glumis 4-aristatis. Roth. Beobacht. p. 45.

2. *caudata*, spica elongata, cal. muticis: terminali aristis a longissimis rectis. Lam. enc. 2. p. 346. Cal. omnibus 2-aristatis. Lin. Hab. in Candia.

3. *truncialis*, spic. elongata, cal. inferioribus 2-aristatis. Schreb. gram. t. 10. f. 1. Crescit in locis aridis cum priore. Aristae 2-3, longissimae. Cal. villosus. ☉

4. *squarrosa*, subinermis: spica dubulata aristis longiore. Schreb. gram. 2. t. 27. f. 4. Buxb. cent. 1. t. 50. f. 3. Habit. in Oriente et prope Mascar. Cal. 1-3 aristatus: aristae breves. Rachis nodosa. ☿

195. **ELYMUS**. Flor. spicati. Cal. involucriformis 4-phyllus lateralis, bivalvis, aggregato-ternus multiflorus.

1. *arenarius*, spica erecta arcta, calycibus tomentosis flosculis longioribus, fol. pungentibus. Willd. Sp. 1. 467. Habit. ad Europae littora marina, inque arena mobili. Fol. arundinacea glauca involuto-mucronata. Ligula exigua. ☿

2. *geniculatus*, spica inflexo-pendula laxa, cal. setaceis patulis, spiculis longioribus, fol. mucronato-pungentibus. Smith. brit. 1. p. 153. Amoen. Acad. 7. t. 2. f. 5. Wither. arrang. 1. t. 2. f. 26. Hab. in Angliae litorib. maritimis. Priore altior. ☿

3. *giganteus*, spica erecta arcta, spiculis senis sexfloris villosis, cal. subulatis glabris, spicula longioribus. Vahl. symbol. 6. p. 10. E. racemosus. Lam. Hab. Gram. altum. Spica stricta, viridi-pallens.

4. *sibiricus*, spica pendula arcta, spiculis binatis calyce longioribus. Schreb. gram. t. 21. f. 1. Cmel. sibir. 1. p. 323. t. 28. Hab. in Sibiria. Var. Spic. 3. ☿

5. *tener*, spica pendula, flosculis geminis. Lin. suppl. 114. Hab. in Sibiria. Culmus bipedalis geniculis rubris. Aristae saepe flexuosae.

6. *canadensis*, spica nutante patula, spiculis inferioribus ternatis: superioribus binatis. Moris. s. 8. t. 10. f. 2. Hab. in Canada. ☿? Elymus philadelphicus? L.

7. *virginicus*, spica erecta, spiculis trifloris, involucri striato. Sp. pl. 123. Habit. in Virginia. Spic. basi fol. vagina inclusa?

8. *striatus*, spica erecta, spiculis bifloris pubescentibus, involucri striato brevioribus. Willd. sp. 1. p. 470. Hab. in America bor.

9. *europaeus*, spica erecta: spiculis bifloris aristatis, involucri laevi aequalibus.

*Hordeum cylindricum*. Murr. prodr. p. 43. H. sylvaticum. Huds. Involucr. 6-phyllum ut in *Hordeis*. Hab. in sylvis umbrosis.

10. *Caput Medusae*, spiculis bifloris, involucri setaceis patentissimis. Schreb. gram. t. 24. f. 2. Hab. in Lusitaniae et Hispaniae maritimis.

11. *Hystrix*, spica erecta, spiculis patentibus involucri destitutis. Lin. In Oriente. *Asperella* Hystrix. Humboldt.

196. HORDEUM. Flor. spicati. *Cal.* 1-2-florus hexaphyllus involucriformis: foliolis per paria digestis, setaceis. *Flosc.* terni intermedio sessili, lateralibus stipitatis (sepius sterilibus). *Cor.* stipitata, 2-valvis acuta: exteriore aristata.

1. *vulgare*, (*sativum*) *flosc.* omnibus hermaphroditis aristatis: ordinibus duobus erectioribus. Lin. Willd. spec. 1. p. 472. *β. caeleste*, seminibus decoratis. Habit. circa Margarem in Sicilia. L. Var. sem. nigris. ☉

2. *hexastichon*, *flosc.* omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus scxariam positis. Viborg. cereal. 30. t. 2. ☉

3. *distichon*, *flosc.* lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus imbricatis. Viborg. t. 3. Moris. s. 8. t. 6. f. 1. Hab. ad Samaram, Tartariae fluvium. ☉

4. *Zoeriton*, *flosc.* lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus patentibus corticatis. Viborg. t. 4. ☉

5. *strictum*, *floscul.* lateralib. masculis muticis, involucri aristatis scabris glabris, radice bulbosa. Schousb. Maroc. Desf. atl. 1. p. 113. t. 37. Cresc. in camp. aridis regni tunetani. Sequenti va'de affine. ¶

6. *bulbosum*, *flosc.* omnibus fertilibus ternis aristatis, involucri setaceis basi ciliatis. Amoen. acad. 4. p. 304. Bar. ic. 112. f. 2. Moris. s. 8. t. 6. f. 7. Hab. in Italia, Oriente. ¶

7. *maritimum*, *flosc.* lateralibus masculis aristatis, involucri intermediis ciliatis lanceolatis. Flor. dan. t. 69. Ubique vulgare. ☉

8. *pratense*, *flosc.* lateralib. masculis brevius aristatis dorso hirsutis, involucri scabris hirsutis. Roth. N. bot. Beytr. 1. p. 124. Smih. brit. 156. H. *maritimum*. Roth. germ. t. 1. p. 51. Engl. bot. t. 409. Hord. *nodosum* Lin. Hab. in pratis et pascuis.

9. *secalinum*, *flosc.* lateralibus neutris brevius aristatis; dorso glabris, involucri setaceis scabris. Roth. l. c. 125. Willd. spec. 1. p. 475. Gramen spicatum secalinum minus. Scheuchz. gram. 17. n°. 3. Monti gram. p. 60 f. 56. Hab. in Europae pratis, minus frequens. +

10. *maritimum*, *flosc.* lateralibus masculis, brevius aristatis, dorso glabris, *floscul.* lateralium foliolo interiore semi-ovato. Roth. Beytr. p. 127. Smith. l. c. Flor. dan. t. 610. H. *maritimum*, *flosculis* omnibus aristatis, lateralibus masculis, involucri scabris, interioribus masculorum semilanceolatis. Vahl. symbol. 2. p. 25. Cresc. in pascuis et arenosis maritimis. ☉

11. *rigidum*, *flosculis* lateralibus spuris aristatis, involucri lateralibus foliolo altero margine exteriore alato. Roth. Catal. p. 24. Monti gram. f. 53. Hab. in Ducatu Oldenburgensi. Involucri intermedia scabra nec ciliata. R

12. *Hystrix*, *floscul.* lateralibus masculis brevius aristatis dorso glabris, involucri omnibus setaceis scabris rigidis patentibus, spica ovata subcompressa. Roth. N. Beytr. Ejusd. Cat. 1. p. 23. In Hispania. ☉

13. *jubatum*, aristis involucri setaceis longissimis. Sp. pl. 126. *Elymus crinitus*. Schreb. gram. 15. t. 24. f. 3. Buxb. cent. 1. p. 33. t. 52. f. 1. Hab. Smyrnae. ☉

197. SECALE. *Cal.* oppositus, 2-valvis, aut multiflorus, solitarius: glum. lineari-lanceolatis, laevib. aut utriusque canaliculatis.

1. *cereale*, glumarum ciliis scabris, squamis calycinis angustis minoribus. Hab. in Creta. Spic. passim ramosa. ☉

2. *villosum*, glumarum ciliis villosis, squam. calycinis cuneiformibus. L. Willd. sp. 1. p. 471. Buxb. cent. 5. p. 2. t. 41. Hab. in Europa australi, et in Oriente. ☉

3. *orientale*, glumis hirsutis, squamis calycinis subulatis. Willd. in N. Act. Ber. 2. t. 4. f. 3. Hab. ad Archipelagum.

4. *creticum*, glumis extorsum ciliatis. Sp. pl. 125. Hab. in Creta.

5. *pungens*, spica subovata glumis subpatulis scabris pungentibus. Hab. .... An *Triticum squarrosum*, spica ovali squarrosa, spiculis distichis, calycibus trifloris patentissimis, valvul. calycinis corollinisque linearis-subulatis scabris rigidis. Roth. N. Bot. Beytr. 1. p. 128-129. (Hab. in Aegypto). Verum in meo gramine cal. 4-6-florus est: descriptio Rothii ceterum

convenit. Glumae sub lente ad marginem aculeatae.

6. *prostratum*, spicula unica ovata compressa bifaria, glumis glabris aristato-mucronatis. *Triticum*. Lin. suppl. 114. Willd. spec. 1. p. 480. Jacq. hort. 3. p. 540. t. 19. f. 4. *Agropogon triticum*. Gaertn. Hab. in desertis Caspicis. Calycis forma cum prioribus convenit, hinc hujus potius loci.

7. *pumilum*, spica ovata, glumis subaristatis: calycinis bisulcatis. Lin. suppl. p. 115. sub *Triticum*. Hab. in Sibiria. An satis distinctum?

198. **TRITICUM**. *Cal.* bivalvis, solitarius, multiflorus. *Flos* obtusiusculus, glumis muticis aut interrupte aristatis. *Spicula* breviuscula e latere plano rachi approximatae.

1. *sativum*, a *aestivum*. calyce quadrifloro ventricoso glabro imbricato aristato. Lin. Willd. sp. 1. p. 476. Hab. apud Baschiros in campis. ☉

β. *hybernum*, calyc. quadrifloro ventricoso levi imbricato submutico. Lin. Blakw. t. 40. f. 1. 2. 3. ☉

*Obs.* Locus natalis genuinus hujus et specierum 3-5 sequentium adhuc incertus est.

γ. *durum*, culm. farcto. glumis pubescentibus aristatis, seminibus duris. Desf. atl. 1. p. 114. T. *sativum*. Lam. enc. 2. p. 55. Hab. in Barbaria, ubi frequens e litur praestans hoc gramen.

2. *compositum*, spica composita, spiculis confertis aristatis. Lin. suppl. 115. Moris. hist. 3. p. 175. s. 8. t. 1. f. 7. Habitat in Aegypto. Scribitur Neupoli. ☉

3. *polonicum*, calyc. bifloro nudo, flos. longissime aristatis, racheos dentibus barbatis. Moris. s. 8. t. 1. f. 8.

γ. *turgidum*, calyc. quadrifloro ventricoso villosa imbricato obtuso. Syst. Veg. 108. Moris. L. c. 1. t. f. 14. Hab. .... Etiam varietas prioris videtur.

4. *Spelta*, calyc. quadrifloro truncato, flosculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro. T. flor. quaternis, duobus secundis glumis adhaerentibus. Hall. helv. n°. 1424. Moris. t. 6. f. 1. ☉

5. *monococcum*, calyc. subtrifloro: primo aristato; intermedio sterili. T. spica disticha, flor. ternis, fertili unico, glumis tridentatis, florali aristato. Hall. helv. n°. 1425. Moris. t. 6. f. 2. ☉

6. *hispanicum*, calyc. sexfloro flosculis secundis apice aristatis. Mant. 325. (T. maritimum). Willd. sp. 1. p. 479. Hab. in Hispania. ☉

7. *juncum*, cal. truncatis 5-floris muticis, fol. involuto-mucronato-pungentibus. Smith. brit. 1. p. 157. Roth. N. bot. Beytr. p. 157. Schouh. maroc. pag. 52. Habitat in arenosis maritimis. Rad. repens articulata. Fol. superne pubescentia. Schouh. T.

\* *pungens*, glaucum, radice repente, foldeum subulato-convolutis pungentibus, glum. acuminatis muticis: carina submucronata. *Triticum juncum* Auct. T. repens. γ Smith. l. c. p. 158.

8. *repens*, cal. subulatis multinerviis 5-floris, flos. acuminatis, fol. planis, radice repente nodosa. Smith. l. c. Willd. 1. p. 481. In culmis, ad saepes. Var. *Spicul. aristatis*.

α. *glaucum*, totum amoenae glaucum, fol. planis, spiculis majoribus aristatis aut muticis. Lam. ill. 1. p. Cresc. cum antecedente.

β. *multiflorum*, altum totum viride, spicul. 8-floris subaristatis. In sylva Meudon observata a cl. Richard. Spic. fere spithamiae. Fol. lata.

γ. *capillare*, spicul. subtrifloris, basi in pedicello flosculoso-villosis, aristas capillaribus glumis duplo fere longioribus. Passim in pratis provenit. Tener. sequenti affine.

9. *caninum*, cal. acuminatis subquinguenerviis 4-floris, floscul. aristatis, fol. planis, radice fibrosa. Smith. p. 159. *Elymus caninus*, spica nutante arcta, spicul. rectis involucre destitutus: infimis geminis. Lin. Willd. spec. 1. p. 469. Moris. s. 8. t. 1. f. 2. Hab. ad saepes, in sylvaticis.

\* *vaginans*, fol. vagina subventricosa spicam basi includente, spicul. 3-floris aristatis. Ex America meridionali hoc gramen habeo.

10. *distichum*, calyc. quadrifloro glabro mutico, flor. distichis, fol. filiformibus. Thunb. prod. 23. Hab. ad Cap. b. spei.

11. *cristatum*, spicul. ovatis 6-8-floris muticis in spicam subtrigonam imbricatis. An *Bromus cristatus*? L. Willd. Sp. 1. p. 439.

12. *fragile*, spica tetragona, cal. 6-floris muticis subacutis, cor. obtusissimis, fol. radicalib. planis tomentosis, culmeis deorum involutis, caule fragili. Roth. N. bot. Beytr. p. 139. Pluckn. alm. t. 33. f. 4. Hab. Vagin. infimae densissime tomentosae. R. T.

13. *nigricans*, spica 4-gona, glumis margine villosis (nigrescentibus), aristis longis. In Normandia maritimis observavit cl. Bory. Secale aut Hordeum refert, spica subturgida.

14. *caudatum*, spica parva, aristis longissimis 4-plo brevior. Scheuchz. gram. t. f. 4. ic. optima. Miß. Dn. Schleicher, qui speciem hanc distinctam in Helvetia invenit, praeter Scheuchzerum a nemine descriptam. Glum. cal. brevis aristatae, corollinae vero aristae 2. unc. fere longae sunt.

15. *maritimum*, humile, calycib. multifloris, floscul. mucronatis, spica basi ramosa L. Vahl. symb. 2. p. 26. Festuca lanceolata. Forsk. Descr. 22. Bocc. mus. 2. p. 133. p. 15. Hab. in Galliae et Angliae maritimis. Fol. longitudine culmi vaginis purpurascens. L.

16. *lotioides*, spica elongata attenuata, spicul. ovatis distantibus; inferioribus pedunculatis. Lectum in ericetis prope Mans. Spica ultra spitham. longa, basi subcomposita. Color viridis.

17. *tenellum*, calyce subquadrifloro, flosculis muticis, acutis, fol. setaceis. Sp. pl. 127. Hab. in Helvetia, Gallia.

199. **LOLIUM.** Cal. 1-phyllus, fixus, multiflorus. Spica simplex.

1. *perenne*, spica mutica, spiculis compressis multifloris. Leers. herb. t. 12. f. 1. Ubique vulgare.

β. *cristatum*, spiculis in capitulum distince aggregatis; Scheuchz. Agrost? 2. Passim cum priore.

γ. *ramosum*, spica ramosa. Leers. l. c.

2. *tenu*e, spica mutica tereti; spiculis trifloris. L. Sp. pl. 122. Hab. in Gallia, Germania et Helvetia. Var. prioris?

3. *temulentum*, spica aristata, spiculis compressis subsexflores cal. aequantibus. Lam. ill. p. 206. t. 48. f. 2. Culm. superne scabro. Sm. Flor. brit. 1. p. 150. Leers. t. 12. f. 2. Hab. in Europae agris. Cal. passim 2-glumis. ⊙

4. *multiflorum*, spica breviter aristata, spiculis compressis suboctofloris, cal. triplo longioribus. Lam. l. c. Hab. passim inter segetes.

α. *compositum*, alissimum, racemo longissimo inferne composito, spicul. numerosis 16-20-flores subaristatis. Thuill. Paris. p. 62. In agris passim.

β. *arvense*, spica submutica; spicul. longitudine calycis, flosc. ellipticis, culm.

glaberrimo. Smith. Flor. brit. 1. p. 150. Morison, s. 8. t. 2. f. 1. Hab. in Angliae et Scotiae et Germaniae agris. L. *temulento* minus et totum glabrum. Huc. L. *remotum*. Schrank. An diversum a L. *multifloro*?

5. *maximum*, calyce longitudine spiculae multiflorae compressae, flosculis summis aristatis. Willd. sp. 1. p. 462. Hab. in Jamaica an varietas prioris?

200. **THUAREA.** Flor. laterales, polygami; inferiores hermaphroditi. *Rachis* membranacea demum involuta, decidua. Cal. 2-florus, 2-valvis. Cor. 2-valvis, ovata, mutica.

1. *sarmentosa*. Culm. repens. Fol. disticha, tomentosa. Hab. in Madagascarae arenos., ubi specularetur hocce gramin ob spiculam, quae demum uti in Arach. *hypogaea* terram intrat, cum numerosis rarioribus aliis plantis observatum a Dom Aubert du Petit-Thouars mecumque cum character generico benevole communicatum.

201. **SPINIFEX.** Flor. polygami. Cal. biflorus, 2-valvis; valvulis rachii parallelis. Cor. 2-valvis, mutica.

1. *squarrosus*. Frutescens, fol. spinoscentibus. Moris. s. 8. t. 8. f. 11. Hab. in India. Spica fere uti in Triticis.

## TRIGYNIA.

202. **ERIOCAULON.** Cal. communis: capitulum imbricatum. Petala 3-6 equalia. Stamina supra germen. Caps. 3-locularis.

1. *triangulare*, culmo triangulari, foliis ensiformibus, capitulo ovato. Willd. Sp. pl. p. 485. Breyne. cent. 1. 50. Moris. hist. 3. p. 253. s. 8. t. 16. f. 17. Hab. in Brasilia.

2. *quinquangulare*, culmo quinquangulati, fol. ensiformibus, calyce universali pentaphyllo. Pluck. Alm. 366. t. 221. f. 7. Hab. in India. h

3. *sexangulare*, culmo sexangulati, fol. ensiformibus. Burm. ind. t. 9. f. 4. Hab. in India.

4. *setaceum*, culmo sexangulati, fol. setaceis. Rheed. mal. 12. t. 63. Hab. in India.

5. *decangulare*, culmo decangulati, fol. ensiformibus. Pluck. amalth. t. 409. f. 5. Hab. in Americae septentrionalis paludibus.

6. *pubescens*, scapo subvillosa, fol. ensiformibus pubescentibus maximis, capitulo plano tomentoso. Lam. ill. gen. t. p. 213. Hab. in India Madagascaria.

β? *compressum*, culm. compresso tenuiter striato, cal. argenteo, capitulo superne plano tomentoso. Lam. l. c. Hab. in Carolina.

7. *fusculatum*, surculo brevi folioso, fol. patentibus, scapis plurimis fasciculatis pilosis. Lam. ill. p. 214. t. 50. Habit. in Guiana.

8. *repens*, caule decumbente folioso, fol. ensiformibus recurvatis, scapis axillaribus solitariis. Willd. l. c. Lamarck. encyc. 3. p. 264. t. 50. f. 2. Habit. in insula Bourboniae.

9. *umbellatum*, caule nudo umbellifero, involucri polyphylo, radiis inaequalibus longissimis. Lam. l. c. t. 50. f. 4. Habit. in Guiana.

203. MONTIA. Cal. 2-phyllus. Cor. 1-petala, irregularis. Caps. 1-locularis, 3-valvis.

1. *fontana*. α. *repens*, caule repente, fol. ovatis. β. *erecta*, caule erecto fol. lanceolatis. Hab. ad scaturigines. ☉

204. PROSERPINACA. Cal. 3-partitus, superus. Cor. o. Nur tri-locularis.

1. *palustris*, α. fol. linearilanceolatis imis inciso-serratis. β. fol. omnibus pectinato-pinnatifidis. Michaux, Flor. p. 76. Trixis. Mitch. Hab. in Virginiae paludibus.

205. HOLOSTEUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. unilocularis, subcylindracea, apice dehiscens.

1. *cordatum*, foliis subcordatis. Lin. Willd. Sp. 1. p. 488. Herm. parad. 11. t. 11. Hab. in Jamaica et Surinamo.

2. *diandrum*, caulis procumbentibus rigidioribus, fol. subrotundis, flor. diandris. Swartz. prod. 27.

3. *succulentum*, fol. ellipticis carnosissimis. Amoen. acad. 3. p. 21. Hab. in Novboraco.

4. *hirsutum*, foliis orbiculatis hirsutis. Amoen. acad. 3. p. 21. Hab. in Malabar.

5. *umbellatum*, flor. umbellatis, petalis dentatis. Flor. dan. t. 1204. Hab. in arvis, graminosis. Vire. Tota glauca.

206. KOENIGIA. Cal. 3-phyllus. Cor. nulla. Sem. 1. ovatum, nudum.

1. *islandica*. Flor. dan. t. 418. Lam. ill. gen. t. 51. Hab. in Islandia. Facie Polycarpi. Caulis subsucculentus. Stipulae vaginales intrafoliaceae. Fol. quaternaria. L.

207. POLYCARPON. Cal. 5-phyllus. Petala 5, minima, ovata. Caps. ovata, 1-locularis, 3-valvis.

1. *tetraphyllum*, caule ramoso prostrato, foliis quaternis. Holosteum tetraphyllum. Thunb. prod. 24. Hab. in Italia, Hispaniae, Istriae, Gal. Narbonensis vineis. ☉

\* *diphyllum*, fol. oppositis orbiculatis. Cavan. Hisp. 2. p. 40. t. 151. f. 1. Hab. prope oppidum Puig, in Hispania. An praecedentis var?

2? *stipulifidum*, erectum ramosissimum ramis setaceis, fol. spatulatis flor. terminalibus fasciculatis, stipulis setaceo-multifidis. *Stipulicida* setacea. Michaux, Flor. 1. p. 26. Hab. in Carolinae aridis sabulosis. Monogynum et diandrum.

Obs. An potius distinctum genus? cui adnumeranda Holosteum *cordatum* L. et *diandrum*. Swartz? quoniam capsula ovata 3-valvi conveniunt cum Polycarpi.

208. DONATIA. Cal. 3-phyllus. Cor. polypetala. Caps. 3-locularis, infera.

1. *fascicularis*, Forst. char. gen. 5. t. 5. Willd. sp. 1. p. 491. Polycarpon *magellanicum*. Lin. suppl. 115. Hab. in Terra del Fuego, in rupestribus humidis, cespites densissimas formans.

209. MOLLUGO. Cal. 3-phyllus. Cor. o. Caps. 3-locularis, trivalvis.

1. *oppositifolia*, foliis oppositis lanceolatis, ramis alternis, pedunculis lateralibus confertis unifloris. Pluck. alm. 21. t. 75. f. 6. Hab. in Zeylona.

2. *stricta*, fol. subquaternis lanceolatis, flor. paniculatis nutantibus, caule erecto angulato. Pluck. phyt. 21. t. 256. f. 2. Burm. zeyl. 31. t. 5. f. 3. Hab. in Africa. ☉

3. *hirta*, fol. quaternis obovatis villosis, caule decumbente. Willd. l. c. Thunb. pr. 24. Hab. ad Cap. b. spec. ☉

4. *pentaphylla*, fol. quinis obovatis aequalibus, florib. paniculatis. In Zeylona.

5. *verticillata*, fol. verticillatis cuneiformibus acutis, caule subdiviso decumbente, pedunc. unifloris. Pluck. mant. 9. t. 33a. f. 5. Ehret. pict. t. 6. f. 3. Hab. in Virginia, in cultis. ☉

6. *radiata*, caulib. procumbentibus radiatis, fol. obovatis acuminatis. Flor. peruv. 1. p. 48. Hab. in inundatis locis Conceptionis, Chile. Caul. plures.

210. MINUARTIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 1-locularis, 3-valvis. Semina nonnulla.

1. *dichotoma*, floribus confertis dichotomis. Loeß. it. 121. t. 1. f. 5. Willd. sp. 1. p. 492. Hab. in Hispania. ☉

2. *campestris*, flor. terminalibus alternis bractea longioribus. Act. Stockh. 1758. t. 1. f. 3. Hab. in Hispaniae collibus planis. ☉

3. *montana*, flor. lateralibus alternis bractea brevioribus. Loeß. it. 122. t. 1. f. 4. Hab. cum priore.

211. QUERIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 1-locularis. Sem. 1.

1. *hispanica*, floribus confertis. Willd. p. 493. Q. bracteis patulis hamatis. Loeß. it. 48. Hab. in Hispania.

2. *canadensis*, flor. solitariis, caule dichotomo. Hab. in Canada, Virginia. Folia utrinque punctis fuscis. L. ¶

3. *trichotoma*, flor. racemosis, caule trichotomo. Thunb. Act. Soc. Lin. Lond. 2.

p. 529. Rubia. Thunb. jap. p. 357. n°. 44. Hab. in Japonia. An hujus generis?

212. LECHEA. Cal. 3-phyllus. Petala 3, linearia. Caps. 3-locularis, 2-valvis. valvulis totidem interioribus. Sem. 1.

1. *major*, *villosa*, fol. ovato-lanceolatis, flor. lateralibus vagis (fasciculatis) Amoën. acad. 3. p. 11. t. 1. f. 4. Lam. Ill. t. 52. f. 2. Menandra foliis alternis. Gron. virg. 2. p. 20. Hab. in Canadae et Carolinae aridis.

2. *minor*, fol. lineari-lanceolatis, florib. paniculatis. Amoën. acad. 3. p. 10. Lam. ill. t. 52. f. 1. Habit. in Canada, sylvis glareosis. ¶

\* *thymifolia*, caul. erecto subaspero, ramis paniculatis, flor. foliato-fasciculatis. Michaux, Flor. 1. p. 77. Habit. in Carolinae apricis. An a priore diversa?

3. *racemosa*, pubescens caul. erecto paniculato-racemuloso, fol. linearibus acutis ciliatis, racemulis sparsis nudis. Michaux, l. c. Menandra ramis ternis. Gronov. Virg. p. 21. In Virginia.

4. *tenuifolia*, humilis, caul. asurgentibus patulis, fol. subulato-linearibus, flor. alternis solitariis. Michaux, l. c. Habit. in collib. sabulosis juxta amnem Santee. Caps. majusculae.

5. *verticillata*, fol. oblongo-ovatis serrulatis, flor. verticillatis, caule hispido. Willd. sp. 1. p. 495. In India orientali. Habitatu Spermacocae. W. ¶

## M O N O G Y N I A.

Galium trifidum. Pontederia limosa. Narcissus triandrus. Laurus triandra. Amananthi nonnulli. Agarae quaedam. Hirtella triandra. Juncus conglomeratus, effusus. Tradescantia multiflora. Sw. Rivina brasiliensis.

## D I G Y N I A.

Chenopodium triandrum. Ehrhartae species (gram.) etc.

## T R I G Y N I A.

Moraea s. Isia gladiata Lin. Elatine triandra. Xanthoxylis. Species. Tillaea muscosa. Alsine.

## TETRANDRIA.



## C L A S S I S I V.

## T E T R A N D R I A.

## M O N O G Y N I A.

213. *PROTEA*. Cor. 4-fida s. 4-petala. *Anther.* lineares, insertae petalis infra apicem. *Cal.* proprius o; (communis imbricatus). *Nux* 1-sperma, supra.

\* *Pinnata* : foliis pinnatis filiformibus.

1. *decumbens*, foliis trifidis filiformibus. caule decumbente. Thunb. prod. 25. et Diss. acad. 2. Willd. Sp. pl. p. 58. Fol. simpliciter trifida secunda. Th.

*Obs.* In campis arenosis Cap. b. spei, ubi paucis speciebus exceptis, omnes sequentes crescunt, quae h. sunt.

2. *florida*, fol. trifidis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis bracteis obvallatis. Thunb. Diss. n.º. 2. t. 1. f. 1. In Cap. b. spei montibus : Franche Hoek.

3. *cyanoides*, fol. trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis nudis. Thunb. L. Mant. 188. Pluck. mant. t. 345. t. 6. Cor. intus purpureascens, extus tota lanata pilis longis densisque albis. Th.

4. *patula*, fol. trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis aggregatis. Cor. niveo-tomentosa.

5. *pulchella*, fol. bipinnatis glabris filiformibus, capitulis terminalibus clavatis aggregatis aphyllis bracteatis. Willd. l. c. p. 507. Sert. Hannov. 1, fasc. 2. p. 15. t. 7. Cav. ic. t. 550. Hab. in Nova Hollandia. Distincta capitulis verticillato-aggregatis in ramorum apice. W.

6. *sphaerocephala*, fol. bipinnatis filiformibus, pedunc. capitulis brevioribus, squamis calycinis ovatis basi villosis. Th.

7. *tridactylides*, fol. bipinnatis ; pinnulis lineari-cuneiformibus : ultima trif-

ida, strobilis sphaericis solitariis terminalibus. Cav. ic. 6. t. 548. Hab. cum a sequentibus in N. Hollandiae sinu botanico, prope Jackson.

8. *acutifera*, fol. pinnatis : pinnulis oppositis, strobilis sphaeroidis, cor. 1-petalis. Cav. l. c. p. 33. t. 549. Cor. flava uti in priore.

9. *dichotoma*, ramis dichotomis, fol. bipinnatis filiformibus glabris, strobilis in dichotomia solitariis concis subsessilibus. Cav. l. c. 34. t. 551.

10. *Serraria*, fol. multifidis filiformibus hirtis, pedunc. capitulis longioribus, squamis calycinis ovato-lanceolatis hirtis. Th. *Serraria* foliis tenuissime divis, floribus rubris apetalis. Burm. afr. p. 264. t. 99. f. 1. Var. fol. glabris.

11. *triternata*, fol. bipinnatis filiformibus glabris, pedunculis capitulis longioribus, squamis calycinis lanceolatis hirtis. Thunb. Caul. superne flexuosus sesquipeda- lis. Cor. lanata pilis argenteis. Th.

12. *glomerata*, fol. bipinnatis filiformibus, pedunculo communi elongato nudo, pedicellis capitulis longioribus. Thunb. Andrew. t. 264. Capitulum hemisphaericum.

13. *phylloides*, fol. bipinnatis filiformibus, capitulis terminalibus solitariis lanatis. Thunb.

14. *Lagopus*, fol. bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis aggregatis villosis. Thunb. Andrew. t. 243. Spic. villo densissimo albo distinctae.

15. *spicata*, fol. bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis distinctis. Thunb. Andr. t. 244. Folia filiformia bipinnata pinnae 3 oppositae, apicis glandula oblonga saevesc. Th.

16. *Sceptrum*, fol. inferioribus bipinna-

tis, superioribus trifidis integrisque. Thunb. Protea Sceptum Gustavianum. Sparm. Act. holm. ann. 1777. p. 55. t. 1. Hab. in summis montibus Hottentots Holland.

**\*\* Dentatae: foliis dentatis callosis.**

17. *crinita*, fol. quinquedentatis glabris, caule erecto, capitulis subternis terminalibus. Thunb. P. *crinita* Linn. suppl. 117.

18. *Conocarpa*, fol. quinquedentatis glabris, caule erecto, capitulo terminali. Th. Pluck. alm. 212. t. 200. f. 2. Boerh. Lugd. B. 2. p. 196.

Obs. Var. caule glabro et villosa, fol. 7-dentatis, 5-dentatis, 3-dentatis et indivisis, Th.

19. *elliptica*, fol. ellipticis tridentatis glabris, caule erecto, capitulo terminali. Thunb. Cor. longae hirsutae. Th.

20. *Hypophylla*, fol. tridentatis glabris secundis, caule decumbente, capitulo terminali. Thunb. Boerh. Lugd. B. 2. t. 158. Hab. in campis sabulosis.

21.  *cucullata*, fol. tridentatis glabris, capitulis lateralibus. Thunb. Boerh. l. c. t. 206. Hab. in campis arenosis, ad rivulos Cap. b. spei. Caulis nodulosus, tomentosus. Flor. flavescent.

22. *tomentosa*, fol. tridentatis tomentos. Thunb. Tota incano-tomentosa.

23. *heterophylla*, fol. tridentatis integrisque, caule decumbente. Thunb.

**\*\*\* Acerosae: foliis filiformibus subulatis.**

24. *pinifolia*, fol. filiformibus, florib. racemosis ecalyculatis glabris. Thunb. Andrew. t. 76. In locis montosis.

25. *racemosa*, fol. filiformibus, flor. racemosis calyculatis tomentosis. Thunb.

Obs. Haec est unica hucusque nota species calyce unifloro; qua non optime a P. *caudata* et *incurva* distinguitur. Thunb.

26. *incurva*, fol. filiformibus incurvis glabris, racemoso capitulis spicatis tomentosis, cal. 4-floro. Thunb. t. 3. f. 2.

27. *caudata*, fol. filiformibus hirtis, capitulis subsessilibus spicatis. Thunb. t. 2. f. 3. Cal. communis 4-phyllus 2-florus, raro uni-vel triflorus.

28. *bracteata*, fol. filiformi-canalicul. capitulo terminali. bracteis multifidis. Th. Diss. t. 1. f. 2. Boerh. Lugd. B. t. 193. Caulis pedalis simplex.

29. *comosa*, fol. inferioribus filiformibus, superioribus lanceolatis, capitulo terminali. Thunb. Caul. a foliorum casu nodulosus.

30. *purpurea*, fol. linearibus recurvatis, capitulis terminalibus cernuis, caule decumbente. Cor. ferrugineae minutae. Th.

31. *prolifera*, fol. lineari-subulatis adpressis, caule proifero. Thunb. Hab. in summis montibus Hottentots Holland.

32. *corymbosa*, fol. lineari-subulatis adpressis, ramulis verticillatis subfastigiatis. Thunb. Diss. t. 2. fig. 1. P. *bruniades* Linn. suppl. 117. Hab. in campis sabulosis Cap. b. spei. Caulis quadrupedalis, ramis subverticillato-aggregatis subfastigiatis. T.

33. *rosacea*, fol. lineari-subulatis, capitulo terminali, calyce colorato. Thunb. (P. *nana*). P. *rosacea*, flor. solitariis, radio calycino colorato patenti; fol. subulatis. L. Mant. 180. Petiv. gazoph. p. 40. t. 25. f. 7. Hab. in montibus Roode Sand Cap. b. spei. Calicis squamae interiores purpureo-coloratae. Cor. lina aurea extus tecta. Rosam referentibus floribus statim noscitur. Thunb.

34. *lanata*, fol. triquetris adpressis, capitulo terminali laneto. Thunb. Diss. t. 3. fig. 1. Cor. pilis argenteis tota lanata et barbata. Th.

**\*\*\*\* Lineares: foliis linearibus.**

35. *torta*, fol. linearibus obliquis callosis. Thunb. profl. 26. Fol. medio latioa, torta, cartilagine apice subfusca. Wendl. Hort. Herrenh. p. 11. t. 1. 7.

36. *alba*, fol. linearibus sericeo-tomentosis. Thunb. Tota argenteo-tomentosa.

**\*\*\*\* Lanceolatae: foliis ellipticis et lanceolatis.**

37. *aulacea*, fol. lineari-spathulatis glabris, flor. racemosis ecalyculatis. Willd. Sp. 1. p. 520. Thunb. Diss. t. 2. f. 2. Hab. in montibus Platte Kog of Cap. b. spei. Caul. 3-vel 4-pedalis. Antherae medio petali inscriptae spirales albae. Th.

38. *umbellata*, fol. lineari-spathulatis glabris, capitulis terminalibus, bracteis multifidis. Willd. l. c. Andrew. t. 248. Hab. in summitate montis tabularis. Nomen minus aptum. Caul. bipedalis.

39. *linearis*, fol. spathulatis glabris, capitulo terminali tomentoso. Willd. Th. Diss. t. 4. f. 2. In arenosis ad. Parl et Drakenstein. Caul. quadrupedalis ramosus. Cor. tubus compressus.

40. *cinerea*, fol. lineari-cuneiformibus sericeis, capitulo terminali sericeo. Ait. Kew. t. p. 127. Willd. Sp. p. 521. Caul. bipedalis ramis verticillatis.

41. *Scolymus*, fol. lanceolatis acutis, capitulo terminali rotundo glabro. Th. Boerh. t. 192. In ericetis montis Tigridis, C. b. sp. Cor. purpurea. Th. Cor. flavo-virens, dipetala quasi, e quibus unum discedit. Sert. hannov. t. 20.

42. *abyssinica*, fol. lanceolatis basi attenuatis obtusis, capitulo terminali hemisphaerico. Willd. p. 522. Bruce ii. 5. app. p. 52. cum icon. Hab. prope Lamalmon in Abyssinia. Caulis 9-pedalis.

43. *mellifera*, fol. lanceolato-ellipticis, capituloque terminali oblongo glabris. Th. Wendl. Hort. Herrenbus. t. 13. P. *repens*, flor. solitariis: radio calycino lanceolato stricto resinoso, fol. lanceolatis. L. Mant. 199. Boerh. t. 187. Caul. arboreus orgyalis, ramosus. Capit. magnum ovato-oblongum viscosum.

44. *repens*, fol. lanceolato-ellipticis capituloque ovato glabris, caule decumbente brevissimo. Thunb. Boerh. t. 190. Caul. vix palmaris. Th.

45. *plumosa*, fol. lanceolato-cuneiformibus incanis, capitulo terminali oblongo, petalis inferne glabris, superae pilosis: pilis longissimis, Aiton Kew. t. p. 127.

46. *obliqua*, fol. ellipticis glabris callosis obliquis, capitulo caulino terminali. Th. Caul. bipedalis. Fol. glandula terminali obliqua.  $\beta$ . *arcuata*, fol. spatulatis arcuatis laxis laevibus, ramis glabris proliferis, capitulis solitariis. Lam. ill. 234.

47. *parviflora*, fol. ellipticis obtusis callosis obliquis, capitulis terminalibus ramulorum glabris. Thunb. Diss. t. 4. f. 1. Caul. ramosissimus ramis virgatis filiformibus. Th.

48. *pallens*, fol. lanceolatis basi attenuatis glabris acutis callosis, capitulo terminali involucreto, involucreto longo pallido. Hort. Herrenbus. t. 19. Thunb. prod. 27. P. *pallens*, flor. ovatis involucreto epaleatis laevibus, fol. linearibus. L. Mant. 193. Boerh. t. 203. Ad Cap. b. sp. in collibus arenosis, Caul. pedalis ramis divaricatis simplicibus.

*Obs.* Est mas Proteae conferrae auctoritate Massonii. Willd. p. 525.

49. *conifera*, fol. lanceolatis basi attenuatis glabris acutis callosis, capitulo terminali involucreto, involucreto longo acuto concolore. Thunb. Hort. Herrenbus. t. 20.

50. *Levisanus*, fol. obovatis obtuse acuminatis imbricatis glabris, caule piloso, capitulo involucreto obtuso longiore. Willd. Sp. p. 526. Thunb. prod. 27. *Levisanus* capensis serpyllifolio. Petiv. gazoph. p. 15. f. 7. Wendl. Hort. Herrenb. t. 1. Hab. in campis arenosis. Caul. pedalis, capit. flavum.

51. *strobilina*, fol. elliptico-oblongis retuso-callosis capituloque terminali glabris. Thunb. Sert. hannov. t. p. 7. tab. 1.

52. *imbricata*, fol. lanceolatis glabris striatis imbricatis, capitulo terminali. Th. Diss. t. 5. f. 2. Wendl. Hort. Herrenb. t. 14. Capitula in ramis terminalia. Cor. extus lana flavescens tota tecta. Th.

53. *sericea*, fol. lanceolatis sericeis, ramis filiformibus, caule decumbente. Th. Cor. luteo-tomentosa. Th.

54. *saligna*, fol. lanceolatis sericeis, caule fruticoso, capitulis oblongis involucreto. Thunb. Pluck. Mant. t. 225. f. 4.

55. *argentea*, fol. lanceolatis argenteo-tomentosis ciliatis, caule arboreo, capitulis globosis. Thunb. Folia nitidissima argentea.

\*\*\*\*\* *Oblongae: foliis oblongis, ovatis.*

56. *acaulis*, fol. oblongis capituloque globoso glabris, caule decumbente brevissimo. Thunb. Boerh. t. 191.

57. *myrtifolia*, fol. oblongis glabris, capitulis terminalibus aggregatis. Caul. tripedalis. Fol. apice glandulosa, basi obliqua.

58. *grandiflora*, fol. oblongis venosis capituloque hemisphaerico glabris, caule arboreo. Thunb.

59. *glabra*, fol. oblongis aveniis capituloque hemisphaerico glabris, caule fruticoso. Thunb.

60. *formosa*, fol. lanceolatis pubescentibus, caule villosa, capitulo hemisphaerico, (aurantio.) Andrew. t. 17.

61. *speciosa*, fol. oblongis glabris, capitulo oblongo, squamis calycinis apice barbatis. Thunb. Andrew. t. 103.  $\beta$ . *nigra* calyc. interiorib. apice incurvatis barbatis nigris. Capit. obovatum. Squam. calyciniae: rubrae, sub apice villo longo nigro barbatae.  $\gamma$ . *rubra*. Andr. t. 270.  $\delta$ . *latifolia*, fol. ovatis rubro-marginatis, squamis calycinis apice incurvis incarnatis. Andrew. t. 110. Capit. rotundum. An diversa species?

62. *longifolia*, fol. sublinearibus basi angustis obliquis, squamis calycinis interioribus lanceolatis erectis, capitulo longo cylindrico. Andrew. t. 132.

β. *ferruginoso-purpurea*, capitulo subgloboso. Andrew. t. 133.

γ. *turbinata*, capit. turbinato. Andrew. t. 144. Flor. plumis atropurpureis. A.

63. *Totta*, fol. ovatis glabris callosis capitulo ovato, corol. cylindricis hirtis. Th.

\* *venosa*, fol. ovatis nudis venosis imbricatis, ramis villosis, capitulis pluribus subterminalibus. Lam. ill. p. 234.

64. *longiflora*, fol. ovato-ellipticis nudis imbricatis subsessilibus, ramis villosis, capitulo oblongo. Lam. l. c. Boerh. t. 199?

65. *chamaelea*, fol. lanceolatis obtusiusculis basi attenuatis nudis, capitul. terminalibus glabris involucreatis. Lam. p. 237. Brey. cent. t. 9?

66. *hirta*, fol. ovatis glabris, florib. lateral. Th. Boerh. t. 194. Hab. in campis infra Taffelberg. Caul. villosus tripedalis.

67. *pubera*, fol. ovatis capitulisque terminalibus tomentosis. Thunb. Habit. in summis montibus Houttontots Holland. Fol. elliptica, breviuscula. Caulis bipedalis. Var. fol. ovatis et oblongis. Thunb.

68. *divaricata*, fol. ovatis hirtis, capitulis terminalibus, ramis divaricatis. Th. P. dichotoma. Lam. Caul. pedalis, flexuosus. Capit. fol. obvallatum.

\*\*\*\*\* *Rotundatae* : fol. subrotundis.

69. *spatulata*, fol. spatulatis subcucullatis glabris. Thunb. Diss. t. 5. f. 3.

\* *concava*, fol. ovalib. concavis imbricatis subsessilibus, ramis villosiusculis, capitulis aggregatis. Lam. ill. gen. p. 234.

70. *Cynaroides*, fol. subrotundis petiolatis glabris. Thunb. Boerh. t. 184. Hab. ad Cap. b. spec. in summitatibus montium. Caul. rugosus simplex vix pedalis. Capitulum magnitudine fere capitis infantis.

71. *cordata*, fol. cordatis. Thunb. Hab. in montibus Houttontots Holland. Caulis decumbens, striatus, spithameus. Fol. subrotunda, inferiora palmaria. Th.

214. LAMBERTIA. Perianthium commune imbricatum, squamis interioribus longioribus, 1-florum. Cor. 4-fida, laciniis revolutis

staminiferis. Caps. tricornis, 1-locularis, disperma.

1. *formosa*. Frutex ramis virgatis, foliis. Cav. ic. 6. p. 32. t. 547. Smith. act. Soc. Lin. 4. t. 20. Andrew. t. 69. Protea nectarina. Sert. Hannov. p. 5. t. 21. Hab. in N. Hollandia. Cor. coccinea.

215. CONOSPERMUM. Cal. o. Cor. 1-petala ringens, staminifera : labium superius fornicatum ; inferius trifidum. Stigm. obtusum. Sem. 1, nudum, pappo coronatum. Smith. in act. soc. Linn. v. 4.

1. *Smithii*. Hab. in Australasia. Frutex. Plures species hujus generis existere videntur, quarum descriptio a cl. autore expectanda est.

216. BANKSIA. Infloresc. strobiliformis, solitaria. Cor. 4-petala. Stamina limbo inserta, Caps. 2-valv. 2-sperma, interjecto seminibus dissepimento semibifido. Sem. alata.

1. *serrata*, foliis linearibus in petiolum attenuatis aequaliter serratis, apice truncatis cum mucrone. Lin. suppl. 126. Cav. ic. 6. t. 540. Andrew. t. 82. Willd. Sp. t. 535. Banksia conchifera. Gaert. sem. 1. p. 221. t. 48. f. 1. Hab. in Nova Hollandia, ubi omnes formosae hujus generis species crescunt, quae h sunt.

2. *dentata*, fol. oblongis in petiolum attenuatis curvis flexuosis, dentatis : dentibus spinula terminatis, subtus albis. Lin. suppl. p. 127. Wendl. Hort. Herrenhus. t. 8.

3. *integrifolia*, fol. cuneiformibus integerrimis, subtus tomentoso-albis. Cav. ic. 6. t. 546. Banksia spicata. Gaert. sem. 1. p. 221. t. 48. f. 2.

4. *praemorsa*, fol. cuneatis praemorsis serratis, subtus albo-punctatis, flor. cytherne purpureis. Andrew. t. 258. Spica ovata maxima.

5. *microstachia*, fol. lanceolato-linearibus serrato-spinosis subtus tomentosis albis, (flor. tomentosis luteo-crocis). Cavan. ic. 6. p. 28. t. 541. An ab antecedente satis diversa?

6. *oblongifolia*, fol. oblongis serratis, subtus tomentosis, caule arboreo. Cav. l. c. t. 542. Ram. villosi. Spica elliptica. Cor. luteo-aurea. Fol. ovato-lanceolata. C.

7. *Robur*, fol. ovato-oblongis serrato-spinosis sparsis, subtus ferrugineo-tomentosis. Cav. l. c. p. 29. t. 533. Cresc. in Botany-Bay. Fol. sinuato-serrata, Querc. similis.

8. *salicifolia*, fol. sparsis oblongis integerrimis, apice breviter mucronatis. Cav. l. c. p. 31. Frutex orygalis, ramis tomentosis. Fol. subtus primo ferruginea, dein alba. Cav.

9. *marginata*, fol. linearibus truncatis margine revolutis, caps. compressis. Cav. l. c. p. 29. t. 534. Frut. 4-5-pedalis. Fol. subtus albo-tomentosa. C.

10. *oleaeifolia*, fol. verticillatis sublanco-latis integerrimis subtus tomentosis albis. Cav. 6. p. 30. t. 545.

11. *spinulosa*, fol. linearibus revolutis mucronulatis, apicem versus denticulato-spinosis. Smith. Nov. Holl. 1. p. 13. t. 4. Cav. ic. 6. p. 25. t. 537.

12. *ericaefolia*, fol. approximatis aceros truncato-emarginatis glabris. Lin. suppl. p. 227. Cav. l. c. t. 538. Fol. hujus minima.

217. *HAKEA*. Flor. distincti. *Cal.* communis imbricatus polyphyllus: squamis deciduis (Gemma?). *Cor.* 4-petala: petalis linearibus apice concavis ibique staminiferis. Germen pedicellatum, basi glandulosum. *Caps.* lignosa, 2-valvis, 2-sperma. *Sem.* 2, alata.

1. *pugioniformis*, caule fruticoso, fol. alternis teretibus mucronatis, capsulis pugioniformibus. Cav. ic. 6. p. 24. t. 533. *Hakea* glabra. Sert. Haenkov. p. 27. t. 17. Hab. in sinu Botánico, in Nov. Hollandia cum reliquis speciebus.

2. *gibbosa*, caule fruticoso, fol. sparsis numerosis teretibus, caps. ovatis gibbosis rugosis. Cav. t. 534. *Banksia* gibbosa. White. it. p. 224. ic.

3. *dactyloides*, fol. alternis ovato-lanceolatis rigidis trinerviis, caps. globoso-ovatis scabris. Cav. l. c. p. 25. t. 535. *Banksia* dactyloides. Gaertn. t. 47.

4. *pyriformis*, caul. arborco, fol. lanceolatis oppositis, flor. spicatis oppositis capsulis pyriformibus. Cav. p. 25-26. t. 536. *Banksia* Gaertn. l. c. f. 1. White. p. 224. Caps. pubescentes.

*Obs.* Genus vix a *Banksia* diversum, flor. forma et fol. integerrimis ab ea distinctum, etique nomen *Conchium* quoque im-

positum est a cel. Smith. in Act. Soc. Lin. v. 4.

218. *BRABEJUM*. Polygamum. *Amentum* squamis ovatis obtusis. *Cor.* 4-partita: laciniis revolutis, basi staminiferis. *Drupa* sicca subrotunda, villosa, 1-sperma.

1. *stellatifolium*. Lin. Syst. pl. ed. Reich. 4. p. 327. Lam. enc. t. 847. Pluck. alm. t. 285. f. 3. Hab. ad Cap. b. sp. Fol. lanceolata, subsinuata, Myricaeformia. h

219. *RUPALIA*. *Cal.* o. *Petala* 4 basi coherentia, *Stamina* medio petalorum inserta. *Pericarp.* 1-locul. monospermum?

1. *montana*, fol. ovatis petiolatis. Willd. Sp. 1. p. 536. Hab. in insula Cajenna. h

2. *sessilifolia*, fol. cuneato-oblongis sessilibus. Willd. Richard, in Act. Soc. Hist. Nat. Paris. 1. p. 106. Habit. cum priore. h

*Obs.* An forsans *Embothrii* species? cum flores conveniant et fructus ignotus sit.

220. *EMBOTHRIUM*. *Cal.* o. *Cor.* tetrapetala. *Stamina* limbo petalorum inserta. *Folliculus* polyspermus. *Sem.* alata, imbricata.

1. *speciosissimum*, fol. obovatis obtusis dentatis, corymbo capitato involucreto. Willd. Sp. 1. p. 538. Emb. fol. obovatis obtusis inaequaliter serratis, spica subcapitata, involucre polyphylo. Smith. Nov. Holl. 1. p. 19. t. 7. Hab. in Nova Hollandia. h

2. *coccineum*, fol. ellipticis integerrimis, racemo terminali coarctato. Willd. l. c. E. *emarginatum*. Flor. Peruv. 1. p. 62. t. 95. Ad fretum Magellanicum et in Terra del Fuego. h

3. *grandiflorum*, fol. ovatis integerrimis, racemis elongatis, corollis fissis quadrilobis. Willd. l. c. p. 538. Lam. encyclop. 2. p. 351. Hab. in Peru. +

4. *umbellatum*, fol. oblongis integerrimis aveniis, umbellis axillaribus pedunculatis. Willd. p. 538. Lin. suppl. 228. p. 7 *salignum*. Andrew. t. 215. Hab. in Nova Caledonia. h

5. *lanceolatum*, fol. lanceolato-linearibus integerrimis. Flor. Per. 1. p. 62. t. 196. Hab. in collibus et montibus excelsis in R. Chilensi.

6. *obliquum*, fol. ovatis serratis glabris, petalis apice obliquis. Fl. Per. p. 63. t. 97. Hab. cum priore. Frutex a-orygalis. Pedicelli villosi.

β? *hirsutum*, fol. cordato-ovalibus subdentatis, racemulis brevibus, pedunculis ramisque villosis. Lam. ill. p. 245. Habit. in Peru.

7. *monospermum*, fol. ovatis serratis lanuginosis, folliculis monospermis. Fl. Per. l. c. t. 98. Arbor triorgyalis, quae in Peruviae montib. crescit.

8. *pinnatum*, fol. simplicibus pinnatisque. Fl. Per. l. c. t. 99. f. a. Hab. in Munna, ruderatis et versuris. Arb. 4-orygalis, vere florens.

9. *sericeum*, fol. ternis lanceolatis integerrimis, margine revolutis subtus sericeis, racemo terminali coarctato, folliculo tuberculato glabro. Willd. p. 539. Smith. Nov. Hol. t. p. 25. t. 9. E. cytoides. Cav. ic. 4. p. 50. t. 386. f. 2. Hab. in Nova Hollandia. h. Var. foliis : β. E. *linearifolium*. Cav. t. 386. f. 1.

10. *flaifolium*, fol. tripinnatifidis : laciniis decurrentibus acutis, flor. spicatis geminatis pedicellatis. Smith. l. c. p. 23. t. 8. E. herbaceum. Cavan. ic. 4. p. 58. t. 384.

221. GUEVINA. Cal. o. Cor. 4-petala : petalis apice concavis, tribus revolutis. Stam. cavitatibus petalorum insidentia. Drupa monosperma.

1. *Avellana*. Molin. Chil. p. 198. Quadria *heterophylla*, fol. pinnatis bipinnatisque, racemis longis simplicibus. Flor. Peruv. t. p. 61. t. 99. f. 6. Hab. in sylvaticis Regn. Chilensis. Arbor 6-orygalis, utilissima. — Nuclei sapore grati.

222. PERSOONIA. Cal. o. Cor. primo conica, quadrifida, laciniis revolutis, basin versus staminiiferis. Glandulae 4 ad basin germinis. Drupa monosperma.

1. *laurina*, foliis ovatis coriaceis, flor. subracemosis tomentosis.

2. *salicina*, fol. oblongis lato-lanceolatis, flor. racemosis.

3. *lanceolata*, fol. lanceolatis, flor. parvis. Andrew. t. 74. Linkia laevis. Cav. c. 4. p. 61. t. 389?

4. *linearis*, fol. linearibus subvillosis? Andrew. t. 77. Flor. flavi uti in antecedente.

5. *hirsuta*, villosa-hirsuta, fol. linearibus margine revolutis.

Obs. Cel. Smith, vir tam animi candore, quam cognitione in Histor. naturali venerabilis, in Act. Soc. Linnaeanae, v. 4, hoc genus constituit ejusque species mecum benevole communicavit, quae omnes frutices sistent, foliis alternis et fructibus edulibus distinctos quintamque orbis partem, nempe Australiam s. Novam Hollandiam, incolunt.

223. GLOBULARIA. Cal. communis imbricatus; proprius tubulatus, inferus. Cor labio superiore 2-partito : inferiore tripartito. Receptac. paleaceum. (Flor. aggregati.)

1. *longifolia*, caul. fruticoso, foliis omnibus linearilanceolatis integerrimis capitulis axillaribus. Ait. Kew. t. p. 130. Willd. sp. 1, p. 539. Sloan. jam. 124. hist. 1. p. 19. t. 5. f. 3. Hab. in Madera. h.

2. *Alypum*, caul. fruticoso, fol. lanceolatis tridentatis integrisque, capitulis terminalibus. Ait. Kew. t. p. 131. Lam. encycl. 2. p. 724. Alypum mouspeliensium, s. Frutex terribilis. Baub. hist. 1. p. 598. Hab. in Europae meridionalis sylvis ad rupes et saxosa. h.

3. *bisnagarica*, caul. fruticoso, fol. radicalibus cuneiformibus retusis; caulinis lanceolatis. L. Sp. pl. 139. Hab. in Bisnagariae sylvis. h.

4. *linifolia*, caul. herbaceo, folioso, fol. radicalibus spathulatis rigidis apice tridentatis, caulinis angustis linearilanceolatis acuminatis. Lam. encycl. 2. p. 722. G. caespitosa. Ortega. Hab. in Hispania. h.

5. *vulgaris*, caul. herbaceo fol. radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. Hab. in apricis, montosis, subalpinis.

6. *spinosa*, fol. radicalibus crenato-aculeatis, caulinis integerrimis mucronatis. Lam. encyc. 2. p. 722. In Granadae montibus. h.

7. *cordifolia*, caule subnudo fol. cuneiformibus tridentatis : dente intermedio minimo. L. Mill. Lam. ill. gen. t. 56. f. 2. Moris. a. 6. t. 15. f. ult. Hab. in Pannonia, Austria, Helvetia, Pyrenaeis. h.

8. *nana*, scapis nudis brevissimis : fol. ovato-spathulatis integerrimis. Lam. encyc. 2. p. 723. In Gall. australi, Pyrenaeis.

9. *nudicaulis*, caule nudo, fol. integerrimis lanceolatis. Moris. a. 6. t. 15. f. 4.

Hab. in Pyrenaeis et Austriae, Helvetiae montibus.  $\mathcal{T}$

10. *orientalis*, caule subnudo, capitulis alternis sessilibus, fol. lanceolato-ovatis integris. Hab. in Nativia.  $\mathcal{T}$

224. **CEPHALANTHUS.** *Cal.* communis o: proprius superus, infundibuliformis. *Recept.* globosum. pilosum. *Caps.* 2-4-partibilibus. *Sem.* solitaria, oblonga.

1. *occidentalis*, fol. oppositis ternisque. *Lin.* *Lam.* ill. p. 257. t. 86. *Pluck.* *alm.* 336. t. 77. f. 4. Hab. in Amer. septentrionali.  $\mathcal{h}$

225. **DIPSACUS.** *Cal.* communis polyphyllus; proprius superus. *Recept.* paleaceum. (Flor. compositi.)

1. *fullonum*, fol. sessilibus serratis, paleis uncinatis. *Willd.* sp. 1. p. 543. *Carduus fullonum.* *Lobel.* ic. 2. t. 17. Hab. in Europa australi.  $\mathcal{O}$

2. *sylvestris*, fol. sessilibus serratis, paleis rectis, involucri capitulo longioribus. *Jacq.* *aut.* 5. t. 402. Hab. ad vias in humidusculis.  $\mathcal{O}$

3. *lacinatus*, fol. connatis sinuatis. Hab. in Alsacia (Colmar), Germania, Carniolia, Gallia, (prope Dijon).  $\mathcal{O}$

4. *pilosus*, subparvus, fol. petiolatis appendiculatis. *L.* *Jacq.* *Flor.* *austr.* t. 248. Hab. in sylvis, praesertim calcareis. Capit. globosa.  $\mathcal{O}$

226. **SCABIOSA.** *Cal.* communis polyphyllus: proprius duplex superus. *Recept.* paleaceum aut nudum. (Flor. compositi.)

\* *Corollulis quadrifidis.*

1. *alpina*, corollulis quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis, floribus cernuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis. *Willd.* sp. pl. *Lin.* p. 545. *Dipsacus foliis pinnatis, pinnis serratis, capitulis globosis.* *Hall.* *helv.* n.º. 200. Hab. in alpinis.  $\mathcal{T}$

2. *ustulata*, cor. quadrifidis aequalibus, calycis squamis acutis, fol. lyratis dentatis. *Thunb.* *prod.* 29. Hab. ad Cap. b. Spei.

3. *rigida*, coroll. quadrifidis subradian- tibus, calycibus imbricatis obtusis, fol. lanceolatis serratis auriculatis. *Lin.* *Thunb.*

*prod.* p. 28. *Comm.* *hort.* 1. p. 185. t. 93. Hab. in Aethiopia, et ad Cap. b. sp.  $\mathcal{h}$  Caul. suffruticosus, scaber.]

4. *attenuata*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycib. imbricatis: squamis oblongis obtusis, fol. linearibus glabris integris basi- que pinnatifidis. *Aiton.* *Kew.* 1. p. 134. *S. trifida.* *Thunb.* *prod.* 28. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{h}$

5. *scabra*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycis squamis obtusis, fol. bipinnatifidis scabris rigidis. *Thunb.* *prod.* 29. *Lin.* *supp.* 118. Ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$  Caul. teretes simplices scabri.

6. *transylvanica*, corol. quadrifidis aequalibus, calycibus paleisque aristatis, fol. radicalibus lyratis. *Jacq.* *hort.* t. 111. *Moris.* s. 6. t. 13. f. 13. Hab. in Transylvania.  $\odot$

7. *syriaca*, coroll. quadrifidis aequalibus, calycibus imbricatis paleisque aristatis, caule dichotomo, fol. lanceolatis. Hab. in Syria.

8. *leucantha*, coroll. quadrifidis subaequalibus, squamis calycinis ovatis imbricatis, fol. pinnatifidis.  $\mathcal{P}$ ? *Scabiosa trenta.* *Hacquet.* pl. alp. p. 13. t. 4. t. 1. *S. Hacquetii.* *Lam.* ill. p. 250. Hab. in collibus Narbonne, et in Delphinatu.  $\mathcal{P}$  in Carniolia. Flores subglobosi, albi.  $\mathcal{T}$

9. *corniculata*, cor. 4-fidis aequalibus calyc. squamis obtusis, seminum angulis in cornicula exsertibus. *Walst.* et *Kitab.* pl. rar. *Hung.* p. 11. t. 13. In apricis Banatus et Transylv.

10. *centauroides*, coroll. quadrifidis subaequalibus, fol. radicalibus integerrimis, caulinis decussive pinnatis, cal. imbricato. *Lam.* ill. p. 250. Hab. in Galloprovinciae alpinis. Flor. ochroleuci.

11. *parviflora*, coroll. quadrifidis subaequalibus, caul. dichotomo, fol. inferiorib. obovatis crenatis, capitul. ovatis. *Desf.* *Alt.* 1. p. 119. *Vaill.* *Acad.* 1722. p. 181. Hab. in Algeria. Cor. parva subvillosa. Cal. interior brevissimus.  $\mathcal{D}$

12. *succisa*, coroll. quadrifidis aequalibus, caul. simplicis, ramis approximatis, fol. lanceolato-ovatis: caulinis subdentatis, flor. subglobosis. *Curt.* *Lond.* t. 10. Hab. in Europae pascuis, humidusculis. Flor. autumnno. Rad. praemorsa.

13. *integrifolia*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. indivisis: radicalibus ovatis serratis integris, ramcis lanceolatis: caul. herbaceo. *L.* *Roß.* *germ.* 1. 58. II. 164. Hab. Monspelii et in Helvetia.  $\odot$  Corolla ru-

bra. Folia radicalia Bellidis. Calyx 10-phyllus; flore brevior.

14. *amplexicaulis*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. amplexicaulibus lanceolatis integerrimis: radicalibus trifidis crenatis. Lin. Hab. . .

15. *humilis*, coroll. quadrifidis inaequalibus, calycis squamis obtusis, fol. linearibus dentato-pinnatifidis. Thunb. prod. 28. Hab. ad Cap. b. spei cum sequente.

16. *decurrens*, coroll. quadrifidis inaequalibus, calycis squamis ovatis, fol. pinnatifidis: pinnis decurrentibus. Thunb.

17. *tartarica*, coroll. quadrifidis radiantibus, caule hispido, fol. lanceolatis pinnatifidis: lobis subimbricatis. Gmel. it. 1. p. 159. Act. ups. 1744. p. 11. t. 1. Hab. in Tartaria. Planta 12-pedalis. Flor. lutei. ☉

18. *arvensis*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. pinnatifidis incisus caule hispido. Curt. Flor. Lond. t. 13. Hab. in arvis, pratis.

\* *dubia*, coroll. quinquefidis radiantibus aequalibus, involucri tetraphyllo. Moench. bass. n<sup>o</sup>. 116. t. 3. Hab. in monte Meisner in Hassia.

19. *uralensis*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. radicalibus simplicibus, caulinis decussate pinnatis, paleis arilis apice reflexis. Murr. goett. 2782. p. 13. t. 4. Hab. in Sibiria. ☉

20. *sylvatica*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. omnibus indivisis ovato-oblongis serratis, caule hispido. Jacq. austr. 4. t. 362. Hab. in Austriae, Helvetiae, Germaniae, Galliae sylvaticis et pratis montosis.

21. *longifolia*, coroll. 4-fidis radiantibus, fol. oblongis lanceolatis integerrimis, caule inferne glabro. Pl. rar. Hung. p. 4. t. 5. Cresc. in alpib. Marmaronensibus. Rad. multiceps. Sem. hirsuta. Priori affinis.

22. *canescens*, tomentosa - canescens, coroll. quadrifidis radiantib. caul. multifloro, fol. radicalib. ovato-lanceolatis, caul. pinnatifidis pinnatisque. Plant. rar. Hung. p. 53. t. 53. Hab. in Hungaria, Bohemia, et Germania, in montosis, collibus. Confunditur cum *S. columbaria*; differt vero tomento, cal. fol. obtusis, radio 2-3 brevior. Nonnunquam occurrit caul. 1-floro et tunc cum pyrenaica non male congruit. Loc. cit.

23. *pyrenaica*, coroll. quadrifidis radiantibus, fol. tomentosis integris, dentatis et pinnatifidis, caul. 1-floro. Willd. sp. 1. p. 552. Allion. pedem. t. 25. f. 2. Boc. mus. p. 22. t. 6. Hab. in Pyrenaeis, Sabaudia et Helvetia. +

### \* \* *Corollulis quinquefidis*

24. *gramuntia*, coroll. quinquefidis, calycib. brevissimis, fol. caulinis bipinnatis filiformibus. Sauv. monsp. p. 263. Desf. Atl. 1. p. 120. Hab. MonsPELLI et in Barbaria ☉

25. *columbaria*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. radicalibus ovatis lyratisque crenatis, caulinis pinnatis linearibus. Flor. dan. t. 314. Habit. in Europae agris siccioribus.

26. *daucoides*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. bipinnatis, cal. communi villosa pinnatifido. Desf. Atl. 1. p. 121. t. 38. Hab. in collib. Algeriae.

27. *graniflora*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. radicalib. oblongis crenatis: caul. pinnatifidis: pinnis lanceolatis linearibus patulis. Scop. Delic. Insub. 3. p. 29. t. 14. Desf. l. c. Hab. in Barbariae arvis. Affin. *columbariae*: differt fol. pinna terminali lanceolata.

28. *tomentosa*, coroll. quinquefidis inaequalibus, fol. tomentosis: radicalibus pinnatifidis caespitosis, caulinis pinnato-linearibus. Cav. ic. 2. p. 66. t. 183. Hab. in Regni Valentini montib. Cor. dilute violacea. Fol. albedo-cinerea. ☉

29. *lucida*, cor. quinquefidis, fol. radicalibus lanceolatis acute serratis glabris, caulinis bipinnato-setaceis. Villars Dauph. 2. p. 293. In Delphinatus sylvaticis, pratis alpestribus. Fol. radicalia lucida, saepius incisa.

30. *sicula*, coroll. quinquefidis aequalibus calyce brevioribus, fol. lyrato-pinnatifidis. L. Jacq. hort. 1. p. 3. t. 15. Hab. in Sicilia. Caulis ruber, debilis. Pappus corona campanulata, plicata, multidentata, centro octocalloso. L. ☉

31. *rutaeifolia*, coroll. quinquefidis, fol. pinnatis summis linearibus, calycibus monophyllis quinquefidis. Vahl. symbol. 2. p. 26. Bocc. sic. p. 95. t. 52. Hab. Tuneti circa Cap. Zebibo et in maritimis Siciliae. Corollae subaequales, calyce vix longiores, paucac villosae.

32. *maritima*, coroll. quinquefidis radiantibus calyce brevioribus, fol. pinnatis: summis linearibus integerrimis. Habit. in Sicilia, MonsPELLI. ☉

33. *stellata*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. dissectis, receptaculis florum subrotundis. Clus. hist. 2. p. 1. icon. Lob. ic. 519. Hab. in Hispania, praesertim in agro Granatensi, et in Barbaria. ☉ Papp-



pus stellae limbo rotato, membranaceo, radiato setis 40.

32. *simplex*, caul. superne nudo, fol. bipinnatifidis villosis: foliol. linearibus acutis, cal. seminis maximo campanulato. Desf. Atl. 1. p. 136. t. 39. f. 1.

34. *prolifera*, coroll. quinquefidis radiantibus, flor. subsessilibus, caule proli-fero, fol. indivisis. Herm. parad. 125. t. 125. Hab. in Aegypto et Arabia. ☉

35. *atropurpurea*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. dissectis, receptaculis florum subulatis. Hab. in India? Var. quoad Corollae colorem. ☉

36. *argentea*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. pinnatifidis: laciniis linearibus, pedunculis longissimis, caule tereti. Desf. Atl. 1. p. 121. β. Hab. in Oriente, et Algeria. ☿

37. *urceolata*, coroll. 5-fidis radiantibus, cal. multifido urceolato, fol. subcar-nosis pinnatifidis. Desf. Atl. 1. p. 102. Bocc. sicul. t. 40. f. 3 et t. 52. Moris. s. 6. t. 13. f. 24. Hab. ad maris litora.

38. *indurata*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. ovato-lanceolatis erosio basi denta-tis, caule rigente. Mani. Sc. altissima. Jacq. hort. 2. t. 185. Hab. in Africa. ♀. Panicula dichotoma: prima dichotomia pedunculifera, reliquis apice proliferis. S. africanæ varietas? L.

39. *africana*, coroll. quinquefidis æqualibus, fol. simplicibus incisis, caule fruticoso. Herm. parad. 219. t. 219. Hab. in Africa, Oriente. Plures dantur varietates vid. Willd. p. 556.

40. *monspeliensis*, coroll. quinquefidis æqualibus, calyce brevioribus, fol. omni-bus pinnatis ciliatis. Jac. ic. rar. 1. tab. 24. Misc. 2. p. 320. Hab. Monspeli. ☉

41. *pumila*, coroll. quinquefidis radiantibus, subcaulis, fol. pilosissimis: radi-calibus lyratis, caulinis pinnatis incisis. Scabiosa *acaulis*. Thunb. prod. 29? Hab. ad Cap. b. spei.

42. *cretica*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. congestis lanceolatis subintegerrimis, caule fruticoso. L. Hab. in Creta. ♀

43. *saxatilis*, coroll. subquinquefidis subæqualibus, fol. lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, caulinis connatis, caul. herbaceo. Cav. ic. 2. p. 68. t. 184. Hab. in saxor. fissuris regni Valentini. Cor. alba. ☉

44. *limonifolia*, coroll. quinquefidis æqualibus, fol. cuneiformibus integerrimis, subtus rugosis incanis. Vahl. symb. 2.

p. 27. Hab. in Sicilia. Fol. inferne fere Staices Limonii. ♀

45. *graminifolia*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. lineari-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo. Amoen. acad. 4. p. 267. Bauh. profr. 127. t. 127. Moris. s. 6. t. 15. f. 36. Hab. in alpinis Europæis et in Barbariae collibus.

46. *lyrata*, coroll. radiantibus, laciniis integris, fol. inferioribus oblongis serratis, superioribus basi pinnatifidis. Vahl. symb. 2. p. 27. Hab. ad Dardanellos.

47. *palaestina*, coroll. quinquefidis radiantibus: laciniis omnibus trifidis, fol. indivisis subserratis: summis basi pinnatifidis. Mant. 37. Gouan. illustrat. p. 5. Hab. in Palaestina. Flores albi, aut citrini. Fructus Sc. stellatae. ☿

48. *isetensis*, coroll. quinquefidis radiantibus, calyce longioribus, fol. bipinnatis linearibus. Mant. 37. Hab. in Sibiriae Ise-tensis rupibus. Semina ut in priore.

49. *ucranica*, coroll. quinquefidis radiantibus, fol. radicalibus pinnatifidis: caulinis linearibus basi subciliatis. Gmel. sib. t. 87. Hab. in Ucraina.

50. *ochroleuca*, coroll. subquinquefidis radiantibus, fol. radicalib. bipinnatis lineari-bus. S. tenuifolia. Roth. germ. 1. p. 59. II. 167. Moris. s. 9. t. 13. f. 23. Barr. ic. 770. f. 2. Hab. in pratis siccis. ☉

51. *banatica*, coroll. 5-fidis radiantibus, fol. radicalib. lyratis: caulinis subbipinnatis, calycib. discum æquantibus. Plant. rar. Hungar. p. 10. t. 12. In saxonis Banatis ad Ciklovam. Affin. S. ochroleucae. Cor. rubellae.

52. *papposa*, coroll. quinquefidis inæqualibus, caule herbaceo erecto, fol. pinna-tifidis, seminibus aristatis plumosoque pap-posis. Syst. veg. Hab. in Creta. Knautiam refert. Caulis filiformis, brachiatus.

53. *pterocephala*, subcaulis, coroll. quinquefidis, caule procumbente fruticoso, fol. laciniatis hirsutis, pappo plumoso. Pterocephalus perenn. humilis laciniatus et inca-nus. Vaill. act. 1722. p. 184. Hab. in Graecia? ♀

227. KNAUTIA. Cal. communis oblongus, simplex, quinqueflorus; proprius simplex, superus. Cor. irregulares. Recept. nudum. (Flor. aggregati.)

1. *orientalis*, foliis incisis, corollulis quinque calyce longioribus. L. Willd. sp. 1. p. 561. Hab. in Oriente. ☉. Semina com-pressa, apice multidentata.

2. *propontica*, fol. superioribus lanceolatis integerrimis, corollulis densis calyci aequalibus. Tilli. pis. 153. t. 48. In Oriente. Sem. corona 15-dentata ciliata. ♂

3. *palaestina*, fol. integris, calycibus hexaphyllis, seminibus papposis. Habit. in Palaestina. Semin. pappus radiis octo villosis. ☉

4. *plumosa*, fol. superioribus pinnatis, calycibus decaphyllis, seminibus papposis. Hab. in Oriente. Pappus radiis 12, pilosis longis. ☉

228. **ALLIONIA**. *Cal.* communis oblongus, simplex, triflorus; proprius obsoletus, superus. *Corollulae* irregulares. *Recept.* nudum. (Flor. aggregati.)

1. *violacea*, foliis cordatis, calycibus quinquefidis trifloris. Sp. pl. Hab. in Cumana.

2. *incarnata*, fol. oblique cordatis altero majore, calycibus triphyllis trifloris. L'Herit. strip. 63. t. 31. Flor. Peruv. 1. p. 49. Wedelia. Loefl. it. 180. Hab. in rupibus et arenosis Peruvianis. ☉

229. **OPERCULARIA**. *Cal.* communis monophyllus, campanulatus inaequaliter dentatus; proprius o. *Corollulae* 4. - 5-fidae, aequales. *Recept.* claudens operculiforme, cui semina inferne affixa.

1. *umbellata*, flor. umbellatis monandris. Willd. sp. p. 563. Gaert. sem. 1. p. 112. t. 24. Hab. in Nova Hollandia.

2. *aspera*, flor. capitatis, calyce sulcato glabro. Willd. p. 561. Gaert. sem. 1. p. 112. t. 24. f. 4. Hab. in Nova Zeelandia cum sequente.

3. *diphylla*, flor. capitatis, cal. hispido. Willd. l. c. Gaert. sem. 1. p. 113.

230. **CRYPTOSPERMUM**. *Cal.* communis hexaphyllus: foliolis patentibus inaequalibus; proprius? e paleis receptaculi, triphyllus. *Corollulae* (sub-20) quadrifidae, primo ovatae. *Receptac.* globosum, paleaceum, subtus seminiferum. (Capsulae 1-loculares in receptac. subglobosum coalitae, medio longitudinaliter dehiscentes. Young.)

1. *Youngii*. Opercularia palmata. Tho-

mas Young. In Act. Soc. Lin. 3. p. 30. c. icone. Hab. in N. Hollandia. Flores aggregati ut in priore genere, a quo calyce polyphylo et receptaculi forma satis differt. ♀

231. **EVEA**. *Cal.* communis polyphyllus: foliolis 4 exterioribus latioribus; proprius quadridentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Pericarp.* . . . (Flor. aggregati.)

1. *guianensis*, capitul. axillaribus brevissime pedunculatis. Lam. ill. p. 258. t. 59. Anbl. Hab. in Guyana. †

232. **HEDYOTIS**. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis. *Caps.* 2-locularis, polysperma, infera. *Recept.* dissepimento undique adnata. *Gertn.*

1. *fruticosa*, fol. lanceolatis petiolatis, corymbis terminalibus involucreti. Lin. Willd. sp. 1. p. 564. Fl. zeyl. 63. In Zeylona.

2. *racemosa*, fol. lanceolatis, racemis axillaribus et terminalibus nudiusculis. Lam. encycl. 3. p. 76. t. 62. f. 2. Rheed. mal. 10. p. 49. t. 25. Hab. in India.

3. *auricularia*, fol. lanceolato-ovatis, flor. verticillatis. Burm. zeyl. 227. t. 108. f. 1. Hab. in Zeylona. ‡

4. *hispida*, fol. lineari-lanceolatis hispidis, flor. verticillatis. Retz. obs. 4. p. 23. Hab. in China.

5. *maritima*, fol. ovalibus obtusis, flor. oppositis sessilibus. In India orientali. Caul. herbacei prostrati.

6. *pumila*, fol. ovatis acutis, flor. alternis pedunculatis. Lin. suppl. Hab. in Tranquebaria. Facies Anagallidis.

7. *setosa*, fol. ovatis acutis cum acumine, flor. terminalibus ternis. Flor. Peruv. 1. p. 56. t. 88. f. 2. Hab. in Andium montib. in Tarma. h

8. *juniperifolia*, fol. linearib. margine revolutis, caul. procumbente ramosissimo, flor. terminalibus ternis. Fl. Per. p. 57. t. 87. Cresc. in Tarmae et Cantae locis frigidis. h

9. *thymifolia*, fol. linearibus, margine revolutis, flor. corymbosis. Fl. Per. 1. p. 56. t. 88. Cum priore. h

10. *filiformis*, fol. linearibus acumina- tis, caul. ramosissimo filiformi repente, flor. solitariis terminalibus. Fl. Per. p. 57. t. 87. b. In Andium alpinis. Herbacea repens, habitu Galii.

11. *conferta*, fol. linearibus acuminatis, caul. ramosissimo repente, flor. terminalibus solitariis. Fl. Per. l. c. fig. a. Habit. in alpb. Cantae et Tarmac. h

12. *diffusa*, fol. lanceolatis acutis, flor. alternis pedunculatis, caule procumbente diffuso. Willd. p. 366. Habit. in India orientali.

13. *herbacea*, fol. lineari-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. Oldenlandia *tenuifolia*. Burm. ind. 37. t. 14. f. 1. Hab. in Zeylona.

14. *graminifolia*, fol. linearibus, caule decumbente, panicula racemosa dichotoma. Vahl. symbol. a. p. 27. Lin. suppl. 119. Alsin. spargulae foliis, capitulis brevibus duris. Pluck. mant. g. t. 338. f. 2. Hab. in India orientali. Caules filiformes debiles Stellariae gramineae.

15. *virgata*, fol. linearibus, caule erecto, panicula nuda dichotoma stricta, pedunculis lateralibus geminatis. Willd. p. 567. Hab. in Guinea.

16. *rupestris*, fol. quadrifariis subulatis canaliculatis, flor. sessilibus axillaribus, coroll. villosis: tubo curvo. Swartz. prod. 29. et Flor. H. americana. Jac. amer. 20. Sloan. hist. 2. t. 202. f. 1. Hab. in rupestribus maritimis Indiae occidentalis. h

233. SPERMATOCYCE. Cal. 4-dentatus. Cor. 1-petala, infundibulif. Sem. 2, bidentata.

\* *Floribus verticillatis.*

1. *tenuior*, glabra, foliis lanceolatis, staminibus inclusis, flor. verticillatis, seminibus hirtis. Willd. sp. 1. p. 568. Dill. elth. 370. f. 277. f. 359. Hab. in Carolina, Jamaica.

2. *coerulescens*, fol. ovatis acutis pilosisculis laevibus, stipulis floribus verticillatis aequantibus, staminibus exsertis. Vahl. eclog. 1. p. 9. Aublet. t. 19. f. 2. Cresc. cum priore.

3. *prostrata*, glabra, fol. subsessilibus ellipticis acutis, flor. verticillatis, caule prostrato. Willd. Aubl. t. 20. f. 3. Hab. ad ripas Gujanac.

4. *radicans*, glabra, fol. subsessilibus lanceolatis, flor. verticillatis, caule procumbente radicante. Willd. Aubl. t. 20. f. 4.

5. *verticillata*, (*hyssopifolia*), glabra, fol. lanceolatis, verticillis globosis capitatisque. Mill. dict. n. 2. Dill. elth. t. 277. f. 358. Hab. in Jamaica, Africa. h. Odor Trifolii Meliloti.

6. *villosa*, villosa, simplex, fol. ovato-lanceolatis pubescentibus, summis quaternis, flor. verticillatis, stam. inclusis. Swartz.

7. *scabra*, fol. subrotundis cauleque hispido-scabris, flor. verticillatis, stam. exsertis. Willd. sp. pl. 572. Hab. in India orientali. Folii parvis orbiculatis distincta. W. T.

8. *articulata*, fol. ellipticis obtusiusculis subscabris. Lin. suppl. p. 119. Hab. in Indiae orientalis apricis argillosis. ☉

9. *assurgens*, fol. lanceolatis lineatis margine scabris, verticillis parvis. Fl. Per. t. p. 60. t. 92. Pluck. Alm. t. 136. f. 4? Cresc. in ruderalis Linac et Huanuci, ubi per totum annum floret. T.

10. *gracilis*, glabra, fol. lanceolatis angustis, ramis inferioribus oppositis, superioribus dichotomis, verticill. minimis. Flor. Per. p. 61. t. 92. f. 2. ☉

11. *stricta*, fol. lineari-lanceolatis lineatis, flor. verticillatis angustis. Linn. suppl. 120. Hab. in India orientali. ☉

12. *linifolia*, fol. lineari-lanceolatis villosis laevibus, summis quaternis, flor. verticillatis, stam. exsertis Vahl. eclog. 1. p. 8. Hab. in Cajenna.

13. *spinosa*, suffruticosa, fol. linearibus spinulis ciliatis, flor. verticillatis paucifloris. Swartz. obs. 45. Hab. in Americae calidioris arvis. Folia Rosmarini.

\*\* *Flor. axillaribus.*

14. *longifolia*, glabra, fol. lanceolatis utrinque acutis, margine scabris, verticillis dimidiatis (flor. axillaribus). Vahl. eclog. 1. p. 8. Aubl. Guj. 1. p. 58. t. 21. In Cajenna, Guiana.

15. *latifolia*, glabra (flavescens), fol. ovatis, caule erecto quadrangulari, stipul. calycib. villosis, flor. axillaribus. Lam. ill. p. 274. Aubl. t. 19. f. 1. In Gujana.

16. *aspera*, fol. ellipticis scaberrimis acutis glabrusculis, flor. axillaribus, conferiis, stam. inclusis. Vahl. eclog. 1. p. 10. Aubl. t. 22. f. 6. In India occidentali.

17. *hirta*, scabra, ramosa, fol. ovato-lanceolatis, flor. confertis axillaribus, stam. exsertis. Swartz. prodr. g. 45. Lin. Syst. veg. p. 124. Hab. in Jamaica in graminosis siccis. ☉

18. *hispida*, hispida, fol. obovatis obliquis, flor. axillaribus. L. Murr. Com. Gott. 3. t. 5. p. 77. Hab. in Zeylona. Cor. violacea turbinato-campanulata. ☉

\*\*\* *Flor. terminalibus capitatis.*

19. *alata*, fol. ovatis, summis sessilib., flor. terminalibus capitatis, caule 4-gono alato repente. Willd. sp. p. 569. Aub. t. 22. f. 7. Hab. in Gujana ad ripas. Flor. caerulei. ¶

20. *hexagona*, fol. ovatis petiolatis, flor. terminalib. (capitatis), caule prostrato 6-gono. Willd. l. c. Aubl. t. 22. f. 8. C. priore.

\*\*\*\* *Flor. corymbosis.*

21. *sumatrensis*, fol. lanceolatis hispida, corymbis terminalibus dichotomis. Retz obs. 4. p. 21. Hab. in Sumatra.

22. *peruviana*, fol. lanceolatis nervosis plicatis, flor. dichotomo-corymbosis terminalibus. *S. corymbosa*. Flor. Per. 1. p. 60. t. 91. a. Hab. in Munaë rudratis in Peruvia. Suffruticosa.

23. *procumbens*, fol. linearibus, caule procumbente, corymb. lateralibus pedunculatis. L. syst. veg. 19. p. 124. In India. *S. corymbosa*. L. Sp. pl. ed. 2. p. 149.

234. *SHERARDIA*. *Cor.* 1-petala, infundibulif. *Sem.* 2, tridentata.

1. *arvensis*, fol. omnibus verticillatis, flor. terminalibus. Flor. dan. t. 439. Hab. in arvis. ☉

2. *muralis*, fol. floralibus binis oppositis binis floribus. Allion. pedem. n°. 34. t. 77. f. 1. Column. cephr. t. 302. Hab. in Italia, et Constantinopoli in vetustis muris. Fruct. reflexi asperi. ☉

3. *fruticosa*, fol. quaternis aequalibus, caule fruticoso. Hab. in insula Adscensionis An hujus generis? ¶

235. *ASPERULA*. *Cor.* 1-petala, infundibuliflor. *Sem.* 2, globosa.

1. *odorata*, foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis, fructu hispido. Smith. brit. 1. p. 172. Curt. Lond. ic. Hab. in umbrosis, sylvis montosis.

2. *hexaphylla*, fol. senis linearibus, flor. umbellatis terminalibus subsessilibus. Allion. ped. n°. 48. t. 77. f. 3. Hab. in rupibus Pedemontanis. ¶

3. *arvensis*, fol. senis, flor. terminalibus sessilibus aggregatis. Hab. in agris praesertim calcareis. Flor. caerulei.

4. *hirta*, fol. senis linearibus acutis hispida, flor. terminalibus aggregatis involucro longioribus. Raymond in Bull. d. sciences n°. 41. p. 131. t. 9. Hab. in Pyre-

nacis, in siccis, rupestribus, praesertim calcareis. Flor. nivei, extus subpurpureascentes.

5. *algerica*, fol. senis linearibus acutis denticulatis, inferioribus hirsutis, flor. aggregatis terminalibus. Desf. Atl. 1. p. 127. (*Asp. hirsuta*). Hab. in collibus Algeriae. Cor. pallide rosea, laciniis oboideis. D.

6. *taurina*, fol. quaternis ovato-lanceolatis, flor. fasciculatis terminalibus. Moris. s. g. t. 21. f. 1. Hab. in alpinis Helvetiae, Italiae.

7. *crassifolia*, subfrutescens, fol. quaternis oblongis lateralibus revolutis obtusiusculis pubescentibus. Hab. in Creta, Oriente. Flores fasciculati, terminales. Cor. extus pubescentes. ¶

8. *aristata*, fol. linearibus subcarnosis, inferioribus quaternis, fl. subternis aristatis. Linn. suppl. Hab. in Europa australi.

9. *tinctoria*, fol. linearibus: inferioribus senis; intermedii quaternis, caule flaccido, flor. plerisque trifidis. Hab. in Sueciae, Germaniae, Galliae, Sibiriae collibus aridis. Rad. rubra. ¶

10. *pyrenaica*, fol. quaternis lanceolato-linearibus, caule erecto, flor. saepius trifidis. Hab. in Pyrenaeis et prope Valentiam.

11. *cynanchica*, fol. quaternis linearibus: superioribus oppositis, caule erecto, floribus quadrifidis. Hab. in pratis aridis ad vias. Cespitosa.

12. *laevigata*, fol. quaternis ellipticis obsolete nervosis laevibus, margine glabris, fructibus scabris. Willd. sp. p. 579. Moris. s. g. t. 21. f. 4. Hab. in Europa australi. Non confundenda cum Galio rotundifolio.

236. *DIODIA*. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis. *Caps.* 1-locularis, 2-sperma.

1. *virginica*, caule ramoso procumbente laevi, fructib. hirsutis. Mich. Flor. 1. p. 81. Jacq. ic. rar. 1. t. 29. Lam. ill. t. 63. Hab. in Virginiae aquis. ¶

2. *simplex*, caul. herbaceo simplici erectiusculo laevi, fol. ovato-lanceolatis. Sw.

3. *glabra*, procumbens, glabra, fol. ovali-lanceolatis, verticillis multifloris. Michaux. Flor. 1. p. 82. Hab. in sabulosis sylvarum Carolinae.

4. *verticillata*, caul. herbaceo simplici erecto laevi, fol. lanceolatis verticillatis. Willd. sp. p. 580. Vahl. symb. 2. p. 28. Hab. in insula St. Crucis.

5. *prostrata*, caul. suffruticoso subdiviso, ramis prostratis filiformibus, fol. linearibus hirsutiusculis revolutis. Swartz. prod. 3o. Hab. in Jamaica, Cumana. h.

6. *scandens*, caul. scandente suffruticoso, fol. ovato-lanceolatis rigidis scabris. Swartz. prod. 3o. Hab. in Hispaniola. h.

7. *sarmentosa*, caul. flaccido fruticoso, ramis oppositis patentibus, fol. oblongis acutis scabrinusculis. Sw. In Jamaica.

237. **HYDROPHYLLAX.** *Cor.* 1-petala infundibuliformis. *Cal.* quadripartitus, Bacca exsucca angulata 2-locul. dissepimento transverso. *Sem.* solitaria.

1. *maritima*. Lam. ill. t. 76. Lin. suppl. 126. Sarissus anceps. Gaert. sem. 1. p. 118. t. 25. f. 4. Hab. in Indiae arenosis. Facies Arenariae rubrae.

238. **KNOXIA.** *Cor.* 1-petala, infundibuliformis. *Sem.* 2, sulcata. *Calycis* unicum folium maius.

1. *zeylanica*, floribus spicatis, fol. glabris. Willd. p. 582. Burm. ind. 34. t. 13. f. 2. Lam. ill. t. 59. f. 1.

2. *corymbosa*, flor. corymbosis, fol. subtus pubescentibus. Willd. Gaert. sem. 1. t. 25. f. 87. Lam. t. 59. f. 2. Hab. in India orientali.

239. **CARPHALEA.** *Cor.* 1-petala infundibuliformis, intus hirta. *Cal.* 4-fidus: laciniis spathulatis scariosis. *Capit.* 2-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *corymbosa*. Willd. sp. 1. p. 593. Carphalea madagascariensis. Lam. ill. t. 59. f. 4. Hab. in Madagascar.

240. **HOUSTONIA.** *Cor.* 1-petala infundibulif. *Caps.* 2-locularis, 2-sperma, supera.

1. *caerulea*, fol. radicalibus ovatis (spathulatis), caule composito, pedunculis primis bifloris. L. Moris. s. 15. t. 4. f. 1. H. Linnaei. Michaux. Fl. p. 84-85. Hab. in Virginia. Var. magnitudine et flor. albis.

2. *serpillifolia*, caespitosa, fol. ovalibus in petiolum angustatis, pedunc. terminalib. 1-floris longissimis. Michaux. Flor. 1. p. 85. Hab. ad rivulos in montibus Carolinae. Fol. subciliata. *Cor.* caerulea.  $\bar{\tau}$

3. *rotundifolia*, repens, fol. suborbiculatis crassiusculis, pedunc. axillarib. 1-floris. Mich. l. c. Cresc. in apricis submarinis Floridae. Sempervirens. *Cor.* alba.

4. *angustifolia*, erecta ramosissima, fol. linearibus, flor. terminalib. fasciculatis subsessilibus saepe ternis. Mich. Hab. in submaritimis antecedens. *Cor.* purpurasc. *Caps.* subtrinata.

5. *coccinea*, fol. ovato-lanceolatis subternis, caul. suffruticoso, flor. corymbosis. Andrew. Repos. t. 106. Hab. in Mexico.

6. *purpurea*, fol. ovato-lanceolatis, corymbis terminalibus, flor. superis. Knoxia purpurea. Lam. ill. p. 259. Hab. in Virginia. An diversi generis? Conf. Michaux, Flor. 1. p. 86.

241. **GALIUM.** *Cor.* 1-petala, plana. *Sem.* 2, subrotunda.

\* *Fructu glabro, passim scabro nec hispido. Fol. quaterna.*

1. *Rubioides*, fol. quaternis lanceolato-ovatis trinerviis rigidis subtus scabris, caul. erecto, fructibus glabris. Schrad. spicil. p. 10. Hab. in Europa australi et in Sibiria. Caulis firmus, erectus. L.

(?) *hyssopifolium*, fol. quaternis inaequalibus linearilanceolatis obtusis glabris Hoffm. germ. ed. 2. p. 71. Hab. in pascuis sylvaticis montosis. Caul. erectus (subflaccidus). Panic. trichotoma subovata. H.

2. *articulatum*, fol. ovatis trinerviis scabris, caul. ascendente: articulis nodosis. Lam. ill. 1. p. 260. Hab. in Oriente.

3. *latifolium*, caul. erecto laevi, fol. quaternis amplioribus oblongo-ovalibus trinerviis: margine nervisque subhispidis, pedunc. divaricatis multifloris. Mich. Flor. 1. p. 59. Hab. in Carolinae subalpinis. Flor. violaceo-purpurei.

4. *palustre*, fol. quaternis obovatis inaequalibus, caulib. diffusis. Hab. in paludosis. caul. flaccidus.  $\bar{\tau}$

5. *trifidum*, fol. quaternis linearibus, caule procumbente scabro, *cor.* trifidis. Flor. dan. t. 48. In Dania, Canada. Stam. 3.

6. *fruticosum*, fol. quaternis linearibus obtusis glabris, caule tetragono frutescente, seminibus glabris. Willd. p. 585. Tournef. cor. 4. Hab. in Creta. h

7. *montanum*, fol. subquaternis linearibus laevibus, caul. debili scabro, *sem.* glabris. L. Hab. in Germania, Gallia. Inter G. Molluginem et glaucum medium. *Corymbi* trifidi. L.  $\bar{\tau}$

8. *hirsutum*, procumbens hirsutum, fol. quaternis lanceolatis aequalib. caul. ramossissimo, pedunc. 1-floris, fructib. scabris. Flor. Peruv. 1. p. 59. Hab. in Peruvia in Cantae umbrosis. ☉

9. *corymbosum*, repens, fol. quaternis lanceolatis oblongis, ramulis corymbosis, pedunc. 1-floris, fructib. glabris. Fl. Per. 1. c. In alpihus Tarmae. ☉

10. *ciliatum*, procumbens, fol. quaternis lanceolatis ciliatis aequalibus reflexis, pedunc. 4-phyllis 1-floris, fructib. glabris. Flor. Per. 1. c. Cresc. in collibus aridis Tarmae. Vere.

11. *ovale*, scandens hirsutum, fol. quaternis oblongo-ovalibus acuminatis aequalibus, pedunc. 1-floris, fructib. glabris. Fl. Per. 1. c. Hab. in Peruviae versuris et rudertis. Vere.

12. *croceum*, procumbens, fol. quaternis linearibus ciliatis subtus scabriusculis, pedunc. 1-floris, fructib. glabris rubris. Fl. Per. p. 59. Cum priore.

13. *mucronatum*, diffusum, fol. quaternis linearibus mucronatis aequalib. corol. 4-fidis, fructibus glabris lacteis. Fl. Per. 1. p. 60. Habit. in aridis Tarmae ad Curis tractus.

*Obs.* An forte ex enumeratis hisce Peruvianis speciebus quaedam ad Valantiae genus pertinent? An *G. croceum* idem ac *Rubia chilensis* Molinae?

14. *Claytoni*, caul. procumbentibus; angulis retro scabris, fol. subquaternis lineari-lanceolatis obtusis margine nervisque hispidulis. Michaux. Flor. 1. p. 78. Hab. in Canada. Flor. pauci, minuti, albi.

15. *asperellum*, caul. decumbentibus retro aculeatis, fol. senis ovali-lanceolatis: acumine flaccido margine nervisque hispidulis. Michaux 1. c. Cresc. in Canadae septentrionalibus.

16. *uniflorum*, fol. quaternis longo-linearibus acutis glabris, caul. laevi, pedunc. unifloris cernuis, fructu glabro. Michaux. Hab. in Carolina. Sequenti affine.

\* \* *Fol. ut plurimum senis.*

17. *tinctorium*, fol. linearibus 1 caulinis senis; ramorum quaternis, caul. flaccido, pedunculis subbifloris, fructib. glabris. Hab. in America septentrionali.

18. *capense*, fol. senis linearibus glabris, caule frutescente erecto. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. spei. ☉? *G. frutescens*. Cav. ic. 3. p. 3. t. 206. f. 2. in Hispania.

19. *mucronatum*, fol. senis linearibus mucronatis glabris, caule pubescente debili. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

20. *expansum*, fol. senis linearibus mucronatis glabris, ramis divaricatis pubescentibus, panicula trichotoma. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

21. *asperum*, fol. senis oblongis serratis, caule hispido piloso, florib. paucis. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

22. *glabrum*, fol. senis oblongis serratis, caule hispido glabro, flor. paniculatis. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei.

23. *viscosum*, fol. infimis quaternis obovatis superioribus senis lineari-lanceolatis antrorsum serratis, carina cauleque laevi. Vahl. symbol. 2. p. 29. Hab. in montosis Tuneti. ☉.

24. *purpureum*, fol. verticillatis linearisetaceis, flor. terminalibus subpaniculatis, pedunc. capillaribus folio longioribus. Hab. in Italia, Gallia et Helvetia.

25. *rubrum*, fol. verticillatis linearibus patulis, pedunculis brevissimis. L. Hab. in Palatinatu, Italia.

26. *megalospermum*, fol. quinas lanceolatis margine hispidis, pedunc. geminis terminalibus. Willd. p. 594. Allion. pedem. n°. 35. t. 79. Hab. in monte Cenisio. Flor. albido-flavi. Semina magna scabra. W.

27. *spurium*, fol. senis lanceolatis carinatis scabris, retrorsum aculeatis, pedunc. axillarib. ramosis divaricatis, fructib. laevibus. Roth. N. Beytr. p. 141. *G. hispidum*. Ej. germ. 2. p. 185. Hab. in cultis, ad saepes. *G. Aparine* simile. ☉

28. *uliginosum*, fol. senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis mucronatis cauleque rigidis, cor. fructu majore. Lin. Hab. in uliginosis montosis, pascuis aqueosis. ☉

\* *hercynicum*, glabrum caespitosum procumbens, fol. senis obovatis mucronatis, ramis brevibus confertis, flor. glomeratis. *G. harycnicum*. Weig. obs. p. 25. Hab. in montosis, sylvaticis, graminosis, arenosis satis frequens. Vix a sequente diversum.

29. *saxatile*, fol. senis obovatis obtusis, caule ramosissimo procumbente, fructu granulato. Smith. Brit. p. 175. Petiv. herb. brit. t. 30. f. 6. *G. montanum*. Huds. Habit. in Hispania, Italiae, Helvetiae, et Angliae alpinis et ericetis.

30. *Witheringii*, fol. quinas reflexis lanceolatis aristatis ciliatis, caul. erectiusculo simplici scabro, paucis terminali tri-

chotoma. *G. montanum*. Withering. arang. 1. p. 187. t. 28. Smith. brit. tr. p. 174. Hab. in ericetis montosis subhumidulis in Anglia.

31. *austriacum*, fol. suboctonis glabris mucronatis, caul. diffuso, ramis floriferis subtrichotomis. *G. glabrum*. Hoffm. germ. ed. 2. p. 72. *G. austriacum*. Jacq. austr. t. 50. *G. laeve*. Thuill. Paris. p. 77? Hab. in Germania et Gallia?

32. *erectum*, fol. suboctonis lanceolatis antrorsum aculeato-serrulatis mucronatis, panic. trichotomis, caul. laeviusculo flaccido. Smith. brit. 1. p. 6. With. arrang. t. p. 189. Hoffm. l. c. Hab. in Anglia et Germania. Caul. ramosissimus, flaccidus. Sm.

33. *scabrum*, caespitosum, caul. sublaevi depresso adscendente, basi tomentosa, fol. 6-8 linearibus subasperis mucronatis, infimis minutissimis (emarcidis) ellipticis, pedunculis trichotomis s. ternis. *G. scabrum*. Jac. austr. t. 422. Murr. Syst. veg. p. 151. *G. pusillum*. Lin. Smith. brit. 1. p. 177. Engl. bot. t. 74. *G. Bocconi*. Allion. Willd. sp. 1. p. 587. *G. supinum*. Lam. *G. paschale*. Vahl. ? *G. asperum*. Schreb. *G. sylvestre*. Poll. *G. pallens* et nitidulum. Thuill. hujus loci sunt. Hab. in montosis praesertim calcareis satis frequens, etiam in sylvaticis.

Obs. *G. anisophyllum*, pnaillum argenteum, corrodiaefolium *Villarsii* hujus tantum varietates?

34. *tenne*, fol. senis subulatis laevibus, pedunc. trifidis, petalis aristatis. Willd. Vill. delph. 2. p. 322. t. 7. Hab. in alpinis Delphinatus. ¶

35. *Jussieui*, fol. subsenis lineari-subulatis laevibus, flor. umbellatis, caule adscendente. Willd. Caulib. filiformibus prostratis, fol. quinis angustis acutissimisque, flor. subumbellatis. Villars delph. 2. p. 323. t. 7. *G. caespitosum*, Lam. enc. *An sequentia var.?* Juss. Act. paris. 1714. p. 373. t. 15. f. 2. In alpinis Delphinatus et Saubaudiae. ¶

36. *pyrenaicum*, fol. senis, flor. lateralibus oppositis subsessilibus solitariis. Lin. suppl. 121. Gouan. illust. 5. t. 1. f. 4. *G. muscoides*. Lam. *G. hypnoides*. Vill. delph. Hab. in Pyrenaeis. ¶

\*\*\* Fol. plus minuve octonis.

37. *minutum*, caul. decumbente, fol. octonis lanceolatis mucronatis serrato-aculeatis glabris incurvis, fruct. reflexis. Gmel. sib. 3. p. 169. Hab. in imperio Ruthenico. Flor. lutei. Caul. laevis.

38. *verum (lateum)*, fol. octonis linearibus sulcatis, flor. paniculatis, ramis floriferis brevibus. Hab. in sylvaticis ad versuras agrorum. ¶

39. *Mollugo*, nitidum, fol. octonis ovato-linearibus subserratis reflexis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. Flordan. t. 355. β. pubescens. Schrad. sjic. p. 16. Cresc. in pratis, ad sepes, vias. Flor. citrini, albi.

40. *lucidum*, caespitosum, fol. verticillatis suboctonis breviusculis patulis nitidis rigidis linearibus, caul. erecto: cortice basi secedente emarci lo. Allion. pedem. n.º. 21. t. 77. f. 2. *G. rigidum*. Vill. delph. 2. p. 319? Hab. in Europa meridionali, locis siccis petrosis. Praecedenti affine.

41. *elatum*, caul. elongato valido: geniculis tumidis, fol. suboctonis obovalibus breviusculis opacis, panic. densa. Thuill. paris. p. 76. Cresc. in dumetis, ad sepes. Flor. albi. Inter *G. Molluginum* et sequentem media species. ¶

42. *sylvaticum*, fol. octonis lanceolatis laevibus subulis scabris: floralibus binis, pedunc. capillaribus, caul. laevi stricto: geniculis tumidis. Ján. *G. laevigatum*. Villars? Hab. in sylvis. Flor. primo penduli.

43. *linifolium*, fol. subseptenis lineari-lanceolatis laevibus, pedunc. capillaribus, caul. erecto tetragono. Aiton. Kew. 1. p. 144. Hab. in Europ. australi. ¶

44. *rigidum*, fol. verticillatis linearibus supra scabris, paniculis divaricatis, caul. erecto tereti piloso-scabriusculo. Ait. Kew. 1. p. 144. Hab. .... ¶

45. *aristatum*, fol. octonis lanceolatis laevibus, panic. capillari. petalis aristatis, sem. glabris. Syst. veget. Bocc. mus. 83. t. 75. Hab. in Baldo. ¶

46. *obliquum*, fol. octonis angustis, inferioribus cano-hirtis superioribus glabris, cor. aristatis. Vill. Delph. 2. p. 320. t. 8. Hab. in pascuis, locis aridis lapideis in Delphinatu. A. G. scabro ob petala omnino diversum videtur.

47. *glomeratum*, glabrum, fol. octonis linearibus serratis, caul. aspero paniculato, petal. aristatis, sem. glabris. Desf. Atl. 1. p. 128. Hab. in Barbaria inter segetes.

48. *hierosolymitanum*, fol. denis lanceolato-linearibus, umbellis fastigiatis, fructibus glabris. L. Hab. in Palaestina. †

49. *glaucum*, caul. tereti, fol. linearibus margine revolutis subulis laevibus, ramis pe-

dunculisque trichotomis, cor. campanulatis. Jacq. aust. t. 81. Hoff. germ. p. 73. Hab. in Germania. Cor. magna.

\*\*\* *Fructu hispido.*

50. *boreale*, fol. quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, sem. hispidis. Hab. in pratis, sylvis.

51. *rotundifolium*, fol. quaternis subrotundo-ovalis trinerviis hispido-ciliatis. Willd. Roth. germ. II. 186 G. decipiens. Ehrh. herb. 63. Bocc. sicil. 10. t. 6. f. 1. Mor. s. g. t. 21. f. 5. In montosis nemorosis.

52. *bermudianum*, fol. quaternis linearibus obtusis, caul. ramosissimo. Sp. pl. 153. Hab. in Virginia.

53. *lappaceum*, fol. quaternis hispidis oblongis acuminatis, pedunc. 1-floris, fructibus lappaceis. Flor. Per. t. p. 56. Hab. in Peruvia. Herbacea, subscandens.

54. *ercooides*, fol. subquinis oblongis hispidis, margine revolutis, fructib. echinatis sessilibus et axillaribus. Lam. encycl. 2. p. 577. Hab. in Monte Video Brasiliæ.

55. *hispidulum*, pumilum ramosissimum cum fructu hispidum, fol. quaternis subovalis-lanceolatis margine revolutis subrugosis. Michaux, p. 80. Hab. in Carolina inferiore.

56. *punctatum*, caul. subaspero, fol. quaternis ovalibus obtusis inermibus margine nervique subpubescentibus punctatis, fructib. lappulaceis. Mich. l. c. Hab. in Carolina inferiore. Flor. purpurei. G. purpureum. Walter.

57. *circaezans*, caul. erecto laevi, fol. quaternis ovalibus planis inermibus, margine ciliato, pedunc. divaricatis paucifloris, fruct. cernuis lappulaceis. Michaux Cresc. cum priore.

58. *triflorum*, caul. procumbente basi hispidulo, fol. 6 ovali-lanceolatis mucronatis laevibus, pedunc. lateralibus et terminalibus trifloris, fructu hispido. Mich. l. c. In sylvis umbrosis Canadæ.

59. *setaceum*, fol. senis lineari-subulatis glabris denticulatis, caul. laevi suberecti, fructib. hispidis. Lam. ill. p. 264. enc. 2. p. 584. Desf. Atl. t. p. 129. In Hispan. et Barbar.

60. *provinciale*, fol. 6-8 linearib. rigidis margine scabris, panic. parvis terminalibus. Lam. l. c. Hab. in Gallia australi et Italia.

61. *divaricatum*, fol. subsenis linearibus hispidis, ramis divaricato-dichotomis,

Lam. l. c. Hab. in Galliae arenosis et petrosis.

62. *tunetanum*, caul. tereti canescente, fol. 8-12 linearib. pubescentibus margine revolutis asperis, sem. hispidis. Desf. Atl. t. p. 129. Lam. ill. p. 263. Hab. in Algeria in sepibus. Facies *G. veri*. L.

63. *ruthenicum*, fol. suboctonis linearibus scabris mucronatis, margine revolutis, caule pubescente, pedunculis germinibusque hirtis. Willd. t. p. 597. Hab. ad Wolgam inferiorem. T. Facie et magnitudine *G. lutei*. Flores albi. W.

64. *Aparine*, fol. octonis lanceolatis cernuis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis. Flor. dan. 495. In Europæ cultis et ruderalis, ad saepes. ☉

65. *aparinoides*, fol. senis oblongis margine carinaque retrorsum aculeatis, geniculis glabris. Vahl. symbol. 2. p. 30. Forsk. descr. p. 30. Hab. in umbrosis Arabiæ.

66. *album*, fol. suboctonis oblongis inermibus margine scabris, caule pubescente herbaceo laevi. Vahl. l. c. Hab. Smyrnae.

67. *microcarpum*, fol. subsenis; inferioribus oblongis, superioribus setaceis, pedunc. trifidis. Vahl. symb. Hab. in montosis aridis Tuneti, rarius in Hispania. Simil. *G. parisiensi*.

68. *parisiense (tenerum)*, fol. linearibus subsenis cauleque scabris, pedunc. bifloris, fructibus hispidis. Gallium parisiense tenuifolium, flore atropurpureo? Tournef. *G. anglicum*. Huds. Smith. brit. 1. p. 179. Raj. angl. 3. t. p. 6. f. 1. Hab. in Anglia Hispania, Helvetia, Gallia, in arenosis.

\*\*\* *Fructu villosa.*

69. *pilosum*, fol. quaternis subovalibus pilosis cernuis, seminib. pilosis. Ait. Kew. 1. p. 145. In Amer. boreali.

70. *maritimum*, caule hirta, fol. quaternis hispidis, pedunc. unifloris, fructibus villosis. Gouan. illust. 5. Hab. in Oriente, Mopsellii.

71. *eracum*, hirtum, fol. subsenis lineari-lanceolatis, caul. lignosis. L. Hab. in Cretæ rupibus. h. Caulis varie flexi, tortuosi, lignosi.

72. *capillare*, caul. tenui 4-gono, fol. octonis, fructu minimo albo-tomentoso. Cav. ic. 2. p. 73. & 131. f. 1. Hab. in Hispaniæ monte St. Michaelis et in collic Montanæ verda. Cor. rubens. ☉

VALANTIA.



242. VALANTIA. Flor. polygami. *Hermaphr. Cal. o.* (subinteg. Juss.) *Cor. 4-fida. Styl. 2-fidus. Sem. 1:* altero sæpius abortivo. *Flor. Masculini. Cor.* ut plurimum trifida, et 3-4-andra: pistillo abortivo. (Fol. an Bractæ? post anthesin reflectuntur et fructum obtegunt.)

1. *Cruciata*, fol. quaternis ovatis hirsutis, pedunc. lateralibus diphyllis, flor. masculis ut plurimum 4-fidis. Lin. Gal. cruciatum. Smith. brit. 1. p. 173. Soverb. engl. bot. t. 143. Hab. ad sæpes, in sylvaticis.  $\mathcal{T}$ .

2. *glabra*, flor. masculis 4-fidis, pedunc. dichotomis, fol. 3-nerviis ovalibus ciliatis. Scop. caru. p. 344. Schkuhr. Handb. t. 345. Hab. in Carinthiae, Italiae et Ungariae umbrosis. Priore tenerior, et fere glabra.  $\mathcal{T}$ .

3. *articulata*, flor. masc. 4-fidis, pedunc. dichotomis aphyllis, flor. cordatis. Hort. ups. p. 303. Hab. in Aegypto, Syria et Mauritania. Fructu maturo, caulis ad articulos discedit. L.

4. *muralis*, tota glabra, flor. masculis trifidis, fructu laevi. Moris. s. g. t. 29. f. 2. Col. ecphr. 1. p. 298. t. 297. Hab. in Galliae meridionalis et Italiae muris.  $\odot$

5. *hispida*, flor. masc. trifidis, caul. fructibusque hispidis. Lin. In Europa australi.

6. *Aparine*, pedunc. trifloris, flore intermedio sessili, lateralibus masculis trifidis subpedicellatis, fructu tuberculato. Vaill. paris. t. 4. f. 3. b. Cresc. passim inter segetes. Facies Galii Aparines. Caul. scalar. Fol. antrorsum aculeata. Roth.  $\odot$

7. *spuria*, pedunc. trifloris, flor. omnibus pedicellatis, fructu (majusculo) granulato reflexo, caul. decumbente simplici aculeato. Galium spurium auct. G. tricornis. Smith. Valantia tricornis. Roth. N. Bot. Beytr. p. 142. Vaill. paris. t. 4. f. 3. a. In agris frequens. Fol. retrorsum aculeata.

8. *cordata*, fructibus subrotundis bractea lata cordata obiectis. Hab. Sub sequentis nomine passim occurrit.

9. *Cucullaria*, caul. ramosissimo multifloro, bract. pedicellatis ovatis fructum lineare involventibus. Buxb. cent. 1. p. 13. t. 19. f. 2. Hab. in Hispania et Oriente.

*Obs.* Ob fructus formam peculiare hae ex specie constitui meretur genus.

243. CRUCIANELLA. *Cor. 1-petala*, infundibuliformis: tubo fili-

formi; limbo unguiculato. *Cal. 2-phyllus. Sem. 2*, linearia.

1. *angustifolia*, erecta, fol. senis linearibus, floribus spicatis. Lin. Hab. Monspeli

2. *latifolia*, procumbens, fol. quaternis lanceolatis, floribus spicatis. Lin. C. priore.

3. *egyptiaca*, fol. quaternis sublinearibus; flor. spicatis quinquefidis. Mant. Hab. in Aegypto.  $\odot$

4. *patula*, diffusa, fol. margine revolutis, bracteis lineari-subulatis scabriusculis, flor. sparsis. Will. sp. pl. 602. Hab. in Hispania.  $\odot$

5. *pubescens*, erecta, fol. subsenis linearibus pubescentibus, capitulis pedunculatis axillaribus et terminalibus. Willd. l. c. Hab. in Creta. Cor. purpurascens pube tenui tectae. W.

6. *maritima*, procumbens suffruticosa, fol. quaternis mucronatis, floribus oppositis quinquefidis. Lin. In Creta et Monsp.

7. *capitata*, procumbens suffruticosa, fol. senis sublinearibus, flor. capitatis quinquefidis. Billardiere icon. pl. Syr. Decas. 1. p. 12. t. 3. Hab. in Monte Libano. Flores atri, capitati.

8. *monspeliaca*, procumbens, fol. acutis caulinis quaternis ovatis; rameis linearibus, flor. spicatis. Lin. Hab. Monspeli, inque Palæstina.  $\odot$

244. RUBIA. *Cor. 1-petala*, campanulata, 4-5-fida. Baccæ 2, monospermae. (Stam. 4-5.)

1. *tinctorum*, fol. lanceolatis subsenis annuis, caule aculeato scandente.  $\beta$ . *sylvestris*, fol. inferioribus senis, superne quaternis binisve, utrinque asperis. Mill. Hab. Monspeli, in Italia, Helvetia, Danubii pratis. Flor. 4-5 fidi.

2. *acaliculata*, caul. laevi hexagono, fol. petiolatis ovato-lanceolatis retrorsum aculeatis. Cav. ic. 2. p. 75. t. 195. Hab. in Madras. Fl. Dec. Cor. 5-partita. Stam. 5. Cal. o, uti in quibusdam aliis.  $\mathcal{T}$

3. *chilensis*, fol. annuis quaternis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris, caule laevi. Willd. p. 604. Molin. chil. p. 118. An Galium croceum. Flor. Per. Feuille. peruv. 85. t. 45. Hab. in regno chilensi.  $\mathcal{T}$

4. *peregrina*, fol. subquaternis perennantibus linearibus supra laevibus, caul. aspero. R. tinctorum. With. Moris. sect. 9. t. 21. f. 2. Hab. in Gallorum Monte Pilati,

Lugduni. Nicæae, inque Anglia, Russia.  
Flor. 5-fidi etiam. 5. Sm. ¶

5. *lucida*, fol. perennantibus (4-6) ellipticis lucidis, caule laevi. Hab. in Majorca. Similis R. peregrinae, sed folia margine tantum retrorsum scabra, non vero carina. Flor. 5-fidi. Stig. 2, capitata.

6. *fruticosa*, fol. perennantibus ellipticis margine carinaque aculeatis, caule frutescente aspero. Alt. Kew. 1. p. 147. Jacq. ic. rar. 1. t. 25. Collect. 1. p. 71. Habit. in fruticetis Teneriffae. ¶

7. *angustifolia*, fol. perennantibus linearib. supra scabris, caul. diffuso. Mant. p. 39. Lam. ill. gen. t. 60. f. 2. Hab. in Minorca. Flores lutei, 5-fidi.

8. *cordifolia*, fol. perennantibus quaternis cordatis. Pall. itin. 3. app. n.º. 68. t. 1. fg. 1. Hab. in Maiorca, Cap. b. spei, Sibiria, China, Japonia. ¶

9. *Brownæi*, subhispida, fol. quaternis ovalibus, pedunculis solitariis uniflor. Nich. Fl. 1. p. 81. Brown. jam. p. 141. Valonia hypocarpia. Lin. Hab. in Carolinae umbris.

245. MATTUSCHKEA. Cal. 4-partit. Cor. infundibulif. 4-fida. Sem. 4, nuda.

1. *hirsuta*. Willd. sp. 1. p. 606. Vahl. symbol. 3. p. 11. Perama hirsuta. Aubergujan. 1. p. 54. t. 18. Lam. ill. t. 68. Hab. in Gujanæ locis humidis arenosis. ☉

246. SIPHONANTHUS. Cor. 1-petala, infundibulif. longissima, infera. Cal. 5-partitus. Baccæ 4, monospermae.

1. *indica*. Willd. sp. 606. S. salicis folio, flore flavescente. Amm. Act. petrop. Lam. ill. p. 318. t. 79. f. 1. Hab. in America meridionali. Racemus terminalis.

247. ROUSSEA. Cal. 4-phyllus. Cor. campanulata, 4-fida, infera: lacin. revolutis. Baccæ 4-angulares polyspermae.

1. *simplex*. Smith. icon. ined. 1. p. 6. t. 6. Hab. in insula Mauritiæ. ¶

248. FROELICHIA. Cal. superus 4-dentatus. Cor. tubulosa. Baccæ 1-sperma exsucca. Semen arillatum.

1. *paniculata*. Willd. sp. 1. p. 607. Billedieria paniculata. Vahl. eclog. 1. p. 13. t. 10. Hab. in insula Trinitatis. ¶

249. SCOLOSANTHUS. Cal. 4-fidus. Cor. tubulosa, limbo revoluta. Drupa monosperma.

1. *versicolor*. Willd. l. c. Vahl. eclog. 1. p. 11. t. 10. Catesbaea parviflora. Lam. ill. t. 67. f. 2. Hab. in insula St. Crucis. ¶

250. CATESBÆA. Cor. 1-petala, infundibuliformis, longissima spera. Stam. intra faucem. Baccæ polysperma, bilocularis.

1. *spinosa*, cor. tubo longissimo baccis ovalibus. C. longiflora. Swartz. Catesb. carol. 2. p. 100. t. 100. Hab. in insula Providentiæ. ¶

2. *parviflora*, cor. tubo tetragono abbreviato, baccis subrotundis. Swartz. Vahl. eclog. 1. p. 12. Sloan. hist. 2. p. 100. t. 207. f. 1. Hab. in Jamaica. ¶

251. IXORA. Cor. 1-petala, infundibuliformis longa. Stam. supra faucem. Stigm. 2-fidum crassum. Baccæ 4-sperma.

1. *coccinea*, fol. sessilibus ellipticis obtusis mucronatis, corymbis terminalibus. Willd. sp. 1. p. 609. Burm. zeyl. 125. t. 57. Rumph. amb. 4. p. 105. t. 46. Rheed. mal. 2. p. 17. t. 13. Hab. in India. Caulis ruber. ¶

2. *parviflora*, fol. subsessilibus lanceolato-oblongis, panicula terminali. Vahl. symbol. 3. p. 11. t. 52. Cum priore.

3. *alba*, fol. ovato-lanceolatis, florib. fasciculatis. Pluck. alm. Rheed. mal. 2. p. 19. t. 14. In India. ¶

4. *Pavetta*, fol. ovato-lanceolatis undulatis obtusis petiolatis, flor. corymbosis. Andrew. t. 78. Hab. in India. Flor. odorati, lutescentes.

5. *ternifolia*, fol. ternatis lanceolatis subsessilibus, flor. fasciculatis coccineis. Cav. ic. 4. p. 3. t. 305. Hab. in Nova Hispania.

6. *americana*, fol. ternis lanceolato-ovatis, flor. thyrsoidis. Amoen. acad. 5. p. 393. Hab. in Jamaica. ¶

7. *fasciculata*, fol. ovato-ellipticis, ramulorum subsessilibus, pedunculis glomeratis subtrifloris. Swartz. prodr. 30. Chomelia fasciculata. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 238. Hab. in Jamaica. ¶

8. *multiflora*, fol. lanceolato-ovatis fasciculatis, pedunc. aggregatis unifloris breviss.

simis, bacca monosperma. Swartz. prod. 30. Hab. in Jamaica. h

*Obs.* An hujus quoque generis *Lonicera corymbosa* L.? Limites inter hoc et sequens genus non satis distincti extant. Ambo hinc a cel. Lamarckio conjunguntur. Vid. ill. gen. p. 285.

252. *PAVETTA*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Stigm.* in-crassatum, curvum. *Lin.* *Bacca* 1-locularis, 1-2-sperma.

1. *amplexicaulis*, glabra, fol. amplexicaulibus ovalibus, corol. lacinis acute lanceolatis. Hab. in India orientali.

2. *indica* (obtus), fol. subsupercatis obovatis, cor. lacinis rotundatis. C m prior, quacum saepius confunditur. De Pavetta indica L. vide. Willd. sp. 1. p. 128. Ixora paniculata. Lam. ill. p. 205? h

3. *villosa*, ramis calycibusque villosis incanis, fol. lanceolato-ellipticis, floribus fasciculatis. Vahl. symbol. 3. p. 12. Hab. in Arabia felici. h

4. *longiflora*, ramis glabris, fol. lanceolato-ellipticis, stipulis intus pilosis, calycibus quadrifidis, flor. fasciculatis. Vahl. symb. 3. p. 12. Ixora occidentalis. Forsk. Hab. in Arabia felici. h

5. *caffra*, fol. obovatis, flor. subumbellatis, calycibus setaceo-aristatis. Thunb. pr. 29. Lin. suppl. 121. Crinita capensis. Houtt. t. 40. f. 1. Hab. ad Cap. h. spei. h

6. *pentandra*, fol. oblongo-lanceolatis acuminatis, panic. trichotoma axillari, flor. pentandris. Willd. p. 611. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 233. Plum. ic. t. 156. f. 1. Hab. in India occidentali. Flor. suaveolentes. h

253. *ERNODEA*. *Cor.* 1-petala hypocrateriformis. *Cal.* 4-5-partitus. *Bacca* 2-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *littoralis*, fol. lanceolatis 5-nerviis, floribus sessilibus. Lam. ill. p. 276. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 223. t. 4. Sloan. hist. t. 189. f. 1. et 2. Hab. in Jamaica, in Insul. Carib. h

2. *pungens*, fol. lanceolatis rigidis multinerviis mucronato-pungentibus, flor. pedunculatis. Lam. l. c. Hab. in Amer. meridionali. *Cal.* 5-fidus.

*Obs.* An *Ernodea* cum sequente genere potius ad *Ixoras* aut *Pavettas* pertinet? Plura haecce Rubiaceae genera, inter so-

nimis affinia, in *vivis* denuo accuratius examinari debent, quo characteres firmiores eruuntur.

254. *SIDERODENDRUM*. *Cor.* tubulosa. *Cal.* 4-dentatus. *Stigm.* 2, revoluta. *Bacca* dicocca 2-locul. *Sem.* solitaria.

1. *triflorum*. Vahl. eclog. 1. p. 10. Jacq. amer. 19. t. 175. f. 9. Pluck. alm. 346. t. 224. f. 2. Hab. in sylvis montosis Martinicae et Monserrat. Arbor procera. *Cor.* saepe mutatur in folliculum oblongum forte ab insecto quodam. V. h

255. *HOFFMANNIA*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* hypocrateriformis, 4-partita, tubo brevissimo. *Filam.* 6. *Anth.* conniventes. *Bacca* bilocularis poly perma infera.

1. *pedunculata*. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 242. Hab. in Jamaica. h

256. *CHOMELIA*. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* hypocrateriformis 4-partita. *Drupa* infera nuce 2-loculari. *Stigm.* 2, crassiuscula.

1. *spinosa*. Jacq. amer. 18. t. 13. Hab. in Carthagenae sylvaticis. Arbor ramis horizontalibus. h

257. *PETITIA*. *Cal.* 4-dentatus inferus. *Cor.* 4-partita. *Drupa* nuce 2-loculari.

1. *domingensis*. Jacq. amer. 14. t. 182. f. 6. Hab. in Domingo sylvaticis. Arbuscula ramis tetragonis striatis. h

258. *MYONIMA*. *Cal.* minimus subinteger. *Cor.* 4-partita tubo brevi. *Drupa* nuce 5-locul. 4-sperma.

1. *obovata*, foliis obovatis acuminatis. Willd. sp. 1. p. 614. Lam. encyclop. t. 68. f. 1. Hab. in insula Borbonia. h

2. *lanceolata*, fol. lanceolatis Willd. Lam. t. 68. f. 2. Hab. in insula Borbonia. h

259. *PYROSTRIA*. *Cal.* minimus sub 4-dentatus. *Cor.* campanulata 5-fida fauce tomentosa. *Drupa*, pyroformis infera, 8-striata. *Nuces* 8, monospermae.

1. *salicifolia*. *Pyrostria* Lam. t. 68. f. 4. Hab. in insula Mauritiu. h

260. *MELANEA*. *Cal.* 4-dentatus. I 2

*Cor.* infundibuliformis, 4-fida. *Drupa* infera nuce 2-locul. *Stylus* 2-fidus.

1. *sarmentosa*. Cunninghamia: caule scandente; fol. oppositis obovatis obtusis subtus tomentosis. Willd. sp. 1. p. 615. Melanea sarmentosa. Lam. encyc. 3. p. 658. t. 66. f. 2. Aubl. guj. 1. p. 103. t. 41. Hab. in Gujana. h

2. *verticillata*, caule erecto, fol. ternis glabris oblongis acuminatis. Willd. l. c. Lam. t. 66. f. 1. Antirhea borbonica. Gmel. Juss. Hab. in insulis Mauritiis et Borbonia. h

261. *ÆGIPHILA*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-fida. *Styl.* filiformis semibifidus. *Bacca* 2-locularis: loculis 2-spermis.

1. *martinicensis*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis glabris, ramis diffusis, panic. terminalibus axillaribusve, calycib. glabris. Swartz. prol. 151. Jacq. obs. 2. p. 3. t. 27. Lam. ill. gen. t. 70. f. 1. In Martinica ad sylvarum margines. h

2. *arborescens*, fol. ellipticis acuminatis glabris planis, corymb. axillaribus, cal. ramisque incanis. Vahl. ecl. 1. t. 10. Manabae. Aubl. t. 24. Hab. in Gujana et ins. Trinitatis. h

3. *villosa*, corymb. axillaribus terminalibusque, fol. ellipti o-lanceolatis subtus pedunc. calicibusque villosis incanis. Vahl. l. c. Manabae. Aubl. p. 62. t. 23. In Cajennae campis aridis. Priori affinis. h

4. *laevis*, fol. ovatis acuminatis glabris, cymis capitatis tripartitis axillaribus, fructibus oblongis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 66. t. 25. Aeg. lutea. Lam. ill. t. 70. f. 3. Hab. in sylvis Gujanae. h

5. *foetida*, fol. ovato-lanceolatis, subtus petiolisque hirsutis, pedunculis axillaribus solitariis. Swartz. prod. 32. Hab. in Jamaica. h

6. *trifida*, fol. ovato-lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus trifidis confertis. Sw. prod. 32. Hab. in Jamaica. h

7. *multiflora*, fol. oblongis, flor. axillaribus. Flor. Per. 4. p. 50. t. 76. Hab. in Peruvia ad fluviorum margines. Frutex ligno durissimo, et Corni habitu.

262. *NUXIA*. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 1-petala, 4-fida. *Stam.* in lance. *Stigm.* truncatum, *Caps.* carnosa, disperma. Lam.

1. *verticillata*, fol. ternis verticillatis. Lam. ill. gen. t. 71. Hab. in ins. Borbonia.

2. *elata*, fol. ellipticis acuminatis submembranaceis oppositis. Aegiphila elata. Swartz. Flora 1. p. 254. Brown. Jam. t. 3. f. 3. Incoliti fruticeta Jamaicae. Stam. exserta. Pistill. abbreviatum. Sw.

253. *MITCHELLA*. *Cor.* 1-petala superae, binae eidem germi. *Stigm.* 4. *Bacca* bifida, 4-sperma.

1. *repens*. Chamaedaphne. Mitch. gen. 27. Pluck. amalib. 198. t. 444. f. 2. Gatesb. carol. 1. p. 20. t. 20. Hab. in Carolina, Terra Mariana, Virginia. h

264. *COCCOCYPSILUM*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Stylus* semibifidus. *Bacca* inflata, 2-locularis, polysperma. *Sem.* lentiformia, libera.

1. *repens*, caule herbaceo repente, foliis ovatis, flor. confertis axillaribus sessilibus, Willd. sp. 1. p. 618. Swartz. prod. 31. Brown. jam. 144. t. 6. f. 2. Hab. in montosis Jamaicae. h

2. *Condalia*, caul. herbaceo repente, fol. ovatis acutis, flor. umbellatis, Condalia repens. Flor. peruv. 1. p. 54. t. 84. Hab. in Peruviae nemorosis.

3. *lanceolatum*, caul. herbaceo radicante, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc. multifloris. Fl. Per. l. c. Sub Condalia. Cum priore in umbrosis.

4. *sessile*, caul. erecto suffruticoso, fol. oblongis acutis, flor. sessilib. congestis axillaribus. Fl. Per. I. p. 54. Sub Condalia.

5. *obovatum*, caul. erecto suffruticoso, fol. obovatis acuminatis, pedunc. aggregatis, flor. racemosis. Fl. Per. l. c. In nemoribus Andium ad Chincho montes.

6. *uniflorum*, caule erecto fruticoso, fol. obovatis acuminatis, pedunculis axillaribus unifloris, stigmatib. capitatis. Willd. Fernelia buxifolia β. Lam. encycl. 2. p. 448. t. 67. f. 1. Hab. in ins. Mauritiis. h

7. *biflorum*, caule erecto fruticoso, fol. ovatis acutis, pedunculis axillaribus bifloris, stigmatibus subulatis. Willd. Fernelia buxifolia α. Lam. enc. 2. p. 448. t. 67. f. 2. Hab. in insula Borbonia.

265. *GONZALEA*. *Cal.* campanulatus, 4-dentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Drupa* nuce 4 polyspermas includens.

1. *pendula*, fol. ovatis subcrenatis, ra-

mis pendulis. *Gonzalagunia* dependens. Flor. Per. 1. p. 56. t. 86. Hab. in Serunaë nemoribus. Cor., etiam sequentis, subtomentosa rubella. *h*

2. *panamensis*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis, stigm. 4-fido. Buena. Cav. ic. 6. p. 50-51. t. 571. Hab. in Panama. *h*

256. *HIGGINIA*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 4-partito. *Stigma* 2-labiato prominens. *Bacca* bilocularis, bisulca, umbilicata, polysperma.

1. *aggregata*, fol. oppositis lanceolatis, pedunc. aggregatis verticillatis. Flor. Per. 1. p. 55. t. 83. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. *h*

2. *obovata*, fol. oppositis obovatis acuminatis, pedunc. aggregatis multifloris inaequalibus. Flor. Peruv. p. 56. t. 85. Cresc. in provincia Panatahuarum locis umbrosis. *h*

3. *verticillata*, fol. ternis lanceolatis, pedunc. solitariis dependentibus subquadri-  
floris. Flor. Per. 1. p. 55. t. 85. f. a. In Muna nemoribus per runctiones. *h*

*Obs.* An hujus generis *Bertiera*. Aubl. ? vidl. Willd. sp. 2. p. 980.

267. *WALLÉNIA*. *Cal.* 4-fidus, inferus, lacinii obtusis. *Cor.* tubulosa, 4-fida: lacin. erectis. *Bacca* 1-sperma.

1. *laurifolia*. Swartz. Flor. 1. p. 248-249. t. 6. *Eryonia* nigra fruticosa, fol. laurinis. Sloan. hist. 2. 234. t. 145. f. 5. Hab. in Jamaica, Hispaniola. *h*

268. *CALLICARPA*. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 4-sperma.

1. *americana*, foliis ovalibus serratis subtus tomentosis, cymis sessilibus. Lam. encycl. 1. p. 556. Pluck. alm. 33. t. 136. f. 3. Catesb. carol. 2. p. 47. t. 47. Hab. in Carolina, Virginia. *Cal.* cylindricus, vix quadridentatus. *h*

2. *cana*, fol. ovatis denticulatis per petiolum semidecurrentibus, subtus villosocanis, paniculis dichotomis. Vahl. symb. 3. p. 12. Retz. obs. 5. p. 1. Hab. in Malabaria, Cochinchina. *h*

3. *lanata*, fol. ovatis basi rotundatis integerrimis subdenticulatis, supra rugosis subtus ramisque lanato-tomentosis. Vahl. l. c. p. 13. C. tomentosa. Lin. Hab. in India. *h*

4. *macrophylla*, fol. lanceolato-ellipticis

crenatis attenuatis, supra rugosis, subtus ramisque tomentoso-incanis. Vahl. p. 13. t. 53. Hab. in India. *h*

5. *globiflora*, fol. oblongo-lanceolatis dentato-serratis integerrimis, cymis dichotomis. Flor. Per. 1. p. 49. t. 77. Hab. in Chinchao nemoribus. *h*

6. *cordifolia*, fol. cordatis ovatisque acutis integerrimis, cymis brachiatis. Flor. Peruv. 1. p. 50. t. 82. f. a. Cresc. in Munna nemorib. Hirsuta. *h*

7. *ferruginea*, fol. lato-lanceolatis serratis subtus scabruiculis, cymis terminalibus axillaribusque. Swartz. prod. 31. Hab. in Jamaica. *h*

8. *reticulata*, fol. elliptico-lanceolatis subserratis reticulato-nervosis, subtus tomentoso-incanis. Swartz. prod. 61. Flor. 1. p. 252. Hab. in Jamaica. *h*

9. *longifolia*, fol. lato-lanceolatis utrinque glabris, superne serratis. Vahl. symb. 3. p. 13. Lam. encyc. p. 556. t. 69. f. 2. Hab. ad Malaccam. *h*

10. *integrifolia*, fol. ovatis acutis integerrimis, subtus subtomentosis, racemis densis axillaribus et terminalibus, tubo corollae calyce quadruplo longiore. Willd. p. 621. Jacq. amer. 15. tab. 173. f. 7. Hab. in sylvaticis Carthagenae. *h*

11. *villosa*, fol. oblongo-ovatis integerrimis, subtus venoso-reticulatis villosis, racemis axillaribus, pedic. multifloris. Vahl. symbol. 3. p. 14. Habit. in India orientali. ? *h*

12. *japonica*, fol. oblongis acuminatis medio serratis glabris. Willd. Thunb. jap. 60. Hab. in Japonia. *h*

259. *AQUARTIA*. *Cal.* campanulatus. *Cor.* rotata: lacinii linearibus. *Bacca* polysperma.

1. *aculeata*, foliis repandis tomentosis. Willd. p. 621. Jac. amer. 15. t. 12. Lam. ill. t. 82. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. Stam. numero solummodo a Solanis differt. *h*

2. *microphylla*, fol. minimis integris subnudis, aculeis subgeminatis patentibus. Lam. l. c. p. 327. t. 82. f. 2. Hab. in St. Domingo. Solanum lycioides refert. *h*

270. *WITHERINGIA*. *Cor.* subcampanulata: tubo quadrigibbo. *Cal.* minimus, 4-dentatus. *Bacca* 2-locularis. *Anth.* conniventes.

1. *solanacea*. L'Herit. sert. 1. 33. tab. 1

Lam. ill. t. 82. Habit. in America meridionali. Umbel. axillares. ¶

271. MYRMECIA. *Cal.* campanulatus, 5-dentatus. *Cor.* tubulosa: fauce inflata. *Glandul.* 5, germinis basin cingentes. *Caps.* 2-locul. 2-valv. polysperma.

1. *scandens*. Willd. sp. p. 623. Tachia gujanensis. Aubl. gujan. t. p. 75 t. 29. Hab. in sylvis Gujanæ ad ripas rivulorum. In cavitate trunci et ramorum degunt formicæ, unde nomen. Aul. h

272. POLYPREMUM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida, rotata: lobis rotundatis. *Caps.* compressa, emarginata, bilocularis, polysperma.

1. *procumbens*. Willd. sp. 1. p. 623. Lam. encyl. t. 71. Michaux. Flor. 1. p. 83. Pet. gaz. g. t. 5. f. 6. Hab. in Carolina, Virginia. Flos. plurib. bracteolis circumvallatus. ☉

273. LABATIA. *Cal.* 4-phyllus inferus. *Cor.* subcampanulata, 4-fida: laciniae 2, minutæ, in divisuris corollæ. *Caps.* 4-locul. *Sem.* solitaria.

1. *sessilifolia*, florib. sessilibus, foliis tomentosis. Willd. sp. 1. p. 623. Habit. in Hispaniolæ fruticetis montosis. *Caps.* passim 2-locul. Swartz.

2. *pedunculata*, flor. pedunculatis, fol. glabris. Willd. Ponteria gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 86. t. 33. Habit. in sylvis Gujanæ. h

274. LASIOSTOMA. *Cal.* 5-fid. *Cor.* infundibuliformis: fauce villosa. *Caps.* 1-locul., disperma.

1. *cirrrosa*. Willd., p. 624. Rouhamon gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 93. t. 36. Ad ripas fluminum Gujanæ. h

275. MANETTIA. *Cal.* 4-5-8-partitus. *Cor.* infundibuliformis, 4-5-partita: fauce barbata. *Caps.* oblonga, 2-locularis, 2-valvis: valvis duplicatis. *Sem.* numerosa, imbricata alata. (Stam. 4-5. Plantæ volubiles aut scandentes.)

1. *umbellata*, fol. ovatis subcordatis-

que, stipulis connatis acuminatis, pedunc. umbellatis multifloris. Flor. Per. 1. p. 58. t. 50. f. a. Hab. in Munna nemorib.

2. *mutabilis*, pubescens, fol. ovatis oblongis acuminatis, stipulis semicircularibus, flor. subracemosis lateralibus. Flor. Per. 1. c. t. 83. (M. racemosa.) *Cal.* plerumque 4-5-partitus, sæpe 8-10-partitus.

3. *acutiflora*, fol. lanceolatis acutissimis connatis acuminatis, pedunc. 1-3-floris. Flor. Per. 1. 89. f. b. In Peruviae nemoribus. Glabra.

4. *Lygistum*, fol. ovatis acutis venosis, caule volubili suffrutescente. Swartz. Flor. Ind. occid. 1. p. 321. Petesia Lygistum. L. Brown. jam. 142. t. 3. f. 2. Hab. in Jamaica, in montibus altis. ¶

5. *coccinea*, fol. ovatis acuminatis, racemis multifloris, caule volubili fruticoso. Willd. sp. 1. p. 625. Nacibea coccinea. Aubl. gujan. 1. p. 96. t. 37. f. 1. Habit. in Gujana. h

6. *picta*, fol. ovatis acutis, calyce quadridentato, caule volubili fruticoso. Willd. Aubl. guj. 1. p. 98. t. 37. f. 2. Hab. in Gujana. Folia luteo-variegata. h

7. *lanceolata*, fol. lanceolatis, calyce quinquefido inaequali, florib. pentandris, caule erecto. Willd. Vahl. symbol. 1. p. 12. Hab. in montibus altioribus Hadie. h

276. TONTANEA. *Cal.* 4-fid. superus. *Cor.* 4-fida. *Nect.* margo 4-lobus stylum cingens. *Caps.* 2-locul. 2-partibilis polysperma.

1. *repens*. Tontanea gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 108. t. 42. Lam. ill. t. 64. Bellardia. Willd. sp. 1. p. 626.

277. PENŒA. *Cal.* 2-phyllas. *Cor.* campanulata. *Stigm.* 4-lobum. *Caps.* tetragona, 4-locularis, 8-sperma.

1. *Sarcocolla*, fol. ovatis planis imbricatis, calyc. ciliatis folio majoribus. Pluck. mant. 183. t. 446. f. 6. Willd. sp. 1. p. 626. Lam. ill. t. 78. f. 2. Hab. in Aethiopia. h

2. *mucronata*, flor. terminalibus, fol. acuminatis glabris. Thunb. prod. 30. Hab. in Aethiopia et in Cap. bon. spei cum sequentibus speciebus. Flor. rubri. Stylus tetragonus.

3. *marginata*, fol. cordatis marginatis, flor. lateralibus. Habit. juxta Capitis b. spei

fluvio. Fol. opposita s. tercia, cordata, subsessilia obtusiuscula. h

4. *lateriflora*, fol. ovatis, florib. lateralibus sessilibus. Lin. suppl. p. 122. Hab. in Cap. b. spei. Fol. opposita sessilia acutiuscula. h

5. *tomentosa*, flor. lateralibus, fol. ovatis tomentosis. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei. h

6. *fucata*, fol. rhombeo-ovatis, bracteis cuneatis acutis coloratis. Mant. 199. Lam. t. 78. f. 2. Hab. in Capitis b. spei montibus. Flor. purpurei. h

7. *squamosa*, fol. rhombeo-cuneiformibus carnosius. Mant. 331. Thunb. prodr. 30. Hab. in Aethiopia, et Cap. b. spei. Cor. majuscula.

8. *fruticulosa*, fol. oblongiusculis obtusis, bracteis orbiculatis acutis. Lin. suppl. 121. Thunb. prod. 30. Ad Cap. b. spei. h

9. *Myrtoides*, fol. lanceolatis. Lin. sup. 122. Thunb. prod. 30. Cum fr. riore.

278. BLÆRIA. Cal. 4-partitus. Cor. 4-fida. Stamina receptaculo inserta. Caps. 4-locularis, polysperma.

1. *ericoides*, antheris muticis exsertis, calycibus tetraphyllis, bracteis ternis longitudine calycis, foliis quaternis oblongo-acerosis pilosis imbricatis, cor. campanulatis. Aiton. Kew. t. p. 149. Willd. sp. t. p. 649. Erica Blæria. Thunb. prod. 72. Pet. gaz. t. 2. f. 10. Hab. uti omnes sequentes species, quae frutices sunt, ad Cap. bonae spei.

2. *scabra*, antheris muticis, fol. quaternis lanceolatis piloso-hispidis, florum capitulis erectis, corollis clavatis. Erica scabra. Thunb. prod. 72. (qui hoc genus *Ericis* inseruit.)

3. *fasciculata*, antheris muticis, fol. quaternis lanceolatis ciliato scabris, capitulis erectis.

4. *articulata*, antheris muticis exsertis, fol. quaternis ovatis glabris, florum capitulis cernuis, cor. cylindricis. Lam. ill. t. 78. Erica eriocephala. Encycl. n°. 78. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *purpurea*, antheris muticis inclusis, fol. quaternis ovatis subciliatis, florib. umbellatis, caule flexuoso erecto. Lin.

6. *muscosa*, antheris muticis subexsertis, calycib. monophyllis pilosis, corollis cam-

panulatis superne pilosis, floribus axillaribus, stigmatibus pelatis. Aiton. Kew. t. p. 150. Erica albens. Thunb. prod. 70?

7. *pusilla*, antheris muticis, fol. ternis linearibus piloso-hispidis, flor. racemosis cernuis. Lin.

8. *glabella*, antheris aristatis, fol. quaternis oblongis glabris margine scabris, flor. aggregatis terminalibus. Blæria purpurea. Berg. cap. 34. Sebaethes. t. p. 30. t. 20. f. 2. Hab. in Cap. b. spei.

9. *ciliaris*, antheris aristatis, fol. quaternis glabris, calyce lacero ciliato. Erica plumosa. Thunb. prod. 73. Hab. in Cap. b. spei.

279. BUDDLEIA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Stamina ex incisionibus. Caps. 2-sulca, 2-locularis, polysperma.

1. *americana (Verbusci)*, fol. ovato-lanceolatis serratis, stipul. subreniformibus revolutis, racemis compositis subpaniculatis. Flor. Peruv. t. p. 53. t. 82. Willd. sp. t. p. 631. Hab. in Caribaeis ad ripas et torrentes et in Peruvia. h

2. *occidentalis*, fol. lanceolatis integris serratisque, flor. paniculatis: spicis verticillatis. Flor. Peruv. t. p. 53. t. 82. Pluck. alm. 270. t. 210. f. 1. Hab. in America, prope Limam. etc. h

3. *globosa*, fol. lanceolatis acuminatis crenatis, subtus tomentoso-albis, capitulis globosis oppositis pedunc. Lam. encyc. t. p. 507. t. 69. f. 2. Flor. Peruv. t. p. 52. t. 81. Jac. ic. rar. 2. t. 307. Collect. 2. p. 332. Hab. in Chili locis humidis. h

4. *incana*, fol. oblongis lanceolatisque crenulatis, stipul. marginalibus, pedunc. ternatim divisis, flor. capitatis. Flor. peruv. t. p. 52. t. 80. Hab. in Peruviae ripis. Arbor 6-orgialis.

5. *connata*, fol. lanceolatis connatis crenatis, stipulis reniformibus, pedunc. solitariis capitatis. Flor. Peruv. t. p. 52. t. 81. Hab. in Chanay segetibus et versuris. h

6. *diffusa*, subscandens, fol. ovatis subcordatisque acutis, stipul. reniformibus reflexis, pedunc. axillaribus, flor. capitatis. Flor. peruv. t. 80. Hab. in Peruv. ad agrorum margines, ubi fere semper floret.

7. *picata*, fol. ovatis utrinque acutis serratis, spicis longissimis simplicibus. Flor. Peruv. p. 53. t. 81. In versuris et locis aridis Munnæ. h

8. *salvifolia*, fol. lanceolatis cordatis crenatis rugosis, subtus tomentosis, florib. paniculatis. Willd. p. 632. *Lantana salvifolia* fol. oppositis subsessilibus, flor. racemosis. Lin. Hab. ad Cap. b. spei. h

9. *madagascariensis*, fol. ovato-lanceolatis subtus tomentosis integerrimis, racemis terminalibus. Vahl. symbol. 3. p. 14. Lam. encycl. 1. p. 507. t. 65. f. 3. Hab. in Madagascar. h

10. *salicifolia*, fol. lanceolatis extrorsum serratis, subtus tomentosis, racemis terminalibus, pedicellis multifloris, floribus nutantibus. Vahl. symbol. 3. p. 14. Hab. in Bonaria?

11. *diversifolia*, fol. ovalibus glabris integerrimis subrepandisque, corymbis axillaribus subquinguefloris. Vahl. symbol. 3. p. 15. Hab. in Java. h

12. *virgata*, fol. lineari-oblongis obtusis integris, racemis terminalibus, ramis virgatis erectis. Lin. suppl. 123. Hab. in Cap. bon. spei. Habitus *Hysopii*. h

13. *incompta*, fol. fasciculatis ovatis canis, ramis flexuosis rigidis, racemis terminalibus. Lin. suppl. 123. Thunb. prod. 30. Hab. in Cap. b. spei. h

280. LINNÆA. *Cal.* superus duplex: fructus 2-phyllus; floris 5-partitus. *Cor.* campanulata. *Stam.* subdidynama. *Bacca* sicca trilocularis.

1. *borealis*. Flor. dan. t. 3. Hab. in Suecia, Germania etc. et in Amer. boreali. *Cal.* fructus 4-phyllus? *Plauta* sempervirens, e fam. *Caprifol.* h

281. CODONIUM. *Cal.* duplex: inferus 1-phyllus inaequale bifidus; superus turbinatus subinteger. *Cor.* campanulata. *Drupa* obovata. *Stigm.* capitatem.

1. *arborescens*. Von Rohr Genera plant. in Skriver af Naturhistorie Selskabet 1793. X. p. 206-207. t. 6. Arbuscula 8-10-pedalis. Genus *Lonicerae* affine.

282. EXACUM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida: tubo globoso. *Caps.* 2-sulca, 2-locularis, polysperma, apice dehiscens: locul. 2-sperminis.

1. *viscosum*, fol. oblongis nervosis amplexicaulis, florib. quinquefidis, bracteis cordato-perfoliatis calyce longioribus.

Smith. icon. pict. fasc. 3. t. 18. Willd. sp. p. 634. *Gentiana viscosa*. Ait. Kew. 1. p. 321. Hab. in Canariis. h

2. *pedunculatum*, flor. quadrifidis terminalibus, calycis foliolis ovatis, fol. lanceolatis trinerviis impunctatis. Vahl. symbol. 3. p. 15. Pluck. mant. 43. t. 343. f. 3. Hab. in India orientali. c

3. *albens*, fol. subdecurrentibus, staminibus exsertis. Lin. suppl. 123. Burm. afr. 207. t. 74. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. c

4. *aureum*, fol. sessilibus, flor. cymosis, staminibus exsertis. Lin. suppl. 123. Lam. ill. t. 80. Pluck. alm. 94. t. 275. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. c

5. *sessile*, flor. quadrifidis lateralibus terminalibusque, capsulis nutantibus, fol. cordatis. Vahl. symbol. 3. p. 16. Hab. in Zeylona ad agrorum limites, et in sylvaticis. Caulis simplicissimus. *Cor.* subcampanulata albida.

6. *cordatum*, flor. quinquefidis, calycis foliolis cordatis striatis. Lin. suppl. 124. *Gentiana exacoides*. Sp. pl. 332. Burm. afr. 208. t. 74. f. 5. Seb. mus. v. 1. t. 22. f. 7. Pluck. alm. 94. t. 275. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. c

7. *punctatum*, fol. brevissime petiolatis oblongis trinerviis punctatis, stam. exsertis. Lin. suppl. 124. Hab. in India. *Cor.* coerulea.

8. *quadrangulare*, calycib. truncatis quadridentatis quadrangularibus longitudine tubi. Willd. sp. 1. p. 636. *Gentiana quadrangularis*. Lam. encycl. 2. p. 618.

9. *guyanense*, cor. quadrifidis, calycib. membranaceo-carinatis laevibus, fol. lanceolatis. Vahl. symb. 3. p. 16. Aubl. gujan. 1. p. 68. t. 26. f. 1. Hab. in Cajenna. c

10. *diffusum*, cor. quadrifidis, calycib. membranaceis quadrifidis, fol. ovatis acutis trinerviis, caule divaricato ramoso. Willd. *Gentiana diffusa*. Vahl. symbol. 3. p. 47. Hab. in India orientali. c

11. *tenuifolium*, cor. quadrifidis, calyc. quadripartitis. laciniis lanceolato-subulatis, panicula dichotoma. Willd. p. 638. Aubl. guj. 1. p. 70. t. 26. f. 2. Hab. in pratis humidis Cajennae, Gujanæ. c

12. *filiforme*, cor. quadrifidis, caule filiformi subramoso, foliis radicalibus subrotundis, caulinis subulatis. W. *Gentiana filiformis*. L. Fl. dan. t. 324. Vaill. paris. 32. t. 6. f. 3. Hab. in pratis humidiusculis.

13. *aphyllum*, cor. quinquefida, caule



simplici aphylo. Willd. *Gentiana aphylla*, Jacq. amer. 87. t. 60. f. 3. Hab. in sylvis montosis Martinicae.

14. *heteroclitum*, cor. qualrifidis, caule alato brachiato, floribus sessilibus. Willd. p. 639. Hab. in Malabarica agris. Stamina inaequalia : tria intra tubum, quartum faucibus insertum. Stigma bilabiatum. An species Coutoubeae?

15. *verticillatum*, flor. verticillatis, cor. quinquefidis, laciniis mucronatis, calycibus apice reflexis capsula longioribus, caule scaberrimo simplici. Willd. p. 640. *Gentiana verticillata*, L. Vahl. symb. 3. p. 46. Plum. spec. 3. ic. 81. f. 2. Hab. in America calidiore.

16. *hyssopifolium*, flor. verticillatis, cor. quinquefidis : laciniis acutis, calycibus capsula brevioribus, caule subramoso glabro. Willd. Retz. obs. 2. p. 15. Burm. afr. 206. t. 74. f. 3. Hab. in India orientali. Cor. fulva.

283. **CENTAURIUM.** *Cal.* 4-partitus appressus. *Cor.* subcampiculata 4-partita. *Stigm.* crassum, glandulosum subbifidum. *Caps.* (cal. et cor. persistentibus involucreta) 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *vernum*, caule simplice, cor. laciniis oblongis, stylo germine longiore. Michaux. Flor. 1. p. 98. t. 12. f. 2. (Centaurella) Hab. in humidis, sphagnosis Car. inferioris.

2. *autumnale*, caul. subramoso, cor. lacin. ovalibus, stylo germine multo brevior. Michaux l. c. t. 12. f. 1. (Centaurella paniculata). Cum priore.

*Obs.* Plantulae sunt graciles antecedenti generi affines, ex quo nonnullae species forte huc referendae.

284. **COUTOUBEAE.** *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 1-petala, 4-fida : *Squam.* 4, cucullatae. *Stigm.* bilabiatum. *Caps.* 2-valvis, polysperma.

1. *spicata*, foliis binis, spicae floribus subsparis. Aubl. gujan. t. 27. *C. alba*. Lam. ill. p. 379. t. 79. Exacum spicatum. Vahl symb. 3. p. 17. Willd. Spec. 1. p. 639. Hab. in Guiana ad ripas rivulorum.

2. *ternifolia*, fol. ternis, spic. flor. densis. Cav. ic. 4. p. 14. t. 328. Hab. in Panama. Flor. pariter albi. ☉

3. *purpurea*, caule ramoso, flor. pedicellatis axillaribus. Lam. ill. l. c. C. ramosa. Aubl. t. 28. Exacum ramosum. Vahl l. c. Cresc. in Guiana et Cajena in sylvis ad rivulorum ripas. Flor. purpurei.

*Obs.* Genus hocce, *Gentianis* affine, ab ill. Schreber (Gen. pl. p. 791.) *Picrium* denominatum est.

285. **FRASERA.** *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida patens : Petala medio glandula barbata. *Caps.* compressa submarginata, 2-locularis. *Sem.* pauca imbricata.

1. *caroliniensis*. Gmel. Syst. Nat. L. 2. p. 256. Fr. *Walteri*. Michaux flor. 1. p. 66-67. Hab. in paludosis Carolinae. Planta altissima, fol. oblongo-ovalibus oppositis verticillatisque.

286. **PLANTAGO.** *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida : limbo reflexo. *Stamina* longissima. *Caps.* 2-locularis, circumscissa.

† *Acaules*, scapo nudo.

\* *Fol. latis*, ut plurimum ovatis.

1. *cordata*, fol. cordatis (?) latissimis subdentatis glabris, spica longissima floucl. imbricatis. Lam. ill. 1. p. 338. *P. canadensis*. Hort. Par. *P. Kentuckensis*, fol. lato-ovalibus subintegris, spic. flor. sparsis glomeratisque, cal. bracteisque rotundatis. Mich. Flor. 1. p. 94. Hab. in Kentucky, et Canada.

2. *cucullata*, fol. ovatis concavo-cucullatis novemnerviis subtus pubescentibus, spica cylindrica imbricata, scapo tereti alto. Lam. ill. p. 339. *P. maxima*. Ait. Jacq. ic. rar. t. 26. Willd. sp. 1. p. 642. In Sibiria. ☿

3. *sinuata*, fol. ovatis sinuato-dentatis glabrisculis, spica cylindrica, caps. retusis. Lam. l. c. Hab. in ins. mauritiana.

4. *crispa*, fol. ovatis (basi) sinuato-dentatis undulatis subcarnosis, scapis brevissimis. Lam. ill. p. 339. Jacq. coll. suppl. p. 34. t. 16. *P. crassa*. Willd. P. crassifolia. Roth. Hab. in Europa meridionali?

5. *vaginata*, caule fruticoso (fol. deciduis) basi vaginato, fol. ovatis denticulatis. Vent. Jard. de Cels. p. 29. t. 29. Cresc. sponte in Mauritania. Caps. 1-locular. 1-sperma. ♀

\* *bracteata*, fol. ovatis glabris in petio-

lum longum subdecurrentibus, bracteis patentibus longissimis. Moench. meth. p. 439. P. rosea, flor. expanso. C. B. Moris. 4. 8. t. 15. f. 3. Var. sequentis.

6. *major*, fol. ovatis glabris, scapo teretibus, spica flosculis imbricatis. L. Willd. sp. 1. p. 61. cum varietatibus. Hab. ad vias. ¶

7. *asiatica*, fol. ovatis glabris, scapo angulato, spica flosculis distinctis. Gmel. sib. 4. n. 2. t. 37? Hab. in China, Sibiria. Refert P. majore. ¶

8. *media*, fol. ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. Flor. dan. t. 581. In pascuis sterilibus, apricis, argillosis. Var. fol. hirsutis et spic. ramosis.

9. *virginica*, fol. lanceolato-ovatis pubescentibus subdentulatis, floribus remotis, scapo tereti. Gisecke. ic. fasc. 1. n. 4. Michaux, flor. 1. p. 94. Moris. 5. 8. t. 15. f. 8. Hab. in Virginia. Cor. subrostratum connivens. Mich. fol. semitrinervia et scapus pubescentia. ○

10. *australis*, fol. ovato-lanceolatis subpetiolatis glabris, integris spica cylindrica. Lam. ill. p. 319. Hab. in Buenos-Ayres.

11. *tomentosa*, fol. ovatis tomentosis, scapo sulcato, spica cylindrica. Lam. 1. c. p. 340. Hab. in Montevideo. Var. fol. ovato-lanceolatis.

**\*\* Fol. plus minusve lanceolatis.**

12. *amplexicaulis*, subcanescentes, fol. lanceolatis amplexicaulibus pilosis, pedunc. axillaribus elongatis. Cav. ic. t. 125. Willd. sp. p. 650. Roth cat. 2. p. 12. In Hispania in muro arcis Saguntinae. Bract. carinatae. Sem. 2. R. Psyllium?

β? *lagopoides*, fol. lanceolatis nervosis ciliatis, caul. sulcoso, pedunc. axillaribus, spic. ovatis: bracteis membranaceis. Desf. atl. 1. p. 133. t. 39. In Barbariae arenosis.

13. *villosa*, subcaulescens, fol. lineari-lanceolatis, obsolete trinerviis subdentulatis villosis-canescens, spic. subrotunda, bracteis alatis carinatis flore brevioribus. Roth. Cat. 2. p. 11. Moench meth. p. 459. Sem. 2. hinc convexa, inde plana, brunnea. R.

14. *pilosa*, fol. lineari-lanceolatis pilosis trinerviis integerrimis, scapo tereti pilosissimo, spic. ovato-oblonga bract. linearibus rigidiusculis squarrosa. Roth. 1. c. p. 10. t. 1. Hab. in Hispania? Caps. disperma. Cor. quasi ringens. R.

15. *nutans*, subcaulescens, fol. lanceolato-acutis hirsutis, spic. subnutante capitata bract. membrana eis lineata notatis. Poir. enc. 4. p. 381. Hab. in Malaga, Hispania. Sem. 3-4, nigra compressa. P.

16. *altissima*, fol. lanceolatis quinque-nerviis dentatis glabris, spica oblongo-cylindrica, scapo angulato scabro. Jacq. obs. 4. t. 83. Hab. in Italia. Folia sesquipedalia. ¶

17. *lanceolata*, fol. lanceolatis, spica subovata nulla, scapo angulato. Habit. in campis sterilibus. Var. scapo polystachio.

γ. *sylovatica*, altior, spicis longis cylindricis.

Υ. *atrata*, fol. lanceolat. subdentatis, scapo tereti hirsuto, spic. subovata nigricante. Hoppe. In Alpibus Salisburgens.

18. *capensis*, fol. ellipticis, spicae floribus distinctis. Thunb. prod. 29. Habit. ad Cap. b. spci.

19. *Lagopus*, fol. lanceolatis subdentulatis, spica ovata albo-tomentosa, scapo tereti piloso. L. Moris. hist. 3. 2. 8. t. 16. f. 13. Hab. in G. Narbonensi, Hispania.

20. *Iusitanica*, fol. lato-lanceolatis trinerviis subdentatis subpilosis, scapo angulato, spica oblonga hirsuta. Lin. Vid. Link in Schradlers Bot. Journ. 1800. p. 58. Hab. in Hispania et Lusitania. Spica Pl. Lagopi, sed oblonga. ¶

21. *patagonica*, fol. lanceolato-lineari-bus subcanaliculatis integerrimis lanatopilosis, scapo tereti hirsuto, spicis cylindricis, staminibus tubum corollae non superantibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 306. Collect. suppl. 35. Habit. in Patagonia. Affinis sequenti. ○

22. *albicans*, fol. lanceolatis obliquis villosis, spica cylindrica erecta, scapo tereti. L. Cav. ic. 2. t. 124? Desf. atl. 1. p. 136. Hab. in Hispania, Narbonae et Barbariae aridis. β? P. minuta Pall. it. 2. tab. E. fig. 1. a 6. ab hac vix differre videtur. ¶

23. *argentea*, fol. angusto-lanceolatis integerrimis sericeis incanis, scapo laevi, spic. tereti flor. congestis. Desf. atl. p. 136. spic. ovata villosa. Lam. ill. p. 340. P. monosperma. Pourret Chlor. Narb. p. 29. Hab. in Barbar. et Gall. meridion.

24. *victoralis*, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus, spic. subrotunda basi scapoque subangulato-villosis. Gerard. Galloprov. Poir. encyc. 4. p. 377. Hab. in Gall.

meridion. praesertim ad montem Victoire prope Aix.

25. *gracilis*, fol. lanceolatis serratis subnudis, spica gracili glaberrima. Poir. it. 2. p. 115. Lam. ill. p. 341. Hab. in Barbariae collib. aridis, petrosis.

26. *interrupta*, fol. lanceolatis integris villosis, spica filiformi interrupta. Poir. enc. 4. p. 375. P. sparsiflora. Mich. Cresc. in Amer. septentr.

27. *Bellarði*, fol. lineari-lanceolatis scap. tereti hirsuto altioribus, spic. ovata. Vahl. symb. 2. p. 31. Willd. sp. 1. p. 646. scap. fol. longitudine, spic. cylindricis. Allioni pedem. t. 85. P. *holostea*. Lam. Poir. enc. l. c. p. 378. et P. *villosa*. Lam. ill. p. 340.  $\beta$ . pilosa. Lam. l. c. Habit. in Hispania, Italia et in Barbariae sabulosis. Var.  $\alpha$ . magnitudine insigni, et  $\beta$  parvitate distinguitur. P.

28. *ciliata*, fol. incanis angusto-lanceolatis, scap. hirsuto fol. adaequante, spic. rotundata, cor. ciliatis. Desf. p. 137. t. 39. f. 3. Hab. in Barbariae arenosis desertis.

29. *remota*, fol. lineari-lanceolatis integris nudis basi lanatis, spic. longis glabris, flor. remotis. Lam. ill. p. 341. Habit. ad Ca. b. spei.

30. *Myosuros*, minuta, fol. lineari-lanceolatis trinerviis glabris, scap. tereti subpiloso, spic. cylindrica. Lam. ill. p. 342. Lecta in Montevidéo a Commerson. Myos. minimum refert.

31. *limensis*, fol. lanceolato-linearibus, trinerviis, denticulis rarissimis, spic. ovato-cylindrica. Flor. Peruv. 1. p. 51. t. 78. P. hirsuta. Hab. in collibus Lima.

\*\*\* *Fol. ut plurimum linearibus, nec subulatis, neque laciniatis.*

32. *microcephala*, fol. linearib. longissimis striatis villosis, scapo pubescente filiformi, spica minima nuda. Poir. enc. 4. p. 378. Col. in Hort. Paris. Sponte in India? †

33. *velutina*, fol. linearib. acutis villososericeis, spica brevi subglabra, bract. obtusis ciliatis. Poir. l. c. p. 379. Hab. in Italia, Calabria. Rad. crassa, elongata, flexuosa.

34. *glomerata*, minuta, fol. linearibus angustissimis villosis-ciliatis, scapo filiformi subpubescente, spica pauciflora glaberrima. Poir. l. c. p. 385. Cresc. in ins. Teneriffa. 2. unc. vix longa.

35. *pigmaea*, villosa, fol. linearib. integerrimis, scapo fol. brevior, spic. capitata lanuginosa. Lam. ill. p. 341. Hab. ...

36. *scorsoneraefolia*, fol. linearibus nervosis nudis, scapo tereti, spica cylindrica glabra. Lam. ill. p. 342. Tournef. coroll. 5. Hab. in Oriente.

37. *scirpoides*, fol. linearib. longissimis trinerviis nudis, scapo tereti, spica ovata. Lam. ill. p. 342. Poir. enc. 380. Hab. in Hispania?

38. *montana*, fol. linearib. pilosis, scapo tereti hirsuto, spica ovata villosa. Lam. ill. p. 341. In montosis et prope Montpellier. Rad. longa fusiformis.

39. *hispidula*, acanl. fol. linearib. integerrimis, scapis longissimis scabris, spica longa. Flor. Per. 51. t. 78. In Chile arenosis.

40. *hirsuta*, fol. linearib. ciliatis, spica cylindrica, scapo hirsuto. L. Habit. ad Cap. b. spei.

41. *alpina*, fol. linearibus planis, scapo tereti hirsuto, spica oblonga erecta. Jacq. hort. t. 125. Hab. in Helvetiae, Austriae alpinis. †

42. *cretica*, fol. linearibus, scapo tereti brevissimo lanato, spica subrotunda nutante. P. cretica minima tomentosa, caule alunco. Tournef. cor. 5. Hab. in Creta. ☉

43. *maritima*, fol. linearibus subtus canaliculatis integerrimis basi lanatis, scapo tereti.  $\beta$ . *dentata*, fol. lanceolatis carnosius planiusculis glabris tricostatis hinc inde dentatis: dentibus ramosis retiusculis, scapo tereti. Roth. germ. I. 61. II. 173. Hab. in littoribus maritimis locisque salis.

44. *graminea*, fol. linearibus subnudis remotissime dentatis, scapo tereti hirsuto, spic. cylindricis. Lam. ill. p. 343. Doell. pempt. ic. Hab. in Gall. meridon. maritimis et montosis. †

45. *recurvata*, fol. linearibus canaliculatis recurvatis nudis. Mant. 2. p. 168. Murr. Comm. goett. 1780. p. 19. tab. 6.  $\beta$ ? *serpentina*. Lam. ill. p. 345. Poir. enc. 4. p. 383. Hab. in Europa australi, Oriente.

\*\*\*\* *Fol. laciniatis dentatis in corn. rangiferin. formam.*

46. *Coronopus*, fol. subhirsutis, semipinnatis: pinnis raris lanceolatis. Hall. helv. n°. 658. Blakw. t. 460. Willd. p. 648.  $\beta$ . *Columnae*, fol. bipinnatis, basi lanatis,

folioli confluentibus, summis auriculatis, scapo tereti. Gouan. illust. p. 6. Habit. in Europae et Barbariae glaciosis. ☉

Y? *Cornuti*, fol. pinnatis: pinnis inaequalibus et distantibus, scapo tereti, stylis longissimis, filamentis brevissimis. Jacq. ic. rar. 1. t. 27. Misc. 2. p. 351.

47. *Loeflingii*, fol. linearibus subdentatis, scapo tereti, spica ovata: bracteis carinatis membranaceis. Loefl. it. 124. Jacq. hort. t. 126. Hab. in Hispaniae collibus agrorumque marginibus. Rad. fibrosae. Fol. caespitosa. P. Coronopo minor et praecocior.

48. *macrorhiza*, fol. spatulatis serratis subnullis, spica cylindrica. Poir. it. 2. p. 154. Vahl. symb. 2. p. 31. Willd. sp. p. 648. P. crithmoides. Desf. Mor. s. 8. t. 17. f. 36. In Barbaria ad vias et littora maris. ☿

49. *ulopecurioides*, fol. linearibus praelongis, superne rariter dentatis calycibusque ciliatis, spica longissima. Poir. in enc. bot. 4. p. 387. Lam. ill. 1. p. 342. Hab. in Barbaria.

50. *Serraria*, fol. lanceolatis 5-nerviis dentato-serratis scapo tereti tomentoso, spica longissima. Lin. P. apula laciniata huiusmodi. Col. cephr. t. 259. Hab. in umbris subhumidis Barbariae, Apuliae et Germaniae. Rad. crassa subfrutescens. Poir. enc. l. c.

51. *barbata*, fol. spatulato-lanceolatis dentatis, capit. subquadrifloris. Forst. Comment. Goettl. 9. p. 25. t. 4.

\*\*\*\*\* *Fol. subulatis.*

52. *sericea*, caule decumbente suffruticoso, fol. lineari-subulatis incurvis sericeis, spica ovata. Flor. Peruv. p. 51. t. 79. f. b. Hab. in collibus Tarmae.

53. *congesta*, caule suffruticoso patente, fol. lineari-subulatis, spica ovato-oblonga. Flor. Per. l. c. Cresc. in eodem antecedentis loco.

54. *triquetra*, fol. subulatis triquetris striatis scabris, scapo tereti. P. *subulata*. Lin. P. fol. triangulari-prismaticis. Guett. Stamp. 2. p. 428. Lob. ic. 439. Habit. in mariuinis Mediterranei. Rad. crassa. Fol. conferta. ☿

55. *aristata*, fol. subsetaceo-linearibus, spica oblongo-cylindrica, bracteis subulato aristatis flor. longioribus. Michaux. Flora 1. p. 95. Hab. in pratensib. Illinoensium.

56. *philippica*, fol. subulatis villosis, scapo nudo fol. aequante, spic. ovatis. Cav.

ic. 4. p. 35. t. 359. f. 2. Hab. in St. Cruz, in insulis Philippicis. Cor. quadrifida alba, centro violacea. Cav. ☉

†† *Psyllia*, caule ramoso folioso, fol. linearibus. (Flor. capituli. Caps. 2-locularis, 2-sperma. Juss.)

57. *Psyllium*, caul. ramoso herbaceo, fol. subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. Hab. in Europa australi, inter segetes.

58. *stricta*, caul. ramoso erecto herbaceo, fol. linearibus canaliculatis integerrimis, capitul. aphyllis. Schousb. maroc. 1. p. 69. ic. 145. *Psyllium majus erectum*. C. B. p. 191. Moris. s. 8. t. 17. f. 2. Cresc. in agris circa Mogadore. A priori vix specie diversa videtur.

\* *arenaria*, caule ramoso, subherbaceo, fol. pubescentibus subviscosis, spicis ovatis compactis subfoliosis. Poir. in enc. bot. 4. p. 392. P. *arenaria*, herbacea pilosocana, caule erecto, fol. subintegerrimis, capit. ovatis, bracteis calycibusque ovatis. Plant. rar. Hung. p. 51. t. 51? Videtur Plant. *Psyllium* auctor. et ab Linnaeano vix diversa. Hab. in arenosis.

59. *egyptiaca*, caule ramoso herbaceo decumbente, fol. linearibus integerrimis, capit. longe foliosis laxis. Jacq. ic. rar. 1. t. 28. Collect. 1. p. 45. P. *squarrosa*. Murr. Willd. sp. 1. p. 650. Hab. in Aegypto.

60. *parviflora*, fol. oppositis linearibus ciliatis, pedunc. folio brevioribus, spic. rotundis, bract. adpressis cal. aequantibus. Desf. atl. 1. p. 141. Hab. in Barbaria. Rad. longa, tortuosa.

61. *arborescens*, fol. filiformibus confertis glaberrimis pedunc. longioribus, capit. paucifloris aphyllis, caul. arborescente. Poir. in enc. bot. 4. p. 389. Hab. in Insul. canariens. Broussonet. Ramosa, lignea, dura cortice cinereo.

62. *genevensis*, fol. angustissimis confertis recurvis pedunc. brevioribus, capit. aphyllis glabris, caule fruticoso. Poir. l. c. p. 390. Hab. in montibus prope Genève. P. *Cynops* affinis.

63. *Cynops*, caule ramoso suffruticoso, fol. integerrimis filiformibus strictis, capit. subfoliatis. Pall. it. 3. p. 626. Moris. s. 8. t. 17. f. 1. Hab. in Gallo-Provincia, Italia, Sibiria. ♀

64. *indica*, caule ramoso herbaceo, fol. integerrimis reflexis, capitulis foliosis. Hab. in Aegypto et circa Astracan.

65. *afra*, caule ramoso fruticoso, foliis lanceolatis dentatis, capitulis aphyllis. Moris. s. 8. t. 19. f. 4. Hab. in Sicilia, Barbaria.

66. *pumila*, caule ramoso herbaceo, fol. integerrimis carnosiss., ramis laevibus. Län. suppl. 125. P. (*exigua*). Murr. comm. goett. 1778. p. 94. t. 5. Hab. in Europa australi. ☉

287. **CENTUNCULUS.** *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida: limbo patente. *Stam.* brevia. *Caps.* 1-locularis, circumscissa, polysperma.

1. *minimus*, fol. alternis ovatis, flor. sessilibus, Curt. Lond. t. 11. Sowerb. engl. bot. t. 531. Vaill. bor. t. 4. f. 2. Habit. in uliginosis, pascuis et ericetis inundatis. ☉

2. *lanceolatus*, fol. deorsum angustatis: inferioribus ovalibus, superioribus lanceolatis; flor. pedicellatis. Michaux, 1. p. 94. Hab. in Carolinae udis. ☉

288. **SPIELMANNIA.** *Cal.* 5-fidus. *Cor.* fauce barbata: limbo 5-lobo subæquali. *Stigma* ducinum. *Drupa* nuce biloculari.

1. *africana*. Lam. ill. 1. p. 336. t. 85. Lantana. Län. Willd. sp. 3. p. 321. Spielm. Jasminum. Medic. in act. palat. 3. p. 196. t. 15. *Stam.* aequalia.

289. **SCOPARIA.** *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-partita, rotata, fauce pilosa. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *dulcis*, fol. ternis, floribus pedunculatis. Willd. sp. 1. p. 652. Lam. ill. t. . . . Vahl. symb. 1. p. 12. Habit. in Jamaica, Curassao. ☉

2. *procumbens*, fol. quaternis, floribus sessilibus. Jacq. amer. 18. Hab. in America caidiore. ☉

3. *arborea*, fol. lanceolatis alternis integerrimis, corymbo supradecomposito trichotomo. Län. suppl. 125. Hab. ad Cup. b. spei. Arbor habitu Oleae s. Phillyreae. An hujus generis? h

290. **BARTONIA.** *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* campanulata, 4-fida, persistens. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *tenella*. Muhlenberg, Willd. in Act. Soc. natur. cur. Berol. 4. v. 3. Hab. in Philadelphia. Primo obtutu Bufoniae tenuifoliae similis.

291. **SANGUISORBA.** *Cal.* 2-phyllus inferus. *Cor.* supera. *Græmen* inter calycem corollamque.

1. *officinalis*, spicis ovatis, *stam.* cor. subæqualibus. Flor. dan. t. 97. *β.* *auriculata*, altior, fol. auriculatis. Hab. in pratis siccioribus.

2. *mauritanica*, villosa, fol. profunde serratis, spic. ovatis (virescentibus), calyce rugoso. Desf. Atl. 1. p. 142. Moris. s. 8. t. 18. f. 4. Priori affinis; foliola profundius serrata. Habit. in Algeriae sepibus. ☞

3. *media*, spicis cylindricis, *stam.* cor. longioribus. Moris. s. 8. t. 18. f. 2. Hab. in Canada. ☞

4. *canadensis*, spicis longissimis, *stam.* cor. triplo longioribus. Lam. ill. p. 344. spicis albidis dignis. Michaux. Flora p. 100. Cornut. canad. 175. t. 174. Habit. in Canada, Sibiria. ☞

292. **KRAMERIA.** *Cal.* o. *Cor.* 4-5-petala. *Nectarium* 4-phyllum, biforme. *Antheræ* perforatæ. *Drupa* echinata.

1. *triandra*, fol. obl. obovatisque acuminatis, tomentosis, flor. triandris. Flor. Per. 1. p. 61. t. 93. Hab. in Peruviae montium declivibus, in arenosis. h

2. *Irina*, fol. lanceolatis, racemo terminali, cor. 4-petalis. Län. Willd. s. pl. 1. p. 693. Hab. in Cumana Americæ. h

3. *cytisoides*, fol. alternis ternatis tomentosis, racem. terminalibus, cor. 5-petalis Cav. ic. 4. p. 60. t. 390. Hab. in N. Hispania. Ad latus germinis foliola 2 ovata, et ex filam. basi exsurgunt corpuscula 3, filiformia, nectarium vulgo nominata. Cav.

4. *linearis*, fol. lineari-attenuatis, pedunc. plitariis, cor. 5-petalis. Flor. Per. 1. p. 62. t. 94. f. a. Hab. in Peruv. collibus argillosis. h

293. **ACÆNA.** *Cal.* 4-5-phyllus, superus. *Cor.* o. *Filam.* 2-4-5. *Nect.* o. *Stigm.* penicillatum. *Drupa* angulata obovata, glochidibus echinata. (Fol. imparipinnata.)

1. *Jappacea*, caul. erecto, foliolis oblongis obovatisque serratis, racem. paucifloris. Flor. Per. 1. p. 66. t. 93. f. a. Cresc. in locis calidis et præruptis Tarmæ. Repens villosa. Autumno. h

2. *trifida*, caulib. erectis, foliol. cuneiformib. trifidis, spicis globosis. Flor. Per. 1. p. 67. t. 97. f. c. In regni chilensis pascuis, campis et collib. Vere ob fructus vestibus adhaerentes *Amor seco* ab incolis nuncupatur.

3. *argentea*, caule repente, foliolis ovato-oblongis, spic. globosis. Flor. Per. 67. t. 93. Fewill. 3. p. 55. t. 41. Cum priore abunde in uliginosis arvisque. Vernacule Broquin. Pl. medicinalis.  $\overline{\text{T}}$

4. *ovalis*, caule repente, foliol. ovalibus profunde serratis linearis, spic. globosis. Fl. Per. 1. c. In locis umbrosis et humidis Pillao.  $\overline{\text{T}}$

5. *cylindristachya*, scapis prostratis, foliol. oblongis argute serratis, spic. cylindricis. Flor. Per. 1. p. 68. t. 104. Habit. in collib. frigidis Tarmae.  $\overline{\text{T}}$

6. *pinnatifida*, scap. erectis, foliolis obovatis pinnatifidis, spic. longis interruptis. Flor. Per. 1. c. fig. b. In Chile collibus Incana.  $\overline{\text{T}}$

294. *CISSUS*. *Cal.* quadridentatus inferus. *Petala* 4. libera reflexopatula decidua. *Nect.* Discus germin cingens. *Bacca* 2-locularis, 1-2-4-sperma. (Siam. passim 5.)

\* *Foliis simplicibus, plerisque.*

1. *compressicaulis*, fol. cordatis acute serratis, flor. umbellatis, pedunc. dichotomis. Flor. Peruv. 1. p. 64. t. 100. Hab. in Chancay rudratis.

2. *Ampelopsis*, fol. cordatis dentatis, racemis duplici-to-bifidis, flor. 5-andris. *Ampelopsis* cordata. Michaux. Flor. 1. p. 159. Hab. in Amer. bor. in dumetis et ad ripas amnis Savannah. Fol. superne passim angulata.

3. *vitiginea*, fol. cordato-subrotundis lobatis subindivisisque villosis dentatis. Vahl. symb. 3. p. 18. Pluck. mant. t. 337. f. 4. Hab. in India.  $\overline{\text{h}}$

4. *repanda*, fol. cordatis integris sublobatisve repantis utrinque glabris. Vahl. symb. 3. p. 18. Hab. in India orientali. Rami teretes, flexuosi.

5. *latifolia*, fol. cordato-ovatis villosis acuminatis setaceo-serratis, ramis tetragonis. Vahl. symb. 3. p. 18. Willd. sp. 1. p. 656. Hab. in Indiae orientalis et Madagascariae sylvis.  $\overline{\text{h}}$

6. *cordifolia*, fol. cordatis integerrimis. Hab. in America. Fol. magna.  $\overline{\text{T}}$

7. *rotundifolia*, fol. cordato-subrotundis serratis. Vahl. symb. 3. p. 19. Saclanthus. Forsk. descr. p. 35. tab. 4. Habit. in sylvis Arabiae felicis.

8. *Sicyoides*, foliis subcordatis nudis, setaceo-serratis, ramulis teretibus. Swartz. obs. 48. Lam. ill. t. 84. f. In Jamaica.  $\overline{\text{T}}$

9. *quadrangularis*, fol. cordatis dentatis carnosiss serrato-dentatis, caule tetragono-tumidiusculo. L. Mant. 37. Saclanthus quadragonos. Forsk. descr. p. 33. tab. 2. Rumph. amb. 5. p. 83. t. 44. f. 2. Habit. in Arabia, India. Caulis longissimus.  $\overline{\text{T}}$

\*\* *Foliis angulatis.*

10. *tomentosa*, fol. subpentagonis obtuse dentatis, subus tomentoso-ferrugineis. Lam. ill. 1. p. 380. Hab. in Ins. Bourboniae. Fol. basi truncata.

11. *angulata*, fol. subpentagonis angulato-lobatis crenulatis subus tomentosis. Lam. p. 331. Hab. in India orientali.

12. *capensis*, fol. 5-angularibus dentatis subus ferrugineo-tomentosis, flor. subcapitatis. Thunb. prod. p. 44. Hab. ad Cap. b. spei.

\*\*\* *Foliis ternatis,*

13. *acida*, fol. ternatis obovatis glabris carnosiss incisiss. Sloan. iam. 108. bist. 1. p. 233. t. 142. f. 6. Pluck. alm. 71. t. 152. f. 2. Hab. in America calidiore.  $\overline{\text{h}}$

14. *cinerea*, fol. ternatis, foliol. pubescentibus dentatis: lateralibus subcordatis, petiol. teretibus. Lam. ill. p. 332. In India orientali.

15. *cirrrosa*, fol. ternatis villosis, foliol. ovatis serratis. Vitis cirrhosa. Thunb. prod. 44. Hab. in Cap. b. spei.

16. *alata*, fol. ternatis subrotundis lirsutis subdentatis, ramis membranaceo-angulatis. Jacq. amer. 23. t. 182. f. 10. O. trifoliate. L. Hab. in Jamaica. Scandit superatque altissimas arbores.  $\overline{\text{T}}$

17. *mic-ocarpa*, fol. ternatis oblongis serratis glabris membranaceis. Vahl. cclg. 1. p. 16. Plum. Cat. p. 18. Ic. t. 259. f. 4. Hab. in India occidentali.  $\overline{\text{h}}$

18. *crenata*, fol. ternatis, foliol. subrotundis crenatis. Vahl. symb. 3. p. 19. Vitis trifolia. L. Rumph. amb. 5. p. 450. t. 166. f. 2. Hab. in India orientali.  $\overline{\text{h}}$

19. *carnosa*, fol. ternatis ovatis obtusiss serratis glabris, ramis petiolisque teretibus. Vahl. symb. 3. p. 19. Lam. encyclop. 1. p. 31. Rheed. mal. 7. p. 17. t. 9. Hab. in India orientali.

20. *obovata*, fol. ternatis, foliol. obovatis integerrimis glabris. Vahl. symb. 3. p. 19. Hab. in ins. St. Crucis.

\*\*\*\* *Foliis quinatis.*

21. *hederacea*, caul. radicante scandente, fol. quinato-digitatis, racem. subsessilib., flor. 5-andris. Hedera quinquefolia. L. Ampelopsis. Michaux. Hab. in America. In hortis ad parietes tegendos optime adhibetur. Foliola superne dentata.

22. *pentaphylla*, (tenuis) fol. quinatis, foliol. indivisis serratis, caule herbaceo filiformi. Vitis pentaphylla. Thunb. jap. 105. Hab. in Japonia. Flor. racemosi. ¶

23. *striata*, fol. quinato-digitatis: foliol. serratis, caul. striato-flexuoso, cymis coarctatis. Flor. Per. 1. p. 64. t. 100.

24. *granulosa*, fol. quinatis: foliolis obovatis, caul. angulato granuloso. Flor. Per. 1. c. t. 101. In Peruv. praeurptis.

\*\*\*\*\* *Foliis pedatis.*

25. *pedata*, fol. pedatis, foliol. lanceolatis serratis, subtus tomentosis. Vahl. symb. 3. p. 20. Lam. encycloped. t. p. 31. Rheed. mal. 7, p. 17. t. 10. In India. An hujus generis, cum fructus quadrilobulatus sit? Habit. in India orientali. ¶

26. *japonica*, fol. pinnatis subpedatis glabris, foliol. crenatis: crenis aristatis. Willd. sp. 1. p. 659. Vitis japonica Thunb. In Japonia. ¶

\*\*\*\*\* *Foliis pinnatis: foliolis oppositis.*

27. *obliqua*, fol. simpliciter pinnatis, foliol. 2-3 oblique cordatis. Flor. Per. 1. p. 65. t. 101. In Tarmae praeurptis. Flor. corymbosi.

28? *Mappia*, fol. subbipinnatis: foliol. ovatis integerrimis. Lam. ill. p. 332. Hab. in ins. Franciae.

29. *orientalis*, fol. bipinnatis, foliol. ovatis serratis, caul. frutescente scandente? Lam. 1. c. t. 84. f. 2. In Oriente. Pinna lateralis ex foliolis 3 constat.

30. *stans*, fol. bipinnatis, foliol. inciso-serratis, flor. pentandris, caul. arborescente. Vitis arbores. Lin. Ampelopsis. bipinnata. Michaux. Hab. in Carolina et Virginia.

*Obs.* Petalis liberis, nec calyptratum cohaerentibus, stam. ut plurimum 4, facili ramorum ad nodos solubilitate hoc genus praecipue a Vite differt. Auct. Flor. Boreali-americanae et specibus 2, 21 et 28 ob

numerum staminum quinarium distinctum constituit genus.

295. *EPIMEDIUM*. *Nectararia* 4, cyathiformia, petalis incumbentia. Cor. 4-petala. Cal. caducus.

1. *alpinum*. Engl. bot. t. 439. Batsch. Anal. flor. 1. n.º 10. Hab. in Alpium umbrosis. ¶

296. *CORNUS*. *Involucrum* 4-phyllum saepius. Petala supera 4. Drupa nuce 2-loculari.

\* *Involucrata umbellata.*

1. *suecica*, herbacea, foliis omnibus oppositis sessilibus nervosis. Willd. phytog. 1. p. 3. n.º 12. et sp. 1. p. 660. herbacea ramis binis. L. Flor. lapp. 63. t. 5. f. 3. Hab. in Europa et Asia boreali inque Kamtschatka.

2. *canadensis*, herbacea, fol. summis verticillatis subpetiolatis venosis. Willd. 1. c. P'Herit. Corn. n.º 2. t. 1. In Canada, Labrador etc. Fructus globosus.

3. *florida*, arborea, involucro maximo: foliol. obovatis. L. P'Herit. Corn. n.º 3. Casteb. carol. 27. t. 27. Hab. in Virginiae sylvis. Fructus ovatus.

4. *mascula*, arborea, umbellis involucrum aequantibus. In saepibus Europae. Vere floret, priusquam folia erumpunt.

\*\* *Nudae cymosae.*

5. *sanguinea*, ramis rectis, fol. ovatis concoloribus, cymis depressis. P'Herit. Corn. n.º 5. Hab. in Europae, Asiae, Americae borealis dumetis, ad saepes. Fruct. niger. ¶

6. *alba*, ramis recurvatis, foliis lato-ovatis subtus canis, cymis depressis. P'Her. n.º 7. Hab. in Sibiria, Canada. Fructus albus. ¶

7. *sericea*, (caerulea), ramis patulis fol. ovatis subtus ferrugineo-sericeis, cymis depressis. P'Herit. t. 2. Willd. arb. 75. C. Amomum. Vogel ic. rar. t. 101. C. caerulea. Lam. Hab. in Carolina meridionali, Pennsylvania. Fructus caerulei. ¶

8. *circinata*, ramis verrucosis, foliis orbiculatis subtus tomentosis canis, cymis depressis. P'Herit. n.º 8. t. 3. C. tomentosa. Michaux. 91. Hab. in Pennsylvania. ¶

9. *stolonifera*, caul. inclinato, ramis debilibus, fol. ovalibus utrinque subpalmatis subtus albicantibus, cymis parvulis. Michaux. Flor. L. p. 92. Cresc. ad

ripas Canadae et N. Angliae. Frutex stoloniferus, purpurasc.

10. *fastigiata*, subglabra, ramis strictis fastigiatis, fol. ovalib, longe acuminatis, cymis longius pedunc. Michaux. Habit. in dumosis et ad ripas Virginiae, Carolinae. Sequenti affinis. Ramuli fusci subquadrang.

11. *stricta*, ramis strictis, foliis ovatis concoloribus nudiusculis, cymis paniculat. l'Herit. t. 4. Habit. in America septentr.

12. *paniculata*, ramis erectis, foliis ovatis subtus canis, cymis paniculat. l'Her. n.º. 10. t. 5. C. *ruemosa*, cymis paniculato-racemosis. Lam. ill. p. 303. Hab. in America septentrionali. h

13. *alternifolia*, fol. alternis. Lin. supp. 125. l'Herit. Corn. n.º 11. t. 6. Var. ramulis rubris et viridibus, apice corymbosis. In America septentrionali. Petala revoluta. h

267. FUSANUS. *Cal.* supernus, 4-fidus. *Cor.* o. *Stylus*. subnulus. *Stigm.* 4. *Drupa* 1-sperma.

1. *compressus*. Linn. syst. veg. ed. 13. Lam. ill. t. 77. Thesium Colpoen. Lin. supp. p. 161. Berg. cap. t. 1. f. 1. Hab. ad Cap. bon. spei. Arb. ramis compressis. Racemi axillares.

298. GLOSSOMA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Anth.* membrana coherentes. *Stigma* 4-fidum. *Drupa* nuce sulcata, 1-sperma.

1. *arborescens*. Willd. sp. 2. p. 664. Votomita gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 91. t. 35. Habit. in sylvis Gujanac. h

299. SAMARA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* basi petali inserta. *Stigm.* infundibuliforme. *Drupa*. 1-sperma.

1. *lactea*, floribus confertis pedicellatis, fol. ovatis obtusis. Swartz. prod. 151. Lam. ill. t. 74. Memecylon umbellatum. Liu. Fl. zeyl. 469. Burm. Zeyl. 96. t. 31. In India orientali. Flor. infra folia.

2. *coriacea*, floribus sessilibus conglomeratis, fol. lanceolato-ovatis acutis subcoriaceis. Sw. flor. 1. p. 261. In Jamaicae sylvis montosis. h

3. *pentandra*, floribus pentandris, fol. ellipticis. Ait. Kew. 1. p. 160. Habit. ad Cap. b. spei. h

4. *floribunda*, floribus pentandris, fol.

obovatis. Willd. sp. 1. p. 665. Rapanea gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 121. t. 46. Hab. ad pratorum margines Cajennae et Gujanac. h

300. FAGARA. *Cal.* 4-5-fidus. *Cor.* 4-5-petala. *Caps.* 2-valvis, monosperma, simplex aut multiplex. (*Stam.* 4. 5 et 8.)

1. *triphylla*, fol. ternatis, foliol. ovatis acumin. integerrimis, paniculis supraaxillaribus. Willd. sp. 1. p. 666. Lam. encycl. 2. p. 443. Rumph. amb. 2. p. 138. t. 62. Hab. in insulis Philippinis. h

2. *Evoidia*, fol. ternatis, foliol. lanceolatis integerrimis. Willd. Evoidia hortensis. Forst. char. gen. p. 13. t. 7. Hab. in insulis Americarum et novis Hebridibus. Vix a praecedente diversa. h

3. *Pterota*, fol. pinnatis, foliol. obov. emarginatis, petiolo communi marginato articulo intermi. Willd. Lam. ill. t. 84. Brow. Jam. 146. t. 5. f. 1. Hab. in Jamaica. Odor hircosus. h

4. *Piperita*, fol. pinnatis, foliol. oblongis basi inaequalibus crenatis. Thunb. Jap. 64. Kaempf. amoen. t. 893. Habit. in Japonia. h

5. *tragodes*, fol. pinnatis, foliol. cuneiformibus emarginatis, petiolo communi alato-articulato aculeato. W. Jacq. amer. 21. t. 14. Hab. in America. Pterotae nimis adfinis. h

6. *Zanthoxyloides*, petiolis costisque foliorum aculeatis, floribus quinquifidis dioicis. Lam. encyclop. 2. p. 402. Hab. in Senegal et Guinea. h

7. *horrida*, fol. pinnatis, pinnis ovatis crenatis, spinis ramorum spinosis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 329. Hab. in Japonia. h

8. *capensis*, fol. pinnatis : pinnis ovatis obtusis crenatis, ramis aculeatis flexuosis. Thunb. prod. 28. Habit. ad Cap. b. spei. h

9. *armata*, fol. pinnatis : pinnis crenatis, ramis petiolisque aculeatis. Thunb. prod. 28. Hab. ad Cap. b. spei. h

10. *Avicennae*, fol. pinnatis : foliolis lanceolatis integerrimis glabris. Willd. 2. p. 668. Lam. encyclop. 1. p. 441. Lobel. ic. 2. t. 133. Hab. in China. h

11. *octandra*, fol. pinnatis utrinque tomentosis : foliol. ovatis dematis, petiolo communi articulo-alato, flor. octandris. Willd. sp. p. 668. Habit. in Curacao duris. An cum sequente distincti generis? h

12. *claphrium*,



12. *Elaphrium*, foliis pinnatis glabris: foliol. oblongo-lanceolatis obtuse dentatis, petiolo communi articulato-alato, floribus octandris. Willd. Jacq. amer. 106. t. 71. f. 3. Hab. in Caribagenae fruticis marit. h

301. HARTOGIA. *Cal.* 4-fidus. *Petal.* 4, patentia. *Drupa* ovata. *Nuce* 2-sperma.

1. *capensis*. Lin. suppl. 128. Thunb. Diss. N. G. 5. p. 87. c. ic. Willd. sp. 1. p. 669. Schrebera schinoides. Thunb. prod. p. 28. t. 2. Hab. in Cap. b. spei sylv. Mygindae species? h

302. AZIMA. *Cal.* 4-fidus, urceolatus. *Cor.* 4-petala. *Bacca* 2-locularis: loculis 2-spermis: 1 saepius abortivo.

1. *tetracantha*, fol. oppositis petiolatis ovato-lanceolatis glabris apice pungentib.; spinis stipularibus quaternis. Lam. enc. 1. p. 319. Seb. th. 1. t. 13. f. 1. Monetia barlerioides. L'Her. Willd. In India et ad Cap. b. sp. h

303. BLACKBURNIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus inferus. *Stigm.* simplex. *Bacca*? monosperma.

1. *pinnata*. Forst. char. gen. p. 12. t. 6. Ptelea pinnata. Lin. sup. 126. Hab. in insul. deserta Norfolk. h

304. PTELEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Stigmata* 2. *Caps.* rotundata membranaceo-alata, 2-locular. 2-sperma.

1. *trifoliata*, fol. ternatis. Trew. rar. 12. t. 9. Hab. in Virginia. Flor. passim apetalis et abortiunt. h

305. GYROCARPOS. Flor. polygami. *Cal.* 4-partitus inaequalis. *Cor.* o. Nect. 4. *Stigm.* sessile. *Caps.* 1-locularis, 1-sperma. 5-alata.

1. *Jacq. ini*. Roxbourg. Corom. t. 1. G. Americanus Jacq. amer. pict. t. 263. f. 50. H. in Caribagenae sylv. et Coromandelinae montosis. Arbor elegans, procera. Pueri ludendi gratia fructus in altum projicere solent, qui ob alas lente et in gyros descendunt. Inde nomen.

306. SKIMMIA. *Petal.* 4 concava. *Cal.* 4-partitus. *Bacca* 4-sperma.

1. *japonica*. Thunb. jap. 62. Habit. in

Japonia. Fol. sempervirentia. Panicula terminalis. h

307. OTHERA. *Petal.* 4 lanceolata. *Cal.* 4-partitus. *Capsula*?

1. *japonica*, flor. aggregatis pedunculatis, stigm. sessili. Lam. ill. p. 310. Thunb. jap. 61. Ej. ic. fasc. 2. Hab. in Japonia. Ilex? h

2. *Oriza*, flor. racemosis, stylo manifesto. Lam. l. c. Oriza japonica. Th. l. c. Willd. Sp. p. 672. In Japonia.

Obs. Ambae plantae ulterius examinandae an diversae aut ejusdem generis sint, fructus enim ignotus est.

308. LUDWIGIA. *Cor.* 4-petala, aut o. *Cal.* 4-partitus, superus: lacini longis persistentib. *Caps.* 4-gona, 4-locularis, infera, polysperma.

\* *Fol. oppositis.*

1. *oppositifolia*, (zeylanica), fol. oppositis lanceolatis, caule diffuso. L. Syst. Veg. p. 135. caule diffuso, fol. lanceolatis, capsulis pedunculatis fol. dimidio breviorib. Fl. zeyl. 66. Hab. in India. h

2. *erigata*, fol. oppositis lanceolatis, caule erecto, flor. terminalibus. Ludwigia triflora. Lam. encycl. 3. p. 538. Habit. in India. Germina tetragono-alata. Capsula subcubica. Lin. ☉

3. *nitida*, caul. assurgente, fol. oppositis ovalibus, flor. axillaribus minimis, caps. subovata. Michaux. Flor. 1. p. 87. Hab. in Carolinae inferioris humidis. Bractae nulae. Majo.

4. *pedunculata*, repens subpubescens, fol. oppositis lineari-lanceolatis glabris, pedunc. axillaribus longissimis, caps. clavato-oblongis. Michaux. p. 88. In paludosis submaritimis Carolin. infer. Flos ratione plantae parvulae maximus. M.

\* *Foliis alternis.*

5. *Jussiaeoides*, erecta glabra, foliis lanceolatis decurrentibus, flor. axillaribus subsessilibus, caps. clavatis oblongis. Michaux. p. 89. Cum priore in aquis umbris.

6. *angustifolia*, erecta ramosissima glabra, fol. linearibus, flor. axillaribus, caps. turbinato-prismatica oblongiuscula. Michaux p. 88. Juxta fossas Car. infer.

7. *virgata*, erecta glabra, ramis virgatis, fol. sessilibus linearibus, flor. subsessilib.

caulis; caps. globoso-4-gonis. Michaux p. 89. In aridis sylvis Carol. infer. Majo.

8. *capitata*, radice repente erecta, fol. sublinearibus, flor. capitatis; petal. calice brevioribus, caps. sub4-gono - semiglobosa. Michaux p. 99. L. suffruticosa. Walter. In aquosis apricis Carol.

9. *macrocarpa*, major subpubescens, fol. longo-lanceolatis acutis, subtus albicantibus, flor. subpedicellatis, caps. globoso-4-gona cal. laciniiis maximis coronata. Michaux p. 89 L. alternifolia. Linn. In Virginiae pratensibus. Fol. in plurimis alterna.

10. *microcarpa*, subprocumbens glaberrima, fol. obovalibus punctis celsosis marginatis, flor. axillaribus apetalis minutis. Michaux. Flor. p. 88. Cresc. in humidis. Folia parvula, obtusa cum mucrone.

11. *mollis*, subtomentoso-pubescent, fol. lanceolatis oblongis, flor. apetalis subterminalibus, caps. subrotundis. Michaux p. 90. In Car. infer. paludosis. Julio.

309. ISNARDIA. *Cal.* campanulatus, 4-fidus. *Cor. o. Caps.* 4-gona, 4-locularis, cal. cincta.

1. *palustris*, fol. ovatis integris. Willd. sp. 2. p. 680. excl. synonym. nonnullis Lam. ill. t. 77. Roth. germ. 2. p. 199. In Europae meridionali et Americae paludosis. Peltidi similis. T.

*Obs.* Non est Ludwigiae species, cum duo haec genera etiam quoad ordines naturales inter se distincta sint.

2. *hastata*, foliis semialexicaulibus hastato-lanceolatis. Flor. Peruv. 1. p. 66. t. 86. f. 2. Hab. in Peruviae paludosis. Suffruticosa.

310. OLDENLANDIA. *Cor.* tetrapetala. *Cal.* 4-partitus, superus. *Caps.* 2-locularis, infera, polyperma; Receptacula libera. G. (Styl. 1-2.)

1. *verticillata*, florib. verticillatis sessilibus, stipulis setigeris. Lin. Willd. sp. 1. p. 674. Rumph. amb. 6. p. 25. t. 10. Hab. in Amboinae, Jamaicae collibus apricis.

2. *trinervia*, caule decumbente, fol. ovatis trinerviis, flor. verticillatis axillaribus, caps. hispidis. Retz. obs. 5. p. 23. Habit. in Indiae umbris praecipue sub Pandano.

3. *glomerata*, decumbens hirsuta, fol. ovalibus, flor. congestis. Michaux. Flor. 1. p. 63. In Cap. infer. humidis.

4. *depressa*; caule diffuso, fol. ellipticis petiolatis glabris, pedunc. geminatis axillaribus. Willd. l. c. p. 675. Rheed. mal. 10. p. 61. t. 31. In India orient. h

5. *capensis*, pedunc. axillaribus unifloris, fol. linearibus acutis. Lin. suppl. 127. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *uniflora*, caule repente, pedunculis simplicissimis lateralibus, fructib. hispidis, fol. subovatis acutis Lin. Flor. Per. 1. p. 54. Hab. in Virginiae, Jamaicae et regni Chilensis aquosis.

7. *biflora*, pedunc. bifloris petiolo longioribus, fol. lanceolatis. Burm. zeyl. 22. t. 11. Hab. in India. ☉

8. *pentandra*, flor. pentandris monogynis, fol. linearibus, pedunc. bifloris. Retz. obs. 4. p. 22. Heuchera dichotoma Murr. comment. goett. 1772. p. 64. t. 17. Habit. in Tranquebaria. ☉

9. *umbellata*, umbel. nudis lateralibus alternis, fol. linearibus. Roxb. coromand. 1. p. 2. t. 3. Hab. in India. T

10. *corymbosa*, pedunc. multiflor. fol. linearis-lanceolatis. Gaertn. de fr. 1. p. 147. Euret. pict. t. 2. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. ☉

11. *hirsuta*, umbel. axillaribus, caule calycibusque hispidis, fol. ovatis acutis. Lin. suppl. 127. Hab. in Java.

12. *debilis*, umbel. axillaribus, pedunc. paucifloris, fol. ovatis sessilibus. Forst. pr. n°. 56. Hab. in insula Tongatabu maris pacifici.

13. *fatida*, umbel. terminali trichotoma, fol. spatulatis. Forst. prodr. n°. 55. Hab. in insula Tongatabu.

*Obs.* Plures, ut videtur, *Oldenlandiae* species cl. Cavanilles in vol. sexto Ic. plant. hisp. sub genere *Hedyotis* descripsit, cum in mentem Lamarckii et Schreberi, et forte nec immerito, duo haec genera haud diversa putet.

311. AMMANNIA. *Cor.* 4-petala, aut 0, calyci inserta. *Cal.* 1-phyllus, plicatus, 8-dentatus, inferus. *Caps.* 4-locularis. (Passim 2-locul. et Stam. 8.)

1. *latifolia*, fol. semialexicaulibus, caul. tetragono, ramis erectis. Lin. Willd. sp. 2. p. 678. Sloan. hist. 1. p. 44. t. 7. f. 4. Hab. in Caribaeis, locis humidis. ☉

2. *ramosior*, fol. semialexicaulibus, caul. tetragono erecto, ramis patentissimis

flor. inferioribus verticillatis. Lin. Michaux 1. p. 99. Hab. in Virginia. Pet. purpurea. ☉

3. *humilis*, procumbens, fol. lanceolatis deorsum angustatis, flor. omnibus solitariis, caps. 1-locularibus. Michaux Fl. p. 99. A. ramosior. Walter. Hab. in Carol. septentrion. paludosis.

4. *debilis*, fol. lanceolatis basi attenuatis, caul. ramoso, flor. fasciculatis axillaribus, caps. bilocularibus. Ait. Kew. 1. p. 163. Hab. in India orientali. ☉

5. *sanguinolenta*, fol. sessilib. lineari-lanceolatis basi cordatis, pedunc. brevissim. multifloris, florib. octandris petaloideis. Willd. p. 679. Swartz. prod. 33. In fossis et aquosis Jamaicae, Hispaniolae.

6. *coccinea*, fol. sessilib. lineari-lanceolatis basi cordatis, pedunc. subunifloris, flor. octandris petaloideis. Willd. (A. octandra). Am. coccinea. Rottb. progr. 1773. n.º 4. Hab. in India orientali. Caulis erectus giganteus brachiatus. Pet. sanguinea. Simil. praecedenti.

7. *verticillata*, fol. subsessilib. lanceolatis, flor. congesto-verticillatis sessilib. cal. 4-dentato. Lam. ill. p. 311. t. 77. f. 3. Cornelia verticillata. Ard. spec. 2. t. 1. Hab. in Italia.

8. *indica*, fol. linearibus sessilib. decurrentib., umbel. axillarib. brevissimis, cal. 4-dentato. Lam. l. c. Am. baccifera. Burm. ind. t. 15. f. 3. 7 In India.

9. *senegalensis*, fol. sessilib. subaristulatis, flor. pedicellatis aggregatis, cal. 4-dentato. Lam. ill. p. 312. t. 77. f. 2. In Senegal.

312. TRAPA. Cor. 4-petala. Cal. 4-partitus. Nux spinis 4, oppositis cincta, quæ calycis folia fuerit.

1. *natans*, nucib. quadricornibus, spinis patentibus. Linn. suppl. 128. Willd. sp. 2. p. 681. fol. natantibus, petiolis ventricosiss. Hal. helv. n.º 527. In Europae australis Asiaeque stagnis limosis. ☉

2. *bicornis*, nucibus bicornibus. Lin. suppl. 128. Gaert. sem. 2. p. 84. t. 95. Hab. in China.

313. POTHOS. *Spatha. Spadix* simplex floribus tectus. Cal. o. Petala quatuor. Bacca disperma.

1. *scandens*, petiol. latitudine foliorum, caul. radicante. Lin. Willd. [Sp. 1. p. 684.

Rumph. amb. 5. p. 490. t. 184. f. 1. 2. 3. Rheed. mal. 7. t. 40. Hab. in India. ☿

2. *acaulis*, fol. lanceolatis integerrimis, enerviis. Jacq. amer. 240. t. 153. Hab. in Americae calidioris arboribus. ☿

3. *lanceolata*, fol. lanceolatis integerrimis trinerviis, scapo apice triquetro. Sp. pl. 1373. Plum. 47. t. 62. fl. t. 206. Hab. in Amer. calidiore. ☿

4. *crenata*, fol. lanceolatis crenatis. Plum. sp. 4. ic. 39. Hab. in insula St. Thomae. ☿

5. *violacea*, caulescens, fol. ovato-lanceolatis integris nervosis punctatis. Swartz. Dracontium scandens. Aubl. Guj. 2. p. 836. In Jamaica et India occident. ☿

6. *crassinervia*, fol. oblongis acuminate integerrimis venosis, costa media fol. tricarinata. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 610. Collect. 4. p. 122. Hab. in sylvis montosis Americae calidioris ad Caracas. ☿

7. *cordata*, fol. cordatis, lobis imbricatis, spadice spatham subaequante. Willd. Plum. spec. 4. ic. 38. fl. t. 205. Cum priore. ☿

8. *macrophylla*, fol. cordatis, spadice longissimo, radice nodosa. Swartz. prod. 33. Jacq. ic. rar. t. 610. Collect. 4. p. 121. Plum. amer. 48. t. 63. Hab. in India occidentali. ☿

9. *pinnata*, foliis pinnatifidis. V. Rumph. amb. 5. p. 489. s. 183. f. 2. In India. ☿

10. *palmata*, fol. palmatis. L. Plum. amer. 49. t. 64. 65. In America calidiore. ☿

11. *digitata*, fol. digitatis. Jacq. ic. rar. 3. t. 611. Collect. 4. p. 119. Hab. in sylvis montosis Americae calid. ad Caracas. ☿

12? *pentaphylla*, fol. digitatis quinatis ovatis acuminatis. W. Aubl. guj. 2. p. 837. t. 326. In sylvis Cajennae, Gujanac. ☿

314. COMETES. *Involucrum* 4-phyllum, 3-florum. Cal. 4-phyllus. Caps. 3-cocca.

1. *alterniflora*, Burm. ind. t. 15. f. 5. Hab. in Suratte. ☉

315. CURTISIA. Cal. 4-part. Petala 4. Drupa supera, subrotunda, succulenta: Nuce 4-5-loculari.

1. *saginea*. Willd. sp. 1. p. 687. Ait. Kew. 1. p. 162. Sideroxylum. Burm. afr. 235. t. 82. Hab. ad Cap. b. s. ei. ☿

316. *CHLORANTHUS*. *Cal.* o. *Petalum* 3-lobum, lateri germinis insidens. *Anth.* petalo accretæ. *Bacca* 1-sperma.

1. *inconspicuus*, Swartz. L'Herit. scrt. angl. 1. 35. t. 2. *Nigrina* spicata. Thunb. Hab. in China, Japonia. h

317. *ELÆAGNUS*. *Cal.* coloratus, 4-fidus, campanulatus, superus. *Cor.* o. *Drupa* monosperma.

1. *angustifolia*, fol. lanceolatis. Lin. Willd. sp. l. p. 688. Pall. ross. 1. p. 10. t. 4. L. (inermis) fol. lanceolatis. Mill. dict. n.º 2. Hab. in Bohemia, Hispania, Syria, Cappadocia, inque Aquis Sextiis locis subhumidis. h

2. *orientalis*, fol. oblongis ovatis opacis. Mant. 41. Pall. Ross. 1. p. 11. t. 5. Hab. in Oriente. Folia neutra pagina nictentia aut argentea. L. h

3. *spinosa*, fol. ellipticis, subtus argenteis, ramulis basi spinosis. Lam. ill. p. 99. Hab. in Aegypto. h

4. *pungens*, ramulis spinescentibus, fol. oblongis undulatis; flor. axillaribus binis. Thunb. jap. 68. p. 789. Habit. in Japonia. h

5. *latifolia*, fol. ovatis maculatis. Lam. ill. t. 73. f. 2. Hab. in Zeylona. Fol. lineis auro-rubentibus. h

6. *crispata*, inermis, fol. lanceolato-oblongis obtusis undulatis fl. solitar. Thunb. jap. 66. Hab. in Japonia cum sequentibus speciebus. h

7. *multiflora*, inermis, fol. obovatis obtusis, flor. axillaribus aggregatis, pedunc. flore longioribus. Thunb. jap. 66. h

8. *umbellata*, inermis, fol. obovatis obtusis, flor. axillaribus aggregatis, pedunc. flore brevioribus. Thunb. jap. 66. t. 14. In monte Fakona Japoniae. h

9. *glabra*, inermis, fol. ovato-oblongis acuminatis, flor. axillaribus subsolitariis. Thunb. jap. 67. h

10. *macrophylla*, inermis, fol. rectundato-ovatis argenteis. Thunb. l. c. Habit. in Japonia. h

318. *GONATOCARPUS*. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida. *Drupa* infera, octogona, 1-sperma.

1. *micranthus*. Willd. Sp. 2. p. 660. Thunb. jap. 69. t. 15. Hab. in Japonia. Fl. spicati cernui minuti. Th. h

319. *SANTALUM*. *Cor.* 4-petala: petalis calyci innatis, præter *Glandulas* 4. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca* infera, monosperma.

1. *album*. Sirium myrsifolium L. Mant. p. 800. Roxb. corom. 1. p. 2. t. 2. Hab. in India. h

320. *DRAPETES*. *Cal.* o. *Cor.* infundibuliformis: limbo 4-fido. *Receptacula* pedicellata, barbata: *Sem.* 1, tectum. (Flor. aggregato-fasciculati.)

1. *muscoïdes*, Lam. in Journ. d'Hist. natur. n.º 5. p. 186. t. 10. Habitu *Passerinae*. Geni *Dais* affinis. L.

321. *CANSIERA*. *Cal.* globoso-necolatus, 4-dentatus, inferus. *Nect.* 4, dentata germen cingentia. *Bacca* 1-sperma. Juss.

1. *scandens*, Roxbourg. 2. p. 1. t. 103. Habit. in Coromandelia.

322. *STRUTHIOLA*. *Perianthium* 2-phyllum. *Cor.* tubulosa, ore glandulis 4-8. *Bacca* exsucca, 1-sperma.

1. *virgata*, fol. lanceolatis striatis, summis ciliatis, ramis pubescentibus. Thunb. prod. 76. Retz. obs. 5. p. 26. Burm. afr. p. 127. t. 47. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h

*Obs.* Omnes generis species crescunt ad Cap. b. spei, tempore vespertino et nocturno, odore grato fragrant et sapius bis per annum florent.

2. *erecta*, fol. linearibus glabris, ramis glabris tetragonis. Thunb. prod. 76. Wendl. obs. bot. p. 9. t. 2. f. 10. Flor. albidis.

3. *nana*, fol. linearibus obtusis, pilosis, flor. terminalibus fasciculatis toment. Lin. suppl. 128. Bractee coerulescentes. h

4. *juniperina*, fol. linearibus acutis patentibus, corollis calycibusque nudis. Retz. obs. 3. p. 26.

5. *angustifolia*, fol. oppositis erectis linearibus dorso trisulcatis, ramis compositis villosis. Lam. ill. p. 214. h

6. *ciliata*, fol. sparsis lanceolatis mucronatis ciliatis concavis quadratariam imbricatis apice incurvis. Andrew, t. 149. Fl. albidis, vespere fragrantissimi. Augusto. S. ciliata, Lam. ?

*β. rubra*, flore rubro, fol. minus incurvis. Andrew. t. 139.

7. *imbricata*, fol. ovatis sulcatis quadrifariis confertis margine ciliatis, glandulis corollinis quatuor. Andrew. t. 113. Aestate.

*β? striata*, pubescens, fol. oppositis ovatis subimbricatis sulcato-striatis, cor. tomentosis. Lam. ill. p. 214. h

8. *ovata*, fol. ovatis glabris, ramis glabris rugosis. Thunb. prod. Andrew. t. 119. Flor. majusculi.

323. RIVINA. *Cor.* 4-petala, persistens. *Cal.* nullus. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* lentiforme, scabrum. (*Stam.* 4, 8 et 12.)

1. *humilis*, racemis simplicibus, flor. tetrandris, fol. pubescentibus. (*Piercea tomentosa*). Mill. Styl. supra gerimen decurrit. In Caribaeis, Jamaica, Barbados. h

2. *laevis*, racemis simplicibus, florib. tetrandris, fol. ovatis acuminatis glabris planis, caul. tereti. Willd. Sp. 1. p. 694. Lam. ill. t. 81. f. 2. *humilis*. Mill. Hab. in America. Fol. margine purpurascens.

\* *latifolia*, florib. tetrandris, baccis siccis, fol. lato-ovatis laevibus. Lam. ill. p. 324. In ins. Madagascar.

3. *brasiliensis*, racemis simplicibus, flor. tetrandris, fol. ovatis undulato-rugosis, caul. sulcato. Willd. l. c. fol. cordatis. Necca in Usteri bot. Annal. 6. Stück. p. 63. Hab. in America. h

4. *secunda*, glabra, foliis ovatis acuminatis obsolete denticulatis, cal. bilabiato. Flor. Per. 1. p. 65. t. 102. Hab. in sylvis Poguzo. h

5. *octandra*, racemis simplicibus, flor. octandris dodecandrive. Amoens. acad. 4. p. 305. R. dodecandra. Jacq. In America calidior. Stam. 4. intra calycis folia; reliqua 8 alternantia. L. h

324. SALVADORA. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* arillo vestitum.

1. *persica*. Lin. Roxb. coromand. 1. p. 26. t. 26. Willd. Sp. 2. p. 665. Habit. ad Sinum persicum, in India orient. h

325. EMPLEURUM. Flor. polygamii. *Cal.* 4-fidus, inferus. *Cor.* o. *Styl.* lateralis. *Caps.*

magna, oblonga, latere dehiscentens. *Sem.* 1, arillatum.

1. *serrulatum*, Ait. Kew. 3. p. 340. Lam. ill. 1. p. 345. t. 86. Diosma unicapsularis. Linn. suppl. p. 155. Ad Cap. b. spei. h

326. CAMPHOROSMA. *Cal.* urceolatus: dentibus 2 oppositis, alterisque minimis. *Cor.* nulla. *Stam.* exerta. *Caps.* 1-sperma.

1. *paleacea*, fruticosa, ramis spicaeformibus paleaceis pilosis. Linn. suppl. 128. Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *monspeliaca*, fol. hirsutis linearib. Lam. ill. t. 86. Buxb. cent. 1. p. 18. t. 28. f. 1. Hab. in Hispaniae Narbonae, Tartariae arenosis. h

3. *acuta*, fol. subulatis rigidis glabris. Hab. in Italia, Tartaria. h

4. *glabra*, fol. subtriangulis glabris inermibus. Hab. in Helvetia? Facies Polycnemii. h

327. PTERANTHUS. *Cal.* 4-partitus persistens, lacin. concavis: 2-majoribus cristatis. *Cor.* o. *Filam.* basi connata. *Caps.* membranacea, 1-sperma, cal. tecta.

1. *echinatus*. Desf. atl. 1. p. 144-145. Camphrosma Pteranthus. Lin. Louichea cervina. L'Herit. stirp. t. 65. Hab. in Barbariae et Arabiae arvis argillosis. Pedicelli plani, obovati. ☉

328. ALCHEMILLA. *Cal.* 8-fidus. *Cor.* o. *Sem.* 1, cal. vestitum.

1. *capensis*, fol. reniformib. sublobatis repando-crenatis, racemis axillarib. Willd. Sp. 1. p. 668. Lam. ill. t. 106. Hab. ad Cap. b. spei. Facies sequentis, sed minor.

2. *vulgaris*, fol. reniformibus novem-lobis acute dentatis utrinque subnudis, corymbis terminalibus. Willd. Flor. dan. t. 633. In sylvis vulgaris.

3. *hybrida*, (*pubescens*), fol. lobatis sericeis acute serratis, caule petiolisque longis dense pilosis. A. *pubescens*. Lam. pluk. phyt. 240. f. 2. In Europ. pascuis. h

4. *alpina*, fol. digitatis serratis subtus argenteo sericeis. L. Fl. lapp. 61. Fl. dan. t. 49. A. argentea. Lam. In alpihus Euro; ac. h

5. *pentaphylla*, fol. quinais ternatisque

multifidis glabris. Hab. in monte Cenisio, Furca, Gotthardo Rhaetiorum. ☞

6. *Aphanoides*, fol. multipartitis, caul. erecto. Lin. suppl. 129. Hab. in N. Granada. An sequentis generis? ☉

## DIGYNIA.

329. *APHANES*. *Cal.* 8-fidis: laciniis alternis minimis. *Cor.* o. *Sem.* 2, calyce vestita; uno interdum abortivo. (*Stam.* 1, 2 et 4-)

1. *arvensis*, foliis trifidis pubescentibus, flor. axillaribus glomeratis. L. Flor. dan. t. 973. *Alchemilla Aphanes*. Willd. Sp. 2. p. 699. Hab. in arvis et agris.

*Obs.* *Stam.* a nonnullis aut 4, quorum 3 vero abortiunt, ab aliis observata. — Sequentes species ob stylos 2 et semina 2, ad hoc genus retuli, forte genere diversas, cum diandrae sint et stylos diversos habeant: Auctores ipsi hac de re dejudicent iconibusque illustrent.

2. *tripartita*, villosa, fol. 3-partitis, laciniis cuneiformibus multifidis, flor. dichotomo-orymbosis. Flor. Peruv. 1. 68. sub *Achemilla*. Hab. in montibus et scaturiginibus Pillao et Tarmae.

3. *orbiculata*, villosa, fol. orbiculato-reniformibus lobatis serratis, flor. spicato-corymbosis. Fl. Per. l. c. Hab. in Peruviae montibus frigidis et humidis. Caul. ramosissimus, sarmentosus.

4. *pinnata*, foliis pinnatis: pinnulis 2-3-fidis. Flor. Per. p. 69. sub *Alchemilla*. Crescit cum prioribus.

330. *CRUZITA*. *Cal.* 4-phyllus: exterior 3-phyllus. *Cor.* o. *Sem.* 1, cal. vestitum.

1. *americana*, Lam. ill. p. 548. C. hispanica. L. Hab. in Cumana Americae nec in Hispania. Caulis altus. Flor. spicati.

331. *BUFFONIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala, brevior. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, 2-sperma.

1. *annua*, caul. paniculato, flor. lateralibus terminalibusque, cal. striato. Lam. ill. p. 349. B. tenuifolia. Lin. Pluck. alm. t. 75. f. 4. Habit. in Gallia australi, et in Angliae maritimis variis. ☉

2. *perennis*, caule apice ramoso florifero, cal. margine scarioso. Lam. l. c. t. 97. f. 2. Hab. in Gallia australi. ☞

332. *HAMAMELIS*. *Involucrum* triphyllum. *Cal.* proprius 4-phyllus. *Petala* 4, linearia. *Nux* bicornis, 2-locularis.

1. *virginica*. Lin. Duham. arb. t. p. 287. t. 114. Willd. Sp. p. 701. In Virginia. Floret autumno, insequente vere semina perficit.

333. *PAGAMEA*. *Cal.* 4-dentatus persistens. *Cor.* 4-fida, urccolaris, intus villosa. *Drupa* supera, 2-locularis, nuculis 2, bilocularibus.

1. *guyanensis*, Aubl. gujan. t. 44. Lam. ill. p. 352. t. 88. Hab. in Guyana. Stipul. 2. vaginantes deciduae. Fol. lanceolata. ☞

334. *HYPECOUM*. *Cal.* 2-phyllus. *Petala* 4: exterioribus duobus latoribus. Siliqua.

1. *procumbens*, siliquis arcuatis compressis articulatis, petalis binis majoribus obtuse trilobis. Willd. Sp. 1. p. 704. Hab. inter Archipelagi, Galliae segetes. ☉

2. *littorale*, siliquis articulatis compressis arcuatis, petalis integris: exterioribus longioribus lineari-spathulatis. Jacq. ic. rar. t. 309. Collect. 2. p. 205. Habit. in sabulosis aridis Austriae littoralis. ☉

3. *pendulum*, siliquis cernuis teretibus cylindricis, petalis majoribus obtuse trilobis. Willd. p. 705. Sauv. monsp. 263. Pall. it. t. 3. p. 553. Hab. in Galloprovincia, Sibiria. ☉

4. *erectum*, siliquis erectis teretibus torulosis. Amm. ruth. 58. t. 9. i. 9. Habit. in Davuria. Flores reliquis majores. W.

335. *NERTERIA*. *Cal.* o. *Cor.* infundibuliformis, quadrifida, supera, *Bacca* bilocularis, 2-sperma.

1. *depressa*. Smith. ic. ined. fasc. 2. p. 28. t. 28. Gaert. sem. 1. p. 124. t. 26. f. 1. Flor. Per. 1. p. 60. t. 90. Gomozia granadensis. Lin. suppl. 129. Lam. ill. t. 87. Hab. in Novae Granadae locis humidis et regno Chilensi.

336. *GALOPINA*. *Cal.* o. *Cor.* supera 4-fida. *Sem.* 2, muricata.

1. *circaeoides*. Thunb. Nov. Gen. 1. p. 3. Anthospermum. Thunb. prod. 32. Hab. ad Cap. b. speci. ☉

## TRIGYNIAS

337. *BOSCIA*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Cap.* 4-locularis,

1. *undulata*. Thunb. prod. p. 32. Hab. ad Cap. b. spec. h

## TETRAGYNIA.

338. *MYGINDA*. *Cal.* minimus, 4-partitus. *Petala* 4. *Stigm.* 2-4. *Drypa* globosa 1-sperma.

1. *Uragoga*, fol. subcordatis acuminatis subseratis pubescentibus. Swartz. Willd. sp. 2. p. 722. Jacq. amer. t. 16. Habit. in America meridion. Corymb. axillaris. h

2. *Rhacoma*, fol. lanceolato-ovatis crenatis, flor. 1-gynis, stylo 4-fido. Swartz. Flor. 1. p. 340. Jacq. ic. rar. 2. t. 311. *Rhacoma* Crossopetalum. Lin. In Jamaicae maritimis. h

3. *latifolia*, fol. ellipticis crenatis subcoriaceis, stigm. 2-7. Swartz. l. c. p. 342. Hab. in Caribaeis. h

4. *rotundata*, fol. ovato-subrotundis crenatis petiolatis, pedunc. axillarib. simplicibus paucifloris. Lam. ill. n.º 1546. Hab. in insulis antillicis. Fol. subtus pubescens. h

5. *integrifolia*, fol. ovatis integerrimis, fructib. subsolitariis. Enc. bot. 4. p. 396. Cresc. in ins. Martinica. Cortex griseo-albidus, glandulis parvis obsitus.

6. *ilicifolia*, fol. ovato-subrotundis dentato-spinosis subtus incanis, pedunc. axillaribus furcatis. Enc. bot. l. c. Hab. ad St. Domingo. Cort. in adultis flavus. Ligndurum album. h

339. *ILFX*. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* rotata. *Stylus*. o. *Bacca* 4-sperma.

1. *Aquifolium*, fol. acutis spinosis nitidis undulatis, flor. axillarib. subumbellatis. Ait. Kew. 1. p. 168. W. sp. p. 307. Flor. dan. 508.  $\beta$ . heterophylla, foliis dentatis spinosis integrisque  $\gamma$ . I. feror, fol. supra echinatis. Habit. in Europa australiori, Japonia, Virginia. Polygama dioica. Planta hermaphrodita 5-petala, pentandra? Ger. h

2. *japonica*, fol. oppositis ovatis acuminatis spinosis sessilibus, racemis terminalibus. Willd. sp. 1. p. 707. Thunb. jap. 79. Hab. in Japonia. h

3. *opaca*, fol. ovatis acutis spinosis

glabris planis, flor. ad basin ramulorum annotorum sparsis. Ait. Kew. 1. p. 169. Hab. in Carolina. h

4. *crocea*, fol. oblongis serratis: serraturis ciliato-spinosis. Thunb. prod. 32. H. in sylvis Cap. b. spec. h

5. *serrata*, fol. acutis ciliato-serratis, flor. axillaribus solitariis. Thunb. jap. 78. Habit. in Japonia. h

6. *latifolia*, fol. ovatis serratis, florib. axillaribus aggregatis. Thunb. jap. 79. In Japonia. Caulis arborescens.

7. *Perado*, fol. ovatis cum acumine, inermibus subintegris. Ait. Kew. 1. p. 169. Hab. in Madera. h

8. *Prinoides*, fol. elliptico-lanceolatis acutis deciduis serratis, serraturis muticis. Ait. Kew. 1. p. 169. Habit. in Carolina, Virginia. h

9. *myrtifolia*, fol. ovatis utrinque acutis integerrimis, flor. fasciculatis lateralibus dioicis. Lam. ill. p. 356. Hab. in insulis Caribaeis. Fol. et infloresc. Sideroxyli. h

10. *rosmarinifolia*, fol. linearib. acutis sparsim dentatis: margine reflexo, cymis brevibus lateralibus. Lam. l. c. 1. Cassine  $\gamma$ . enc. bot. Hab. in Carolina.

11. *aestivalis*, fol. ovato-ellipticis planis superne crenato-mucronatis, pedunc. simplicibus. Lam. l. c. *Prinos* lucidus. Ait? Cresc. in Madera.

12. *cuneifolia*, fol. cuneiformibus truncuspidatis. Lin. Plum. ic. 118. f. 2. Hab. in America meridionali. h

13. *Cassine*, fol. alternis distantibus, semipervirentibus lanceolatis serratis: serraturis acuminatis. Ait. Kew. 1. p. 170. Hab. in Carolina. h

14. *vomitaria*, fol. alternis distantibus oblongiusculis obtusiusculis crenato-serratis: serraturis muticis. Ait. 170. *Cassine Peragua*. Lin. Mill. dict. t. 83. f. 2. *Cassine* vera Floridanorum Catesb. carol. 2. t. 57. In Florida austr. h

15. *crenata*, fol. ovatis crenatis, pedunc. rameis sparsis subtrifloris. Thunb. jap. 78. Hab. in Japonia. h

16. *emarginata*, fol. obovatis emarginatis, flor. axillaribus dioicis. Thunb. Hab. in Japonia. h

17. *salicifolia*, fol. lanceolatis utrinque attenuatis dentatis, pedunc. petiolo longioribus axillaribus cymosis. Willd. sp. p. 710. Jacq. collect. 4. p. 36. t. 3. f. 2. Hab. in ins. Mauritiis. h

18. *asiatica*, fol. lato-lanceolatis obtusis integerrimis. Lin. In India. h

19. *integra*, fol. oblongis obtusis integerrimis, flor. sessilibus umbellatis: pedunc. unifloris. Thunb. jap. 77. Hab. in Japonia. h

20. *rotunda*, fol. rotundatis acutis integris, pedunc. umbelliferis. Thunb. jap. 77. Hab. in Japonia. Rami nodulosi. h

21? *obcordata*, stigmati simplice, fol. obcordatis coriaceis, caul. fruticoso. Swartz. Flor. t. p. 338. Hab. in montibus coerulesis Jamaicæ. h

22? *Macoucoua*, (*acuminata* Willd.) fol. ovatis acuminatis emarginatis integerrimis, pedunc. cymosis axillaribus. Willd. sp. 711. *Macoucoua* gujanensis. Aubl. guj. t. p. 88. t. 34. Lam. ill. t. 75. In Gujana, Cajenna. h

23? *Paltoria*, fol. ovalibus crenatis, pedunc. subtrifloris, stigm. magno tetragono integro. *Paltoria* ovalis. Flor. Per. l. p. 44. t. 84. Habit. in Peruviae montibus altissimis. Biorgyalis. h

340. *RIQUERIA*. *Cal.* triplex. *Petala* 4, concava. *Filam.* compressa. *Caps.* 4-locularis, stylis coronata.

1. *avenia*, fol. oblonga *avenia*. Racemi terminales. Flor. Per. l. p. 70. In Peruviae nemoribus. h

341. *POTAMOGETON*. *Cal.* o. *Petala* 4. *Stylus* o. *Semina* 4.

1. *natans*, fol. natantibus petiolatis ellipticis acutis basi rotundatis subcordatis. Willd. sp. p. 712. Flor. dan. t. 1025. Habit. in Europae lacubus et stagnis. ¶

2. *fluitans*, fol. natantibus longe petiolatis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis. Willd. Roth. germ. II. 202. In Europae fluviis. Simile praecedenti. ¶

3. *heterophyllum*, fol. superioribus petiolatis ellipticis utrinque attenuatis, inferioribus confertis sessilibus linearibus. Willd. Schreb. spicil. p. 21. Habit. in stagnis et rivulis.

4. *perfoliatum*, fol. cordatis amplexicaulis. Habit. in Europae lacubus et fluviis. Totum praeter spicas submersum. ¶

5. *densum*, fol. ovatis acumin. oppositis confertis, caule dichotomo, spica quadriflora. Engl. bot. t. 397. Hab. in Europae meridionalis fossis.

6. *lucens*, fol. lanceolatis planis oppositis in petiolos desinentibus trinerviis. Hab. in lacubus, stagnis. ¶

7. *crispum*, fol. lanceolatis alternis oppositisve undulatis serratis. Curt. Lond. ic. Flor. dan. t. 927. Hab. in fossis et rivulis lentis.

8. *serratum*, fol. lanceol. oppositis subundulatis. P. fol. tenuibus ellipticis, nervis convergentibus. Hall. P. caul. longe ramosis. Guett. Hab. in rivulis. Differt a priore praecipue fol. confertioribus integerrimis. Willd. p. 715.

9. *compressum*, fol. linearibus obtusis, caule compresso, spicis brevibus 4-6-floris. Flor. dan. t. 201. Hab. in fossis paludosis. ♂

10. *striatum*, fol. linearibus striatis, caul. compresso, flor. spicatis. Flor. Per. l. p. 70. t. 96. Hab. in Peruviae aquis. Fluitans.

11. *Zosteraefolium*, fol. linearib. longissimis obtusis cum mucrone, alternis oppositisve sessilibus, caule compresso, spic. uncialibus multifloris. Schumacher. Flor. Zaealand. septent. t. p. 50. Habit. in Zaeelandiae rivulis et piscinis.

12. *gramineum*, fol. lineari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus, caule tereti subdichotomo. Smith, brit. l. p. 196. Raj. syn. ed. 3. t. 4. f. 3. In fossis et fluviis. Stipula involuto-tubulosa.

13. *pusillum*, fol. linearibus alternis oppositisve, stipul. angustioribus basi patentibus, caule tereti, pedunc. axillarib. paucifloris. Smith, l. c. p. 197. Vaill. bot. t. 32. f. 4. Hab. in aquis argillaceis. Stipulae amplexicaul. fol. latiores.

14. *pectinatum*, fol. setaceis parallelis approximatis distichis, basi vaginantibus. Smith, l. c. Flor. Dan. t. 186. β. *marinum*. Lin. Var. *pectinati* secundum Pcl. Smith. Caul. subflexuosus. Schum. p. 51. Vaill. bot. t. 32. f. 3.

15. *filiforme*, fol. linearib. marginibus involutis, caul. tereti pedunculisque filiformibus elongatis, spic. 3-glomeratis. Schumacher. l. c. p. 51. P. setaceum. Frequens in Zaeelandiae lacubus. A P. *setaceo* diversum dicit auctor. †

16. *setaceum*, fol. lanceolatis oppositis acuminatis. Lin. Hab. in fossis paludosis. †

242. *RUPPIA*. *Cor.* o. *Cal.* o. *Sem.* 4, pedicellata.

1. *maritima*, flor. dan. t. 364. Engl. bot. t. 136. Mich. gen. t. 35. Hab. in Europae et Americae maritimis et fossis stagnantibus. ¶



*Obs.* Pedunc. subspirales longissimi vel breves, Valisneriae modo, a planta contrahuntur aut laxantur. vid. Smith, brit. 1. 199. Planta videtur monoica.

343. *SAGINA*. *Cal.* 4-phyllus. *Petal.* 4. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis, poly-permae.

1. *cerastoides*, caule diffuso dichotomo, fol. spatulatis obovatisque recurvis, pedunc. fructiferis reflex. Smith. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 341. Willd. sp. 1. p. 718. Habit. in arenosis maritimis et fissuris rupium, in Bodotriac insulis. ⊙

2. *procumbens*, caulib. glabris procumbentibus. Curt. Lond. 3. t. 12. Hab. in pascuis sterilibus, aridis. Var. floribus apetalis. ⊙

3. *apetula*, caule erectiusculo pubescente, flor. subapetalis. Curt. t. 14. Habit. in agris et arenosis. ⊙

344. *MOENCHIA*. *Cal.* 4-phyllus. connivens: lacin. lanceolatis acutis. *Cor.* subbrevior: petal. integris. *Caps.* evalvis, 1-locularis, apice 5-fariam dehiscens, *Sem.* reniformia scabra.

1. *glauca*, caul. erecto 1-2-floro. *Sagina* erecta. Lin. Curt. Lond. Fasc. 2. t. 12. Engl. bot. t. 609. M. quaternella. Ehrh. Alsinella erecta. Moench. meth. p. 222. In pascuis, ericetis, sylvaticis. Vere. ⊙

345. *RADIOLA*. *Cal.* multifidus. *Petal.* 4. *Caps.* supera, 8-valvis, 8-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *Millegrana*, caule ramosissimo dichotomo. Smith. brit. 1. p. 202. Radiola linoides. Roth. germ. 2. p. 199. Linum Radiola. Lin. Flor. dan. t. 178. Millegrana. Raf. syn. Chamaelinum. Voill. Bot. t. 4. f. 6. Cresc. in inundatis arenosis, sabulosis. ⊙

346. *TILLEA*. *Cal.* 3-s. 4-partitus. *Petal.* 3 s. 4, aequalia. *Caps.* 3 s. 4, bi-poly-spermae.

1. *aquatica*, caule erecto, fol. linearibus, flor. sessilibus. Willd. Sp. 1. p. 720. Hab. in Sueciae et Germaniae inundatis. ⊙

2. *prostrata*, caul. prostrato, fol. lanceolatis, flor. axillaribus pedunculatis W. 1. c. Schkuhr. in Ust. Nov. Annal. bot. 6. p. 4. Hab. in Germaniae humilis. Stam. 8: 4 sterilia. ⊙

3. *Vaillantii*, caule erecto dichotomo, pedunc. elongatis cal. turbinato semiquadrifido. Willd. sp. p. 720. Buillarda. L'Her. Decand. Pl. grass. ic. Vail. Paris. t. 10. f. 2. In Galliae humidis. ⊙

*Obs.* Ob calyc. et squamas nectarinas 4, integras lineares forte distincti generis, quononnullae aliae species forsitan pertinent.

4. *capensis*, fol. oblongiusculis, flor. quadrifidis. Lin. suppl. 129. Crassula nantans Thunb. prod. p. 54. Hab. ad Cap. b. spei. Ral. capillares copiosae. Nectaria purpurea triangularia. ⊙

5. *perfoliata*, fol. perfoliatis ovatis, corymbis terminalibus, floribus quadrifidis. Lin. suppl. 120. Crassula inanitis Th. Hab. ad Cap. b. spei. ⊙

6. *connata*, caule erecto, fol. connatis linearibus, carnosius, flor. axillaribus. Flor., Per. t. p. 70. t. 56. f. a. Hab. in collibus Chancay, supra saxa. ⊙

7. *umbellata*, fol. subpetiolatis ovatis obtusis integris, caule capillari erecto, flor. umbellatis. Willd. p. 721. Crassula Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. ⊙

8. *decumbens*, decumbens, fol. subulatis, petalis calyce brevioribus. Willd. H. ad Cap. b. spei. ⊙

9. *muscosa*, procumbens, flor. trifidis. Lin. Decand. Plant. Grass. ic. Lam. ill. t. 90. f. 2. Mich. gen. 22. t. 20. In Europae merid. humilis. turfosius muscosius. Numerus partium in planta culta interdum quinquarius. Caps. articulatae, 2-spermae.

347. *GOLDENIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. *Styli* 4. *Caps.* 4, approximatae, 1-spermae.

1. *procumbens*. Linn. Lam. ill. t. 89. Pluck. alm. 363. t. 64. f. 6. Habit. in India. Fol. peiolata, obovata, subulnata. L. ⊙

## M O N O G Y N I A.

Valeriana supina, sibirica, villosa. Boerhaavia 4-andra. Justicia pulcherrima. Lycium 4-andrum. Cordia 4-andra. Solanum flexuosum. Citharexylis quaciam

species. Cuscutae quaedam. Convallaria bifolia. Coffeae nonnullae species. Nondeletia pilosa, virgata. Billia 4-andra. Guettarda elliptica, membranacea. Portlandia 4-andra. Evonymi plures. Portulaca meridiana. Cinchonae nonnullae. Laugeria coriacea. Melastoma 4-andra. Lythrum thymifolium. Prinos glaber et nitidus. Peplis indica. Stroeemia 4-andra. Thesium alpinum. Corchorus Coreta. Exaca quaedam.

# D I G Y N I A.

Gentianae quadrifidae. Swertiae nonnullae. Mysynda latifolia. Ulmus suberosa. Herniaria fruticosa, glabra?

---

# C L A S S I S V.

## P E N T A N D R I A.

### M O N O G Y N I A.

#### ASPERIFOLIAE s. BORRAGINACEAE. Juss.

Gen. 348-378. Caule sunt ut plurimum herbaceo, etiam frutescente, rarius arboresce; foliis alternis, saepe asperis; semina habent plerumque 4, pericarpio inclusa; aut nuda (nuculae), calice persistente cincta. Cor. regularis infundibuliformis, fauce nunc squamulis fornicata, nunc nuda.

† *Semina 4, nuda.*

348. **HELIOTROPIUM.** Cor. hypocrateriformis, 5-fida, interjectis dentibus aut plicis: fauce nuda. (Spicæ recurvato-involutæ.)

1. *peruvianum*, fol. lanceolato-ovatis, caule fruticoso, spicis numerosis aggregato-corymbosis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 740. In Peru. Vauillam redolet. h

2. *amplexicaule*, fol. lanceolatis obtusis semiamplexicaulibus, spicis ramosis, caule fruticoso. Vahl. symbol. 3. p. 21. In Brasilia. h

3. *indicum*, fol. cordato-ovatis (ovalib.) acutis scabrieusculis, spicis solitariis, fructibus bifidis. Lin. Pluck. phyt. 245. f. 4. In India utraque. ☉

4. *parviflorum*, fol. ovatis rugosis scabris oppositis alternisque, spicis subconjugatis. Mant. 201. Dill. elth. 178. t. 146. f. 175. Hab. in India. ☉

5. *inundatum*, fol. oblongis obtusis hirsutis, spicis quaternis erectis, caule frutescente. Swartz. prod. 40. Ej. Flor. 1. p. 343. Hab. in insulis Caribaeis, in Jamaicae locis submaritimis.

6. *villosum*, fol. subrotundo-ovatis in-

tegrerrimis planis villosito-tomentosis, spicis solitariis. Willd. l. c. p. 741. Tournef. cor. 7. Hab. in insula Melo. ☉

7. *europaeum*, fol. ovatis integerrimis. tomentosis rugosis, spicis conjugatis. Linn. Jacq. aust. 3. t. 207. In Europa australi. Inodora. ☉

8. *coromandelianum*, fol. obovatis villosis integris, spicis simplicibus conjugatisque, seminibus punctatis. Retz. obs. 2. p. 9. Hab. in India.

9. *malabaricum*, fol. ovatis plicatis strigosis integerrimis, spicis subsolitariis. Retz. obs. 4. p. 24. Burm. ind. 40. t. 16. f. 1. Hab. in India.

10. *marifolium*, fol. lanceolatis hispidis, caulibus procumbentibus fruticulosus, spicis simplicibus alternis. Retz. obs. 2. p. 8. Hab. in India. h

11. *supinum*, fol. ovatis integerrimis tomentosis plicatis, spicis solitariis. Gouan. monsp. 17. c. fig. Tournef. Cor. 7. it. vol. 1. p. 342. t. 23. Hab. Salmanticae juxta agros, Monspelii in littore et in Barbaria. ☉

12. *undulatum*, fol. lanceolatis hispidis margine revolutis undulatis, spicis conjugatis, corollis villosis, caule procumbente. Vahl. symbol. 1. p. 13. Lithospermum hispidum. Forsk. arab. p. 38. n.º 24. Hab. in Aegypto. h

13. *lineatum*, foliis ellipticis petiolatis villosis margine revolutis planis, spicis conjugatis, caule procumbente. Vahl. symb. 1. p. 13. Forsk. arab. p. 39. n.º 25. Habit. in Aegypto. h

14. *strigosum*, fol. lineari-lanceolatis strigoso-papillosis, spicis conjugatis, caule erecto fruticoso. Willd. p. 743. Habit. in Guinea. Facies H. zeylanici. h

15. *fruticosum*, fol. lineari-lanceolatis pilosis margine revolutis, spicis solitariis sessilibus, caule fruticoso. Lam. ill. p. 394. Sloan, hist. 1. t. 132. f. 4. Habit. in insulis Caribaeis.

16. *curassavicum*, fol. lanceolato-linearibus glabris avenis, spicis conjugatis. Pluck. alm. 182. t. 56. f. 3. Moris. s. 11. t. 31. f. 12. Hab. in Americae calidioris maritimis. ☉

17. *zeylanicum*, fol. lineari-lanceolatis utrinque attenuatis subtus villosis, spicis solitariis conjugatis filiformibus longissimis nudis. Willd. p. 744. Lam. encyclop. 5. p. 60. et ill. p. 393. Burm. ind. t. 16. fig. 2. Hab. in Zeylone. ♀

18. *persicum*, fol. lineari-lanceolatis villosis recurvatis, caule fruticoso, spicis terminalibus foliosis. Lam. l. c. Burm. t. 19. f. 1. Hab. in Persia. ♀

19. *corymbosum*, fol. oblongo-lanceolatis, caule fruticoso, spicis terminalibus aggregato-corymbosis, lacin. calycis longis subulatis. Flor. Per. 2. p. 2. t. 107. Hab. in Peruvia. ♀

20. *oppositifolium*, fol. ovatis acutis latis integerrimis, caule fruticoso, spic. dichotomo-corymbosis. Flor. Per. l. c. t. 108. In Munna aridis. Corol. extus hispidiuscula.

21. *incanum*, fol. ovatis acutis crenatis latis rugosis, caul. fruticoso, spic. dichotomo-corymbosis. Flor. Per. l. c. fig. a. Hab. in Huanuci collib. aridis. Cal. fructus ventricosus.

22. *myrcocalyx*, fol. oblongo-lanceolatis, caule suffruticoso, spicis oppositifol. dichotomis, cal. minimis 5-dentatis. Flor. Per. p. 3. t. 109. In Peruviae collibus.

23. *pilosum*, fol. lanceolatis integerrimis, caule fruticoso procumbente, spicis brevibus sub-quaternis, fructu hispidulo. Fl. Per. 1. p. 3. t. 110. f. a. Hab. in Limaee collibus aridiusculis.

24. *lanceolatum*, fol. lanceolatis, caule fruticoso, spicis terminalibus dichotomo-corymbosis. Flor. Per. 2. p. 4. t. 101. H. in Pillao et Huanuci nemoribus. Cor. dilute caerulea.

25. *microstachyum*, fol. oblongis alternis, caul. herbaceo, spicis aggregatis brevibus, fruct. bipartibili. Flor. Per. l. c. fig. b. Hab. in aridis Tarmae. Sem. 2, bilocularia, nonnulla 1-locularia. l. c.

26. *synzostachium*, fol. ovatis oppositis intermediis alternis, spicis longissimis ge-

minis, fructu 2-partibili. Habit. in Limaee segetibus et campis aridis. Cor. tubus clavatus longissimus: lacinis acutis.

Obs. An cum priore Messerschmidiae aut distincti generis species? cum semina pericarpio manifesto inclusa sint.

27. *scabrum*, fol. lanceolatis strigosis, caule ramoso diffuso, flor. congestis. Retz. obs. 2. p. 8. Hab. in India. Facies fere Sherardiae, Retz. ☉

28. *orientale*, procumbens, fol. linearibus glabris avenis, flor. sparsis lateralibus. Lin. Habit. in Asia. ☉

29. *gnaphalioides*, fol. linearibus obtusis tomentosis, pedunculis dichotomis, florib. quaternis, caule frutesc. L. Jacq. amer. 25. t. 173. f. 11. Ed. 2. t. 264. f. 77. Moris. hist. 3. s. 11. t. 28. f. 6. In Barbados, Jamaicae maritimis. ♀

30. *ternatum*, fol. ternis alternisque lanceolatis subtus incanis, spicis terminalibus conjugatis. Vahl. symbol. 3. p. 21. Hab. in India occident. Facies H. fruticosi, et forte non nisi varietas. Vahl. ♀

31. *pinnatum*, fol. pinnatis. Vahl. l. c. Hab. ad fretum Magellanicum.

340. MYOSOTIS. Cor. hypocrateriformis, 5-fida, submarginata: fauce elansa fornicibus. Sem. laevia aut echinata.

\* *Seminib. laevibus.*

1. *scorpioides*, semin. laevibus, caule subsimplici, fol. lanceolatis obtusis, cal. corollaeque patulis. Willd. sp. p. 746. Flor. dan. t. 583. M. palustris Roth. germ. l. 8. II. 221. Hab. in Europae humidis, rivulis. Fol. ligulata subcarnosa. ☿

2. *arvensis*, caule basi ramosissimo foliisque pilosis, racemo nudo, corol. connivente. Bull. herb. t. 355. Habit. in pratis, arvis. Var. caule simplicissimo, fol. rosaceo-congestis, petalis non emarginatis: M. simplex. ☉

3. *sylvatica*, caule elongato hirsuto, fol. lineari-lanceolatis, racemo conjugato. Ehrh. Freq. in sylvis. Caul. 5-gonus, ultra pedalis. Fol. rad. maritima subovata.

4. *versicolor*, subcaespitosa, caul. elongato foliisque ligulatis pilosis, flor. minutis flavis. In sylvaticis. Caul. teretiusculus scaber. Fol. caul. alterna. Cor. flava et caerulea. Cal. clausus. Vid. Roth. germ. 2. p. 222.

3. *lutea*, caule herbaceo erecto, foliis

ovatis alternis ciliatis villosis, flor. sparsis racemosis, cor. limbo integro patentissimo. *Anchusa lutes.* Cav. ic. 1. p. 50. t. 69. f. 1. Habit. in Matridi viciniis. Martio. Rad. fibrosa, rubesc. ☉

4. *Apula*, seminibus nudis, fol. lineato-lanceolatis hispidis, racemis foliosis. Lam. ill. p. 395. *Lithospermum apulum.* Vahl. Pluck. Phyt. 16. f. 5. Hab. in Europa meridionali, in Alpibus et ad Cap. bon. spei. Rad. lignosa fere. Flores terminales. Cor. lutea vix cal. longior.

5. *obtusata*, semin. laevibus, fol. lanceolatis acutis hispidis, cal. obtusissimis, radice repente ramosa. Plant. rar. hungar. p. 103. t. 100. Cresc. in Hungariae graminosis et pratis. Petala non emarginata. Sem. basi alba, circulo tumido. ☉

6. *nana*, seminibus laeviusculis margine serrulatis, caule simpliciter paniculato. foliis oblongis villosis. Willd. Vill. Delph. 2. p. 450. *M. tergloriensis.* Haec. pl. alp. p. 12. t. 2. f. 6. In Alpibus. Flor. majusculi. ☉

7. *fruticosa*, seminib. laevibus, caule fruticoso laevi. L. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

8. *spathulata*, seminib. laevibus, foliis spatulatis hispidis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris. Forst. prod. n.º 62. In Nova Zeelandia.

9. *rupestris*, seminib. laevibus, foliis linearibus villosis, racemis alternis. Willd. p. 748. Pall. itin. 3. app. n.º 71. t. E. f. 3. Hab. in Davuriae saxosis apricis siccis. ☉ Flor. speciosi.

10. *corymbosa*, seminib. laevibus, fol. linearibus acutis, caul. divaricatis, flor. corymbosis. Flor. Peruv. 2. p. 5. Hab. in Chile campis. Subhispidata. ☉

11. *granulosa*, sem. granulosis, foliis linearibus hispidis punctis albicantibus, flor. secundis. Flor. Per. l. c. Habit. in Limae arenosis.

12. *humilis*, semin. rugosis, fol. linearibus, caul. brevibus, florib. lateralibus secundis. Flor. Per. l. c. Habit. in Peruviae campis. Procumbens. ☉

\*0 *LAPPULA. Sem. s. fructibus echinatis.*

13. *virginiana*, sem. aculeato-glochidibus, fol. ovato-oblongis, racemis divaricatis. Lin. Moris. 6. 11. t. 30. f. 9. In Virginia. Sequentis var. ? ☉

14. *Lappula*, sem. aculeis glochidibus, fol. lanceolatis pilosis. L. *Cynoglossum glandulis faucibus glabris.* Hall. herb. n.º 589. Hab. in argillosis, ruderatis, muris. ☉

15. *squarrosa*, seminum angulis setoso-uncinatis, fol. lanceolatis pilosis apice callosis. Retz. obs. 2. p. 9. Hab. in Sibiria ad Volgam. ☉

16. *echinophora*, sem. undique hamato-aculeatis, pedunc. apice incrassatis axillaribus solitariis, fol. lanceolatis pilosis. W. Pall. itin. 3. app. n.º 71. t. 18. f. 1. Hab. in Sibiria ad Volgam in ripis praeruptis nitrosis. ☉

17. *spinocarpus*, semin. muricato-spinosis, racemis foliosis, floribus remotis, fol. linearibus pilosis. Vahl. symb. 2. p. 32. *Anchusa spinocarpus.* Forsk. descr. p. 41. Circa Alexandriam. Flores albi. Caulis diffus. ☉

18. *borbonica*, sem. aculeis glochidibus echinatis, fol. subnudis lineari-lanceolatis longissimis. Lam. l. c. In insula Borbonia. Fol. tuberculata.

19. *gracilis*, sem. eclinatis, fol. linearibus, caul. gracilibus, flor. lateralibus laxo spicatis secundis. Flor. Per. 2. p. 5-6. Hab. in Chile campis et collib. Cor. alba. ☉

20. *Cynoglossoides*, seminib. depresso-concavis: aculeis glochidibus radiatim muricatis, fol. oblongis hispidis, flor. axillarib. Lam. l. c. Hab. ad Cap. b. spei.

21. *pectinata*, sem. apice setosis, racemis rectis, fol. ovato-lanceolatis villosis. Willd. Pall. it. 3. app. n.º 71. t. E. f. 4. Hab. in Sibiria in rupibus muscosis frigidis ad Jeniscam. ☉

350. **TIQUILIA. Cal. 5-partitus.**  
*Cor. infundibuliformis: laciniis emarginatis, fauce nuda. Stam. exserta. Styl. filiformis, longior. stigmata 2, simplicia. Sem. 4: unum saepius abortivum.*

1. *dichotoma.* *Lithospermum dichotomum*, semin. laevibus, caul. prostrato, fol. oblongo-obovatis lineatis rugosis, floribus congestis. Flor. Per. 2. p. 5. t. 117. Hab. in Peruviae arenosis. Caul. dichotomus, geniculatus, nodulosus. Tabulis omnino a *Lithospermis* recedit. Nom. vernaculum *Tiquilo*.

351. **LITHOSPERMUM. Cor. infundibulif. fauce perforata, nuda. Cal. 5-partitus. Sem. ossea, nitida. (Genitalia inclusa.)**

1. *officinale*, semin. laevibus, corollis vix calycem superantibus, fol. lanceolatis venosis. Engl. bot. t. 134. Willd. sp. p. 751. Flor. dan. t. 1084. Hab. in ruderatis, styvaticis. Sem. alba. ☉

2. *latifolium*, fol. lato-ovalibus nervosis supra asperis subnudis, sem. lucidis punctatis. Michaux, Flor. t. p. 131. Habit. in umbrosis Kentucky. Priori affine.

3. *angustifolium*, pumilum procumbens, fol. linearib. pilis brevib. appressis, semin. nitidis punctatis, Michaux, p. 110. Ad flumen Ohio. Puncta in seminibus uti antecedentis excavata.

4. *distichum*, sem. laevibus lucidis, fol. ovato-lanceolatis, margine revolutis, flor. axillaribus petiolatis. Ortega Decad. p. 8. In insula Cuba. Cor. alba: fauce lutea. Sem. alba. Folia latiuscula, fere avenia.

5. *arvense*, seminib. rugosis, corol. vix calycem superantibus. Engl. bot. t. 123. Fl. dau. t. 456. Hab. in agris et arvis. Planta tinctoria videtur. ☉

6. *tinctorium*, semin. rugosis, corollis cal. superantibus, fol. lineari-lanceolatis, flor. lateralibus solitariis. Flor. Per. 2. p. 4. t. 114. In Chile arenosis. Pl. herbacea, hinc inde purpurasc.

7. *cuneifolium*, incanum, fol. cuneiformibus, flor. axillaribus solitariis, semin. nitidis. Flor. Per. 2. p. 4. Hab. in Peruviae collibus aridis.

8. *hispidum*, sem. rugosis, fol. lanceolatis sessilibus, apice revolutis. Flor. Per. L c. p. 5. In Peruviae saxosis. Albicans. Cor. lutea. ☉

9. *muricatum*, sem. muricatis, cor. cal. aequante, fol. lanceolato-linearibus. Flor. Per. 2. p. 4. Cal. fruct. expansus. In Chile ruderatis et parietibus.

10. *incanum*, seminibus asperis, spicis terminalibus compositis coarctatis, foliis linearibus villosis. Forst. prod. n.º 65. In insula Teauſea et feroci. h

11. *papillosum*, seminib. rugosis, fol. lanceolato-ovatis papillois hirsutis. Thunb. Prod. 34. Hab. ad Cap. b. spei.

12. *tetrastigma*, fol. lanceolatis hirsutis, flor. in spicis terminalibus secundis, stigmate quadrifido. Lam. encyc. 3. p. 29. et ill. p. 358. Hab. in Aegypto. ☉

13. *scabrum*, seminib. laevibus, foliis lanceolatis papilloso-scabris hirsutis. Th. prod. 34. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *orientale*, ramis floriferis lateralibus, bracteis cordatis amplexicaulis. Habit. in Oriente. ☉

Obs. Habitus recedit. Cal. subdecagonus. Cor. flava, fauce margine pilosa. Stigm. ca-

pitatum. Sem. subpubescentia: *Oskampia* trichotoma. Moench. Method. p. 430.

15. *purpureo-caruleum*, sem. laevibus, corollis calyc. multoties superantibus. L. H. in nemoribus et secus vias. Caules steriles repentes radicanes. T

16. *fruticosum*, ( *rosmarinifolium* ), fruticosum, fol. linearibus hispidis, margine revolutis, staminib. corollam aequantibus. Mill. dict. n. 3. *Anchusa* lignosior Monspelienisium, flore violaceo, Barr. ic. 1168. Buglossum, rosmarini fol. Garid. aix. t. 15. Hab. in Europa australi. h

17. *decumbens*, ( *pentagonum* ), calloso-hispidum, fol. lanceolatis, cal. basi pentagonis strigosis, sem. tuberculatis, caule herbaceo. Venten. Descr. p. 37. t. 37. Habit. in Bagdad. ☉

18. *callosum*, decumbens, fol. lanceolato-linearibus calloso-verrucois hispidis, caule suffruticoso hispido. Vahl. symbol. 1. p. 14. Hab. in desertis prope Cairo. h

19. *ciliatum*, fol. ovatis incanis margine callosis ciliatis, caule suffruticoso muricato hispido. Vahl. symbol. 1. p. 14. Hal. it. ad canales prope Cairo. h

20. *tenuiflorum*, fol. lineari-lanceolatis strigosis, corol. filiformibus. Lin. suppl. 130. Hab. in Aegypto. Cor. caerulea. ☉

21. *dispermum*, semin. duobus, caly. cili. patentibus. Lin. dec. 1. t. 7. In Hispania Calyx quasi induratus. ☉

22. *retortum*, fol. inferioribus spathulatis summis linearibus, calycibus fructiferis pediculis ciliatis monospermis, semine confuso calloso-punctato. Willd. sp. 2. p. 755. Pall. it. 3. app. n.º 72. t. II. fig. 2. Hab. in Sibiria ad ripas praerupt. nitrosas Volgae. ☉

(? *incurvum*, fol. sublanceolatis incanis, cal. lacinis apice incurvatis, seminib. quaternis. In Hispania collibus. Thibaut.

352. **BATSCHIA**, Cal. subquinquefidus. Cor. hypocrateriformis (majuscula), tubo recto, cal. longiore: intus basi annulo barbato; fauce nuda, lacinis rotundatis. Sem. dura nitida.

1. *carolinensis*, hirsuta, fol. floralibus ovatis, cal. longis sublanceolatis. B. Gmelini. Michaux. Flor. I. p. 130. Gmel. syst. II. p. 315. Hab. in aridis sylvis Carolinae inferioris.

2. *canescens*, candicanti-villosa, fol. omnibus oblongis, cal. brevissimis. Mich.

14. In collibus sylvaticis Tennessee. *Obs.*  
An Lithospermum orientale L. hujus generis?

353. **ANCHUSA.** *Cor.* infundibuliformis : fauce clausa fornicibus. *Sem.* basi insculpta, superficie ut plurimum venosa.

1. *paniculata*, fol. lanceolatis strigosis integerrimis, panicula dichotoma divaricata, flor. pedunculatis, cal. quinquepartitis, laciniis subulatis. Ait. Kew. 1. p. 177. Willd. sp. 2. p. 756. *A. macrophylla*. Lam. ill. p. 402? Hab. in Madera. ♀

2. *capensis*, foliis lanceolatis callosis villosis, racemis trichotomis. Thunb. pr. 34. Hab. ad Cap. b. spci.

3. *officinalis*, foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis, bract. ovatis. Lin. Fl. dan. t. 572. Hab. ad ruderata, vias, agros. Cal. 5-partitus. ♀

4. *angustifolia*, fol. oblongo-lanceolatis integris, flor. spicatis, calycib. quinquefidis, bract. lineari-lanceolatis. Moris. s. 11. t. 26. f. 4. In Italia, Germania. ♂

5. *undulata*, strigosa, fol. linearibus dentatis, pedicellis bractea minoribus, cal. fructiferis inflatis. Boccon. mus. t. 77. Barr. ic. 578. Hab. in Hispaniae, Lusitaniae, Si. biriae pratis. ♂

6. *tinctoria*, tomentosa, fol. lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. H. Monspeli et in Barbaria. ♂

7. *hispida*, pedunc. axillaribus diphyllis, fol. lanceolatis repando-dentatis hispidis. Vahl. symb. 2. p. 33. In Aegypto.

8. *virginica*, flor. sparsis, caule glabro. A. Paecon indigenis dicta qua se pingunt americani. Pluck. alm. 30. Moris. s. 11. t. 28. f. 4. Hab. in Virginia. ♂

9. *lanata*, fol. villosis, calycib. hirsutis, staminibus corolla longiorib. H. Algiriae.

10. *sempervirens*, peduncul. diphyllis espartatis. Hab. in Anglia, Hispania. Flor. vere. Cor. caerulea Myosotidis. ♂

11. *parviflora*, fol. linearibus cauleque ramosisimo hispidis, racemis paucifloris confertis. Willd. p. 759. Hab. in Oriente.

12. *cespitosa*, foliis linearibus obtusis basi attenuatis caule longioribus, racemo terminali simplici subquadrifloro. Willd. Lam. encycl. 1. p. 498. Hab. in Creta. Rad. crassa, ♂

† **Buclossum** : *squamulis faucis cor. penicilliformibus.*

13. *italica*, caule exaltato, fol. lucidis strigosis, racemis bipartitis diphyllis, flor. subaequalibus, fauce barbatis. Reitz. obs. 1. p. 72. Trew. Dec. 2. p. 14. t. 13. Moris. s. 11. t. 26. f. 1. Hab. in Europa australi in campis : saepius cum *A. officinalis* confunditur. (Bugl. caeruleum.)

*Obs.* An *Cynoglossum fulvum*, cor. cal. aequali limbo fornicumque apicibus barbatis Rudolphi in Schräd. bot. Journ. 2. p. 280. hujus loci? qualis plantae prope Lisbonam crescentis pedunculi lanugine aurea vestiti sunt.

354. **CYNOGLOSSUM.** *Cor.* infundibuliformis : fauce clausa fornicibus. *Semina* depressa, latere interiore stylo affixa.

1. *officinale*, staminibus corolla brevioribus, fol. lato-lanceolatis basi attenuatis tomentosis sessilibus, laciniis calycinis oblongis. Ait. Kewt. 1. p. 179. Willd. sp. 2. p. 760. Flor. dan. t. 1147. Hab. in ruderatis. Odore murino foetet. Smith.

2. *montanum*, stam. corolla brevioribus, fol. spatulato-lanceolatis lucidis nudiusculis subtus scabris. Smith. brit. 1. p. 276. (C. sylvaticum.) C. *montanum*. Lam. C. virginianum. Lin. syst. veg. ed. 13. nec Sp. pl. C. Dioscoridis. Villars. C. virente folio montana frigidarum regionum. Column. Ecphr. t. 175. C. *sylvaticum* Haenke in Jacq. coll. 2. p. 77. non differre videtur. Hab. in sylvaticis montosis. Vix foetet. Sm.

3. *pictum*, corollis calyci subaequalibus venosis, laciniis calic. subrotundo-dilatatis, fol. lanceolatis tomentosis : superioribus basi cordatis. Ait. l. c. C. *creticum*. Villars. Hab. in Europa australi, Barbaria et Madera. ♂

4. *lanceolatum*, fol. lanceolatis utrinque attenuatis supra punctato-scabris inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus. Vahl. symbol. 2. p. 34. Hab. in Arabia.

5. *virginicum*, foliis amplexicaulis. Gron. virg. 10. Moris. s. 11. t. 30. f. 9. Hab. in Virginia. ☉

6. *amplexicaule*, hirsutissimum, foliis ovali-oblongis : superioribus amplexicaulis, corymbo terminali aphyllis, seminibus obovatis. Mich. Fl. 1. p. 132. In montibus Alleghanis. An idem cum antecedente?

7. *clandestinum*, fol. lanceolatis villosis, corol. calycem aequantibus apice

tomentoso pubescentibus. Desf. atl. I. p. 159. t. 42. Habit. ad limites agrorum Algeriae. Sem. echinata spinulis peltato uncinatis. D.

8. *cheirifolium*, corollis calyce duplo longioribus, fol. lanceolatis sericeis. C. fol. spatulatis incanis tomentosis semiamplexicaulis. Gouan. monsp. 20. Hab. in Creta, Gallia, Hispania, Oriente. Corollae albae venis sanguineis. ♂

9. *apenninum*, staminibus corollam aequantibus. Col. cephr. t. 170. Hab. in alpinis Apenninis et Campoclaresibus. ♂

10. *hispidum*, fol. oblongis obtusis setaceo-hispidis, stom. corolla brevioribus. Thunb. prodr. 34. Hab. ad Cap. b. spei, cum tribus sequentibus. ☉

11. *hirsutum*, foliis lanceolatis villosis-hispidis, seminum aculeis uncinatis. Th.

12. *echinatum*, fol. lanceolatis obtusis papillis hirsutis, semin. subconicis uncinato-aculeatis. Thunb. ♀

13. *muricatum*, fol. ovatis villosis scabris, semin. callosis-muricatis. Thunb. ♀

14. *angustifolium*, fol. linearibus hispidis, stylo corollis campanulatis longiore, seminibus laevibus. Willd. l. c. p. 763. Tournef. Cor. 7. Habit. in Armenia. Cor. calyce multo longior. Semine glabra clypeata. ♀

15. *laevigatum*, fol. lanceolato-ovatis glabrisculis, calycibus tomentosis, sem. laevibus. Linn. suppl. 131. C. *Rindera*. Pall. Flor. ross. 2. p. 96. t. 88. *Rindera* traspi. Pall. it. 1. p. 486. t. F. f. 1. 2. Hab. in Sibiria. Cor. perva. ♀

16. *glastifolium*, fol. lanceolatis glabris subvis papulosis, seminib. membranaceis centro submuricatis. Willd. p. 764. Tourn. Cor. 7. Hab. in Armenia.

17. *cristatum*, fol. lineari-lanceolatis hispidis, sem. membranaceis centro et margine muricatis. Willd. l. c. C. seminibus margine membranaceo cristatoque pelvis inter cinctis. Lam. encycl. 2. p. 238. Hab. in Oriente.

18. *decurrens*, fol. lanceolatis decurrentibus venosis, caule anguloso-alato. Fl. Per. 2. p. 6. Hab. in Chile nemoribus. Sem. echinata : aristis glochidiatis. ☉

19. *revolutum*, stom. corol. brevioribus, cor. calyce duplo longioribus, fol. lanceolatis : caulinis sessilibus. Flor. Per. l. c. Crescit in umbrosis. Semina echinato-hammosa. ☉

20. *pilosum*, fol. linearibus, flor. solitariis fol. alternantibus. Flor. Per. l. c. t. 111. Cresc. in locis aridis. Fruc. cristatus, uncinatus. ☉

21. *lineare*, canescent. fol. linearibus, florib. solitariis oppositifoliis, sem. dentatis. Flor. Per. l. c. p. 6. In campis aridis. ☉

22. *pauciflorum*, hispidum, fol. lanceolatis inferne angustatis, pedunc. subsempiternis. Flor. Per. l. c. Cum priore. ☉

23. *lusitanicum*, fol. cordatis amplexicaulis glabris, margine laevibus. Vahl. synh. 2. p. 34. Hab. in Lusitania. Cal. nudus. ☉

24. *linifolium*, fol. linearibus lanceolatis glabris, margine denticulato-scabris. Vahl. l. c. Meris. s. 11. t. 35 f. 11. In Lusitania. Cal. basi strigosus. ☉

25. *lanatum*, calyc. tomentoso-lanatis, corol. limbo acuto profunde quinquefido, racemulis cernuis. Lam. Hab. in Oriente.

26. *japonicum*, cal. villosis, fol. oblongis villosis, caulibus prostratis. Thunb. jap. 81. Ej. Icon. pl. Jap. Hab. in Japonia. ☉

27. *lateriflorum*, fol. linearibus acutis angustis pilosis, flor. lateralibus solitariis subsessilibus, sem. radiatim cristatis. Lam. ill. p. 400. Hab. in Lima. ☉

28. *scorpioides*, caule prostrato, foliis lanceolatis scabris, pedunculis axillaribus unifloris, sem. umbilicatis glabris. Jacq. Collect. 2. p. 3. Schmidt bohem. 1. n. 220. Hab. in nemorosis umbrosis udis Bohemiae. ☉

29. *Omphalodes*, fol. radicalib. ovato-cordatis, caulinis ovatis petiolatis. Willd. p. 766. Curt. bot. mag. t. 7. Meris. s. 11. t. 26. f. 3. Hab. in Lusitania, Carniolae nemorosis ad radices montium. Vere. ☉

30. *cappadocicum*, fol. petiolatis radicalibus cordatis, caulinis infimis lanceolatis, summis cordatis sessilibus. Willd. p. 767. Hab. in Cappadocia. ♀

31. *myosotoides*, fol. radicalibus spatulato-lanceolatis, caulinis linearibus sessilibus, seminib. membranaceis laevibus margine ciliato denticulatis. Willd. l. c. Billard. Icon. pl. Syr. 2. p. 6. t. 2. C. *lithospermifolium*. Lam. Hab. in summo cacumine montis Libani. ♀

355. PULMONARIA. Cor. infundibuliformis, fauce perva. Cal. prismatico-5-gonus.

1. *angustifolia*, fol. radicalibus lanceolatis.



ceolatis. Flor. dan. 483. Hab. in Pannonia, Helvetia, Suecia, Germania. Sequenti nimis affinis, solum foliis angustis sublinearibus distinguenda. L.  $\overline{\text{L}}$

2. *officinalis*, fol. radicalibus ovato-cordatis scabris. P. foliis ovatis hirsutis. Smith. Brit. 1. p. 216. Engl. bot. t. 118. Hab. in nemoribus.  $\overline{\text{L}}$

3? *suffruticosa*, fol. linearibus scabris, calycibus subulatis quinquepartitis. Pluck. phyt. 42. f. 7. Hab. in alpinis Italiae.  $\overline{\text{L}}$

\* \* MERTENSIA. Calyces abbreviati, tubo corollae dimidio breviores.

4. *paniculata*, calyc. abbreviatis quinquepartitis hispidis, fol. ovato-oblongis acuminatis pilosiusculis. Ait. Kew. 1. p. 181. Hab. ad fretum Hudsonis.  $\odot$

5. *virginica*, calyc. abbreviatis glaberrimis, fol. ovatis, caule erecto, flor. subpaniculatis terminalibus. Michaux. Flor. t. 1. p. 131. Mertensia pulmonarioides. Roth. catal. bot. t. 1. p. 34. Pluck. albn. t. 227. t. 6. Hab. in Virginia et Carolina ad ripas arenosas.  $\overline{\text{L}}$

6. *parviflora*, caule diffuso procumbente glaberrimo, fol. ovali-spathulatis carnosis, pedunc. l. teralibus 1-floris. Michaux, l. c. Hab. ad litora maris prope flumen St. Laurentii.

7. *sibirica*, calycibus abbreviatis, foliis radicalibus cordatis. Sp. pl. 194. Gmel. sib. IV. t. 39. Hab. in Sibiria. Corymbi ramosi, nutantes. L.  $\overline{\text{L}}$

8. *maritima*, calycib. abbreviatis, foliis ovatis glaucis, caule ramoso procumbente. Lightf. scot. 1. p. 134. t. 7. In Angliae et Europae boreal. litoribus.  $\odot$

356. SYMPHYTUM. Corollae limbus tubulato-ventricosus: fauce clausa radiis subulatis.

\* Foliis ovatis.

1. *officinale*, (album), foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. Lin.

$\beta$ . *purpureum*, cal. patente: S. *patens*. Sibth. Flor. oxon. p. 70

$\gamma$ . S. ( $\alpha$  et  $\beta$ ). *bohemicum*, caule anguloso-hirsuto, racemis apice revolutis, stylo cor. excedente. Schmidt bohem. n. 212. Hab. in Europae umbrosis subhumidis. Radix nigra.  $\overline{\text{L}}$

2. *tuberosum*, fol. ovatis semilecurrentibus, summis oppositis, (radice alba.) Jacq. obs. 3. p. 12. t. 63. Hab. in Germania australi, Montspeli, Hispania.  $\overline{\text{L}}$

3. *orientale*, fol. ovatis acutis subpetiolatis. Lin. Buxh. cen. 5. p. 36. t. 58. Hab. juxta Constantinop. rivulos, primo vere.  $\overline{\text{L}}$

\* \* Foliis cordatis.

4. *tauricum*, fol. cordatis crenulatis basi inaequalibus. Willd. in Nov. Act. Soc. Nat. cur. Berol. 2. p. 120. t. 6. f. 1. S. orientale Pallas in Act. Petrop. 1792. p. 306. Hab. . .

5. *pannonicum*, foliis cordatis acuminatis integerrimis basi aequalibus. S. cordatum. Willd. l. c. Pl. rar. Hungar. p. 6. t. 7. Hab. in pinetis Comit. Beharensis et in Transylvania. Cor. luteo-alba.

357. CERINTHE. Cor. limbus tubulato-ventricosus: fauce pervia. Noces 2, biloculares.

1. *major*, corollis obtusis patulis apice ventricosus campanulatis, staminib. corolla brevioribus. Roth. cat. 1. p. 32. Lam. ill. t. 91. Willd. p. 772. Hab. in Sibiria, Helvetia.  $\odot$

$\beta$ ? *aspera*, cor. obtusis patulis cylindricis, stamin. corollae aequalibus. Roth. l. c. p. 33. Hab. in Europa australi.  $\odot$

2. *minor*, fol. amplexicaulibus integris, coroll. acutis clausis. Jacq. austr. 1. 124. In Austriae, Styriae agris et Jenae.  $\odot$

358. ONOSMA. Cor. campanulata: limbo tubuloso-ventricosus, 5-dentato, fauce pervia. Styl. inclusus. Semina 4.

1. *simplicissima*, corollis ventricosis, fol. linearilanceolatis hirsutis. Willd. sp. 2. p. 773. Gmel. sib. 4. p. 76. t. 40. Hab. in Sibiria.  $\overline{\text{L}}$

2. *orientalis*, corollis cylindricis acutis, fructibus pendulis, foliis linearibus hirtis. Willd. l. c. Hab. in Oriente.  $\overline{\text{L}}$

3. *echtioides*, corol. cylindricis obtusis fructibus erectis, fol. lanceolatis hispidis. Willd. sp. p. 774. Jacq. austr. 1. 295. Lam. ill. t. 93. Hab. in Europae rupibus.  $\overline{\text{L}}$

4. *taurica*, cor. cylindricis obtusiusculis, racemis axillaribus subnutantibus, foliis linearilanceolatis hispidis. Willd. in Nov. Act. Soc. Nat. Cur. Berol. v. 2. Pallas in Nov. Act. Petrop. 1792. p. 306. Fol. et cor. angustiora quam in antecedente, cui affinis.

5. *echinata*, pilosissima, foliis angustolanceolatis verrucosis, florib. nutantibus, sem. tuberculoso. Desfont. Atl. r. p. 161. t. L

43. Hab. in arenis deserti prope Caisam. Sem. magna. ☉

6. *sericea*, fol. petiolatis oblongo-lanceolatis sericeo-villosis. Willd. l. c. Symphytum orientale olcae fol. argenteo, flore flavescente. Tournef. Cor. 6. In Oriente. ☿

7. *coerulea*, fol. sessilibus lanceolatis sericeo-villosis, stamin. corolla longioribus. Willd. 775. Tournef. Cor. 7. Habit. in Armenia. ☿

8. *tenuiflora*, fol. sessilibus linearibus obtusis hirtis, corollis cylindricis calycinis foliolis linearibus parum longioribus. Willd. Symphytum orientale Echii folio, flore albo tenuissimo. Tournef. Cor. 6. In Oriente. Parvitate fol. distincta. W.

9. *caspica*, caule ramoso divaricato, fol. oblongo-lanceolatis hispidis, pedunculis axillaribus fructiferis reflexis, cor. obtusis. Willd. Onosma orientalis. Pall. it. 2. t. L. (bona.) Habit. in arenosis versus mare caspium. ☉

10. *micrantha*, caule ramoso divaricato, fol. oblongis petiolatis subtus incano-hispidis, racemis nudis. Willd. it. 2. app. n. 100. t. L. Hab. in Sibiria ad Irin et inter Jaikum et Volgam, locis arenosis. ☉

\* *gigantea*, caule ramoso altissimo, fol. oblongo-lanceolatis scabris, cal. pilosissimis. Lam. ill. p. 497. Hab. in Oriente.

359. **ONOSMODIUM**. *Cal.* profunde 5-partitus. *Cor.* oblonga subcampanulata: fauce nuda; limbo ventricoso semiquinquesido: lacin. subconniventibus acutis. *Anth.* sessiles inclusæ. *Stylus* exsertus.

1. *hispidum*, fol. obovati-lanceolatis papilloso-punctatis, corol. lacinis subulatis. Michaux. Flor. 1. pl. 133. Lithospermum virginianum. L. Hab. in Virginia.

2. *molle*, villosocandicans, fol. oblongo-ovalibus subtripplinerviis, cor. lacin. subovalibus. Mich. t. 15. Habit. in Tennessee, circa Nashville.

360. **BORAGO**. *Cor.* rotata: fauce radiis clausa.

1. *officinalis*, fol. alternis, calycibus patentibus. Blackw. t. 36. Willd. sp. 1. p. 776. Hab. sponte in Aleppo. ☉

2. *indica*, fol. ramificationum oppositis amplexicaulibus, pedunc. unifloris. Cal. aurito. Pluck. alm. 30. t. 76. f. 3. Hab. in India. ☉

3. *africana*, foliis oppositis petiolatis ovatis, pedunc. multifloris. In Aethiopia. ☉

4. *longifolia*, foliis lineari-lanceolatis sessilibus alternis, calyc. basi hirsutissimis. Poir. it. 2. p. 157. t. 3. Desf. Atl. t. 44. In locis humidis Numidiae.

5. *zeylanica*, fol. rameis alternis sessilibus, pedunc. unifloris, calyc. inauritiis. Mant. 202. Jacq. Collect. 3. p. 169. Ic. rar. 2. t. 314. Hab. in India orientali.

6. *crassifolia*, foliis ovato-lanceolatis subearnosis dentato-spinosis, superne scabris glaucis, petalis linearibus. - Venten. Deser. p. 100. t. 100. Hab. in Oriente. Num. floris partium passim quaternarius.

7. *orientalis*, calycibus tubo corollae reflexae brevioribus, fol. cordatis. Tourn. itin. t. 523. Buxb. cent. 5. p. 16. t. 30. Hab. circum Constantinopolin. Pedunc. axillares multiflori. Stam. exserta, villosa. ☿

8. *cretica*, calycibus longitudine tubi corollae reflexae, fol. ovatis. Willd. p. 778. Hab. in Creto. Distincta a praecedente foliis calycinis ovato-rhombicis. W.

361. **ASPERUGO**. *Cal.* fructus compressus: lamellis plano-parallelis, sinuatis.

1. *procumbens*. Lin. Flor. dan. t. 552. Hab. in ruderatis pinguibus. ☉

362. **LYCOPSIS**. *Cor.* tubo incurvato, et rectiusculo. *Cal.* inflatus aut ventricosus.

1. *vesicaria*, foliis integerrimis, caule prostrato, calycibus frutescentibus inflatis pendulis. Lin. Willd. sp. p. 779. Echiioides violacea. Desf. Atl. 1. p. 164. Nonea decumbens. Moench. Meth. p. 422. Hab. in Europa australi. ☉

\* *nigricans*, caule procumbente, foliis integerrimis, cal. fruct. inflatis pendulis, cor. calyce brevioribus. Desf. l. c. Moris. 2. 11. t. 26. f. 11. Habit. in arenosis prope Tozzer. ☉

2. *pulla*, fol. integerrimis, caule erecto, calycibus frutescentibus inflatis pendulis. Jacq. austr. 1. 188. Hab. in Tartaria, Germania, in arvis.

3. *ciliata*, foliis lanceolatis denticulatis hispido-ciliatis, calyce fructifero inflato pendulo. Willd. p. 780. Hab. in Oriente.

4. *obtusifolia*, foliis lanceolatis obtusis subintegerrimis, calyce fructifero inflato erecto. W. In Chio. ☉

5. *variegata*, fol. repandis dentatis callosis, caule decumbente, corollis cernuis. Lin. Mortis. s. 11. t. 26. f. 10. Anchusa perlata. Lam. ill. p. 403. Hab. in Creta. ☉

6. *aegyptiaca*, foliis ovato-lanceolatis verrucosis scaberrimis, florib. axillaribus alternis pedunculatis. Lin. sp. ed. l. p. 138. *Asp. rugo aegyptiaca*. Lin. Willd. p. 779. *Anchusa verrucosa*. Lam. Jacq. hort. 3. t. 21. Hab. in Aegypto. Cor. ochroleuca: tubo recto. Sem. rugosa subius concava. J. An potius *Anchusae* species?

7. *arvensis*, foliis lanceolatis hispidis, calycibus florentibus erectis, (cor. tubo incurvo.) For. lapp. 77. Flor. dan. t. 435. In arvis. ☉

8. *echioides*, foliis lanceolatis hirsutis, caule ramosissimo erecto, floribus secundis sessilibus. Buxb. cent. 1. p. 1. t. 1. Habit. in Armenia. ☿

9. *orientalis*, foliis ovatis integerrimis scabris, calycib. erectis. Hab. in Oriente. ☉

10. *virginica*, fol. lineari-lanceolatis confertis tomentosis mollioribus, caule erecto. Gron. virg. 140. Habit. in Virginia ad vias. ☉

Obs. Hocce genus forte in duo separandum est.

363. *ECHIU*. Cor. ut plurimum irregularis, fauce nuda, ampla.

1. *fruticosum*, (africanum), caule fruticoso, fol. lanceolatis basi attenuatis villosis strigosis aveniis, foliolis calycinis lanceolatis acutis. Ait. Kew. 1. p. 186. W. sp. p. 781. E. africanum fruticans. Comm. hort. 2. p. 107. t. 54. Pluck. Mant. 33. t. 341. f. 1. Habit. in Aethiopia. Plura fruticosa sunt, nomen hinc minus aptum.

2. *formosum*, caule fruticoso, foliis nitidis lanceolatis hispidis; corollis magnis aequalibus. E. grandiflorum. Andrew. t. 20. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. rubra, stam. longior, limbo brevi, obtuso.

3. *ferox*, caule fruticoso, ramis foliisque aculeatis, flor. spicatis, cor. subaequalibus. Andrew. t. 39. Cum priore. Cor. amoene violacea, limbo patente obtuso, tubo brevi?

4. *candicans*, caule fruticoso, foliis lanceolatis nervosis ramisque hirsutis, foliolis calycinis oblongis lanceolatis acutis, stylis hirsutis. Ait. Kew. 1. p. 186. Jacq. Col. 1. p. 44. Ic. rar. 1. t. 30. Habit. in Madagascariis rupibus altis. Tota planta albicat, quasi argentea. ☿

5. *giganteum*, caule fruticoso, fol. lanceolatis basi attenuatis pilosis, pilis brevissimis; bracteis calycibusque strigosis, staminibus corolla longioribus. Ait. Lin. snpp. 131. Hab. in rupibus Teneriffae. Corollae subaequales albae.

6. *strictum*, caule fruticoso stricto ramoso, fol. oblongo-lanceolatis pilosis, cor. subcampanulatis, staminibus corolla longioribus. Ait. Kew. 1. p. 180. Linn. suppl. 131. Hab. in rupibus Teneriffae. ☉

7. *argenteum*, caule folisque lanceolatis acutis sericeo-villosis, spica terminali simplicifolia. Thunb. prodr. 33. Andrew. t. 154. Hab. in Cap. b. spei montibus nigris. ☿

8. *sericeum*, fol. lineari-cuneatis, cauleque suffruticoso inanis. In Aegypto. ☿

9. *setosum*, foliis lineari-lanceolatis cauleque suffruticoso procumbente hispidis incanis. Vahl. symb. 2. p. 35. Habit. in Aegypto. Corolla unguicularis canescens.

10. *trichotomum*, caule glabro subtrichotomo, ramis tomentosis, fol. lanceolatis imbricatis tomentosis. Thunb. prodr. 33. Ad Cap. b. spei. ☿

11. *hispidum*, caule glabro, ramis apice folisque lanceolatis piloso-hispidis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. ☿

12. *paniculatum*, caule pubescente, ramis angulatis, fol. piloso-hispidis. Thunb. l. c. Hab. ad Cap. b. spei. ☿

13. *trigonum*, caule villosa, fol. oblongis canaliculatis piloso-hispidis. Thunb. Ad Cap. b. spei. ☿

14. *capitatum*, caule piloso, floribus capitato-corymbosis aequalibus, staminibus corolla longioribus, foliis hispidis. Mant. 42. Thunb. prodr. 33. Hab. ad Cap. b. spei. Corolla parva. ☿

15. *glaucophyllum*, caule fruticoso, ramis calycibusque glabris, foliis lanceolatis glaucis aveniis ad oras strigosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 312. Collect. 2. p. 325. Andrew. t. 165. Hab. ad Cap. b. spei. ☿

Obs. *Echium laevigatum* Lin. et E. glabrum Thunb. hujus videntur loci.

16. *incanum*, caule villosa, foliis lineari-ensiformibus sericeo-tomentosis, racemo spicato lineari. Thunb. prodr. 33. Hab. ad Cap. b. spei.

17. *spicatum*, caule villosa, foliis ensiformi-ellipticis villosis, spica composita lineari-oblonga. Thunb. Linn. suppl. 132. Cum priore. Ad Cap. b. spei.

L 2

18. *caudatum*, caule villosa, fol. oblongis setaceo-hispidis, spica composita ovato-oblonga. Thunb. Ad Cap. b. spei.

19. *italicum*, caule herbaceo piloso, fol. lineari-lanceolatis strigoso-hirsutis, inferioribus nervosis, cor. subaequalibus, staminibus corolla longioribus. Ait. Kew. 1. p. 187. E. caule erecto piloso, spicis hirsutis, corollis subaequalibus, staminib. longissim. Lán. β ? *Echium altissimum*. Jacq. aust. 5. app. t. 6. Hab. in Anglia, Italia, Helvetia, Pannonia, Gallia, in collibus siccis. Corolla subparva, alba. Stam. longissima. ♂

20. *asperimum*, caule ramoso pilosissimo, fol. lanceolatis tuberculosis, corolla villosa, stam. exsertis. Lam. ill. p. 412. E. pyrenaicum. Desf. Atl. 1. p. 164. Lin. mant. p. 335. In agro Tunesiano et Algeriensi.

21. *flavum*, caule simplici, fol. lanceolatis, hirsutissimis, stam. cor. subregulari duplo longioribus. Desf. l. c. t. 45. Hab. in Atlante, prope Tlemsen.

22. *humile*, fol. angusto-lanceolatis pilosis scabris in petiolum decurrentibus, cal. hirsutissimis. Desf. l. c. Hab. in arenosis prope Cassam.

\* *angustifolium*, caule simplice hispido, foliis linearibus, cor. calyce duplo longioribus. Lam. ill. p. 412. Barret. ic. n.º 1011 ? Hab. in Hispania. ☉

23. *rubrum*, caule ex racemulis brevib. longe spicato, corollis subaequalibus, fol. lineari-lanceolatis hispidis. Host. synop. p. 93. Jacq. aust. 5. app. t. 3. Hab. in pratis Austriae, Pannoniae. ☉

24. *vulgare*, caule tuberculato-hispido, fol. caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. Flor. dan. t. 445. Black. t. 299. Hab. ad vias et agros. Var. fol. pubescentibus submollibus. ♂

25. *violaceum*, caule diffuso, cor. stamina aequantibus, tubo calyce brevior. Lin. Hab. in Austria, Germania, Italia. ☉

26. *maritimum*, fol. spatulato-lanceolatis villosis strigosis, staminibus corolla brevioribus. Willd. sp. 788. Tournet. inst. 136. Bocc. mus 2. p. 84. t. 78. In maritimis Italiae, Siciliae. ☉

27. *tenuis*, caule erecto tenui folisque lanceolatis strigosis, stam. cor. brevioribus. Roth. Catal. 2. p. 16. E. micranthum. Schousboe. Hab. in arvis in Barbaria. Cor. coerulea: striis albis. ☉

28. *parviflorum*, caule erecto dichotomo, fol. caulinis ovali-oblongis, corol.

subaequalibus longitudine calycis, stamin. corol. brevioribus. Roth. l. c. p. 14. Moench. method. p. 423. Hab. . . Cor. vix calycem superans.

\* *australe*, fol. caulinis ovatis utrinque attenuatis, stam. corol. aequantibus. Lam. ill. p. 413. Cresc. in Europa australi? Ab E. lusitanico distinctum videtur.

29. *grandiflorum*, foliis pubescentibus mollibus: caulinis ovato-oblongis, caule subramoso piloso, cor. calyce 4-plo longioribus. Desf. Atl. 1. p. 166. t. 46. H. . . ☉

30. *plantagineum*, fol. radicalibus ovatis lineatis petiolatis, cor. calyce majorib. Lin. Barr. ic. t. 1026. In Italia. Bract. semicordatae. ☉

31. *creticum*, caule procumbente, calycibus frutescentibus distantibus. Lin. Hab. in Creta, Oriente. ☉

32. *orientale*, caule ramoso, fol. caulinis ovatis, flor. solitariis lateralibus. Lin. Hab. in Oriente. ☉

33. *lusitanicum*, cor. stam. longiorib. caule simplici, fol. caulinis lanceolatis sericeis, flor. spicatis lateralibus. Roy. Lugd. 407. Hab. in Europa australi. ☿

364. *ECHIOCHILON*. Cal. 4-partitus. Cor. bilabiata: labio superiore bilobo; inferiore 3-lobo: lobis rotundatis; tubo gracili arcuato. Sem. 4.

1. *fruticosum*, caule fruticoso, ramis hirsutis, fol. subulatis asperis, flor. solitariis axillaribus. Desf. Atl. 1. p. 167. t. 47. Hab. prope Kerwan in regno Tunesiano. Hyeme floret.

†† *Fructus baccatus. Caul. frutescens aut arboreus.*

365. *MESSERSCHMIDIA*. Cor. tubo basi globoso, fauce nuda. *Bacca* muricata, ruberosa, bipartibilis: singulo dispermo.

1. *fruticosa*, caule fruticoso, fol. petiolatis ovato-lanceolatis cor. hypocrateriformibus. Lin. suppl. 132. Hab. in Teneriffa et insula Canar. ♀

β. *angustifolia*, fol. petiolatis lineari-lanceolatis. Lam. ill. p. 415. Habit. in ins. Canariis.

2. *Argusia*, caule herbaceo, fol. sessilibus, corollis infundibuliformibus. Linn. suppl. 132. Act. Petropol. 1763. p. 315. t.

11. Gmel. It. 2. p. 197. t. 27. *Argusia montana*. Apm. ruth. 38. In Davuriae apricis glareosis. Caulis palmaris  $\mathcal{T}$

366. *TOURNEFORTIA*. *Cor.* infundibuliformis : tubo basi globoso. *Bacca* 2-locularis, 2 4-sperma, supera, apice duobus poris perforata.

1. *hirsutissima*, fol. ovatis petiolatis acuminatis, caule hirsuto, spicis ramosis terminalibus, baccis hirsutis. Swartz. obs. 56. Habit. in America calidior.  $\mathcal{h}$

2. *volubilis*, foliis ovatis acuminatis glabris, petioliis reflexis, caule volubili, pedunc. corymboso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 148. f. b. Lam. ill. t. 93. f. 2. Sloan. hist. 1. t. 143. f. 2. Pluck. alm. 689. t. 235. f. 6. Hab. in Jamaica, Mexico, Peruvia. Arbor scandens. Bac. 4-sperma.  $\mathcal{h}$

3. *Syringaeifolia*, fol. subcordato-ovatis acuminatis glabris, spicis ramosis. Vahl. symb. 3. p. 23. Hab. in Cajenna.  $\mathcal{h}$

4. *laurifolia*, caule volubili, fol. ovato-oblongis repandis glabris, petiol. geniculatis, bacca torulosa 2-partibili. Vent. choix de Plant. rar. p. 2. t. 2. Hab. in Porto Ricco et St. Thomas.

5. *macrophylla*, fol. ovato-lanceolatis nudis maximis, pedunc. ramosis, spicis praelongis pendulis. Lam. ill. p. 416. T. *cymosa*. Lin. Jacq. coll. 1. p. 56. Ic. rar. t. 31. Sloan. jam. t. 212. f. 2. Hab. in Jamaica.  $\mathcal{h}$

6. *bifida*, fol. ovatis glabris petiolatis, pedunc. bifidis axillaribus, spicis divaricatis. Lam. ill. p. 417. Hab. in insula Franciae.  $\mathcal{h}$

7. *foetida*, fol. ovato-lanceolatis hirtis, pedunc. ramosis, spicis pendulis. Pittonia racemosa, Nicotianae foliis foetidissimis, Plum. gen. 5. ic. 220. Habit. in Mexico, Jamaica.  $\mathcal{h}$

8. *humilis*, foliis lanceolatis sessilibus, spicis simplicibus recurvis lateralibus. Pittonia humilis, Anchusae fol. Plum. gen. 5. ic. 227. f. 2. Hab. in America calida.  $\mathcal{h}$

9. *bicolor*, foliis ovatis acuminatis glabris, superne rugosiusculis, spicis cymosis erectis recurvis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 344. Hab. in fruticetis Jamaicae.  $\mathcal{h}$

10. *polystachia*, fol. ovatis acutis rugosis hirsutis, pedunc. terminalibus corym-

boso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 149. f. a. Habit. in Peruviae praeruptis. Bacca 4-sperma.

11. *undulata*, fol. oblongo-lanceolatis acutis lineatis rugosis, petunc. corymboso-dichotomis polystachiiis. Flor. Per. p. 25. f. 6. Hab. in Camanae collibus. Cor. pubescens. Bacca 2-sperma.  $\mathcal{h}$

12. *longifolia*, fol. oblongo-lanceolatis obliquis venosissimis: margine subrevoluto, pedunc. corymbosis. Flor. Per. 1. c. t. 150. In Peruviae nemoribus. Bacca 2-sperma. Symphyti habitu.  $\mathcal{h}$

13. *angustiflora*, foliis ovatis venosis acumine obliquo, pedunculis bifurcatis, cor. angustis. Flor. Per. 2. p. 25. t. 151. f. a. Cum priore. Bacca alba, 2-sperma, Glabra, suffruticosa.

14. *virgata*, fol. ovato-oblongis subundulatis hispidulis integerrimis, pedunculis terminalibus subdichotomis. Flor. Per. 1. c. t. 150. Spic. revolutae.

15. *mutabilis*, foliis ovatis integerrimis scabris, spicis cymosis brevibus, cor. lobis crenulatis. Vent. choix de Plant. p. 3. t. 3. Habit. in Jamaica.

16. *argentea*, fol. ovatis obtusis tomentoso-sericeis, spicis terminalibus compositis. Lin. suppl. 133. Rumph. 4. t. 55. Habit. ad littora maris Zeylanici. Truncus brevissimus, cortice fisso.  $\mathcal{h}$

17. *sericea*, fol. ovato-lanceolatis subtus tomentosis sericeis, spicis lateralibus terminalibusque dichotomo-paniculatis. Vahl. eclog. 1. p. 17. Hab. in insula Moutferrat.  $\mathcal{h}$

18. *suffruticosa*, (*incana*), fol. sublanceolatis incanis undulatis, cauli. suffruticoso spicis ramosis laxis. Lam. ill. p. 417. Hab. in Jamaica. Plures dantur suffruticosae.  $\mathcal{h}$

367. *CORDIA*. *Cor.* infundibuliformis. *Stylus* dichotomus. *Drupa* nuce 2-loculari.

1. *Myxa*, fol. ovatis supra glabris, corymbis lateralibus, calycibus decemstriatis. Lin. Willd. sp. 2. p. 1072. Pluck. alm. 306. t. 217. f. 3. Hab. in Aegypto, Malabarica. Folia Alni.  $\mathcal{h}$

2. *rotundifolia*, foliis subrotundis crenatis scabris, pedunc. corymboso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 24. t. 148. f. a. Hab. passim in Limae arenosis. Cal. striatus.

3. *obliqua*, fol. integerrimis subrotundo-

cordatis nervoso-venosis obliquis. Willd. phytog. 1. p. 4. f. 1. Hab. in India orientali. Calyx non striatus. An prioris varietas?

4. *monoica*, fol. subrotundo-ovatis densatis venosis scabris, corymbis axillaribus monoicis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 43. t. 58. Hab. in sylvis Indiae. An potius polygama? h

5. *spinescens*, fol. ovatis acutis serratis scabris, petiolis subspinescentibus. Mant. 206. Hab. in India orientali. Rami tomentosi, ferruginei. h

6. *Sebestena*, foliis oblongo-ovatis repandis scabris s. J-eq. am. ed. 2. t. 44. And. t. 157. *Sebestena* scabra flore miniatu crispo. Dill. elth. 341. t. 255. f. 331. Hab. in Ind. h

7. *aspera*, fol. ovatis acuminatis asperis, floribus cymosis rugosis. Forst. prod. n. 109. Habit. in insula Tongatabu. h

8. *dichotoma*, fol. oblongo-ovatis vix crenatis, corymbis dichotomis. Forst. prod. n. 110. Hab. in N. Caledonia. h

9. *Geraecanthus*, fol. lanceolato-ovatis scabris, panicula terminali, calycibus decemstriatis. Jacq. amer. t. 175. f. 16. Brown. jam. 170. t. 29. f. 3. Hab. in Jamaicae sylvis. An species *Cerdana* cum n. 1? h

10. *flavescens*, fol. oblongis acuminatis reticulato-venosis glabris, racemis axillaribus. Willd. Fructus viridi-flavescens cerasiforme. Aubl. guj. 1. p. 226. t. 89. In sylvis Gujanae et Cajennae ad margines pratorum. h

11. *Toqueva*, fol. cordatis acuminatis villosis, flor. racemosis. Aubl. guj. 1. p. 228. t. 90. Hab. in sylvis Gujanae. h

12. *macrophylla*, foliis ovatis villosis sesquipedalibus. Mill. dict. 3. Sloan. jam. 184. hist. 2. p. 130. t. 221. f. 1. Hab. in Jamaica. h

13. *micranthus*, fol. ellipticis acutis integris membranaceis venosis, racemis compositis laxis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 460. In Jamaicae sylvis montium. h

14. *elliptica*, fol. oblongis apice attenuatis integris subcoriaceis, racemis compositis diffusis, drupis acuminatis. Swartz. l. c. p. 461. Hab. in Jamaica, Dominica. h

15. *Collococca*, fol. oblongo-ovatis integerrimis, florib. corymbosis, calycibus interne tomentosis. Sloan. hist. 2. t. 203. f. 2. Pluck. phyt. t. 158. l. 1. Hab. in Jamaica. h

16. *hirsuta*, fol. oblongis utrinque attenuatis pubescentibus, caule pedunculisque

corymbosis terminalibus axillaribusque hirsutis. Willd. p. 1076. Aubl. guj. 1. p. 219. t. 86. Hab. in sylvis Cajennae et Gujanae. h

17. *tetrandra*, foliis ovatis acutis, basi inaequaliter cordatis subtus scabris, cyma terminali, floribus tetrandris. Willd. Fructu albo tetrapyreno. Aubl. In Gujana ad fluviorum ripas.

18. *tetraphylla*, fol. quaternis obovatis integerrimis glabris, pedunc. lateralibus multiflor. Willd. C. fol. verticillatis, fructu olivaeformi. Aubl. 1. p. 224. t. 88. Hab. in maritimis Gujanae.

368. **PATAGONULA.** *Cor.* rotata. *Stylus* dichotomus: *Cal.* fructifer maximus. *Sem.* . .

1. *americana*. Lin. Dill. elth. t. 226. f. 293. Lam. ill. t. 96. *Cordia* Patagonula. Ait. Willd. sp. p. 1076. Hab. in Patagonia. A *Cordia* differt calyce et forte fructu.

369. **MFNAIS.** *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* hypocrateriformis. *Bacca* 4-locularis. *Sem.* solitaria.

1. *topiaria*. Lin. Hab. in America meridionali. Fol. ovata, integra. An *Ehretiae* species? h

370. **EHRETIA.** *Cor.* tubulosa. *Drupa* 2-locularis. *Nuces* solitariae, 2-loculares. *Stigma* emarginatum.

1. *tinifolia*, fol. oblongo-ovatis integerrimis glabris, flor. paniculatis. Amoen. acad. 5. p. 595. Willd. sp. 2. p. 1077. Lam. ill. t. 96. Trew. Ehret. t. 24. Hab. in Jamaica. h

2. *aspera*, fol. ovatis scaberrimis, flor. corymbosis spicatis secundis. Willd. phyt. 1. p. 4. t. 2. f. 1. Roxb. corom. 1. p. 41. t. 85. Hab. in rupestribus siccis Indiae. Medium tenet inter *Ehretias* et *Tournefortias*, et cum *Cordiis* stigmate convenit. Willd. h

3. *laevis*, fol. ovatis glabris, flor. lateralibus corymbosis spicatis secundis divaricatis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 42. t. 56. Habit. in montibus Circarensibus Indiae. Simillima praecedenti. W. h

4. *internodis*, fol. oblongo-ovatis glabris, paniculis infrastolaceis. Willd. l'Her. stirp. 1. p. 47. t. 24. E. petiolaris. Lam. in rupibus insulae Mauriti. Corolla campanulata. h

5. *spinosa*, spinosa. Jacq. amer. 46. t. 80. f. 18. Hab. in America. h

6. *Bourreria*, foliis ovatis integerrimis laevibus, flor. subcorymbosis, calycibus glabris. Linn. *Beurreria succulenta*. Jacq. *Brown. jam.* 168. t. 15. f. 2. In Jamaica. *Beurreria* affinitate jungit Ehretias cum *Cordiis*. h

7. *virgata*, fol. oblongis integris superne scabris, ramis filiformibus, pedunc. terminalibus sparsis unifloris, calycibus hirsutis. Swartz. *Fl. ind. occid.* 1. p. 463. In desertis Hispaniolae. h

8. *exsucca*, fol. cuneiformi-lanceolatis margine reflexis. Lin. *Beurreria exsucca* fructibus exsuccis quadrifidis. Jacq. *amer.* 45. t. 173. f. 17. Hab. in Amer. merid. h

9. *microphylla*, fol. cuneiformibus obtusis, superne scabris punctatis, pedunc. brevibus axillaribus subunifloris. Lam. *ill.* p. 425. Pluck. t. 31. f. 1. Hab. in India. h

10. *buxifolia*, fol. fasciculatis obovatis calloso-punctatis, apice subtridentatis, pedunc. multifloris. Willd. *Roxb. corom.* 1. p. 42. t. 37. *Cordia retusa*. Vahl, *symb.* 2. p. 42. Hab. in India orientali. h

371. VARRONIA. *Cal.* campanulatus 5-dentatus. *Cor.* tubulosa cal. paullo longior: ore patente crenato-plicato. *Styl.* dichotomus. *Stigma* 4. *Drupa* ovata 1-locularis (4-locular. Lin.), 1-sperma. *Flor.* Per. 2. p. 22.

1. *crenata*, fol. ovato-subrotundis crenatis rugosis, pedunculis lateralibus, flor. capitatis. *Fl. Per. l. c.* t. 146. f. 6. Habit. in Peruviae petrosis et argillosis. *Lantanae* forma. h

\* *parviflora*, fol. ovato-oblongis serratis, pedunc. oppositifoliis alternantibusque, spicis globosis. Orteg. *Dec. plant.* p. 86. In N. Hispania et Peruvia. An una ex enumeratis Peruviae specibus? h

2. *lineata*, fol. lanceolatis lineatis, pedunculis lateralibus petiolo adnatis, spicis globosis. Amoen. *acad.* 5. p. 394. Willd. *sp.* 2. p. 1079. *Brown. jam.* t. 13. f. 2. Pluck. *alm. t.* 328. f. 5. Hab. in America. h

3. *bullata*, fol. ovatis venoso-rugosis, spicis globosis. Linn. l. c. Swartz. *obs.* 88. Hab. in Jamaicae fruticetis aridis. h

4. *globosa*, foliis lanceolatis-oblongis, caule dichotomo, pedunc. axillaribus elongatis nudis, spicis globosis. Hab. in Amer. Varietas V. *bullatae*? Swartz. *obs.* 88. h

5. *geniculata*, (*mirabil.* Jacq.), fol. ovatis rugosis serratis, floribus racemosis secundis,

corollis hypocrateriformibus. Swartz. *prod.* p. 465. Jacq. *amer.* 41. t. 33. *Tournefortia serrata*. Lin. *vid. Lam. ill.* 418. Hab. in fruticetis et petrosis graminosis Hispaniolae. *Pedic. geniculati.* h

6. *martinicensis*, foliis ovatis acuminatis, spicis oblongis. Jacq. *amer.* 41. t. 32. Hab. in Martinica. A V. curassavica non diversa. Swartz. *obs.* p. 89. h

7. *curassavica*, fol. lanceolatis, spicis oblongis. Jacq. *amer. ed.* 2. p. 25. Swartz. *obs.* 88. In Jamaicae fruticetis, pascuis. h

8. *dichotoma*, foliis ovato-lanceolatis acutis sursum serratis, pedunc. umbellato-spicatis. *Flor.* Per. l. c. f. a. Copiose in Per. ruderalis etc. *Drupa coccinea.* h

9. *obliqua*, foliis ovatis acutis obliquis obtuse serratis, pedunculis rameis, spicis oblongis. *Flor.* Per. 2. p. 24. t. 147. f. a. In Peruviae praeruptis. *Flor. densi sessiles.* h

10. *cylindristachya*, fol. ovatis acutis dense serratis rugosis, spicis longis supra-axillaribus et terminalibus. *Flor.* Per. p. 23. t. 147. f. a. (*macrostachya*) *Cresc.* in Peruviae saepibus. *Drupa calyce involuta, alba.* h

11. *ferruginea*, fol. ovatis dentatis subtus tomentosis, pedunc. lateralibus, spic. oblongis. Lam. *ill.* p. 418. Hab. in America. h

12. *angustifolia*, fol. linearibus scabris subdentatis obtusis, spicis linearib. oblongis. Willd. p. 1081. Hab. in insula St. Crucis. Fol. inferne tomentosa.

13. *alba*, fol. cordatis, florib. cymosis. Jacq. *amer. ed. picta.* p. 26. Hab. in America. h

14. *monosperma*, fol. ovato-lanceolatis, spicis subrotundis, nuc. 1-loculari. Jacq. *Sevenbr.* 1. p. 18. t. 39. Habit. ad Caracas. h

372. CERDANA. *Cal.* tubulosus, 10-striatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5-partito. *Nectar.* cyathiforme, germen ambiens. *Stigm.* 2, bifida.

1. *alliodora*, fol. oblongis ovatisque, flor. paniculatis. *Flor.* Per. p. 47. t. 184. In Peruvia, in nemoribus Pozuzo et Munna. Arbor excelsa, cujus cortex, recenter evulsus, odorem foetidum spirat, deinde vero, uti et folia, allium redolet. Fol. saepissime a Formicis exiguis devorantur. l. c.

+++ *Asperifoliae fructu capsulari.*

373. ALDFA. *Cor.* campanula a. *Styl.* bifidus. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, 2-sperma, cal. 5-partito involuta. (Genitalia longe exserta.)

1. *pinnata*, fol. pinnatis, superioribus simplicibus. Flor. Per. 2. p. 8, t. 14. Hab. in Chile et Peruvia. Filam. hirsuta. Spicae recurvatae. Sequenti generi affinis.

374. PHAGELIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* subcampanulata, 5-fida. *Stam.* exserta. *Caps.* 2-locul., 2-valvis, 4-sperma.

1. *bipinnatifida*, (simplex), erecta, fol. pinnatifidis: lacin. inciso-lobatis, spicis ut plurimum bifidis, corollae lobis margine simplicibus. Michaux, Flor. 1. p. 134, t. 16. Hab. in sylvis occidentalibus montium Alleghanis.

2. *fimbriata*, assurgens, foliis pinnatifidis: lacinis integris, spica solitaria, cor. lobis ciliato-fimbriatis. Michaux l. c. Pluck. t. 245. f. 5. Cresc. in Carolinae montibus aliis.

375. HYDROPHYLLUM. *Cor.* campanulata, interne striis 5 melliferis. *Stigm.* 2-fidum. *Caps.* globosa, 2-valvis.

1. *magellanicum*, tomentoso-lanuginosum, fol. pinnatis. Lam. in Journ. d'hist. nat. n.º. 10. p. 373 t. 19. Valerianam refert. T.

2. *appendiculatum*, hirsutum, foliis radicalibus subpinnatifidis: caulinis sublobato-angulosis, calycis sinibus appendiculatis. Michaux Flor. 1. p. 134. Hab. in sylv. montanis Tenassée. Cor. caerulescens.

3. *virginicum*, fol. pinnatifidis pinnatisque: lacinis ovali-lanceolatis incis. Lin. Lam. ill. t. 97. f. 1. Hab. in Carolinae et Virginiae sylvis montanis. T.

4. *canadense*, glabriusculum, fol. lobato-angulosis. Lin. Lam. l. c. t. 97. f. 2. In Canadae sylvis humidis. T.

376. ELLISIA. *Cor.* infundibuliformis angusta. *Bacca* sicca, 2-locularis, 2-valvis. *Sem.* 2 punctata: altero super alterum.

1. *Nyctelea*. Hab. in Virginia. Fol. pinnatifida.

377. NOLANA. *Cal.* 5-fidus: lacinis latis. *Cor.* campanulata. *Stigm.* capitatum subpentagonum. *Sem.* 5, recept. carnoso coalita, arillata?

1. *prostrata*, (gallinacea), caule prostrato, fol. ovato-oblongis, cal. lacinis triangulari-sagittatis. Fl. Per. 2. p. 6. L. sp. pl. ed. Willd. p. 794. Schmelde ic. t. 18. Hab. sponte in Peruviae maritimis arenosis. Cibus gallinis jucundus. ☉

2. *coronata*, caule prostrato, calycis lacinis subcordatis. cor. fauce villosa. Flor. Per. l. c. t. 112. f. b. Hab. in Peruviae saxosis collibus. Faux villis pulchre coronata. Caul. pubescens. ☉

3. *spatulata*, caule erecto, fol. cordato-triangularibus, calyc. lacinis spatulatis. Flor. Per. t. 113. f. a. Cum priore Cal. in fructu bipartitus. Fol. carnosa.

4. *inflata*, caule prostrato, fol. radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis, calyc. inflatis. Flor. Per. t. 112. f. a. In Camanae collibus arenosis.

5. *revoluta*, caule procumbente, foliis confertis linearibus margine revolutis, cal. ventricosus. Flor. Per. 2. p. 8. t. 113. f. b. Cresc. in Peruviae arenosis.

*Obs. Nolanae*, dicunt auctores laudati operis, plantae sunt succosae, inferne ramosissimae, unica specie excepta, prostratae, habitu solanaceae, fructu vero diversae, cujus nuculae epidermide succulenta obiectae, quadriloculares sunt: locul. 1-3 vero saepe abortientibus.

LYSIMACHIAE. Juss. (gen. 378-396.)  
*Cor.* regulares: limbo saepe 5-lobis.  
*Stam.* rarius plura aut pauciora quam 5.  
*Caps.* 1-locularis, polysperma: placenta centrali libera. Caulis herbaceus. Fol. opposita aut alterna.

378. ARETIA. *Cor.* hypocraterif. 5-fida: tubo ovato. *Stigm.* depresso-capitatum. *Caps.* 1-locularis, globosa, 5-valvis, subpentasperma.

1. *helvetica*, fol. imbricatis, floribus subsessilibus. L. Willd. sp. 2. p. 795. Diapensia helvetica. Sp. pl. 2. p. 203. Aretia fol. subhirsutis, ovatis, cauliculos tegentibus. Hall. helv. n.º 617. t. 11. Androsace Dia-



*pensia*. Vill. Delph. 2. p. 472. Hab. in alp. Helvetiae, Galliae, in petrosis aridis. ☞

2. *alpina*, foliis linearibus patentibus, florib. pedunc. L. Jacq. aust. 5. t. 18. Androsace alpina. Lam. ill. t. 98. f. 3. A. fol. ovatis repandis, scapis unifloris. Hall. helv. n. 618. t. 11. Hab. in Valtellina et Delphinatu. ☞

3. *Vitaliana*, fol. linearibus recurvatis, flor. subsessilibus: tubo elongato. Primula Vitaliana. Vill. Dauph. 2. p. 400. Habit. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis, et Italicis. ☞

*Obs.* *Primulae* flor. lutei, Aretiae folia pilis ramosis et caps. 5-valvis ei adsunt.

379. ANDROSACE. *Involucrum* umbellulæ. *Cor.* tubus ovatus: ore glanduloso. *Caps.* 1-locularis, ovato-globosa, 5-fariam dehiscentis, polysperma.

1. *maxima*, fol. ovatis dentatis, perianthiis fructuum maximis. Lin. Jacq. aust. t. 331. Willd. sp. p. 796. Lam. ill. t. 93. f. 1. Hab. inter Germaniae, Austriae, Helvetiae segtes. ☉

2. *elongata*, glabra, foliis lanceolatis dentatis, umbella fructifera elongata, cor. calyce angulato brevioribus. Retz. obs. 2. p. 10. Jacq. aust. 4. t. 330. Folia cinerea. Hab. in Austria, Germania. ☉

3. *filiformis*, fol. ovatis dentatis petiolatis, umbellae radiis capillaribus, corollis calycem campanulatum excedentibus. Retz. obs. 2. p. 10. Gmel. sib. 4. p. 81. t. 44. f. 4. Hab. in Sibiria. ☉

4. *septentrionalis*, fol. lanceolatis dentatis glabris lucidis, perianthiis angulatis cor. brevioribus. Gmel. l. c. t. 43. f. 1. Flor. dan. t. 7. Roth. germ. II. 232. Vill. Delph. 2. p. 481. In alpinis Lapponiae, Russiae, Galliae, Germaniae. Var. fol. subpinnatis in locis fertilibus. Vill. ☉

5. *odoratissima*, fol. triquetris lanceolatis ciliatis, umbellae radiis brevibus, perianthiis angulatis corolla brevioribus. W. l. c. Schreber. Dec. p. 7. t. 4. Hab. in Capadociae alpinis. ☞

6. *villosa*, fol. ovato-lanceolatis ciliatis, pedunc. brevissimis, cor. calyce majore. Hoppe. A. fol. pilosis, perianthiis hirsutis. Lin. Jacq. Flor. aust. 4. t. 332. Ej. coll. 1. p. 103. Hab. in alpinis Rhaeticis, Pyrenaeis et Carniolicis. ☞

7. *Chamaejasme*, hirta, fol. lanceolatis integerrimis, pedunc. brevissimis, corollis

calyce majoribus. Hoppe. v. Wulf. in Jacq. coll. 1. p. 194. In Carniolicis alpinis.

8. *lactea*, glabra, fol. linearibus integerrimis, pedunc. longissimis, cor. calyce majoribus. Hoppe. Jacq. austr. 4. t. 333. A. pauciflora. Vill. Delph. p. 477? Habit. in Austriae, Helvetiae et Galliae alpinis.

9. *obtusifolia*, foliis lanceolatis basi angustatis glabris, perianthiis angulatis pubescentibus. W. Allion. pedem. n. 326. t. 46. f. 1. Aretia foliis ellipticis lanceolatis glabris, scapis umbellatis. Hall. ☞? *brevisifolia*, fol. petiolatis lanceolatis hispidis, pedunc. involucri quadruplo longioribus. Vill. Delph. 2. p. 480. t. 15. Hab. in Helvetiae, Italiae, Galliae, Styriae alpinis. Planta Villarsii est sola varietas. ☉

10. *carnea*, fol. subulatis glabris, umbella involucra aequante. Lin. Pluck. alm. 332. t. 108. f. 5. ☞. Aretia Halleri, fol. ciliatis. Lin. sp. pl. 1. p. 142. Hab. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis. ☞

11? *spatulata*, fol. caespitosis spatulatis, flor. corymbosis-racemosis. Cav. ic. 5. p. 56. t. 484. f. 1. Habit. in Americae meridionalis humidis.

*Obs.* *Cor.* carneo-rubens, absque glandulis in fauce, nec involucrum infra flores adest secundum auctorem, qui cum Villarsio et Lamarkio *Androsacen* et *Aretiam* in unum conjungit genus.

380. PRIMULA. *Involucr.* umbellulæ. *Cor.* tubus cylindricus: ore patulo; limbo emarginato. *Stigm.* globosum. *Caps.* 1-locularis: ore 10-fido.

1. *verticillata*, foliis serratis glabris: floribus verticillatis. Vahl. symb. 1. p. 15. t. 5. Hab. in monte Kurma ad rivulos. ☞

2. *veris*, (*officinalis*), foliis rugosis dentatis, limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo. Flor. dan. t. 433. Bull. t. 171. Engl. bot. t. 5. Habit. in fruticetis argillosis. Corolla odorata. Cal. inflatus.

3. *elatior*, fol. rugosis dentatis hirsutis, limbo corollae plano, tubi collo hemisphaerico, floribus interioribus nutantibus. Jacq. misc. 1. p. 158. Fl. dan. t. 434. Engl. bot. t. 513. Hab. in sylvis. Fl. pallide lutei.

4. *acaulis*, fol. rugosis dentatis, subulis hirsutis, scapis unifloris. Jacq. misc. 1. p. 158. Fl. dan. t. 104. Curt. Fl. lond. ic. P. vulgaris. Smith. brit. 1. p. 222. Primula sylvestris. Scop. P. grandiflora. Lam. Cresc. in nemoribus, sepibus.

5. *farinosa*, fol. rugosis crenatis-gla-

bris, subtus farinosus, umbella erecta. Jacq. misc. 1. p. 159. Flor. dan. t. 125. Curt. Lond. ic. Hab. in alpinis et in pratis uliginosis Germaniae, Sueciae, Gallicae.  $\mathcal{T}$

6. *Cortusoides*, fol. rugosis lobatis, scapo multifloro. Andrew. t. 7. Gmel. sib. 4. p. 85. t. 45. f. 1. Habit. in Sibiria. Corolla rubra. Folia Cortusae.  $\mathcal{T}$

7. *villosa*, fol. planis serrulatis hirsutis, Jacq. l. c. 1. p. 159. Ej. Flor. Aust. 5. app. t. 27. Curt. mag. t. 14. P. foliis subhirsutis dentatis, scapo paucifloro. Hall. hist. n.º 613.  $\beta$ . pubescens, foliis planis serrulatis subvillosis. Jacq. misc. 1. p. 157. t. 18. f. 2. Hab. in alpinis Carinthiae, Helvetiae.  $\mathcal{T}$

8. *nivalis*, foliis lanceolatis planis argute dentatis glaberrimis. Willd. sp. p. 803. Pall. it. 3. app. n.º 81. t. 9. f. 2. Hab. in alpinis Dauriae ad scaturigines frigidissimas.  $\mathcal{T}$

9. *longiflora*, fol. serratis glabris, subtus farinosus, umbella nutante, corol. tubo longissimo. Jacq. Fl. aust. 5. app. t. 46. Allion. pedem. t. 39. f. 3. Habit. in alpinis.  $\mathcal{T}$

10. *glutinosa*, fol. serrulatis glabris glutinosus, involucri foliolis maximis. Jacq. Fl. aust. 5. app. t. 26. Pluck. phyt. t. 149. f. 6. Hab. in summis alpinis. Odor Orchidis conopsea.  $\mathcal{T}$

11. *marginata*, foliis obovatis serrato-dentatis albo marginatis, scapo multifloro, involucri foliolis pedunculis brevioribus. Curt. mag. 191. Hab. in alpinis Helvetiae.  $\mathcal{T}$

12. *Auricula*, foliis serratis carnosius obovatis, scapo multifloro, calycibus subfarinosus. Jacq. aust. t. 405. Hab. in alpinis. Color genninus luteus, qui cultura tam varius et pulcher factus est.

\* *lutea*, foliis spatulato-subrotundis integerrimis, tubo floris calyce angustiore. Villars a p. 469. cal. brevi subfarinaceo. Lam. ill. p. 429. Hab. in Galliae et Helvetiae alpinis.

13. *longifolia*, foliis oblongo-obovatis denticulatis, involucri foliolis basi auriculatis. Curt. mag. t. 399. P. auriculata. Lam. ill. p. 429. Ventenat hort. Cels p. 42. t. 40. Hab. in Oriente. Scapus apice farinosus. Lam. Corolla intus citrina. V.

14. *gigantea*, fol. serratis glabris rhombico-ovatis, scapo paucifloro altissimo. Jacq. misc. 1. p. 160. Gmel. sib. 4. p. 84. Hab. in Sibiria.  $\mathcal{T}$

15. *minima*, foliis glaberrimis nitidis

cuneiformibus argute serratis, scapo paucifloro. Jacq. l. c. Flor. aust. t. 273. Hab. in alpinis. Corolla carnea.  $\mathcal{T}$

16. *integriifolia*, fol. integerrimis ellipticis, ad oras subcrenato-cartilagineis, umbella erecta, calycibus longe tubulosis obtusissimis. Jacq. Flor. aust. t. 327. Habit. in alpinis Pyrenaeis, Helveticis, Austriacis, Styriacis, Carniolicis.  $\mathcal{T}$

17. *carniolica*, fol. integerrimis ellipticis, umbella erecta, calycibus acutis brevissimis. Jacq. l. c. Fl. aust. 3. app. t. 4. In Carnioliis. Folia margine non cartilaginea. Calyces abbreviati. Willd.  $\mathcal{T}$

18. *norvegica*, foliis integerrimis ovatis glabris petiolatis, floribus infundibuliformibus, calycibus tubulosis obtusis. Retz. scand. n. 249. Flor. dan. t. 188. P. finmarctica. Jacq. Willd. p. 806. Hab. in alpinis Norvegiae.  $\mathcal{T}$

19. *viscosa*, fol. ovatis integerrimis villosis-viscosis, umbella erecta, cor. hypocrateriformibus. Willd. l. c. Allion. pedem. n.º 338. t. 5. f. 1. Hab. in alpinis Pedemontanis.  $\mathcal{T}$

20. *sibirica*, foliis integerrimis ovatis longe petiolatis, umbella pauciflora nutante, cor. hypocrateriformi. Jacq. misc. 1. p. 161. Gmel. sib. 4. p. 83. t. 46. f. 1. Hab. in pratis humilioribus Sibiriae.  $\mathcal{T}$

381. **CORTUSA.** Cor. rotata, tubo subnullo, fauce annulo elevato, lacin. ovatis acutis. Caps. 1-locularis, ovalis, apice 5-valvis.

1. *Mathioli*, calycibus corolla brevioribus. L. Jacq. ic. t. 32. Andrew. t. 1. In alpinis Austriae, Sibiriae, Silesiae.  $\mathcal{T}$

2. *Gmelini*, calycibus corollam excedentibus. Lin. Moen. 2. p. 340. Gmel. sib. 4. p. 79. t. 43. f. 1. Lam. ill. t. 99. f. 2. Hab. in Sibiria.  $\mathcal{T}$

382. **SOLDANELLA.** Cor. campanulata, lacero-multifida. Caps. 1-locularis, apice multidentata.

1. *alpina*. Jacq. aust. t. 13. Curt. mag. t. 49. S. foliis reniformibus sublobatis. Sch. bohem. 1. 2. n. 147.  $\beta$ . Clusii, fol. reniformibus integerrimis. Schmidt. bohem. 1. n. 148. Hab. in alpinis.  $\mathcal{T}$

383. **DODECATHEON.** Cor. rotata, reflexa. Stam. tubo insidentia. Caps. 1-locularis, oblonga.

1. *Meadia*, foliis oblongo-ovalibus den-

tato-repandis, umbellis multifloris laxis, bracteis ovalibus. Michaux Flor. 1. p. 123. Trew. Elret. t. 12. Meadia. Catesb. car. 3. t. 1. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{T}}$

2. *integrifolium*, fol. subspathulatis integerrimis, umbellis paucifloris strictis, bracteis linearibus. Michaux, l. c. Pluck. alm. t. 79. f. 6 In montibus Alleghanis juxta rivulos sylvaticos.

384. CYCLAMEN. *Cor.* rotata, reflexa, tubo brevissimo: fauce prominente. *Bacca* tecta capsula.

1. *coum*, fol. orbiculatis cordatis integerrimis. Aiton. Kew. 1. p. 195. Curt. mag. t. 4. Hab. in Europa australi.  $\overline{\text{T}}$

2. *europaeum*, fol. orbiculatis cordatis crenatis. Ait. p. 196. Jacq. aust. 5. p. 1. t. 401. Engl. bot. t. 217. Hab. in Silesiae, Bohemiae, Austriae, Barbariae sylvis umbrosis montosis. Rad. tuberosa magna. Scapi, germine impraegnato, spiritaliter contorquentur fructumque in terra recondunt. Smith.

3. *persicum*, foliis oblongo-ovatis cordatis crenatis. Aiton. l. c. Curt. mag. t. 44. In insula Cypro.  $\overline{\text{T}}$

4. *hederaefolium*, foliis cordatis angulatis denticulatis. Aiton. l. c. Lob. ic. 605. Swert. florileg. t. 59. Hab. in Italia.  $\overline{\text{T}}$

5. *indicum*, corollae limbo nutante. In Zeylona.  $\overline{\text{T}}$

385. MENYANTHES. *Cor.* hirsuta. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* 1-locularis, (in Plant. emersis 2-valvis: valvul. medio placentiferis; in natantibus ruptilis. Michaux.)

1. *nymphoides*, foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. L. Flor. dan. t. 339. Waldschmidia nymphoides. Corolla 5-fida. Glandul. ad basin germinis. Pepo 1-locularis. Semina ciliata. Hayne in Schr. bot. Journ. 1800. p. 14. Hab. in Europae australioris aquis stagnantibus, fossis majoribus.  $\overline{\text{T}}$

2. *trachysperma*, cor. glabra, laciniis integris, stylo subnullo, seminibus vesiculosos scabris. Michaux, p. 126. Villarsia aquatica. Gmel. S. N. Lin. 2. p. 447. Vent. Choix des Plant. p. 9. Habit. in America boreali. An distinctum genus?

3. *ovata*, fol. ovatis petiolatis, caule paniculato. Lin. suppl. Houttuyn t. 47 f. 1. Vent. l. c. t. 9. Hab. in aquis Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

4. *indica*, fol. cordatis subcrenatis, petiolis floriferis, corollis interne pilosis. L. Sloan. Cat. 121. hist. t. 252. Rumph. 6. t. 72. f. 3. Hab. in Malabarica, Zeylona, Cap. b. spei, Jamaicae fossis.  $\overline{\text{T}}$

5. *trifoliata*, corollis superne dense barbatis, foliis ternatis. Flor. dan. t. 541. Curt. Lond. ic. Engl. bot. t. 495. p. minor. Mich. Flor. 1. p. 125. Hab. in Europae et Americ. aquis et palustribus. Fl. Hyacinthoides.  $\overline{\text{T}}$

386. HOTTONIA. *Cor.* hypocrateriformis. *Stamina* tubo corollae imposita. *Stigm.* globosum. *Caps.* 1-locularis.

1. *palustris*, flor. verticillatis pedunculatis. Willd. Sp. p. 812. Flor. dan. t. 487. Hab. in fossis.  $\overline{\text{T}}$

2. *sessiliflora*, flor. verticillatis sessilibus. Vahl. symbol. 2. p. 36. Hab. in India.

3. *indica*, pedunculis axillaribus solitariis, fol. multifidis. Pet. gaz. Erica africana equiseti folio. Seb. mus. 2. t. 37. f. 5. Burm. zeyl. t. 55. f. 1. Rheed. 12. t. 36. Habit. in India.

4. *serrata*, pedunc. axillaribus solitariis, foliis lanceolatis tenuissime serratis. Willd. sp. a. 814. Hab. in India. Caulis subramosus. V.

387. CORIS. *Cal.* ventricosus: dentibus subspinosus. *Cor.* 1-petala, irregularis. *Caps.* 5-valvis, calyce cincta. *Sem.* plurima.

1. *mo-speliensis*, Linn. Willd. 2. p. 1000. Vill. 2. p. 464. Lam. ill. t. 202. Hab. in Europae australis maritimis. Cor. purpurea. Fol. (superiora) spinulosa. Var. foliis omnibus denticulato-spinosis, vid. Lam. ill. t. 202. An species distincta?

388. SAMOLUS. *Cor.* hypocrateriformis, 5-fida squamis interstincta. *S am.* tubo inserta. *Caps.* seminfera, 1-locularis, 5-dentata, polysperma.

1. *Valerandi*, caule erecto, fol. obtusis, racemo multifloro. Smith. brit. 1. p. 259. Flor. dan. t. 198. Curt. Lond. ic. Hab. in paludosis, maritimis, locis salosis per omnem terrarum orbem.  $\overline{\text{T}}$

2. *repens*, parvula repens. Sheffieldia repens. Lin. suppl. p. 135. Forst. gen. p. 18. t. 9. Willd. sp. p. 833. Hab. in N. Zealand. et insula Patchatis. Pepl. Portulacae similis.  $\overline{\text{T}}$

389. *LYSIMACHIA*. *Cor.* rotata. *Caps.* globosa, mucronata, 10-valvis. (Filam. in quibusdam basi connata.)

\* *Pedunculis racemosis.*

1. *vulgaris*, foliis ternis ovatis lanceolatis, racemis terminalibus. Flor. dan. t. 689. Curt. Lond. ic. Willd. sp. 1. p. 816. Hab. ad ripas et paludes. Var. fol. 4. ♀

2. *decurrens*, racemis simplicibus terminalibus, corollae segmentis obtusis, staminibus corolla longioribus. Forst. prod. n.º 65. Hab. in insula Tanna.

3. *Ephemerum*, racemis terminalibus, petalis obovatis patulis, fol. lineari-lanceolatis sessilibus. Ant. Kew. 1. p. 198. Murr. Comment. goett. 1782. p. 9. t. 2. Till. pis. 106. t. 42. f. 2. Hab. in Media, Sibiria. Differta sequente foliis subtus fusco-punctatis. ☉

4. *atropurpurea*, spicis terminalibus, petalis lanceolatis, staminibus corolla longioribus. L. Comm. rar. 33. t. 33. Hab. in Oriente. ☉

5. *dubia*, racemis terminalibus, petalis conniventibus, stam. corolla brevioribus, fol. lanceolatis petiolatis. Ait. Kew. 1. p. 199. *Lysimachia atropurpurea*. Murr. l. c. p. 6. t. 1. Buxb. cent. 1. t. 33. Cum priore ♂

6. *angustifolia*, glaberrima ramulosa, fol. oppositis verticillatisque longo-linearibus punctatis, racemo terminali brevi, petalis oblongis. Michaux Flor. 1. p. 128. L. stricta. Ait. Willd. sp. 2. p. 818? Hab. in Carolina inferiore?

7. *racemosa*, glaberrima clata, foliis ovali-lanceolatis oppositis punctatis, racemo terminali longissimo laxo, petalis oblongo-ovalibus. Michaux, Lam. ill. p. Pluck. Amalt. t. 428. f. 42. Hab. in New-York. Cor. uti in priore flava. ♀

8. *thyrsiflora*, racemis lateralibus pendulatis. L. Flor. dan. t. 517. Naumburgia guttata. Moench. meth. suppl. p. 23. ob stam. libera. Hab. in Eur. borealis paludib. inque alpebus australioris, et America? cfr. Michaux, Flor. p. 127. ♀

\*\* *Pedunculis unifloris.*

9. *quadrifolia*, foliis quaternis petiolo ciliatis, pedunc. quaternis unifloris L. Pet. Cat. 5. t. 2. f. 5. ♂? *hirsuta*, caule hirsuto, foliis subsessilibus 3-4-nis oppositisque ovalibus punctatis, pedunc. 4-nis, petalis integris. Michaux, Flor. 1. p. 127. Hab. in Canada. ♂. in Carolina.

10. *ciliata*, foliis petiolatis subcordato-ovalibus margine subpul. escentibus: petiolo ciliato, flor. cernuis, pedicel. subgeminis, petalis rotundatis crenulatis. Michaux Flor. 1. p. 126. Willd. sp. 2. 819. Wech. hort. t. 12. Hab. in New-York et Connecticut.

11. *hybrida*, glabra, fol. oppositis longe petiolatis lanceolatis, petiolo ciliato, flor. cernuis, petalis crenulatis. Michaux p. 127. L. *angustifolia*, foliis lineari-lanceolatis basi ciliatis, pedunc. filiformibus 1-floris, cor. dentatis. Willd. in N. Act. Soc. Berol. v. 3? Hab. in Carolina, Pennsylvania.

12. *heterophylla*, gracilis, foliis oppositis, imis suborbiculatis breviter petiolatis; superioribus linearibus sessilibus basi subciliatis, flor. cernuis. Michaux l. c. Hab. in Georgia.

13. *punctata*, fol. subquaternis subsessilibus, pedunc. verticillatis unifloris. Linn. Jacq. aust. t. 366. Habit. in Holland. inter arundines, et in Helvetia, Sibiria, Carniolia. Petala maculis fulvis punctata. ♀

14? *Linum stellatum*, calyc. corollam superantibus, caule erecto ramoissimo. L. Magn. Monsp. 163. t. 162. Hab. in Galliae et Italiae collibus Parva, a-3-pollicaris. Cor. 5-fida. Fructus 5-valvis.

15. *memorum*, fol. ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. Linn. Flor. dan. t. 174. *Anagallis lutea nemorum*. Bauh. Hab. in nemoribus roridis. Anagallidem refert: fol. subtus quoque punctata, sed caps. differt.

16. *japonica*, fol. subcordatis, floribus axillaribus subbinis, pedunc. folio brevioribus. Thunb. jap. p. 83. Habit. in Japonia. ☉

17. *Nummularia*, fol. subcordatis, flor. solitariis, caule repente. Linn. Flor. dan. t. 493. Hab. in pascuis humidis et in umbris. ♀

390. *LUBINIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* hypocraterif. : limbo plano 5-partito aequali. *Filam.* medio tubi adnata. *Stigm.* obtusum. *Caps.* 1-locularis, polysperma, mucronata.

1. *spatulata*. Vent. Hort. Cels. p. 66. t. 66. *Lysimachia mauritiana*. Lam. Willd. p. 820. Hab. in insula Mauritiae. Habitu Conv. tricoloris. Folia alterna. Caps. non sponte dehiscit, sed compressione 2-4-valvis. Vent. 5-valvis. Lam. ♂

391. *ANAGALLIS*. *Cor.* rotata. *Filam.* hirsuta. *Caps.* circumscissa.

1. *arvensis*, caule diffuso nudo, petalis integris planis margine pilis capitatis. A. *arvensis*. L. Willd. sp. 2. p. 831. A. *mas.* Vill. Dauph. 2. p. 361. Blackw. t. 43. Engl. bot. t. 529. In arvis.

2. *caerulea*, caule erectiusculo subulato, petalis dentatis demum reflexis. A. *caerulea*. Schreb. A. *femina*. Vill. *Cresc.* cum antecedente, sed minus frequens. Praeter color. caeruleum floris, caulibus super minus ramosus est. Folia sursum angustiora, subtus magis punctata.

3. *ovatis*, caule erecto, foliis ovalibus cum brevi acumine, florib. subsessilibus. Flor. Per. 2. p. 8. t. 115. f. a. Hab. in Peruviae collibus arenosis. Pusilla. Flores axillares. ☉

4. *alternifolia*, fol. oblongo-ovatis alternis, flor. axillaribus longe pedunculatis. Cav. ic. 6. p. 3. t. 505. f. 2. Hab. in humidis Concep. Chili. Fol. glauco-viridia venosa. In Gonorrhoea a Chilensibus adhibetur. C.

5. *pumila*, caule erecto, fol. subrotundis acutis sessilibus. Swartz. ind. occid. 1. p. 345. Hab. in Jamaicae montibus alius, locis paludosis. ☉

6. *Monelli*, fol. lanceolatis, caule erecto, herbaceo. Schousb. Mar. p. 78. ♀ A. verticillata erecta, fol. caulibus verticillatis, axillis foliorum in caule et ramis florigeris. Allion. ped. n. 118. t. 85. f. 4. Hab. in Italia et Barbaria. Flor. corul. ☉

7. *collina*, fol. lanceolatis, caule diffuso basi lignoso (fruticoso). Schousb. l. c. Hab. in Barbaria. Cor. phoenicea.

♂ ? *orientalis*, caule basi lignoso, flor. rubris. Similis *arvensi*, sed major et perennis. Ad eadem c. *collina* ? colitur apud Cels.

8. *latifolia*, fol. cordatis amplexicaulis, caule compresso. Lin. In Hispania. Cor. caerulea. Caulis erecto-paten., brachiatus, quadrangularis : angulis oppositis, triplo latioribus. L.

9. *linifolia*, fol. linearibus, caule erecto. L. Hab. in Lusitania, Hispania.

10. *tenella*, fol. subrotundis acutiusculis, caule repente. Linn. Curt. Lond. ic. Engl. bot. t. 310. *Irsekia alpina*. F. W. Schmidt. Obs. bot. in Usteri annal. bot. 2. p. 124. Hab. in Galliae, Angliae, Germaniae, Italiae ericetis humidis. ☉

11. *crassifolia*, caule repente stolonij-

fero, foliis subrotundis, pedunc. axillarib. 1-floris. Thore chloris du Département des Landes. p. 62. Hab. prope Dax in uligi n sis, turfosis. Cor. alba. Filam. hispida basi coalita. *Lysimachis* affinis.

392. *DORÆNA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala, 5-fida. *Stigma* emarginatum. *Caps.* supera, 1-locularis, 1-valvis, polysperma.

1. *japonica*. Thunb. jap. p. 84. Hab. in Japonia. Fol. oblonga, alterna. Flor. racemosi. h

393. *BACOPA*. *Cal.* 5-partitus inequalis. *Cor.* rotata : tubo staminifero. *Stigma* capitatum. *Caps.* 1-locularis, polysperma.

1. *aquatica*. Aubl. Guian. p. 120. t. 49. Lam. ill. p. 445. t. 102. Willd. Sp. 2. p. 84. Hab. in Cayenna. Fol. opposita lanceolata. Pedunc. axillares.

394. *BASSOVIA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata. *Bacca* ovata, nodulosa. *Sem.* marginata, nidulantia.

1. *sylvatica*. Aubl. 1. p. 212. t. 85. Lam. ill. t. 102. Willd. 2. p. 1065. In sylvis Gujanae humidis. Folia alterna pedunculi axillares. ☉

395. *SPHENOCLEA*. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-fida, cal. minor. *Caps.* compressa, 2-locularis, circumscissa. *Sem.* numerosa, subteretia.

1. *zeylanica*. Gaertn. de fruct. et sem. 1. p. 113. t. 24. f. 5. Willd. sp. p. 927. Pongatium indicum. Lam. ill. p. 44. Gaertnera. Retz. Rhede. 11. t. 24. Habit. in Indiae humidis. ☉

+ *Genera ericoidea s. bicornia, pentandra* (gen. 396-404.)

396. *POIRETIA*. *Cal.* 5-partitus, imbricatus persistens. *Cor.* 5-petala. *Stam.* receptaculo inserta. *Anth.* connatae. *Caps.* 5-locul., 5-valvis, dissepimentis et medio valvularum.

1. *cucullata*. Cav. ic. 4. n. 378. t. 343. *Sprengelia incarnata*. Smith. Act. holm. 1794. p. 260. t. 8. W. sp. 2. p. 843. Andrew. t. 2. Hab. in Nova Hollandia. Frutex bipedalis, rigidus.

397. *EPACRIS*. *Cal.* duplex : exterior imbricatus. *Stigma* capi-

tatum. *Germ.* cinctum squamulis. *5. Caps.* 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, polysperma. *Cav.*

1. *longiflora*, foliis cordato-ovatis rigidis apice subspinosis, flor. tubulosis elongatis. *Cav. ic. 4. p. 25. t. 344. Corolla* punicea.

*Obs.* Omnes hujus generis species in Australasia, seu Nova Hollandia aut Zeelandia praesertim prope oppidum Jackson lectae sunt, etiam omnes frutices sunt.

2. *pulchella*, fol. imbricatis cordatis: acumine rigido, flor. axillaribus tubul. socam, anulatis. *Cav. l. c. p. 26. t. 345. Cor.* rubens.

3. *pungens*, fol. ovatis imbricatis rigidis: acumine spinaeformi, cal. exteriore conico. *Cav. t. 346. Cor.* tubus rubescens: limbo albo.

4. *spuria*, fol. ovato-mucronatis: limbo revoluti, flor. axillaribus subternis. *Cav. 2. p. 27. t. 347. f. 1. An diversa a sequente?*

5. *grandiflora*, fruticosa, foliis ovatis acuminatis mucronatis recurvatis, floribus axillaribus. *Willd. sp. p. 834. Hab. in Nova Hollandia. h*

6. *pumila*, herbacea? fol. ovato-oblongis imbricatis: florib. sessilibus subsolitariis terminalibus. *Forst. l. c. Lin. suppl. 138. Hab. in Nova Zeelandia. h*

7. *longifolia*, arborea, fol. lineari-lanceolatis basi vaginantibus, racemis erectis articulatis lateralibus. *Forst. prod. n. 68. Lin. suppl. p. 138. Hab. in N. Zeelandia. h*

8. *rosmarinifolia*, fruticosa, fol. linearibus obtusis rigidis vaginantibus: flor. solitariis lateralibus. *Forst. Hab. in N. Zeelandia. h*

9. *villosa*, foliis linearibus imbricatis, ramis villosis, flor. axillaribus. *Cav. t. 347. f. 2. Cor. lacin. intus tomentosis.*

398. STYPHELLA. *Cal.* imbricatus. *Cor.* tubulosa, 5-fida: laciniis saepe revolutis hirsutis aut glabris. *Nect.* membranaceum, lacerum, germen cingens. *Stigma* capitato-5-fidum. *Stam.* fauci inserta. *Drupa* 5-locularis: locul. 2-spermis.

1. *tubiflora*, corol. clavata longissima: limbo revoluti hirsuto, florib. axillaribus solitariis, fol. obovato-linearibus. *Smith. Nova Holl. 1. p. 45. t. 14. Willd. sp. 2. p. 835. Crescunt omnes species in Nova Hollandia seu Australasia et h sunt.*

2. *triflora*, foliis imbricatis ovatis mucronatis glaucis, flor. axillaribus ternis. *Andrew. Repos. t. 72. Cor. longissima, rubescens, apice flava.*

3. *ericoides*, cor. limbo patente hirsutissimo racemis axillaribus brevissimis erectis, fol. lanceolato-ellipticis revolutis. *Smith. l. c. p. 48.*

4. *strigosa*, corollae limbo patente imberbi: fauce pilosa, racemis axillaribus brevissimis erectis, fol. subulatis. *Smith.*

5. *scoparia*, cor. limbo concaviusculo imberbi, racemis axillaribus brevissimis recurvis, fol. lineari-lanceolatis. *Smith.*

6. *daphnoides*, corollae limbo patente subpubescenti, florib. axillaribus solitariis, foliis ellipticis concaviusculis. *Smith. l. c.*

7. *Gnidium*, cor. limbo reflexo hirsuto, spicis terminalibus solitariis ovatis, foliis lineari-lanceolatis sparsis. *Hort. Malmanson. p. 23. t. 23.*

8. *lanceolata*, cor. limbo revoluti hirsuto, racemis aggregatis terminalibus, foliis lineari-lanceolatis. *Smith. Ardisia acerosa Gaert. sem. 2. p. 78. t. 94? Epacris juniperina. Lin. suppl. p. 138.*

9. *elliptica*, cor. limbo patente imberbi, racemis aggregatis subterminalibus, fol. lanceolato-ellipticis. *Smith.*

10. *juniperina*, arborea, foliis sparsis linearibus cuspidatis serrulatis, flor. sessilibus solitariis terminalibus. *Forst. prodr. n. 71. sub genere Epacris.*

\* *procumbens*, caule procumbente, fol. lineari-lanceolatis imbricatis ciliatis, flor. axillaribus solitariis. *Ventenatia procumbens. Cav. ic. 4. p. 28. t. 349. f. 1. Fol. nervis parallela.*

\* *humifusa*, fol. linearibus sparsis numerosis, floribus axillaribus. *Cav. l. c. t. 348. Caulis ramosissimus.*

*Obs.* Forsitan duae hae species ab enumeratis non diversae, quare stellulas apposui. Hoc genus ab Epacri fructu tantum differt.

399. PEROA. *Cal.* duplex: exterior triphyllus. *Cor.* hypocrateriformis: lacin. acutis tomentosis. *Germ.* ovatum nudum. *Stigm.* simplex. *Caps.* ovata, 1-locularis, 1-sperma. *Sem.* oblongum.

1. *microphylla*, caule fruticoso, foliis ovatis imbricatis, flor. terminalibus. *Pero-*

jos. Cav. ic. 4. p. 29. t. 349 f. 2. Copiose inter Jackson et Botany-Bay. Differt ab Epacri stigm. simplice, squamularum circa germen defectu et fructu 1-spermo. C.

400. PYXIDANTHERA. *Cal.* 5-partitus : laciniis incumbentibus paleaceo-membranaceis. *Cor.* campanulata, 5-partita. *Filam.* lamellata. *Anth.* loculis subglobosis circumscissis. *Styl.* crassus. *Stigm.* 3. *Caps.* ..

1. *barbulata*, fol. cuneato - lanceolatis acutis basi interna barbulatis. Michaux, Fl. 1. p. 152. Hab. in Carolina superiore. Pusilla repens, Azaleae *procumbentis* habitu. ¶

401. BÆOBOTRYS. *Cor.* tubulosa, 5-fida. *Cal.* duplex, superus; exterior 2-phyllus; inferior campanulatus, 5-dentatus. *Bacca* 1-locularis, polysperma. (*Cal.* squamula duplici infra persistente cinctus. Juss.)

1. *nemoralis*, fol. ovato-dentatis. Vahl. symb. 1. p. 19. Willd. sp. p. 992. Maesa. Forsk. Juss. Hab. in insula Tanna. ¶

2. *lanceolata*, foliis lanceolatis serratis. Vahl. l. c. t. 6. Maesa Forsk. Juss. gen. p. 180. In montibus Arabiae felicis. Racemi supradecompositi, axillares. ¶

402. ARGOPHYLLUM. *Cal.* 5-fidus, semisuperus. *Cor.* 5-partita. *Nec.* s. tubus interior, 5-gonus, pyramidalis truncatus. *Caps.* seminifera, 3-locularis, 3-fariam dehiscens; polysperma.

1. *nitidum*. Lin. suppl. p. 22. Lam. ill. 2. p. 1. t. 111. Hab. in Nova Caledonia. Frutex sericeus. Flores paniculati.

403. BROSSEA. *Cal.* carnosus superus. *Cor.* conica truncata. *Caps.* 5-sulca, 5-focularis, tecta calyce persistente, 5-fissuris peruvia. J.

1. *coccinea*. Lin. Plum. gen. 7. ic. 64. f. 2. Hab. in America calidior. Frut. multicaulis. Flores solitarii.

404. CYRILLA. *Cal.* minutus sub-turbatus, 5-partitus, superus. *Petala* 5, stellatim patentia (ri-

gidula). *Styl.* 2-fidus. *Bacca* (*Caps.* l.) exsiccabilis, 2-locularis. *Sem.* solitaria funiculo appensa. M.

1. *caroliniana*, foliis lanceolato-cuneatis acutis membranaceis nervosis. Michaux Flor. 1. p. 158. C. racemiflora. Linn. Itca cyrilla L'Herit. Stirp. t. 66. Jacq. ic. rar. t. 47. Hab. in Carolina. Petala pedicello longiora. M. ¶

2. *antillana*, foliis cuneato-oblongis obtusis coriaceis subtus nervosis. Michaux; l. c. In ins. Antil. Spicae crassiores. ¶

405. ITEA. *Cal.* 5-fidus campanulatus. *Petala* 4, linearia reflexo-patentia, cal. inserta. *Stigma* capitatum, bilobum. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis: valvis margine introflexo seminiferis. M.

1. *virginica*, foliis serratis, apicis pubescentibus. Michaux Flor. 1. p. 157. Hab. in Virginia.

*Obs.* Etiam ordine naturali, 'qui *saxifrageae*, a priore genere, quocum ab aliquibus conjuncta, differt. Richard apud Michaux. l. c.

406. PLUMBAGO. *Cal.* oblongus glandulososcaberr. *Cor.* infundibulif. *Stam.* squamis basin cor. claudentibus inserta. *Stigma* 5-fidum. *Sem.* 1, oblongum, tunicatum.

1. *europaea*, foliis amplexicanlibus lanceolatis scabris (rigidis), caule stricto. Willd. sp. 2. p. 837. Habit. in Europa australi et in Peruvia. Pl. tinctoria videtur. ¶

2. *lappathifolia*, foliis amplexicanlibus lanceolatis laevibus, caule divaricato. Willd. Hab. in Iberia. Similis precedenti. ¶

3. *capensis*, foliis petiolatis oblongis integris subtus glaucis, caule erecto. Th. prod. 33. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

4. *seylanica*, foliis petiolatis ovatis glabris, caule filiformi. Lin. Rheed. 10. t. 8. Hab. in India. ¶

5. *rosea*, fol. petiolatis ovatis glabris subidenticulatis, caule geniculis gibbosis. Linn. Rumph. 5. t. 168. Hab. in India. ¶

6. *scandens*, foliis petiolatis ovatis glabris, caule flexuoso scandente. Lin. Sloan. 1. p. 211. t. 133. f. 1. Hab. in America calidior. ¶

7. *auriculata*, fol. ovato-oblongis petiolatis subtus squamoso-punctulatis, petiolis auriculatis caulcm amplexantibus. Lam. enc. 2. p. 267. Hab. in India. *h*

407. WEIGELIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. *Styl.* e basi germinis. *Stigma* peltatum. *Sem.* 1.

1. *japonica*, fol. sessilibus ovato-lanceolatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. 2. p. 331. *Ej.* Flor. jap. t. 16. Willd. sp. p. 836. Hab. in Japonia. *h*

2. *coracensis*, fol. petiolatis obovatis. Thunb. l. c. Kaempf. ic. select. t. 45. Cum prior. *h*

408. ABRONIA. *Cal.* 6. *Cor.* infera, hypocrateriformis, supra germen coarctata. *Sem.* 1, 5-angulare, cor. basi indurata tectum.

1. *umbellata*, Lam. ill. p. 469. t. 105. *Tricratus* admirabilis. L'Herit. Willd. sp. 2. p. 807. Hab. in Californiae maritimis. Fl. capitato-umbellati.

409. MIRABILIS. *Cor.* infundibuliformis, inferne coarctata, suprema. *Cal.* inferus. *Nectarium* globosum, germen includens. *Stigma* globosum. *Nux* infra corollam, striata.

1. *dichotoma*, flor. sessilibus axillarib. erectis solitariis. Lin. Willd. sp. 2. p. 999. *Admirabilis*. Clus. hist. 2. p. 90. Hab. in Mexico. *h*

2. *Jalapa*, flor. congestis pedunculatis, fol. glabris. Willd. Batsch. anal. plant. 2. p. 34. Hab. in India utraque. Flor. flavi, rubri, albi, vespera explicantur.

3. *longiflora*, flor. congestis longissimis subnutantibus terminalibus, foliis subvillosis. Lin. Act. holm. 1755. p. 176. t. 6. f. 1. Hab. in Mexici frigidis montibus. *h*

410. FABIANA. *Cor.* infundibuliformis, limbo plicato revoluta; *Tubus* longissimus. *Stam.* inaequalia. *Stigma* emarginatum. *Caps.* bilocularis, 2-valvis.

1. *imbricata*, fol. imbricatis ovatis minimis. Flor. Per. 2. p. 12 t. 122. Hab. in Regni Chilensis campis et ripis arenosis. Resinosa, Tamarisici habitu. *h*

411. NIEREMBERGIA. *Cor.* subhypocrateriformis: tubo longissimo; fauce coarctata plicata. *Stam.* inaequalia, superne adpressa. *Stigma* bilobum. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis.

1. *repens*. Flor. Per. 2. p. 1 t. 123. f. 1. Hab. in Regni Chilensis campis apricis et pascuis arenosis Concepcionis. Herbacea, pedalis. *Convolvulacea*?

412. XUAREZIA. *Cor.* rotata. *Stigm.* compressum. *Caps.* bilocularis, 2-valvis: valvis bifidis.

1. *biflora*, fol. lanceolatis superne serratis, flor. geminis. Flor. Peruv. 2. p. 13. t. 123. l. a. *Capraria peruviana*. Fewill Peruv. 2. p. 763. t. 48. In Peruviae arenosis, ripis et argillosis. Ab incolis loco Theae adhibetur. *h*

413. PORANA. *Cor.* campanulata. *Cal.* 5-fidus, in fructu maior. *Styl.* semibifidus, longior, persistens. *Stigmata* globosa. *Per.* bivalve.

1. *volabilis*. Barm. ind. 51. t. 21. f. 1. Willd. Sp. p. 843. Lam. ill. t. 186. In India orientali. Fol. ovata, serrata, plicata. L. *h*

CONVOLVULACEI (monostyli. Gen. 414-418.) calyce sunt 5-fido, ut plurimum persistente, corolla campanulata aut infundibuliformi tubo elongato, capsula 2-3-4-loculari, eorumque folia alterna sunt, insuper herbas, assim frutices, sistent saepius volubiles et quasdam lactes. Monogynae aut Polygynae sunt.

414. RETZIA. *Cor.* cylindrica extus villosa. *Stigma* bifidum. *Caps.* 2-locularis. polysperma.

1. *spicata*. Thunb. Act. lund. t. p. 53. t. 1. f. 5. Lam. ill. t. 103. Hab. in Cap. b. spei altissimis montibus. Corol. rutescentes. *h*

415. ENDRACHIUM. *Cal.* coriaceus, 5 phyllus. *Cor.* campanulata s. urceolata extus hirsuta. *Stam.* exserta. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* substipitata, lignosa, 2-locularis.

21. *Madagascariense*. Gmel. Syst. veget. Thounia spectabilis. Smith ic. ined. 1. p. 7. t. 7. Willd. spec. 2. p. 935. *Endrachium*



drachium Juss. *Humbertia madagascariensis*. Lam. ill. t. 105. Hab. in Madagascaria. h

416. *CONVOLVULUS*. *Cor.* campanulata, plicata. *Stigm.* 2, simplicia. *Caps.* 2-3-locularis: loculis dis eruii.

\* *Caule volubili.*

1. *arvensis*, fol. sagittatis utrinque acutis, pedunc. subunifloris. Lin. Willd. sp. p. 844. Flor. dan. t. 569. Hab. in agris. Bract. remotae. ¶

\* *auriculatus*, foliis linearibus hastato-acuminatis, auriculis integris. Lam. enc. bot. 3. p. 540. Bocc. mus. t. 33. Pluck. alm. t. 24. f. 3. Var. (p. prioris. Lin.

2. *incarnatus*, foliis sagittatis oblongis acuminatis glabris: lobis divaricatis acutis integerrimis, pedunc. 1-floris. Vahl. Eclog. amer. 2. Hab. in Curassao. *C. arvensis* affinis.

3. *ruber*, fol. sagittatis glabris emarginatis: lobis obtusissimis divaricatis integerrimis, umbellis involucreatis, caule piloso. Vahl. l. c. Hab. in America meridionali.

4. *sepium*, fol. sagittatis postice truncatis, pedunc. tetragonis unifloris, bracteis cordatis maximis. Flor. dan. t. 458. Engl. bot. t. 314. Flor. Per. 2. p. 10. Habit. in sepibus et salicetis, etiam in America et Peruvia. Stigma simplex.

5. *Scammonia*, foliis sagittatis postice truncatis, pedunc. teretibus subtrifloris. Lin. Moris. hist. 2. s. 1. t. 3. f. 5. Mill. dict. t. 102. *Scammonia syriaca*. Bauh. pin. 294. Hab. in Syria, Mysia, Cappadocia. ¶

6. *involucratus*, fol. cordato-hastatis pubescentibus, pedunc. subtrifloris, calycibus bracteatis. Willd. sp. p. 845. Hab. in Guinea.

7. *Hermanniae*, fol. cordato-sagittatis subhastatisque crenato-sinuatis: nonnullis integerrimis, pedunc. bifloris. Flor. Per. 2. p. 10. L'Hér. Stirp. p. 67. t. 33. Hab. in Per. Cor. alba. Caps. helvola, carnosa.

8. *crenatifolius*, fol. sagittatis crenatis, pedunc. longis, flor. umbellatis. Flor. Per. l. c. t. 118. f. a. Cum priore. ☉

9. *sagittifolius*, fol. oblongo-sagittatis: sinu profundissimo, auriculis subacuminatis, pedunc. 1-floris, cal. laciniis rotundato-ovalibus. Mich. flor. t. p. 138. Pluck.

t. 85. f. 3. Hab. in America boreali. Cor. ampla, rosea.

10. *bonariensis*, fol. hastatis, basi cuneatis, apice setula terminatis, pedunc. subtrifloris. Cav. ic. 5. p. 54. t. 48. f. 2. Hab. in planitie de Buenos-Ayres. Corol. alba venulis roseis variegata.

11. *farinosus*, fol. cordatis acuminatis repandis, pedunc. trifloris, caule farinoso. Lin. Jacq. hort. t. 35. Hab. in Madera. ☉

12. *lanuginosus*, fol. cordatis oblongis subhastatis tomentoso-sericeis: auriculis dentatis, pedunculis trifloris, caule piloso. Vahl. symb. 3. p. 23. Hab. in Oriente. Fol. tomento subferrugineo tecta. Cor. fere C. *Scammoniae*, flavescent.

13. *villosus*, fol. cordatis ovatis acuminatis margine villoso subciliatis, capit. pedunculatis hirsutis involucreatis. *C. ciliatus*. Vahl. Eclog. amer. 2. Hab. in Cajenna. *C. guianensis* habitu.

14. *nummularius*, villosus, fol. cordatis mucronatis, pedunc. multifloris folio longioribus, calycib. ovatis, bracteis lanceolatis. Vahl. l. c. In America meridionali. Sequenti affinis.

15. *nodiflorus*, fol. subtomentosis ovatis subcordatis, pedunc. bifidis multifloris fol. brevioribus, Vahl. l. c. Lam. enc. 3. p. 557. Hab. in ins. St. Crucis. An diversus a *C. verticillato*?

16. *parviflorus*, foliis cordato-oblongis mucronatis, peduncul. ramosis multifloris brevib. subverticillatis. Enc. bot. 3. p. 556. Burm. amer. p. 81. t. 94. f. 2. Habit. ad St. Domingo in collibus petrosis, ubi floret Decembri.

17. *ovalifolius*, glaber, foliis ovalibus integerrimis emarginatis, pedunc. 1-7-8-10- cal. obovatis. Vahl. Eclog. 2. Hab. in India orientali.

18. *incanus*, tomentoso-sericens, fol. lanceolatis sagittatis obtusis basi subdentatis, pedunc. bifloris. Vahl. l. c. Hab. in America. Cor. catus villosa.

19. *emarginatus*, fol. lanceolatis: inferioribus emarginatis mucronatis, pedunc. unifloris, foliolis calycinis exterioribus gemmatis magnis Vahl. l. c. Burm. ind. 47. t. 21. f. 27. Hab. in India.

20. *Medium*, glaber, fol. linearib. hastato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunc. unifloris, cal. sagittatis, caule volubili. Lin. Vahl. symb. 3. p. 24. Rheed. t. 35. Hab. in India. Affinis *C. reptantis*. L. Calycis

foliola sagittata, ut in *Campanula* Medio. Lin. ☉

21. *flicaulis*, foliis lineari-lanceolatis obtusis mucronatis, basi dilatatis dentatis, foliolis calycinis oblongis. Vahl. l. c. Hab. in Guinea. ☉

22. *simplex*, foliis linearibus hastato-acuminatis; auriculis dentatis, foliolis calycinis simplicibus. Lam. enc. 3. p. 542. (C. hastatus.) In India orientali.

23. *dentatus*, fol. hastatis glabris; auriculis dentatis, pedunc. multifloris muricatis. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orientali.

24. *hastatus*, fol. lanceolatis hastatis, pedunc. axillaribus geminis bifloris. Vahl. symb. 1. p. 15. Hab. in Aegypto.

25. *panduratus*, radice crassa, foliis cordatis integris panduriformibus, calycibus laevibus. L. Mich. Flor. 1. p. 138. C. megaboribus, flore amplo lacteo; fundo purpureo. Dill. elt. 101. t. 85. f. 99. In Virginiae arenosis. Junior subtomentosus. ¶

26. *bracteatus*, fol. cordatis subintegris trilobisque hastatis attenuatis, pedunculis unifloris, foliolis exterioribus calycis bracteiformibus. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orientali.

27. *bicolor*, fol. cordatis villosis, basi angulato-sublobatis, pedunc. unifloris, foliolis exterioribus calycis bracteiformibus. Vahl. symb. 3. p. 25. Hab. in India orient.

28. *trilobus*, fol. cordatis villosis trilobis: lobis ovatis acutis, pedunc. unifloris, caule volubili. Thunb. prod. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

29. *platanifolius*, fol. cordatis trilobis: lobis lateralibus dentato-angulatis, pedunc. subtrifloris calycibusque subaequalibus glabris. Vahl. symb. 3. p. 26. Fewill. 3. p. 16. t. 11. Pluck. t. 167. f. 3. Hab. in Amer. australi. ¶

30. *acuminatus*, fol. cordatis trilobisque acuminatis, pedunc. elongatis multifloris calycibusque glabris. Vahl. l. c. Hab. in insula St. Crucis.

31. *obscurus*, fol. cordatis acuminatis, pedunc. filiformibus unifloris calycibusque glabris, caule hirsutissimo. Vahl. symb. 3. p. 27. C. flore minore lacteo, fundo atrovirente. Dill. elth. 98. t. 83. f. 95. Hab. in China, Batavia, Zeylona et Surinamo. ☉

32. *fluvus*, fol. cordatis repando-sublobatis dentatis apice mucronatis, pe-

duncul. bifidis multifloris. Willd. p. 852. Burm. ind. 77. t. 30. f. 2? In India orient.

33. *angularis*, fol. cordatis quinqueangularibus integerrimis villosis, pedunculis multifloris. L. Burm. ind. 46. t. 19. f. 2. Hab. in Java.

34. *Batatas*, fol. cordatis hastatis quinque-nerviis, caule repente hispidulo tuberoso. L. Michaux Flor. 1. p. 138. C. radice tuberosa esculenta. Catesb. car. p. 60. t. 60. Rumph. 5. t. 130. Hab. in India intra-que. Fol. modo hastato, modo angulato-lobata. Mich.

35. *maximus*, fol. cordatis ovatis acuminatis integerrimis glaberrimis, caule petiolisque glabris. Lin. suppl. 237. Rheed. 11. t. 53. Hab. in Zeylona. Caulis inferne ligneus. ¶

36. *gemellus*, fol. cordatis subtus villosiusculis, pedunc. bifloris. Vahl. symb. 3. p. 27. Burm. ind. 46. t. 41. f. 1. Hab. in Javae et Tranquebariae ruderalis. Floret ante meridiem usque ad 12 horam, quod raro in calidis regionibus. Koenig.

37. *cymosus*, fol. cordatis integerrimis, caule filiformi, pedunc. multifloris umbellato-cymosis. Flor. Per. 2. p. 9. t. 117. f. b. In Peruvia ad Pozuzo versatur. Caul. ramosissimus pilis deciduis hirsutus.

38. *sphaerostigma*, fol. cordatis subvillosis, flor. umbellatis, stig. linis divaricatis capitatis. Cav. ic. 5. p. 54. t. 481. Hab. in Mindanao. Calyx villosus. An potius *Ipomoea*?

39. *pentanthus*, fol. cordatis acuminatis glabris subrepandis, umbellis pedunc. capitatis quinquefloris, cal. ciliatis. Willd. p. 855. Jacq. ic. rar. 2. p. 316. Collect. 4. p. 210. Hab. . . h

40. *gujanensis*, foliis cordato-ovatis subtus calycibusque tomentosis, pedunc. elongatis, floe. corymboso-subcapitatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Auhl. guj. 1. p. 136. t. 52. Hab. ad ripas rivulorum in Cajenna et Gujana. ¶

41. *capitatus*, hispidus, fol. cordato-ovatis, flor. cordatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Hab. in India orientali.

42. *hispidus*, hirsutissimus, fol. cordato-ovatis, flor. umbellatis, pedunc. brevissimis. Vahl. Symb. p. 29. In India orientali.

43. *triflorus*, fol. cordato-lanceolatis attenuatis glabris obtusis, pedunc. triflor. Vahl. p. 30. Hab. in India orientali.

44. *verticillatus*, fol. cordatis oblongis

nudis, pedunc. umbellatis bifidis multiflor. L. sp. pl. 220. Ipomoea verticillata. Amoen. acad. 5. p. 394. Hab. in America. Flores caerulescentes, parvi.

45. *violaceus*, foliis foliolisque calycis duobus exterioribus cordato-ovatis acutis, pedunc. elongatis bifidis multifloris. Vahl. symb. 3. p. 29. Hab. in insula St. Crucis.

46. *umbellatus*, fol. cordatis, caule volubili, pedunc. umbellatis. Lin. Swartz. obs. 62. Pluck. alm. 114. t. 167. f. 1. Plum. amer. 88. t. 102. Hab. in Martinica, Domingo. Cor. lutea. Stigm. 2, globosa. Sw. T.

47. *tuguriorum*, fol. cordatis sagittatis acutis, caule anguloso, pedunc. tetragonis unid. Forst. n. 74. Hab. in Nova Zeelandia.

48. *cordifolius*, fol. cordatis hastatis dentatis, pedunc. bifido-umbellatis, caule volubili. Th. prod. 35. II. ad Cap. b. spec.

49. *bifidus*, fol. cordatis oblongis acuminatis subtus mollissimis, pedunc. bifidis multifloris. Vahl. symb. 3. p. 30. Hab. in Java et India orientali.

50. *malabaricus*, fol. cordatis glabris, caule perenni villosa. L. Rheed. 11. t. 51. Hab. in Malabariae arenosis. h

51. *coelestis*, fol. cordatis acuminatisimis pubescentibus, pedunc. elongatis umbellato-trifidis. Forst. prod. n. 77. Hab. in ins. Tanna.

52. *canariensis*, fol. cordatis pubescentibus, caule perenni villosa, pedunc. multifloris. L. Comm. hort. 2. p. 101. t. 51. Pluck. alm. t. 325. f. 1. Hab. in Canariensis. insulis. h

53. *ferrugineus*, ferrugineo-tomentosus, fol. cordato-ovatis acutis, pedunc. axillaribus quadrifloris. Vahl. eclog. 1. p. 17. Hab. in Amer. merid. h

54. *muricatus*, fol. cordatis, pedunculis incrassatis calycibus laevibus, caule muricato. L. Hab. in Surate. Simillimus C. purpureo. ☉

55. *triqueter*, fol. cordatis acutis subvillosis, pedunc. multifloris, caule tricarinato. Vahl. symb. 3. p. 30. Hab. in insula St. Crucis.

56. *anceps*, fol. cordatis, caule volubili utrinque carinato. L. H. in Zeylona, Java.

57. *Turpethum*, fol. cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunc. multifl. L. Blackw. t. 397. Herm. Lugl. B. t. 178. 179. Turpethum repens, fol. Althaeae vel indicum. Bauh. pin. 149. In Zeylona. T.

58. *grandiflorus*, foliis cordatis ovatis

obtusiusculis integerrimis, pedunc. subfloris, cal. coriaceis, caule petiolisque pubescentibus. Lin. suppl. 136. Rheed. 11. t. 50. Hab. in India inter spineta ad littora fluminum. Caulis arboreus. Cal. di-s. triphyllus coriaceus. h

59. *trinervius*, fol. cordatis oblongis glabris trinerviis, caule volubili tereti, pedunc. unifloris. Thunb. jap. 85. encycl. bot. 3. p. 543. Hab. in Japonia. Folia opposita. An Ipomoea?

60. *peltatus*, fol. peltatis, pedunculis multifloris, L. Rumph. amb. 5. t. 159. Hab. in Amboina inque Societatis insulis.

61. *Jalapa*, caule volubili, fol. ovatis subcordatis obtusis, obsolete repandis subtus villosis, pedunc. unifloris. Ait. Kew. 1. p. 211. Hab. in Mexico, Vera cruce. Rad. magna, nigra. Sem. hirsuta. Ipomoea macrostigma. Michaux. p. 141?

62. *macrospermus*, fol. ellipticis acutis glabris, cor. planis, capsularum loculis monospermis, caule scandente. Willd. p. 860. Mouroucoa violacea. Aubl. Guj. 1. p. 142. t. 54. Hab. in Gujanae sylvis. h

63. *tenellus*, fol. ellipticis mucronatis, basi subcordatis, pedunc. bifloris fol. longioribus. Willd. Lam. enc. 1. p. 535. Pluck. alm. 114. t. 166. Hab. in Carolina.

64. *sericeus*, fol. lanceolato-ellipticis, subtus tomentoso-sericeis, pedunc. subumbellatis, cal. pilosis, caule volubili. Lin. C. mollis. Burm. ind. 44. t. 17. f. 1. Hab. in India. h

65. *tomentosus*, fol. trilobis tomentosis, caule lanuginoso. Lin. Sloan. jam. 55. hist. t. 98. f. 2. Pluck. t. 167. f. 4. In Jamaica.

66. *quinqueflorus*, fol. sagittato-ovatis attenuatis glabris crenato-subrepandis, pedunc. subquinquefloris. Vahl. symb. 3. p. 31. Hab. in insula Borbonia?

67. *arenarius*, fol. oblongis emarginatis basi lobatis integrise, pedunc. unifloris, cor. tubulosis. Vahl. symb. 1. p. 18. Hab. in ins. Azoricis et ins. St. Crucis.

68. *althaeoides*, fol. cordatis sinuatis sericeis lobis repandis, pedunc. bifloris. L. Harr. rar. 5. t. 312. Hab. in Europae meridionalis, Orientis et Africae collib. T.

69. *cairicus*, fol. palmatis glebris serrulatis, stipulis foliiformibus palmatis, axillaribus tomentosis, cal. pedunculatis laevib. Vahl. symb. 1. p. 15. Ipomoea palmata. Forsk. Hab. in Aegypto. T.

70. *quinquelobus*, fol. palmato-quin-

quleobis serrulatis obtusis glabris, axillis tomentosis, pedunc. unifloris, caule glabro. Vahl. symb. 3. p. 32. In insula St. Crucis.

71. *vitifolius*, fol. palmatis quinquelobis glabris dentatis, caule piloso, pedunculis multifloris. L. Mant. 203. Burm. ind. 45. t. 18. f. 1. Pluck. alm. t. 25. f. 3. Hab. in India orientali.

72. *mucronatus*, fol. palmato-pedatis: lobis ciliatis apice mucronatis, pedunculis unifloris. Forst. prod. n.º 79. Habit. in insula Tanna.

73. *macrocarpus*, fol. palmato-pedatis quinquepartitis, pedunc. unifloris. L. Plum. spec. 1. ic. 3. f. 1. Hab. in Amer. Pedunc. articulati, incrassati. ☉

74. *paniculatus*, fol. palmatis lobis septenis ovatis acutis integerrimis, pedunc. paniculatis. Linn. Jacq. collect. 4. p. 216. Rheed. 11. t. 49. Hab. in Molaharica arenosis. Var. fol. 3-lobis s. 5-lobis. ☿

75. *macrorhizos*, fol. digitatis septenis integerrimis, caule glabro, pedunc. triflor. Lin. Plum. sp. 1. ic. 90. f. 1. Hab. in Amer. An Ipomoea?

76. *quinquefolius*, fol. digitatis glabris dentatis, pedunc. laevibus. Linn. Swartz. obs. 63. Pluck. alm. 116. t. 167. f. 6. Hab. in America, in Jamaicae sepibus. Stigm. 2, subglobosa. Sw. Ipomoea?

77. *glaber*, fol. digitatis quinatis: foliol. ovato-lanceolatis integerrimis laevibus, pedunc. multifloris. Lam. enc. bot. 3. p. 566. Aubl. Gujan. p. 138. t. 53. Willd. p. 86. Hab. in Cayenna. Lactescens.

78. *venosus*, glaberr., fol. digitatis: foliolis petiolatis ovato-acuminatis venosis, petiolis communibus basi cirrhis. Lam. l. c. Vahl. symb. 3. p. 32? Hab. in ins. Franc. et Borboniae. Ipomoea?

79. *eriospermus*, fol. digitatis: foliolis subtonis linearibus, angustissimis, sem. hirsutis. Lam. l. c. p. 567. Cresc. in St. Domingo. Caps. 4-valvis, 2-lo. ul. loculis 2-sperinis. Sem. sericea.

80. *macrocalyx*, fol. quinatis oblongo-lanceolatis integerrimis, pedunc. longissimis racemoso-dichotomis. Flor. Per. 2. p. 10. t. 98. In Peruv. nemorosis. Petioli contortii.

81. *chilensis*, pedunc. 1-floris, fol. profundissime 5-partitis: laciniis linearibus, medio productiore. Cav. ic. 5. p. 54. t. 480. f. 1. (C. dissectus.) Cresc. in Regno chilensi.

82. *renifolius*, foliis digitatis quinatis, foliolis linearibus, pedunc. subquadrifloris

Vahl. symb. 3. p. 33. Habit. in India orientali.

\* \* *Caule prostrato et non volubili.*

83. *siculus*, fol. cordato-ovatis, pedunc. unifloris: bracteis lanceolatis, flor. sessilib. L. Boer. sic. t. 48. Moris. 6. t. 7. f. 5. Hab. in Sicilia. Caul. vix, vel parum volubilis. Linn.

84. *ebracteatus*, fol. cordato-sagittatis postice obtusis, pedunc. petiolo brevioribus ebracteatis. Lam. enc. bot. 3. p. 541. Hab. . . Primo intuitu antecedenti similis dicitur, verum bracteatum defectu distinguitur. Stigmata 2-globulosa, an hinc Ipomoea?

85. *trichosanthes*, pubescens diffusus, fol. lanceolatis oblongis cum acumine, pedunc. longis 1-5-floris, cor. pilosa indivisa. Michaux p. 137. C. humistratus et aquaticus, Walt. Cor. alba, margine subrotundiculata. Styl. profunde 2-partitus. Caps. pubescens. Mich.

86. *stans*, erectus, tomentoso-incanus, fol. subcordatis, pedunc. 1-floris, calyc. bracteis obtusis: laciniis lanceolatis mucicis. Michaux Flor. 1. p. 136. In Canada juxta Lacum Champlain. Affinis C. spithameo. Walt.

87. *pentapetaloides*, fol. lanceolatis obtusis nudis lineatis, ramis declinatis, flor. solitariis semiquinquefidis. L. Vahl. symb. 2. p. 36. C. humilis. Jacq. collect. 4. p. 209. t. 22. ♂? C. prostratus, fol. radicalibus ovatis obtusis emarginatis longe petiolatis, pedunc. unifloris, caule prostrato. Roth. Abb. p. 11. t. 3. Habit. in Majorca. ☉

88. *ciliatus*, fol. oblongis cuneiformib. obtusis emarginatis ciliatis, caule prostrato, caps. pilosisimis. Roth. catal. 2. p. 22. Priori affinis. Hab. . +

89. *lineatus*, fol. lanceolatis sericeis lineatis petiolatis, pedunc. bifloris, calycib. sericeis subfoliaceis. L. C. spicaefolius, fol. linearibus lanceolatis basi angustatis, caule simplicibus, pedunc. folio brevioribus. Lam. enc. 3. p. 577. C. serpens maritimus, spicae foliis. Triumf. obs. 71. t. 91. f. 2. Munt. 29. t. 140. Hab. in Hispaniae, Siciliae, Mediterranei marium et montosis. Cor. extus hirtae.

90. *evolutoides*, caule prostrato, fol. spatulatis villosis obtusis integerrimis, flor. sessilibus. Desf. Atl. p. 176. t. 49. In regno Tunetano prope Shibam. Cor. parva, caerulea. Caps. villosa. D.

91. *suffruticosus*, caule villosa suffruticoso, fol. angusto-lanceolatis, pedunc.

1-floris folio longioribus. Desf. Atl. 1. p. 175. t. 48. Hab. in Atlante prope Tlemsen. Cor. pallide rosea aut alba. h

92. *saxatilis*, hirsutissimus, fol. linearibus, flor. capitatis, calycib. acuminatis. Vahl. symbol. 3. p. 31. C. lanuginosus, tomentoso - incanus, fol. linearibus, flor. capitatis terminalibus. Lam. enc. 3. p. 551. Bocc. mus. 2. p. 70. t. 70. Hab. in Hispania, Italia, Tauria. T

93. *Cneorum*, fol. lanceolatis tomentosis, flor. umbellatis, calycib. hirsutis, caul. erectiusculo. L. C. argenteus. Lam. l. c. p. 552. *Cneorum album*, folio argenteo molli. Bauh. pin. 463. Hab. in Hispania, Creta, Syria. h

94. *linearis*, caulibus erectis fruticosis, fol. linearib. acutis piloso - sericeis, flor. terminalibus umbellato-paniculatis, calycib. pilosis. Curt. bot. mag. t. 299. Hab. . . h

95. *Cantabrica*, fol. lineari-lanceolatis acutis, caule ramoso erectiusculo, calycib. pilosis, pedunc. subtrifloris. Lin. Jacq. Fl. austr. t. 296. Moris. 2. s. 1. t. 4. f. 3. *Cantabrica quorundam*. Clus. hist. 2. p. 49. *β. terrestris*, fol. linearibus sericeis, pedunc. subtrifloris, cal. hirsutis mucronatis. L. spec. 2. p. 224. Hab. in Europa australi, Tauria, Africa. Mollis incana. T

96. *palustris*, caule erecto ramoso, fol. lanceolatis pilosis, flor. axillaribus solitariis minutis subtomentosis. Cav. ic. 6. p. 80. t. 600. f. 2. Cresc. in paludosis in Acapulco viciniis. Pedunc. bistipulati. C.

97. *Ammanni*, sericeus, procumbens, fol. linearibus, pedunc. unifloris axillarib. longe bracteatis, cal. acuto. Lam. encyc. 3. p. 526. Willd. sp. p. 870. In Sibiria ad Jeniseam et ad lacum Baikal. T Cor. minuta calyce paulo major, pilis externe sericeo-villosis. W.

98. *pilosellaefolius*, villosus, fol. lanceolatis, pedunculis racemosis paucifloris. Willd. l. c. Lam. enc. p. 528. C. orientalis humifusus *Pilosellae* fol. Tournef. Hab. in Oriente. Rami axillares floriferi. T

99. *Dorycnium*, fol. sublinearibus sericeis, caule fruticuloso paniculato, calicibus nudiusculis obtusis. Linn. Habit. in Oriente. h

100. *proliferus*, fol. linearibus subtus sericeis, capitulis terminalibus, inque dichotomiis bracteis ovatis extus hirsutissim. Vahl. eclog. 1. p. 18. Habit. in America meridionali. Facies C. *Cantabricae*. h

101. *lanatus*, fol. lanceolatis linearib. tomentosis, ramis senescentibus spinosis,

flor. capitatis involucreatis. Vahl. l. c. p. 16. Hab. in Aegypto inferiori et in monte Sinai. h

102. *Histrix*, fruticosus, fol. oblongis flor. sessilibus subsolitariis, ramis spinascentibus. Vahl. Hab. in Arabia. h

103. *spinosus*, fruticosus, fol. lanceolatis, pedunc. unifloris, ramis floriferis spinosis. Willd. p. 871. Lin. suppl. 137. C. fruticosus. Pall. it. 2. p. 734. t. M. Hab. in Sibiriae arenosis collibus ad fluvium Irin. Rudimenta ramulorum in axillis foliorum rameorum in spinas breves mutantur. Habitus C. *Cneori*. L. h

104. *scoparius*, fol. linearibus pilosisculis, pedunc. subtrifloris, calyc. sericeis ovatis acutis, caule fruticoso, ramis virgatis. Ait. Kew. 1. p. 213. Lin. suppl. 135. Habit. in Teneriffa circa oppidum St. Cruz. Facies *Spartii* a. Genistae et non *Convulvi*. Cor. extus hirsutae albae. Rasura hujus ligni, quod durum album: striis radiantibus, spargit odorem rosaceum. h

105. *Oenotheroides*, fruticosus erectus, fol. linearibus canescentibus, pedunc. axillaribus solitariis erectis unifloris bracteatis, calycib. lanceolatis glabris. Lin. suppl. 137. Hab. ad Cap. b. spei. Habitus *Oenotherae* mollissimae. Cor. magna fulva.

106. *Feridus*, fol. oblongo - lanceolatis basi attenuatis subpilosis, ramis floriferis pedunculisque paniculatis. Ait. Kew. 1. p. 214. C. fruticosus prostratus canus, fol. lineari-lanceolatis glabris, thyrsis terminali pyramidali composito. L. suppl. 136. Jacq. ic. 1. t. 34. Collect. 1. p. 62. Habit. in rupibus Teneriffae. Copia florum omnium pulcherrimus. Lin.

107. *cuneatus*, caule fruticoso erecto, fol. cuneiformibus obtusis mucronatis glabris, corymbis axillaribus fol. breviorib. Willd. sp. p. 873. Hab. in India orientali. h

108. *corymbosus*, fol. cordatis, pedunc. umbellatis, caule repente. L. Plum. spec. 1. ic. 89. f. 2. Hab. in America.

109. *secundus*, fol. cordatis acuminatis integerrimis, pedunc. secundis longissimis, flor. umbellatis. Flor. Per. 2. p. 10. t. 117. f. a. In Peruv. collibus arenosis.

110. *spithameus*, fol. cordatis pubescentibus, caule recto, pedunc. unifloris. Lin. Hab. in Virginia.

111. *persicus*, fol. ovalibus tomentosis pedunc. unifloris. Amoen. acad. 2. p. 341. Gmel. it. 3. p. 36. t. 7. Hab. in Persia ad maris Caspici litus. T

112. *tricolor*, fol. lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, flor. solitariis. Lin. Moris. 5. t. 4. f. 4. Hab. in Africa, Mauritania, Hispania, Italia et Peruvia. Fol. obovata. ☉

113. *acetosaefolius*, fol. oblongo-lanceolatis subhastatisque, pedunc. elongatis unifloris, caule repente. Vahl. eclog. 1. p. 18. Plum. amer. 91. t. 105. Hab. in Amer. merid. ☿

114. *repens*, fol. sagittatis postice obtusis, caule repente, pedunc. unifloris. L. Michaux 1. p. 137. Cor. alba, colore rosco ad ambitum suffusa. Cal. bracteatus. M. Hab. in India utraque ad ripas, in arenosis maritimis. Caul. geniculatus. ☿

115. *reptans*, fol. hastato-lanceolatis auriculis rotundis, caule filiformi repente, pedunc. unifloris. L. Rumph. 5. t. 155. f. 1. Hab. in India. An a priore diversus?

116. *edulis*, fol. cordatis integris trilobisque glabris, caule repente angulato. Thunb. jap. p. 84. Hab. in Japonia ☿ +

117. *hirtus*, fol. cordatis subhastatisque villosis, caule petiolisque pilosis, pedunc. multifloris. Mill. dict. n. 10. Hab. in India.

118. *Soldanella*, fol. reniformibus, pedunc. unifloris. Moris. 5. t. 3. f. 2. Soldanella maritima minor. Benth. pin. 295. Hab. in Angliae, Hispaniae, Belgii, Italiae, Frisiae littoribus maris et in Carnioliis. ☉

119. *Imperati*, foliis panduriformibus interrisve emarginatis basi cordatis, pedunc. unifloris, caule repente. Vahl. symbol. 1. p. 17. C. stoloniferus. Lam. enc. 3. p. 527. Cyrill. pl. rar. fasc. 1. p. 14. t. 5. Moris. 5. t. 15. t. 7. Soldanellae congener Imperati. Barr. obs. 33. ic. 856. Hab. ad littora maris Neapoli.

120. *obtusilobus*, glaber, foliis crassis sinuato-lobatis: lobo impari majore emarginato, pedunc. 1-floris, cor. brevi campanulata. Michaux. Flor. 1. p. 139. Habit. in Amer. boreal. littoribus.

121. *Pes caprae*, fol. bilobis, pedunculis unifloris. Linn. Herm. Lugd. B. 174. t. 175. Rumph. 5. t. 159. f. 1. Habit. in India.

122. *Lasianthus*, flor. solitariis, fol. palmato-lacinatis tomentosis: lacinia media ampliore pinnatifida. Cav. ic. 5. p. 53. t. 479. f. 1. Hab. in Regno chilensi.

123. *laciniatus*, flor. solitariis, foliis laciniatis: laciniis capillaribus 2-3-fidis. Cav. l. c. Lam. enc. 3. p. 545. t. 479. f. 2. Cresc. prope Montevideo. Cor. et cal. extus villosi, uti in priore, cui affinis.

124. *platycarpus*, flor. racemosis, fol. pinnatis, caps. compressis. Cav. l. c. p. 55. t. 482. In Mexico. An hujus generis?

125. *venosus*, glaber, fol. digitatis foliolis petiolatis ovato-acuminatis, petiolis basi cirrhosis. Enc. l. c. Hab. in Ins. Mauritii.

126. *brasiliensis*, fol. emarginatis basi biglandulosis, pedunc. trifloris. L. Hab. in Brasilia, Domingo maritimis. ☿

127. *multifidus*, foliis palmatis, loliis septenis linearibus integris, pedunc. unifloris, caule decumbente. Thunb. prodr. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

128. *sublobatus*, procumbens, fol. superioribus apice dentato-repandis, floribus capitatis. Lin. suppl. 135. Hab. in India. Involucrum hexaphyllum. Cor. magna. ☉

129. *capensis*, fol. hastatis, lobis semibifidis, pedunc. subbifloris, caule decumbente villosa. Willd. p. 877. castatus. Th. prod. 35. Hab. ad Cap. b. spei.

130. *sagittatus*, fol. hastatis sagittatisque, pedunc. unifloris, caulib. prostratis. Thunb. prod. 35. Cum priore.

131. *littoralis*, foliis oblongis lobato-palmatis, pedunc. unifloris, caule repente. L. Plum. sp. 1. ic. 90. f. 2. Habit. in Amer.

132. *martinicensis*, fol. ellipticis, glabris, pedunc. unifloris folio longioribus, caule repente. Jacq. amer. 26. t. 17. Hab. in Martinicae umbrosis, inundatis.

Obs. Plures Convolvuli species ob stigma capitato - didymum ad Ipomoeas relatae sunt, et nonnullae examinandae adhuc restant, numne potius ad idem pertinent genus.

417. **IPOMOEAE.** Cor. infundibuliformis, aut campanulata, 5-plicata, *Stigmata* capitato-globosa, papillosa. *Caps.* 2-3-locularis, polysperma.

1. *Quamoclit*, fol. pinnatifidis linearib., flor. subsolitariis. Lin. Willd. sp. 2. p. 879. Quamoclit s. Iasminum americanum. Clus. posth. 9. Rumph. 5. t. 155. f. 2. Hab. in India. Conv. pennatus. Lam. enc. 3. p. 567.

2. *dissecta*, fol. palmatis, laciniis angustatis pinnatifidis dentatis, pedunc. subbifloris Willd. phytog. 1. p. 5. n. 19. t. 2. f. 3. Hab. in Guinea.

3. *umbellata*, foliis digitatis septenis, pedunc. umbellatis brevissimis. L. suppl. Plum. spec. 3. ic. 92. f. 2. Hab. in Amer.

4. *carolina*, fol. digitatis: foliolis petiolatis, pedunc. unifloris. Lin. Catesb. Car. 2. p. 19. t. 19. Hab. in Carolina.

5. *coccinea*, fol. cordatis acuminatis, basi angulatis, pedunc. 2-fidis. L. Comm. rar. 21. t. 11. *β. luteola*, fol. cordatis acuminatis subangulatis, pedunc. primum dichotomis, dein racemosis. Jacq. ic. rar. 1. t. 35. Collect. 2. p. 266. Hab. in Domingo. ☉

Obs. An Ip. angulata. Orteg. Dec. p. 83. Flor. Per. 2. p. 11. t. 119. Varietas?

6. *lacunosa*, foliis cordatis acuminatis scrobiculatis basi angulatis, pedunc. sub-unifloris flore brevioribus. Lin. Dill. elch. 103. t. 87. f. 102. Hab. in Virginia, Carol. Simillima I. coccineae. Flor. tubo crassiore albi, ore purpurascens. ☉

7. *leucantha*, fol. cordatis acuminatis integerrimis, pedunculis unifloris solitariis folio brevioribus. Willd. p. 881. Jacq. ic. 1. t. 318. Collect. 2. p. 280. Hab. in Amer. torrida. ☉

8. *solanifolia*, fol. cordatis acutis integerrimis, pedunc. unifloris solitariis fol. aequalibus. Willd. l. c. Plum. sp. 3. ic. 94. f. 1. Hab. in Amer.

9. *bona nox*, fol. cordatis acutis integerrimis, caule aculeato, flor. ternis, cor. indivisis. L. Cav. ic. 3. p. 52. t. 300. Sloan. hist. 151 t. 96. f. 1. Hab. in Indiae arvensis, arborescens. Cor. tubus lutescens: limbo albo, radiis 5 lutescentibus. ☉

10. *campanulata*, fol. cordatis, pedunc. multifloris, perianthio exteriori orbiculari, cor. campanulatis lobatis. Lin. Rheed. 11. p. 175. t. 56. Hab. in India. Sub perianthio quinquepartito, alius perianthium minus orbiculatum integerrimum. L.

11. *violacea*, fol. cordatis integerrimis, flor. confertis, cor. indivisis. Lin. Plum. spec. 3. ic. 93. f. 1. Sloan. hist. 1. p. 155. t. 98. f. 1. Hab. in Amer. merid. +

12. *verticillata*, fol. cordatis, pedunc. axillaribus ternis reflexis, calycib. hispidis. Vahl. symb. 3. p. 33. Hab. in Arabia felici.

13. *carnea*, fol. cordatis glabris, pedunc. multifloris, cor. marginatis. Jacq. amer. 26. t. 18. Hab. in America. ♀

14. *repanda*, fol. cordatis oblongis repandis, pedunculis ramosis cymosis. Jacq. amer. 28. t. 20. Hab. in America. ☉

15. *filiformis*, fol. oblongo-cordatis obtusis integerrimis mucronatis, pedunculis cymosis. Willd. Murr. syst. veg. 205. Jacq. am. pict. 20. t. 26. Jacq. amer. 27. t. 19. Hab. in Martinicae sylvaticis. ♀

16. *biflora*, caule volubili, fol. cordatis pubescentibus, pedunc. geminis, cor. lobis trifidis. Lin. sub Convolv. Willd. p. 854. Hab. in China. Pistillum album, stigm. 2. capitata, purpurea. L.

17. *striata*, fol. cordatis attenuatis glabris, pedunc. fol. longioribus subquadri-floris, cor. glabris extus striatis. Vahl. symb. 3. p. 28. Willd. l. c. sub Convolv. In India. Cor. alba: fundo fusco - purpurascens. Stigma capitatum. V.

18. *parviflora*, fol. cordatis acuminatis glabris, pedunc. multifloris, calycibusque acuminatis villosis. Vahl. l. c. Ip. *paniculata*, caule volubili, fol. ovatis acuminatis, pedunc. paniculatis. Burm. ind. t. 21. f. 3. Hab. in Java.

19. *sibirica*, foliis cordatis acuminatis laevibus, pedunc. incrassatis 1-floris. Lin. sub Convolv. Hab. in Sibiria. Stigma 2-lobum.

20. *speciosa*, fol. cordatis subtus tomentoso-sericeis, pedunc. petiolo longioribus, umbelliferis. Ait. Kew. 1. p. 211. Smith. ic. pict. t. 17. sub Conv. C. *nerveus*. Burm. ind. t. 20. f. 1. In India orient. Caul. volub. arborescens. Fol. subtus argentea. ♀

21. *purpurea*, foliis cordatis indivisis fruct. cernuis, pedicellis incrassatis. Roth. Cat. bot. 1. p. 37. Conv. purpureus. Lin. Ehr. pict. t. 7. f. 2. H. in Amer. Cor. colore variat.

22. *ciliolata*, volubilis glaber, fol. cordatis subciliatis, pedunc. longiusculis 1-floris, cal. laciniis lato-ovalibus obtusis. Michaux, 1. p. 137. sub Conv. Hab. circa urbem Knoxville in Tennessee. Cor. ampla, tubulato-campanulata, alba. Stigmata subglobosa. M.

23. *tricolor*, fol. cordatis acuminatis flor. axillaribus subumbellatis, peduncul. caul. crassiore. Cav. l. c. p. 5. t. 208. Hab. Cor. tricolor, crenulata. Cal. violaceo-niger. C.

24. *glandulifera*, caul. volubili hirsuto, fol. cordato-subrotundis acuminatis, pedunc. subquadri-floris incrassatis, calycib. glanduliferis. Flor. Peruv. 2. t. 121. f. 8. in Limaec etc. segetibus. Flor. mane explicantur, hinc ab incolis *Auroras* denominatur haec planta.

25. *tamniifolia*, fol. cordatis acuminatis

pilosus, flor. aggregatis. Lin. Willd. p. 886. Dill. elth. t. 318. f. 414. Habit. in Carolina.

26. *sagittata*, fol. glaberrimis inferioribus cordatis, superioribus sagittatis, pedunc. subunifloris. Desf. atl. t. p. 177. Poir. it. p. 122. Cav. ic. 2. t. 107. Conv. Wehleri. W. sp. p. 845. In Barbaria et Hispania (prope oppidum Castulo) ad lacum et maris ripas. Sem. lanata. ♀

27. *hastata*, fol. sagittato-hastatis, pedunc. bifloris. L. Burm. ind. 50. t. 18. f. 2. Hab. in Java. Flor. lutei.

28. *glaucofolia*, foliis sagittatis postice truncatis, pedunc. bifloris. Linn. Dill. elth. t. 87. f. 101. Hab. in Mexicae arvis.

29. *acutangula*, fol. sagittato-triangularibus, angulis posticis dentatis, caule tereti, pedunc. 3-5-floris fol. longitudine. Fl. Per. 2. p. 11. t. 119. f. b. (I. angulata.) Hab. in Potuzo. nemoribus. Cor. coccinea. ♂

30. *angustifolia*, fol. hastato-linearibus, pedunc. 1-floris. Jacq. coll. 2. p. 367. ic. rar. t. 317. Vahl. symb. 3. p. 25. In India.

31. *japonica*, fol. lanceolatis hastatis acutis: auriculis postice 1-dentatis, caule simplicibus. Vahl. l. c. Thunb. jap. p. 85. W. p. 849. In Japonia juxta Jedo et Nagasaki.

32. *simplex*, fol. lanceolatis integris, floribus solitariis. Thunb. prod. 36. Hab. in Cap. b. speci.

33. *hederacea*, fol. trilobis quinquelobisve cordatis, pedunc. unifloris, calycibus villosis. Willd. 2. p. 884. Jacq. ic. t. 36. Stigm. 3-lobum. Jacq. Habit. in America torrida. ♂

34. *triloba*, fol. trilobis cordatis, pedunculis trifloris L. Hab. in Amer. Cor. cylindricae, violaceae. ♂

35. *sanguinea*, fol. cordatis trilobis, lobis lateralibus postice angulato-sublobatis, pedunc. trifloris, calycibus glabris. Vahl. symb. 3. p. 33. Hab. in insula St. Crucis. ♂

36. *hederifolia*, fol. trilobis cordatis, pedunc. multifloris racemosis. Lin. Plum. spec. 3. t. 93. f. 2. Hab. in Amer. ♂

37. *hepaticifolia*, fol. trilobis, floribus aggregatis. Lin. Burm. ind. 50. t. 20. f. 2. Fol. superiora 5-loba. Lam. ill. p. 461. Sub Convolv. Hab. in Zeylona.

38. *punctata*, fol. cordatis trilobisque, cor. indivisus, fruct. erectis. Lin. sub Conv. hederaceo. Willd. p. 851. C. flore purpureo, cal. punctato. Dill. elth. p. 99. t. 83. f. 46. Hab. in utraque India et Africa. Stigm. 3-lobum. Jacq. ♂

39. *carolina*, fol. cordatis trilobisque villosis, cal. laevibus, caps. hirtis, pedunc. subbifloris. Lin. sub Conv. fol. profunde sublanceolato-3-lobis. Michaux. Flor. 1. p. 139. Hab. in Carolinae sepibus. ♀

40. *cuspidata*, fol. cordatis trilobis: lobis cuspidatis, pedunc. 1-floris, cal. laciniis linearibus basi hirsutis. Flor. Peruv. 2. p. 13. t. 119. f. a. Hab. in Peruviae petrosis Petioli longi. ♂

41. *villosa*, fol. cordatis trilobis: lobis acuminatis lateralibus extrorsum excavatis, pedunc. trifloris involucreis. Fl. Per. 2. p. 12. t. 121. f. 1. In Per. nemoribus et ad agrorum margines. Cor. caerulea. Caps. glabra.

42. *macrorrhiza*, fol. cordatis lobatisque plicatis subtus tomentosis, pedunc. subunifloris, rad. crassissima. Michaux. Flor. 1. p. 141. In Georgiae et Floridae maritimis. Cor. magna, alba. Sem. lanuginosa. ♀

43. *crassifolia*, caule erecto ramoso, fol. reniformibus emarginatis subplicatis, pedunc. axillaribus subtrifloris petiolo brevioribus. Cav. Descr. p. 100. Habit. in Guayaquil.

44. *stans*, caule erecto suffruticoso ramoso, fol. cordatis truncatis sinuato-dentatis. Cav. ic. 3. p. 26. t. 250. Hab. .

45. *Nil*, foliis cordatis trilobis, coroll. semiquinquefidis, pedunc. petiolo brevioribus. Linn. Willd. sp. 2. p. 851. sub Ipomoea. Cur. mag. t. 188. Hab. in Amer.

46. *barbata*, cordatis trilobis, pedunc. subunifloris retortis, cal. barbatis. Roth. Cat. 1. p. 37. Dill. elth. t. 88. f. 92.

47. *varia*, fol. cordatis lobatisque, pedunc. unifloris erectis, caps. laciniis dorso barbatis: 3 exterioribus cordato-lanceolatis. Roth. Cat. p. 17. Convolv. pilosus. Moench. meth. p. 432. Rad. fusiformis. An eadem ac I. hederacea? ♀

48. *tridentata*, fol. oblongis tricuspidatis: basi dilatato-dentatis, pedunc. 1-flor. incrassatis 4-gonis. Roth l. c. p. 19. Conv. tridentatus. Lin. W. Sp. 1. p. 848. Rheede 11. t. 65. In Indiae aridis, caps. 2-locularis, 4-sperma. Stigm. 2, globosa. ♂

49. *pentaphyllu*, caule fruticoso filiformi volubili, fol. quinatis glabris, flor. axillaribus, pedunc. solitario. Cav. ic. 3. p. 29. t. 256. Hab. Pedunc. axillares 1-3-flori. Cor. limb. crenulatus.

50. *pilosa*, caule scandente piloso, fol. quinatis pilosis integerrimis. Cav. ic. 4. p. 11. t. 323. Conv. 5-phyllus. Linn. Ipomoea.



Jacq. pl. rar. v. 2. Hab. in Amer. calidior. Caul. et petioli longi valde pilosi. ☉

51. *muricata*, foliis quinatis linearibus angustissilibus, cal. muricatis. Cav. ic. 1. c. f. 2. Hab. in Huanajuato. Caps. 2-locularis.

52. *ternifolia*, fol. ternis linearibus angustis petiolo communi longioribus. Cav. 5. p. 52. t. 478. Hab. in Apuloo viciniis Flor. axillares.

53. *parviflora*, fol. cordatis quinquelobato-palmatis, umb. axillaribus pedunculatis, cal. capsulisque pilosis. Vahl. symb. 3. p. 34. Sloan. hist. 1. t. 97. f. 1. Hab. in ins. St. Crucis. Affinis. I. trilobae. ☉

54. *heterophylla*, foliis palmatis: lobis lateralibus superne lobulo erectiusculo auctis. Orteg. Dec. plant. p. 9. Habit. in Nova Hispania et in ins. Cuba.

55. *sinuata*, fol. palmato-pedatis septemlobis: lobis lanceolatis inaequaliter sinuatis, pedunc. 1-floris. Ortega Dec. 7. p. 84. Conv. dissectus. Jacq. hort. 2. t. 159. Cresc. cum priore.

56. *Papirin*, fol. palmatis cordatis lobis quinis lanceolatis, pedunc. 1-floris, radice tuberosa. Flor. Peruv. 2. p. 11. t. 120. f. 2. Hab. in Tarmae collibus. Radix uti sequentis vi drastica gaudet.

57. *subtriloba*, fol. cordatis subtrilobisque, pedunc. 1-floris, rad. tuberosa. Flor. Per. 1. c. Cum priore. Cor. etiam purpurea. ☿

58. *tuberosa*, fol. palmatis, lobis septenis lanceolatis obtusis, pedunc. trifloris. Lin. Plum. am. t. 276. f. 6. Hab. in Jamaica. Cor. sulphurea. ☿

59. *digitata*, fol. palmatis: lobis septenis lanceolatis obtusis, pedunc. trifloris. Lin. Plum. Sp. 3. ic. 92. f. 1. In America. Cor. coccinea.

59. *Pes tigridis* (tigrina), villosa, fol. palmatis flor. aggregatis. Lin. Herm. Lugd. t. 187. Dill. Elth. t. 318. f. 411. Hab. in India. ☉

*Obs.* Ipomoea *bracteata*, bracteis latis venosis carnis plicatis distichis. Cav. ic. 4. p. 51. t. 477. ob corollae limbum integerrimum revolutum, filam. glabra, stigm. simpliciter ovatum distinctum genus effecere videtur. In opere botanico: *Encyclopédie méthodique*, vol. 3. p. 534-568. plures sub genere Convolvuli descriptae extant species, quae ob *stigma capitatum* didymum verae Ipomoeae videntur. Interea duo haec genera caractere nimis artifi-

ciali, quo affinitas inter quasdam species aliquando dilaceratur, inter se disjunguntur.

418. *DIAPENSIA*. Cal. 5-phyllus imbricatus foliolis tribus. Cor. hypocrateriformis: limbo 5-fido plano. Stam. tubo cor. imposita. Caps. 3-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *lapponica*, floribus pedunc. Linn. Flor. dan. t. 47. Hab. in alpihus lapponicis. Sedi facie, Aretii affinis. ☿

419. *COBÆA*. Cal. inferus persistens, 5-gonus: angulis basi compresso-alatis. Cor. campanulata. Stam. declinata. Stigma 3-fidum. Germ. cinctum corpore glanduloso. Caps. obovata, 3-locularis, recept. 3-gono disticta. Sem. imbricata, marginata.

1. *scandens*. Cav. ic. 1. p. 11. t. 16 et 17. et vol. 5. p. 69. t. 500. *bir.* Habit. prope Mexico et in Acapulco. Caul. longissimus, scandens. Fol. pinnata cirrhosa: pinnulis ovatis. Cor. maxima, violacea. E Bignoniarum familia. C.

420. *MACROSTEMA*. Cal. inferus persistens, semiquinque partitus. Cor. infundibuliformis: lacin. lanceolatis. Stam. longissima exerta, basi nuda. Caps. 4-locularis, 4-valvis: dissepimento valvulis parallelo cruciata. Sem. solitaria.

1. *vitifolia*. Calbo Cav. ic. 5. p. 51. t. 476. in honorem ejusdam medici secul. 16. Calbo sic dicti. Hab. in Amer. septenti. Caul. scandens. Pedunc. axillares multiflori.

~~~~~  
*POLEMONIDRAE*. Cal. inferus, persistens. Cor. regularis, quinqueloba. Stam. 5, in medio tubi inserta. Caps. 3-locularis, 3-valvis: valvis medio intus septiferis, receptac. centrali 3-gono. Caul. herbaceus aut frutescens. Fol. alterna aut opposita. Vid. Juss. gen. pl.

421. *POLEMONIUM*. Cor. 5-partita, fundo clauso valvis staminiferis. Stigma 3-fidum. Caps. 3-locularis, supera.

1. *aeruleum*, fol. pinnatis (17), florib.

erectis, calycib. cor. tubo longiorib. Lin. Flor. dan. 255. Willd. Sp. 2. p. 886. *β. alba*, flor. albis. In Europa et Asia.  $\overline{\text{T}}$

2. *repans*, rad. repente, fol. pinnatis septenis, florib. terminalibus nutantibus. Lin. Lam. ill. 1. 106. f. 2. Mill. dict. 1. 209. Hab. in Virginia montibus.  $\overline{\text{T}}$

3? *dubium*, fol. inferioribus hastatis, superioribus lanceolatis. Linn. Habit. in Virginia. Stylus semibifidus.  $\dagger$

4? *Röelloides*, erectum, caule filiformi, fol. lanceolatis ciliatis, panic. pauciflora pedunc. nuda. Linn. suppl. p. 139. Hab. in Cap. b. spei.  $\dagger$

5. *Campanuloides*, erectum glabrum, fol. lineari-lanceolatis integris erectis, flor. terminalibus solitariis. Linn. suppl. 139. Hab. in Cap. b. spei. An potius Campanula?

*Obs.* Ambae hae posteriores species germinis infero a Polemonis recedunt. Lam. ill. p. 472; hinc hujus generis non sunt.

422. PHLOX. Cor. hypocrateriformis. Filam. inaequalia. Stigma 3-fidum Cal. prismatens. Caps. 3-locularis, 1-sperma.

1. *paniculata*, caule alto laevi, foliis lanceolatis margine scabris, corymbis paniculatis, cor. laciniis rotundatis. Ait. Kew. 1. p. 205. Willd. Sp. 2. p. 819. Dill. elth. 205. t. 166. f. 203. Fol. undulosa. Cal. aristati. Michaux. Hab. cum omnibus fere speciebus in Amer. septent.  $\overline{\text{T}}$

2. *undulata*, f. l. oblongo-lanceolatis subundulatis margine scabris, caule laevi, corymbis paniculatis, cor. laciniis subretusis. Ait. Kew. 1. p. 205. Hab. in America boreali.  $\overline{\text{T}}$

3. *triflora*, caul. erectis subpubescentibus, fol. lanceolatis glabris, corymborum r. n. is subtrifloris, cal. dentibus linearibus. Michaux Flor. 1. p. 143. Hab. in Carolina superiore. Humilis.

4. *lutifolia*, caule erecto laevi, foliis subcordato-ovalibus, flor. fasti. lato-corymbosis. Michaux. In Carolinae sylvis sphagnosis. Cor. majusculae lacinae suborbiculatae.

5. *aristata*, caule debili pubescente, panic. e racemis laxis et subgeminifloris fastigiata, aristis calycin. longissimis. Mich. p. 144. Var. corollae roseo-purpureae.  $\beta.$  et cor. albido-rosea. Hab. in Carolina ad ripas amnis Santée, et  $\beta.$  circa Knoxville.

6. *suaveolens*, ( *candida* ), fol. ovato-lanceolatis undique laevibus, caule glaberrimo, racemo paniculato. Ait. Kew. 1. p. 206. Hab. in America boreali. Flores albi leviter suaveolentes. Ait.  $\overline{\text{T}}$

*Obs.* Var. sequentis secundum Michaux. Flor. 1. p. 143.

7. *maculata*, fol. oblongo-lanceolatis glabris, caule maculato scabriusculo, racemo corymboso. Ait. Jacq. hort. 1. 127. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{T}}$

8. *pilosa*, fol. lanceolatis villosis, caule erecto, corymbo terminali. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{T}}$

9. *carolina*, fol. lanceolatis laevibus, caule scabro, corymbis subfastigiatis. Lin. Mart. cent. 10. t. 10. Hab. in Carolina.  $\overline{\text{T}}$

10. *glaberrima*, fol. lineari-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. Lin. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{T}}$

11. *divaricata*, fol. lato-lanceolatis: superioribus alternis, caule bifido, pedunc. geminis. Lin. Mill. dict. n.º 4. et ic. f. 1. Habit. in Virginia.  $\overline{\text{T}}$

12. *ovata*, fol. ovatis, florib. solitariis. Pluck. mant. 122. t. 348. f. 4. In Virginia.  $\overline{\text{T}}$

13. *repans*, pubescens, caul. ferilibus erectis simplicibus, fol. radicalibus obovatis, caulinis ovali-lanceolatis, corymbo paucifloro. Michaux p. 145. Cresc. in excelsis montibus Carol. occidentalis. Habitu quodammodo Bellidis. Corolla maxima caerulea.

14. *linearis*, fol. alternis linearibus, flor. terminalibus confertis. Cav. ic. 6. p. 17. t. 52. In urbis chilensis Talcahuano vicinis. Fol. mollia subvillosa.  $\odot$ ?

15. *biflora*, pubescens, fol. lineari-lanceolatis: interioribus oppositis, pedunc. axillaribus geminis. Flor. Per. 2. p. 17. In R. chilensis arenosis. Pedalis.  $\odot$

16. *subulata*, fol. subulatis hirsutis, flor. oppositis. Lin. Pluck. alm. 233. t. 98 f. 2. Hal. in Virginia. Cor. lobi emarginati.

17. *sibirica*, fol. linearib. villosis, pedunc. ternis. Lin. Gmel. sib. 4. p. 87. t. 46. f. 2. H. in Asia boreali. Lobi cor. rotundati.  $\overline{\text{T}}$

18. *setacea*, fol. setaceis glabris, flor. solitariis. Lin. Pluck. alm. t. 98. f. 2. Hab. in Virginia.

19? *pinnata*, fol. pinnatis: pinnulis linearibus angustissimis, florib. axillaribus. Cav. l. et t. 328. Habit. in Montevideo et in N. Hispania.  $\text{h}$

423. **CANTUA**. *Cal.* 1-phyllus tubulosus. *Cor.* infundibulif. 5-partita : laciniis obcordatis s. emarginatis. *Germ.* corpori glanduloso insidens. *Stigm.* 3-partitum. *Caps.* subtrigona, 3-locularis, trivalvis. *Sem.* imbricata, margine membranacea cincta.

1. *uniflora*, fol. glabris ovatis integris (nonnullis quadrifido-dentatis), florib. solitariis. Pegiphragmos uniflorus. Fl. Per. 2. p. 18. *Cantua ovata*. Cav. ic. 4. p. 43. t. 363. Hab. in Peruviae sepibus.

*Obs.* Nomen vernaculum *Cantu*, unde nomen genericum ortum. Antores Flor. Per. et Chilensis hoc genus *Periphragmos* denominant.

2. *dependens*, fol. obovatis acuminatis, aveniis : ramis pendulis. Flor. Per. 2. l. c. t. 133. Cresc. in Peruviae versuris.

3. *duxifolia*, fol. ovato-lanceolatis subsessilibus inferne pubescentibus, flore tubuloso, stam. inclusis. Lam. ill. gen. t. 106. f. 2 Hab. in Peru. +

4. *tomentosa*, fol. sublanceolatis sessilibus utrinque tomentosis, stam. corollae subaequalibus. Cav. ic. 6. p. 43. t. 364. In Peru. Rami tomentosi. +

5. *flexuosa*, fol. lanceolatis acuminatis, flor. corymbosis. Flor. Per. 2. p. 17. t. 131. In Peruviae versuris. Fol. masticata colore luteo salivam imbuunt. C. pyrifolia Lam. ? h

6. *foetida*, fol. lanceolatis glabris, pedunc. subtrifloris. Flor. Peruv. l. c. t. 132. Cresc. in umbrosis et ruderalis. Fol. amara et acidula, et, uti lignum, colorem luteum praebent. h

424. **HOITZIA**. *Cal.* duplex : interior 1-phyllus, tubulosus ; exterior polyphyllus : foliolis 4-8 polymorphis serratis (Bractea ?) *Cor.* infundibuliformis : laciniis ovatis. *Stigma*, caps. et semina uti in *Cantua*.

1. *coccinea*, caule fruticoso, fol. sessilib. ovato-acutis pubescentibus. Cav. ic. 6. p. 44. t. 365. H. mexicana. L. ill. *Cantua Hoitzia*. Willd. Sp. p. 878. Habit. passim in regno Mexicano, copiose prope Guanajuato. h

2. *caerulea*, caule suffruticoso, foliis subsessilibus linearibus spinosis : Cav. l. c. t. 366. Cum priore. *Cal.* exterior translucidus. h

3. *glandulosa*, caule suffruticoso aspero, fol. ovato-lanceolatis petiolatis : ramis sublinearibus. Cav. l. c. p. 45. t. 367. Hab. inter Actopam et Salaviera, oppida Mexicana. Caul. villosus : villis glanduliferis. C.

*Obs.* Praeter calyc. duplicem, folia hujus generis serrata et petala non emarginata sunt. Nomen vernaculum *Huitsitzitzin*, ex quo nomen *Hoitzia* Jussiaci.

425. **GILIA**. *Cor.* infundibuliformis. *Filam.* aequalia, incisuris cor. inserta prominula. *Stigmata* 3. *Caps.* 3-locularis, polysperma. *Sem.* nuda, nec marginata.

1. *laciniata*, fol. laciniato-pinnatifidis florib. capitatis. Fl. Per. 2. p. 17. t. 123. f. 6 Hab. in Peruviae collibus arenosis.

2. *coronopifolia*, fol. linearipinnatifidis, seminib. cubicis. Willd. Sp. p. 879. sublantua. *Ipomopsis elegans*. Michaux Flor. 1 p. 141. *Ipomoea rubra*. Lin. Hab. in Carolina.

426. **BONPLANDIA**. *Cal.* liber, tubulosus 5-dentatus. *Cor.* subbilabiata, 5-partita : lacin. emarginatis. *Stam.* declinata. *Stigma* trifidum. *Caps.* ovato-trigona, 3-locularis, 3-sperma. *Sem.* elliptica.

1. *geminiflora*, caule herbaceo, foliis alternis lanceolatis serratis, flor. axillarib. geminis. Cav. ic. 6. p. 21. t. 532. Hab. in Nova Hispania. *Cor.* violaceo rubra. *Stam.* filiformia. ☉

427. **NAVARRETIA**. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* membranacea, 1-locularis, bivalvis.

1. *involutrata*, fol. pinnato-multifidis. Flor. Per. 2. p. 8 Hab. in Chile umbrosis et stagnosis ☉

~~~~~  
**CAMPANULACEAE** (gen. 428-435) distinguuntur calyce supero aut seminifero, corol. regulari campanulata aut rotata. s. uno latere fisso sublabiata : limbo 5-fido. Stamina numero sunt varia : 4-10, basi saepius dilatata germen cingentia, antheris distinctis aut connatis. Fructus inferus est aut bacca, aut drupa, aut capsula, haec 2-3-5-6-locularis. Cacterum sunt

autherhae aut passim frutescentes. (Hic enumerantur genera pentandra monogyna, staminibus liberis.)

428. *CAMPANULA*. Cor. campanulata, fundo clauso valvis staminiferis. *Stigma* 3-5-fidum. *Caps.* infera, poris lateralibus dehiscens.

\* *Foliis laevioribus.*

1. *cenisia*, minuta. caul. unifloris, fol. ovatis glabris integerrimis subciliatis. Linn. Allion. ped. n. 2. 45. t. 9. f. 2. Willd. Sp. 2. p. 89. H. b. in alpinis Helveticis inque Cenisii alpinis. Radix repens, alternatim emittens ramos terminatos fol. radicalibus. Caul. pollicares.

2. *uniflora*, caule unifloro, calyce cor. aequante. Fl. lapp. 85. t. 9. f. 5. 6. Hab. in alpinis Lapponicis.  $\mathcal{T}$

3. *Belardi*, caule nudo unifloro, foliis petiolatis elliptico-lanceolatis dentatis. Allion. pedem. n. 9. 36. t. 85. f. 5. Hab. in alpinis Italiae.  $\mathcal{T}$

4. *pulla*, caule unifloro, foliis caulinis ovatis crenatis, cal. cernuis. Jacq. Fl. austr. 3. t. 285. Hab. in Austriae et Styriae alpinis.  $\mathcal{T}$

5. *Zoysii*, caule subtrifloro, cor. ovato-campanulatis, fol. integerrimis: radicalibus ellipticis petiolatis, caulinis sessilibus oblongis obtusis. Willd. Jacq. ic. 2. t. 334. Coll. 2. p. 122. Hab. in alpinis Carnioliae.  $\mathcal{T}$

6. *glauca*, fol. sessilibus ovatis serratis subtus glaucis, caule angulato paniculato, pedunc. unifloris. Thunb. jap. 88. Hab. in Japonia.  $\mathcal{T}$

7. *grandiflora*, fol. ternis oblongis serratis, caule unifloro, flore patulo. Linn. suppl. 140. Jacq. hort. 3. p. 4. t. 3. C. gentianoides, flor. turbinatis patulis, stigmatibus quinquefidis. Lam. encyc. 1. p. 574. Hab. in Sibiria, Tartaria. Caul. tener.  $\mathcal{T}$

8. *tetraphylla*, fol. ternis oblongis serratis. Thunb. jap. 87. Hab. in Japonia. Flor. in ramis racemosi cernui.

9. *triphylla*, fol. ternis linearibus, flor. verticillato-ternis. Thunb. jap. 87. Hab. in Japonia. Radix fusiformis.  $\mathcal{T}$

10. *verticillata*, fol. floribusque verticillatis. Lin. suppl. p. 141. Pall. it. 3. p. 719. t. G. f. 1. Hab. in Davuria.  $\mathcal{T}$

11. *hederacea*, glabra, foliis cordatis quinquelobis petiolatis, caul. laxo. Lin. Flor. dan. t. 330. Engl. bot. t. 73. Hab. in An-

gliae, Galliae, Hispaniae et Daniae umbrosis, humidis. Caps. hemisphaerica.

12. *cochlearifolia*, caulib. simplicibus unifloris, fol. radicalibus cordato-subrotundis crenatis longissime petiolatis, caul. subpatulis, flor. cernuo. Lam. enc. 3. p. 578. W. p. 914. C. *fragilis*. Cyrilli. Borel. ic. 451. Hab. in Alpinis et Italiae montosis. Petioli apice subdilataii.

13. *rotundifolia*, (decipiens) ramosissima diffusa, fol. radicalibus (cito pereuntibus) subrotundis profunde crenatis, caulinis confertis angusto-linearibus. Flor. dan. t. 855. Curt. Lond. ic. Cresc. frequens in muris, ad saxa, in versuris agrorum.

$\beta$ . *reniformis*, major, fol. radicalibus pluribus reniformibus persistentibus, caul. sparsis oblongo-lanceolatis in petiolum decurrentibus. C. rotundifolia.  $\beta$ . Lam. enc. 1. p. 578. H. in monte Cantal in Auvergne.

$\gamma$ ? *caespitosa*, adscendens late caespitosa, fol. omnibus acute serratis, inferioribus pluribus ovato-acuminatis, caulinis linearibus subsparsis. C. *caespitosa*. Scop. Lam. C. *pusilla*. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 79. Hab. frequens in Europa australi et subalpinis ad saxa, truncos putrescentes.

$\delta$ . *tenuifolia*, fol. radicalibus oblongis, caul. linearib. caul. elongato gracili. Hoffm. Fl. germ. p. 100. In pratis, arvis.

14. *linifolia*, pubescens, fol. radicalibus obovato-subrotundis, caulinis lineari-lanceolatis subdentatis, caule subunifloro. W. p. 843. Jacq. Coll. 2. p. 81. C. uniflora, fol. integerrimis hirsutis subrotundis lanceolatis et linearibus, caule unifloro. Vill. Delph. 2. p. 500. t. 10.  $\beta$ ? C. Scheuchzeri, fol. subfalcatis lanceolato-linearibus, flore (unico) pendulo. Vill. 2. p. 503. t. 16. H. in pratis subalpinis et montosis Europae.

15. *flexuosa*, glabra, caule erecto flexuoso, ramulis confertis foliosis, fol. lanceolatis subremote serratis, flor. (parvulis) breviter paniculatis nutantibus. Michaux, Flor. 1. p. 109. Hab. in montibus altis Carolinae. Subpedalis.

16. *divaricata*, subnitens erecta, foliis membranaceis remote serratis, panicula ramulis subaphyllis divaricatis, flor. (parvulis) nutantibus. Mich. l. c. Cum priore.

17. *filiformis*, caps. bilocularibus apice dehiscens, fol. linearibus inferioribus denticulatis, florib. terminalibus ternatis. Flor. Per. 2. p. 55. t. 200. f. 5. Hab. in aridis Concept. Chile. Fol. distantia.

18. *gracilis*, fol. lineari-lanceolatis ob-

solete serratis, caule dichotomo, pedunc. terminalibus elongatis 1-floris. Forst. profl. n. 87. C. vincaeflora. Jardin de Malmaison. ic. Hab. in N. Zeelandia.

19. *pubescens*, caule hirsuto, fol. glabris: radicalibus cordatis; caulinis oblongis dentatis petiolatis. Willd. p. 894. Schma. bohém. n. 167. Habit. in rupibus sylvae Bohemicae. Facies fere C. rotundifoliae. Y. Willd. ¶

20. *Linarioides*, caul. virgatis, apice ramoso-paniculatis, fol. linearibus sparsis exiguis, flor. erectis terminalibus. Lam. enc. 1. p. 573. Hab. in Bonaria in Monte Video. Facies Antirrhini Linariae. Lin.

21. *carpathica*, foliis omnibus cordatis serratis petiolatis glabris, ramis filiformib. unifloris. Ait. Kew. 1. p. 219. Jacq. hort 1. p. 22. t. 57. Hab. in montib. Carpathicis. ¶

22. *Lobelioides*, caul. teretibus strictis glabris, fol. lineari-lanceolatis denticulatis, cor. infundibuliformibus trifidis quadrifidis. Ait. Kew. 1. p. 219. Hab. in locis latebrosis Maderae. Cor. minutissimae albo-purpureascentes. ☉

Obs. Var. cal. tripartito et quinquepartito, corol. limbo tripartito et quinquepartito, etiam stam. 4-5. Lin.

23. *porosa*, fol. radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis, caule punctato-scribro, flor. racemosis. Thunb. prod. p. 36. C. fol. lanceolatis laevibus, caule erecto sursum punctis porosis. Lin. suppl. 142. Hab. in Cap. b. spei.

24. *undulata*, fol. lanceolatis undulatis glabris, floribus ramosis, caule calycibusque glabris. Thunb. prod. 39. Hab. ad Cap. b. spei.

25. *linearis*, herbacea erecta, fol. linearibus integris glabris, flor. cernuis, caps. hispidis. Lin. suppl. 140. Hab. ad Cap. b. spei.

26. *sessiliflora*, prostrata, fol. linearibus subulatis integris, flor. axillaribus solitariis sessilibus. Lin. suppl. 139. Cum priore.

27. *patula*, foliis strictis et radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula, cal. denticulato. Smith brit. 1. p. 235. Engl. bot. t. 42. Flor. dan. t. 373. β. C. decurrens, fol. caulinis lanceolatis serratis decurrentibus. Lin. Fl. suec. 1. n. 173. Hab. in sylvis, arvis, pascuis, ad sepes. Fol. lactescentia, amara, subcrenata. Fl. ten. ♂

28. *Rapunculus*, radice fusiformi, fol. undulatis pilosis, radicalibus lanceolato-

ovalibus, panicula coarctata. Linn. Engl. bot. t. 283. Rapunculus esculentus. Bauh. pin. 92. In sylvaticis, graminosis, arvis. Caul. multangulus, strictus, basi hirsutus. Cor. subparva. ♂

29. *alata*, caule simplici, foliis glabris lato-lanceolatis decurrentibus, flor. sessilib. terminalib. Desf. atl. 1. p. 179. t. 50. Hab. in Atlante prope Macane. Fol. profunde serrata.

30. *unidentata*, erecta glabra, fol. lanceolatis acutis utrinque unidentatis, panicula divaricata foliosa. Lin. suppl. 139. Hab. in Cap. b. spei. Caul. simplicissimi

31. *fasciculata*, fruticosa erecta, fol. ovatis subunidentatis recurvis, flor. glomeratis terminalibus. Lin. suppl. 139. Thunb. prod. 39. Cum priore. ¶

32. *persicifolia*, glabra, fol. radicalib. obovatis; caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilib. et remotis. Linn. Bull. t. 367. β. Rap. nemorosus angustifolius, magno flore. Bauh. pin. 93. Hab. in asperis, sylvaticis. ¶

33. *pyramidalis*, foliis laevibus serratis cordatis; caulinis lanceolatis, caul. junceis simplicibus, umbellulis sessilibus lateralibus. Lin. Pyramidalis laevis. J. Bauh. hist. p. 808. Hab. circa Idriam et in Carnioliis. Caul. ab imo ad apicem ramulos florigeros profert.

34. *americana*, fol. cordatis lanceolatisque, petiolis inferioribus ciliatis, flor. secundis, corol. quinquepartitis planis. Lin. Ait. Kew. 1. p. 220. C. planiflora. Lam. ? Hab. in Pennsylvania. Stylus corolla longior. ☉

35. *nitida*, fol. oblongis crenatis laevigatis, caulinis lanceolatis subintegris, cor. campanulato-rotatis. Ait. Kew. 1. p. 221. Dodart. mem. 4. p. 119. t. 118. Habit. in America boreali. ¶

36. *lilifolia*, fol. lanceolatis; caulinis acute serratis, flor. paniculatis nutantibus. Lin. Gmel. sib. 3. t. 26. Hab. in Sibiria, Tartaria. ¶

37. *stylosa*, fol. petiolatis subcordatis acute serratis, flor. (parvis) nutantibus, stylo longe exerto. Lam. enc. 1. p. 580. Gmel. sib. 3. t. 27. In Sibiria et Tartaria. Diversa a priore ?

β ? *periplocifolia*, fol. cordatis serratis longe petiolatis, caul. ascenduntibus multifloris. Lam. l. c. Cresc. cum priore, cujus varietas ?

38. *limonifolia*, ramis patentibus simplicibus, fol. radicalibus ellipticis laevibus integerrimis, caulibus linearibus subulatis, flor. sessilibus ternis. Lin. Willd. 2. p. 914. Hab. in Oriente. ☉

39. *virgata*, ramis virgatis, fol. lanceolatis utrinque acutis dentatis scabrisculis, cor. profunde partitiis, flor. subsapicatis sessilibus. Billard. pl. Syriac. 2. p. 11. t. 6. Phytoma virgata. Willd. Sp. 2. p. 924. Hab. in Libano. ♂

40. *acuminata*, glabrescens, caule stricto, fol. ovato-lanceolatis in longum acumen desinentibus subserratis, spica fasciculato-multiflora, cor. subulatis. Mich. Fl. 1. p. 108. Dolar. mem. 4. p. 119. t. 18. In remotis occidentaliib. Pensylv. et Virgin.

41. *ensifolia*, fruticosa, fol. ensiformibus serratis glabris, florib. paniculatis nutantibus. Lam. enc. 1. p. 575. Hab. in monte ignivomo insulae Borboniae. E medio rosulae foliorum assurgit caulis paniculatus sexuncialis fol. sessilibus distantib. minoribus instructus. Lin. h

42. *rhomboidica*, fol. rhomboidibus serratis, caulibus ovatis serratis, spica secunda, calyc. dentatis. Hab. in alpinis. Tj

43. *Alpini*, foliis lanceolatis serratis, inferioribus petiolatis, summis sessilibus, flor. nutantibus, stylo exerto. Lam. enc. 1. p. 681. Lin. Sp. 2. p. 166j. Hab. in umbrosis, humilis Italiae prope Bassano.

44. *crispa*, fol. laevibus petiolatis subcordatis duplicato - serratis incis, caule simplici, flor. lateralibus et terminalibus patulis. Lam. 1. c. Tournef. Cor. 3. Hab. in Armenia.

**\*\* Foliis scabris.**

45. *latifolia*, foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, flor. solitariis pedunculatis, fructibus cernuis. Lin. Engl. bot. t. 302. Flor. dan. t. 85. Hab. in montosis, sepibus. Tj

\* *urticifolia*, caule angulato hispido, fol. ovato-lanceolatis grosse serratis, pedunc. unifloris axillaribus cernuis, calyc. hispidis. Schmid. bohem. n.º 171. Willd. Sp. 2. p. 900. Hab. in Germaniae et Bohemiae nemoribus umbrosis. Tj

46. *Rapunculoides*, rad. repente, fol. cordat. - lanceolatis, caule ramoso, flor. secundis, sparsis, calycibus reflexis. Lin. Moris. s. 5. t. 3. f. 39. Hab. in Helvetiae, Galliae, Angliae, Germaniae siccissimis. Cal. scab. Cor. C. Rapunculi. Tj

47. *bononiensis*, fol. ovato-lanceolatis subtus scabris sessilibus, caule paniculato. Moris. s. 5. t. 4. f. 38. Hab. in Baldi, Lessinensium jugis, Bononia, Carniolia. Caul. habitu Verbasci nigri. Tj

48. *vesula*, pubescens, foliis oblongis obtusis crenatis, caule unifloro. Willd. C. uniflora, fol. glabris ovalibus dentatis, caul. subnudo, cal. glabro. Allion. ped. n.º 397. t. 7. f. 1. In Italia ad radicem montis Vesu. Tj

49. *bicaulis*, hispida, caule gemino 1-floro, radice crassiuscula. Lapeyrouse Fl. Pyren. ic. In Pyrenaeis in monte Rancid.

50. *ptarmicaefolia*, fol. linearibus margine ciliato-serratis, flor. sessilibus erectis. Willd. p. 902. Lam. enc. 1. p. 573. Hab. in Armenia.

51. *graminifolia*, fol. lineari-subulatis, capitulo terminali. Lin. Col. phyt. 2. t. 54. Barr. ic. 33a. In Italiae, Carnioliae montibus, Aprutii Salmone vicinis. Similis Phytomae hemisphaericae. Caul. simplicissimi, viz foliis longiores. Linn. Tj

52. *Trachelium*, caule angulato, foliis petiolatis cordato-lanceolatis acute serratis, cal. ciliatis, pedunc. trifidis. Engl. bot. t. 12. Flor. dan. t. 1026. Hab. in sepibus et nemorosis. Fructus lacunosus-torulosus. Tj

53. *glomerata*, caule angulato simplici glabrescens, fol. scabris oblongo-lanceolatis cordatis sessilibus, capitulo glomerato. Willd. Hab. in agris et pratis aridis, et in collibus calcareis.

\* *petraea*, caule angulato simplici, flor. sessilibus capitulo-glomeratis, fol. subtus tomentosis. Lin. Allioni. t. 39. f. 1. Hab. in Baldo.

54. *Cervicaria*, hispida, flor. sessilibus, capitulo terminali hemisphaerico, fol. lanceolato-linearibus undulatis. Lin. C. caule simplici aspero, fol. lingulatis asperis, flor. capitatis. Hall. belv. n.º 636. H. in Helvetiae, Germ., Sueciae asperis sylvaticis. ♂

55. *marginata*, fol. lanceolatis undulatis serratis marginatis, ramis debilibus, flor. terminalibus solitariis. Thunb. jap. p. 89. et Ejusd. Ic. pl. jap. Dec. 3. Hab. in Japonia ad marines viarum. Caulis basi crassus, sublignosus, decumbens. Th. Tj

56. *lanuginosa*, hispida - lanuginosa, fol. ovatis rugosis crenatis in petiolum attenuatis, caule simplici, flor. subsessilibus erectis patulis. Lam. enc. 1. p. 584. An C.

peregrinalis? L. Baul. pin. p. 94. Cervicaria media. Thal. p. 32. Hab. in Tartaria.

57. *tomentosa*, fol. radicalibus longis spatulatis crenatis, summis cuneiformibus, flor. pedunculatis subspicatis, calyce tomentoso. Lam. l. c. In Oriente. †

58. *argentea*, fol. oblongis angustis tomentoso-argenteis, caule paniculato, ram. unifloris. Lam. l. c. Tourn. Cor. 3. Hab. in Armenia. Caps. turbinatae.

59. *thyrsioidea*, hispida, racemo ovato oblongo terminali, caule simplicissimo, fol. lanceolato-linearibus. Jacq. vind. 211. obs. 1. p. 33. t. 21. Roth. germ. 1. 100. Hall. helv. n.º 688. Hab. in alpinis et montibus Helvetiae, Carnioliae. Cor. flavescent. ♂

60. *adpressa*, fol. lanceolatis dentatis ciliatis, caule erecto, panicula decomposita. Thunb. prod. 38. Lin. suppl. p. 140. Hab. ad Cap. b. spei.

61. *subulata*, fol. lanceolatis trigonis ciliatis, florib. paniculatis, caule erecto. Thunb. prod. 38. Ad Cap. b. spei. †

62. *hispidula*, hispida, florib. erectis, calyc. longitudine cor. Linn. suppl. 132. Hab. in Cap. b. spei. Folia linearia acuminata ciliata imprimis carina. Cor. infundibuliformis. Stigma trifidum. Liu. †

63. *paniculata*, foliis lanceolatis undatis latis, caule angulato hispido, flor. racemosis. Thunb. prod. 38. Ad Cap. b. spei. †

64. *cinerea*, foliis lanceolatis integris glabris, caule lanato, flor. terminalibus solitariis. Thunb. Cum prioribus.

65. *cernua*, fol. oblongis undatis hirsutis, flor. terminalibus cernuis, calycibus glabris. Th. prod. 39. In Cap. bonae spei. †

\*\*\* *Capsulis obtectis calycis sinibus reflexis.*

66. *Elatines*, fol. cordatis dentatis pubescentibus, caul. prostratis, pedunculis capillaribus multifloris. L. Allioni. Pedem. t. 7. f. 1. (Fig. justo major.) Habit. in Europae australis alpinis. ☉

67. *velutina*, caule ascendente, fol. obovatis incanis mollissimis, flor. paniculatis, lacin. calicis sagittatis. Desf. Atl. 7. p. 180. t. 51. Cresc. in rupium fissuris prope Flemscen. Stigm. 5.

68. *capensis*, foliis lanceolatis dentatis hispidis, pedunc. longissimis, caps. strigosis. Lin. Com. hort. 2. p. 69. t. 35. An cum sequente hujus divisionis?

69. *procumbens*, caule dichotomo dif-

fuso, fol. obovatis crenatis obtusis, flor. solitariis axillaribus. Linn. suppl. p. 141. Cresc. in Cap. b. s. et humidis.

70. *Erinus*, caule dichotomo, fol. sessilibus: superioribus oppositis tridentatis. L. Willd. Sp. 2. p. 917. Moris. S. 5. t. 3. f. 25. Hab. in Europa australi. Veronicam arvensem refert. ☉

71. *Erinoides*, caul. diffusis, fol. lanceolatis subserratis decurrentibus linea scabra, flor. pedunculatis solitariis. Linn. Herm. Lugd. Bat. t. 111? In Africa. Similis Lobeliae erinoidi. †

72. *diffusa*, caul. diffusis, fol. petiolatis serrato-dentatis lanceolatis, inferioribus cordatis, pedunc. 1-floris. Vahl. symb. 1. p. 18. Barr. ic. 453. In Calabria.

73. *Allionii*, capsulis obtectis, caule unifloro hispido, fol. linearibus lanceolatis undulatis hispidis. Willd. sp. p. 607. Vill. delph. 2. p. 512. t. 10. C. nana. Lam. C. alpestris. Allion. pedem. n.º 418. t. 6. f. 3. Hab. in alpinis Helvetiae, Galliae, Italiae. †

74. *caucasica*, pusilla, caps. obtectis 3-locularibus cernuis, caulic. erectis paucifloris, fol. obovatis crenatis scabris, radice repente. Bieberstein Tableau etc. Cresc. in abruptis lapideis circa Kurt-Bulak. †

75. *ligulata*, (hungarica), fol. undulatis hispidis: crenis callosis, caps. calicis sinibus obtectis, capitulo terminali. Kitaib. Plant. rar. Hungar. p. 65. t. 64. Hab. in Hungariae sylvis. C. glomeratae similis dicitur.

76. *ligularis*, cal. sinibus reflexis, caule 1-floro, foliis angustis lingulatis obtusis integerrimis. Lam. enc. 1. p. 585. In Alpib?

77. *punctata*, capsulis trilocularibus obtectis, caule simplici erecto folioso, fol. subpetiolatis, flor. nutantibus. Willd. flor. cernuis interne punctatis villosis. Lam. enc. 1. p. 579. Gmel. sib. 3. p. 155. t. 30. Hab. in Sibiria.

78. *Medium*, caps. quinquelocularibus obtectis, caule indiviso erecto folioso, flor. erectis. Lin. Habit. in Germaniae, Italiae sylvis apricis. ♂

79. *pelvisiformis*, caps. obtectis, fol. inferioribus ovatis serratis petiolatis: caul. subsessilibus, flore maximo pelvisiformi. Lam. l. c. p. 586. Tournel. Cor. 3. Hab. in ins. Candia. Fol. tomentosa.

80. *tubulosa*, caps. obtectis, fol. radicalibus petiolatis ovatis inaequaliter den-

tatis basi incisiss, caul. oblongis serratis sessilibus, flore tubuloso. Lam. l. c.

81. *violae*, humilis, caps. obtectis, fol. radicalibus cordatis crenatis petiolatis, fl. amplius pedunculatis, cal. hispido. Lam. p. 587. (C. violae-folia.) Hab. in Sibiria?

82. *barbata*, caps. quinquelocularibus obtectis, caule simplicissimo subunifolio, fol. lanceolatis, cor. barbatis. Jacq. obs. 2. p. 14. t. 37. Hab. in alpihus Austriae, Helvetiae, Pedemontii. ¶

83. *spicata*, hispida, spica laxa, flor. alternis, fol. linearib. integerrimis. C. caule simpliciter aspero. fol. linearib., flor. laxe et longissime spicatis. Hall. Hab. in Valesia inferiori. Totq. pilis albis hispida. L. ♂

84. *strigosa*, caps. obtectis. fol. lanceolatis integerrimis, pedunc. axillaribus unifloris, caule strigoso. Vahl. symb. 3. p. 34. Hab. in Oriente.

85. *alpina*, fol. ellipticis hirsutis, petiolis alaribus unifloris, flor. glabris. Hall. helv. n. 695. Jacq. austr. 2. t. 118. Hab. in alpihus Schneeberg, Helvetiae. Tota flavescens. Folia lineari-oblonga, integra. Linn. ¶

\* *longifolia*, hispida, caule simplice, pedunc. axillaribus unifloris, flor. erectis, fol. linearibus subcrenatis longissimis. Lapeyrouse. Flor. Pyren. ic. Hab. in monte Rancé in Pyrenaeis.

86. *mollis*, caps. 5-locularibus obtectis pedunculatis, caule prostrato, fol. suborbiculatis. Linn. Rocc. mus. t. 145. Barr. t. 759. Hab. in Italia, Hispania.

\* *dichotoma*, caps. 5-locularibus obtectis, caule dichotomo, flor. cernuis. Sp. p. 237. Willd. p. 610. Moris. s. 5. t. 3. f. 26. Desf. atl. 1. p. Barr. ic. 759. Hab. in Syria et Barbaria.

87. *saxatilis*, caps. 5-carinatis obtectis, flor. alternis nutantibus, fol. obovatis crenatis. Bocc. mus. 2. p. 76. t. 64. Hab. in Cretae scopulis saxosis.

88. *alliariefolia*, caps. obtectis, flor. radicalibus reniformibus duplicato-dentatis, caulinis ovatis dentatis sessilibus. W. l. c. Hab. in Oriente. Fol. radicalia facie Erysimi Alliariae. W.

89. *heterophylla*, fol. subovatis glabris integerrimis, caul. diffusis. Linn. Lam. enc. 1. p. 588. Camp. saxatilis, fol. inferioribus heilidis, caeteris Nummulariae. Tournef. iter. 1. p. 243. In insulis Archipelagi.

90. *parviflora*, cal. sinu reflexo, caule superne ramoso, foliis radicalibus longo petiolatis obovatis crenatis, caulinis ovato-lanceolatis incisiss, flor. paniculatis. Lam. l. c. Tournef. Cor. 4. In Oriente.

91. *lyrata*, hispida, caps. obtectis. fol. radicalibus longis petiolatis lyratis: lobo terminali cordato, flor. erectis sessilibus. Lam. l. c. Mor. s. 5. t. 3. f. 31. Vill. Camp. tomentosa. Vent. Hort. Cels. p. 18. t. 18. Cum priore.

92. *sibirica*, caps. 3-locularibus obtectis, caule paniculato. Gmel. sib. 1. p. 154. t. 29. Jacq. austr. t. 200. Hab. in Sibiria, Austria. Flor. oblongi, parvi. ♂

93. *tridentata*, caps. 5-locularibus obtectis, caule unifloro, fol. radicalibus tridentatis. Schreb. dec. 3. t. 2. Hab. in Oriente. Fol. radicalia Statices reticulatae. Flos majusculus. ¶

94. *laciniata*, caps. obtectis pedunculatis, fol. serratis: radicalibus lyratis, caulinis lanceolatis. L. Hab. in Graecia, Libano. Similis Mienauxiae. W.

95. *stricta*, caps. obtectis, fol. hirsutis: caulinis lanceolatis serratis, caule simplicissimo, flor. sessilibus. L. Hab. in Syria, Palaestina.

96. *aurea*, frutescens, caps. 5-locularibus, stigmatibus quinquefidis, caule paniculato, fol. duplicato serratis. Lin. supp. 141. In insulae Maderae rupibus. Nitida. Flor. flavesc.

\* *LEUCOSTA*. Corol. subhypocrateriformis. Stig. 2-3-fidum. Caps. longissima, prismatice-cylindrica, 2-3-locularis, polysperma. *Prismatocarpus*. L'Herit. Sert. angl. p. 1.

97. *interrupta*, fol. subulatis ciliatis, ramis floriferis superne interruptis aphyllis. L'Her. sub Prismatocorpo cum sequentibus. Hab. ad Cap. b. spei.

98. *ericoides*, paniculata, fol. subulatis subciliatis, panic. longis pedunculatis. L'Her. Lam. ill. 2. p. 65. Polcmonium Roellioideis. Lin. suppl. ? C. subulata. Th. Prodr. p. 38 ? C. hispida. Linn. suppl. ? Cum priore.

99. *altiflora*, fol. subulatis subciliatis confertissimis, pedunc. longissimo aphylo, germ. tomentosis. L'Her. l. c.

Obs. Tres hae enumeratae species Lepidium subulatum refert. L'Her.

100. *fruticosa*, fol. lineari-subulatis muticis, panic. terminali pedunculata, caule



caule fruticoso. L'Herit. Willd. Spec. 2. p. 912.

101. *plicata*, fol. linearibus undulatis, caule prolifero laxo ramoso, germ. longissimis. Prism. crispus. L'Her. Habitu C. undulatae.

102. *Prismatocarpus*, foliis lanceolatis glaberrimis, flor. terminalibus sessilibus, cor. cal. duplo longioribus. Prism. nitidus. L'Her. C. Prismatocarpus. Ait. W. p. 913.

103. *Speculum*, (arvensis) caule ramosissimo diffuso, fol. oblongis subcrenatis, florib. solitariis majusculis patulis. Curt. mag. t. 108. Willd. Spec. p. 912. Legousia arvensis. Durande Flor. de Bourgogne t. p. 37. (qui primus hanc plantam sub nomine inditio ut diversum genus a Campanulis removit.) Hab. in agris, ad versuras viarum. Cor. fundo squamulis destituta (?) Dur.

104. *hybrida*, caule stricto basi subramoso, fol. oblongis subundulatis crenatis, calycib. corol. subclandestina longioribus. Lin. Moris. s. 5. t. 2. f. 22. Cresc. minus frequens cum priore, in locis calcareis.

105. *Pentagonia*, caule ramosissimo, fol. linearibus aruminatis, cal. pilosis cor. breviorib. Lin. L'Her. l. c. Hab. in Thracia. Cor. rotata.

106. *biflora*, caps. 3-locularibus, fol. late ovatis crenatis sessilibus, flor. binis axillaribus sessilibus. Flor. Per. 2. p. 55. t. 200. Hab. in Peruviae arenosis. Cal. 3-5-partitus. Sequentem refert.

107. *perfoliata*, (amplexicaulis), caule simpliciter, fol. cordatis crenatis amplexicaulis, florib. axillaribus sessilib. glomeratis. Lin. Moris. s. 5. t. 2. f. 23. C. amplexicaulis. Michaux Flor. 1. p. 108. Hab. in Amer. borealis cultis.

429. *LIGHTFOOTIA*. Cal. 5-phyl-lus. Cor. 5-petala, fundo clausa valvis staminiferis. *Stigma* 3-5-fidum. *Caps.* 3-5-locularis, 3-5-valvis semisupera.

1. *subulata*, fol. subulatis, petalis linearibus. L'Her. Sert. p. 4. t. 5. Willd. sp. p. 888. Campanula capillacea. Lin. suppl. p. Hab. ad Cap. b. spec. h

2. *oxycoecoides*, fol. petalisque lanceolatis. L'Her. l. c. t. 4. Lobelia tenella. Lin. Mant. Hab. cum priore. Rami filiformes prostrati. h

*Obs.* Hoc et sequens genus Campanulis nimis affinia, cum valvis staminiferis, characteri generi Campanulae aequae essentiali, ac nectarium Ranunculis, cum Campanulis conveniunt.

430. *ROELIA*. Cor. infundibuliformis: fundo clauso valvulis staminiferis. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* sub 2-locularis, cylindrica, infera. (*Caps.* 1-locularis apice pervia. Gærtn.)

1. *ciliata*, fol. lanceolatis ciliatis, flor. solitariis terminalibus. Thunb. prodr. 38. Willd. Sp. 1. p. 918. Lam. ill. t. 123. f. 1. Hort. cliff. 492. t. 35. Comm. hort. 2. p. 77. t. 39. Hab. in Mauritania, Aethiopia et Cap. b. spec.

2. *squarrosa*, fol. ovatis dentatis ciliatis, flor. terminalibus aggregatis. Th. R. filiformis. Lam. ill. p. 66. t. 123. f. 2. Hab. ad Cap. b. spec. cum sequentibus. h

3. *decurrens*, foliis lanceolatis ciliatis decurrentibus, pedunc. longissimis axillaribus. Ait. Kew. 1. p. 226. L'Her. sert. angl. p. 4. t. 6. Andrew. t. 258. ©

4. *mucosa*, fol. ovatis dentatis reflexis glabris, flor. terminalibus solitariis. Thunb. Lin. suppl. 143. ©

5. *spicata*, fruticosa erecta, fol. lanceolatis integris ciliatis, flor. terminalibus subspicatis. Lin. suppl. 143. h

431. *PHYTEUMA*. Cor. primo tetrati-conica, dein 5-partita: laciniis linearibus laxis. *Stigma* 2-s. 3-fidum. *Caps.* 2-s. 3-locularis infera.

\* *Floribus capitato-spicatis.*

1. *pauciflorum*, capitulo subfolioso, fol. omnibus lanceolatis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 919. Ranunculus fol. ovatis, obtuse dentatis, bracteis maximis obtusis. Hall. helv. n°. 680. Hab. in alpinis Helveticis, Styriae. Stylus saepius bifidus. h

2. *Scheuchzeri*, capitulo subfolioso, bracteis linearibus capitulo longioribus, fol. lanceolatis dentatis. Willd. l. c. Allion. pedem. n°. 428. t. 39. f. 2.

3. Ph. *Scorsonerifolium*, fol. omnibus oblongis laeviter crenatis, supremis linearibus, spica oblonga. Vill. delph. 2. p. 519. t. 12. f. 2. Hab. in alpinis Helveticis et Pedemontanis, et in Delphinatus. h

3. *Michellii*, capitulo subrotundo, bracteis oblongo-lanceolatis, fol. linearibus rigidis subintegerrimis. Willd. Ph. spica oblonga, fol. lineari-lanceolatis subintegerrimis. Allion. ped. n.º 427. t. 7. fig. 3. Habit. in monte Cenisio et in alpihus Hetruriæ et Valesiæ. ¶

4. *hemisphaericum*, capitulo subrotundo, bracteis ovatis ciliatis, fol. linearibus subintegerrimis caule vix breviorib. Willd. Jacq. collect. 2. p. 61. lc. rar. vol. 2. Hab. in Helvetiæ, Italiæ, Austriæ, Hassiæ, Pyrenæis montibus et pratis.

5. *comosum*, fasciculo terminali sessili, fol. dentatis: radicalibus cordatis. Linn. Barr. ic. 88g. Jacq. austr. app. t. 50. Hab. in Balii, Carniolæ et Tyrolensibus montibus. ¶

6. *orbiculare*, capitulo subrotundo, fol. serratis: radicalibus cordatis. Linn. Eugl. bot. t. 142. In alpihus et pratis.

β. *lanceolata*, fol. omnibus oblongo-lanceolatis. Willd. Vill. Dauph. 2. p. 517, t. 12. f. 1.

γ. *ellipticum*, fol. omnibus oblongo-ellipticis obtusis. Willd. Vill. p. 922. t. 11. f. 2.

δ. *Charmelii*, capitulo rotundo, fol. radicalibus cordatis subdentatis, caulinis linearibus integerrimis. Vill. l. c. t. 11. fig. 3. In rupestribus calcareis. Planta antisiphylitica.

7. *nigrum*, capitulo ovato, bracteis serratis, fol. simpliciter dentatis, radicalib. cordatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus. Willd. Schmidt. bohem. 1. n.º 189. Hab. in pratis nemoribusque circa thermas Carolinas. ¶

8. *betonicaefolium*, spica oblonga, fol. simpliciter crenatis, radicalibus lanceolato-cordatis, caulinis lanceolatis. Willd. fol. cordatis oblongis crenatis, spica oblonga. Vill. 518. t. 12. f. 3. Hab. in montibus Delphinatus. ¶

9. *spicatum*, spica elongata, stylis pilosisculis trifidis, fol. radicalibus cordatis duplicato-dentatis. Willd. Flor. dan. 362. Hab. frequens in sylvaticis. Flores albi.

β? *Rapunculus*, rad. repente crassiuscula, fol. radical. cordatis petiolatis, caulinis oblongis sessilibus, spica ovata. Ph. ovalis. Hoppe. Cresc. vere in sylvis. Fl. violacei.

10. *ovatum*, spica ovata, stylis hirsutis flore longioribus emarginato-bifidis, fol. radicalibus cordatis duplicato-dentatis.

W. Schmidt. Fl. bohem. 1. n.º 190. Ph. Halleri. Allion. Hab. in pratis subalpinis Sudetorum, Bohemiæ, Helvetiæ et Pedemontii. ¶

\*\* *Flor. axillaribus sparsis.*

11. *lobelioides*, fol. lineari-lanceolatis denticulatis hispidis, caule paniculato flor. geminis pedunculatis sparsis. Willd. phytog. 1. n. 20. t. 4. f. 2. Hab. in Armenia.

12. *lanceolatum*, fol. lineari-lanceolatis tenuissime denticulatis scabris, caule ramoso, ramis simplicissimis foliosis, flor. sparsis geminatis sessilibus. Willd. l. c.

β? *canescens*, fol. sessilibus inferioribus obovatis serratis, superioribus lanceolatis integerrimis, flor. axillaribus racemosis. Plant. rar. Hungar. p. 12. t. 14. In Hungariæ montibus apricis.

13. *rigidum*, foliis lineari-lanceolatis obsolete denticulatis glabriusculis, caule simplicissimo foliato, flor. sparsis, pedunc. trifloris. W. Hab. in Oriente.

14. *amplexicaule*, fol. amplexicaulibus cordatis ovatis, duplicato-serratis, floribus sparsis. W. Hab. in Oriente.

PETROMARULA. Cal. 5-fidus. Cor. primo ovata, dein 5-partita: laciniis reflexis. Filam. basi dilatata. Stig. capitatum simplex. Germ. glabrum. Caps. .

15. *pinnata*, foliis pinnatis, racemo composito. Vent. Hort. Cels. p. 52. t. 52. Linn. Willd. Sp. p. 925. Rapunculus creticus, Petromarula. Bauh. hist. 2. p. 811. t. 812. Hab. in Crete, Oriente, ubi ad muros et rupes frequens crescit.

Obs. Habitu et filamentis cum Campanulæ genere, cor. rotata, quamvis facie aliena, cum Phyteumate convenit; sed ab utroque stylo crasso et stig. simplice capitato differt, quare non male ut diversum genus constitui posset.

432. FORGESIA. Cal. turbinatus, 5-fidus. Petala 5. Stigma 2-lobum. Caps. seminifera, stylo 2-partito acuminata. Caps. 2-locularis, polysperma.

1. *borbonica*. Defforgia. Lam. ill. p. 69. t. 125. Forgesia. Juss. gen. p. 183. Habit. in ins. Borbonia. Arbor. Fol. lanceolato-ovata, serrata. Escalloniæ Smith affinis. Lam.

433. TRACHELIUM. Cor. infundibuliformis. Styl. longus. Stigma

globosum. *Caps.* trilocularis, infera.

1. *caeruleum*, ramosum erectum, fol. ovatis serratis planis, flor. corymbosis. L. Willd. Sp. p. 926. Barr. ic. 683. 684. Hab. in Italiae et Orientis umbrosis. ♂

2. *diffusum*, ramosissimum diffusum, ramis divaricatis recurvis, foliis subulatis. Linn. suppl. 143. Habit. ad Cap. bon. spec.

3. *angustifolium*, erectum, fol. linearib. sessilibus integerrimis glabris. Schousb. Maroc. 1. p. 85. In montosis aridis prope Tezzam.

4. *tenuifolium*, erectiusculum, foliis linearibus ciliatis hispidis. L. Hab. ad Cap. bon. spec.

434. *GOODENIA*. *Cor.* labiata, 5-fida, undulata, longitudinaliter fissa, genitalia exserens. *Anth.* lineares. *Stigma* urceolatum ciliatum. *Caps.* 1-2-locul. 2-valv. polysperma, dissepimento parallelo. *Sem.* imbricata.

1. *ovata*, fol. ovatis denticulato-serratis glabris, pedunc. 3-floris, caps. lineari. Smith. Act. Soc. Linn. Lond. 2. p. 347. Willd. Sp. 2. p. 954. Vent. Hort. Cels. t. 3. Andrew. t. 68. Hab. in Nova Hollandia cum omnibus sequentibus.

2. *paniculata*, fol. obovato-lanceolatis dentatis corollisque pilosis, caule nudiusculo paniculato. Smith. Act. Soc. Linn. p. 348. Cav. ic. 6. p. 5. t. 507?

3. *bellidifolia*, fol. obovatis denticulatis carnosiss. caule nudiusculo spicato, cor. extus hirsuta, fructu quadrivalvi. Smith. l. c. p. 349. Flor. flavi.

4. *calendulacea*, fol. integerrimis obovatis crassis scabris, flor. axillaribus caeruleis. Andrew. Repos. t. 22. Var. sequentis?

5. *stricta*, fol. lanceolatis integris dentatis carnosiss. glabris, cor. extus hirsuta, stigmate ore contracto. Smith. l. c. Hab. in Novae Hollandiae locis humidis. Flores caerulei.

6. *heterophylla*, fol. integris dentatis lobatis pilosis, fructu subrotundo, cor. nudiuscula. Smith. l. c. Cav. ic. 6. t. 508.

7. *hederacea*, fol. subrotundis integris quinquelobisve, cor. extus lanata, caule prostrato. Smith. l. c.

8? *radicans*, caule repente, fol. spatulatis. Selliera radicans. Cav. ic. 5. p. 49. t. 474. f. 2. Habit. in humidis maritimis Chiloe et in valle Chilensi prope Coquimbo.

*Obs.* Ob semina imbricata marginata, uti in quibusdam Goodeniis, hanc plantam, sed dubitanter, huc retuli, cum auctor de natura pericarpium adhuc incertus sit.

435. *SCÆVOLA*. *Cor.* 1-pectala: tubo longitudinaliter fisso. *Limbo* 5-fido laterali. *Drupa* infera, 1-sperma. *Nux* 2-ocularis.

1. *Lobelia*, fol. obovatis glabris integerrimis. Vahl. symb. 2. Lam. encycl. t. 124. f. 1. Willd. Sp. 2. p. 955. *Lobelia Plumieri*, Lin. Jacq. Amer. Catesb. car. 1. p. 79. t. 79. Hab. in Indiis. h

2. *Koenigii*, fol. obovatis glabris superne dentato-subrepandis, calyce quinque-dentato. Vahl. symb. 3. p. 36. Lam. ill. t. 124. f. 2. Hab. in India orientali. h

3. *sericea*, fol. obovatis villosis mollissimis, superne dentatis. Vahl. symb. 2. p. 37. Habit. in Sauvage Island.

4. *laevigata*, fol. alternis obovatis dentatis glabris, fructu minimo. S. microcarpa. Cav. ic. 6. p. 4. t. 509. *Goodenia laevigata*. Curt. Mag. t. 287. *Cor.* dilute violacea.

5? *albida*, stylo canesque piloso. Sm. Act. Linn. 2. p. 348. Willd. Sp. p. 954. sub *Goodenia*. Hab. ad portum Jackson in N. Hollandia.

5. *hispida*, fol. lineari-lanceolatis hispidis, inferioribus dentatis, stylo apice hirsuto, cor. extus pilosus. Cav. l. c. p. 7. t. 510. *Goodenia ramosissima*. Smith. l. c. Cum priore. *Cor.* pariter dilute violacea.

**RUBIACEAE** (gen. 436-446) constituent ordinem plantarum valde naturalem et generum diutissimum. Plurimae sunt fruticosae aut etiam herbaceae; folia in his verticillata, in illis opposita, integerrima, stipulis aut vagina ciliari distincta. Flor. plurimum fragrantis, nonnullae odore sunt ingrato. *Cor.* tubulosa s. infundibuliformis. Stamina numerus varie variat, maxima parte 5 sunt, plura 4 (alia genera in antecedente classi occurrunt), rarius 6 aut plura. Fructus inferus, natura varius: nunc dicoccus s. semina nuda referens, nunc capsularis, plerumque haecatus, passim drupaceus, limbo calycis in plurimis coronatus, 1-2-aut multilocularis. Embryo

(*Coreculum* Juss.) oblongus, tenuis, perispermio (albumine. G.) magno corno involutus. Plura rubiacea genera (quod etiam in omni ordine valde naturali locum habet) inter se nimis affinia acgre distinguuntur.

436. *CINCHONA*. *Cal.* campanulatus, 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5-partito ut plurimum hirsuto. *Caps.* oblongo-teres, 2-locularis, 2-partibilis: dissepimento parallelo. *Sem.* numerosa, compressa margine membranaceo cincta.

\* *Staminibus inclusis.*

1. *officinalis*, fol. ovato-lanceolatis glabris, caps. oblongis. Vahl. in Act. Soc. Hist. nat. Haf. 1. p. 17. t. 1. Willd. Sp. 2. p. 957. Lam. enc. t. 64. f. 1. Habit. in Loxa Peruviae. Panicula terminalis; patens trichotoma. Caps. semipollicaris, lineis obscuris elevatis. Vahl. h

2. *pubescens*, fol. ovatis basi elongatis subtus pubescentibus, caps. cylindricis. Vahl. l. c. p. 19. t. 2. Hab. in Peru. h

3. *macrocarpa*, foliis obovatis subtus pubescentibus costatis. Vahl. l. c. p. 20. t. 3. C. *officinalis*. Linn. suppl. 144. Hab. in regno Santa-Fé. Rami villosi-tomentosi. *Cal.* campanulatus pubescens. *Cor.* coriacea pilis adpressis tomentosa. Caps. bipollicaris. h

\* *nitida*, fol. obovatis nitidis, panic. brachiata, cor. albo-purpureis, limbo parum hirsuto. Flor. Per. 2. p. 50. t. 191. Ruiz. quinol. art. 2. p. 56. Hab. in Andium montibus altis, nemorosis, frigidis et in pluribus aliis locis in Peruvia. Fol. glabra, subtus venosa.

*Obs.* Antifebrilis, tonica et antiseptica est. In provincia Huanuci Tarmae, Huamalies et Xauxae pro genuino cortice Peruviano, majorique pretio quam reliquae species venditur. An peculiaris species?

4. *hirsuta*, fol. ovalibus crassis margine reflexis, supra nitidis vrosis, subtus pubescentibus: terminalibus subcoriatis, flor. corymbosis (purpurascensibus.) Fl. Per. 2. p. 57. t. 192. Cresc. cum priore, cum qua eodem pretio aestimatur. Caps. obscure purpurea, exsiccatione atra. h

5. *purpurea*, fol. oblongo-ovalib. ovatis (purpurascensibus) panic. brachiata magna, fl. subcorymbosis, cor. albo-purpureis, limbo hirsuto albo. Flor. Per. 2. p. 52. t. 191.

In Andium montibus imis nemorosis. Caps. oblonga angusta.

6. *ovata*, fol. ovatis subtus tomentosis, panic. brachiata, florib. subcorymbosis. Flor. Per. l. c. t. 195. Cresc. in Andium montibus imis nemorosis calidis versus Pozuzo et Panso. Fol. subtus venis purpurascensibus. Cor. pubescens limbo patente albo. h

7. *lanceolata*, fol. lanceolato-oblongis glabris, panic. brachiata magna, flor. subcorymbosis. Fl. Per. 2. p. 51. In Andium montib. frigidis et nemorosis. Cor. roseo-purpurea, limbo hirsuto. Cort. extus fuscus, intus lutescens.

8. *magnifolia*, fol. oblongis ovalibusque glabris, panic. brachiata, flor. subcorymbosis, cor. albae limbo villosiusculo. Flor. Per. 2. p. 53. t. 196. Cresc. in Andium nemorib. calidissimis prope torrentes. Cor. odorata uti Citrus Aurantium. Arbor fere 40-ulnaris, coma valde frondosa, erecto patens. Caps. oblonga magna.

9. *acutifolia*, fol. ovatis acutis, panic. terminalibus brachiatis, cor. candidis glabris. Flor. Per. 3. p. 1. t. 225. Hab. in Peruviae Andium nemorosis. Filam. medio tubi inserta; Anth. inclusae. Capsula turbinata.

10. *micrantha*, fol. ovalibus obtusis, panic. maxima, flor. nemorosis parvis, cor. albae limbo lanato. Flor. Per. 2. p. 52. t. 194. Cum priore in montibus aliis frigidis. Arbor 23-ulnaris.

11. *glandulifera*, fol. ovato-lanceolatis supra glandulosis, panic. subcorymbosis, cor. albedo-roseis limbo lanuginoso. Flor. Per. 3. p. 1. t. 224. Cresc. in locis saepe memoratis. Frutex 2-orgialis.

12. *dichotoma*, fol. oblongo-lanceolatis, pedunculis terminalibus dichotomis paucifloris, caps. angustis linearib. longis. Flor. Per. 2. p. 53. t. 197. Cort. fuscus, maculis albis variegatus, amarissimus.

13. *rosea*, fol. oblongis obtuse acuminatis, panic. brachiata, flor. corymbosis. cor. fauce glabra, limbo margine tomentoso. Flor. Per. 2. p. 54. t. 199. In Andium nemoribus imis, copiose ad Pozuzo etc. tractus. Filam. basi hirsuta, infra medium tubi inserta. Anth. parum exsertae. Fol. palmaria, nitida, a formicis quibusd. exiguis avide appetuntur.

\*\* *EXOTEMA. Staminibus exsertis.*

14 *philippica*, fol. ovatis glabris, flor. corymbosis, pedunc. trifidis, anth. exter-

tis. Cav. ic. 4. p. 15. t. 329. Hab. prope Manila in St. Cruz. Née. Arbor Lumilis.

15. *longiflora*, pedunc. axillaribus 1-floris, fol. lineari-lanceolatis glabris, cor. tubo longissimo. Lambert de Cinchona. p. 38. t. 12. C. caribaea. Journ. de Phys. Oct. 1790. p. 243. t. 1.

Obs. Cinchona spinosa ejusdem auctoris hoc ad genus non pertinere videtur.

16. *caribaea*, foliis ovato-lanceolatis, pedunc. axillaribus terminalibusque unifloris, stamin. exsertis. Swartz. obs. 72. Jacq. amer. Cinchona jamaicensis. Wright. in Act. angl. vol. 67. p. 504. t. 10. Hab. in Caribaeis. h

17. *corymbifera*, fol. oblongo-lanceolatis, corymbis axillaribus. Linn. suppl. 144. Forst. in Act. ups. nov. 3. p. 176. Habit. in ins. Tongatabu et Eaoe maris pacifici. Folia palmaria saturate viridia, nervo subtus purpureo. Corymb. trichotomus magnus. h

18. *lineata*, panic. terminali, fol. ovatis acuminatis glabris lineatis, caps. pentagonis. Vahl. l. c. p. 22. t. 4. Habit. in St. Dominica. h

19. *floribunda*, panic. terminali, caps. turbinatis laevibus, fol. ellipticis acuminatis. Vahl. p. 23. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 375. Lam. enc. t. 164. f. 2. Cinchona montana. Badier. Roz. Journ. de Phys. Feb. 1789. p. 129. Ust. et Roem. Mag. de Bot. 6. p. 96. t. 3. Hab. in Jamaica, Hispaniola, St. Lucia, Dominica et Guadeloupe locis montosis et ad torrentum ripas. h

20. *brachycarpa*, panic. terminali, caps. obovatis costatis, foliis ellipticis obtusis. Vahl. p. 24. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 378. Hab. in montibus umbrosis Jamaicae occidentalis. Caps. obovata lineis 10 elevatis costata. Vahl.

21. *angustifolia*, flor. paniculatis glabris, caps. oblongis pentagonis, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 380. et in Act. holm. 1787. p. 117. t. 3. Lam. t. 164. f. 3. Hab. in Hispaniola ad ripas petrosas fluviorum. h

Obs. Auctores Florae Peruvianae, vol. 2. p. 49. de speciebus hujus subdivisionis censent, eas ad genus, *Portlandia* referri debere.

437. *COSMIBUENA*. Cal. deciduus, 5-dentatus. Cor. tubus longissimus: limbo reflexo obliquo glabro. Stam. infra faucem inserta.

Caps. apice bivalvis; valvulis involutis subbilocularis. Recept. lamellata hinc valvulis adpressa, inde seminifera. Sem. ovalia, cincta ala lineari reticulata.

1. *obtusifolia*, fol. ovalibus obovatisque obtusis, flor. corymbosis. Flor. Per. 3. p. 3. t. 198. Cinchona grandiflora. Flor. Per. 2. p. 53. Cresc. ad Pozuzo ripas. Cor. caudata, fragrantissima. Arb. 3-orgyalis.

2. *acuminata*, fol. ovalibus acuminatis, flor. solitariis sessilibus. Flor. Per. l. c. p. 4. t. 226. Hab. in Peruviae Andium nemorosis imis. Arbor 5-ulnaris.

438. *PINKNEA*. Cal. laciniae inaequales: 1-2 bractaeformibus magnis. Cor. longe tubulosa. Filam. basi tubi inserta. Caps. superne 2-valvis: valv. medio septiferis. Sem. alata, transverse invicem superposita.

1. *pubescens*, fol. ovalibus subtus tomentosis, flor. fasciculato-paniculatis. Michaux Flor. 1. p. 105. Hab. ad Georgiae ripas fluvii St. Mariae. Subarborescens. Cinchonae affinis.

439. *PORTLANDIA*. Cal. 5-phyl-lus. Cor. clavato-infundibuliformis: laciniis patenti-deflexis. Caps. 5-gona, retusa, coronata, 2-locularis, 2-valvis: valv. duplicatis 2-fidis, polysperma.

1. *tetrandra*, flor. tetrandris. fol. obovatis. Forst. prod. n.º 86. Willd. Sp. 2. p. 935. Lin. suppl. 143. In insula Savage Island maris pacifici. Cor. tetragona. h

2. *graniflora*, flor. pentandris, foliis lanceolato-ellipticis. Swartz. fl. ind. etc. 1. p. 385. Smith. ic. piet. l. p. 6. t. 6. Brown. jam. 164. t. 11. f. 1. Habit. in Jamaicae rupibus calcareis. Cor. Datu-rac. h

3. *coccinea*, florib. pentandris, foliis ovatis coriaceis. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 384. Hab. rarius in Jamaicae occident. praecipitiis montium. ¶

4? *corymbosa*, flor. corymbosis, fol. ovatis acutis lanceolatisque, stipulis subovatis, flor. pentandris. Flor. Peruv. 2. p. 49. t. 190. f. 2. Habit. in Andium praeruptis, locis calidis. Cor. calyce 4-plo longior. h

440. *DANAIS*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: fauce villosa. *Stylus* apice bifidus. *Caps.* globosa, umbilicata, 2-locularis, apice 2-valvis, polysperma. *Sem.* margine membranaceo. (Geuitalia exerta.)

1. *fragrans*, (denudata), fol. lanceolatis, flor. dioicis, caps. calyce deciduo denudatis. *Paederia fragrans*. Lam. enc. 2. p. 257. t. 166. f. 2. Willd. Sp. 2. p. 1219. Hab. in ins. Madagascaria, Mauritia et Borbonia. Planta scandens, uti sequentes. Rad. rubra.

β. *coronata*, capsul. laevibus calyce persistente coronatis. An distincta species?

2. *sulcata*, fol. ovatis, caps. sulcatis cal. subfoliaceo coronatis. In ins. Mauritia, ubi altissimas arbores scandit. h

*Obs.* Vidi has species in Herbario dom. Aubert du Petit Thouars, qui earum characteres ex observationibus in locis natalibus institutis mecum communicare voluit. Hoc genus *Cinchonis* affine et ab iis caps. globosis praecipue differt.

441. *GENIPA*. *Cal.* tubulosus aut turbinatus subinteger. *Cor.* hypocrateriformis, limbo magno 5-partito. *Anth.* in fauce sessiles exertae. *Stigma* clavatum, integrum s. simplex. *Bacca* (magna) carnosa, apice attenuato-truncata, 2-locularis, polysperma.

1. *oblongifolia*, fol. oblongo-ovatis subsessilibus, racemis terminalibus. Flor. Per. 2. p. 67. t. 220. f. 2. Hab. in Peruv. Andium nemorib. imis calidis. Bacca mali persici magnitudine, ex cujus pulpa et seminibus Indi colore nigro persistente faciem manusque inficiunt. Etiam lignum, colore roseum, utilissimum est.

2. *americana*, (grandifolia), foliis lanceolatis subsessilibus integris Lin. *Gardenia Genipa*. Swartz. obs. p. 84. Willd. Sp. 2. p. 1228. Plum. Sp. ic. 136. Hab. in Amer. meridionali. Arbor, florens Junio. Fruct. circi magnitudine, edulis.

*Obs.* Hoc genus a *Gardeniis* inter alia stigmate clavato nec bilamellato distinguendum, hinc omnes *Gardeniae* tali gaudentes stigmate, huc referri debent. An hujus generis *stylocoryna*. Cav. ic. 6. p. 21. t. 436?

3. *Merianae*, tota hirsuta, fol. oblongo-

obovatis, florib. in summitate congestis, fructu depresso-globoso. Richard in Act. Soc. Nat. Paris. p. 107. Huc Duroia *Ericpila*. Lin. suppl. Hab. in Cayenna.

4. *edulis*, glaberrima, foliis oblongis, flor. in summitate congestis, plurimumque 4-fidis; fructu globoso laevi. Richard l. c. Cum priore.

442. *GARDENIA*. *Cal.* laciniae verticales aut obliquae. *Cor.* primo contorta, infundibuliformis 5-9-fida: tubo saepius longo. *Stylus* elevatus. *Stigma* bilobum. *Bacca* 2-locularis, polysperma. *Sem.* duplici serie disposita. *Antherae* ori tubi insertae.

\* *Inermes.*

1. *radicans*, inermis, fol. lanceolatis, cor. hypocrateriformibus obtusis, calyce angulato, caule radicante. Willd., Sp. 2. p. 1225. Thunb. Diss. de *Gardenia* n.º 1. t. f. 1. et ejusd. Diss. acad. 2. p. 1. Hab. in Japonia. h

2. *florida*, inermis, fol. ellipticis, cor. hypocrateriformibus, calycinis laciniiis verticalibus lanceolato-subulatis. Ait. Kew. 1. p. 293. Lin. suppl. 163. Ehret. pict. t. 15. Rumph. 7. t. 14. f. 2. Habit. in India orientali, Surate, Amboina et Cap. bon. spei. Flor. solitarii, magni, odori. h

3. *longiflora*, inermis, fol. lanceolatis, cor. longissimis hirsutis acutis, bacca cylindrica. For. Peruv. 2. p. 67. t. 219. f. 2. Hab. in Andium nemoribus imis calidis ad Pozuzo. Frut. 2. orgyalis, valde ramosus. Bacca lutea, 1 1/2-palmaris, pulpa dulci eduli.

4. *tubiflora*, inermis, fol. ellipticis undulatis, flor. ternis, cor. lacinis linearibus reflexis: tubo filiformi longissimo. Andr. t. 183. Hab. in Sierra Leone. Odor fragrantissimus.

5? *Thunbergia*, inermis, foliis ellipticis utrinque acuminatis, cor. hypocrateriformibus, cal. latere rumpentibus, laciniiis apice dilatatis cucullatis. Ait. Kew. 1. p. 294. Thunb. Diss. de Garden. n. 3. *Thunbergia capensis*. Mont. Act. holm. 1773. p. 282. t. 11. Habit. ad Cap. b. spei et in Manilla. Cal. appendiculatus laciniiis cucullatis. Cor. limbus planus decempartitus. Filam. o. Anther. q. 4. 10. Stigma oblique truncatum, 5-sulcatum, sulcis reflexis emarginatis. An potius peculiare genus?

6. *latifolia*, inermis, fol. obovato-sub-

rotundis, cor. hypocrateriformibus, lacinii calycinis subulatis obtuse carinatis. Ait Kew. 1. p. 234. H. in montibus Indiae orientalis. *h*

7. *clusiaefolia*, inermis, caule erecto, fol. obovatis emarginatis, panic. terminali, lacinii corol. cuspidatis. Willd. p. 1227. Jacq. collect. append. p. 37, t. 4. f. 3. Catesb. carol. 1. p. 59. t. 59. Habit. in insulis Bahamensisibus. *h*

8. *gummifera*, inermis, foliis oblongis obtusis hirtis, stipulis subulatis, lacinii calycinis ovatis brevissimis, tubo recto. Lin. suppl. 164. Thunb. Diss. de Gard. n. 4. t. 2. f. 3. Hab. in Zeylona. Ex rimis corticis et foliis sudat Gummi - resina, Gummi Elemi simillima. *h*

9. *Mussaenda*, inermis, foliis ovatis acutis, stipulis mucronatis, lacinii calycinis subulatis compressis, tubo incurvato hirtis. Lin. suppl. 163. *Mussaenda formosa* Jacq. amer. 70. t. 48. Ed. picta t. 70. Hab. in Carthagenae sylvis. Fol. subpubescentia. *h*

\* *madagascariensis*, inermis, foliis ovatis utrinque glabris, flor. axillaribus sessilibus solitariis longe tubulosus externe tomentosus. Lam. enc. 2. p. 608. Hab. in Madagasc. Antecedenti affinis.

10. *Rothmannia*, inermis, fol. oblongis, stipulis subulatis, lacinii calycinis subulatis teretibus longitudine tubi, tubo glabro ampliato brevi. Lin. suppl. 165. Th. in Act. holm. 1776. p. 65. t. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Flores suaveolentes, imprimis nocte. *h*

#### \*\* *Spinosae.*

11. *uliginosa*, spinosa, ramis apice spinosis, cor. intus tubo hirsutis. Retz. obs. 2. p. 14. Hab. in paludosis Indiae. *h*

12. *armata*, spinosa, spinis ramulorum terminalibus quaternis, lacinii calycinis linearibus cuneiformibus, flor. aggregatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 524. Jacq. amer. 70. Hab. in Martinicae et Carthagenae sylvis. *h*

13. *micranthus*, spinosa, fol. ellipticis utrinque acutis spinis longioribus, florib. sessilibus, corol. elabris. Willd. Thunb. Diss. 1. f. 2. Hab. in China et Zeylona. *h*

14. *multiflora*, spinosa, spinis fol. brevioribus uncinatis, fol. ovalibus acuminate, flor. cymoso-umbellatis. Willd. Sp. 2. p. 1231. *Randia longiflora*. Lam. enc. 3. p. 25. ill. t. 156. f. 3. Hab. in India orientali. Tubo longo, stigmate et atheris

ad faucem corol. eum Gardeniis magis convenit.

443. *MUSSËNDA*. *Cor.* infundibulif. *Stigmata* 2, crassiuscula, *Bacca* oblonga, 2-locularis, poly-perma. *Sem.* quadrifariam disposita. *Stam.* tubo interne inserta.

1. *frondosa*, ramis foliisque ramorum et paniculae villosis. Vahl. symbol. 3. p. 37. Willd. Sp. 2. p. 997. Burm. zeylan. 165. t. 76. Rumph. 4. t. 51. Rheed. 2. t. 18. Hab. in India. Bractea altera enata in folium album, ellipticum, nervosum, panicula longius. L. *h*

2. *glabra*, ramis foliisque ramorum et paniculae glaberrimis. Vahl. l. c. p. 38. In India orientali. Rumphii folium principissae huc pertinere videtur. Vahl. *h*

444. *RANDIA*. *Cal.* 5-partitus: lacin. lineari-lauceolatis contortis. *Cor.* hypocrateriformis: tubo cal. vix longior. *Stigma* bilobum: lobis oblongis, inaequalibus. *Bacca* dissepimento incompleto, semibilocularis, cal. tubuloso coronata. *Sem.* plurima, per 4 series alternatim superimposita.

1. *obovata*, spinis oppositis, fol. obovatis acutis. Flor. Per. 2. p. 68. t. 220. f. h. Habit. in Peruviae Andium praeruptis calidis. Bractee 7 sub singulo flore.

2. *rotundifolia*, spinis ramisque subverticillatis foliis subrotundis ovatisque rugosis. Flor. Per. 1. c. Cresc. in Peruv. nemoribus. Stipul. intrafoliceae membranaceae fulvae.

3. *latifolia*, fol. spathulato-ovalibus, spinis in apice fol. multo breviorib. Lam. enc. 3. p. 25. *Randia aculeata*. Lin. *Gardenia Randia*. Willd. Sp. p. 1230. Brown. Jam. t. 85. f. 1. Habit. in Antillis, Jamaica etc.

♂ ? *mitis*, subinermis, fol. subovalib. Lin. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 528. Sloan. Jam. hist. 2. p. 18. t. 161. f. 1. Cum priore.

4. *parvifolia*, fol. obovatis fasciculatis spinis abbrevioribus. Lam. l. c. p. 25. Sloan. l. c. 2. p. 100. t. 207. f. 1. Cresc. in Jamaica, St. Domingo. Magis spinosa.

5. *parviflora*, fol. ovatis petiolatis spi-

nis arcuatis brevissimis, flor. pedicellatis subfasciculatis axillaribus. Lam. l. c. *Gardenia micranthus*. Thunb. Willd. Spec. 2. p. 1230 ?

#### 445. CANTHIUM. Cal. 5-fidus.

Cor. 5-fida, patens. Stylus elevatus. Stigma capitatum aut clavatum. Bacca corticosa, 2-locularis, 2-sperma. Sem. hinc convexa, inde plana: sulco longitudinali.

\* *Spinosa, stigma capitato.*

1. *chinense*, spinosa, floribus sessilibus hisutis. *Gardenia spinosa*. Thunb. Willd. Sp. 2. p. 1229. In China.

2. *coronatum*, spinosum, fol. ovato-cuneiformibus obtusis, lacin. calycinis foliaceis, baccis coronatis. Lam. enc. 1. p. 602. *Gardenia spinosa*. Lin. suppl. Pluck. alm. t. 98. Gard. dumetorum. Ait. Willd. l. c. f. 6. Habit. in India. Horride spinosa.

3. *parviflorum*, foliis ovatis petiolatis apicis vix longioribus, dentibus calycinis acutis brevissimis baccis nudis umbilicatis. Lam. l. c. Roxb. Corom. 1. p. 39. t. 51. β. fol. majoribus et acutioribus. Pluck. l. c. f. 3. *Webera tetrandra*. Willd. Sp. 2. p. 1224. Habit. in India orient. Radix dicitur amara, rubra, odore grato.

4. *pedunculare*, spinosum, fol. ovato-acutis subsessilibus, peduncul. folio longioribus. Cav. ic. 6. p. 21. t. 436. In Insul. philippices.

\*\* *CUPIA, inermia, stigma clavato.*

5. *corymbosum*, inerme, fol. oblongis acutis, corymbo terminali. Willd. l. c. sub *Webera*. *Rondeletia asiatica*. L. Cupi. Rheed. mal 2. t. 23. In Malabar et Zeylona. h

6. *cymosum*, inerme, fol. ovatis acuminate, cymis multifloris axillarib. *Webera cymosa*. W. Hab. in India orientali. Arb. ramis pubescentibus. Stigm. capitato-bilobum. W.

Obs. An posteriores duae hae species revera hujus generis? Nomen *Webera* caeterum inter muscos, a pluribus jam adoptatum, conservandum est.

#### 446. ERITHALIS. Cal. urceolatus.

Cor. 5-partita: lacinii recurvis.

Bacca 10-locularis, 10-sperma.

1. *fruticosa*, (odorata), fol. obovatis,

cymis compositis pedunculatis. Willd. Sp. 2. p. 996. E. odorifera, arborea erecta, Jacq. amer. pict. t. 260. f. 20. Plum. ic. t. 249. f. 2. β. *inodora*, fruticosa procumbens. Jacq. Hab. in Jamaica, Martinica. β. in Curacao.

2. *polygama*, fol. obovatis, flor. axillaribus: masculis cymosis, hermaphroditis solitariis. Forst. prod. n.º 101. β. Rumph. 3. t. 140. Hab. in insula Societatis.

447. GUETTARDA. Cal. integer, obsolete dentatus, aut crenatus. Cor. tubulosa, limbo 5-9-fida. Stigma capitatum. Drupa nuce sulcata 5-passim 2-locularis. (Stam. 4, 5, 6, 7 et 9.)

1. *speciosa*, fol. ovatis utrinque nudis, cor. subnovemfidis. Lam. enc. 3. p. 53. t. 154. f. 2. Lin. syst. veg. p. 899. Rheed. 4. t. 47 et 48. Hab. in India, Malabar et ins. Java. Flores Nyctæit, longe pedunculatis. Cor. 7-9-fida. Stam. eodem quoque numero variat. Arbor meliocris. Fol. laeviuscula.

2. *argentea*, fol. ovatis subtus argenteis pubescentibus, venis transversis, cor. subsexfidis. Lam. l. c. t. 154. f. Halesia arborescens. Brown. jam. t. 20. f. 1. Hab. in Jamaica et Cayenna. Flores externe tomentosi. Drupa pubescens, 6-locular. h

3. *Mathiola*, fol. obovatis mucronatis scabris, subtus venosis pubescentib., flor. sub-6-andris. Guettarda scabra Vent. Choix de Plant. 1. t. 1. Lam. l. c. f. 3. *Mathiola scabra*. Lin. Habit. in America.

Obs. Linnaeus secundum figuram Plumeri, naturae incongruam, corol. dicit 1-petalam. Cor. 5-6-fida. Stam. 5, 6, 7.

4. *rugosa*, fol. subcordatis ovatis acutis scabris subtus tomentosis, flor. 6-andris. Swartz. prodr. p. 59. Flor. ind. occ. 2. p. 632. Vahl. symb. 3. p. 50. Habit. in ins. Antigua, Dominica etc. Flor. parvi. Fol. superne aspera. Drupa. coccinea.

5. *elliptica*, fol. ellipticis, flor. 4-andris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 634. Cresc. in Jamaicae campestribus siccis. Drupa umbilicata, 4-sperma. Pedunculi axillares. h

6. *membranacea*, fol. ovatis acuminate membranaceis hispidis - scabris, flor. tetrandris. Swartz. l. c. p. 635. In Hispaniolae fruticetis montosis. Racemi terminales. Drupa oblonga, 4-sperma. Cal. tubulato-coronata.



7. *parviflora*, fol. oblongis glabris laevibus, pedunc. trifloris subpentandris. Vahl. eclog. 2. Lam. ill. t. 154. f. 4. Hab. in ins. St. Crucis et in Monserrat.

*Obs.* Secundum v. Rohrap. Vahl. *Edechi* Loefl. huc pertinet.

8. *odorata*, fol. confertis parvulis subovatis acutis glabris, floribus lateralibus subracemosis. *Laugeria odorata*. Swartz. Willd. Sp. 2. p. 1081. *Laugeria odorata*. Jacq. amer. t. 177. f. 21 et Ed. picta t. 259. f. 16. Hab. in Carthagenae et Havanae arbutis apicis maritimis.

9. *hirsuta*, fol. oblongis acutis, spicis longis multifloris revolutis, cor. laciniis fimbriato-plicatis, fructibus pentagonis, *Laugeria hirsuta*. Flor. Per. 2. p. 22. t. 145 f. a. Hab. in Peruv. nemorib. Arb. 30. ulnariis. Bract. magnae. Fol. subtus pubescentia venosa venosissima.

10. *crispiflora*, fol. ovatis acuminatis nervosis, subtus villosis, lacin. corol. crispatis. Vahl. Eclog. amer. Fasc. 2. t. 6. Habit. versus summities montium in ins. Montserrat. h

β? *dependens*, fruct. 3-gonis. Flor. Per. 1. c. sub Laug.

\* *LAUGERIA*. Drupa subrotunda, 2-sperma.

11. *lucida*, fol. oblongis obtusis integris membranaceis nitidis, racemis dichotomis, drupis nucibus bilocularibus. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 475. Vahl. symb. 3. p. 40. t. 57. Habit. in fruticetis Jamaicae calidioris, ins. St. Luciae et St. Crucis. h

12. *tomentosa*, fol. ovatis acutis integris subtus tomentosis, racemis dichotomis, drupis nuce biloculari. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 477. Facie Tournefortii similis. Hab. in fruticetis Jamaicae occid. h

13. *coriacea*, fol. elliptico-ovatis subcoriaceis utrinque glabris obtusiusculis, spicis bisfidis, flor. tetrandris. Vahl. ecl. 1. p. 26. Habit. in insula Montserrat ad summities montium. h

14. *resinosa*, fol. lato-lanceolatis glabris, subtus glaucis, spicis axillaribus bifidis, ramis apice resinosis. Vahl. l. c. p. 97. Hab. in altis montibus insulae Montserrat. h

*Obs.* Variant species *Langeriae* quoad numerum loculamentorum putaminis, saepe maturitate unum vel alterum quoque evanescit. Genus a Guettardis parum diversum, et forte non absonum foret cum eo conjungere. Vahl.

448. *SCHRADERA*. *Involucr. universale* multiflorum. *Cal.* superus urceolatus. *Cor.* 5-6 fida, campanulata, sauce hirsuta. *Bacca* polysperma. (Stam. 5-6.)

1. *capitata*, involucreo dentato, calyce integerrimo, fol. obtusis. Willd. Sp. II. p. 238. Vahl. ecl. 1. p. 35. t. 5. *Urceolaria exotica*. Gmel. syst. 2. p. 390. Habit. in ins. Montserrat. Frutex scandens parasiticus. *Involucrum coriaceum* circiter 15-florum. Numerus partium floris a 5-6. h

2. *cephalotes*, (jamaicensis), involucreo integerrimo, cal. dentato, fol. acuminatis. Willd. l. c. *Fuchsia involucrata*, Swartz. Fl. ind. occ. 2. p. 674. Hab. in sylvis et montibus Jamaicae interioris. *Involucrum* 8-florum. Numerus octonarius frequentissimus est, rarius 5-7-9-10-rius. W. h

449. *MORINDA*. Flores in globum collecti supra receptac. sphaericum. *Cal.* sub-5-dentatus. *Cor.* subinfundibuliformis, 5-fida, patens. *Baccæ* aggregatae, ob mutuum compressionem angulatae, apice retusae, 2-spermae.

1. *umbellata*, erecta, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. confertis. Linn. Willd. Sp. 2. p. 991. Hab. in India. h

2. *citrifolia*, arborea, pedunc. solitariis. Lin. Rumph. amb. 2. p. 158. t. 99. Rheede. 1. t. 52. Cum priore.

β? *angustifolia*. *Bacchodius angustifolia*. Rumph. 3. p. 157. t. 98. h

3. *Royoc*, procumbens. L. Jacq. hort. 1. t. 16. *Royoc humifusum*, fructu compresso. Plum. Spec. 2. t. 26. Hab. in Amer. calidior. h

450. *NAUCLEA*. *Cal.* sub-5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* subtrigona bilocularis, polysperma. Flor. in globum collecti supra Recept. commune globosum pilosum.

1. *orientalis*, fol. oblongis acutis, pedunc. aequalibus, stam. longitudine cor. Willd. Sp. 2. p. 928. *Cephalanthus* fol. oppositis. Lin. Flor. zeylan. 53. Rheed. mal. 3. p. 29. t. 33. Hab. in India orient. Capitula florum magnitudine pomi minoris, flava. Stigma pyramidatum. W. h

2. *purpurea*, fol. oblongis utraque attenuatis, pedunc. incrassatis, staminibus

inclusis. Willd. l. c. Roxb. coromand. 1. p. 41. t. 54. *Cephalanthus chinensis*, Lam. enc. 1. p. 671. Rumph. amb. 3. p. 84. t. 55. Hab. in India orientali. Similis praecedenti. Stigm. capitatum. W. h

3. *parviflora*, fol. ellipticis obtusiusculis, staminibus longitudine tubi cor. dentibus calycinis brevissimis subrotundis. Willd. p. 929. Roxb. corom. 1. p. 40. t. 52. Hab. in India orientali. Stigma cylindraceo-capitatum. W. h

4. *africana*, fol. oblongo-ovatis acuminatis, stam. tubo cor. longioribus reflexis, dentibus calycinis brevissimis subrotundis. Willd. *Uncaria inermis*. Willd. in *Usteri* delect. 2. p. 199. t. 3. Hab. in Guinea. h

5. *aculeata*, fol. ovatis acutis, caule aculeato. Willd. *Uncaria aculeata*. Willd. in *Usteri* delect. 2. p. 200. N. *gujanensis*, spinis aduncis, capit. subternatis. Enc. bot. 4. p. 436. t. 153. f. 2. *Ourouparia gujanensis*, Aubl. guj. 1. p. 177. t. 68. Hab. in sylvis Gujanae. Caulis tetragonus aculeis magnis oppositis recurvato-uncinatis obsitus. W. h

6. *cordifolia*, fol. subrotundo-cordatis, capitulis pedunculatis axillaribus. Willd. Roxb. corom. 1. p. 40. t. 53. Habit. in montosis Indiae orientalis. Stigma clavatum. h

*Obs.* Totum genus a *Cephalantho* vix nisi numero diversum. W.

451. *CANEPHORA*. *Cal.* communis tubulosus, multiflorus: *Proprius* 5-fidus. *Cor.* campanulata subaequalis. *Caps.* coronata, 2-locularis.

1. *axillaris*, fol. subrotundo-ovatis, flor. solitariis axillaribus. Willd. Sp. pl. 2. p. 976. Lam. ill. gen. t. 151. f. 1. Hab. in Madagascar.

2. *capitata*, fol. lanceolatis, floribus terminalibus aggregatis. Willd. l. c. Lam. t. 151. f. 2. Cum priore.

452. *CEPHÆLIS*. *Flor.* capitati involucrati. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* tubulosa. *Stigma* 2-partitum. *Bacca* disperma. *Receptaculum* paleaceum. *Invol.* 1-5-polyphyllum.

1. *violacea*, capitulis globosis terminalibus, involucri pentaphyllo, fol. nervosis glabris. Swartz. Flor. ind. occ. 1. p. 439. Willd. p. 977. Aubl. t. 60. Hab. in Gujana et India occident. h

2. *tomentosa*, hirsuta, capitulis pedunculatis axillaribus terminalibusque, involucri diphylis cordatis acuminatis. Vahl. eclog. 1. p. 19. *Tapogomea*. Aubl. guj. 1. p. 160. t. 6. Hab. in sylvis Gujanae, inque insula Trinitatis. h

3. *punicea*, glaberrima, capitulis terminalibus erectis, involucri diphylis. Vahl. eclog. 1. p. 19. Hab. in Jamaica. h

4. *elata*, capit. globosis terminalibus, pedunc. elongatis, involucri diphyllo, fol. glabris. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 437. (In montibus Jamaicae australis. Involucrum 2-phyllum: foliol. magnis. h

5. *axillaris*, capit. axillaribus sessilibus. Swartz. l. c. p. 441. Hab. in insula St. Christophori. h

6. *purpurea*, capit. terminalibus nudis, fol. oblongis pictis subtus villosis, caule repente tomentoso. Willd. p. 978. *Tapogomea purpurea*. Aubl. guj. 1. p. 162. t. 63. f. 3. Habit. in sylvis remotis Gujanae. h

7. *alba*, capitulis terminalibus nudis, foliis ovatis subtus pubescentibus, caule repente glabro. Willd. Aubl. l. c. t. 62. f. 4. Hab. in sylvis remotis Gujanae.

8. *glabra*, capitulis terminalibus nudis, fol. oblongis glabris, caul. erectis, ramulis villosis. Willd. p. 979. Aubl. p. 162. t. 63. Hab. in Gujana. h

9? *involucrata*, (*carapichea*), capit. terminalibus globosis, involucri tetraphyllo inaequali, fol. oblongis acuminatis. Willd. *Carapichea gujanensis*. Aubl. guj. 1. p. 168. t. 64. Hab. in sylvis ad ripas Gujanae. Stam. exserta et fruct. capsularis. An distincti generis?

10. *sessiliflora*, (*Patabea*), capitulis terminalibus globosis sessilibus nudis, flor. tetrandris. Willd. l. c. *Patabea coccinea*. Aubl. guj. 1. p. 110. t. 43.

11. *muscosa*, capitulis subrotundis subsessilib. terminalib., paleis dentatis. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 442. *Morinda muscosa*. Jacq. amer. p. 65. t. 45. Habit. in Martinicae sylvis montium et ad fluviorum ripas. h

12. *dubalina*, capitulis terminalib. pedunculatis, fol. oblongis glabris. Linn. suppl. sub *Lonicera*. Hab. ad Cap. b. spei. *Cal.* hirtus dentibus recurvis. *Cor.* hirta *Symphiti*.

*Obs.* Ob affinitatem, quae secundum ill. Jussieu, (vid. Ej. gen. pl.), extat inter hanc et antecedentem plantam, forte genere a

*Cephaelibus separandam*, sub hoc genere militet, donec accuratius inquisita sit; saltem non *Lonicera* est.

13. *emetica*, herbacea procumbens, fol. lanceolatis glabris capitulis axillarib. pedunculatis paucifloris. Lin. suppl. p. 144. sub *Psychotria*. Willd. Sp. pl. 2. p. 968.

*Obs.* Haec species in Act. Soc. Linn. Lond. v. 6. p. 137. t. VI. sub peculiari genere: *Callicocca* proposita, secundum observationes cl. Richardi hac potius pertinet.

453. *BERTIERA*. *Cor.* 5-fida. *Stigma* 2-lamellatum. *Bacca* 2-locularis polysperma.

1. *guyanensis*. Vahl. symb. 3. p. 33. Aubl. guj. 1. p. 180. t. 69. Lam. ill. t. 165. Hab. in sylvis Gujanae et Cajennae. Frutex ramis tomentosis. Flor. paniculati. h

454. *DUHAMELIA*. *Cor.* 5-fida. *Bacca* 5-locularis, infera, polysperma. (Racemi partiti: flor. secundis.)

1. *patens*, ramis sulcatis, fol. 3-4-oblongo-lanceolatis pubescentibus, floribus cymosis secundis. Flor. Per. 2. p. 68. t. 221. f. a. Jacq. amer. pict. p. 39. t. 72. Lam. enc. 3. p. 65. Willd. Sp. 2. p. 980. Hab. in sepibus montosis Hispaniolae et in Peruviae Andium nemoribus ac in Pozuzo versuris. Cal. ruber. h

2. *sphaerocarpa*, ramis teretibus, fol. ternis oblongis utrinque hirsutis, florib. subcorymbosis. Flor. Per. l. c. t. 221. f. b. Cresc. in Peruviae nemoribus. Corolla croceo-purpurea. h

3. *axillaris*, subherbacea, racemis axillaribus, flor. subsecundis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 443. Hab. in Jamaicae, Hispaniolae fruticetis saxosis juxta rivos. h

4. *Chrysantha*, racemis terminalibus, fol. oblongis cuneatis acuminatis glaberrimis, flor. pedicellatis. Swartz. l. c. p. 444. Jacq. ic. rar. 2. t. 335. Plum. amer. 22. t. 218. f. 1. In fruticetis montosis Jamaicae occid. et ad Caracas.

5. *ventricosa*, racemis terminalibus axillaribusque, cor. campanulatis ventricosis, fol. ternis. Swartz. p. 446. Ham. grandiflora. L'Her. sert. angl. 4. t. 7. Hab. in Jamaicae collibus et fruticetis aridis. h

6. *glabra*, fol. utrinque glabris, fructibus congestis sessilibus. Lam. enc. 3. p.

65. *Amajoua gujanensis*. Aubl. guj. 2. sup. 13. t. 375. Hab. in sylvis Gujanae. h

455. *SABICEA*. *Involucrum* 2-4-phyllum. *Cor.* hypocraterif. 5-infundibulif. *Stigma* 5-partitum. *Bacca* 5-locularis, polysperma. (Numerus partium passim quaternarius.)

1. *hirta*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, flor. pedunculatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 450. Schwenkfeldia. Willd. Sp. 2. p. 982. Hab. in Jamaica. h

2. *cinerea*, fol. oblongis acutis tomentosis, subtus incanis, flor. subsessilibus. Swartz. p. 452. Aubl. guj. 1. p. 192. t. 75. Habit. in sepibus Cajennae, Gujanae. h

3. *aspera*, caule volubili, fol. ovatis acutis asperis subtus villosis. Aubl. guj. 1. p. 197. t. 76. Hab. in Gujana ad fluviorum ripas. h

4. *umbellata*, fol. ovatis acutis, pedunc. axillaribus umbellatis. Flor. Per. 2. p. 55. t. 200. f. a. sub Schwenkfeldia. Hab. in Andium nemoribus. Suffruticosa volubilis, subhispida. *Bacca* hirsuta, albicans.

5. *diversifolia*, fol. altero minimo, flor. axillaribus conglomeratis. Peculiaris haec species detecta in insula Mauritania Dom. Aubert. Fol. majus late ovatum obtusum minus primo obtutu bracteaeforme, ita ut folia alterna videantur.

456. *RONDELETIA*. *Cor.* infundibuliformis, tubo apice subventricoso, laciniis subrotundis planiusculis. *Caps.* subrotunda, coronata, 2-locularis. *Sem.* plura aut solitaria.

\* *Seminibus pluribus.*

1. *americana*, (*dichotoma*), foliis sessilibus, panic. dichotoma. Lin. Willd. Sp. 2. p. 930. Plum. gen. ic. 142. f. 1. Lam. ill. t. 162. f. 1. Hab. ut omnes fere sequentes in Amer. merid.

2. *odorata*, foliis petiolatis subovatis obtusis. L. Jam. amer. edit. picta. t. 61. Hab. in Amer. rupestribus ventricosis, maritimis. Flor. pulchri miniat, violam redolentes. In quibusdam Linnæi operib. haec species errore typographico *obovata* audit.

3. *trifoliata*, fol. ternis, subtus to-

mentosis. Jacq. amer. 60. t. 43. ed. picta. t. 62. Ehret. pict. t. 15. Hab. in Amer. Fruct. adhuc observandus.

4. *virgata*, foliis subrotundis, ramis filiformibus patentibus, pedunc. trifidis, flor. ternis confertis tetrandris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 354. Hab. in fruticetis maritimis Hispaniolae. h

5. *pilosa*, fol. ovatis utrinque pilosis, pedunc. axillaribus fol. brevioribus trifidis, floribus tetrandris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 356. R. triflora. Vahl. symb. 3. p. 34. t. 54. Hab. in ins. St. Crucis et Montserrat. h

6. *buxifolia*, fol. obovatis glabris, flor. tetrandris axillaribus solitariis. Vahl. eclog. amer. Fasc. 2. t. 12. Hab. in ins. Montserrat.

\* *Seminibus subsolitariis.*

7. *thyrsioidea*, fol. oblongis acutis membranaceis subtus pubescentibus, thyrsis axillaribus. Swartz. l. c. p. 358. Hab. in collibus aridissimis Jamaicae. h

8. *racemosa*, fol. lanceolato-ovatis acuminatis utrinque glabris, stipulis ellipticis acuminis brevi, racemis axillaribus dichotomis patulis. Swartz. Fl. p. 360. Brown. jam. 143. t. 2. f. 3. Hab. in Jamaicae sylvestrib. montium. R. thyrsioidea et laurifoliae proxima. Sw. h

9. *laurifolia*, fol. lanceolato-oblongis acutis utrinque glabris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. Brown. jam. 143. t. 2. f. 2. Hab. in fruticetis Jamaicae. h

10. *tomentosa*, fol. ovatis acuminatis tomentosis, pedunc. tripartitis axillaribus brevibus. Swartz. l. c. Petesia stipularis. Lin? Hab. in Jamaicae collibus petrosis umbrosis. h

11. *umbellulata*, fol. lanceolato-ovatis acutis subhirsutis, pedunc. axillar. apice trichotomis, flor. subumbellatis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 367. Hab. in Jamaic. rupibus petrosis juxta fluvios. h

12. *incana*, fol. ovato-lanceolatis subto-incanis scabris, pedunc. axillar. simplicibus trifloris. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 369. Hab. rarius in Jamaicae montibus petrosis calcareis. h

13. *hirsuta*, fol. oblongis acutis hirsutis, pedunc. axillar. dichotomis laevis, flor. hirsutis. Swartz. Hab. in fruticetis montium Jam. austr. h

14. *hirta*, fol. oblongis acuminatis hirsutis

rigidis subtus nervosis, pedunc. axillaribus trichotomis erectis. Swartz. Ait. Kew. 1. p. 227. Hab. in fruticetis montosis Jamaicae priore. h

*Obs.* Quae in hac subdivisione enumeratae sunt species, ulterius examinandae sunt, quarum nonnullae hujus generis haud videntur.

457. **MACROCNEMUM.** *Cal.* campanulato-cyathiformis. *Cor.* campanul. aut infundibuliformis. *Caps.* 2-locularis. *Sem.* imbricata.

1. *jamaicense*, corymbis axillaribus elongatis nudis. Willd. Spec. 2. p. 933. Swartz. obs. 68. t. 3. f. 1. Hab. in Jamaicae austr. locis umbrosis ad rivulorum ripas. h

2. *candidissimum*, corymbis terminalibus brevibus paucifloris bracteatis, bracteis coloratis subrotundis. Willd. p. 934. Vahl. symb. 2. p. 38. t. 30. Habit. in vicinia St. Marthae. h

3. *coccineum*, panicula terminali elongata bracteata, bracteis longissimis coloratis. Willd. Vahl. symbol. 2. p. 38. t. 29. Hab. in ins. Trinitatis Americae. h

4. *corymbosum*, fol. ovato-oblongis basi excavatis carinatis rugosis sessilibus corymb. magnis. Flor. Peruv. 2. p. 48. t. 189. Hab. in Andium collib. *Cor.* crassa. *Caps.* fusco-purpureae. tandem atra.

*Obs.* Quamvis cortex hujus speciei parum amarus sit, collectores tamen Cinchonarum cortici illum admiscere solent, quae fraus facile dignosci potest, cum cortex Macrocnemi intus albus sit, et sapore amariuscule viscido gaudeat. Flor. Per. p. 48.

5. *microcarpon*, foliis oblongis obtuse acuminatis subtus pubescentibus, racemis terminalibus, flor. congestis sessilibus. Fl. Per. 2. p. 48. t. 188. Habit. in Chincho et Cuchero nemoribus imis, calidis. *Cor.* laciniae reflexae.

6. *venosum*, fol. oblongis acuminatis venosissimis lineatis, nervo venisque pubescentibus, racemis terminalibus. Flor. Per. l. c. t. 119. f. 6. In Peruv. nemoribus calidis. Stipulae strictae rubae.

*Obs.* Tres haec Peruviae species a characterere generico parum differre videntur.

458. **NONATELIA.** *Cal.* 5-dentatus,

*Cor. tubulosa. Bacca striata, 5-locularis, 5-sperma.*

1. *racemosa*. Aubl. guj. p. 186. t. 72. Oribasia. Schreb. Psychotria. Willd. Spec. 2. p. 666. Hab. in sylvis Gujanæ. Ceteræ Nonatliæ Aubletii alius sunt generis. h

459. VANGUIERA. *Cor. campanulato-globosa, fauce pilosa. Stigma 2-lamellatum. Bacca pomiformis, 4-5-locularis, 4-5-sperma.*

1. *edulis*. Vahl. symb. 3. p. 36. et in Acr. Soc. Hafn. 1. p. 208. t. 7. Juss. gen. pl. 229. Lam. ill. t. 159. Willd. Sp. 2. p. 976. Hab. in India. Arb. Flor. corymboso-cymosi. Sem. amygdalina. J.

460. DENTELLA. *Cal. 5-partitus, superus. Cor. infundibuliformis laciniis tridentatis. Caps. 2-locularis polysperma.*

1. *repens*. Forst. prod. n.º 98. Lam. ill. t. 118. Oldenlandia repens, caps. subsessilib. hispidis, fol. lanceolatis. Lam. mant. 40. Burm. ind. 38. t. 15. f. 2. Rumph. 6. t. 170. f. 4. Hab. in India orientali et Nova Caledonia. Caps. undique pilis obtusis cavis pellucidis obiecta. Lin.

461. SERISSA. *Cor. infundibuliformis, fauce ciliata, limbi laciniis subtrilobis. Bacca 2-sperma.*

1. *foetida*. Willd. Sp. 2. p. 1061. Lycium japonicum. Thunb. t. 17. L. foetidum. Lin. suppl. p. 150. Hab. in India, Japonia. Fol. venosa. Cor. alba. In India in hortis Buxi ad instar adhibetur.

462. SIPANEA. *Cal. 5-partitus. Cor. infundibuliformis, 5-loba. Caps. coronata, 2-locularis, 2-partibilis, polysperma.*

1. *pratensis*. Aubl. guj. 1. p. 148. t. 56. Lam. ill. t. 151. Virectia pratensis. Vahl. Eclog. Amer. 2. Hab. in Guiana.

463. VIRECTA. *Cal. 5-dentatus: dentibus interjectis. Cor. infundibuliformis. Stigma bipartitum. Caps. 1-locularis, polysperma.*

1. *biflora*, fol. ovatis, pedunc. bifloris. Lin. suppl. 134. Vahl. symb. 2. p. 38. Ejusd. ecl. 2. W. Sp. 2. p. 972. Rondeletia biflora, caule filiformi repente, pedunc. biflor. Roth. Descr. pl. rar. Surinam. p. 7. t. 2. f. 2. Hab. in Surinami subhumidis. Herba te-

nera Mercurialis annua. Corolla rubescens: ore albo. Lin. ©

464. SOLENA. *Cal. 5-fidus superus. Cor. hypocrateriformis, tubo longissimo, fauce pilosa. Style filiformis. Stigma trifidum. Bacca unilocularis, polysperma. (Cyrthantus. Schreb.)*

1. *longiflora*. Willd. Sp. 2. p. 961. Posoqueria longiflora. Aubl. guj. 1. p. 134. t. 51. Lam. ill. t. 163. Hab. ad ripas fluviorum Gujanæ. Flor. corymbosi. Cor. albae nutantes. h

465. UCRIANA. *Cal. 5-dentatus superus. Cor. hypocrateriformis: tubo longissimo, fauce ventricosa nuda. Antheræ sessiles. Styl. clavatus pilosus. Stigma 2-lamellatum. Bacca 2-locularis, polysperma.*

1. *speciosa*. Willd. l. c. Tocoyena longiflora. Aubl. guj. 1. p. 131. t. 50. Hab. in sylvis Gujanæ. Fl. terminales capitati. h

466. PSYCHOTRIA. *Cal. 5-dentatus, coronans. Cor. infundibuliformis. Bacca? globosa aut ovalis. Sem. 2, sulcata, ossea.*

\* *Cor. tubo tereti recto.*

1. *asiatica*, stipulis emarginatis, fol. lanceolatis ovatis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 961. Jacq. amer. Hab. in India. h

2. *glabrata*, stipulis acutis indivisis deciduis, fol. ovatis glaberrimis nitidis, flor. paniculatis erectis. Swartz. flor. ind. occ. 1. p. 350. Hab. in Jamaicae rupibus. h

3? *axillaris*, stipulis acutis indivisis, fol. ovatis acutis, flor. axillaribus. Willd. l. c. p. 662. Ronabea latifolia, caul. flexuosis, fol. ovatis acutis viridibus et caeruleo variegatis, fructu nigricante striato. Aubl. guj. 1. p. 154. t. 59. Lam. ill. t. 166.

β. R. erecta, caul. tenuiorib. fol. ovatis acutis tenuioribus, fol. minoribus et luteo virentibus. Hab. in sylvis Gujanæ. A reliquis habitu diversa, et florib. axillaribus distincta. Willd. Sem. hiuc plana, inde convexa. Aubl. h

4. *laurifolia*, stipulis ovatis acuminatis deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis crassiusculis glabris, panic. erectis, bacis subrotundis. Swartz. fl. ind. occid. 1. p. 392. Hab. in Jamaicae, Hispaniolæ fruticetis aridis. h

5. *parviflora*, stipulis ovatis cuspidatis deciduis, fol. elliptico-ovatis acuminatis parallelo-venosis, panic. erectis, baccis ovalib. Willd. l. c. Simira tinctoria. Aubl. guj. 1. p. 170. t. 65. Hab. in sylvis Gujanæ. Cortex ad pannos sericeos et gossypinos rubro colore tingendos adhibetur. h

6. *hirsuta*, stipulis lanceolatis integris deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis hirtis, caule hirsutissimo, panic. patente. Sw. l. c. p. 394. Hab. in australis Jamaicae sylvis vetustis. h

7. *foetens*, stipulis acuminatis integris deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis glabris, panic. patentissima, ramis reflexis filiformibus. Swartz. l. c. p. 366. Cum priore. Olore foetido subacido ex ramis fractis, folisque contusis distinguitur. Sw.

8. *citrifolia*, stipulis ovatis persistentibus, fol. ellipticis acuminatis subcoriaceis, panic. brevibus, baccis oblongis costatis. Swartz. p. 368. Hab. in Ind. occid. h

9. *nitida*, stipulis subrotundis deciduis, fol. subrotundo-ovatis acuminatis, panic. terminali, cor. limbo tubo longiore. W. Mapouria gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 175. t. 67. Hab. in ripis fluviorum Gujan. h

10. *marginata*, stipulis integris acuminatis deciduis, fol. lanceolato-ovatis acutis margine cartilagineo-setosis, panic. laxa. Swartz. l. c. p. 400. Brown. jam. 161. n. 6. Hab. in sylvestribus Jamaicae australis. h

11. *tenuifolia*, stipulis ovatis emarginatis deciduis, fol. oblongis acutis tenuioribus glabris, panic. erectis subsessilibus. Swartz. p. 402. Hab. in fruticetis Hispaniolæ. h

12. *nervosa*, stipulis oblongis emarginatis deciduis, fol. ovatis utrinque acuminatis nervosis (venosis) subundulatis, panic. sessilibus erectiusculis. Swartz. p. 403. Hab. in fruticetis Jamaicae. Fol. non sunt nervosa, sed venosa, venis prominentibus. Willd. p. 964. h

13. *carthaginensis*, stipulis emarginatis, fol. obovatis acuminatis, panic. terminali. Willd. p. 964. Jacq. amer. p. 65. t. 174. l. 22. EA. picta. t. 260. Hab. in Carthagenæ fruticetis. h +

14. *Myrtiphyllum*, stipulis ovatis deciduis, fol. lanceolato-ovatis enerviis nitidis rigidis, ramis secundis, racemis compositis terminalibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 405. et 406. Brown. jam. 152. Hab. in Jamaicae fruticetis aridis. Vere. Facie a ceteris diversa. Bacca immatura dura

2-locularis est, demum succosa. dissepimento evanescente. Sw. An potius Myrtiphyllum dicendum?

15. *laxa*, stipulis ovatis acutis deciduis, fol. ovatis acuminatis, racemis ternis terminalibus trichotomis, ramis pedicellisq. subcapillaribus laxis. Swartz. p. 407. Ha! it. in fruticetis montium Jamaicae. h

16. *parasitica*, stipulis amplexicaulib. retusis, fol. ovatis acuminatis: aveniis subsucculentis, racemis terminalibus axillaribusq. compositis. Swartz. p. 408. Viscoides pendulum. Jacq. amer. 71. t. 51. f. 1. An hujus generis? Habit. in Martinica, Dominica, Guadeloupe, etc. h

17. *horizontalis*, stipulis ovatis, foliis lanceolato-ovatis acutis, ramis fol. ramulisq. panicularum horizontalibus. Swartz. p. 410. Habit. in Hispaniolæ locis apricis cretaceis. h

18. *nutans*, stipulis bidentatis, fol. lanceolatis acutis nervosis, racemis tripartitis erectis, fructiferis nutantibus. Swartz. p. 411. Habit. in Hispaniolæ collibus aridis solo cretaceo. h

19. *speciosa*, arborea, fol. oblongo-lanceolatis, involuero terminali subtrifloro. Forst. prod. n. 789. Hab. in ins. Tahiti. h

20. *flexuosa*, stipulis bidentatis, foliis ovatis utrinque attenuatis, panic. divaricata flexuosa. Willd. p. 966. Nonatelia paniculata. Aubl. guj. 1. p. 184. t. 70. f. 2. Habit. in Cajennæ locis sterilibus. h

21. *racemosa*, stipulis bilobis, fol. oblongis acuminatis, racemo terminali simplici, flor. involucreatis. Willd. l. c. Aubl. guj. 1. p. 186. t. 72. sub Nonatelia. Hab. in sylvis Gujanæ. h

22. *violacea*, stipulis oblongis obtusis deciduis, fol. oblongis acuminatis, flor. paniculato-corymbosis involucreatis. Willd. Nonatelia. Aubl. guj. 1. p. 188. t. 73. Ha! in sylvis Gujanæ. h

23. *capitata*, fol. oblongis acuminatis, stipulis bifidis, florib. capitatis sessilibus bracteis obvallatis. Flor. Per. 2. p. 59. t. 206. f. a. Hab. uti omnes sequentes spec. Peruvianæ in Andium nemoribus.

24. *pilosa*, fol. oblongo-ovatis acutis pilosis, flor. terminalibus verticillato-cymosis, bracteis pilosis cinctis. Flor. Per. p. 60. t. 208. f. a. Bac. caeruleæ. Inflorescentia Asperulam quandam refert.

25. *subtomentosa*, fol. lanceolato-oblongis, stipul. liffidis acutis, pedunc. ter-

minalibus trifidis, flor. capitatis bracteis cinctis. Flor. Per. 2. p. 61. t. 210. Flor. sessiles caerulei.

26. *brachiata*, stipul. ovatis bifidis, racemo terminali composito, ramis brachiatis, flor. aggregatis sessilibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 415. Hab. in montibus altis Jamaicae australis. h

27. *grandis*, stipul. deltoideis margine revolutis apice subulatis, fol. cuneiformib. obovatis, caule angulato. Swartz. p. Flor. ind. occ. 4:7. Habit. in fruticetis montosis Jamaicae interioris occidentalis. h

28. *patens*, stipul. bidentatis, fol. distichis lanceolato-ovatis membranaceis, ramis patentibus, panic. secundis. Swartz. p. 419. Hab. in montibus altis Jamaicae praesertim in montibus caeruleis. An diversa a n°. 21? h

29. *uliginosa*, stipul. connatis acutis convexis, fol. lanceolato-oblongis, semin. compressis cristatis, caule subherbaceo simplici erecto. Swartz. p. 421. Hab. in Jam. depressis subhumidis montium. h

30. *serpens*, caule subherbaceo repente, fol. ovatis utrinque acutis. Lin. Mant. 204. Hab. in India orient. Similis Ps. herbaceae. Stipulae subrotundae. h

31. *herbacea (sylvana)*, caule herbaceo repente, fol. cordatis petiolatis, pedunc. axillaribus 3-4-floris. Lin. Willd. Sp. 2. p. 987. Jacq. amer. t. 46. Ed. pict. t. 67. Hab. copiose in umbris uliginosis. Per stolones plures proferens plantulas, ita ut tandem eandem sylvula quasi exsurgat. Bacca rui ra. Jacq.

32. *macropoda*, caule herbaceo repente, fol. cordatis acutis glabris, stipul. ovatis, umbellulis 3-6-floris, seminib. laevib. Flor. Per. 2. p. 61. t. 211. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. Priori valde affinis. Bacca atro-purpurea.

33. *gracilis*, fol. cordatis acutis supra pilosisculis, stipulis ovatis, umb. 6-9-floris, seminib. sulcatis. Flor. Per. 1. c. f. a. Cum priore. Cor. dilate violaceae. P. violaceae. Aubl. affinis dicitur.

Obs. Species illae herbaceae, repentes, habitu nimis a ceteris recedunt, forte hinc ut peculiare genus sejungendae.

34. *corymbosa*, stipulis bidentatis, fol. lanceolato-ovatis acutis subrigidis nitidis, flor. subcorymbosis, pedunc. pedicellisque coloratis. Swartz. p. 423. Hab. in montib. excelsis Jamaicae. h

35. *pubescens*, stipul. bidentatis, fol.

lanceolato-ovatis acuminatis pubescentib. panic. cymosis patentibus. Swartz. p. 425. Habit. in sepibus ruderalisque Jamaicae vulgaris. h

36. *pedunculata*, stipul. bidentatis, fol. ovato-lanceolatis rugosiusculis, flor. subcymosis, pedunc. communi elongato. Swartz. p. 427. Brown. jam. p. 160 n°. 4. Hab. in sylvis montosis Jamaicae. h

37. *alpina*, stipul. bidentatis, fol. lanceolato-ovatis membranaceis reticula o-venosis, panic. erectis, cor. elongatis diaphanis. Swartz. p. 431. Habit. in montib. caeruleis Jamaicae australis. h

38? *paniculata*, stipulis bidentatis, fol. ovatis, panic. erecta, caule arboreo, W. Sp. p. 970. Chlorococca paniculata. Linn. suppl. 145. Hab. in Surinamo et Amer. merid. h

39. *macrophylla*, fol. oblongo-lanceolatis amplis, stipul. unidentatis, racemis axillarib. subdichotomis. Flor. Per. 2. p. 56. t. 202. Stipulae semialexicaules, internis ad basin glandulis minimis obtectae.

40. *reticulata*, fol. oblongo-lanceolatis venoso-reticulatis, stipulis bidentatis: dentibus subulatis, racem. terminalib. brachiatis. Fl. Per. 1. c. Corol. lutea extus pubescens.

41. *amethystina*, fol. oblongis acuminatis, stipul. vaginantib. quadridentatis, racemis terminalibus, cor. haccisque amethystinis. l. c. p. 57. t. 203. Stipul. ad basin singuli denticuli glandulae 7.

42. *macrobotrys*, fol. lanceolatis pubesc. longis, stipul. bidentatis racemis terminalib. longissimis. p. 57. t. 203. f. a. Stipulis interioribus ad basin denticulorum glandulis numerosis. Cor. lutea pubescens.

43. *thyrsiflora*, fol. lanceolatis glabris, stipulis vaginantibus sexidentatis, thyrsis terminalib. Flor. Per. p. 57. t. 214. Stipulae denticulus intermedius ovatus ciliatus. Cor. lutea, tubulosa.

44. *obovata*, fol. obovatis acuminatis amplis, stipul. emarginatis, thyrsis terminalibus, cor. tubulosis. l. c. p. 58. t. 204. f. a. Cor. purpurea, intus villosa. Pedunc. bracteis reflexis stipati.

45. *sulphurea*, fol. obovato-cuneiformibus acuminatis, stipul. emarginatis, racemo paniculato, cor. infundibuliformib. l. c. t. 205. f. a. Planta amarissima, tincturam luteam praestantissimam praestat ideoque ab incolis hunc in finem adhibetur. An Falcouria?

46. *alba*, fol. lanceolatis, stipulis ob-  
ovatis integerrimis striatis deciduis, racemo  
paniculato, cor. baccisque albis. Fl. Peruv.  
3. t. 205. f. a.

47. *cymosa*, fol. oblongo-lanceolatis  
acutis utrinque bilobatis, cymis termi-  
nalibus, cal. 5-partitis longis. l. c. t. 206.  
f. a. Cor. violaceo-purpurea. Tub prope  
basin villosus.

48. *villosa*, fol. oblongo-ovatis hirsutis  
stipul. ovatis acutis deciduis, panic. race-  
mosa brachiata. p. 59. t. 207. f. a. Bacca  
rubra, globosa. An eadem ac *P. hirsuta*.

49. *foveolata*, fol. lanceolatis subtus  
ad apicem nervi forcolis quatuor, stipul.  
ovatis calucis, panicul. fructus cernua.  
t. 207. f. b. Flor. sessilibus 3-5-approxi-  
mati. Cor. parva, albo-lutea.

50. *mitis*, fol. lanceolatis supra miti-  
bus (?) subtus glabris, stipul. annula-  
ribus emarginatis, racemis subpaniculatis  
terminalibus. Fl. Per. p. 60. t. 208. Cor.  
infundibuliformibus lutea.

51. *virgata*, foliis oblongis acuminatis  
coriaceis venosissimis, stipul. bilobis pro-  
funde emarginatis, corymb. terminalibus,  
flor. sessilibus congestis. Tab. 209. Cor.  
infundibuliformis, sulphurea.

52. *trifida*, fol. lanceolatis acuminatis,  
stipul. bifidis acutis, pedunc. axillaribus  
terminalibusque trifidis trifloris. Tab. 209.  
f. b. Bacca nigra, umbilicata, subrotundo-  
turbinata.

53. *repanda*, fol. lanceolatis repandis,  
stipul. lanceolatis ciliatis, pedunc. panicu-  
lato-racemosis, flor. sessilib. Pag. 61. Cor.  
minima, lutea. Bacca purpurea.

**PALICOURIAE.** *Cor. tubo basi hinc gibbo  
obliquo aut subincurvo. Flor. colore  
ut plurimum lutei, passim caerule-  
scentes.*

54. *crocea*, fol. ovatis acutis nervosis,  
panic. erectis pedunculisque croceo-colo-  
ratis. Swartz. Flor. ind. occid. t. p. 429.  
Willd. Sp. 2. p. 669 Brown. jam. t. 21.  
f. 1. 2. quoad flores. Hab. in Americae  
fruticetis subtomentosis.

55. *Palicourea*, stipul. bilobis, fol. lato-  
ovatis utrinque acuminatis, panic. erectis,  
cor. cylindraceis ventricosis subcurvis extus  
furniosis. Swartz. l. c. p. 433. Palicourea  
guyanensis. Aubl. l. p. 173. t. 66. Step-  
hanium Schreber. Hab. in sylvis.

56. *lutea*, fol. lato-ovatis acuminatis,  
cor. tubo longo, laciniis acutis. Willd.

p. 971. Nonatelia Aubl. p. 190. t. 79. Cum  
priori in Gujana.

57. *longiflora*, fol. ovato-lanceolatis,  
stipul. bilobis, cor. tubi incurvo, lacini.  
obtusiusculis. Willd. Aubl. t. 71. sub No-  
natelia. Hab. in Gujanae sylvia.

58. *hyacinthoides*, fol. obovatis acumi-  
natis amplis, stipul. bifidis, racem. com-  
positis purpureis. Flor. Peruv. 2. p. 62. t.  
213. f. a. P. hyacinthiflora. Pedunc. patulo-  
reflexi.

59. *caerulea*, fol. lanceolatis acumi-  
natis, stipul. ovatis, racem. terminalibus,  
flor. aggregatis. Flor. Per. l. c. Cor. lutes-  
cens: limbo revoluta. Bacca caerulea.

60. *tinctoria*, fol. oblongis acuminatis,  
foveolis ad basin venarum, stipul. lanceo-  
latis, racem. brevib. brachiatis. Fl. Per. 2.  
p. 62. t. 211. Cor. albo-luteove rubescens.

61. *luteo-virescens*, fol. oblongis acu-  
minatis, stipul. bifidis, paniculis laxis,  
bract. longis reflexis. P. laxa. Flor. Per. 2.  
p. 61. t. 212. f. b. Cor. tenuis, luteo-vi-  
rescens. Bacca subdulyma.

62. *viridis*, fol. oblongis acuminatis  
dorso foveolatis, stipul. lanceolatis, racem.  
subpaniculatis. Flor. Per. l. c. t. 210. f. b.  
Cor. parva viridis. Sem. hinc convexa 5-  
sulca, inde plana laevia.

**Obs.** Quamvis auctores operis allegati  
cor. obliquae aut incurvae nullam in des-  
criptionibus fecerint mentionem, tamen  
ex iconibus hoc divinare potest.

467. **COFFEA.** *Cal. ceresens, 5-  
dentatus: dentibus deciduis. Cor.  
hypocrateriformis. Stam. supra  
tubum. Anth. sagittatae. Bacca  
infera, disperma. Sem. arillata,  
hinc convexa, inde plana.*

1. *sambucina*, fol. oblongo-lanceolatis  
acutis, cymis corymbosis terminalibus.  
Forst. prod. n. 92. Willd. Sp. 2. p. 973.  
Hab. in ins. Amicorum. h

2. *opulina*, fol. ovato-lanceolatis, co-  
rymb. coarctatis globosis terminalib. Forst.  
prod. n. 93. In N. Caledonia. h

3. *odorata*, fol. ovatis acutis, cymis  
corymbosis axillaribus. Forst. l. c. Hab.  
in ins. Tanna et in ins. Amicorum. h

4. *arabica*, fol. oblongo-ovatis acumi-  
natis, pedunc. axillarib. aggregatis, cor.  
quinquefidis. W. l. c. Blackw. t. 337. Juss.  
act. 1713. p. 388. t. 7. Habit. in Arabia  
felici.

5. *mauritiana*



5. *mauritiana*, baccis oblongis basi acutis dispersis. Lam. enc. 1. p. 5. t. 160. f. 2. Hab. in ins. Borbonia.

6. *risflora*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, pedunc. terminalib. ternis unifloris. Forst. prod. n.º 95. Hab. in insula Tabiti. h

7. *guyanensis*, fol. lanceolatis, pedunc. axillaribus aggregatis, corol. quadrifidis. Willd. baccis exiguis. Aubl. guj. p. 150. t. 57. Hab. in sylvis Gujanæ. h

8. *paniculata*, fol. oblongis acuminatis, panic. terminali divaricata, cor. quadrifidis, ramis tetragonis. Willd. Aubl. t. 58. Hab. in sylvis Gujanæ. h

9. *racemosa*, fol. oblongo-ovalib. acuminatis, stipul. bifidis, racemis axillarib. terminalibusque (sub anthesi) nutantibus. Flor. Peruv. 2. p. 64. t. 214. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus Pati et Mácora.

10. *umbellata*, fol. oblongis acuminatis; venis transversalibus (nervosis), stipul. subrotundis, florib. congestis umbellatis. Flor. Per. 2. p. 66. t. 215. f. a. Cresc. in Andium nemoribus. Involucr. universale 4-phyllum, parziale 7-phyllum.

11. *ciliata*, fol. oblongis acuminatis, stipul. truncatis ciliis obvallatis, racemis terminalibus. Fl. Per. l. c. t. 216. f. a. Hab. in Peruviae Andium nemoribus.

Obs. Plures flores, huic quadrifidi, tetrandri sunt.

12. *verticillata*, fol. oblongo-lanceolatis obovatisque acuminatis, stipul. ovatis ciliatis, racemis terminalibus verticillatis. Flor. Per. 2. p. 66. t. 217. f. b. Cor. fauce villosa. Cal. ciliatus.

13. *nitida*, fol. oblongis, obtuse acuminatis nitidis, stipul. truncatis ciliatis, racemis terminalibus. Flor. Peruv. 2. p. 66. t. 217. f. a.

14. *foveolata*, fol. oblongo-ovalibus acute acuminatis, foveolis ad basin venarum, stipul. ovatis, racem. terminalib. Flor. Per. l. c. t. 216. Pedunc. brachiato-decussati. Cor. fauce hirsuta.

15. *longifolia*, fol. lanceolato-oblongis undulato-repandis, stipulis ovatis, racem. terminalibus ternis. Flor. Per. 2. p. 66. t. 218. f. a. Stipul. in vaginæ formam connatae. Cor. lacin. reflexae.

16. *microcarpa*, fol. lanceolatis acutis, stipul. utrinque bidentatis, cymis axillaribus terminalibusque patulis. Fl. Per. l. c.

f. b. Hab. uti antecedentes in Andium nemoribus.

†† Ротина. *Bacca monosperma*: sem. 1 nempe abortivo.

17. *occidentalis*, fol. ovato-lanceolatis glabris, pedunc. trifidis subaxillaribus, cor. 4-fidis, 4-andris, baccis 1-spermis. Jacq. amer. pict. t. 68. Plum. Sp. ic. 156. f. 2. Hab. in Amer. merid., St. Domingo, etc. Cor. laciniae acuminatae deflexae.

Obs. Praeter Baccam monospermam a *Cof. arabica* differt: perispermio basi in 4 lobos diviso et emyone in ejus substantia immerso: hae partes enim in *C. arabica* convolutae sunt.

18. *acuminata*, fol. ovalibus acuminatis ad axillas venarum villosis, stipul. caldus, racem. paucifloris. Flor. Per. 2. p. 64. t. 214. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. Bacca 1-sperma.

Obs. Haeccae species ab antecedente, in qua axillas venarum non villosas inveniri, omnino diversa videtur. Fol. etiam multo minor et magis venosa sunt. Differentia specifica *C. occidentalis* a cl. Willdenovio forte de *C. acuminata* desumpta.

19. *sessilis*, fol. sessilib. oblongo-lanceolatis acuminatis basi excavatis stipulis ovatis, racemis axillarib. Flor. Per. 64. t. 215. f. b. (non f. a.) Hab. in Andium nemoribus. Fol. magna, ovata, fere sessilia. Pedunc. trifidi.

468. CHOCOCCA. Cor. infundibuliformis, aequalis. *Bacca* compressa, didyma, 2-sperma, infera. Sem. oblonga, compressa.

1. *racemosa*, fol. ovatis acuminatis, racem. subdivisis axillarib. secundis subnutantibus. Willd. Sp. p. 975. Lin. suppl. 145. Jacq. Dill. elth. 306. t. 228. f. 255. Sloan. hist. 2. p. 97. t. 188. f. 3.

2. *Chiococco scandens* sarmentis tenuissimis et fere indivisis. Brown. jam. 164. Swartz. obs. p. 76. Habit. in Jamaicae, Barbados, locis contragosis. h

3. *brachiata*, scandens, fol. ovatis deflexis, ramis brachiatis horizontalib. Flor. Per. 2. p. 67. t. 219. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus. Cor. luteo-viridis.

4. *barbata*, erecta, fol. ovatis, pedunc. axillaribus unifloris, cor. fauce barbata. Forst. prod. n.º 96. Hab. in ins. Marchionis, Societatis et Antiorum. h

469. *PÆDERIA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis, 5-loba, intus hirsuta. *Stylus* bipartitus. *Bacca* fragilis (nitida) disperma.

1. *foetida*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1219. Lam. enc. 2. p. 257. t. 166. f. 1. Rumph. 5. t. 160. Hab. in India, h

470. *DISODEA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* compressa, 1-locularis, basi 2-valvis, 2-sperma. *Recept.* filiforme. *Sem.* orbiculata, membrana cincta.

1. *foetida*. *Lygodisodea foetida*, fol. cordatis acutiusculis, caule volubili. Flor. Peruv. 2. p. 48. t. 188. f. 2. Habit. in Peruviae nemorib. Ad trabes ligandas loco funium sumitur.

471. *PLACOMA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* campanulata, 5-fida. *Bacca* 3-locularis: loculis monospermis.

1. *pendula*. Ait. Kew. 1. p. 292. Gmel. syst. pl. p. 390. Willd. Sp. 2. p. 1210. Hab. in Canariis. Caul. tenuis articulatus. Fol. linearis, internodiis longiora.

472. *CHIMARRHIS*. *Cal.* margo integer. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* infera, 2-locularis: loculis 1-spermis. *Stigma* 2-partitum.

1. *cymosa*. Jacq. amer. p. 61. Willd. Sp. 2. p. 971. Hab. in Martinica. Arb. procera, elegans. Flor. parvi in racemis cymosis. Gallice: *Bois de rivière*, quod nomen genericum graece datum idem significat.

473. *HIPPOTIS*. *Cor.* infundibuliformis curvata. *Nectar.* germen ambiens. *Bacca* 2-locularis, calyce magn. auriculiformi coronata.

1. *triflora*, fol. ovato-oblongis acuminiatis, pedunc. trifloris. Flor. Per. 2. p. 56. t. 20. Hab. in Peruv. nemoribus. An revera genus rubiaceum?

474. *VOGELIA*. *Cal.* 5-phyllus: foliolis complicatis magnis transversim undulato-sulcatis. *Cor.*

tubulosa, plicata. *Stigma* 5-fidum.

1. *africana*. Lam. ill. gen. p. 376. t. 149. Cresc. in interiore Africa, ubi detecta a cl. Vaillant. Spica strobiliformi, bracteis plicatis, fol. obcordatis cum mucrone facile distinguenda planta.

475. *TRICYCLA*. *Cal.* 3-phyllus: foliolis magnis subrotundis venosis, persistens. *Cor.* infundibuliformis, 5-fida: laciniis tricrenatis. *Filam.* infra germen inserta. Samara ovata, cor. tubo ampliato cincta. (Stamina aliquando 7.)

1. *spinosa*, caule arboreo; ramis alternis spinosis, fol. fasciculatis sublinearibus, basi angustioribus. Cav. ic. 6. p. 79. t. 598. Habit. in Pampas de Buenos Ayres. Aprili.

476. *BELLONIA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata. *Caps.* infera, laciniis corollinis conniventibus rostrata, 1-locularis, polysperma.

1. *aspera*, fol. ovatis serratis, florib. corymbosis terminalibus. Swartz. prod. p. 42. Willd. Sp. 2. p. 934. Lam. ill. t. 149. Hab. in Amer. Fol. subius aspera.

2. *spinosa*, fol. ovatis angulatis dentato-serratis, pedunc. axillarib. 1-floris. Swartz. Flor. ind. occ. 1. p. 382. Cresc. ad ripas, locis desertis et sylvaticis in St.-Domingo et Hispaniola. Caul. spinosus. Flor. vere. Numerus quaternarius in flor. saepius observatur. Sw.

477. *WIBELIA*. *Cal.* inferus, 5-partitus. *Petala* 5, in tubum conniventia, apice reflexa. *Stigma* 2-lobum. *Pericarp.* 2-loculare.

1. *guyanensis*. Payrola. Lam. ill. t. 122. Paypayrola gujanensis. Gmel. syst. veg. p. 419. Aubl. p. 249. t. 99. Hab. in Gujana. Racem. axillares.

*Obs.* Nomen Aubletii nimis barbarum et illud Lamarkii cum Payrola fere consonum repudiari duxi. Dr. Wibel est auctor Florae Wertheimienensis nec non alius libri botanici argumenti germanice conscripti.

478. *STROEMIA*. *Cor.* 4-petala aut 6. *Cal.* 4-phyllus. *Nectar.*

ligulatum. *Bacca* corticosa, pedicellata.

1. *farinosa*, fol. oblongis farinosis, flor. petaloideis pentandris. Vahl. symb. 1. p. 20. Willd. Sp. 2. p. 993. *Cadaba* farinosa, fol. ovatis oblongis farinosis. Forsk. desc. p. 68. Lam. encycl. 1. p. 544. Hab. in Arabia felici. *h*

2. *tetrandra*, fol. oblongis mucronatis nudis, florib. petaloideis tetrandris. Vahl. symb. 1. p. 20. Cleome fruticosa. Lin. Burm. ind. 140. t. 46. f. 3. Hab. in India. Filam. saepe duo inferiora basi coalita. *h*

3. *glandulosa*, piloso - viscosa, fol. subrotundis, flor. apetalis. Vahl. symb. 1. p. 20. *Cadaba* glandulosa. Forsk. Hab. in Arabia felici. Capsula oblonga hirsutissima. *h*

4. *rotundifolia*, fol. orbiculatis glabris, flor. apetalis. Vahl. symb. 1. p. 20. *Cadaba* rotundifolia. Forsk. Hab. in Arabia felici. Caps. pendula glabra. *h*

479. CONOCARPUS. *Cor.* 5-petala, aut nulla. *Sem.* nuda, solitaria, infera. *Flores* aggregati.

1. *erecta*, erecta, fol. lanceolatis. L. Willd. Sp. 2. p. 994. Jacq. amer. 78. t. 52. f. 1. Ed. picta t. 78. Plum. ic. 135. t. 144. f. 2. Hab. in Jamaicae, Bermudensium, Brasiliae maritimis. *h*

2. *procumbens*, procumbens, fol. obovatis. Jacq. amer. 79. t. 52. f. 2. Mill. dict. n°. 2. Ed. picta. t. 260. f. 22. Hab. in montibus maritimis Cubae. Var. flor. 5-6-andris. *h*

3. *racemosa*, fol. lanceolato-ovatis obtusiusculis, fructibus segregatis. Lin. Sw. obs. 79. Jacq. amer. 80. t. 53. et pict. t. 79. Sloan. jam. 156. hist. 2. p. 66. t. 187. f. 1. Hab. in maritimis arenosis et limosis Caribaeorum vicinaeque Continentis. Rami juniores rubent. Stamina huic decem. Jacq. *h*

480. THESIUM. *Cal.* 1-phyllus, cui stamina inserta. *Nux* infera, monosperma, cal. persistente tecta.

1. *Linophyllum*, caule erecto subramoso panicula foliacea, flor. pedicellatis, bract. ternis, fol. linearibus. Willd. Spec. 2. p. 1211. Hayne in Schrad. bot. Journ. 1800. p. 32.

β. *intermedium*, caule stricto elongato, fol. linearibus lanceolatis trinerviis, panic. foliacea. Schrad. spicil. Flor. germ. 1. p. 27.

γ. *montanum*, caule flaccido, fol. lanceolatis trinerviis, pan. foliaceae. Sch. l. c. In Europae siccis montosis cretaceis, etiam Oriente. *Nux* subrotunda. *h*

\* *ramosum*, caule erecto ramoso, racemis foliatis elongatis, flor. sessilibus, bract. memorib. obvallatis. Hayne l. c. p. 30. t. 7. Th. alpinum. Pollich. Th. palatinum. Roth. Hab. in Palatinatu. *Nux* oblonga.

2. *alpinum*, caul. prostratis simplicib. racemo foliato secundo, florib. sessilibus, bract. obvallatis. Hayne l. c. p. 32. t. 6. Jacq. austr. 5. t. 416. Hab. in montosis et vix subalpinis. An cum Th. *ramoso* constanter a Th. *Linophyllo* diversum?

3. *ebracteatum*, caule erecto simplice, racemo foliato, flor. pedicellatis ebracteatis. Hayne l. t. p. 33. t. 7. Hab. in pascuis nemorosis prope Berolinum. Fol. obtusa concava. Racem. apicem versus sterilis.

4. *humile*, fol. linearibus subcarnosis, flor. axillarib. sessilib. quinquefidis. Vahl. symb. 3. p. 43. Noces globosae rugosae.

5. *lineatum*, fol. linearibus, caule tereti angulato inferne aphylo, ram. erect. divaricatis, flor. axillaribus pedunculatis. Lin. suppl. 162. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *squarrosus*, fol. linearibus - subulatis, recurvato - reflexis, caule tereti, florib. axillaribus sessilibus. Lin. suppl. 162. flor. axillaribus pedunculatis. Thunb. prod. 46. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *Frisea*, flor. subspicatis secundis ciliato-lanatis, fol. subulatis. L. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. simplices, palmates. Fructus ovatus, rugosus.

8. *funale*, flor. spicatis, cor. ciliatis, caule flexili suffruticoso, foliis subulatis brevissimis. Hab. ad Cap. bon. spei. Facie Restionis capensis. *h*

9. *spicatum*, flor. spicatis laevibus, fol. subulatis brevissimis remotissimis. Linn. Hab. in Cap. b. spei montibus. Flores distincti bracteis tribus, margine membranaceis.

10. *capitatum*, flor. capitatis sessilibus terminalib., fol. triquetris laevib., bract. ovatis ciliatis. Hab. in Aethiopia. *h*

11. *strictum*, flor. umbellatis, fol. lan-

ceolatis decurrentibus. Lin. Hab. ad Cap. b. spec. h

12. *umbellatum*, flor. umbellatis, fol. oblongis. Lin. Pluck. mant. 43. t. 342. f. 1. Hab. in Virginiae, Pennsylvaniae paucis siccis. Umbellulae racemosae, involucri tetraphyllo.

13. *fragile*, fol. ovato-triquetris carinatis decurrentibus, caule angulato, flor. axillaribus sessilibus. Lin. suppl. Hab. ad Cap. b. spec. Habitus Salsolae.

14. *scabrum*, capitulis pedunculatis, fol. triquetris, margine carinaeque scaberrimis. Lin. Hab. ad Cap. b. spec. Simillim. T. capitato. h

15. *paniculatum*, fol. lanceolatis remotis, ramis angulatis diffusis, flor. terminalibus. Thu b. prod. 45. Hab. ad Cap. b. spec. Caul. subligosus, pedalis, totus quantus in panic. floriferam effusus, more Galii. Lin. h

16. *amplexicaule*, flor. subspicatis secundis ciliato-lanatis. Lin. Mant. p. 213. Hab. in Cap. b. spec. montib. altis. h

17. *triflorum*, foliis lanceolatis, caule angulato, pedunc. axillaribus trichotomis compositis. Lin. suppl. 162. Hab. ad Cap. b. spec. h

18. *euphorbioides*, pedunculis trifloris terminalibus, fol. subovatis carnosiss. Lin. Mant. 214. Hab. ad Cap. bon. spec. Rami superne dichotomi. h

19. *spinosum*, fol. subulatis mucronato-spinosis, flor. axillaribus solitariis. Linn. suppl. p. 161. Ad Cap. b. spec.

481. **QUINCHAMALIUM**. *Cal.* inaequalis 3-4-dentatus. *Cor.* tubo longo, 5-partita. *Stam.* basi laciniarum cor. inserta. *Stigma* truncatum. *Sem.* 1.

1. *chilense*. Molin. chil. p. 159. Lam. ill. t. 142. *Q. procumbens*, fol. linearib. sparsis, flor. terminalibus capitatis sessilib. Flor. Pet. 2. p. 1. t. 107. f. b. Hab. in Per. collib. arenosis, Rad. fusiformis. Cor. extus purpureo-rubra, intus lutea.

482. **ARIONA**. *Cal.* diphyllus. *Stigma* 2; lamellata. *Bacca* 2 bilocularis?

1. *tuberosa*, tomentosa, fol. sparsis vaginantibus apice subulatis patulis, corymbo terminali. Cav. ic. 4. p. 57-58. Cresc. in

Amer. meridion. partis, vulgo Descado, in siccis et aridis. Fol. tomentosa. Cor. extus tomentosa lutescens, intus luteo-albicans. Rad. fibris divergentib. tuberculiferis. C.

*Obs.* Quoad stum haec planta a priori non diversa, sed quibusd. fructificationis partibus tamen differt, hinc praesertim quoad fructum accuratiori subjicienda examini.

483. **FAGREA**. *Cor.* infundibuliformis, tubo longissimo. *Stigma* peltatum. *Bacca* 2-locularis, carnosa. *Sem.* globosa.

1. *Zeylanica*. Thunb. in Act. holm. 1782. p. 125. t. 4. Willd. Sp. 2. p. 830. Hab. in Zeylona. Frutex ramis crassis, 4-gonis. Folia opposita, coriacea. Flor. magni.

484. **AZALEA**. *Cor.* campanulata, aut infundibuliformis subobliqua. *Stam.* receptaculo inserta. *Stigma* obtusum. *Caps.* 5-locularis.

\* *Cor. campanulatis.*

1. *indica*, flor. subsolitariis, calycibus pilosis. Linn. Herm. Lugd. t. 163. Var. fol. angustioribus. Kaempfer. Reliq. t. 55. In India orient.

2. *lapponica*, fol. ellipticis, punctis excavatis asperis. Lin. Flor. dan. t. 666. Flor. Lapp. t. 6. f. 1. Hab. in alpid. Lapponicis. h

3. *procumbens*, ramis diffuso-procumbentibus, fol. ellipticis (minutis) glabris, margine revolutis. Flor. dan. t. 6. Fl. Lapp. t. 6. f. 2. Cresc. in Europ. alpidibus. Habitus recedit.

4. *rosmarinifolia*, flor. solitariis, fol. linearilanceolatis margine reflexis hirsutis. Lam. ill. p. 491. Burm. Fl. ind. p. 42. t. 3. f. 3. Hab. in Japonia.

\* \* *Cor. infundibuliformibus.*

5. *pontica*, fol. ovato-oblongis pilosis ciliatis, stam. longissimis declinatis. Andr. t. 16. Fall. rose. t. 69. Hab. ad Pontem-Euxinum in Or. et in Amer. ? *Cor.* pulchra lutea

6. *A. calendulacea*. Michaux. p. 151.

*Obs.* Linnaeus dicit de Az. *Pontica*: fol. nitidis utrinque glabris.

6. *nudiflora*, fol. ovatis, cor. pilosis, stam. longissimis. Lin. Curt. mac. t. 180. Var. cor. coccineis, carneis et albis. Vid. Ait. Kew. p. 202. Hab. in Virginia.

7. *viscosa*, ramis hispitis, fol. ovato-lanceolatis utrinque viridibus, margine scabris, stam. cor. piloso-glutinoso sublongioribus. Lin. Cum priore.

\* *glauca*, fol. lanceolato-ovatis subtus glaucis, stam. cor. vix longioribus. Lam. ill. t. 170. f. 2. Prioris var. secundum Aiton. Huc *A. scabra* quorundam. Cor. alba.

8. *periclymena*, fol. glabriusculis nervo supra lanuginoso subtus setigero, florib. non viscoso (roseis) limbo ampliore tubo hirsuto, stam. longissime exsertis. Michx. Flor. 1. p. 151. Hab. in New-Jersey. Fol. utrinque viridia.

9. *canescens*, fol. subtus canescentibus, cor. nuda non viscosa (rosea), cal. minutissimi dentib. rotundatis. Michaux, p. 150. Hab. in Carol. inferiore juxta rivulos. Stam. exserta.



CAPRIFOLIAR. 5-andrae (gen. 485-499). Cal. monophyllus, superus saepius bracteatus. Cor. monopetala (passim poly-petala), subirregularis. Stam. 4, 5, 6, 10. Styl. 1. Stigm. 1-3. Fruct. inferus baccatus, nonnunquam capsularis. Embryo in cavitate superna perispermii solidi magni situs. Caul. ut plurimum frutescens. Fol. in plurimis opposita, sed stipulis destituta, quo haec familia a rubiaceis quoque differt.

485. LONICERA. Cal. 5-dentatus. Cor. tubulosa, 5-fida irregularis. Bacca infera, 2-3-4-locularis, polysperma.

\* CAPRIFOLIUM, floribus in pedicello solitariis, tubo ut plurimum longo. Bacca distincta, 3-loculari.

1. *Caprifolium*, flor. ringentibus terminalibus sessilibus, fol. summis connato-perfoliatis. Linn. Willd. Spec. 2. p. 98a. Jacq. Flor. austr. t. 357. Hab. in nemorosis et flumetis Europae. praesertim aust. Cal. subintegerrimus. h

2. *Periclymenum*, capitulis ovatis imbricatis terminalibus, fol. omnib. distinctis ringentibus. Smith brit. t. p. 260. Flor. dan. t. 608. *β. quercifolia*, fol. sinuatis. Hab. in nemorosis. Cal. 5-dentatus.

3. *parviflora*, fol. summis connato-perfoliatis subtus glaucis, cor. breviusculis gibbis, filam. barbatis. Enc. botan. 1. p. 728. L. media et L. dioica. L. Syst. veg. huc pertinent. Caprifolium bracteosum. Michx. Flor. 1. p. 105. Hab. in Carolinae montib.

Fl. flavescentes aut etiam secundum Michx. violaceo-purpurei, in axillis bractearum sessiles, rarius pedunculati.

4. *sempervirens* (coccinea), fol. summis connato-perfoliatis, cor. infundibuliformi subregulari. Caprifolium *sempervirens*, spicae verticillis distantibus, corol. subregulari rutilo-coccinea. Michx. l. c. Herin. Lugd. t. 481. Hab. in Carolinae sylvis. Fl. per totam aestatem. Frut. tener.

5. *grata*, flor. verticillatis terminalibus, fol. perennantibus obovatis subtus glaucis: summis connato-subperfoliatis, cor. ringentibus. Ait. Kew. 1. p. 231. Habit. in Amer. bor. Fol. plerumque terna. Willd.

6. *japonica*, flor. binis terminalib. sessilibus, fol. omnibus distinctis, caule volubili. Thunb. jap. p. 89. Hab. in Japonia.  $\frac{1}{2}$

\* \* Xylosteon, pedunc. bifloris, baccis 2, basi connatis, 2-locularibus, aut in unicam coadunatis.

7. *canescens*, peduncul. bifloris, baccis distinctis, caule volubili, fol. cordato-ovatis petiolatis Schousb. maroc. 1. p. 88. L. *biflora*, Desf. Atl. 1. p. 184. t. 52. Hab. in sepibus ad Magadore et in monte Trara. h

8. *nigra*, pedunc. bifloris baccis distinctis, fol. ellipticis integerrimis. Linn. Jacq. Flor. austr. 4. t. 314. Hab. in Eur. austr. Fol. juniora hirsuta. Pedicelli fol. incumbentes. Bract. fructib. adpressae.

9. *Xylosteum* (dumetorum), pedunc. bifloris baccis distinctis, fol. integerrim. pubescentibus. Lin. Flor. dan. t. 808. Hab. in sylvaticis. Pedicelli perpendiculares. Bract. lineares, patentes.

10. *tartarica*, pedunc. bifloris, baccis distinctis fol. cordatis obtusis. Jacq. ic. pl. rar. t. 37. Pallas. Flor. rossica t. 36. Hab. in Tartaria. Bract. 2, lineares.

*β. sibirica*, flor. rubris.

11. *pyrenaica*, pedunc. bifloris, bacc. distinctis, fol. obovato-lanceolatis glabris. Willd. Sp. 2. p. 987. Hab. in Pyreneis. Flor. primo vere. Cor. regulares. Bract. lanceolatae.

12. *alpigena*, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis didymis, fol. ovali lanceol. L. Caprifolium fo. iis ovato-lanceolatis subhirsutis, bacc. bicolla biflora. Hall. helv. Hab. in alpihus. Fol. glabra. Cor. fusco-rubra. Vere.

13. *caerulea*, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis globosis, stylis indivisis, fol. ovatis.

Lin. Pall. ross. 1. p. 58. t. 37. Hab. in Helvetia. Cor. flava.

14. *orientalis*, pedunc. bifloris, bacc. coadunatis, fol. petiolatis ovatis acutis, subius pubescentibus. Lam. enc. 1. p. 724. Tournef. cor. 42. Hab. in Asia minori.

15. *flexuosa*, flor. subsessilibus, bafi distinctis, fol. ovatis integris glabris, caul. flexuoso. Thunb. in Act. Soc. Lin. 2. p. 330. L. nigra. Flor. jap. p. 89. Hab. in Japonia.

\*\*\* SYMPHORICARPOS (*Symphoria*.) *Cal.* 4-dentatus. Cor. 3-fida, subaequalis. *Bacca* coronata, 4-locularis, 4-sperma; loculis 2 interdum abortivis.

16. *Symphoricarpos* (*S. conglomerala*), flor. axillarib. subcapitato-glomeratis. *Symphoricarpos* vulgaris. Michaux, Flor. 1. p. 106. Lin. Willd. Spec. 2. p. 986. Dill. elth. t. 278. f. 360. Habit. in Virginia et Carolina.

17. *racemosa*, racemo terminali, cor. intus barbata. *Symph.* racemosus. Mich. l. c. p. 107. Hab. in montosis, ad lacus Mistassin. Cum priore a *Lonicera* potius separari debet.

485. *DIERVILLA*. *Cal.* oblongus, 5-fidus. *Cor.* duplo longior, infundibuliformis, 5-fida, patens. *Caps.* oblonga, 4-locularis, polysperma.

1. *humilis*. D. *Tournefortii*, racemis terminalibus, fol. serratis. Michaux, 1. p. 107. *Lonicera* *Diervilla*. Lin. Tournef. in Act. Soc. reg. 1706. t. 7. f. 1. Habit. in Acadia, Noveboraco, Canada et in Carolinae alptribus. Frutex elegans. Flor. lutei.

*Obs.* *Lonicera dubalina* et *corymbosa*. Lin. nec hujus nec *Lonicerae* genus.

487. *TRIOSTEUM*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* vix longior, tubulosa, 5-loba. *Bacca* 3-locularis, 3-sperma, infera.

1. *perfoliatum* (majus), fol. connatis flor. sessilibus perfoliatis. Willd. 2. p. 990. Dill. elth. t. 293 f. 378. Hab. in Amer.

2. *angustifolium*, caule hispido, fol. connatis, pedunc. oppositis unifloris. Vahl. symb. 3. p. 37. T. *minus*. Michaux, Flor. 1. p. 107. *Lonicera humilis* hirsuta, caule obsolete rubente quadrato, fol. lanceolatis adversis, flore luteo ad alas unico. Gron.

virg. 143. Fluck. alm. 287. t. 104. f. 2. Hab. in Virginia. Cor. lutea. ¶

3. *triflorum*, caule subpubescente, pedunculis oppositis trifloris, fol. petiolatis Vahl. symb. 3. p. 37. Hab. in Madagascar? Caul. tenuissime pubescens.

488. *HELICIA*. *Cal.* oblongus, truncatus, suffultus bractea carnosa. *Cor.* 5-partita. *Anthera* spirales. *Bacca* calycina, 1-sperma.

1. *parasitica*. *Helitanthera* *parasitica*, Loureiro Flor. Cochinchin. ed. Willd. 1. p. 176. Fol. lanceolata. Spicae axillares, flor. coccinei Adrept arboribus cultis in Cochinchina.

489. *AIDIA*. *Cal.* tubulosus, 5-dentatus. *Cor.* hypocrateriformis, fauce lanosa. *Anth.* lineares, cor. incisuris insertae. *Bacca* 1-sperma.

1. *cochinchinensis*. Loureiro, l. c. p. 177. Fol. lanceolata. Racemi axillares. Arb. magna; lignum album, grave.

*Obs.* Duo haecce b. Lourciro genera ab ill. Jussieu confirmata sunt; vid. les Genres des Plantes par O. F. Brisseau - Mirbel, tome 4. p. 407-408.

**SOLANACEAE. Luridae.** Lin. (Gen. 490-508.) *Cor.* his monopetala, campanulata aut rotata: limbo 5-lobo, paululum irregulari. *Stamin.* nonnunquam didynamia. *Styl.* omnibus unicus, stigmatibus plerumque simplicibus. Fruct. in plurimis *bacca* 2-5-locularis, aut *capsula* 2-locularis, 2-sperma. Caulis herbaceus aut frutescens. Folia alterna, in multis plus minusve tomentosa, in quibusdam per paria aut fasciculata approximata. Plantae hujus familiae quoad fructum aliasque partes in universum suspectae imo nonnullae venenatae, quod earum habitus luridus etiam ostendit. Nonnullae interea tam ad usum medicum quam oeconomicum utilissimae reperiuntur

+ *Fructus capsularis.*

490. *VERBASCUM*. *Cor.* rotata, subinaequalis. *Filam.* barbata. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis: valvul. inflexis, polysperma.

1. *Thapsus*, fol. decurrentibus utrisque

tomentosis, caule spicato simplici. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1001. Flor. dan. t. 631. Engl. bot. t. 549. Hab. in Europae glareosis sterilibus. Flores flavi. Anth. miniatae. ♂

2. *Thapsoides*, fol. decurrentib., caul. ramoso. Lin. Habit. in Europa rarius. ♂

3. *Boërhaavii*, fol. sublyratis, florib. sessilibus. Lin. V. fol. radicalibus ovatis petiolatis, caulinis oblongis sessilibus, subtus tomentosis serratis. Mill. t. ic. 273. Hab. in Europa australi. ☉

4. *haemorrhoidale*, fol. ovato-oblongis basi attenuatis tomentosis obsolete crenulatis, racemis spiciformibus elongatis, fasciculis flor. ebracteatis. Aiton. Kew. t. p. 236. Hab. in Madera. ♂

5. *phlomoides*, fol. ovatis utrinque tomentosis: inferioribus petiolatis. Linn. II. 239. V. fol. obovatis sessilibus tomentosis, spica composita interrupta, bract. cordato-lanceolatis. Moench. Flor. bass. n. 170. t. 4. Hab. in Italia et Germania. ♂

6. *floccosum*, tomentoso-candicans, fol. ovatis subintegerrimis, glomerulis multifloris, caps. rotundis. Plant. Hungaricae. p. 81. t. 79. Cresc. in Hungaria inter arbor. et frutices. Caul. 3-4 pedalis, tomento detergo, eleganter purpurascens. Filam. pilis albis. An satis a sequente diversum?

7. *Lychnitis*, fol. cuneiformi-oblongis supra denudatis, caule angulato paniculato. Smith. brit. t. p. 250. V. album. Moench. meth. p. 447. Engl. bot. t. 58. Hab. in pascuis et ad vias, solo calcareo. Flor. pedicellati, lactei. Filam. flavescens. Anth. croceae. Smith.

8. *pulverulentum*, fol. ovato-oblongis subserratis utrinque pulverulentis, caule tereti paniculato. Smith. l. c. V. *pulverulentum*, caule ramoso, calyc. farinoso fasciculatis farinosis, flore luteo. Villars. Delph. 2. p. 450. Engl. bot. t. 487. Cresc. in ruderalis, sepih. ad margines agrorum. Flor. majores anrei, filam. villo albo et anth. miniatis distincti. Sm.

9. *nigrum*, fol. oblongo-cordatis petiolatis undulato-crenat. subpubescentib. Sm. l. c. Engl. bot. t. 95. Flor. dan. t. 1088. Hab. in sylvaticis. Flor. aurei. Filam. villus violaceus.

10. *virgatum*, fol. oblongo-lanceolatis dentatis sessilibus, radicalibus sublyratis pubescentibus, caule ramoso, flor. aggregatis subsessilibus. Sm. p. 252. Engl. bot. t. 550. Lob. ic. 564. Verbasz. Chaici. Vill. 2. p. 491. t. 13. V. gallicum. Willd. Sp. 2. p. 1005. eadem videtur planta. Hab. in

Angliae arvis, et ad vias et inter rupes in Delphinatu. Filam. purpurea. V.

\* *Alopecurus*, fol. ovatis subtus incanis crenatis spica laxa rarius ramosa (simpliciuscula). V. nigrum. ♂. Lin. Hort. Cliff. 54. Thuill. l. c. p. 110. Hab. in locis aridis.

11. *parisiense*, fol. caul. obverse ovatis cum acumine: floralibus (bracteis) lanceolatis, caule ramoso. Thuill. Flor. Par. p. 110. Hab. circa Parisios in locis glareosis. Flor. lutei.

12. *ferrugineum*, fol. subvillosis rugosis, caulinis subsessilibus aequaliter crenatis, radicalibus oblongis cordatis duplicato-crenatis. Aiton. Kew. t. p. 237. Andrew. t. 162. Hab. in Europa austr. Filam. incrassata.

13. *phoeniceum*, fol. ovatis nudis crenatis radicalibus, caule subnudo racemoso. Lin. Jacq. austr. t. 125. Blattaria purpurea. Baulh. pin. Hab. in Europa orientali, Germania, Carniolia. Cor. rotata, saturate purpurea. Filamenta purpurea, horum superiora 3 barba alba. Anth. nigricantes b. ♂

14. *Blattaria*, caule ramoso, fol. amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis. Lin. Hab. in Europ. australioris argillaceis. Var. flor. albis. ♂

15. *viscidulum*, fol. oblongis amplexicaulibus nudiusculis, radicalib. sinuato-crenatis, scapo pedicellisque subdifloris glanduloso-viscidulis. V. Blattarioides. Enc. bot. 4. p. 225. Thuill. Paris. Hab. circa Parisios.

16. *Claytoni*, glabrum, caule simpliciusculo, fol. caulinis oblongis sublanceolatis incis duplicato-crenatis. Mich. Fl. 1. p. 148. Hab. in Carolina.

17. *monspessulanum*, fol. ovato-lanceolatis petiolatis profunde dentatis, flor. spicatis. Hab. prope Montpellier. Vidi in herbario cl. Richardi. Folia quasi sinuato-dentata, parvula.

18. *sinuatum*, fol. radicalibus pinnatifido-repandis tomentosis: caulinis amplexicaulibus nudiusculis, rameis primis oppositis. Lam. encyc. 4. p. 221. Willd. Sp. 2. p. 1006. Habit. in Europa austr Italia et Gallia merid.

19. *undulatum*, fol. incano-tomentosis, radicalibus sinuato-crepis, caulinis sessilib. indevisis, caule virgato, flor. sessilib. Lam. l. c. V. graecum fruticosum, fol.

sinnato candidissimo. Tournef. it. r. p. 335. Hab. in Oriente.

20. *parviflorum*, fol. pinnatifido-runcinatis utrinque tomentosis radicalibus, caule ramoso nudiuculo, flor. minimis. Lam. l. c. in Oriente? Fol. Taraxici. Fl. parvitate Scopariae dulcis similes. L.

21. *lyratum*, hirsutum, fol. radicalib. lyrato-pinnatifidis: caulinis inaequaliter dentatis, subsessilibus, cal. 5-phylo serrato. Lam. enc. 4. p. 222. Hab. in Hispania?

22. *pinnatifidum*, fol. lineari-lanceol. pinnatifidis, lacinii obtusis dentatis, flor. sessilibus glomeratis. Vahl. symb. 2. p. 39. Hab. in ins. Archipelagi.

23. *Barnadesii*, caule subnudo, fol. lanceolatis dentato-sinuatis glabris, pedunc. unifloris. Vahl. symb. 2. p. 39. Hab. in Hispaniae collibus versus oppidum Ortales.

24. *Ozbeckii*, fol. incisus nudis, caule folioso, cal. lanatis, pedunc. bifloris. Osb. it. 2. Blattaria orientalis, Bugulae folio, flore maximo virescente lituris luteis in semicirculum striato. Tournef. cor. 8. it. aep. 83. t. 83. Buxb. cent. 5. p. 17. t. 32. Hab. in Hispania et circa Bosphorum. ♂

25. *spinosum*, caule folioso frutescente. Lin. Moen. aca. 4. p. 307. Vahl. symb. 2. p. 39. Leucolum spinosum. Alp. exot. 37. t. 36. Habi. t. in Creta. ♀

491. **RAMONDA**. Scapi radicales. Cor. rotata, 5-partita. Stam. approximata: antheris apice perforatis. Caps. 1-locularis; recept. 2, parietalia, polysperma. Richard.

1. *pyrenaica*, fol. ovalibus tomentosis erectis. Verbascum Myconi. Lin. Ehrh. pl. select. t. 57. Mill. ic. t. 277. Hab. in Pyrenaeis. Hoc genus in memoriam cl. Ramond ob merita in plantas pyrenaeas observandas sic appellatur.

492. **DATURA**. Cor. infundibuliformis, plicata. Cal. tubulosus, angulatus, deciduus: basi orbiculata persistente. Caps. 4-valvis, 4-locularis, laevis, aut spinosa.

1. *ferox*, pericarpis spinosis erectis ovatis: spinis summis maximis convergentib. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1007. Moris. 3. s. 15. t. 2. f. 4. Hab. in China. Flores parvuli. Fol. plicata. ♂

2. *Stramonium*, pericarp. spinosis erectis ovatis, foliis ovatis sinuatis glabris basi in petiolum attenuatis. Flor. dan. t. 436. Blackw. t. 313. Curt. Lond. ic. Habit. in America, nunc vulgaris in ruderalis per Europam. In loco natali cor. etiam violaceo-caerulea. Flor. Per. e. p. 15. ♂

3. *Tatula*, pericarpis spinosis erectis ovatis, fol. cordatis glabris dentatis. Lin. Hab. ... Fol. basi quasi truncata. Caul. purpurascens, punctis albis adpersus. Cor. pallide caeruleae. ♂

\* *dubia*, fol. ovato-lanceolatis indivisis petiolatis. Hab. ... Ex herb. cl. Richardi. An var. sequentis cultura ortae?

4. *fastuosa*, pericarpis tuberculatis nutantibus globosis, fol. ovatis angulatis. Rumph. 5. t. 243. f. 2. Hab. in Aegypto. Cor. violacea, intus alba, passim duplicata s. plena. ♂

5. *Metel*, cal. tereti subtumido, pericarpis spinosis nutantibus globosis, foliis cordatis subintegris pubescentibus. Linn. Kniph. cent. 1. t. 24. Rumph. 5. t. 87. Habit. in Asia, Africa et in insulis Canariis. Omnium foetidissima. ♂

6. *laevis*, pericarpis glabris inermib. erectis, fol. glabris, caule fistuloso herbaceo. Ait. Kew. 1. p. 239. Jacq. hort. 3. p. 44. t. 82. Hab. in Abyssinia. ♂

7. *ceratacaula*, pericarp. obovatis inermib. pendulis, fol. ovato-lanceolatis undulatis subtus tomentosis, caul. dichotomis corniformib. Ortega, Decad. p. 11. D. *macro-caulis*, fol. oblongis repandis subtus sericeis, caule herbaceo inferne piloso superne glabro subinflato. Roth. N. Bot. Beyträge, p. 159. Cresc. in ins. Cuba. Cor. speciosa alba: angulis purpurascens, circa vesperam explicatur. ♂

493. **BRUGMANSIA**. Cal. latere reptilis, persistens. Cor. infundibuliformis, plicata. Antherae conglutinae. Stigma utrinque lineatim decurrens. Caps. 2-locularis (inermis.)

1. *candida*, floribus pendulis. Datura arborea, pericarp. glabris inermib. oblongis pendulis, fol. ovato-lanceolatis oblongisque geminis, caule fruticoso. Flor. Per. 2. p. 15. t. 128. cfr. Willd. Spec. 2. p. 1010. Hab. in Peruvia. Flores vespertino tempore fragrantis, maximi, albi, penduli. ♀

2? *bicolor*, fol. congestis, cor. versicolore. Datura sanguinea, pericarp. inermib.



mibus oblongo-cylindricis pendulis, fol. lanceolatis angulatis congestis, caule fruticoso. Flor. Per. 2. p. 15. Cresc. in Peruv. in altis, frigidis et ruderalis. Cor. e medio ad basin lutescens, superne rubra, lineis 15 sanguineis maculata.

*Obs.* Ex analogia cum priore, nec ex autopsia, hanc speciem huc retuli. Cl. Moench. in Meth. plant. suppl. p. 37. aliam a huc speciem capsulis muricatis instructam descripsit, quae forte etiam hujus generis est. Speciosum hoc genus, cum Daturis habitu tantum conveniens, memoriae Cl. Brügmanns, Professoris Historiae naturalis et Botanices Lugduni Batavorum meritis, imi et dignissimi dicari velim.

494. *HYOSCYAMUS*. Cor. infundibuliformis, obtusa, irregularis. *Stam.* inclinata. *Caps.* operculata, 2-locularis.

1. *niger*, fol. amplexicaulibus sinuatis, flor. venosis sessilibus. Lin. Willd. Spec. 2. p. 1010. Engl. botan. t. 52. Hab. in Europ. ruderalis pinguibus, Planta venenata. Cor. ochroleuca. ☉

2. *reticulatus*, fol. caulibus petiolatis cordatis sinuatis acutis: floralibus integerrimis, corol. ventricosis. Linn. Cam. bort. 77. t. 22. Habit. in Creta, Syria, Aegypto. Cor. campanulatae, rubrae, venis obscuris pulchre reticulatae. L. ☉

3. *albus*, fol. petiolatis sinuatis obtusis, flor. sessilibus. Lin. Blackw. t. 111. Hab. in Europa australi. ☉

4. *aureus*, fol. petiolatis dentatis acutis, flor. pedunculatis, fructibus pendulis. Lin. Hab. in Creta, Oriente. Cor. aurea, fauce atro-purpurea striata. ☉

5. *muticus*, fol. petiolatis ovatis acutangulis, calycibus muticis, bract. indivisis. Lin. Mant. 45. H. betaeifolius. Lam. Hab. in Aegypto, Arabia. Racemus secundus apice incurvato. ☉

6. *pusillus*, fol. lanceolatis dentatis: flor. inferioribus binis, calycibus spinosis. Pluck. alm. 188. t. 37. f. 5. Habit. in Persia. Cor. flava fauce nigra. ☉

7. *physaloides*, fol. ovatis integerrimis, calycibus inflatis subglobosis. L. Amoen. acad. 7. t. 6. f. 1. Hab. in Sibiria. Cor. purpurascens. Stam. conniventia. Stigma capitatum, albidum. Floret primo vere. ☉

8. *Scopolia*, fol. ovatis integris, calyc. inflatis campanulatis laevibus. Scop. carn.

ed. 2. n.º 254. Scop. la. carniolica. Jacq. obs. 1. p. 32. t. 20. Hab. circa Idriam in sylvis. Cor. Atropae. Caps. operculata Hyoscyami.

495. *NICOTIANA*. Cor. infundibuliformis, limbo plicato. *Stam.* inclinata. *Caps.* 2-valvis, 2-locularis.

1. *Tabacum*, fol. lanceolato-ovatis sessilibus decurrentibus, flor. acutis. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1014. Blackw. t. 136. Hab. in America; nota Europaeis ab a. 1560.

2. *fruticosa*, fol. lanceolatis subpetiolatis amplexicaulibus, flor. acutis, caule frutescente. Lin. Hab. ad Cap. b. spei et in China.

3. *rustica*, fol. petiolatis ovatis integerrimis, flor. obtusis. Blackw. t. 437. In America.

4. *paniculata*, fol. petiolatis cordatis integerrimis, flor. (parvis) paniculatis obtusis clavatis. Flor. Per. 2. p. 16. t. 129. Habit. in Peru.

5. *urens*, fol. corollatis crenatis, racem. recurvatis, caule hispido pruriginoso. L. Plum. Spec. 3. ic. 211. Hab. in America meridionali. Caps. Acanthi more dehiscit. Juss. h

6. *glutinosa*, foliis petiolatis cordatis integerrimis, flor. racemosis secundis subringentibus. Lin. Flor. Per. 2. p. 16. Act. holm. 1751. p. 61. t. 2. In Peru et petrosis Lima. Calycis una lacinia reliquis duplo major. ☉

7. *undulata*, fol. radicalibus subspatulatis: caulibus petiolatis ovatis undulatis, flor. nutantibus: tubo longo cylindrico. Vent. Jard. de Malmaison. p. 10. f. 10. Hab. prope oppidum Jackson in N. Holl. Silenem refert. Cor. lactea: limbo plano.

8. *crispa*, caule tuberculato ramoso, ramis attenuatis, fol. lanceolatis acutis undulato-crispis. N. plumbaginifolia. Viviani Elench. Plant. Hort. Dinegro. p. 26. N. crispa. H. P. Flor. albidis. Cor. laciniiis acutis, plicatis.

9. *tomentosa*, fol. lanceolatis decurrentibus subtus tomentosis, panic. maxima diffusa, cor. subringentibus acutis. Flor. Per. 2. p. 16. t. 129. f. a. Hab. in ruderalia et arvis in Peruvia. h

10. *undulata*, fol. lanceolatis petiolatis undulatis, racemis terminalibus, calice bilabiato, cor. brevibus acutis. Flor. Per. t. 130. f. b. Cresc. in frigidis locis Tar-

mae. Cal. denticulus supremus longissim.  
Cor. lutea. ☉

11. *angustifolia*, fol. lanceolatis: superioribus linearibus acutis, panic. diffusa, cor. angustissimis: limbo plicato. Fl. Per. t. 130. f. a. In Conceptionis Chile versuris. Cor. tubus viridis, limbus albus. ☉

12. *pusilla*, fol. oblongo-ovalibus radicalibus, flor. racemosis acutis, fol. ovato-lanceolatis obtusis rugosis, cal. brevissimis. Mill. ic. 185. f. 2. Hab. in Vera Cruce.

496. PETUNIA. Cal. profunde 5-fidus: laciniis subspathulatis. Cor. tubulosa: limbo dilatato subquingnelobo. *Stigma* capitatum, bilobum. *Caps.* 2-valvis, 2-locularis, polysperma.

1. *parviflora*, caulibus prostratis, cor. vix calyce longioribus, Jussieu in Annal. du Mus. d'Hist. Natur. Fasc. 9. p. 214. 216. t. 47. f. 1. Hab. in America ad flum. Plata, uti et sequens species. Fol. Cerasiil.

2. *nyctaginiflora*, caule hirsuto, foliis ovato-oblongis pubescentibus, cor. calyce 4-plo longiorib. Juss. l. c. f. 2. Fol. Heliotropii. Cor. magaa Mirabilis. J.

497. LAMARKEA. Cal. longus, 5-gonus, 5-fidus. Cor. hypocrateriformis, 5-partita: limbo subaequali obtuso. *Caps.* teres, 2-locularis, polysperma.

1. *coccinea*, glaberrima, fol. obovatis nitidis. Richard in Act. Soc. Lin. p. 107. Hab. in Cayenna.

++ *Fructus baccatus.*

498. ULLOA. Cal. ovatus, inflatus, 5-partitus. Cor. tubulosa: fance gibbosa. *Stigma* oblongum. *Bacca* bilocularis calyce magno obvoluta. *Sem.* reniformia.

1. *parasitica*. Juanulloa parasitica, fol. oblongis acuminatis, racemis dependentib. dichotomis. Flor. Peruv. 2. p. 47. t. 185. Hab. in Peruv. nemoribus. Flor. et fruct. colore puniceo. h

499. JABOROSA. Cor. tubulosa. Cal. 5-fidus, brevis. *Stam.* fauci inserta. *Stigma* capitatum. *Bacca*?

1. *integrifolia*, fol. ovatis subintegerimis, flore longo tubuloso. Lam. enc. 3. p. 181. t. 114. Willd. Sp. 2. p. 1016. Hab. in Bonaria. h

2. *runcinata*, fol. sinuato-lyratis dentatis, flore brevi subcampanulato. l. c. Cum priore. Scapus in his speciebus est uniflorus. Willd. h

500. TRIGUERA. Cor. campanulata: limbo inaequali. *Nect.* breve, germen cingens, 5-dentatum. *Filam.* nectario inserta. *Bacca* 4-locularis: loculis 2-spermis.

1. *ambrosiaca*, caule sulcato-alato, fol. superioribus obovatis dentatis pubescentibus. Willd. Sp. 2. p. 839. Cav. Diss. 2. app. 2. t. a. Hab. in Boëtia. ☉

2. *indora*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis glabris. Cav. l. c. app. 3. Cresc. cum priore.

501. SOLANDRA. Cal. rumpens. Cor. clavato-infundibuliformis maxima. *Bacca* 4-locularis, polysperma.

1. *grandiflora*. Swartz. Flor. p. 387. t. 9. Willd. Sp. 2. p. 936. In Jamaica arborib. maximis et rupium fissuris subparasitica. Cor. lutea. *Datura* sarmentosa. Lam. ill. 2. p. 9.

502. ATROPA. Cor. campanulata. *Stam.* distantia. *Bacca* globosa, 2-locularis, calyci insidens.

1. *Mandragora*, acaulis, scapis uniflor. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1016. Bull. herb. t. 145. *Mandragora* acaulis. Gaertn. de sem. 2. p. 237. Blackw. t. 364. *Mandragora* mas. Lobel. ic. 267. Flor. vere. Cor. albidula.

β. A. fol. minoribus angustioribus et magis undulatis. Lam. encycl. 1. p. 391. *Mandragora* flore subcaeruleo purpurasc. Bauh. pin. Hab. in Hispaniae, Helvetiae, Italiae, Sibiriae, Cretae, Cycladum apricis. An distinctum genus?

2. *Belladonna*, caule herbaceo brachiato, fol. ovatis integris. L. Jacq. austr. 4. t. 309. Hab. in Austriae, Angliae, Germaniae, Italiae montibus sylvosiss. Corol. parum ringens, lutea. *Bacca* nigra, venenata. h

3. *umbellata*, caule frutescente, fol. ovatis cordatisque integerrimis angulatisque, flor. umbellatis, cor. revolutis. Flor. Per. 2. p. 44. t. 181. f. a. Hab. in Peruviae collibus. Cor. mellifera. *Stigm.* capitatum.

4. *biflora*, caule fruticoso, fol. ovatis acutis integerrimis, pedunc. bifloris, stam. cor. longioribus. Flor. Per. t. 181. fig. b. Cresc. in praeruptis locisque humidis. Cor. suburceolata, extus villosa. Stigmat. 2-lolum.

5. *bicolor*, caule fruticoso, fol. ovatis angulatis glabris, pedunc. 3-4-floris. Flor. Per. 2. p. 45. Habit. in Peruviae umbris. Corol. tubulosa, rubro-viridis. Fol. subgemma.

6. *aspera*, caule herbaceo, fol. ovatis geminis: altero minori, flor. solitariis cernuis, cor. subdecemfidis. Flor. Per. l. c. Cor. luteo - caerulea, centro violacea: lacin. 5 - acutis, 5-alternis emarginatis. Filam. hirsuta.

7. *procumbens*, caule herbaceo procumbente, fol. geminis ovatis integerrimis (tenerioribus dorso et margine villosis) flor. umbellatis plicatis filam. glabris. Cav. ic. 1. p. 53. t. 72. A. plicata. Roth. Cat. 2. p. 24. *Saracha procumbens*. Flor. Per. 2. p. 43. t. 180. f. b. Hab. in Peruvia et Mexico. Cor. pubescens. Bacca depresso-globosa, lutea, 2-locularis. Roth. 1-locularis. Fl. Per.

8. *umbellata*, caule erecto herbaceo hirsuto, umbellis axillaribus pedunculatis cernuis, flor. plicatis, filam. basi barbatis, fol. ovatis scabris, floralib. geminis. Roth. l. c. p. 26. Hab. . . Bacca globosa nitida atra, lineis 4-cruciatis notata, 2-locular. Priori affinis.

\* *SARACHA. Cor. rotato-campanulata. Bacca* (per abortum) 1-locularis. Recept. carnosum.

9. *punctata*, suffruticosa, fol. ovato-oblongis, cor. punctatis. Flor. Per. 2. p. 42. t. 178. In Peruv. altis. Flor. majusculi nutantes.

10. *dentata*, caule procumbente, fol. geminis ovatis integris dentatisque, pedunc. subquadrifloris. Flor. Per. 2. l. c. t. 179. f. b. sub *Saracha*, uti antecedens et sequentes species. Corol. albo - violacea, utrinque villosa. Cresc. cum priore.

11. *contorta*, fol. ovatis angulato-dentatis integrisque, pedunc. multifloris umbellatis. Flor. Peruv. 2. p. 43. t. 180. f. a. In praeruptis Cantac. Stamina basi hirsuta. ☉

12. *biflora*, pubescens, fol. ovatis subgeminis, pedunc. bifloris. Flor. Peruv. 2. p. 42. t. 139. Hab. in Peruvia inter segetes et ad saepe. Corol. luteo - viridis. Bacca alba. 75

13. *solanacea*, caule fruticoso, pedunc. solitar., cor. campanulatis, fol. subovatis. Linn. Mant. 205. Solanum aggregatum. Jacq. ic. rar. 2. t. 323. Collect. 4. p. 124. Solanum guineense. Lin. Spec. plant. 2. p. 263. Hab. ad Cap. b. spei littora maritima. h

Obs. An potius Solanum? vide Roth N. Bot. Beyträge, p. 162.

14. *arborescens*, caule frutescente, pedunc. confertis, corol. revolutis, fol. oblongis. Linn. Habit. in locis montosis frigidis Jamaicae. Cor. alba. h

15. *frutescens*, caule fruticoso, pedunc. confertis (subsolitariis), fol. cordato-ovatis obtusis. Linn. Lam. ill. 1. 114. Physalis suberosa, cortice suberoso, fol. orbiculatis nitidis integerrimis. Cavan. ic. 2. p. 1. t. 102. Barr. ic. 1173. Hab. in Hispania. h

503. *NICANDRA. Cal.* 5-partitus, 5-angulatus: angulis compressis laciniisque sagittatis. *Cor.* campanulata. *Stam.* incurva. *Bacca* carnosa (exsucca 3-5-locularis, cal. tecta.)

1. *Physalodes*. Gaertn. de fruct. 2. p. 237. t. 131. Atro: a Physalodes. Lin. Calydhemos erosus. Flor. Per. 2. p. 44. Hab. sponte in segetibus, ruderalis et versurus Limaec etc., ubi per totum annum floret. Caulis subaltus ramosissimus. Cal. membranaceus venoso-reticulatus. Cor. albo-caerulea. ☉

504. *LINKIA. Cal.* 5-partitus: laciniis linearilanceolatis erectis. *Cor.* campanulata: tubo pentagono. *Anth.* sagittatae.

1. *peruviana*. Desfontainia spinosa, fol. ovatis dentato-spinosis, flor. solitariis. Flor. Per. 2. p. 47. t. 186. Hab. in Peruv. nemoribus ad Churupallana praedium in Provinc. Tarma et inter Munna et Pozuzo. Fol. sapore amara, eaque masticata pappum luteo colore tingunt. Frutex ad sepes conficiendas utilis et ob flor. coccineorum pulchritudinem coli meretur.

Obs. Cum jam genus *Fontanesia* existat, nomen mutandum erat. Plantam dicavi memoriae Cl. Link, viri amicissimi, Professor. apud Rostockenses, ob opuscula botanica varia bene meriti.

505. *PHYSALIS. Cor.* campanulato-rotata. *Stam.* conniventia.

*Bacca* intra calycem inflatum, bilocularis.

\* *Perennes.*

7. *somnifera*, caule fruticoso, ramis rectis, flor. confertis. Willd. Spec. 2. p. 1019. Cavan. ic. 2. p. 2. t. 103. Habit. in Mexico, Creta, Hispania. Fructus Physalidis, Flos Atropae. h

2. *aristata*, caule fruticoso, fol. oblongis integris glabris, ramis petiolis pedunculisque lanuginosis, lenticulis calycin. aristatis. Ait. Kew. 1. p. 244. Habit. in ins. Canariis. ¶

3. *flexuosa*, caule fruticoso, ramis flexuosis, flor. confertis. L. Hab. in India. Habit. P. *somniferae*. h

4. *arborescens*, caule fruticoso, fol. ovatis pilosis, flor. solitariis, cor. revolut. Lin. Mill. dict. 1. 206. f. 2. Hab. in Campechia.

5. *curassavica*, caul. fruticoso, fol. ovatis tomentosis. Lin. Pluck. alm. 352. t. 111. f. 5. Hab. in Curassao.

6. *tomentosa*, caule fruticoso tomentoso, fol. elliptico-oblongis tomentosis, fl. lateralib. aggregatis. Thunb. prodr. p. 37. Hab. ad Cap. b. spei. h

7. *viscosa*, fol. geminis repandis obtusis subtomentosis, caule herbaceo superne paniculato. Jacq. hort. t. 136. Alkekengi bonariense repens, bacca turbinata viscosa. Dill. elth. 11. t. 10. f. 10. S. Hab. in Virginia, Bonaria. Tomentosa et subscabra, sed non viscosa. Jacq. † ¶

8. *obscura*, herbacea divaricato-ramosissima, foliis suborbiculatis acuminatis inaequaliter dentatis. Michaux Flor. 1. p. 149. Habit. in Carolina. Cor. flava, maculis fuscis, anth. caerulecentes. Var. viscido-pubescent, et β. glabra.

9. *lanceolata*, pumila pubescens, fol. subsessilibus ovali-lanceolatis subintegris, cal. villosa, caule dichotomo. Mich. l. c. In Carolina. ¶

10. *pennsylvanica*, fol. ovatis subrepandis obtusis nudiusculis, flor. geminis, caule herbaceo. Hab. in Virginia. Flor. unicolores. ¶

11. *Alkekengi*, foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso. Hab. in Italiae, Germaniae, Japoniae scrobibus. Calyces fructus sanguinei. ¶

12. *peruviana*, pubescens, fol. cordatis integerrimis. Spec. pl. 1670. Hab. Limae.

Simillima *Daturae* Metel. Flor. penduli, lutei, umbilico cor. maculis quinque fuscis utrinque conspicuis, fauceque hirsuta. L.

\*\* *Annuae.*

13. *angulata*, ramosissima, ramis angulatis glabris, fol. ovatis dentatis. P. fol. oblongo-lanceolatis dentatis integerrimis, flor. pendulis. Flor. Per. 2. p. 42. Dill. elth. 13. t. 12. f. 12. Hab. in India utraque. ©

14. *pubescens*, ramosissima, fol. villosa-viscosis cordatis, flor. pendulis, cal. fructiferis subrotundo-globosis angulatis. Willd. p. 1023. Flor. Per. 2. p. 41. Moris. s. 13. t. 3. f. 24. Hab. in India utraque. Corollae maculae fuscae. Baccae globosae, luteae.

15. *nodosa*, herbacea ramosa, foliis ovato-oblongis suberosis pubescentibus, flor. pendulis. Lam. ill. p. 29. Hab. in America.

\* *latifolia*, erecta ramosa villosa pubescens, fol. cordatis subintegerrimis, pedunc. brevibus nutantibus 1-floris. Lam. ill. l. c. Ph. *barbadensis*. Enc. bot. 2. p. 11. In Amer. Sequenti affinis.

16. *barbadensis*, ramosissima, foliis ovato-cordatis pubescentibus, flor. pendulis, cal. fructiferis ovato-acuminatis angulatis. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 39. Hab. in Barbados.

17. *chenopodifolia*, ramosissima, fol. glabris ovatis acuminatis angulato-dentatis, cal. laevibus, magnitudine fructus, globosis. Willd. l. c. Hab. ... ©

18. *minima*, ramosissima, pedunculis fructiferis fol. villosa longioribus. Hermann. Lugd. B. t. 571. Ruess. 10. t. 140. f. 71. In Indiae aridis sordidulis. ©

19. *pruinosa*, ramosissima, fol. villosis, pedunc. strictis. Lin. Alkekengi *barbadense*, nanum, Alliariae fol. Dill. elth. 12. t. 9. f. 9. Hab. in America. Antherae flavae. Baccae suburbinatae. L. ©

20. *prostrata*, ramosissima diffusa prostrata, fol. ovatis repandis, caule ramisque teretibus hirsutis. Jacq. ic. rar. 1. t. 38. Collect. 1. p. 99. l. Her. Stirp. p. 43. t. 22. Hab. in Peruviae arenosis et collibus. Cor. fragrans, caerulea, lineis purpureis maculata. Flor. Per. 2. p. 41. Audr. t. 75.

506. SOLANUM. Cal. persistens. Cor. rotata, aut campanulata 5-loba, plicata. *Anthera* sub-

coalitæ, apice porogemino dehiscentes. *Bacca* 2-locularis, polysperma. (*Anth.* passim libera præsertim in corol. basi hyalina.)

† *Inermia.*

\* *Foliis integris, aut sinuatis.*

1. *laurifolium*, caule inermi arboreo, fol. petiolatis ovato-oblongis subtus tomentosis, panicula terminali dichotoma divaricata. Lin. suppl. 148. Hab. in America australi. Arb. *Baccae* nigrae.

2. *verbascifolium*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis tomentosis integerrimis, corymbis bifidis terminalib. Willd. phyt. 1. p. 5. n. 17. Jacq. hort. t. 13. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 1. Hab. in Amer. h.

*auriculatum*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis acuminatis tomentosis integerrimis, stipulis cordatis, corymbis bifidis terminalibus. Willd. Ait. Kew. 1. p. 246. Hab. in ins. Madagascar, Mauritiu et Bourboniae. An Var. præcedentis? Stipulis nonnunquam deciduis.

4. *pubescens*, caule inermi tomentoso fruticoso, fol. ovatis, basi decrecentibus integerrimis pubescentibus, racemis subumbellatis axillaribus. Willd. phyt. 1. p. 5. t. 3. Habit. in Indiae orientalis hortis. Simile *S. verbascifolio*, flor. racemoso-umbellatis, oppositifoliis.

\* *luteo-album*, caule fruticoso, foliis ovatis acutis, racemis lateralibus, flor. secundis. Fl. Per. 2. p. 36. t. 166. f. b. (*S. pubescens.*) Hab. in Per. nemoribus ad Cuchero tractus. Fol. utrinque pubescentia. Cor. albo-lutescens. An prioris varietas?

5. *virgatum*, caule inermi frutescente, ramis virgatis, fol. ovato-acutis, subtus tomentosis, umbellis (in ramorum dichotomia) sessilibus. Lam. ill. 2310. encycl. p. 280. In Canariis. h.

6. *riparium*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis incanis, corymb. terminalibus dichotomis multifloris. Fl. Per. 2. p. 34. t. 166. f. b. (*S. dichotomum*. Hab. in Huancu provincia ad torrentium margines. Rami tomentoso-pulverulenti. Flor. parvi. Cor. calyce duplo major, violacea. *Bacca* lutea.

7. *nutans*, caule inermi fruticoso, fol. oblongo-ovatis acuminatis, racemis brevissimis oppositifoliis, flor. secundis nutantibus. Flor. Peruv. 2. p. 34. t. 166. f. a. Habit. in Peruviae rudertis passim in Pillao circuitu. Frutex ferrugineus. Folia

integerrima, venosissima. Corolla alba brevis,

8. *grandiflorum*, caule arboreo, fol. ovatis sinuatis integerrimisque, racemis ramis recurvis, flor. secundis magnis. Fl. Per. 2. p. 45. t. 168. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus imis et calidis ad Pozuzo. Arb. sexorgyalis. Fol. subtus lanuginosa, supra hispida. Cor. violacea, zonis extus lanuginosis. *Bacca* magna lanuginosa.

9. *viridiflorum*, caule fruticoso, fol. cordatis simplicibus, racemis dependentib. Flor. Peruv. 2. p. 38. t. 173. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus. Planta orgyalis, villosa. Cor. viridis. *Bacca* magna, turbinate, villosa.

10. *sessile*, caule inermi fruticoso, fol. spatulatis sessilib. pedunc. terminalib. recurvo-pendulis, flor. capitato-umbellatis. Flor. Peruv. 2. p. 35. t. 167. f. a. Hab. in Peruv. rudertis ad Munna vicum. Frutex biorgyalis, gl. ber. Fol. conferta, ad basin crispata, pedalia. Flor. parvi. Corol. alba. *Bacca* alba.

11. *Melongena*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis tomentosis, pedunc. pendulis incrassatis, calyc. inermib. Syst. veg. 188. Willd. sp. p. 1036. *S. pomierum* fructu oblongo. Baub. pin. 167. Pluck. phyt. 226. f. 2. Fructus magnus violaceus.

β. *ovigera*, fructu ovato albo. Mill. Tournef. inst. 151. Lam. enc. p. 294. In Asia, Africa, America. An var. *S. insani*, cui aculeis exceptis, similis?

12. *muricatum*, caule subinermi suffruticoso radicante, turionibus muricatis, fol. oblongo-lanceolatis integris pubescentibus. Ait. Kew. 1. p. 250. Willd. Sp. pl. p. 1037. Few. Pera. 2. p. 735. t. 26. *S. scabrum*. Lam. enc. p. 291. *S. variegatum*, fol. lanceolatis basi inequalibus excavatis, fl. cymosis, fructu maximo ovato. Fl. Per. 2. p. 32. t. 162. f. a. Hab. copiose in Peruv. cultis. Caulis radicans. *Bacca* ovata alba, purpureo colore variegata, pendula. 1-2-palmaris, edulis. h.

13. *salvifolium*, caule inermi fruticoso, fol. ovato-lanceolatis subtus tomentosis, calycibus corollisque tomentosis. Lam. ill. n. 2108. enc. p. 280. An *S. subinermis*. Jacq. Willd. Sp. 2. p. 1037. *S.* Hab. in Gujana et Jamaica. h.

β ? *longiflorum*, inerme, fol. ellipticis integris attenuatis infra subtomentosis, racemis lateralibus, cor. 5-partitis. Vahl. eclog. amer. 1. p. 20. Hab. in Cajenna.

14. *terminale*, inerme frutescens, fol ?

lanceolato-ovatis subintegerrimis pilosis, umbellis terminalibus. Vahl. l. c. Forsk. descr. p. 45. Hab. in Arabia felici. *h*

15. *pauciflorum*, fol. ovatis integerrimis, ramis calycibusque decemdentatis tomentosis, pedunc. axillaribus geminis unifloris. Vahl. eclog. 1. p. 20. Hab. in Martinica.

16. *diphyllum*, caule inermi fruticoso, fol. geminis: altero minore, flor. cymosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 322. Collect. 2. p. 331. Hab. in Amer. Pedunc. subsolitarii. Bacca flava. *h*

17. *fugax*, caule inermi fruticoso dichotomo divaricato, fol. lanceolatis integerrimis glabris, pedunculis longissimis solitariis axillaribus unifloris, cal. decemdentato. Willd. p. 1027. Jacq. ic. rar. 2. t. 324. Collect. 4. p. 123. Lam. enc. 4. p. 282. Hab. circa Caracas, Cor. stellaris: angulis flavescentibus. *h*

18. *geminatum*, fol. ovatis integerrimis, calycibusque decemdentatis glabris, pedunc. axillaribus geminis unifloris, caule scandente. Vahl. eclog. 1. p. 21. Hab. in Cajenna. *h*

19. *retrofractum*, fol. ovatis glabris, ramulis axillaribus retrofractis, umbellis axillaribus terminalibusque sessilibus, cal. truncatis. Vahl. eclog. 1. p. 21. Hab. in Amer. merid. Aëne S. geminato. *h*

20. *stellatum*, caule inermi fruticoso scandente flexuoso, fol. ovatis glabris acuminatis, pedunc. subgeminatis unifloris axillaribus, calycib. inaequaliter dentatis. Willd. p. 1028. Jacq. ic. rar. 2. t. 325. Coll. 3. p. 254. Hab. Calyx est quadri-quinque- et sex-dentatus: dentibus inaequalibus. Willd. *h*

21. *scandens*, caule inermi volubili, fol. cordatis ovatis dependentibus subtus mollissimis, panic. terminalib. Lin. suppl. 147. Enc. p. 292. Hab. in Surinamo. Caul. herbaceus. Cor. lacin. recurvis.

22. *glandulosum*, caule suffruticoso scandente, fol. geminis ovato-cordatis, pedunc. 3-quinis interfoliaceis, denticul. calycinis glandulaeformibus. Flor. Peruv. 2. p. 35. t. 167. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus. Fol. opposita? Cal. turbinatus, angulato-striatus, carnosus. Lacin. 10, rarius 12-14, glandulaeformibus!

23. *lentum*, fruticosum inerme decumbens, ramis subscentibus, fol. petiolatis ovatis, flor. terminalib. subumbellatis sessi-

lib., cal. 10-dentato. Hab. in Mexico Stam. 4 sessilia, unicum longius pedicellatum. Cor. violacea: limbo 5-gono.

24. *obliquum*, caule inermi suffruticoso, fol. cordatis obliquis acutis, pedunc. lateralib. recurvis, flor. secundis. Flor. Per. 2. p. 35. t. 165. f. a. Habit. in Peruviae nemoribus ad Chinca vicum, Biorguale. Cor. purpureo-violacea. Bacca oblonga.

25. *oblongum*, caule inermi suffruticoso, fol. geminis oblongis acuminatis altero maximo, racemis lateralibus brevissimis, flor. secundis. Flor. Per. 2. p. 34. t. 165. f. b. Habit. in Peruv. nemoribus ad Pillao tractus. Planta glaberrima. Fol. majora tripalmaria, parva quadruplo minora. Bacca lutescens.

26. *biformifolium*, caule inermi suffruticoso flexuoso, fol. geminis oblongo-lanceolatis: altero minimo orbiculato, pedunc. 1-floris interfoliaceis, cal. 10-partito. Flor. Per. 2. p. 32. t. 161. f. a. Hab. in Peruv. nemoribus ad Chinca runcationes. Corol. purpureo-violacea, patent. Calyx multipartitus, lacin. linearib. Bacca luteo-rubra, cal. incarcerationa.

*Obs.* Haec et frequens species tam cal multipartito, quam flor. situ axillari a ceteris differunt Solanis, an ab iis genere disjungendae?

27. *lineatum*, caule inermi fruticoso, fol. geminis ovatis acuminatis lineatis subtus villosis, pedunc. interfoliaceis 1-floris, cal. 10-fido. Flor. Per. 2. p. 31. t. 158. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus ad Munna vicum. Cal. multipartitus: lacin. linearib. Cor. alba, longitudine calycis. Bacca cal. incarcerationa, fusca.

28. *acuminatum*, caule inermi fruticoso, fol. geminis ovatis oblongis acuminatis stricto, racemis lateralibus, flor. secundis. Fl. Per. 2. p. 34. t. 159. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus ad Chinca vicum. Planta glabra, caulis erectus, ramosus. Cor. parva, alba.

29. *filiforme*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis cordatisque obtusis, pedunculis lateralibus filiformibus bifidis subumbellatis. Flor. Peruv. 2. p. 31. t. 159. f. b. In Peruviae collib. Planta habitu Salviae. Caulis granuloso. Corolla albo-caerule

30. *triquetrum*, caule inermi frutescente triquetro, fol. cordatis acuminatis glabris, umbellis oppositifoliis subpedunculatis. Willd. Sp. p. 1029. S. caule triquetro, fol. cordatis in lancea ferrug

productis. Cav. ic. 3. p. 30. t. 25g. Hab. in N. Hispania. Caulis humifusus ramulosus. Umb. 4-flora. Cor. alba. h

31. *foetidum*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis dependentibus, umbel. oppositifol. nantantibus. Flor. Peruv. 2. p. 39. Hab. in Tarmae oppidi versuris et rudratis. Planta foetidissima. Cor. albo-caerulea. Bacca aurea.

32. *urceolatum*, caule fruticoso, fol. oblongis acuminatis, pedunc. oppositifol. 2-4-floris. Flor. Per. 2. p. 35. t. 168. f. a. (S. oppositifolium.) Hab. in Peruviae memorib. ad Vitoc vicum. Planta orgyalis. Fol. undulato-repanda, utrinque glabra. Cal. in flore parvus, in fructu magnus, fere urceolatus. Dantur plures species ubi flores fol. sunt oppositi, hinc nomen minus congruum mutavi.

33. *pulverulentum*, caule inermi fruticoso, ramis pulverulentis, fol. lanceolato-linearibus, racemis rameis subcorymbos. Flor. Peruv. 2. p. 33. t. 163. f. b. (S. angustifolium.) Hab. in memorib. Huancu ad Acamayo tractus. Caulis ramosissimus. Fol. undulata longa venosa. Cor. albo-violacea.

34. *nitidum*, caule inermi fruticoso, ramis glabris nitidis, fol. ovato-lanceolatis acutis, racem. terminalib. subcymosis. Fl. Peruv. 2. p. 33. t. 163. f. a. Habit. in Peruv. memorib. ad Tarmae provinciam. Fol. leviter repanda, venosa. Cor. albo-violacea, pulverulenta. Bacca nigra.

35. *corymbosum*, caule inermi suffruticoso, fol. ovato-lanceolatis acutis, pedunc. florentib. corymbosis. Jacq. ic. rar. 1. t. 40. Collect. 1. p. 78. S. fol. ovatis integris subtrilobisque, flor. cymosis. Retz. obs. 5. p. 22.

β. S. *cymosum*. Fl. Per. p. 31. t. 160. f. a. Hab. in Peruv. cultis, versuris et subhumidis locis. E

36. *nodiflorum*, caule inermi fruticoso, foliis glabris ovatis utrinque acuminatis, umbellis pedunculatis extrafoliaceis (c. caulibus proleuntibus.) Willd. Spec. p. 1035. S. fol. per petiolum decurrentibus, pedunc. filiformib. umbelliferis intrafoliaceis Jacq. ic. rar. 2. t. 326. Collect. 2. p. 288. Hab. in ins. Mauritiis. Pedunc. ex caul. nodis incrassatis rubescentibus proveniunt. h

37. *incurvum*, pubescens, caule herbaceo, fol. ovatis acuminatis, racemis geminis, altero breviori, pedicel. incurvis secundis. Flor. Per. 2. p. 34. t. 164. f. b.

Hab. in Peruv. memorib. ad Munna vicum. Planta bipedalis. Caulis articulationibus incrassatus. Cor. albo-violacea.

38. *patulum*, caule inermi fruticoso, ramis pulverulentis, fol. lanceolatis acutis, racemis terminalib. patulis. Fl. Per. 2. p. 33. t. 164. f. a. (S. lanceolatum.) Hab. in Peruviae memorib. Fol. sesquipalmaria. Cor. violacea magna. Bacca nigra. Pedunc. elongati, gemini, glabri.

39. *havanense*, caule inermi frutescente, fol. lanceolatis nitidis integerrimis, pedunc. subbidor. L. Mant. 47. Swartz. obs. 82. Jacq. amer. 49. t. 35. Ed. picta. t. 48. Fl. Per. 2. p. 39. Hab. in Martiniacae, Jamaicae, Peruv. umbrosis locis. Fol. aliquando gemina. Pedunc. solitarii a-ternique.

40. *anceps*, caule herbaceo, fol. oblongo-lanceolatis, pedunc. axillaribus bi-ternis brevissimis, fructibus conicis anticipib. Fl. Per. 2. p. 35. t. 169. f. a. Hab. in Peruv. memorib. ad Cuchero tractus. Planta herbacea, tripedalis. Fol. integerrima. Flores secundi, parvi, virescentes. Bacca versus apicem multiangularis.

41. *Gnaphaloides*, caule inermi fruticoso, fol. lanceolatis repandis nitidis, umbellis oppositifoliis tomentosis, baccis nutantib. Flor. Peruv. 2. p. 31. (S. calygnaphalium.) Habit. in Peruv. umbrosis. Frutex bi-orgyalis. Cor. violacea. Baccas atrorubrae, saponaceae.

42. *acutifolium*, caule inermi suffruticoso flexuoso, foliis geminis ternis lanceolatis integerrimis, pedunc. 1-floris interfoliaceis. Fl. Per. 2. p. 33. t. 162. f. b. Hab. in Munna memorib. calidis hirsuta. Fol. utrinque hispidula, deflexa. Cor. alba.

43. *sericeum*, caule inermi fruticoso, ramis gracilibus, fol. (parvulis) ovatis lanceolatis sericeis integerrimis, pedunc. lateralib. 2-flor. Flor. Peruv. 2. p. 33. t. 161. f. b. Hab. in Huasenuassi memoribus imis, calidis. Planta triularis. Fol. parva, incana. Cor. violaceo-caerulea, extus sericea. Bacca rubra.

44. *Pseudo-capsicum*, caule inermi fruticoso, fol. lanceol. repandis, umbel. sessilib. Lin. S. fruticosum baccarum. Bauh. pin. 61. Pseudo-capsicum. Doell. pempt. 718. meth. p. 476. Hab. sponte in Madera, nunc ubique in Anthophytorum hortis colitur; autumnus in hyemem usque baccis cerasiformibus rubris copiosis onustus est pulcher hie frutex,

\* *microcarpum*, caule inermi fruticoso, fol. ovato-lanceolatis, umbellis lateralibus, pedunculatis. Vahl. symb. 2. p. 30. Willd. Spec. pl. p. 1026. S. diphylum. Forsk. Hab. in Aegypto. Fol. latis integerrimis, umbel. pedunculatis, fructu triplo minore videtur diversum a S. Pseudo-capsico. Vahl. h

45. *Dulcamara*, caule inermi fruticoso scandente, fol. cordatis glabris, superioribus auriculatis, corymbis oppositifol. L. Flor. dan. t. 60. Black. t. 34. S. Scandens s. Dulcamara. Bauh. pin. Hab. in Europae humentibus. Var. fol. omnibus unilobis et  $\beta$ . pubescentibus, quae forte est S. lignosum, s. Dulcamara marina. Razi. Syn. p. 265, cujus fol. secundum Hudson hirsuta sunt.

46. *crassifolium*, caule inermi frutescente subarmentoso, fol. ovatis integris vel sinuato-angulosis obtusiusculis, flor. pendulis. Lam. enc. p. 284. S. Dulcamara africanum, fol. crassis hirsutis. Dill. elth. 365. t. 275. f. 252. Willd. Sp. p. 1029. Hab. ad Cap. b. spec. h

47. *betaceum*, caule fruticoso inermi, fol. ovato-acutis crassis: limbo crispo, racemis pendulis. Cav. ic. 6. p. 15. t. 524. S. crassifolium. Ortega Dec. p. 117. In N. Hispania. Bacca ovata, magna, luteo-viridis: 3 zonis longitudinalibus fuscis, tandem rubens. C.

48. *crispum*, caule inermi fruticoso, fol. ovatis subcordatisque undulato-crispis acuminatis, flor. corymbosis. Flor. Per. 2. p. 31. t. 158. f. a. Hab. in Chile ruderat. Subtriogyale, amarissimum. Cor. dilute violacea. Bacca albo-lutescens. Incolae, quibus Natre dicitur, decoctum vel infusum ad febres inflammatorias in frequentati usu habent.

49. *leprosum*, caule erecto, fol. oblongisinnatis subtus lueanis, pedunc. s. litaris bifloris. Ortega Dec. p. 115. Bacca lutescens, cerasi magnitudine.

50. *foefolium*, caule fruticoso erecto, fol. cordatis sinuatis, racemis lateralibus 2-3-fidis subcymosis. Ortega Dec. p. 116. Hab. in insula Cuba. Cor. alba, cal. quadruplo longior.

51. *Chenopodioides*, caule inermi subherbaceo, fol. ovato-oblongis repando-sinuatis subhirsutis, junioribus subtus tomentosis. Lam. enc. p. 240. S. chenopodioides acinis albescentibus. Few. obs. 2. t. 14. Hab. in ins. Mauriti.

52. *Phyllanthum*, caule inermi herbaceo alato, fol. sinuato-lobatis floriferis. Cav. ic. 4. p. 35. t. 359. f. 1. S. caule alato, foliis decurrentibus ovatis subtriangularibusque, racemis oppositifol. flor. pendulis. Fl. Per. 2. p. 32. Ha it. in Limae, Chan-cay et Lurin arenosis locis. Pedunc. oppositifolii, usque ad foliorum discum decurrentes. Spec. singularis ob fol. a medium pedunculis adnata. Folia cuneata, 5-loba. ☉

53. *pygmaeum*, caule herbaceo inermi pollicari, fol. ovatis trilobis. Cav. ic. 5. p. 23. t. 439. f. 2. Hab. in planitie vulgo Pampas de Buenos-Ayres. Caul. simplex, terminatus florib. ut plurimum binis. Fol. minima. Bacca minuta, villosa, globosa. ☉

54. *nigrum*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis dentato-angulatis, racemis distichis nutantib. Lin. Flor. Dau. t. 4<sup>to</sup>. ☉

\* *patulum*, ramis teretibus glabris, fol. integerrimis glabris. Dill. elth. 367. t. 275. f. 355. Hab. in India.

\* *villosum*, ( *moschatum* ), ramis teretibus villosis, fol. angulatis subvillosis, bac. luteis. Dill. elth. 366. t. 274. f. 353.

\* *guineense*, ramis angulatis dentatis, fol. integerrimis glabris. Dill. t. 274. f. 354. Lam. enc. 4. p. 289.

\* *virginicum*, ramis angulatis dentatis, fol. repandis glabris. Dill. t. 275. f. 256. S. alatum. Moench. meth. p. 474. Sw. obs. 83. Hab. in Amer.

$\beta$ . *judaicum*, ramis aculeis incurvis, fol. repandis nudis. Cum priore.

\* *hirsutum*, ramis teretibus folisque integerrimis hirsutis. Vahl. symb. 2. p. 40. S. aegyptiacum. Lam. l. c.

Obs. Varietates sic dictae Sol. nigri revera species sunt et cultura non mutantur, excepto S. judaico, quod s. virginici varietas est. Willd. p. 1014. Ob conformitatem, quae inter eas obinet, ut subpecies hic enumeratae sunt.

55. *aethiopicum*, caule inermi herbaceo, fol. ovatis repando-angulatis, pedunc. fertilibus unifloris cernuis, fruct. torulosus. Jacq. hort. t. 12. S. torulosum. Moench. Hab. in Aethiopia. Fruct. ruber, magnus, profunde torulosus s. sulcatus.

56. *triste*, caule inermi frutescente, fol. lanceolato-oblongis subrepandis glabris, racemis subcymosis. Jacq. amer. 50. t. 40. f. 2. Ed. pict. t. 49. Hab. in Maritima. h

57. *racemosum*,



57. *racemosum*, caule inermi frutescente, fol. lanceolatis repandis undulatis, racemis longis rectis. Lin. Jacq. amer. 50. t. 36. Ed. pict. t. 50. Hab. in Martinica, Surinami. Flor. albi. Pedunc. apice crassiores. h

58. *quadrangulare*, caule inermi frutescente tetragono, fol. ovatis integris angulatisque, flor. paniculatis. Thunb. prod. 36. Lin. suppl. 147. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. saepe decurrunt et caules angulos crispiformant. L. h

59. *triangulare*, caule inermi herbaceo trigono. fol. oblongo-ovatis integerrimis nudis, cor. pallide violaceis. Lam. enc. 4. p. 290. Rumph. G. t. 26. f. 2. Hab. in Ind. orient. ©

59. *repandum*, caule inermi subherbaceo flexuoso laevi, fol. ovatis repandis tomentosis, pedunc. axillaribus cymosis. Forst. prod. n.º 105. Hab. in Marchionis et Societatis insulis.

60. *bonariense*, caule subinermi fruticoso, fol. ovato-oblongis sinuato-repandis scabris. L. Dil. elih. t. 272. f. 351. Hab. in agro Bonariensi. Aculei aliquot in tenello caule. Flor. albi, magni, nutantes. Planta coronaria. h

61. *macrocarpon*, caule inermi suffrutescente, fol. euneatis repandis glabris. L. excl. Feuilli synonymo. Habit. in Peru. Caul. rigens. Bacc. pomiformes, flavae.

62. *angulatum*, caule bienni, fol. cordatis sinuato-angulatis, racem. lateralib. brevissim. pauciflor. recurvis. Flor. Peruv. 2. p. 36. ic. 170. f. a. S. amplissimo anguloso hirsutoque folio, fructu aureo maximo. Few. obs. 3. p. 61. t. 46. Hab. in Peruv. hortis. S. *quiloense*. Lam. enc. 4. p. 285. Ulnaris, hirsutissima. Corolla albo-violacea. Bacca globosa, parvi citri aurantii magnitudine et colore.

\* \* *Folii laciniatis et pinnatis.*

63. *lyratum*, caule inermi herbaceo erecto, fol. lyrato-hastatis tomentosis. Th. jap. p. 92. Hab. juxta Nagasaki in Japonia. Totum tomentosum. Fol. inferiora lyratopinnatifida, superiora hastata.

64. *Tegore*, caule inermi fruticoso hirsutissimo, fol. petiol. inferiorib. pinnatifido-sinuatis, superiorib. cordatis, racem. simplicib. axillarib. Willd. Aubl. guj. 1. p. 212. t. 84. Hab. ad ripas fluvii Sinemari Gujan. h

65. *aviculare*, caule fruticoso inermi glaberrimo, fol. pinnatifidis, lacini lanceolatis acutis, panic. axillaribus binis

ternisve. Ait. Kew. 1. p. 247. Curt. mag. t. 349. (S. laciniatum. Willd. p. 1030.) S. *aviculare*. Forst. prod. n.º 107. Lam. enc. 4. p. 292. Hab. in N. Zeelandia. Fl. Geranii pratensis, laciniis corol. emarginatis. Anth. separatae. Willd. h

66. *quercifolium*, caule inermi subherbaceo angulato flexuoso scabro, fol. pinnatifidis, racem. cymosis. L. Sp. pl. 264. Fl. Per. 2. p. 36. Few. Peruv. 772. t. 13. In Peruv. versuris. Cor. violaceae; maculis duabus viridibus ad basin singuli lob. Similis S. sequenti, differt: fol. scabris, lobisq. paniculato-corymbosis majoribus. Willd.

67. *ralicans*, caule inermi herbaceo laevi teretiusculo prostrato radicante, fol. pinnatifidis, racem. cymosis oppositifol. Lin. Dec. 1. 10. Hab. in Peru. In Flor. Peruv. non occurrit. T

68. *reclinatum*, caule inermi sulcato ramoso, fol. pinnatifidis; pinnulis longis sublineari. decurrentibus, pedunc. racemosis axillarib. Colitur in hortis. Vill. le Botaniste-Cultivateur, 2. p. 134. Tot. glabr. Flor. magni, caerulei.

69. *runcinatum*, caule herbaceo procumbente anguloso, fol. laciniato-pinnatifidis, corymb. terminalibus, dichotomis. Flor. Per. 2. p. 36. Hab. in Peruviae et Chilensis regni rudernis et versuris. Pl. succosa, fragilis, tripedalis. Fol. subbruncea. Cor. violacea, revoluta. Bacca parva, lutea.

70. *pinnatifidum*, caule herbaceo alato fol. decurrentib. pinnatifidis, flor. paniculat. Fl. Per. 2. p. 37. t. 170. f. b. S. caule herbaceo erecto laevi, fol. ampl. profunde pinnatifidis glaberrimis, flore plano. Lam. ill. n.º 2133. t. 115. f. 4. enc. 4. p. 287. Hab. in Peruv. arenosis. Planta succosa. Caul. fragilis. Corolla dilute caerulea. Bacca lutea.

71. *multifidum*, caule herbaceo nudo, fol. multifidis, in petiolum decurrentibus, pedunc. dichotomo-paniculatis. Fl. Per. 2. p. 37. t. 171. f. a. Lam. enc. 4. p. 287. Hab. in Peruv. collibus ad Pungo prov. Camanae vicum. S. pinnatifido affine, sed caul. teres non alatus. Fol. semi-amplexicaulia. Corolla obscure caerulea.

72. *pinnatum*, caule inermi herbaceo sulcato, fol. pinnatis, flor. corymbosis. Cav. ic. 5. p. 21. t. 339. f. 1. Hab. prope Coquimbo in Chile. Caulis est fere alatus ex decursu foliorum. Corolla saturate lutea. Bacca globosa, nigra. Fol. potius pinnatifida sunt. ©

73. *pomiferum*, caule herbaceo villosa, fol. interrupte pinnatis, fructu oblongo inverse conico. Cav. Descr. p. 112. Flores racemosi. Baccæ obconicæ.

74. *peruvianum*, caule inermi herbaceo, fol. pinnatis incisissimis tomentosis (incanis), racem. bipartitis foliosis, baccis subpilosissimis. Lin. Jacq. ic. rar. 2. t. 327. Collect. 2. p. 284. Fl. Per. 2. p. 37. Hab. in Peruv. aridis locis, versur. et ruderat. Fl. longe pedicellati. Corolla lutea; laciniis acutis reflexis.  $\overline{\text{L}}$

75. *Lycopersicum*, caule inermi herbaceo, fol. pinnatis incisissimis, racem. bipart. aphyllis, fructibus glabris torulosissimis. Murr. syst. veg. 224. S. pomiferum fructu rotundo striato molli. Bauh. pin. 167. Pomum amoris. Rumph. amb. 5. p. 417. t. 154. f. 1. Flor. Per. 2. p. 37. Hab. in Amer. calidior.  $\odot$

Obs. Secundum auctores Fl. Peruv. l. c. in ruderatis maritimis regni peruviani abundat S. Lycopersici varietas illa, quam C. Bauhinus Solanum racemosum cerasorum forma nuncupat. Pin. p. 167, quæ hirsuta procumbens est, an distincta?

76. *Pseudo-Lycopersicum*, caul. inermi herbaceo, fol. pinnatis incisissimis, racem. simplicibus, fructibus subvillosis laevibus. Jacq. hort. 1. t. 11. Hab. . . Var. prioris? cui simillimum.  $\odot$

77. *tuberosum*, caule inermi herbaceo, fol. interrupte subcorymbosis pinnatis integerrimis, pedunc. S. tuberosum esculentum. Bauh. prod. 89. t. 89. Flor. Peruv. 2. p. 38. Hab. sponte in collib. et prædijs in Peru. Innotuit 1590. C. Bauhino.  $\overline{\text{L}}$

78. *pimpinellifolium*, caule inermi herbaceo, fol. pinnatis integerrimis, racem. simplicibus. L. Amoen. acad. 4. p. 268. Hab. in Peru.  $\text{h}$

79. *montanum*, rad. tuberosa, caule inermi herbaceo, fol. subcordatis repand. L. fol. ovatis integr. laciniatisque. Fl. Per. 2. p. 32. t. 160. f. a. Hab. in Peru, in collib. arenosis et saxosis.

80. *mite*, caule herbaceo radicante, fol. impari-pinnatis, foliol. oblongis, racem. axillaribus aggregatis, baccis glabris. Flor. Per. 2. p. 38. t. 173. f. a. Hab. in Chinæ vicis in locis humidis et umbrosis in Peruvia. Caul. nitidus, flexuosus. Fol. minutissima. Flor. minimi, albi.

81. *diffusum*, caule suffruticoso, ramis virgat. diffusis, fol. impari-pinnatis, foliol. oblongis, pedunc. axillaribus, 2-3-flor. Flor.

Per. 2. p. 37. t. 171. f. b. Hab. in Peruviae nemoribus ad Huancu provinciam. Jasmini facie. Cor. violacea, patens.

82. *pendulum*, caule fruticoso, foliis pinnatis: foliol. 2-6-nis oblique cordatis, racem. dependentibus furcat. Fl. Per. 2. p. 39. t. 174. f. a. Hab. in Panathauarum provinciae nemoribus. Cor. elongata profunde 5-fida: lacin. acutis, subpubescens, purpurea.

83. *conicum*, caule herbaceo, fol. impari-pinnatis: foliol. oblongo-lanceolatis, pedunc. axillaribus, subternis apicatis, fructu conico. Flor. Per. 2. p. 38. t. 172. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus ad Chinæ et Cuchero tractus. Cor. albo-caerulea. Bacc. conica, alba.

84. *ternatum*, caule suffruticoso tetragono scandenti radicante, fol. ternatis, pedunc. axillaribus. Flor. Per. 2. p. 38. t. 172. f. a. Hab. in Peruviae nemor. humidis. Planta glabra. Fol. longe petiolata. Bacc. ovato-conica albicans.

#### ++ Aculeata (Folia in plurimis sinuato-lobata.)

85. *insanum*, caule aculeato herbaceo, fol. ovatis tomentosis, pedunc. pendulis, in crassatis, cal. aculeatis. Pluck. alm. 550. t. 226. f. 3. Moris. s. 13. t. 2. f. a. Triongum hortense. Rumph. amb. 5. p. 238. t. 85. In Indiis. Affinis S. Melongenæ, Differt caule, et fol. aculeatis.  $\odot$

\* *zeylanicum*, caule aculeato fruticoso, fol. ovatis sinuatis, subtomentosis, calycibus aculeatis, fructu oviformi. Scop. delic. insubr. 1. t. 1. Lam. enc. p. 295. Hab. in Zeylona.

86. *torvum*, caule aculeato fruticoso, aculeis curvis, fol. subcordatis ovatis sinuatis, tomentosis, rachibus aculeatis, cal. inermibus. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 456. S. indicum. L. Sp. pl. 1. p. 187. Pluck. alm. 350. t. 225. f. 6? Hab. in sepibus Jamaicae et insularum Bermudensium. Var. fol. inermibus: petiol. solis hinc inde aculeatis. S.  $\text{h}$

87. *volubile*, caule aculeato fruticoso scandente, fol. angulatis, petiol. rachibus calycibusque aculeatis. Swartz. l. c. p. 458. S. sarmentosum. Lam. enc. 4. p. 306. S. lanceifolium. Jacq. ic. 7. Habit. in sylvis Hispaniolæ.  $\text{h}$

88. *ferox*, caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulatis, tomentosis, aculeatis, lacc. hirtis cal. obtusis. Hab. in Malabar. Statura S. Melongenæ. Cal. aculeati, obtegentes totas baccas hirtas.

89. *campechiense*, caul. fruticoso aculeato hirtio, fol. cordato-oblong. quinquelobis dentatis; cal. aculeatissimis. Willd. p. 1039. Dill. elth. 361. t. 268. f. 367. Lam. enc. 4. p. 227. Hab. in America. Fol. setis stellatis divergentibus. An à sequente diversum? h

90. *fuscatum*, caule herbaceo aculeato, fol. cordato-ovatis sinuato-lobatis obtusis lob. subangulatis, aculeis superiorib. coloratis. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 42. Collect. 1. p. 51. Lam. l. c. t. 296. Habit. in Amer. Rami varie spinosi, latere solari fusciscentes. ©

91. *mammosum*, caule aculeato herbaceo, fol. cordatis angulato-lobatis utrinque villosis aculeat. Lin. Pluck. alm. 350. t. 226. f. 1. Merian. surin. 27. t. 27. Hab. in Virginia, Barbados. ©

92. *hirtum*, fruticosum aculeatum, fol. cordato-angulatis tomentosis aculeatis, peduncul. lateralibus aggregatis calycibusque hirsutissimis. Vahl. symb. 2. p. 40. Hab. in ins. Trinitatis. h

93. *paniculatum*, caule petiolisque aculeatis, fol. sinuato-angulatis supra glabris, flor. paniculatis. L. Hab. in Brasilia. Caul. et petioli albo-tomentosi aculeis rectis.

94. *crinitum*, fruticosum aculeatum. fol. ovat. sinuato-angulat. tomentosis, petiolis, pedunc. calycibusque echinatissimis. subcrinitis. Lam. encyc. p. 297. Hab. in Cajenna. Le Ecland. h

95. *aculeatissimum*, caul. fruticoso aculeatissimo, fol. cordatis quinquelobo-sinuato. pilo inaequali, calyc. subaculeatis. Willd. Jacq. ic. rar. 1. t. 41. Collect. 1. p. 100. Hab. in Amer. Affine S. campechiensi. h

96. *virginianum*, caule erecto aculeato, fol. pinnatifid. undique aculeatis, lacinii sinuatis obtusis, margine ciliatis, calycibus aculeatis. Willd. p. 1041. Dill. elth. 360. t. 267. f. 346. Pluck. alm. 351. s. 62. f. 3. Hab. in Amer. ©

97. *Jacquini*, caule decumbente diffuso aculeato, fol. pinnatifid. undique aculeatis-lacin. sinuatis obtusis, margine nudis, cal. aculeatis. Willd. S. virginianum. Jacq. ic. rar. 2. t. 332. Coll. 2. p. 285. Hab. in India orient. ©

98. *xanthocarpum*, caule decumbente diffuso aculeato, fol. pinnatifidis aculeatis stellato-pubescentibus: lacin. sinuatis acutis margine nudis, calycibus aculeatis. Willd. Schrad. et Wendl. scrt. Hannov. 1. p. 8. t. 2. Hab. in Aethiopia. S. Jacquini simile. ©

99. *coagulans*, caule aculeato fruticoso, fol. oblongis repando-sinuatis tomentosis aculeatis 8 lobis rotundatis integris. Vahl. symb. 2. p. 41. Forsk. descrip. 47. Hab. in Arabia felici. h

100. *jamaicense*, caule aculeato fruticoso, fol. cuneatis medio latioribus obtusangulatis utrinque tomentosis, rachibus calycibusque aculeatis: aculeis reflexis. Sw. flor. ind. occid. 1. p. 454. Hab. in ruderatis Jamaicae, Hispaniolae. S. tomentosum refert. h

101. *indicum*, caule aculeato fruticoso fol. cuneiformih. angulat. subvillosis integerrimis: aculeis utrinque rectis. L. Burm. zeyl. 220. t. 102. Dill. elth. 362. t. 270. f. 349. S. cuneatum Moench. meth. p. 476. Hab. in India. h

102. *undatum*, fruticosum aculeatum, fol. ovatis repand. subtus tomentosisculis, aculeis nudis. Lam. enc. 4. p. 301. Rheed. malab. 2. t. 37. Hab. in ins. Mauriti. Flor. corymbosi, interdum 1-flori. Bacca magna, ovata.

103. *heterophyllum*, fruticosum aculeatum, fol. ovatis sinuato-repandis subtus tomentosisculis, aliis minoribus obovatis integerrimis. Lam. enc. p. 301. Hab. in Gujana. Fl. racemosi. Fol. magna.

104. *ciliatum*, caule aculeato herbaceo, fol. cordatis sinuato-angulatis aculeatis ciliatis pedunculis brevibus paucifloris. Lam. ill. n°. 2160. encycl. 4. p. 298. Hab. . . . Flores parvi, subcaerulei.

105. *anguivi*, aculeatum fruticosum, fol. ovatis sinuato-angulosis subtus tomentosis, cal. inermibus. Lam. enc. 4. p. 304. Ill. n°. 2175. Habit. in insula Madagascar. Flor. racemosi. Fructus parvi, rubri, esculenti.

106. *carolinense*, caule aculeato annuo, foliis hastato-angulatis: aculeis utrinque tectis, racemis laxis. L. Jacq. ic. rar. 2. t. 331. Coll. 2. p. 287. Dill. elth. 362. t. 269. f. 348. Michaux, Flor. 1. p. 150. In Carolin. Caulis pumilus. Folia ovali-oblonga basi acuta. Michaux. Caulis quasi fruticosus, sed annuus.

107. *sinuatum* (villosum), caule fruticoso tereti aculeato, fol. bipinnatifido-sinuatis villosis utrinque aculeatis, calycibus villosis aculeatis. Willd. p. 1043. Hab. . . . Differt a S. Sodomeo: fol. villosis bipinnatifidis, corol. flavis, baccis calyce tectis. Willd. h

108. *solomeum*, caule aculeato fruticoso tereti, fol. pinnatifido-sinuatis sparse aculeatis, nudis, calycibus aculeatis. Moris. s. 3.

t. 1. f. 15. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 4? In Africa. *h*

109. *capense*, caule aculeato fruticoso tereti, fol. sinuato - pinnatifidis aculeatis nudis, lacin. altern. integr. obtusis. Linn. suppl. 147. Hab. in Cap. b. s. ei. Planta copiosa aculeorum horrida. *h*

110. *marginatum*, aculeatum, fol. cordat. repand. margine albis. Lin. suppl. 147. Jacq. ic. rar. t. 45. Collect. t. p. 50. Habit. in Abyssinia. Caulis albo-tomentosus. Cal. inermes, fructiferi aculeati.  $\beta$ ? S. arzyracantha. Courset Botan. cultivateur, 4. p. 48. Cal. 6 - 7 - fidus. Stam. saepe 6. *h*

111. *stramonifolium*, caule aculeato-fruticoso, fol. cordat. angulato-lobat. integris subinermibus, subtus tomentosiusculis. Ait. Kew. 1. p. 252. Jacq. ic. rar. t. 44. In Italia occident. *h*

112. *toxicarium*, fruticosum aculeatum, fol. lobato-angulosis tomentosis basi oblique emarginatis, aculeis utrinque sparsis, racemis sessilibus, lacin. corollae sublanceolatis. Rich. in Act. Soc. Paris. Lam. encycl. p. 309. Hab. in Gujana.

113. *hispidum*, caule aculeato fruticoso hispidissimo, setis apice stellatis, fol. lobatis, corymb. magn. dichotomis. Flor. Per. 2. p. 40. t. 176. f. b. In Peruvia ruderalis. (S. *stellatum*.) Folia superiora nonnulla ovata, integerrima, acuta; pauca subrepanda, reliqua cordata, 7-11-lobata subspithamea, subtus valde hirsuta, supra aspera setis minimis in stellularum formam dispositis.

114. *incanum*, caule arboreo aculeato, fol. juniorib. 7-9-lobatis; adultis sinuatis, racemis 2-3-nis subcorymbosis, fl. secundis. Flor. Per. 2. p. 40. t. 175. f. b. Hab. in Peruv. praeruptis, ad torrentium margines Arbor 4-orgyalis et ultra. Fol. supra nitida, subtus tomentosa, alba. Cor. alba. Fol. ad ulcera canerosa adhibentur.

115. *Milleri*, caule fruticoso aculeato, fol. glabris subquinquelobo - pinnatifidis integerrimis, aculeatis, pedunc. 1-flor. subgeminatis. Willd. Sp. 1. p. 1049. Jacq. ic. rar. 2. t. 330. Collect. 4. p. 209. Lin. suppl. p. 270. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

116. *trilobatum*, caule aculeato fruticoso, fol. cuneiformi-angulatis subtrilobis obtus. glabris, flor. racemosis. Willd. l. c. Burm. ind. p. 27. t. 22. f. 2. S. accorae-folium. Lam. encyc. Pluck. alm. 351. t. 316. f. 5. p. 306. Hab. in Jam. et India orient. Caulis alatus. Fol. parva glabra. *h*

*Obs.* Hoc cum praecedente conjunxit Linnæus, ab illo vero diversum fol. nunquam pinnatifidis, cor. quadruplo et ultra majorib. violaceis. Willd.

117. *laciniatum*, caule aculeato fruticoso scandenti, fol. geminis lacinatis: altero lanceolato-integerrimo, racem. filiformibus longissimis. Fl. Per. 2. p. 40. t. 177. f. a. Hab. in nemorib. Chincac et Cuchero. Cor. caerulea. Bac. globoso-ovata, magnitudine parvi pyri, aurea.

118. *tectum*, aculeatum, fol. bipinnato-sinuatis, fructu tecto. S. *fractu-tecto*. Cav. ic. 4. p. 5. t. 309. Hab. in Imperio Mexico. Caulis, foliorum nervi et calycei aculeati. Fl. racemosi. Cor. lutea, extus tomentosa. Bac. calice aucto tecta.

119. *sisymbriifolium*, aculeatum, fol. subbipinnatifidis villosis aculeatis; lobis dentatis, stigmatibus bilobis. Lam. ill. 2286. enc. p. 307. Hab. circa Buenos-Ayres. Commerson.

120. *cornutum*, aculeatum, fol. pinnato-pinnatifidis aculeatis, antheris declinatis corniformibus; infra maxima productissima. Lam. enc. p. 308. Juss. in Annal. d. Museum. 14. p. 120. t. 9. Habit. in Mexico Fl. lutei, subinaequales. Cal. spinosus.

121. *Vesperilio*, caule aculeato fruticoso, fol. cordat. integris, cor. subirregularibus, anthera ima productiore. Ait. Kew. 1. p. 252. Wendl. hort. Herrenh. p. 5. t. 21. Hab. in insulis Canariis. Una ex antheris imis longissima arcuata. *h*

122. *sanctum*, caule aculeato fruticoso, aculeis tomentosis foliisque oblique ovatis repandis. Lin. Vahl. symb. 2. p. 41. Pluck. alm. 351. t. 316. f. a. Hab. in Palaestina. Caul. tomentosus, cinereus, aculeis crassis, flavescens. *h*

123. *hybridum*, caule aculeato fruticoso, fol. ovatis subinermibus acuto repandis; tenellis dorso et ad oras violaceo - pulverulentis. Linn. Jacq. hort. 2. t. 113. Habit. in Guinea. *h*

124. *tomentosum*, caule aculeato fruticoso, aculeis acerosis rectis, fol. cordatis inermibus, subrepandis; tenellis purpureo-pulverulentis. Kocc. sic. 8. t. 5.

$\beta$ ? *coccineum*, caule aculeato fruticoso, fol. ovatis subrepandis, uno alterove alculo armatis subtomentosis. Jacq. ic. rar. t. 43. Habit. in Aethiopia. *h*

125. *rigidum*, aculeatum frutescens humile, fol. ovatis sinuato-angulosis aculeatis nudiusculis, aculeis rectis albid. Lam. enc. p. 303. Hab. . . *h*

128. *polygamum*, caule aculeato, foliis ovato-oblongis subintegris supra scabriusculis, subtus tomentosis. Vahl. symb. 3. p. 39. t. 55. Hab. in ins. St. Crucis. h

129. *bahamense*, caule aculeato fruticoso, fol. lanceol. repandis obtusis margine reflexis, racem. simplicib. Linn. Dill. elih. 263. t. 271. f. 250. Sloan. jam. 108. hist. 1. p. 38. t. 11. f. 3. Habit. in Americae insula Providentia. h

130. *obscurum*, fol. elliptico-lanceolatis planis subtus villosis, racem. lateralibus, caule petiolisque aculeatis. Vahl. symbol. 2. p. 41. S. crotonoides. Lam? Habit. in Cajenna. h

131. *giganteum*, caule aculeato fruticoso: aculeis tomentosis, fol. lanceol. acutis inermibus, supra glabris, subtus tomentosis et incanis, racem. dichotom. cymosis terminalibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 328. Coll. 4. p. 125. S. *niveum*. Vahl. symb. 2. p. 41. Th. pr. 36. Hab. ad Cap. b. spei. h

132. *scabrum*, caul. aculeato fruticoso, fol. sinuato-angulatis, scariis, corymb. dichotomis, flor. intus secundis. Fl. 2. Per. p. 39. t. 175. f. a. Habit. in Peruviae versuris et ruderalis. Fol. subtus valde venosa, utrinque setis minimis in stellularum formam digestis scabra. Bacca aurantiace loco saponis ad crines et vestimenta ablucenda inseriunt.

133. *incarceratum*, caule aculeato fruticoso, fol. geminis cordatis aculeatis, flor. secundis, bac. glabr. cancellatis. Flor. Per. 2. p. 40. t. 176. f. a. Hab. in Peruv. nemoribus, ad Chincaos runcationes. Calyx inermis, in flore reflexus, infructu erectus. Cor. albo-violacea. Bacca alba, oblonga, venosa, glaberrima.

134. *flexuosum*, fol. geminatis elliptico-lanceolatis, scabriusculis integris, subtus petiolisque aculeatis, florib. tetrandris. Vahl. eclog. 1. p. 22. Habit. in Cajenna. Valde affine S. obscuro. h

135. *lanceolatum*, caule fruticoso tomentoso aculeato, fol. angusto-lanceolatis integerrimis, subtus tomentosis inermibus, panicula terminali. Willd. Cav. ic. 3. p. 23. t. 245. S. cymosum. Ortega Decad. 1. p. 12. Hab. in Mexico. Flor. caerulei terminales magni. h

136. *eleagnifolium*, caule fruticoso petiolis folisque lanceolatis obtusis inferne tomentosis subaculeatis, racem. lateralibus. Willd. Cav. ic. 3. p. 22. t. 243. Habit. in Amer. calidior. Aculei capillacei. h

137. *polyacanthos*, aculeatissimum, fol.

linearilanceolatis subrepandis subsessilibus obtusis, pedunc. axillarib. unifloris, aculeis acicularib. Vahl. eclog. 1. p. 24. Lam. enc. 2. p. 23. S. (*parviflorum*.) Cavan. ic. 3. p. 19. t. 236. Plum. ic. 218. t. 224. f. 1. Hab. in ins. Dominica. Corol. alba. Bacc. minima. h

138. *igneum*, caule aculeato fruticoso, fol. lanceolatis acuminatis basi utrinque revolutis, racem. simplicibus. Linn. Jacq. hort. t. 14. Pluck. alm. 350. t. 225. f. 5.

β. S. *parvifolium*. Vahl. eclog. 1. p. 23. Hab. in Amer. Flor. albi. Spinae rubro-ignae.

139. *pyracanthos*, caule aculeato fruticoso, fol. oblongis acutis sinuatis tomentosis: utrinque aculeis rectis subcoccineis. Lam. encyclop. 4. p. 299. Hab. in ins. Madagasc. Caul. obscure fuscus, apice et in juniorib. tomentosis.

140. *asperum*, caule aculeato arboreo, fol. oblongis solitariis geminisque, corymbis r. meis subdichotomis Flor. Peruv. 2. p. 39. t. 174. f. b. (S. *aspero-lanatum*.) Hab. in Peruv. praeruptis ad Huassavassi arcem. Frutex aspero-lanatus: lanugo lucida in stellae formam digesta. Caulis erectus superne ramosissimus, vix aculeatus. Cor. alba. Bacca lutea.

### +++ Spinosa.

141. *lycioides*, caule fruticoso spinoso, fol. ellipticis, pedunc. aggregatis unifloris. Jacq. ic. rar. 1. t. 46. Collect. 1. p. 96. Flor. Per. 2. p. 41. t. 177. f. b. Habit. in Peruv. locis argillosis et petrosis, passim ad Huancu et Tarmae provincias. Caul. ramosissimus, ramis in spinam foliosam floriferam desinentib. Cal. lacin. appendiculatae. Anth. liberae. Corol. in hortis nivea, in Peruv. caerulea, fundo lutescens. Bacca globosa, rubro-crocea. Sem. ossea. An diversum genus? h

507. CAPSICUM. Cor. rotata.  
Bacca ex ucca.

1. *annuum*, caule herbaceo, pedunculis solitariis. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1050. Rheed. 2. t. 35. Hab. in America meridionali. ☉

2. *baccatum*, caule fruticoso laevi, pedunc. geminis. Lin. Rumph. 5. t. 88. f. 2.

3. *sinense*, caule fruticoso, pedunculis geminatis, fructib. ovatis pendulis, foliorum petiol. subpubescentib. Willd. Jacq. hort. v. 3. t. 67. Habit. in China. Fructus ovatus magnitudine cerasi. h

4. *grossum*, caule suffrutescente, fructib. incrassat. variis. Mant. 47. Besl. syst. aut. t. 2. f. 1. Hab. in India. Fructus maximus.

5. *frutescens*, caule fruticoso, pedunc. solitariis, fructibus oblongis. Willd. Clus. exot. 340. f. 2. Rumph. 5. t. 88. f. 1. 3. 4. Hab. in Indis. h

6. *cerasiforme*, caule fruticoso, pedunc. solitariis, fructibus globosis. Willd. Hab. .... Simile antecedenti, sed fructus globosus. W.

508. CESTRUM. *Cor.* infundibuliformis : lac. acutis marginatis. *Stam.* denticulo in medio, ant. edentula. *Anth.* 4-gonae. *Bacca* 1-2-locularis. *Sem.* pauca, angulata.

1. *laurifolium*, filamentis denticulatis nudisve, fol. elliptic. coriaceis nitidissim., pedunc. petiolo breviorib. L'Herit. stirp. 1. p. 69. t. 34. Willd. Sp. 2. p. 1054. C. venenatum. Lam. encyc. 1. p. 680. Pluck. phyt. t. 95. f. 1. Hab. in America. h

2. *macrophyllum*, filam. denticulatis, fol. ovato-oblongis acuminais glaberrimis, flor. fasciculatis sessilib. Vent. Choix de Pl. p. 18. t. 18. Hab. in ins. Antillanis, Porto-Rico. Riedel. Priori affine. Cor. alba.

3. *nocturnum*, filamentis dentatis, pedunc. subracemosis folio aequalib. L'Herit. stirp. 1. p. 70. Dill. elth. 183. t. 153. f. 185. Pluck. alm. 35. t. 64. f. 3. Hab. in Jamaica. Chili. h

4. *Parqui*, filamentis denticulatis nudisve, caule florifero paniculato, stipulis linearib. L'Her. l. c. 1. t. 36. Parqui. Feuil. Peruv. 2. p. 72. t. 32. f. 1. C. virgatum, fol. lanceolatis acutis, ramis floriferis paniculatis, pedunc. corymboso-racemosis. Flor. Peruv. 2. p. 27. Hab. in Chili locis humidis. h

*Obs.* In Flor. Peruv. l. c. p. 28. de hac specie sequentia prolata sunt. L'Heritierius folia ramulorum inferiorum perperam *stipulas* appellavit, et Filam., contra ejus assertionem, in loco natali *edentula* sunt, nec non ad basin solummodo tumida ac villosa.

5. *auriculatum*, filamentis edentatis, stipul. amplexicaulib. lunatis, fol. ovatis, flor. paniculat. terminalib. Willd. C. Hediunda. Lam. enc. 1. p. 680. Hediunda Jasmini flor. Feuil. Peruv. 2. p. 25. t. 20. f. 3. Habit. in Limae humidis.

6. *auriculatum (affine)*, foliis ovatis oblongo-lanceolatisque, auricul. (stipulis) oblique cordatis, ram. florifer. divergentib., pedunc. corymboso-paniculatis. Flor. Peruv. 2. p. 28. t. 155. f. 2. Hab. in Per. versuris, ruderatis, scopibus.

*Obs.* An ob stipulae formam diversa ab C. auriculato. L'Her. cujus stipulas etiam reniformes, amplexicaules observavi sed saepius tantum in ram. juniorib. fl. expertis.

6. *scandens*, filamentis edentulis, fol. ovatis attenuatis glabris, racem. axillaribus subcompositis, ramis scandentibus. Vahl. eclog. 1. p. 24. Hab. prope St. Martham. h

7. *undulatum*, filam. dentatis, fol. ovatis acutis undulatis, pedunc. axillaribus terminalibusque paucifloris. Fl. Per. 2. p. 28. t. 155. Hab. in Peruv. ruderatis praesertim ad Huanuci urbem.

8. *confertum*, fol. ovato-ovalibus acuminais coriaceis confertissimis, flor. axillaribus congestis sessilib. Flor. Per. p. 29. t. 153. In Peruv. sylvis. Cal. ciliatus. Cor. lutescens : limbo externe atro. Filam. edentula.

9. *conglomeratum*, fol. lanceol. acutis, flor. axillarib. numerosissim. conglomeratis sessilib. Flor. Per. t. 156. Cresc. in Peruviae praeruptis locisque altis frigidis. Flor. nonnulli limbo 6-7-fido. Stigm. concavum.

10. *vespertinum*, filamentis edentatis, tubo filiformi (longo), pedunc. brevissimis. L'Herit. stirp. 1. p. 72. C. *confertum*. Miller. Jasminum laurinis foliis, flore pallido luteo, fructu atro-caeruleo. Sloan. hist. 2. p. 96. t. 204. f. 2. Hab. in America. Cortex et fructus foetentes. Sw. h

11. *diurnum*, filament. edentatis, lacin. cor. subrotundis reflexis, fol. lanceolatis. L'Her. stirp. 1. p. 74. Dill. clib. 186. t. 154. f. 186. Habit. in Chili, Havana. h

12. *venenatum*, fol. lanceolato-oblong. coriaceis, flor. sessilib. Thunb. prodr. 36. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *tomentosum*, flor. confertis sessilib. terminalib. ramis fol. calycibusque tomentosis. L. suppl. 150. Hab. in Amer. merid. Mutis. h

14. *hirtum*, flor. subspicatis axillaribus, fol. cordatis acutis subtus ramulisque hirtis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 478. Hab. in sylvis Jamaicae. h

15. *latifolium*, filamentis edentulis, ramis superne folisque ellipticis subtus pul-

verulento - subvillosis, racemis axillaribus breviorib. Vahl. eclog. 1. p. 25. Lam. Hab. in ins. Trinitatis. Stigma capitatum. W. h

16. *racemosum*, fol. lanceolato - ovatis acutis, racemis brevibus compositis 1-3-que: intermedio productiore. Flor. Per. 2. p. 29. t. 154. f. b. In Peruviae nemorib. Petioli suborti. h

17. *longiflorum*, fol. ovato - oblongis acutis, peduncul. terminalibus paniculato-racemosis, corol. tubo longissimo curvato. Flor. Per. l. c. p. 28. t. 154. Cor. 1. 11a-pollicaris, purpurascens: limbo margine lanato.

18. *strigilatum*, fol. cordatis acutis, pedunc. geminis racemoso-paniculatis, altero brevior. Flor. Peruv. p. 29. t. 156. Cum priore in nemorib. Cor. magna tubo longo curvato, Jasminum refert. Frutex lanugine brevi, strigiliformi adpersus. Bacca ovata.

509. *SESSEA*. Cor. infundibuliformis. *Stigma* 2-lobum: lobo altero breviori. *Cap.* teres, curvata; 1-locularis, 2-valvis: valvul. 2-fidis.

1. *stipulata*, fol. lanceolatis cordatisque, racem. paniculatis. Flor. Per. 2. p. 9. t. 115. Hab. in Peruviae montibus. Frutex foetidus.

2. *dependens*, fol. corlato - oblongis, racem. longissim. pendulis. Flor. Per. l. c. t. 116. In Peruviae rupis. Arbor. 5 - orgyalis.

510. *LYCIUM*. Cor. tubulosa, fauce clausa. *Filam.* barba. *Bacca* 2-locularis, polysperma.

\* *Spinosa*.

1. *asrum*, caul. strictis spinosis, foliis fasciculatis linearibus, bacc. globosis. Duham. N. ed. p. 107-110. Trew-Ehret. Pl. select. t. 24. Lam. ill. t. 112. f. 1. Willd. Sp. 2. p. 1057. Hab. in Barbaria, Aegypto, Arabia, Palestina, Hispania et Medina. Flor. fusco-purpurei. Var. fol. plus minusve longiorib. et subulatis. h

2. *carnosum*, caule ramisve erectis spinoscentibus, fol. lineari - lanceolatis fasciculatis carnosius, bacc. sphaericis. Duham. l. c. p. 111. L. italicum. Mill. dict. rar. 2. L. rigidum. Thunb. 1. prod. p. 37. Trew-Ehr. t. 24. f. 1. Ad Cap. bonae spei. Priori simile, sed multo minus, 3 - 4 - pedes altum. h

3. *microphyllum*, caul. strictis rigidis divaricatis laevissimis, ramulis reflexis spinascentibus, fol. fasciculatis alternisve parabolicis. Duham. l. c. p. 112. Hab. in India et in Africa orient. Fol. glauca. +

4. *ruthenicum*, fol. linearibus fasciculatis, gemmis spinascentibus, ramis laxis. Willd. Murr. Comm. goett. 1779. p. 2. t. 2. L. tataricum. Pall. ross. 1. p. 78. t. 49.

5. *caspicum*, fol. breviorib. ram. spinosissimis, flor. minorib. Pall. ross. 1. t. 49. f. A. Hab. in Sibiriae nitrosis ad Volgam, in desertis Turcomannorum inque Hyrcania; 5. ad mare Caspium.

6. *tetrandrum*, spinosum, foliis ovatis obtusis, ramis angulatis, cor. quadrifidis. Thunb. prod. 37. L. suppl. 150. Hab. in Cap. b. spei. Simillimum L. afro. h

7. *barbarum*, caulib. procumbentibus angulatis simplicib. raro spinosis, fol. petiolatis ellipticis, cal. bifido: lacin. bidentatis, cor. margine villosa, bacca elliptica. Duham. p. 120. L. *barbarum*, fol. lanceolatis crassiusculis, cal. bifidis Linn. Sloan. afric. spec. n. 349. f. 349. Hab. in Africa, Barbaria, ubi detectum a Shaw; vid. iter. vol. 2. Cor. pallide rubra post anthesin livida s. pallens. Filam. primo recta, dein incurvata inter cor. divisuras, supra basin villosa.

\* *turbinatum*, caul. erectis fasciculatis, ramulis dependentibus spinosis teretibus, fol. sessilib. lanceol. acuminatis, cal. trifido, bacca turbinata ante maturitatem bursiformi. Duham. ed. nov. p. 119. t. 31. L. halimifolium. Mill. L. *barburum*. L. Sp. pl. 1. p. 192. Lam. encycl. n. 3. Hab. in China meridionali. Fol. nonnunquam quasi pulverulenta. Cal. rarius bifidus. Ad sepes etc. adhibetur. Filam. basi villosa. l. c.

8. *europaeum*, caul. ramisve erectis teretibus spinosis, fol. spatulatis, filam. imberbibus, bacca subrotunda. Duham. p. 124. L. fol. obliquis, ramulis flexuosis teretibus. Linn. Willd. p. 1059. Mich. N. Gen. Pl. t. 105. f. 1. Hab. in Europa meridionali, in Gallia, Italia, Lusitania, Graecia et in Barbaria. Rami longis et fortibus induti spinis. Cor. albedo-rubra. Var. bac. rubris et flavis.

9. *lanccolatum*, caul. erectis apice flexuosis recurvis teretibus, ram. patentissim. spinosis, fol. subsessilib. lanceolat. acutis, cal. inaequaliter dentato, bacca oblonga. Duham. p. 123. L. *europaeum*. Lam. excl. synonym. Hab. in regno Neapolitano, Graecia. Cor. violacea.

10. *chinense*, erectum spinosum, ramis

diffusis angulatis, fol. petiolatis lanceolatis acutis, cal. 2-3-fidis, stylo staminibus vix longiore, bac. ovatis. Duham. N. ed. p. 116. t. 30. Trew-Ehr. t. 68. excl. synonym. Hab. in China temperatore. Corol. infundibuliformis, violacea.

10. *ovatum*, caul. ramisque dependentibus striatis raro spinosis, foliis petiolatis ovatis obtusis, cal. 5-dentatis, stylo staminibus longiore, bac. oblongis. Duham. l. c. p. 117. L. chinense. Lam. ill. t. 112. f. 2. L. barbarum. P. Willd. Sp. 2. p. 1059.

11. *cinereum*, spinosum, fol. lanceolatis glabris, ramis spinascentibus, pedunculis brevissimis. Thunb. prod. Hab. ad Cap. b. spei. h. †

12. *horridum*, spinosum, fol. obovatis carnosius glabris, ramis spinascentibus, pedunc. brevissimis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. h.

13. *boerhaaviaefolium*, spinosum, fol. ovatis integerrimis acutis glaucis, floribus paniculatis. Lin. suppl. 150. Eheretia halmifolia. L'Her. stirp. 1. p. 45. t. 23. Hab. in Peru. Var. fol. undulatis. h.

14. *obovatum*, spinosum, fol. obovatis obtusissimis, spinis foliosis: vetustioribus nudis, flor. paucis nuntantibus. Flor. Per. 2. p. 46. t. 181. f. c. Hab. in circuitu et sepius Tarnae oppidi. Corol. purpureo-violacea.

15. *salsum*, spinosum, ram. gracilibus, spinis foliosis, fol. obovato-oblongis sessilibus, flor. solitariis. Flor. Peruv. 2. l. c. p. 183. f. a. Cor. albo-purpurea: tubo angusto.

#### \* Inermia.

16. *barbatum*, inerme, fol. ovatis glabris, ram. flexuosis, flor. paniculatis. Th. L. inerme. Lin. suppl. 150. Habit. ad Cap. b. spei. h.

17. *spatulatum*, inerme, fol. obovato-spatulatis, florib. fasciculatis axillaribus. Flor. Per. t. 183. f. b. Cresc. ad sepes urbis Huanuci. Cor. violacea, limbo pubescente. Cal. truncatus. †

18. *umbellatum*, inerme, fol. oblongo-lanceolatis, pedunc. ramis, flor. umbellatis, cal. pentagonis. Flor. Peruv. 2. p. 45. t. 182. f. b. Habit. in sepih. et versuris in prov. Canta in Peru. Filam. glabra. Bacca aurantia, 1-locularis. h.

19. *aggregatum*, inerme, fol. oblongis acutis undulatis subtus tomentosis, florib. axillaribus numerosissimis. Flor. Per. l. c. f. a. Hab. passim in Lima etc. vailibus et

praeruptis, etiam ad sepes. Cor. alba. Filam. imberbia. Bacca globosa aurantia, 2-locularis.

*Obs.* Tres hae species, quarum habitus etiam recedit, vix ad Lycia pertinent, sed *Atropae arborescenti* Lin. affines, quoniam non male peculiare genus efficiere possent. L. *capsulare*. Lin. Willd. Spec. p. 1061. planta dubia et ob fructus forte non hujus generis est.

511. **POGONIA.** Cal. 5-phyllus, persistens. Car. infundibuliformis: ore villis clauso; limbo semiquinquefido. Styl. sursum parum subcurvatus; Stigma concavum. Drupa compressa, quadrilocularis.

1. *debilis*, fol. lanceolatis apicib. subserrulatis distichis, flor. soliter. axillaribus caeruleis, cortice scabroso. Andrew Repos. t. 212. Hab. in N. Hollandia, ad oppidum Jackson. Planta sarmentosa. E. Fam. campanulacea?

512. **CRYPTOSTOMUM.** Cor. infundibuliformis, calyci inserta. Nectar. monophyllum, corollam claudens. Bacca exsucca, 3-locularis: loculis monospermis. Sem. arillata?

1. *laurifolium*. Willd. Spec. 2. p. 1061. Moutabea gujanensis. Aubl. guj. 2. p. 680. t. 274. Hab. in campis cultis Cajennae et Gujanae. Frutex sarmentosus. Folia alternata. h.

513. **ARDISIA.** Cal. 5-partitus. Cor. hypocrateriformis: limbo reflexo. Anth. magnae, erectae. Stigma simplex. Drupa carnosae, supera, 1-sperma.

1. *tinifolia*, flor. paniculatis, fol. ellipticis integris nervosis, caule arboreo. Sw. Fl. Ind. occid. 1. p. 468. Willd. Sp. 2. p. 1062. Sloan. hist. 2. p. 98. t. 105. Hab. in aridis submontosis Jamaicae. h.

2. *coriacea*, flor. paniculatis, fol. oblongis integris avenis coriaceis. Swartz. l. c. p. 470. Hab. in Antillis. h.

3. *serrulata*, florib. paniculatis, foliis ovato-lanceolatis acuminate rugosis, caule fruticoso pubescente. Swartz. p. 471. Plum. cat. 18. ic. 80. Hab. in Hispaniola ad fluviorum ripas graminosas. h.



4. *acuminata*, panic. axillaribus terminalibusque, fol. oblongis acuminatis basi attenuat. Willd. *Isacorea gujanensis*. Aubl. 2. suppl. p. 1. t. 368. Hab. in campis cultis Gujanæ. h

5. *crenulata*, panic. terminali, fol. lanceolato-ovatis repando - crenatis acuminatis, basi attenuatis. Ven. Choix de pl. p. 5. t. 5. Hab. in Antillis.

6. *pyramidalis*, fol. lanceolato - ovatis glabris, racemis terminalibus, pedunc. umbelliferis compressis. Cav. ic. 6. p. 1. t. 502. Hab. prope Santa Cruz. Cor. rubra. Arbor.

7. *serrata*, fol. sparsis lanceolatis serratis, flor. racemis terminalibus compositis. Cav. l. c. p. 2. t. 503. sub *Anguillaria* uti antecedens. Arb. 15-20-pedalis.

8. *humilis*, racem. terminalibus compositis, pedicellis umbellatis, fol. lanceolato-ellipticis integerrimis coriaceis venosis. Vahl. symb. 3. p. 40. *Tinus humilis* zeylanica, fol. crassis venosis. Burm. zeyl. 222. t. 101. Hab. in ins. Haiman, in paludosis salis ad Siam, Malaccam et in Zeylona. h

9. *solanacea*, corymbis axillarib. tripartitis, fol. oblongis utrinque attenuatis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 27. t. 27. Hab. in montosis Indiae orient. h

10. *lateriflora*, racem. lateralib. axillaribusve compositis, florib. umbellatis, fol. oblongis acuminatis integerrimis, caule fruticoso. Swartz. l. c. p. 473. Hab. in Ind. occident. h

11. *excelsa*, racem. axillarib. simplicib. fol. obovatis margine cartilagineo-serratis. Ait. Kew. 1. p. 261. Gaertn. sem. 1. t. 77. f. 1. Hab. in Madera. h

12. *parasitica*, racemis axillarib. simplicibus, fol. sessilibus lanceolato - ovatis lineatis, caule fruticoso. Swartz. Hab. in truncis arborum versus juga montium ins. Dominicae. h

Obs. Hoc genus idem est ac *Anguillaria*. Gaertn. et *Badula*. Juss.

514. BLADHIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* rotata, quinquefida. *Bacca* 1-sperma. *Semen* arillatum.

1. *japonica*, fol. ternis serratis glabris, caule basi decumbente. Thunb. Flor. jap. 95. t. 19. Willd. Sp. 2. p. 1122. Hab. in fruticetis montium Japoniae. h

2. *glabra*, fol. oppositis serratis glabris, caule erecto. Thunb. in Act. Soc. Linn. 2. p. 331. et jap. p. 350. Hab. in Japonia. h

3. *villosa*, fol. serratis villosis. Thunb. jap. p. 56. t. 19. Hab. in Japonia. h

4. *crispa*, fol. oblongis crispis glabris. Thunb. l. c. p. 97. Kaempff. amoen. Fasc. 5. p. 776. Cum priore.

515. MYRSINE. *Cor.* semiquinquefida connivens. *Germen.* cor. replens. *Stigma* magnam, lanigerum, (exertum). *Drupa* 1-sperma: nuce 5-loculari. (*Bacca* imatura 5-sperma, matura 1-sperma. Gaertn.)

1. *africana*, sempervirens, fol. ovatis acutis superne serratis. Lam. ill. t. 121. Willd. Sp. p. 1121. Pluck. alm. t. 80. f. 5. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei. h

Obs. Planta videtur Polygamo - monoica, cum individua occurrunt flor. masculis tantum instructa, qui 4-andri fuerunt. Fol. serraturae spinulosae.

2. *retusa*, fol. obovatis obtusis, apice emarginato-denticulatis. Ait. hort. 1. p. 271. Hab. in ins. Azoriis. Flor. subcorymbis. Willd. Stigm. inclusum? cfr. Veni. Hort. Cels. p. 86-87. h

516. LEFA. *Cor.* 1-petala. *Nect.* 1-phyllum, tubo corollae impositum, 5-fidum, erectum. *Bacca* 5-sperma, infera. (Monoica. Juss.)

1. *sambucina*, caule sulcato-angulato glabro, fol. subbipinnatis. Willd. Sp. p. 1177. Aquilicia. Cavan. dist. 7. p. 372. t. 218. *Staphylea indica*. Burm. ind. 72. t. 24 f. 2. Rumph. 4. t. 45. Hab. in India orientali. Arbuscula facie Sambuci. h

2. *aequata*, caule tereti pubescente, fol. pinnatis. Willd. l. c. Mant. p. 124. In India orient. *Corymbi* trichotomi. h

Obs. An *Aquilicia* congener? vid. Juss. gen. p. 170.

3. *crispa*, caule angulato fimbriato, fol. pinnatis. Hab. ad Cap. b. spei. Radix tuberosa. Flor. nivei. h

517. CORYNOCARPUS. *Cal.* 5-phyllus inferus. *Cor.* 5-petala. *Nect.* 5-petaliformia, cum petalis alternantia, basi glandulifera. *Nux* 1-sperma, clavata.

1. *laevigata*. Lin. suppl. 156. Fors. gen. p. 31. t. 10. Willd. Sp. 2. p. 1178. Habit. in

N. Zeelandia. Fol. obovata integra. Panie. terminalis magna rugosa. h

518. JACQUINIA *Cor.* 10-fida. *Stamina* receptaculo inserta. *Bacca* 1-sperma.

1. *arborea*, fol. cuneiformibus, ramis ad ramificationes aequalibus, inferioribus verticillato-quaternis, superioribus dichotomis. Vahl. eclog. 1. p. 26. Willd. Spec. 2. p. 1064. Hab. in ins. Montserrat prope New-Windward. Arb. trunco erecto, quatuor, sex, decem, viginti, vel triginta pedes alto, diametro sex vel octopollicari.

2. *armillaris*, fol. cuneiformibus, ramis ad ramificationes nodosis verticillatis. Vahl. eclog. 1. p. 26. Jacq. amer. 53. t. 39. Ed. pict. Sloan. hist. 2. p. 89. t. 190. f. 2. Hab. in America. Frutex humilis 4-6-pedalis. h

3. *venosa*, fol. ovato-lanceolat. venosis submembranaceis. Swartz. prod. 47. Habit. in India occident. h

4? *macrocarpa*, fol. rigidis lanceolatis mucronatis, flor. aurantiis, bac. cerasiformibus. Cav. ic. 5. p. 55. t. 483. Habit. non procul a mare Panamais et Acapulci. Bacc. continet corpus cartilagineo-carnosum, cui adhaerent 12 fere corpuscula plana ovata, an scissina? C.

5. *ruscifolia*, fol. lanceolatis acuminatis. Jacq. amer. pict. t. 57. Melicola aculeata. Linn. Spec. pl. 1. p. 339. Dill. elth. t. 123. f. 149. Hab. in Amer. merid. in Havanae sylvis montosis. h

6. *linearis*, fol. linearibus acuminatis. Jacq. amer. t. 40. f. 1. Ed. picta. t. 58. Cresc. ad St. Domingo in litoribus maritimis. Pedunc. in hac et praecedente 1-flori. h

519. SICKINGIA. *Cal.* 5-dentatus.

*Cor.* campanulata. *Caps.* lignosa. 2-locularis, 2-valvis. *Sem.* alata.

1. *Erythroxyton*, fol. rhombo-oblongis, apice dentatis subtus pulescentibus. Willd. in Nov. Act. Berol. v. 2. vid. Schrad. Bot. Journ. 1800. p. 291. Arb. 30-40 pedib. lignoque duro.

2. *longifolia*, fol. oblongo-obovatis integerrimis glabris. Willd. l. c. Cresc. cum priore in montosis sylvis ad Caracas. h

520. BECKEA. *Cal.* 5-fidus. *Petal.* 5. *Caps.* 3-4-locularis, polysperma, cal. tecta. (*Sem.* pauca. Gaertn.)

1. *frutescens*, fol. oppositis muticis,

dentibus calycinis membranaceis coloratis. Smith in Act. Soc. Lin. 3. p. 259. L. suppl. p. 514. Willd. Sp. 2. p. 1. Beckea chinensis. Gaertn. de fruct. 1. p. 157. t. 31. f. 7. Osb. iter. t. 1. Hab. in China.

2. *densifolia*, fol. 4-fariam imbricatis obtusis mucronatis reflexis dentib. calycin. foliaceis. Smith l. c. Hab. ad portum Jackson, N. South-Wales.

521. IMBRICARIA. *Petal.* 5. *Stigma* capitatum. *Caps.* calyce tecta, 2-locularis, polysperma. Sm. (*Caps.* 1-locularis evalvis, apice amplo foramine debiscens. Gaertn.) Conf. Juss. gen.

1. *crenulata*, fol. obovato-cuneiformibus sursum crenulatis, cal. denticulatis. Smith in Act. Soc. Lin. 3. p. 259. Jungia imbricata. Gaertn. de fr. 1. p. 175. t. 35. f. 5. Philadelphus imbricatus. Sol. And. Molliis. Gmel. syst. p. 420.

2. *ciliata*, fol. triquetro-linearibus, calycib. ciliatis, germine 5-gono. Smith l. c. p. 176. Jungia tenella. Gaertn. l. c. p. 176. Hab. in N. Hollandia.

522. ESCALLONIA. *Cal.* 5-dentatus, persistens. *Petal.* 5, lingulata. *Stigma* capitato-depressum. *Bacca* semiuifera, 2-locularis, polysperma. (*Caps.* 2-locularis calyce coronata, basi rimis 2-4-dehiscens. *Recept.* 2, in singulo loco. *Dissepimentum* interruptum. Syst. veg. Flor. Per. p. 166. sub Stereoxylon.)

1. *serrata*, fol. serratis subretusis subtus aveniis. Smith. ic. p. 31. t. 31. Hab. ad fretum Magellanicum.

2. *myrtilloides*, fol. obovatis venosis denticulato-glandulosis, pedunc. 1-floris, petalis spatulatis. Stereoxylon patens. Fl. Peruv. 3. p. 13. t. 234. Escal. myrtilloides. Smith. pl. ic. fasc. 2. p. 30. t. 30. Willd. Spec. 2. p. 1149. Habit. in Amer. merid. collibus frigidis montosis. Lignum durissimum ad varia utensilia utilissimum.

3. *corymbosa*, foliis oblongis serrulatis, pedunc. 1-floris, calycibus denticulatis, petalis oblongis. Flor. Per. 3. p. 14. t. 234. Arb. tristis, Myrti facie.

4. *virgata*, fol. obovato-spatulatis serrulatis, pedunc. 1-floris calycib. dentatis, petalis obovatis. Flor. Per. t. 235. sub Ste-

*reoxylon*. Hab. in montibus et sylvis humidis. Ramuli seniores post defoliationem spinas aemulantur.

5. *resinosa*, fol. oblongo-obovatis serrulatis, pedunc. racemosis, petalis obovato-oblongis. Flor. Per. l. c. f. a. sub *Stereoxylon*. Hab. in Peruv. collib. frigidis. Ramuli purpurascens, resina illiti. Lignum durissimum.

6. *rubra*, fol. ovato-oblong. acuminat. serratis, pedunc. 2-7-floris, petalis spathulatis. Flor. Peruv. p. 15. t. 236. *Stereoxylon rubrum*. In R. Chilensis montibus, inter saxorum fissuras. Nect. conicum, 10-angulare, denticulatum.

7. *revoluta*, foliis obovatis denticulatis revolutis, racemis thyrsoides; petalis linearispathulatis. Flor. Per. l. c. f. a. Cum priore in umbrosis et scaturiginibus prope Conceptionis urbem et ad littora. Folia amara.

8. *pulverulenta*, fol. oblongo-ellipticis serrulatis, pedunculis racemosis - spicatis, petal. obovatis. Fl. Per. 3. p. 15. t. 237. f. a. Cresc. in R. Chilensis sylvis. Rami juniores pulverulenti, pubescentes.

9. *pendula*, fol. lanceolatis acutissimis integris obsoleteque serrulatis, racem. pendulis longissimis, petalis linearibus. Flor. Per. f. b. Hab. in Peruv. nemoribus. Lign. durum.

523. *CERVANTESIA*. *Cal.* minimus, crescens. *Cor. o.* Squamæ nectariferæ 5, ovales crenatæ, infra lacinias calycis insidentes. *Stam.* plana, basi calycis inserta. *Nux* calyce carnoso 5-gono, colorato involuta, 1-locularis.

1. *tomentosa*, fol. linearibus oblongis, flor. racemosis subsessilibus. Flor. Peruv. 3. p. 19-20. t. 241. f. b. Habit. in Peruviae præcipue circa Arobamba vicum, etiam in Cantae provinc. locis imis calidis. Stigm. simplex, obtusum, obsolete umbilicatum.

*Obs.* An hujus quoque loci *Cervantesia bicolor*, caule arboreo, fol. oblongis ferrugineo-tomentosis, flor. racemosis. Cav. ic. 5. p. 49-50. t. 475? Secundum quem stigm. emarginatum et veluti bicornis est. Conf. quoque. Fl. Per. l. c. *Obs.* 1.

524. *ALZATEA*. *Cal.* 5-fidus, 5-gonus. *Cor. o.* *Stam.* receptaculo inserta. *Caps.* obcordata 2-loc.

cularis, 2-valvis: valvulis medio septiferis. *Dissepimentum* contrarium. *Sem.* super-imposita, membrana cincta.

1. *verticillata*, fol. obovatis emarginatis, flor. corymbosis. Flor. Peruv. 3. p. 20. t. 241. f. a. Hab. in Peruviae nemoribus, prope Messapata prælium.

*Obs.* Arbor hæc primo ex truncis distinctis postea ad 4 ulnarum altitudinem in unicum truncum connexis, constabat. vid. l. c.

525. *MYOSCHILOS*. *Cal.* 5-phyl-lus, coloratus. *Cor. o.* *Stam.* receptaculo inserta. *Stigma* 2-3-fidum. *Drupa* 1-sperma, cal. coronata. *Nux* 1-locularis.

1. *oblonga*, fol. oblongis acuminatis repandis, flor. spicatis. Flor. Peruv. 3. p. 20. t. 242. f. a. Cresc. in R. Chilensis collib. et ripis arenosis prope Conceptionis urbem, etc. Cal. purpureus. *Drupa*, atropurpurea. Incolae fol. infuso, instar Sennae, frequens utuntur.

526. *ACHRAS*. *Cal.* 5-6-partitus: laciniiis ovatis concavis incurbentibus. *Cor.* ovata, 5-fida: laciniiis rotundatis: squamis totidem alternis ad faucem. *Pomum* mammosum 1-loculare. *Sem.* solitaria, hilo marginali, apiceque unguiculato. *Stigma* obtusum, striatum. (*Stam.* 4-6.)

1. *Lucuma*, florib. solitariis 2-3, foliis oblongo-obovatis, pomis mammosis. Flor. Peruv. 3. p. 17. t. 219. *Lucuma*. Juss. Gen. Hab. in Peruv. hortis et in R. Chilensis maritimis. *Pomum* mammosum sæpe ovatum, acuminatum. Semina castaneas aemulantur. Arbor est procera, supra quam in ejus saepius detrimentum copiose vegetat *Tillandsia Usneoides*.

2. *Caimito*, flor. aggregatis tetrandris, fol. obovato-lanceolatis, pomis ovalib. Fl. Per. 3. p. 18. t. 240. Hab. in Andium montibus. Arbor frondosissima lactifera. Fruct. edules et in hac specie molliores et sapidiore.

3. *mammosa*, flor. solitariis, fol. cuneiformi-lanceolatis, flor. pentandris. Linn. A. Sapota major. Jacq. amer. t. 182. f. 19. Ed. picta. t. 59. Willd. Sp. tom. 2. p. 224. Pluck. alm. t. 268. f. 2. Hab. in America meridionali.

4. *Sapota*, flor. solitariis, fol. lanceolato-ovatis, florib. hexandris. Jacq. amer. t. 41. Ed. pict. t. 41. Brown. Jam. 2. p. 200. t. 19. f. 3.

β. *Zapottilla*, brachiatis, diffusus. Brown. Hab. cum priore.

5. *dissecta*, flor. confertis, cor. octodecemfidis, fol. obovatis emarginato-retusis. Forst. pl. excul. n<sup>o</sup>. 13. Linn. suppl. p. 210. A. *Balata*, foliis ovato-oblongis subtus cinereis, fructu viridi olivaceiformi. Aubl. guj. 1. p. 308. Willd. l. c. p. 221. Hab. in ins. Philippinis et Americorum, etiam in Gujana et Malabar. Pedunculi axillares penduli, uniflori.

527. CHRYSOPHYLLUM. Cor. campanulata, 5-fida: laciniis alternis patulis. Bacca (magna) 10-sperma, (etiam 1-2-3-sperma.)

1. *Cainito*, fol. ovatis parallele striatis, subtus tomentoso-nitidis, hac, subrotundis. Linn. Jacq. amer. 51. t. 37. f. 1. pict. t. 51. Willd. Sp. 2. p. 1083. Lam. ill. 2. p. 44. t. 120. Cainito folio subtus aureo. Plum. gen. 10. ic. 69.

β. *jamaicense*, fructu purpureo subovato. Jacq. l. c. Sloan. jam. 205. hist. 3. p. 170. t. 229.

γ. *caeruleum*, fructu caeruleo globoso. Jacq. amer. t. 37. Ed. picta. t. 52. Hab. in Martinica. h

Obs. Eadem planta aut saltem huic valde affine videtur Nycterisition *ferrugineum*. Flor. Per. 2. p. 46. t. 187. cujus fructus auctoribus bucosque ignotus est.

2. *monopyrenum*, fol. oblongis acuminatis subtus tomentoso-aureis, fructu ovato monopyreno. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 480. Hab. in fruticetis et collibus Jamaicae et Hispaniolae. h

3. *microcarpum*, foliis ovatis glabris subtus pubescentibus, hac. oblongis obliquis monospermis. Swartz. prod. Fl. ind. occ. 1. p. 482. Hab. in Hispaniola ad fluviorum ripas. Sapor fructus dulcissimus. h

4. *angustifolium*, fol. lanceolatis parallele striatis nitidis subtus tomentoso-ferrugineis, haccis olivaceiformibus. Lam. ill. 2. p. 44. Hab. in St. Dominica. Baccae subdispermae. h

5. *oliviforme*, foliis ovato-oblongis, subtus tomentoso-nitidis, fructu monospermo olivaceiformi. Lam. l. c. Burm. amer. t. 69. Hab. in Martinica. h

6. *argenteum*, fol. falcato-ovatis, subtus tomentoso-nitidis. Jacq. amer. 53. t. 38. f. 1. Ed. picta. t. 54. Habit. in Martinica. h

7. *rugosum*, foliis oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu acuminato rugoso. Swartz. l. c. p. 484. Hab. in sylvis montium Jamaicae occident. h

8. *pyriforme*, fol. oblongis acuminatis utrinque glabris, fructu pyriformi laevi. Willd. p. 1084. C. Macconcou. Aubl. p. 233. t. 92. Hab. ad ripas amnis Calibiensis Gujanac. h

9. *glabrum*, fol. ovato-oblongis acutis utrinque glabris, fructu elliptico laevi. Willd. Jacq. amer. 53. t. 38. f. 2. Ed. picta t. 55. Habit. in sylvis Martinicae. h

β. *pauciflorum*, fol. ovatis acuminatis utrinque subglabris, axillis paucifloris. Lam. l. c. Hab. in Martinica.

528. SIDEROXYLON. Cor. subrotata 5-fida. Squamæ 5, petalis alternæ serratæ. (Nect. in plerisque 5-phyllum. L.) Drupa 5-sperma.

#### \* *Inermia*.

1. *mite*, inermis, flor. sessilibus. Linn. Jacq. collect. 2. p. 249. Willd. Sp. p. 1089. Hab. in Africa. h

2. *inermis*, inermis, fol. perennantibus obovatis, pedunc. teretibus. Lin. Jacq. coll. 2. p. 250. Lam. ill. 2. p. 41. t. 120. f. 1. Dill. elth. t. 265. f. 344. Hab. in Aethiopia. Fol. crassa rigida.

3. *cymosum*, inermis, fol. oppositis petiolatis, cymis compositis et decompositis. L. suppl. 152. Hab. in monte tabulari Cap. b. spei. h

4. *sericeum*, inermis, fol. ovatis subtus tomentoso-sericeis. Ait. Kew. 1. p. 262. In N. Hollandia. h

5. *argenteum*, inermis, fol. ovatis retusis tomentosis, flor. pedunculatis. Thunb. prod. 36. et Rohmeria. Hab. ad Cap. bon. spei. h

6. *tomentosum*, inermis, foliis oblongis acuminatis obtusis, junioribus tomentosis, pedunc. aggregatis axillaribus. Willd. p. 1090. Roxb. corom. 1. p. 28. t. 28. Hab. in Ind. orientali. h

7. *nitidum*, inermis, fol. ovato-oblongis glabris nitidis petiolatis, pedunc. confertis axillaribus. Lam. l. c. p. 42. Habit. in St. Domingo.

\*\* *Spinosa.*

8. *decandrum*, spinosum, fol. deciduis ellipticis. L. Willd. p. 1091. Hab. in Amer. septentrionali. Stam. 10. Bac. nigra.

9. *multiflorum*, spinosum, fol. obovato-cuneatis coriaceis glabris, pedunc. divisis fasciculatis lateralib. Lam. ill. 2. p. 43. Hab. ad Cap. b. spei. †

529. *BUMELIA. Cor.* 5-fida. *Nect.* 5-phyllum. *Drupa* monosperma.

1. *nigra*, fol. terminalibus oblongo-lanceolatis glabris margine undulatis, ramis laxis, ramulis virgatis floriferis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 487. Willd. Sp. p. 1085. Hab. in sylvis et locis montosis Jamaic. h

2. *pallida*, fol. terminalibus ellipticis obtusis, pedunc. confertis lateralibus, ram. erectis. Swartz. p. 489. Hab. in campestribus Jamaic. Distinguitur a B. nigra, quod arb. minor cortice albescente et flor. majores sint. Swartz. h

3. *retusa*, fol. cuneato-ovatis retusis rigidis, pedunc. confertis axillaribus. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 490. Habit. in montosis Jamaic. occid. ¶

4. *foetidissima*, fol. lanceolato-oblong. obtusis submarginatis, pedunc. confertis axillaribus. Willd. p. 1085. S. inermis, fol. suboppositis, florib. patentissimis. Linn. Mant. 49. Habit. in S. Domingo in sylvis montosis. h

5. *salicifolia*, foliis lanceolato-ovatis acuminatis, pedunc. confertis axillaribus et lateralibus. Swartz. l. c. Fl. ind. occid. 1. p. 491. sub Bumelia. Achras salicifolia. L. Sp. pl. 470. S. Mastichodendrum. Jacq. coll. 2. p. 251. t. 17. f. 5. Lam. ill. 2. p. 41. Cornus. Catesb. carol. 2. p. 75. t. 7. Habit. in collib. aridis Jamaicae, insul. St. Crucis, et in ins. Bahamensib. h

6. *montana*, foliis oblongis obtusis, pedunc. longioribus axillaribus distinctis. Sw. Fl. ind. occid. 1. p. 493. Hab. in montibus aliorib. Jam. austr. h

7. *nervosa*, fol. alternis ellipticis subtus discoloribus, florib. aggregatis lateralibus axillaribusque tomentosis pedunculat. Vahl. ecl. 1. p. 28. Chrysophyllum Cainito. Aubl. Ch. macrophyllum. Lam. enc. 2. p. 44. Hab. in Cajenna. h

8. *Lycioides*, spinose erecta, fol. lato-lanceolatis utrinque glabris. Michaux, Flor. 1. p. 122. Duham. 2. t. 68. S. laeve. Walter. Hab. in Canada, Carolina.

9. *reclinata*, spinosa-liffusa, ram. sterilibus divaricatis, fol. parvulis obovalibus glaberrimis. Michaux, l. c. Vent. Choix de Pl. t. 22. In dumetosis Georgiae rupibus.

10. *tenax* (chrysophylloides), spinosa fol. cuneato-lanceolatis, plerumque obtusis subtus sericeo-nitentibus. Michaux, p. 123. Jacq. collect. 2. p. 252. Ej. obs. 3. t. 54. sub Sideroxylo. Willd. Sp. 2. p. 1087. Habit. in dumetis littoralib. Carolinae. Fol. Chrysophylli. Arb. 20-pedalis. M.

11. *lanuginosa*, spinosa, ramulis patentissimis pubescentibus, fol. ovali-lanceol. subtus lanuginosis. Michaux, p. 122. In Georgiae humidis. Antedenti affinis dicitur, quare eam hac retuli.

12. *pentagona*, fol. lanceolatis acuminatis, nitidis, pedunc. axillaribus, drupis pentagonis. Swartz. l. c. p. 494. Habit. in monte Josephi insulae Dominicae. h

13. *rotundifolia*, foliis suborbiculatis marginatis venosis coriaceis utrinque glabris. Swartz. p. 495. In fruticetis montium Jamaicae. h

14. *cuneata*, fol. cuneatis obovatis. Sw. l. c. p. 496. Hab. in fruticetis montium Jamaicae.

*Obs.* Hujus et praecedentis fructus nondum observatus est.

530. *MANGLILLA. Cal.* minimus, 5-partitus. *Cor.* rotata, 5-partita. *Nect.* squamulae o. *Drupa* 1-locularis, 1-sperma. Juss. Gen. pl.

1. *Jussieu*, fol. perennantibus oblongis glaberrimis, pedunc. fasciculatis brevibus. Chrysophyllum Mangnillo. Lam. ill. 2. p. 45. Bumelia. Willd. Sp. 2. p. 1087. n.º 7. Hab. in Peru. h

2. *Mitteriana*, fol. perennantibus lanceolato-ovatis acuminatis nitidis, cal. subrotundis. Lam. l. c. sub Chrysophyllo. Mill. ic. t. 269. Sideroxylon mite. Jacq. coll. 2. p. 249. Hab. ad Cap. b. spei. Pedunc. axillares, aggregati, albi. h

3. *melanophleas*, foliis perennantibus lanceolatis undulatis glabris, pedunc. brevissimis (purpureis), cal. subnullis. Lam. l. c. sub Chrysophyllo. Sideroxylon laurifolium. Lam. enc. bot. 1. p. 244. S. melanophleum. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1087. Jacq. hort. t. 71. Hab. in Aethiopia.

*Obs.* Praeunte Lamarkio 2. posteriores species ad hoc genus amenavi, quod fructu a Chrysophyllo et Nectarii defectu a Sider-

oxylo differt. Huc etiam pertinet *Caballeria*. Flor. Per. prod. p. 141. t. 30. et syst. veget. Flor. Peruv. et Chilens., ubi p. 279-282. plures hujus generis enumeratae sunt species, quarum descriptiones et Icones in posterum expectari debent. An *Roemeria*. Thunb. idem genus?

531. **TECTONA**. *Cor.* 5-fida. *Stigma* dentatum. *Drupa* sicca, spongiosa, intra calycem inflatum. *Nux* trilocularis.

1. *grandis*. Lin. suppl. 151. Roxb. corom. 1. p. 10. t. 6. Willd. Sp. 1088. Theka. Rheed. mal. 4. t. 27. Juss. gen. Lam. ill. t. 136. Habit. in vastis sylvis insularum Javæ et Zeylonæ, et in Malabar et Coromandel. Arbor.

**RHAMNEIS** (gen. 532-53.) cal. habent 1-phyllum, petala ut plurimum 5, aut 4-6, rarius 0, calyci inserta ejusdem lacinis alterna, squamiformia. Stam. cal. quoque inserta, petal. alterna aut opposita, plerumque 5, in quibusdam 4, rarissime 6 (Prinos). *Stigma* simplex aut 2-3 et 5, quo nonnulla hujus familiae genera in sequentibus ordinibus occurrunt. Discus glandulosus in multis. Fructus superus (rarius inferus) baccatus, drupaceus et capsularis. Embryo planus et rectus, perispermio carnoso cinctus. Arborea aut frutices fol. opposita s. alterna, stipulis sæpe minimis distincta.

† *Stamina petalis opposita. Fructus baccatus aut drupaceus.*

532. **RHAMNUS**. *Cal.* campanulatus, 4-5-fidus. *Cor.* squamæ stamina munientes, calyci insertæ, (passim 0.) *Stigma* 1-2-4-fidum. *Bacca* 3-4-sperma. (Flor. passim polygami, et dioici.)

\* *Spinosi.*

1. *catharticus*, spinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis, fol. ovatis serratis. Linn. Willd. Spec. 2. p. 1092. Flor. dan. 1. 850. Duham. arb. 1. t. 50. Hab. in sylvaticis. *Stigma* 4-fidum.

2. *infectarius*, spinis terminalibus, flor. quadrifidis dioicis, caulibus procumbentibus. Jacq. coll. 3. p. 17. Spina infectoria pumila L. Clus. hist. 1. p. 111. Habit. in Hispania, Gallia, Carniolia, Italia. Fol. subtus villosa. Calyx cyathiformis edentulus. L. In hortis caulem erectum vidi. h

3. *lycioides*, spinis terminalibus, fol. linearibus integerrimis obtusis. Willd. Sp. 1093. Cav. ic. 2. p. 56. t. 182. Hab. in Hispania. h

4. *Erythroxyton*, spinis terminalibus, fol. lineari-lanceolatis serratis acutiusculis. Willd. l. c. Pall. ross. 2. p. 26. t. 62. et ejusdem. itin. 3. app. n.º 78. t. 1. f. 1. Hab. in Sibiriae rupibus apricis. h†

5. *oleoides*, spinis terminalibus, foliis oblongis integerrimis. Linn. Hab. in Hispania. Similis *R. cathartico*, sed minor. Fol. ad gemmas 2. s. 3. Oleae similia.

6. *crenulatus*, ramulis spinescentibus, flor. quadrifidis triflorisve dioicis, fol. oblongis obtusis serratis sempervirentibus. Ait. Kew. 1. p. 263. Hab. in ins. Teneriffa. h

7. *saxatilis*, fol. ovato-lanceolatis serratis, spinis terminalibus, flor. quadrifidis hermaphroditis. Jacq. Fl. Austr. 1. t. 53. Hab. in montib. Badoisibus, Italicis, Helveticis.

*Obs.* Squamæ petaloideae 0. *Stigma* 4-fidum. *Drupa* intera, sub 4-sperma: *Frangula saxatilis*. Cramer. enumer. pl. etc. Marburgi. 1803. p. 41.

8. *theezans*, spinis terminalibus, fol. ovatis serrulatis, ramis divaricatis. L. Mant. 207. Hab. in China, pauperibus *Theae* succedaneum. Sarmmentosus. Ramis triati. Fl. in spica interrupto-glomerati. *Stigma* triplex. h

\* \* *Inermes.*

9. *Sarcophyalus*, inermis, fol. ovalibus ciliatis integerrimis emarginatis. L. Amoen. acad. 5. p. 395. *Sarcophyalus*. Brown. jam. 179. Hab. in America. h

10. *ferreus*, inermis, flor. hermaphroditis umbellatis axillaribus, fol. oblongo-ovatis emarginatis integerrimis glabris membranaceis. Vahl. symb. 3. p. 41. t. 58. Hab. in ins. St. Crucis. h

11. *laevigatus*, inermis, flor. hermaphroditis axillaribus subgeminis, fol. oblongis integerrimis coriaceis glabris. Vahl. l. c. p. 41. Cum priore. h

12. *tetragonus*, inermis, foliis ovatis integris glabris sessilibus, ramis tetragonis. Lin. suppl. 153. Habit. in Cap. b. spei. h

13. *polifolius*, inermis, flor. hermaphroditis axillaribus subsessilibus, fol. lanceolatis integerrimis subtus tomentoso-niveis. Vahl. in N. Zealandia. h

14. *valentinus*, inermis, flor. hermaphroditis quadrifidis trigynis, capsul. trilo-

*eularibus*, fol. subrotundo-ovatis subcrenatis. Willd. p. 1066. Rh. pumilus. Cav. ic. 2. p. 65. t. 181. excl. syn. Hab. in regni Valentini montibus Meca et Palomera. *h*

15. *cubensis*, inermis, fol. hermaphroditis, cape trilocularibus, foliis rugosis integerrimis tomentosis. Lin. Jacq. hort. 3. t. 49. et ejusd. Am. pict. 1. 75. Hab. in fruticetis maritima. Cubae. Habitus Viburni Lantanae. Fructus capsularis? Ceanothus?

16. *carolinianus*, inermis, fol. ovali-oblongis integrissimis glabris, umbell. pedunculatis, flor. hermaphroditis 4 - andri-gynis. Michaux, Flor. 1. p. 153. Hab. in Carolina.

17. *minutiflorus*, fol. suboppositis ovalibus serratis, flor. minutissimis dioicis spicatis, stylo 3-fido. Michaux l. c. Hab. in Carolinae maritimis. Bacca 3-sperma.

18. *davuricus*, inermis, flor. quadrifidis dioicis, fol. oblongo-ovatis serratis venosis. Pall. ross. 2. p. 24. t. 61. Amman. ruth. t. 33. Hab. ad Argantum fluvium Davuriae. Simillimus R. cathartico, sed defectu spinarum distinctissimus. Willd. *h*

19. *alpinus*, inermis, florib. dioicis, fol. ovali-lanceolatis glanduloso-crenulatis. Jacq. Coll. 3. p. 15. Duham. ed. nova. p. 37. t. 13. Hall. helv. n.º 823. t. 40. Hab. in Alpib. Dioicis calyce 4-fido, stigm. 4 - fido, ut R. cathartici.

20. *pumilus*, inermis repens, flor. hermaphroditis, fol. petiolatis ovatis crenatis. Jacq. Collect. 2. p. 141. t. 11. Rh. rupestris. Scop. carn. n.º 262. t. 5. Hab. in monte Baldo, Carniolia. Differt a Frangula caulibus saxis adhaerentibus.

21. *Frangula*, inermis, flor. monogynis hermaphroditis, fol. integerrimis. L. Flor. dan. t. 278. Duham. arb. 1. t. 100. Hab. in Europae borealis nemorosis humidiusculis. *h*

22. *latifolius*, inermis, flor. monogynis hermaphroditis, calycib. vilosis, fol. ellipticis integerrimis. L'Herit. sert. p. 5. t. 8. Hab. in Azoribus in montib. St. Miguel. R. Frangulae similissimus, sed calyces in R. Frangula g. aber. L'Herit. *h*

23. *glandulosus*, inermis, flor. hermaphroditis racemosis, fol. ovatis obtuse serratis glabris basi glandulosis. Ait. Kew. 1. p. 265. Jard. de Malmaison. t. 34. Hab. in Madera et ins. Canariensibus. *h*

24. *racemosus*, inermis, fol. ovato - rotundis laevib. subtus tomentosis ciliatis, petiolis foliisque ferrugineis. Duhamel. ed. nov. p. 48. Hab. ... Herb. Juss.

25. *cassinoides*, inermis, fol. ovatis coriaceis glaucis obsolete dentatis, ramulis angulatis, flor. axillaribus subsessilib. Lam. enc. 4. p. 474. Hab. ad St. Dominicam. Fol. albido - glauca, margine subrevoluta. Habitus Cassines, cujus forte species. Loc. cit. *h*

26. *Prinoides*, inermis, flor. polygamis, stylo subtriplici, fol. ovatis serratis. L'Her. sert. p. 6. t. 9. Celtis. Burm. afr. 242. t. 68. Hab. ad Cap. b. spec. *h*

27. *mystacinus*, inermis, flor. hermaphroditis, stigmatibus triplici, foliis cordatis, ramis cirriferis. Ait. 1. p. 266. Hab. in Abyssinia. Caulis fruticosus, cirrhis scandens. Folia brevissime petiolata cordata. Ait. *h*

28. *alnifolius*, inermis, flor. hermaphroditis, fol. ovalibus acuminatis serratis subtus reticulatis. L'Her. sert. p. 5. cfr. Rh. franguloides. Michaux, 1. p. 152. Hab. in Amer. septentr. ? Affin. R. alpino.

29. *sphaerospermus*, inermis, floribus hermaphroditis racemulosis, bacis subrotundis trilocularib. pellucidis, fol. oblongis serratis glabris. Swartz. Flor. ind. occid. t. p. 499. Hab. in fruticetis montosis Jamaicae. temperatoris. *h*

30. *hybridus*, inermis, flor. androgynis, fol. alternis oblongis acuminatis vix perennantibus. L'Herit. sert. R. Burgundicus. H. P. Hab. in hortis. *+*

31. *Alaternus*, inermis, floribus dioicis, stigm. triplici, fol. serratis sempervirentib. *Al. latifolius*, fol. ovato-oblongis aequaliter serratis. (R. Hispanicus.) *β. baleari-cus*, foliis rotundis spinoso-dentatis ramis subspinosis. Duham. ed. nov. p. 42. *γ. angustifolius*, fol. lanceolatis profunde serratis glabris. Ait. Kew. 1. p. 267. Hab. in Europa austr. *h*

32. *umbellatus*, caul. inermi, fol. oppositis ovato-acutis lineatis, flor. umbellatis. Cavan. ic. 6. p. 2. t. 504. Hab. in N. Hisp. Fol. obscure cordata. Cal. crassus, 5-partitus: lacin. interne bifoveolatis.

33. *trinervis*, inermis, foliis alternis ovatis serrulatis trinerviis, subtus tomentosis, flor. hermaphroditis axillarib. Cav. l. c. t. 505. f. 1. H. bit. in ins. Lizon, prope Manillam. Germ. cinctum foveolis 10. Stigma incrassata, 2. C.

34. *sanguineus*, fol. ovatis oblongisque lineatis integerrimis, caule erecto, floribus

axillaribus fasciculatis hermaphroditis. Orteg. Dec. pl. p. 87. Hab. in Galicia prope St. Jacob. urlem ad ripas etc. - Vernacule: Sanguino a caule et ramorum colore sanguineo sic nuncupatus. Cort. cum lacte decoctus optimum remedium contra scabiem.

35. *cubensis*, fol. ovatis dentatis lineatis, racem. axillaribus, bac. striatis. Rh. *lineatifolius*. Orteg. l. c. p. 89. Habit. in insul. Cuba. Fruct. 2-pedalis.

36. *lineatus*, inermis, flor. hermaphroditis, fol. ovatis lineatis repandis subtus reticulatis. Lin. Obs. it. t. 7. Zizyphus lineatus. Willd. Spec. p. 1102. Pluck. phyt. t. 122. f. 4? Encycl. bot. 4. p. 473. Hab. in India orient., China. Fol. sultus subvelutina: venis nigrescentibus. Stigm. simplex. Fruct. bacca!

### \*\*\* Aculeati.

37. *capensis*, aculeis solitariis, fol. ovatis excisis integris glabris, umbellis axillaribus. Thunb. prod. 44. Hab. ad Cap. bon. spei. h. +

+ *OENOPHIA*. Cal. urceolatus, 5-fidus. Petala 5. Discus carnosus o. Drupa: succosa, 2-locularis, altero loco saepius abortiente, 1-sperma.

38. *volubilis*, inermis, caule volubili, fol. ovatis repando-subcrenatis (integerrim. Lin.) striatis. Michaux. p. 153-154. Linn. suppl. p. 132. Jacq. ic. rar. 2. t. 336. Zizyphus volubilis. Willd. Sp. p. 1102. Hab. in Carolina et Ludoviciana.

Obs. Frutex flore Rhamni fructu Zizyphi. - Umbellae axillares. Willd. Racemi subterminales. Michaux. Flor. hermaphroditi. Aiton, Flor. dioici. Mich. Fol. integerrima. Linn. Willd. repando - subcrenata. Mich. undulato-serrata. Walter!

+ ZIZYPHUS. Cal. patens, 5-fidus. Petala 5. Discus carnosus orbicularis, pistillum ambiens. Styl. 2. Drupa nuce 1-2-sperma. Fol. alterna. Flor. axillares.

39. *Lotus*, aculeis geminis, altero-recurvo, fol. ovato-oblongis obsolete crenatis. Willd. Z. *Lotus*, aculeis geminis, foliis ovalibus glabris obsolete dentatis, fructu rotundiore. Lam. encycl. 3. p. 304. Destonaines in Acad. Scient. 1788, p. 443. t. 21. et Flor. 1. p. 200. Rhamnus *Lotus*. Lin. Shaw. afr. 631. t. 631. β? Mungo Parker iter. p. 85. vers. germ. Habit. in regno Tuncano et in interiore Africae. Fruct. edules. h.

40. *Napeca*, aculeis subgeminis recurvis, pedunc. corymbosis, flor. semilignis, fol. ovatis obliquis subcrenatis utrinque laevibus.

Willd. p. 1104. Rhamnus *Napeca*. Linn. Pluck. alm. 199. t. 216. f. 6. Rumph. 2. t. 37. Hab. in Zeylona. h.

41. *Jujuba*, aculeis solitariis recurvis, fol. subrotundo-ovatis obtusis sultus tomentosis, pedunc. aggregatis, flor. semilignis. Willd. Sonnerat. it. t. 34. Rumph. 2. t. 36. Hab. in India. Fruct. ovato-subrotundus. h.

42. *Xylopyrus*, caul. aculeato, aculeis recurvis, fol. ovatis subtus tomentosis, flor. corymbosis. Retz. obs. 2. p. 11. Zizyphus *rugosa*, acul. subgeminatis recurvis, fol. lato-ovalib. rugosis serrulatis, corymbis tomentosis pedunculatis dichotom. Lam. enc. 3. p. 319? Habit. in Ind. orient. ad radices montium. h.

43. *sinensis*, ramulis annotinis aculeis pubescentibus: venustiorib. inermibus, fol. ovato-oblongis acute serratis. Lam. enc. 3. p. 318. Hab. in China? Petal. sub calyce reflexa.

44. *Ignaneus*, acul. subgeminatis, fol. ovatis acuminatis serratis nudis, racemulis axillarib. Lam. l. c. Rhamnus. Lin. Jacq. amer. p. 74. Ed. pict. p. 40. Hab. in insula Antillicis et ad Curac. Lacerta ignana sub hoc frutice communiter degit.

45. *Oenophia*, aculeis solitariis recurvis, fol. obliquis dimidiato-cordatis acuminatis subtus tomentosis, pedunc. aggregatis. Willd. p. 1105. Burm. zeyl. 131. t. 61. Hab. in Zeylona. h.

46. *Zizyphus* (vulgaris), acul. geminis, altero recurvo, fol. ovatis retusis dentatis glabris. Willd. Rh. *Zizyphus*. Linn. Pall. ross. 2. p. 24. t. 59. Hab. in Europa australi. h.

47. *maurittiana*, acul. geminis: altero recurvo, fol. oblong. obtusis subtus tomentosis, fructu oblongo. Lam. l. c. p. 369. Hab. in ins. Mauritiana. Antecedenti affinis, sed fol. minus latiora et fruct. oblongus acuminatus. h.

48. *rotundifolius*, acul. geminatis: altero recurvo, fol. subrotundo-ovalibus subtus tomentosis. Zizyphus. Lam. l. c. n. 9. Pluck. alm. 199. t. 197. f. 2. Burm. Zeyl. p. 132. In India, Zeylona. h.

49. *angulatus*, acul. geminatis rectis, fol. subrotundo-ovalib. subidentatis utring. glabris ramis acute angulatis. Lam. l. c. p. 300. sub Zizypho. Hab. . . . Rami flexuosi, 4-goni: angulis prominentibus.

50. *Spina Christi*, acul. geminis rectis, fol. ovatis acutis dentatis glabris. Willd. + Alp.



Alp. aegypt. 16. t. 19. Pluck. 199. t. 197. f. 3.  
Hab. in Aethiopia, Palaestina. h

\*\* *Inermis*.

51. *peruvianus*, inermis, fol. ovato-rotundat. rariter dentatis subangulosis, petal. stellatis calyce majorib. Lam. enc. 3. p. 320. Hort. Par. Hab. in Peruv. Sempervirens.

+++ *Paliurus*. *Flor.* Zizyphi. *Styli* 3.  
*Drupa* exsucca, 3-locularis ala membranacea orbiculari cincta.

52. *Paliurus (australis)*, acul. geminatis : inferiore reflexo, flor. trigynis, drupa coriacea margine alata. Willd. Spec. 2. p. 1103. sub Zizypho. Pall. Fl. ross. 2. p. 27. t. 64. *Paliurus aculeatus*. Lam. ill. t. 210. P. australis. Gaertn. t. 43. f. 5. Hab. in Europa austr. et ad Caucasum.

*Obs.* Tam ob fructus naturam, quam ob floris structuram Zizyphi et Paliuri ut distincta genera separari omnino merentur; verum cum magnaniter hoc genera (characterem artificiali solummodo distinguenda) extet affinitas, potius ea hic conjuncta maneant, quam, in mentem system. veget., in diversis ordinibus collocanda, quod ob stylum 1. in *Rhamno* 2. in *Zizypho* et 3. in *Paliuro*, flor. dioico in *Oenoplia* necessarium omnino esset.

533. *CONDALIA*. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, persistens. *Cor.* o.  
*Discus* glandulosus. *Stylus* 1.  
*Drupa* ovata, nuce monosperma.

1. *microphylla*, spinis terminalibus et axillaribus, fol. ovatis subsessilib. Cav. ic. 6. p. 16. t. 525. Zizyphusmyrtoides. Ortega Decas plant. p. 119. Habit. in R. Chilensi. Flor. saepe 4-partiti, 4-andri. O. h

*Obs.* Rhamno aut potius Zizypho omnino affinis, et forte ejus solum species, sed stylo unico et petalis nullis differt. An hoc sufficit?

534. *OPELIA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Nectararia* 5, staminibus alternantia. *Bacca* 1-sperma.

1. *amentacea*. Roxb. Corom. n°. 158. t. 158. Hab. in montibus Carcassiensibus in Coromandel. Fol. ovata, alterna. Racem. axillares.

535. *ELAEODENDRUM*. *Cal.* 5-10-phyllus : foliolis 5, squamis subrotundis concavis. *Cor.* 5-partita : laciniis ovato-lanceolatis concavis. *Nect.* linearis-subulata

petaliformia. *Drupa* exsucca, nuce 2-3-loculari. *Putamen* crassum, durum, 2-3-sulcatum.

1. *Argam*, spinosum, fol. lanceolatis obtusis. Schousb. Maroc. Ed. germ. p. 89. Willd. p. 1148. *Rhamnus siccus*. Lin. Commel. Hort. 1. t. 83. *Sideroxylon spinosum*. Liu. Cresc. copiose in sylvis in Barbariae provinc. austr. inter flumina Tanis et Suz. Ex nuculis oleum praeparatur oleo olivarum simile.

*Obs.* Cl. Schousboe loc. cit. ample et docte de hac arbore disseruit, et ad ejus observationes characterem genericum emendavi.

2. *orientale*, inermis, fol. lanceolatis acutis : venis rubris. Jacq. ic. rar. 1. t. 32. Willd. l. c. Habit. .. An congener *Rubentia*. Juss. gen. pl.?

3. *glaucum*, inermis, ellipticis subserratis acutis, cymis axillaribus dichotomis folia aequantib. Vahl. symb. 2. p. 42. sub *Celastr.* *Schrebera albens*. Retz. obs. 6. p. 25. t. 3. Willd. Sp. 2. p. 1092. Hab. in Zeylona et Coromandel. Vid. Roxb. Corom. v. 2. p. 2.

536. *HENKEA*. *Cal.* 2-phyllus : altera biloba. *Cor.* urecolata. *Stigma* 3-gonum. *Drupa* 1-sperma. *Nux* trilocularis.

1. *flexuosa*, ramis flexuosis, fol. ovato-lanceolatis, racemis axillaribus. Flor. Per. 3. p. 8. 231. Hab. in Andium montibus.

+++ *Stamina* petalis alterna. *Fructus* capsularis.

537. *SENACIA*. *Cal.* minimus, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* sphaerica, pedunculata, 2-valvis, 4-sperma. *Sem.* angulata, nuda.

1. *undulata*. *Celastrus undulatus*. Lam. Willd. 2. p. 1124. Hab. in Borbonia. A. d. Petit-Thouars.

538. *CELASTRUS*. *Cor.* 5-petala, patens. *Caps.* 3-angularis, 3-locularis. *Sem.* calyptrata.

\* *Inermis, foliis integerrimis.*

1. *lucidus*, inermis, fol. ovalibus acutis nitidis marginatis, pedunc. axillarib. Willd. Sp. 2. p. 1123. L'Herit. stirp. 1. p. 49. t. 25. Pluck. alm. 139. t. 280. f. 4. An Cassine concava. Lam. enc. 1. p. 652? Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *microphyllus*, inermis, fol. ovatis obtusis integerrimis, cymis terminalib. dichotomis. Lin. suppl. 154. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *bullatus*, inermis, fol. ovatis acutis integerrimis, panic. terminali. Willd. l. c. Mill. dict. n.º. 1. Pluck. alin. 139. t. 28. f. 5. Hab. in Virginia. h

4. *laurinus*, inermis, fol. ovato-oblong. obtusis emarginatis integerrimis, cymis axillaribus. Willd. C. fol. oblongis integris, panic. axillarib. Thunb. prod. 42. Habit. ad Cap. b. spei. h

5. *rostratus*, inermis, fol. oblongo-ovatis inaequalib. integerrimis, corymbis dichotomis axillaribus, fructib. spinosis. W. Inermis, fol. oblongo-ovatis integris, panic. axillaribus, fructib. spinosis, Thunb. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *octogonus*, inermis, fol. ellipticis angulis subnerviis, perennantibus, capsulis bivalvis. monospermis. L'Herit. sert. angl. 7. Hab. in Pern. Fol. glauca. Semen arilatum bisuleum. L'H. h

7. *filiformis*, inermis, fol. lanceolatis integerrimis, ramis filiformibus, pedunc. axillaribus unifloris. Linn. suppl. 153. Th. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

8. *macrocarpus*, inermis, fol. oblongo-lanceolatis integerrimis, acumine emarginato, flor. aggregatis. Flor. Peruv. 3. p. 8. t. 230. f. b. Haenke. Prodr. Flor. Per. p. 65. Hab. in Munna nemoribus. Fruct. polygamus, dioicus. Caps. magna, obovata, sac-pius 1-sperma. Sem. arillosa, oleaginosa.

**\*\* Inermis, fol. dentatis.**

9. *Maytenus* (uncinatus), inermis ramis dependentibus, fol. lanceolatis serratis, acumine uncinato, pedunc. congestis unifi. C. Maytenus. Willd. p. 1127. Molin. Chil. Juss. gen. p. 449. Mayten. Feuill. 3. p. 39. t. 27. Habit. in R. Chiliensis campis et arvis. Arb. sempervirens. Caps. luteo-erocca, 2-3-locularis. Sem. arillo rubro involuta.

10. *scandens*, inermis, fol. oblongis acuminatis serratis, racemis terminalibus, caul. volubili. Willd. p. 1125. Duham. arb. 1. p. 223. t. 95. Hab. in Canada. h

11. *paniculatus*, inermis, fol. ovatis acuminatis obtusis serratis, panic. elongata terminali. Willd. l. c. Hab. in Ind. orient. Rami fusi punctati. Caps. trilocularis trivalvis. Willd. h

12. *procumbens*, inermis procumbens, fol. ovatis serratis, flor. axillarib. subsolita-

riis. Lin. suppl. 153. Habit. ad Cap. bon. spei. h

13. *acuminatus*, inermis, fol. ovatis acuminatis serratis, pedunc. axillarib. uniflor., caul. erecto laxo. Lin. suppl. 154. Habit. ad Cap. b. spei. h

14. *cassinoides*, inermis, fol. ovatis acutis laxe dentatis perennantibus, flor. axillaribus. L'Her. sert. angl. p. 6. t. 10. Hab. in Canariis. h

15. *striatus*, inermis, ramulis erectis striatis, fol. ovatis acuminatis serratis, pedunc. sparsis uniflor. Thunb. jap. 68. Hab. in Japonia. Flor. sparsi pedunculati. Th. h

16. *cernuus*, inermis, fol. ovatis obtusis serratis, pedunc. axillarib. uniflor. cernuus. Thunb. prod. 42. Hab. ad Cap. b. spei. h

17. *undatus*, inermis, fol. obovato-subcuneiformib. undato-dentatis, flor. axillaribus sessilibus. Thunb. Cum priore. h

18. *edulis*, inermis, fol. oppositis alternisque ellipticis serratis, cymis axillarib. dichotomis. Vahl. symb. 1. p. 21. Catla edulis. Forsk. descript. 63. Habit. in Arabia felici. h

19. *crenatus*, inermis, fol. ovatis crenulatis, cymis axillarib. Forst. prod. n. 113. Habit. in insulis Marchionis maris pacifici. h

20. *dilatatus*, inermis, fol. obovatis acuminatis apice serratis, florib. terminalibus. Willd. p. 1127. Thunb. in Act. Linn. Lond. 2. p. 332. Habit. in Japonia. h

21. *myrtifolius*, inermis, fol. ovatis serrulatis, flor. racemosis, caule erecto. L. Hab. in Virginia. h

22. *emarginatus*, inermis, fol. ovatis ovalibusque acuminatis apice emarginato, laeviter serrato-crenatis, pedunc. congestis 1-floris. Flor. Per. 3. p. 6. t. 229. Hab. in Andium nemorib. Frut. 20 - ulnaris polygamio-dioicus. Caps. crocea, 1-3-locular.

23. *verticillatus*, inermis, ramis aggregato-verticillatis, fol. oblongo-lanceolatis serratis, flor. racemosis, pedunc. congestis 1-5-flor. Flor. Per. 3. p. 6. t. 229. Hab. in nemorib. Cuchero etc. Sempervirens, polygamio-dioicus. Caps. turbinata, 3-gona, 2-3-4-locular. Sem. arillo pulposo flavo subobovata. Auctor. quaerunt, an C. *octogonus*. L'Her. eadem species sit?

24. *confertus*, inermis, ramis aggregato-verticillatis, fol. confertis ovalibus subrotundisque serrulatis, flor. congestis. Flor. Per. l. c. Hab. in Peruviae nemorib.

altis. Caps. 2-3-locularis, 2-3-valvis, valvulis patentis - reflexis. Sem. 2-3, arillo croceo, involuta. *h*

25. *tetragonus*, inermis, fol. ovatis serratis, ramis tetragonis. Thunb. prodr. 42. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

26. *articulatus*, inermis, fol. rotundatis acuminatis, pedunc. axillaribus subtrifidis. Thunb. jop. 57. Hab. in Japonia. *h*

27. *alatus*, inermis, fol. oppositis brevissime petiolatis acuminatis serrulatis, ramis alatis. Willd. Thunb. jop. 98. Hab. in Japonia. *h*

\*\*\* *Spinosi, foliis integerrimis.*

28. *linearis*, spinosus, spinis foliosis, fol. linearibus integerrimis. Lin. suppl. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

29. *integrifolius*, spinosus, spinis foliosis, fol. ovatis obtusis integerrimis, cymis lateralibus. Lin. suppl. 153. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

30. *emarginatus*, spinosus, spinis foliosis, fol. ovatis emarginatis integerrimis, umbellulis pedunculatis. Willd. Spec. p. 128. Hab. in India orient. Spini crassi juniores foliosi et floriferi. Pedunc. capillares. Caps. trilocularis trivalvis. Willd. *h*

\*\*\*\* *Spinosi, foliis dentatis.*

31. *phyllacanthus*, spinosus, spinis foliosis, fol. lanceolatis serratis perennantibus, flor. lateralibus. L'Hér. sert. angl. 6. C. *senegalensis*. Lam. enc. 1. p. 654. Hab. in Senegal. *h*

32. *buxifolius*, spinis foliosis, ramis angulatis, fol. obtusis. Lin. R. ramis angulatis, fol. obovato-cuneiformibus obtusis, cymis lateralibus paucifloris. Lam. l. c. 661. Pluck. alm. t. 202. f. 3. Hab. in Aethiopia. Fol. obtusis. *h*

33. *multiflorus*, spinis inferioribus oblongissimis: ramis parvis subfoliosis, fol. obovato-rhomboides, cymis lateralibus multifloris. Lam. l. c. p. 661. C. *hispanicus*. H. P. Hab. in Africa?

34. *pyracanthus*, spinis nudis, ramis teretibus, fol. acutis. Lin. Pluck. phyt. t. 126. f. 2. 3. Comm. hort. 1. p. 103. t. 84. Hab. in Aethiopia. *h*

35. *rotundifolius*, spinosus, fol. petiolatis subrotundis dentatis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. *h*

36. *parviflorus*, spinis nudis, fol. ovatis crenatis, pedunc. filiformibus, fol. longio-

rib. Vahl. symb. 1. p. 21. Catba spinoso. Forsk. descr. 64. Hab. in Arab. felici. *h*

539. *EVONYMUS*. Cor. 5-petala. Caps. 5-gona, 3-locularis, 3-valvis, colorata. Sem. calyptrata.

1. *Tobira*, flor. quinquefidis, fol. obovatis retusis integerrimis. Willd. Sp. 2. p. 1130. Kaempf. amoen. fasc. 5. t. 797. Hab. in Japonia. *h*

2. *japonicus*, florib. quadrifidis, fol. subrotundo-ovatis dentatis. Willd. l. c. Lin. suppl. 154. Banks. Ic. select. Kaempf. t. 8. Hab. in Japonia. Fol. bipollicaria fere. *h*

3. *europaeus* (*vulgaris*), flor. plerisque tetrandris 4-fidis, petal. oblongis pedunc. compressis multifloris, stigmatibus subulatis, fol. glabris. Ait. Kew. 1. p. 273. Hab. in Europ. sepib. *h*

4. *verrucosus*, flor. tetrandris, cortice verrucoso, pedunc. filiformibus teretibus, subtrifloris. Ait. Flor. austr. 3. p. 48. t. 289. Hab. in Carniolae montosis asperis. *h*

5. *latifolius*, flor. plerisque 5-fidis, petal. ovalibus, pentandris, cortice laevi, pedunc. filiformibus teretibus multifloris. Ait. 1. p. 273. Jacq. Flor. austr. 3. p. 48. t. 289. Hab. in Silesia, Bohemia, Austria, Pannonia, Helvetia. *h*

6. *atropurpureus*, flor. tetrandris, pedunc. compressis multifloris, stigmatibus tetragonis truncatis. Ait. 1. p. 274. Jacq. hort. 2. p. 55. t. 126. E. flor. quadrifidis et quinquefidis, fol. lanceolatis nitidulis petiolatis, ramis laevibus. Lam. enc. 2. p. 567. Hab. in Amer. boreali. *h*

7. *americanus*, pedunc. subtrifloris, fol. elliptico-lanceolatis serratis, ramis laevibus. Hellen. diss. in Usteri delect. opusc. bot. 1. p. 95. E. virginianus, caps. verrucarum instar exasperata. Pluck. alm. 139. t. 115. f. 5. Hab. in Virginia. *h*

540. *PILOCARPUS*. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. Stamina sub germine inserta. Caps. quinque, basi coalitae, 1-spermae, elasticae. Sem. arillata.

1. *racemosus*. Vahl. eclog. 1. p. 29. t. 10. Plum. Sp. p. 18. t. 127. Hab. in Montserrat, in altib. montib. Frut. ramis pendulis. Fol. elliptica. Priori generi affinis.

541. *POLYCARDIA*. Petala 5, rotundata. Cal. 5-lobus. Caps.

coriaceæ, 3-5-locularis: valvulis totidem semi-septiferis. *Semina* ad hilum semiarillata. (Flor. 3-4, ex apice foliorum nonnullorum (pedunc. foliiformium?) provenientes!

1. *phyllanthoides*. Lam. ill. p. 373. t. 112. Enc. bot. 5. p. 481. *P. madagascariensis*. Willd. Sp. 1121. Hab. in Madagascar. Frutex. Fol. oblongo-ovata, in floriferis apice emarginata.

+++ *Stamina petalis opposita.*  
*Fructus triloccus.*

542. *HOVENIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala convoluta. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis: loculis 1-spermis.

1. *dulcis*. Thunb. Flor. jap. p. 101. Lam. ill. t. 131. Kœnig. amoen. t. 809. Hab. in Japon. Arb. fol. ovatis serratis. Pedunculi carnosi, edules sapore dulci.

543. *CEANOTHUS*. *Petala* 5, succata formiata. *Bacca* (Caps.) sicca, 3-locularis, 3-sperma.

1. *americanus*, fol. ovalib. serratis subtus tomentosis, racemis axillari composito longe pedunculato. Lin. Michaux. Flor. 1. p. 154. Willd. Spec. 2. p. 1114. Mill. dict. t. 86. Pluck. alm. t. 28. f. b. Hab. in Amer. septent. h

2. *microphyllus*, subdecumbens, fol. minutis subfascicularibus integrisculis, corymbulis terminalib. Michaux, l. c. Hab. in sabulosis sylv. Georg. et Florid. Rad. uti præcedentis, tuberosa, rubra. M.

3. *macrocarpus*, fol. cordato-subrotundis obtusis triplinerviis, corymb. axillarib. Willd. l. c. Cav. ic. 3. p. 38. t. 276. Hab. in N. Hispan. h

4. *asiaticus*, fol. ovatis acuminatis basi rinerviis, flor. axillaribus nemorosis. Lin. Cav. ic. 5. p. 24. t. 440. f. 1. Lam. ill. p. 89. t. 199? *Rhamnus asiaticus*. Lam. enc. 4. p. 474. Hab. in Zeylona et prope Guinapatam in ins. Luzonens. Petala cucullata, lutescentia.

5. *circumscissa*, aculeis solitar. recurvis, fol. oppositis bifariis obcordatis. Gaertn. de fr. 2. p. 110. t. 106. *Rhamnus circumscissus*. Lin. suppl. p. 152. Hab. in Ind. orient. dumetis et in ins. Mauritii.

*Obs.* Ambigui inter *Ceanothum* et *Rham-*

num, priori tamen magis vicina videtur ob pericarpium exsuccum, pressione in valvulas regulares dehiscens. G.

6. *granulosus*, fol. ovato-oblongis acuminatis glabris mitibus medio subserratis, pedunc. brevib. dichotomis multifloris. FL Per. 3. p. 5. t. 238. f. a. Hab. in Peruv. nemorib. Nect. discus fungos. germen ambiciens. Bac. subrotundo-turbinata. h

7. *pubescens*, fol. ovatis acuminatis pubescentib. acute serratis, pedunc. brevibus dichotomis multifloris. Flor. Peruv. l. c. p. 6. f. h. In Andium nemoribus. Bac. prioris, nigra.

8. *colubrinus*, fol. ovatis venosis petiolis ferrugineo-tomentosis caps. sphaericis. *Rhamnus colubrinus*. Lin. Willd. Spec. 2. p. 1066. Com. hort. 1. p. 175. t. 90. Hab. in Amer. Callus nectariferus transversus inter basin staminum. Lin.

9. *reclinatus*, fol. ovatis integris multinerviis, ramis dependentib. L'Herit. sert. angl. p. 6. *Rhamnus ellipticus*. Ait. Swartz. Flor. 1. p. 497. Brown. jam. p. 172. t. 29. f. 2. In Jamaica montosis fruticetis, et in ins. St. Bartholomei. Antecedenti affinis, cum quo fructu 3-roccos a *Rhamnis* differt. h

10. *africanus*, fol. lanceolatis enerviis, panic. terminali. Lin. Pluck. phyt. p. 126. f. 1. Seb. thes. t. 22. f. b. Hab. in Aethiop. Habitus parum recedit. Styl. ex 3bus-coadunatis. h

11. *capsularis*, fol. ovato-cordatis acuminatis serratis, caps. 3-valvib. dehiscen-tibus. Forst. prodr. n°. 112. Cresc. in ins. Tabiti. h

544. *COLLETIA*. *Cal.* villosus, 5-fidus, basi intus villosus v. plicatus. *Petala* 5, squamiformia, aut o. *Bacca* sicca, 3-rocca, 3-partibilis, 3-sperma.

\* *Flor. petalis instructis.*

1. *obcordata*, fol. obcordatis intergerimis 3-nerviis, ramis flexilib. virgatis, petal. squamiformib. Vent. Hort. Cels. p. 92. t. 92. Hab. in Peruv. Spartium refert. Vere fl. h

2. *Ephedra*, aphylla, ramis erectis implexis apice spinosis, flor. in ramulorum nodis conglomeratis. Vent. Choix de Pl. p. 16. t. 16. Cum priore, cui affinis. *Ephedra* menitur.

\*\* *Flor. apetalis.*

3. *serratifolia*, fol. ellipticis argute ser-

ratis, flor. apetalis. Vent. l. c. p. 15. t. 15. Pariter in Peruv. Lycium sistit. h

4. *horrida*, fol. integerrimis, flor. apetalis. Willd. Sp. 2. p. 1113. C. spinosa. Lam. ill. t. 129. Hab. in Brasilia. Pedunc. 1-flori, nutantes. h

545. **PHYLICA**. *Perianthium* 5-partitum, turbinatum, (viliosum). *Petala* nulla. *Squamæ* 5, stamina munientes. *Caps.* tricoeca, infera.

1. *ericoides*, fol. linearibus lanceolatis glabris, ramis subumbellatis, capitulis terminalibus tomentosis. Thunb. prodr. 44. Willd. Sp. 2. p. 1108. Hab. in Aethiopia, et cum plerisque sequentibus, ad Caps. b. spei.

2. *parviflora*, fol. subulatis acutis scabris subpilis, ramis paniculato-multiflor. Linn. Thunb. prodr. p. 44.

3. *lanceolata*, fol. sparsis lanceolatis subtus tomentosis, capitulis terminalibus hirsutis. Thunb. prod. 44. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *bicolor*, fol. linearibus pubescentibus, calyce communib. corolla brevioribus. Linn. A. Cap. b. spei, in campis arenosis. Calyx communis, reticulato-venosus, squamis rubro-carinatis. h

5. *pubescens*, fol. linearib. acutis pilosis subtus tomentosis, flor. spicatis, bracteis villosis filiformib. Ait. Kew. 1. p. 268. Ph. capitata. Willd. p. 1109? Burm. afr. 121. t. 44. f. 3. Lam. ill. 127. f. 2? Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *eriophoros*, fol. linearib. pilosiusculis subtus tomentosis, margine revolutis capitulis terminalibus, flor. tomentosis. Aiton. Kew. 1. p. 269. P. fol. lanceolat. acutis subtus tomentosis, capitulis terminalibus tomentosis. Thunb. prod. 44. Pluck. amalth. 72. t. 445. f. 1. Ph. nitida. Lam.

7. *rosmarinifolia*, fol. linearibus planiusculis erectis, subtus incanis, capitulis ovatis tomentosis. Lam. l. c. Hab. . . Capitula majuscula, compacta, lanuginosa. †

8. *trichotoma*, fol. trigonis obtusis glabris, capitulis terminalibus hirsutis, caul. trichotomo. Thunb. prodr. app. p. 187.

9. *axillaris*, fol. linearibus lanceolatis subtus incanis, flor. distinctis, racemis foliosis terminalibus. Lam. ill. 2. p. 77. Encycl. bot. 5. p. 289. Hab. . . Sequenti affinis, sed differt flor. axillaribus et solitariis. Rami pubescentes, albicantes.

10. *plumosa*, fol. linearibus lanceolatis subpubescentibus, bracteis lanatis spica oblonga. Thunb. prod. 45. Lam. ill. t. 127. f. 4. Pluck. mant. 45. t. 342. f. 3. Hab. in Aethiopia. h

11. *villosa*, fol. linearibus superioribus villosis, flor. racemosis. Th. Hab. ad Cap. bon. spei. h

12. *imberbis*, fol. linearibus obtusis scabris, flor. terminalibus pubescentibus. Linn. Erica africana flor. albedo rorisamarini. Schmus. 2. t. 46. f. 5. Ph. Brunioides. Lam. ill. 2. p. 78. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *stipularis*, fol. linearibus stipulatis, flor. quinquecornib. Linn. Capitulis terminalibus. Thunb. prod. 44. Burm. afr. 117. t. 43. f. 2. Cor. lutea.

14. *cordata*, fol. cordato-ovatis patentibus, caul. prolifero. Com. rar. 62. t. 12.

15. *dioica*, fol. cordatis, flor. dioicis. L. Mant. 342. Cal. squamæ hirtae pilis glaucogriseis. Var. fol. revolutis-linearibus.

16. *buxifolia*, fol. ovatis sparsis ternisq. subtus tomentosis. Linn. Burm. afr. 119. t. 44. f. 1. Habit. in Aethiopia. h

17. *spicata*, fol. oblongis cordatis acuminatis subtus tomentosis, spicis cylindricis, flor. longitudine bractearum. Aiton. Kew. 1. p. 269. P. fol. cordato-sagittatis lanceolatis. Linn. suppl. 153. Lam. ill. t. 127. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Differt ab omnib. capitulo elongato in spicam villosam. h

18. *myrtifolia*, fol. ovatis acuminatis subtus candidissimis, flor. subsolitar. Poir. in encyc. bot. 5. p. 293. Hab. . . Fol. minuta. Bract. O.

19. *callosa*, fol. oblongis cordatis acuminatis pilosis subtus tomentosis, flor. subcapitatis. Ait. Kew. 1. p. 269. Linn. suppl. 153. Ph. reflexa. Lam. ill. 2. p. 79? Distincta. a P. cordata.

20. *paniculata*, fol. ovatis mucronatis superne glabris nitidis subtus tomentosis, racemis foliosis paniculatis. Willd. p. 1112. Accedit ad P. callosam.

21. *imbricata*, fol. cordato-ovatis glabris, flor. racemosis. Thunb.

22. *racemosa*, fol. ovatis glabris, flor. simplicib. paniculato-racemosis. L. Thunb. prod. 45. Beckea cordata. Burm. Hab. juxta Cap. b. spei fossas. h

23. *pinifolia*, fol. acerosis utrinque planis glaberrimis, flor. paniculato-racemosis

glabris. Lin. suppl. p. 153. *Beckea africana*, fol. linearib. canaliculatis. Burm. pr. p. 12. Hab. in Cap. b. spei summis montib. Frut. 5-6-petalis, habitu Tamarisci. Invol. commune o. Vid. Enc. bot. 5. p. 294.

*Obs.* Antecedenti speciei affinis, quacum ratione floris (amborum fructus adhuc examinandus est) a ceteris Phyllicis differt, an ob id hinc cum Bergio separari possunt duae hae species?

#### 546. BRUNIA. Flores aggregati.

*Cal.* superus, 5-partitus. *Filamenta* unguibus petalorum inserta. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* minimae, 2-loculares.

1. *nodiflora*, fol. trigon. incurv. acutis, capitulis in ramis lateralibus terminalibus. Thunb. prod. 41. Willd. 2. p. 1141. Breyn. cent. 22. t. 10. Pluck. mant. 69. t. 346. f. 4. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei.

2. *paleacea*, fol. trigonis rectis arcte adpressis, capitulis corymbosis paleaceis, paleis flor. longiorib. Willd. p. 1142. Th. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *lanuginosa*, fol. trigonis patul. apice fuscis, capitulis globosis fastigiatis. Thunb. prod. 41. Pluck. alm. 361. t. 318. f. 4. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei. Similis B. abrotanoidi. h

4. *verticillata*, fol. trigonis obtusis glabris, ramulis verticillatis fastigiatis, capitulis terminalibus. Thunb. Lin. suppl. 156. Ad Cap. b. spei.

5. *densa*, fol. trigonis glabris apice nigris, capitulis terminalib. Thunb. prodr. spp. p. 187. Cum sequentib. ad Cap. b. spei.

6. *microphylla*, fol. ovato-trigonis carnosis glabris, capitul. terminalibus, ramis divaricatis. Thunb. l. c.

7. *laxa*, fol. trigonis, floribusque spicatis glabris. Thunb.

8. *alopecuroides*, fol. trigonis acutis glabris, capitul. lateralib. globosis glabris. Thunb. l. c.

9. *laevis*, fol. linearibus convexis incurvis, capitul. terminalib. Thunb.

10. *abrotanoides*, fol. lanceolatis glabris squarrosis, capitul. subfastigiatis. Th. Burm. afr. 266. t. 100. f. 1. Levisanus capensis, serpilli folio. Pet. gaz. 9. t. 5. Pluck. mant. 69. t. 346. f. 7. Habit. in Aethiopia. Germen superum. Stylus 1, emarginatus.

11. *superba*, fol. triquetris filiformibus calloso-mucronatis patulis, ciliato-villosis. Hab. ad Cap. b. spei. h +

12. *fragarioides*, fol. triquetris adpressis margine ciliatis. Willd. p. 1143. Ad Cap. bon. spei. Fol. parva lineari-filiformia. h

13. *ciliata*, fol. ovatis acuminatis ciliatis. Lin. Sp. pl. 288. Hab. in Aethiopia. Germen superum. Stylus bifidus. h +

#### 547. STAAVIA. Flores aggregati.

*Stam.* calyci inserta. *Styli* 2, coaliti. *Bacca* 5-sperma corticata. *Receptaculum* paleaceo-villosum.

1. *radiata*, fol. lanceolato-trigonis patulis, calycis radio colorato, capitulo brevior. Th. prod. 41. Willd. Sp. 2. p. 1144. Brunia radiata. Pluck. L. mant. 47. t. 454. f. 7. Moris. s. 6. t. 3. f. 43. Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *glutinosa*, fol. lineari-lanceolatis trigonis patulis, radio calycis colorato capitulo longiore. Thunb. prod. 41. Lin. sub Brunia. Pluck. mant. 149. t. 431. f. 1. ? Hab. ad Cap. b. spei. Similis praecedenti at discus major glutinosus. h

#### 548. PLECTRONIA. Cal. turbinatus, 5-dentatus, persistens, clausus sinibus s. squamis 5, villosis.

*Petala* 5, calycis fauci inserta. *Bacca* infera, 2-locularis, 2-sperma.

1. *corymbosa*. Burm. prodr. P. ventosa. Willd. Spec. 2. p. 1152. Burm. afr. t. 94. Hab. ad Cap. b. spei. Arb. ramis 4-gonis. Fol. lanceolato-ovata.

#### 549. CARPODETUS. Cal. turbinatus, germiini adnatus, 5-dentatus: dentibus deciduis. Petala calyc. margini inserta. Stigma capitatum. Bacca seminfera, sicca, medio annulata, 5-locularis.

1. *serratus*. Forst. gen. p. 33. t. 17. Willd. p. 1113. Hab. in N. Zeelandia.

*Obs.* Hoc et antecedens genus Rhamnis affinis, ab iis fructu infero distincta.

#### 550. BIOSMA. Cal. sub-5-partitus persistens. Cor. 5-petala. Nec-

*taria* 5, supra germen. Caps. 3 s. 5, coalitæ. Semina calyptrata.

1. *oppositifolia*, fol. trigonis obtusis ciliatis, flor. terminalib. Th. prod. 43. Willd. Sp. 2. p. 1133. Pluck. alm. 136. t. 279. f. 4? Vid. D. scabra. Lam. enc. 2. p. 283. Habit. ad Cap. b. spei, cum sequentibus speciebus; quæ omnes parvi frutescentes sunt.

2. *obtusata*, fol. trigonis acutis punctatis, calyce, petalisque ciliatis, ramulis pubescentib. Th. prod. 84.

3. *linearis*, fol. linearib. obtusis glabris patulis, flor. terminalibus subsolitariis. Th.

4. *virgata*, fol. trigonis obtusis punctatis glabris, flor. subracemosis fastigiatis. Th.

5. *alba*, fol. trigonis acutis punctatis, bracteis calyceque ciliatis. Th.

6. *hirsuta*, fol. trigonis mucronatis hirsutis, flor. terminalib. subsolitariis. Thunb. Comm. rar. 3. t. 3.

7. *rubra*, fol. trigonis mucronatis glabris subtus bifariam punctatis, lacin. calycinis glabris. Th. Comm. rar. 2. t. 2. Pluck. mant. 68. t. 347. f. 4. Hab. in Aeth. Habitus juniperi. Fol. subtus punctis pertusa. An flor. rubri? Vid. Lam. enc. 2. p. 285.

8. *pectinata*, fol. trigonis acutis punctatis ciliatis. Th. Hab. ad Cap. b. spei. h

9. *ericoides*, fol. trigonis obtusis glabris, flor. terminalib. subsolitariis. Thunb. Pluck. analib. 236. t. 279. f. 5. Hab. in Aethiopia. h

10. *hispida*, fol. trigonis muticis villosis hispida patulis, umbellis terminalibus. Th. D. capensis. Lin. Murr. syst. ed. 14. p. 239. Hab. ad Cap. b. spei. Stamina sterilia huic fere petaloidea sunt. h

11. *ciliata*, fol. lanceolatis carinatis ciliatis, umbellis terminalib. Th.

12. *bifurca*, fol. trigonis acutis hirsutis, racemis terminalib. subumbellatis.

13. *bifida*, fol. lanceolatis mucronatis punctatis glabris imbricatis, flor. capitatis, petal. bifidis. Willd. Sp. p. 1136. Jacq. coll. 3. p. 278. t. 20. f. 1.

14. *capitata*, fol. trigonis villosis-lipidis imbricatis, florib. spicato-capitatis. Th. Caulis prolixa, facie Bruniae nodifloræ.

15. *villosa*, fol. lanceolatis villosis imbricatis, capitulis terminalib. Th.

16. *cupressina*, fol. ovatis trigonis glabris imbricatis, flor. terminalib. solitariis. Brunia uniflora. Lin. Spec. pl. 2. p. 289.

17. *imbricata*, fol. ovatis acutis ciliatis, umbellis terminalib. Th. Similis D. ciliatæ, sed Petala purpurea subrotunda.

18. *marginata*, fol. cordatis, inferiorib. ovatis, superioribus lanceolatis, umbellis terminalib. Th. Lin. suppl. 155.

19. *lanceolata*, fol. lanceolatis obtusis subpilosis, flor. axillarib. geminis. Th.

20. *pubescens*, fol. lanceolato-trigonis muticis villosis imbricatis, umbellis terminalib. Hartogia ciliaris. Lin. Syst. Nat. p. 223. Pluck. alm. 197. t. 411. f. 3.

21. *latifolia*, fol. ovatis crenatis pubescentibus, pedunc. lateralib. unifloris, ramis subtomentosis. Th. prod. Lin. suppl. 154.

22. *crenata*, fol. ovatis crenatis subtus punctatis, flor. axillarib. solitariis. Calycis fol. subulata, crenata.

23. *tetragona*, fol. ovatis carinatis ciliatis quadrifariam imbricatis, flor. terminalib. solitariis. Th. Lin. sup. 155. Facile distinguitur fol. valde approximatis, quo caulibus illis totius obiectus evadat.

24. *uniflora*, fol. oblongis subtus punctatis, flor. terminalibus, calycib. ciliatis. Th. Sert. hanov. 1. p. 16. t. 8. Flos huic speciei maximus.

25. *rugosa*, fol. ovatis rugosis villosis reflexis, umbellis terminalib.

26. *ovata*, fol. ovatis glabris marginatis, flor. axillarib. solitariis et geminis. Th. D. pulchella. Houttuyn. t. 21. f. 2.

27. *barbigera*, fol. cordatis acutis glabris, umbellis terminalib. Th. Lin. suppl. p. 155. Petal. barbata. Pistil. 1, flore longius.

28. *glandulosa*, fol. ovatis acutis carinatis hirsutis patulis, cal. villosis. Th. prodr. p. 187.

29. *betulina*, fol. subcuneatis crenatis subtus punctatis, flor. lateralibus solitariis. Hartogia (betulina). Berg. cap. 67.

30. *orbicularis*, fol. orbiculatis, ramis villosis.

31. *pulchella*, fol. ovatis glanduloso-crenatis glabris, flor. axillarib. geminis. Th. prod. 43. Fructus 3-locularis. Cornua terminata glandulis duabus. Polymor. hum genus sexu, nectariorum figura, capsularum numero, suavit. divisionem in Diosmata et Hartogias, sed utraque demum plures observationes retraxerunt in unum. Linn.

*Obs.* Hoc genus secundum ill. Jussieu ad familiam Rutaceam pertinet.

551. BURSARIA. *Cal.* inferus, 5-dentatus. *Petala* 5, linearia. *Stigma* simplex. *Caps.* cordata, compressa, 2-partibilis, disperma. *Sem.* reniformia.

1. *spinosa*, caul. fruticoso spinoso, fol. emarginatis, flor. racemosis. Cav. ic. 4. p. 30. t. 350. Hab. prope Jackson et Botany Bay N. Hollandiae. *Caps.* siliculam Thlasp. Bursae pastoris adaequat, unde nomen. *h*

552. GOUANIA. Polygama. *Cal.* superus turbinatus, 5-fidus. *Petala* 5, squamiformia. (*Cor.* o. Lin.) obvolvencia *stamina*, (*Antheræ* 5, sub calyptra tectæ. L.) *Stigma* 3-fidum. *Fruct.* tripartibilis: coeculis s. *capsulis* 3-gonis dorso saepius 2-alatis, 1-spermis non dehiscentibus. Juss. (Flor. masculi hermaphroditis mixti.)

1. *domingensis*. Linn. G. glabra. Jacq. amer. pict. p. 128. t. 264. f. 96. Lam. ill. t. 845. Vahl. symb. bot. 3. p. 101. Habit. in St. Dominica. Frut. scandens habitu Vitis et Paulliniae.

553. PITTOSPORUM. *Cal.* deciduus. *Petala* 5, in tubum conniventia. *Caps.* 2-5-locularis, 2-5-valvis. *Semina* pulposa.

1. *undulatum*, fol. ovato-lanceolatis undulatis acutis nitidis, pedunc. ternis terminalib. trifloris. Vent. Hort. Cels. p. 76. t. 76. Habit. in ins. Canaria. Frut. sempervirens, viscoso-pulverulentus. Fruct. adhuc ignotus. Pet. oblonga odor fortis.

2. *coriaceum*, fol. obovatis obtusis coriaceis, caps. 2-valvibus. Act. 3. p. 483. Willd. Sp. 2. p. 1145. Andrew. t. 151. Lam. ill. t. 144. Habit. in ins. Canariis. Cor. caerulea.

554. LICANIA. *Cal.* turbinatus, 5-fidus. *Petala* 6, fauci cal. inserta. *Drupa* olivæformis, carnosa. *Nux* ovata, sibris tecta, 1-locularis.

1. *incana*. Aubl. t. 45. Lam. ill. t. 122. *Hedycrea* Schreb. gen. pl. p. 160. secundum quem Cor. o. Willd. Sp. 2. p. 1210. Hab. in

Guyana. Fol. alterna simplicia, stipulacea. Flor. parvi, spicati. Drupa punctata, edulis. *h*

555. CALODENDRUM. *Cal.* 5-partitus brevis. *Cor.* 5-partita, petalis lanceolatis, unguiculatis. *Stam.* 5-sterilia, petaliformia (*Nectar.* 5-phyllum Th.) *Caps.* 5-angularis, 5-locularis, 5-valvis: loculis 2-spermis.

1. *capense*. Th. prod. p. 44. Willd. Spec. 2. p. 1148. Lam. in Journ. d'Hist. natur. n°. 2. p. 56. t. 3. Dict. capensis. Lin. suppl. p. 232? Hab. ad Cap. b. spei. Arb. truncato crasso ob flor. paniculas formosa. Pet. glandulosa. E Dictamni familia.

556. CEDRELA. *Cal.* marcescens. *Cor.* 5-petala, infundibuliformis, basi ad  $\frac{1}{3}$  receptaculo adnata. *Caps.* lignosa, 5-locularis, 5-valvis. *Sem.* deorsum imbricata, ala membranacea.

1. *odorata*, flor. paniculatis, fol. pinnatis. Willd. Sp. 2. p. 1147. Lam. ill. gen. t. 37. Brown. jani. 158. t. 10. f. 1. Hab. in Amer. merid. Arb. procera, frondosissima, adhuc junior allium redolens, et cujus lignum pariter odoratum, ad varia utensilia perutile. Flor. Per. 3. p. 9.

557. HUMBOIDTIA. *Cal.* 4-partitus. *Petala* 5. *Legumen* oblongum, compressum.

1. *laurifolia*. Willd. Spec. 2. p. 1147. Batschia laurifolia. Vahl. symb. 3. p. 39. t. 56. Hab. in Zeylona. Arb. ramis articulatis flexuosis inanib. Fol. pari pinnate 4 vel 5-juga. Racemi axillares solitarii vel gemini multiflori. Willd. *h*

558. HUERTEA. *Cal.* 5-dentatus, inferus. *Petala* ovata, sessilia. *Stigma* 2-fidum, acutum. *Drupa?* obovata. *Nux?* unilocularis.

1. *glandulosa*, fol. imparipinnatis. Fl. Per. 3. p. 5. t. 227. f. a. Habit. in Peruviae nemorib. Arb. 30-ulnaris, coma frondosa, truncato crasso. Pedicel. bracteolis stipatis. Glandulae 2, ad basin foliolorum parium, et 2 ad basin singuli folii.

*Obs.* Auctores l. c. p. xxx, hanc arborem ex Rhamnii familia putant, forte Araliis affinis videtur.



559. CAMAX. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* rotata 5-loba. *Stigma* 3-4-fidum. *Bacca* (villosa) 4-locularis, polysperma.

1. *fraxinea*. Willd. Sp. 2. p. 1117. Ropourea gujanensis. Aubl. 1. p. 198. t. 78. Lam. ill. t. 121. Hab. in sylvis Gujanæ. Flor. parvi numerosi cum fol. pinnatis? verticillati. h

560. TODDALIA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stigma* capitatum. *Caps.* baccata, 5-locularis: loculis 1-spermis. (*Bacca* sicca. Lam.)

1. *aculeata*, caul. aculeato, fol. ovatis acuminatis. Lam. ill. t. 139. Scopolia aculeata. Smith. ic. ined. 1. p. 34. Willd. 2. p. 1115. Paullinia asiatica. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 62. f. 1. Schreb. Pluck. alm. 202. t. 35. f. 5. Hab. in India orient. Panic. racemosae axillares. Willd. h

2. *inermis*, caul. inermi, foliol. obovat. obtusis. Willd. sub Scopolia. Lam. l. c. t. 139. f. 2. In ins. Borbonia? Corymb. terminalis. Willd. h

561. RUYSCHIA. *Cal.* 5-phyllus, involucreatus. *Cor.* 5-petala, reflexa. *Stylus* o. *Stigma* 4-5. *Bacca* sub-5-locularis, polysperma.

1. *clusiaefolia*, fol. obovatis integris aveniis, flor. bractea solitaria. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 502. Jacq. amer. 75. t. 51. f. 2. Willd. p. 1116. Habit. in Martinicæ sylvis interioribus, in arborum truncis. h

2. *Souroubea*, fol. obovatis obtusis mucronatis venosis. Willd. *Souroubea*, fol. obovatis emarginatis apice denticulatis venosis, flor. bracteis tripartitis. Swartz. l. c. 1. p. 504. Lam. ill. t. 135. *Souroubea* gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 244. t. 97. Logania pentacrina. Scop. Gmel. Hab. in sylvis Gujanæ ad ripas rivuli Gallion dicti. h

562. CORTESIA. *Cal.* inferus, 10-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 2-partitus. *Stigma* globoso-peltatum. *Bacca* disperma.

1. *cuneifolia*, caul. fruticoso ramosissimo, fol. alternis cuneiformibus trifidis, flor. solitariis. Cav. ic. 4. p. 53. t. 377. Hab. in Buenos-Ayres planitie Pampas. Flor. Mayo.

*Obs.* Hoc genus, honori Ferd. Cortesii, herois illius intrepidus ac imperii Mexici debellatoris, dicatum, ad familiam Boraginæam aut Sebastanæam pertinere videtur et secundum auctorem generi *Rocheportiae*. Sw. affine est.

563. EUPAREA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-12-petala. *Bacca* exsucca polysperma.

1. *amoena*. Gaert. sem. 1. p. 230. t. 50. f. 5. Willd. Sp. 2. p. 1183. Lam. ill. t. 133. Hab. in Nov. Holland. Procumbens, facie Nummulariæ. Flor. colore Anagallidis phoeniceæ. Caps. Trientali proxima. Gaert.

564. ÆGICERAS. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Caps.* arcuata, unilocularis, univalvis, monosperma.

1. *majus*, fol. ellipticis acutis venosis, caps. cylindraceis arcuatis. Willd. Sp. 2. p. 1183. Gaert. sem. 1. p. 216. t. 46. f. 1. Rhizophora corniculata. Lin. Mangium fruticosum corniculatum. Rumph. 3. t. 77. Hab. in Moluccis. h

2. *minus*, fol. ellipticis obtusis subaveniis, caps. acinaciformib. Willd. Gaert. l. c. t. 46. f. 1. Rumph. 3. t. 82. Hab. in Moluccis. h

565. BILLARDIERA. *Petala* quinque, foliolis calycinis alterna. *Nectar.* nullum. *Stigma* simplex. *Bacca* supera polysperma.

1. *scandens*, pedunc. solitar. unifloris, fol. subhirsutis. Smith. N. Holl. 1. p. 1. t. 1. Hab. in N. Holland. h

566. MANGIFERA. *Cor.* 5-petala. *Drupa* reniformis.

1. *indica*, fol. oblongo-lanceolatis, flor. submonandris, drupa maxima reniformi. Lam. enc. 3. p. 667. Willd. Spec. 2. p. 1150. Jacq. coll. 4. p. 96. Icon. rar. v. 2. t. 337. Rumph. 1. t. 25. Rheed. 4. t. 1. 2. Habit. in Ind. h

2. *laxiflora*, fol. ovato-lanceolatis subsessilibus, flor. pentandris, drupa ovata subrotunda. Hab. in ins. Mauritiis. h

3. *axillaris*, fol. ovato-oblongis obtusiusculis, panic. axillaribus, flor. decandris. Lam. l. c. Hab. in Ind. h

567. HIRTELLA. *Pet.* 5. *Filam.* longissima persistens, spiram

lia. *Bacca* 1-sperma. *Stylus* lateralis. (Stam. 3 et 5.)

1. *americana*, racemis simplicib. axillarib. solitariis, pedunc. communi villosa, flor. pentandris, fol. oblongis acuminatis. Willd. Sp. 2. p. 1151. Sw. obs. 94. Aubl. t. 98. Hab. in Brasilia, Gujan. et Cajenna. h

2. *peruviana*, fol. oblongis acuminatis, racemis compositis pubescentibus, floribus triandris. H. *racemosa*. Flor. Peruv. 3. p. 5. t. 227. f. b. Cosmibuena prodr. Flor. Per. p. 10. t. 2. In Chinchao nemorib. Drup. cuneiformis subplicata parum recurvata, hirsuta, 1-sperma. Styl. basi germinis. h

3. *triandra*, racemis compositis terminalib. solitariis, pedunc. communi pubescentis, flor. triandris, fol. oblongis acuminatis. Willd. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 508. H. *americana*. Jacq. amer. p. 8. t. 8. Hab. in sylvis Jamaicae, Hispaniolae, Martinicae ad latera torrentum. h

4. *paniculata*, racemis compositis terminalibus aggregatis, pedunc. communi hirsuto, flor. pentandris, fol. ovalib. acutis. Willd. Sw. Fl. ind. occ. 1. p. 510. Hab. in Cajenna. h

5. *rugosa*, fol. ovato-acuminatis subbulato-rugosis, pedunc. villosissimis, flor. fasciculatis. Hab. in Portorico. In specimen, communicato a Dom. Thuillier, fol. sunt superne niuida, inferne sparsim et ad nervos pilosa. Stam. 3. h

568. WALKER A. *Cal.* 5-partitus infusus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* 5. monospermae. *Nuces* reniformes.

1. *serrata*. Willd. Spec. p. 1145. Meesia serrata. Gaert. sem. 1. p. 344. t. 70. f. 6. In Ind. orient. Fol. alterna. Corymbi terminales. Flor. parvi flavescentes. Willd. h

569. BARRERIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* rotata: lacinis scrobiculatis. *Filam.* dilatata. *Anth.* tetragonae, marginatae, marginibus coherentibus. *Fructus*...

1. *theobromaeifolia*. Willd. Spec. 2. p. 1145. Poraqueiba gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 123. t. 47. Lam. ill. t. 134. Hab. in sylvis prope flumen Sinemari Gujanae. Arbor 50-pedalis. Fol. alterna. Spica axillaris. h

570. GALAX. *Cor.* hypocrateriformis. *Cal.* 10-phyllus. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, elastica.

1. *aphylla*. Lin. excl. Synon. Gron. Virg.

Viticella. Mitch. gen. 24. Habit. in Virginia. h

571. LASIOPETALUM. *Perianthium* 3-phyllum, (tomentosum) persistens. *Cor.* rotata, hispida (lanuginosa Andr.): lacinis ovatis incurvatis. *Anthera* bilobae, apice poris 2. *Caps.* supera, 3-locularis, 3-valvis, dissepimento medio valvularum. Smith.

1. *ferrugineum*, fol. lineari-lanceolatis obtusis inaequaliter sinuatis, subtus lanuginosis, flor. racemosis axillarib. Andrew. t. 208. Smith. in Act. Soc. Lin. 4. p. 217. Hab. in N. Holl. ad portum Jackson, in paludosis. Plant. viminea, ramis extensis, tomento ferrugineo, fol. superficie excepta, undique tecta.

Obs. Quamvis in systemate artificiali forte indifferens videtur, quoniam locum planta quaedam occupet, tamen hoc (et sequens genus?) ob affinitatem inter plantas ericoideae, p. 174. (ubi ex improvisis omissum) collocandum est.

572. CRYPTANDRA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* tubulosa, limbo 5-fido: squamis 5. cucullatis inter segmenta. *Stam.* fauci inserta sub singulis squamis. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* supera, 3-valvis, 3-locularis e valvulis inflexis. *Sem.* solitaria compressa.

1. *australis*. Fruticulus ericoideus, fol. fasciculatis, florib. capitatis extus setosis. Smith. in Act. Soc. Lin. vol. 4. Hab. in Australia.

573. VENTILAGO. *Cal.* tubulosus. *Cor.* squamae stami. munientes, cal. inserta. *Caps.* supera, sphaerica, ala longissima terminata. *Sem.* solitarium.

1. *madraspatana*, scandens, fol. ovatis integerrimis glabris. Willd. in Nov. Act. Berol. v. 2. Ej. Sp. 2. p. 1106. Gaertn. 1. p. 223. t. 49. Roxb. Corom. 1. p. 55. t. 76. Rumph. 5. t. 2. In Indiae montosis et maritimis. h

2. *denticulata*, fol. ovatis crenatis pubescentib. Willd. in N. Act. Berol. 2. Hab. in Ind. prope Samulcotta. Genus e Malignia familia videtur.

574. ERYCIBE. *Cal.* 5-dentatus,

inferus. *Cor.* 1-petala decemlobata. *Styl.* o. *Stigma* 5-sulcatum. *Bacca* 1-sperma.

1. *paniculata*. Roxb. *Corom.* t. 2. ic. Hab. in sylvis *Coromandeliae* montosis. Frutex scandens, junior fuliginoso-pulverulentus.

575. *RIBES. Petala* 5 et *Stamina* calyci inserta. *Stylus* 2-fidus. *Bacca* polysperma, infera.

\* *RIBESIA. Inermia*, *for. racemosis*.

1. *rubrum*, inermis, racemis glabris natis, flor. planis (petal. obcordatis), fol. obtuse quinquelobis, caule erecto. Willd. Sp. 2. p. 1153. Smith brit. t. p. 263. Flor. dan. t. 667. Var. fructib. albis. Flor. lutescentes. Hab. sponte in Sueciae et Angliae borealibus. h

2. *petraeum*, inermis, racemis pilosiusculis erectis, flor. planiusculis (petalis obtusis) rubris, fol. acuminato-lobatis inciso-dentatis, caule erecto. Willd. Smith. l. c. R. racemis florentib. erectis, frutescentibus pendul. Jacq. ic. 1. t. 49. Misc. 2. p. 36. Hab. in alpib. Carinthiacis, Syriacis, et in Silesia, Bohemia, etiam in Angliae montosis. h

3. *spicatum*, inermis, spicis erectis, petalis oblongis, bract. flore breviorib. Smith. l. c. p. 264. Robson. in Trans. of Linn. Soc. 5. p. 240. t. 21. Hab. in sylvis Angl. boreal. Fol. R. rubri, subtus magis tomentosa. Baccae R. rubri. An prioris var.? h

4. *trifidum*, inermis, fol. glabriusculis, racem. pubescentibus, flor. parvis petalis (purpureis) spathulatis, baccis hirsutis, cal. lacin. subtrifidis. Michaux. Flor. 1. p. 110. Hab. juxta Quebec et sinum Hudsonis.

5. *rigens*, inermis, racem. erectis, fol. reticulato-rugosis, subtus pubescentibus, racemis (etiam fructiferis) rigescentibus, bacc. hispidulis. Michaux. l. c. Hab. in Canada, ad amnem Mistassin.

6. *procumbens*, inermis, racem. erectis, flor. planiusculis, fol. obtuse lobatis, caule procumbente. Willd. p. 1154. Pall. ross. 2. p. 35. t. 65. Hab. in Davuriae muscosis umbris paludosis. h

7. *prostratum*, inermis, ramis reclinato-prostratis, racem. suberectis, bacc. hispidis. Lam. enc. 3. p. 48. L'Her. Stirp. t. 2. R. glandulosum. Ait. Willd. p. 1154. Hab. in Amer. boreal. ins. Newfoundland. h

8. *alpinum*, inermis, racemis erectis: bracteis flore longioribus, fol. subtus luci-

dis. Flor. Dan. t. 668. Jacq. austr. t. 47. Hab. in montosis et subalpinis. Polygama dioica. Bac. insipidae.

9. *fragrans*, inermis, racemis erectis, cor. campanulatis, fol. obtuse trilobis, caule ascendente. Willd. p. 1155. Pall. Nov. Act. Acad. Petrop. 10. p. 377. t. 9. Hab. in Sibiria in montibus Mongolice finitimis altioribus. Baccae rubicundae, suavissimi saporis. h

10. *triste*, inermis, racem. pendulis, cor. planiusculis, fol. quinquelobis. Willd. Pall. in N. Act. Acad. Petrop. 10. p. 378. Hab. in Sibiria circa summa montium cacumina Jugi Jablennoi et in altioribus montibus Mongolice finitimis. Bac. parvae nigrae insipidae, scatentes succo atro-rubro, ad tingenda vina praestantissima. Pall. l. c. h

11. *macrolophyrs*, inermis, racemis longissimis pendulis hirsutis, fol. cordatis lobatis inciso-serratis, petiol. basi ciliatis. Fl. Peruv. 3. p. 12. t. 202. Hab. in Peruviae Andium nemorib. Fol. vitis viniferae habitu. Bac. hirsuta, viridis.

12. *albifolium*, inermis, racemis fol. duplo longioribus, pendul. fol. subcordatis trilobis inciso-serratis petiol. ciliatis. Flor. Peruv. l. c. f. b. Hab. in nemorib. Munna locis frigidis. Flor. purpurascens.

13. *punctatum*, inermis, racemis pendulis brevibus, fol. trilobis serratis subtus punctatis. Flor. Peruv. t. 233. f. a. In Chile collib. Bac. rubra, punctata.

14. *albinervium*, inermis, fol. abbreviat. acute lobatis glabriusculis: nervis albidis, racem. recurvatis. Michaux. Hab. in Canada, ad amnem Mistassin. Baccae glabrae, rubrae. h

14. *recurvatum*, inermis, ramis recurvatis, fol. latiusculis acute lobatis pubescentibus glanduloso punctatis, racemis reflexis, tubulatis glabris (baccis nigris). Michaux. Flor. p. 110. Hab. ad ripas Latorum juxta sinum Hudsonis.

16. *nigrum*, inermis, fol. subtus punctatis, racem. laxis, flor. campanulatis, bract. pedicellis breviorib. Lam. enc. 3. p. 295. Fl. dan. t. 356. Hab. ad ripas fluvior. et sepes Graveolens. h

17. *pensylvanicum*, inermis, fol. utrinque punctatis, flor. racemosis subcylindricis, bract. pedicellis longiorib. Lam. l. c. R. floridum. Willd. p. 1156. Dill. elth. 324. t. 244. f. 315. Hab. in Pensylv. h

18. *glandulosum*, inermis, racem. brevibus, fol. coriatis obtuse trilobis duplicato-serratis rugosis. Hab. in collib. sylva-

ticis Chile. Frutex biorgyalis glandulosus. Cal. glandulos., pubescens.

19. *viscosum*, inermis, racem. brevibus, fol. cordatis 5-lobis serratis asperis viscosis. Flor. Peruv. 3. p. 13. Habit. in Peruviae præruptis. Cal. flavus. Bacca dilute purpurea.

20. *cuneifolium*, inermis, pedunc. 2-3-floris, fol. cuneiformib. incis. Habit. in Peruv. alpih. Fol. fasciculate. Bract. duæ ad basin singuli floris. Habitus Grossulariæ, fruct. magni. Flor. Per. l. c.

\*\* *Grossularia*, *aculeata*, *pedunc. plerisque paucifloris*, *fruct. majusculis*.

21. *Diacantha*, aculeis geminatis stipularibus, fol. cuneiformi-tripartitis dentatis, flor. racemosis. Willd. p. 1157. Ravillis bispinosis, racem. erectis, fol. cuneiformibus incis. Pall. ross. 2. p. 36. t. 66. Itin. 3. app. n°. 79. t. 2. f. 2. Habit. in glaucosis saxosis, locisque salsis Davuriæ. Media int. r. Grossularias et Ribesias. Nonnunquam aculei desunt. h

22. *saxatile*, aculeis sparsis, fol. cuneiformib. obtuse trilobis, racem. erectis. Willd. Pall. Nov. Act. Acad. Petrop. 10. p. 376. Habit. in Sibiria in montib. granitosis Songariæ. Species media inter R. alpinum et R. Diacantham, habitu Grossulariæ, fructu Ribesii. h

23. *rotundifolium*, spina subaxillari, fol. suborbiculatis: lobis subrotundo-obtusis, pedunc. 1-floris, limbo calyc. tubuloso, bac. glabra. Michaux. p. 117. Hab. in Carol. montib. excelsis.

24. *hirtellum*, spinula subaxillari, ram. subhispidis, fol. parvis semitrifidis: lobis subdentatis, pedunc. 1-floris, bac. glabra rubra, Michaux. In Amer. boreal. saxosis, ad amnem Sagney. h

25. *gracile*, spina subaxillari, fol. petiol. gracilibus utrinque pubescentibus: lobis acutis dentato-incis. pedunc. capillarib. subbifloris, cal. tubulato-campanulatis glabris. Michaux. l. c. Habit. in montib. Tennesseæ.

26. *reclinatum*, ramis subaculeatis reclinatis, pedunc. bractea triphylla. Linn. Hab. in Germania, Helvetia. h

27. *Grossularia*, ramis aculeatis, petiol. pilosis, bract. 2-phylla, bac. hirsutis (aut glabris). Linn. vid. Smith. brit. 1. p. 266. Hab. in Europ. sylv. et sepibus. Pili in fructu capitiati. h

28. *Uva crispa*, ramis aculeatis, bac. glabris, pedicellis bract. monophylla. Hab. in Eur. boreali. Var. prioris? h

29. *oxyacanthoides*, aculeis majoribus et subsolitariis ad gemmas, minoribus undique sparsis, bac. glabris subgeminis. Lam. enc. 3. p. 51. Dill. elth. t. 139. f. 166. Habit. in Canada.

30. *lacustris*. R. oxyacanthoides? spina subaxillari multiplici, caul. undique hispidulo, fol. ultra medium lobatis, petiol. villosis, bac. racemosis hispidis. Michaux, p. 111. Hab. ad lacus Mistassins.

31. *Cynosbati*, aculeis 2 passim subgeminis, fol. molliter pubescentibus, racem. nutanti-paucifloris, cal. erecto-campanulatis, bac. aculeatis. Mich. l. c. Jacq. hort. 2. t. 123. Hab. in Canada. h

576. *HEDERA*. *Petala* 5, oblonga. *Bacca* 5-sperma, calyce cincta.

1. *Helix*, fol. tri-quinquelobis: floralib. ovatis, umbella erecta. Willd. Spec. 2. p. 1179. In Eur. arboribus, muris aut saxis repente scandens. Flor. sero autumno. h

2. *pendula*, fol. ovato-lanceolatis integris, umbel. subcapitatis, pedunc. longissimis pendulis. Swartz. Flor. ind. occ. 1. p. 512. Hab. in altis montibus Jamaicae. h

3. *nutans*, fol. ellipticis coriaceis, umbel. nutantibus hemisphaericis, pedunc. erectiusculis. Swartz. l. c. p. 514. Hab. in montib. caeruleis Jamaicae. austr. h

4. *terebinthinacea*, fol. septenatis ellipticis integerrimis, racemo terminali, pedunc. umbellatis. Willd. Vahl. symb. 3. p. 42. Hab. in sylv. et nemorosis Zeylonae. h

Obs. Familiae *Caprifoliæ* affinis genus.

577. *VITIS*. *Petala* apice calyptratim coherentia, emarcida. *Bacca* 5-sperma, supera.

1. *vinifera*, fol. lobatis sinuatis nudis aut tomentosis. 3. *Apyrena*, s. *Corinthiaca*. Bauh. hist. 2. p. 72. Ubique fere colitur. Var. bac. rubris, cui fol. tomentosa sunt. h

2. *palmata*, fol. palmatis glabris, lacin. incis. umbel. racemosis. Vahl. symb. 3. p. 42. Hab. in Virginia. h

3. *indica*, fol. cordatis dentatis subtus villosis, cirrhis racemiferis. Linn. Sylvestris, sarmentis lacte repentibus, uvis mi-

morib. nigris. Brown. jam. 178. Sloan. hist. 2. t. 110. f. 4. Pluck. phyt. 249. f. 1. Hab. in Ind. utraque. h

4. *flexuosa*, fol. cordatis dentatis, subtus villosis, caul. flexuoso, panic. elongatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 332. Hab. in Japonia. h

5. *Labrusca*, fol. cordatis subtrilobis dentatis subtus tomentosis. Lin. Plum. sp. 18. ic. 259. f. 1. Hab. in America septentrionali. h

6. *vulpina*, fol. cordatis dentato-serratis utrinque nudis. Sp. Hab. in Virgin. h

7. *heterophylla*, fol. simplicib. incisoritribus quinquelobisque serratis nudis. Th. jap. 103. Hab. in Japon. h

8. *laciniosa*, fol. quinatis: foliol. multifidis. Hab. .... Fol. parva eleganter incisa. h

9. *heptaphylla*, caul. scandente, fol. septenatis ovatis integerrim. Hab. in Ind. orient. Similis *V. hederaceae*. Spicae simplices, subtomentosae: flor. verticillatis. Petal. apice cohaerentia. Stam. 5. h

10. *pinnata*, fol. pinnatis dentato-serratis glabris. Vahl. symb. 3. p. 43. Hab. ... Pedicelli umbellati. *V. Rami purpurascentes*. h

578. **RORIDULA**. *Cal.* 5-phyllus. *Petal.* 5. *Anthere* basi scrotiformes, apice poro 2 dehiscen-tes. *Styl.* 1. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis.

1. *dentata* (verticillata). Lin. Lam. ill. t. 141. Irion verticillatum. Burman. *Drosera Roridula*. Thunb. Hab. ad Cap. bon. spei. Tota planta ut *Drosera* pilis glandulosis viscida. Fol. in caule suffruticoso verticillatim congesta, linearia, ciliata.

579. **LAGOECIA**. Umbella simplex. *Invol.* universale sub-8-phyllum; partiale 4-phyllum, capillaceo-pinnatum. *Cal.* superus 5-fidus: laciniis capillaceo-multifidis. *Petal.* 2-fida. *Sem.* 1, cal. coronatum.

1. *cuminoides*. Linn. Willd. p. 1184. Lam. ill. t. 142. Cuminum sylvestre, capitul. globosis. C. Bauh. Habit. in Graecia.

580. **CLAYTONIA**. *Cal.* 2-valvis.

*Cor.* 5-petala. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* 3-valvis, 1-locularis, 3-sperma.

1. *virginica*, fol. linearia-lanceolata, petal. integris. Ait. Kew. 1. p. 284. Willd. Sp. 2. p. 1185. Fol. linearibus, calycibus obtusis. Aiton. Pluck. aln. 272. t. 102. f. 3. Fol. lanceolatis, calycibus acutiusculis. Ait. Hab. in Virgin. sylv. humidis et Nov. Angliae. Flor. albi, rubro-linearis. Lin. Fol. praelongo-linearis; flor. albedo-rosei. Michaux.

2. *caroliniana*, fol. brevi-ovalibus, in petiolum abrupte angustatis, flor. roseis. Michaux, Flor. 1. p. 1160. Hab. in montib. Carolin. Martio.

3. *sibirica*, fol. nervosis, radicalibus caulibusque ovatis, racemo secundo, petal. bifidis. Willd. p. 1186. Hab. in Sibir. Scap. declinatus. Fol. caulinis duobus oppositis, intraque Racemi duo. Flor. rubri. L.

4. *perfoliata*, fol. enerviis, radicalib. rhombico-ovatis, caulinis subconnatis, flor. umbellato-verticillatis, petalis integris. Willd. l. c. Donn. ind. hort. cantab. p. 25. Hab. in Amer. bor. Fl. albi. C

581. **SAUVAGESIA**. *Cor.* 5-petala, fimbriata. *Cal.* 5-phyllus. *Nect.* 5-phyllum, cum petalis alternans. *Caps.* 3-locularis, 3-sulca, 3-valvis: valvis margiibus introflexis. (Stipulae pennato-ciliatae.)

1. *erecta*, caul. ramosissimo procumbente erectoque, fol. lanceolato-serrulatis lineatis, flor. subternis erectis. Flor. Per. 3. p. 11. Willd. Sp. 2. p. 1185. Jacq. amer. t. 51. f. 3. Ed. picta. t. 77. Hab. in Amer. Nectar. duplex: exterius pilis plurimis raris, orbiculatis positus (Stam. sterilia?) Interius foliolis 5. linearibus, petal. alternantibus distinctum. Fl. Per. l. c.

2. *nutans*, flor. nutantibus, nectario staminib. majore. Hab. in ins. Madagascar. Aubert.

*Obs.* Cum *Viola* familiam naturalem efficere videtur.

582. **VIOLA**. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis, postice cornuta (aut ecalcerata). *Anth.* apice membranula cohaerentes,

aut distinctæ. *Caps.* supera, 3-valvis, 1-locularis.

\* *Acaules.*

† *Viola. Cor.* calcarata. *Anth.* coarctantes.

1. *palmata*, acaulis pubescens, fol. palmatis quinquelobis, lobis dentatis indivisib. Lin. Willd. Sp. p. 1:59. Pluck. amalth. 129. t. 447. f. 1. Fol. nonnulla indivisa, reniformi-cordata. Michaux. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{T}}$

2. *pedata*, acaulis, fol. pedatis septem-partitis: lacini lineari-lanceolatis integris. Michaux. Flor. 2. p. 151. Andrew. t. 153. Pluck. alm. 388. t. 114. f. 7. Hab. in Virginia. Fol. lacini dentatis. Willd.  $\overline{\text{T}}$

3. *pinnata*, acaulis, fol. multifidis, lacini lobatis. Willd. p. 1160. Gmel. sib. 4. p. 107. t. 49. f. 4. V. acaulis, fol. palmato-multifidis et laciniosis. Misc. tour. 3. p. 181. t. 5. f. 2. Hab. in Sibiria et alpi. Europ.  $\overline{\text{T}}$

4. *sagittata*, acaulis, fol. oblongis acutis cordato-sagittatis serratis basi incis, flor. inversis. Ait. Kew. 3. p. 287. Hab. in Pensylv.  $\overline{\text{T}}$

5. *lanceolata*, acaulis, fol. lanceolatis crenatis. Gmel. sib. 4. p. 99. t. 49. f. 2. Hab. in Canada, Carolina, Sibiria. Flor. albid.

6. *rotundifolia*, acaulis, fol. orbiculato-cordatis: sinu clauso subdentatis, petiolo pubescente, cal. obtuso. Michaux 2. p. 150. In Carol. montibus excelsis. Flor. flavi.

7. *obliqua*, acaulis, fol. cordatis acutis subplanis glabris, flor. erectis, petal. oblique flexis. Ait. l. c. Hab. in Pennsylvania, Virgin. Petala oblongo-ovata straminea, basi caerulea.

8. *cucullata*, acaulis, fol. cordatis acutiusculis glabris serratis basi cucullatis, flor. inversis, petal. oblique flexis. Ait. l. c. Andrew. Hab. in Amer. bor. Petal. oblonga caerulea: superum, infra medium albidum, venis violaceis, lateralia longiora, infra medium albidula barbata. Ait.  $\overline{\text{T}}$

9. *primulifolia*, acaulis, fol. oblongis subcordatis: petiol. membranaceis. Linn. Habit. in Sibiria, Virginia. Fol. obtusissima, crenata, basi decurrentia per petiolum, ut in Prim. officinali. L.  $\overline{\text{T}}$

10. *philippica*, acaulis, fol. ovato-oblongis obtusis crenulatis petiolo longiori-

bus, scap. 1-floris hibracteis. Cav. ic. 6. p. 19. t. 529. f. 2. Hab. in ins. Lugon.

11. *magellanica*, acaul., fol. reniformib. repandis villosis. Willd. Forster in Comment. Soc. Goett. 6. p. 47. t. 8. Habit. in Tierra del Fuego, locis uliginosis. Fl. amplius luteus, venis spadiceis.  $\overline{\text{T}}$

12. *hirta*, acaul., fol. cordatis acutis piloso-hispidis, stolonib. subnullis. Fl. dan. t. 618. Hab. in nemorib. Vere. Cor. majuscula dilute caerulea.

13. *palustris*, acaul., fol. reniformib. L. Fl. dan. t. 83. Allion. t. 2. f. 2. Moris. hist. 2. v. 5. t. 35. f. 5. Hab. in Europ. frigidiorib. et monto in tursosis humidis. Fol. subconvoluta. Fl. venosi, diluti.  $\overline{\text{T}}$

14. *odorata*, acaul., fol. cordatis, stolonib. reptantib. Lin. Fl. dan. t. 309.  $\beta$ . V. martia alba. Baub. pin. 199. Hab. in Eur. nemorib. et ad sepes. Fl. primo vere.  $\overline{\text{T}}$

\* *Caulescentes.*

15. *canina*, caul. adultiore ascendente caniculato, fol. oblongo-cordatis, cal. acut. Roth. germ. I. II. p. 209. Hab. in apricis sylvis. Flor. per aetatem saepe apetalis Roth.  $\overline{\text{T}}$

16. *montana*, caul. erectus, fol. cordat. oblongis. Lin. V. caul. lato, erecto, fol. ellipticis, crenatis, stipulis semipinnatis. Hall. helv. n. 567. Moris. hist. 2. p. 475.  $\alpha$ . 5. t. 7. f. 7.  $\beta$  *Persicifolia*, caul. erecto, fol. ovato-lanceolatis serratis, Roth. germ. II. p. 271. Hab. in alpi. Lapponiae, Austriae, Germaniae, Baldo.  $\overline{\text{T}}$

17. *lactea*, caul. ascendente tereti, fol. ovato-lanceolatis, stipul. inciso-serratis. Smith. Flor. brit. 1. p. 247. Hab. in Angl. ericetis montosis. Fl. albidocaeulei.  $\overline{\text{T}}$

18. *nummularifolia*, fol. subrotundis orbiter crenatis, stipul. lanceolatis serratis, caul. brevissimo bifloro. Vill. Dauph. 2. p. 663. Allion. ped. n. 1630. t. 9. f. 4. Ejusd. Sp. t. 2. f. 2. Bocc. Mus. 2. t. 127. Habit. in alpi. Delphinatus et Pedemontanis.  $\overline{\text{T}}$

19. *cenisia*, caul. filiformibus indivisis, procumbentibus, fol. ovatis petiolatis, basi margine ciliatis, stipul. indivisis. Willd. p. 1165. Allion. ped. n. 1631. t. 22. f. 6. Hab. in Cenesi alpinis bonche dictis, Flos magnus, caeruleus: calcare petalis brevior.  $\overline{\text{T}}$

20. *canadensis*, caul. erecto teretiusculo, fol. cordatis acuminatis dentatis glabris, stipulis integris. Ait. Kew. 3. p. 290. Hab. in Canad. et Carol. montib. altis.  $\overline{\text{T}}$

21. *striata*, caul. erecto semitereti, fol. ovatis cordatis acutis serratis, stipulis lanceolatis serrato-ciliatis. Ait. l. c. Hab. in Amer. bor.  $\overline{\text{T}}$
22. *pubescens*, caul. erecto villosio tereti hinc planiusculo, fol. cordatis pubescentibus, stipulis oblongis apice serrulatis. Ait. Cum priore.  $\overline{\text{T}}$
23. *pensylvanica*, villosio-pubescent, caul. apice folioso, fol. late cordatis, stipul. membranaceis ovalib. subserratis. Michx. Flor. a. p. 149. Hab. in Pensylv. umbrosis, juxta rivulos. Flor. lutei.
24. *hastata*, glabriuscula, caul. simplicissimis sursum foliosis, fol. alternis hastatis subpetiolatis, stipulis minutis denticulatis. Michx. l. c. Hab. in Carolin. montib. Fl. lutei.
25. *debilis*, caulescens, fol. subcordatis denticulatis, flor. (albis) longe pedunculatis, stipulis lanceolatis sublaecis. Mich. p. 150. Cresc. in montib. Alleghanis.
26. *mirabilis*, subcaulis, caul. triquetro, fol. reniformi-cordatis, flor. caulinis apetal. Lin. Jacq. austr. t. 19. V. florib. radicalib. corollatis abortientibus, caulinis apetalis seminferis. Lin. Hort. cliff. 407. V. montana latifolia, flores & radice. Dill. clib. 408. t. 303. f. 360. Hab. in Germaniae, Sueciae, nemorib. montosis. Cor. majuscula caerulea.  $\overline{\text{T}}$
27. *biflora*, caul. bifloro, fol. reniformibus serratis. Flor. dan. t. 46. V. alpina rotundifolia lutea Bauh. pin. 199. Pluck. alm. t. 234. f. i. Hab. in alpi. Fl. parvi, lutei.  $\overline{\text{T}}$
28. *uniflora*, caul. unifloro, fol. cordatis dentatis. Gmel. sib. 4. p. 101. t. 48. f. 5. Hab. in Sibiria  $\overline{\text{T}}$
29. *decumbens*, caulescens procumbens, fol. linearibus confertis, stipulis subulatis. Thunb. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spei. Stipulae minutae subulatae acutae. Cor. caerulea.  $\overline{\text{T}}$
30. *tricolor*, caul. angulato glabro diffuso, fol. oblongis incis, stipulis pinnatifidis. Lin. Hab. in cultis et sylvaticis. Cor. obscure violacea: lab. infernis colore dilatiore basi macula flava. Cal. major.  $\odot$
31. *bicolor*, erecta, cal. stipulisque ciliatis. Hoffm. germ. 2. p. 170. In Hercyn. Cor. caerulea.
32. *arvensis*, caul. angulato sultrato, fol. ovato-lanceolatis serratis, stipul. basi incis, cal. pubescente cor. sublongiore. V. bicolor. arvensis. Bauh. pin. Roth. germ. 2. p. 273. Hab. in agris et cultis. Petal. alba: infimum flavo-maculatum.  $\odot$
33. *rothomagensis* (pilosa), diffusa hirta, fol. oblonge petiolatis subcordato-ovatis crenatis, bract. pinnatifidis: lacinia ultima majore subovato. Thuil. par. p. 454. Hab. in montosis prope Rouen Gallorum. Flor. pallide caerulei. V. tricolori similis sed diffusa debilior et undique pilosa.  $\overline{\text{T}}$
34. *lutea*, caul. triquetro simplici, fol. ovato-oblongis crenatis ciliatis, stipul. palmato-incis. Smith. brit. p. 248. Hab. in Angliae pascuis montosis. Flor. lutei, nigro-radiati, rarius caeruleascentes. S.  $\overline{\text{T}}$   $\dagger$
35. *grandiflora*, caul. triquetro simplici, fol. oblongiusculis, stipul. pinnatifidis. L. V. fol. imis subrotundis, caulinis ellipticis. Hall. helv. n<sup>o</sup>. 566. t. 17. V. montana lutea grandiflora. Bauh. Barr. ic. 692. Hab. in alpi. Helveticis, Pyrenaeis. Caul. ramosus, foliosus. Fl. maximus, flavus.  $\overline{\text{T}}$
36. *Zoysii*, caul. brevissimo erecto, fol. subrotundis crenatis, stipul. integerrimis, pedunc. triquetris. Willd. V. aculis, scapo subtriquetro striato unifloro, flore maximo nutante flavo, calcaribus subulato caeruleo petalis subaequali. Host. in Jacq. Coll. 4. p. 279. t. 11. f. 1. Barr. ic. 691. Hab. in alpi. Carinth. Similis V. grandiflorae.  $\overline{\text{T}}$
37. *pumila*, fol. ovato-ellipticis crenatis, glabris, stipul. serratis, caul. erecto. Vill. dauph. 2. p. 666. V. valeriana. Allioni n<sup>o</sup>. 1644 t. 24. f. 3? Cresc. in monte Corie in Delphin.  $\overline{\text{T}}$
38. *calcarata*, caul. abbreviato, fol. subrotundo-cordatis crenatis, stipul. subrotundis dentatis, nectariis calyce longioribus. Willd. V. alpina purpurea, exiguis fol. Bauh. pin. 199. Hab. in Pyrenaeis, Helveticis alpi. Caul. subnullus. Petal. subrotunda.
39. *cornuta*, caul. elongato, fol. ovatis subcordatis margine ciliatis, stipul. oblongis pinnatifidis, nect. subulatis cor. longioribus. Willd. Hab. in Pyrenaeis. Caul. longus, petala oblonga. Priori affinis.
40. *maculata*, caulescens, fol. ovatis crenatis subulatis, pedunc. axillaribus solitar. fol. longiorib. Cav. ic. 6. p. 20. t. 530. Hab. in ins. Maclovianis. Cor. patens lutea: petal. majus rubro-lineatum.
41. *rubella*, fruticosa, fol. ovato-acut. oblongis punctatis serratis, pedunc. solitariis axillarib. fol. subaequalib. Cav. l. c.

t. 531. f. 1. Hab. in St. Carlos de Chilac.  
Cor. rubella. h

41. *capillaris*, fruticosa, fol. ovato-acutis serratis: basi inaequali, pedunc. axillaribus solitariis fol. longiorib. Cav. l. c. p. 21. t. 531. f. 2. Cresc. in Talahuano viciniis. Stipul. lanceolatae, serraturis capillaribus, internodiis saepe longiores. C. A. V. stipulari Sw. diversa.

42. *capensis*, suffruticosa, caul. erecto, fol. obovatis serratis. Hab. ad Cap. bon. spei. h

43. *arborescens*, caul. fruticoso, fol. lanceolatis integerrimis. V. Hispanica fruticosa longifolia. Tournef. inst. 421. Barr. t. 508. Hab. in Hispan. h

\*\*\* *Floribus erectis, nec resupinatis.*

44. *stipularis*, caul. simplici repente, ol. ovato-lanceolatis crenatis glabris, stipulis ciliatis, pedunc. solitariis terminalib. Swartz. prod. 117. Habit. in Ind. occident. St. Christophoro. h

45. *suffruticosa*, caul. procumbente, fol. lanceolatis subserratis confertis, cal. postice aequalibus. Hab. in Ind. h

46. *oppositifolia*, caul. suffruticosa, fol. oppositis, flor. racemosis. Lin. Habit. in Cumana. h

47. *Hybanthus*, arborescens scandens, aculeata, fol. oblongisobovatis glabr. Aubl. guj. 2. p. 811. t. 319. Hybanthus. Jacq. amer. 77. T. 175. f. 24. 25. Ed. pict. t. 260. Hab. in America meridion. Pedunc. multiflori. h

Obs. Species hujus subdivisionis accuratius inquirendae, numine generi Iouae s. Ionidio. Vent. (ut subgeneri hinc ad interim proposito) inseri potius debeant. V. *diandra* dubia species.

†† IONIA. Cal. 5-phyllus: foliolis basi productis. Cor. subbilbiata: calcar e o. Antherae plerisque distinctae. Stigm. simplex. Caps. 1-locularis, 3-valvis: valv. medio seminiferis. (Ionidium. Vent. Jard. de Malmaison. p. 27.)

48. *Calceolaria*, hirsuta, fol. lanceolatis, petal. inferiorib. involutis. Ionidium. Vent. l. c. Willd. Sp. 2. p. 1172. Locfl. It. p. 184. Hab. in Amer. merid. et Cajen.

49. *glutinosa*, fol. alternis ovato-lanceolatis argute serratis. Vent. Hab. in Montevideo.

50. *buxifolia*, fol. alternis obovat. integerrimis, margine revolutis. Vent. Hab. in ins. Madagasc. Juss.

51. *enneasperma*, caul. basi ramosissimo, fol. lanceolato-linearib. integerrimis. distantib. Lin. Burm. Zeyl. p. 195. t. 85. Rheed. g. t. 60. Hab. in Ind. h

52. *stricta*, fol. oppositis lanceolatis integerrimis, stipulis brevissimis, pedunc. rectis, fol. breviorib. Vent. l. c. sub Ionidio. Hab. in St. Domingo.

53. *parviflora*, fol. ovatis serratis: inferioribus oppositis, superioribus alternis. Vent. Cav. ic. 6. p. 21. Habit. in America meridion. h

54. *Ipecacuanha*, fol. ovalibus serratis glabris, petal. inferiore plano. Vent. sub Ionidio. V. fol. ovalib. margine subusque pilosis. Lin. Pombalia. Vandelli, fasc. pl. p. 7. t. 1. Hab. in Brasilia. Rad. Ipecacuanhae albae producere dicitur. h

55. *verticillata*, fol. (verticillatis) oppositis lanceolatis integerrimis, stipul. petiolis longioribus, pedunc. cernuis longissimis. Ionidium Polygalae-folium. Vent. l. c. p. 27. t. 27. V. Viola verticillata. Orteg. Dec. pl. Solea verticillata. Sprengel in Sehrad. Journ. bot. 2. 1800. p. 190. t. 6. Hab. in Amer. meridion.

583. IMPATIENS. Cal. 2-phyllus. Cor. 5-petala, irregularis, nectario cucullato. Anth. primo sub-cornatae. Caps. supera, 5-valvis.

\* *Pedunculis unifloris.*

1. *bifida*, pedunc. unifloris solitar., fol. oblongis serratis, nectar. longissimis bifidis. Thunb. prod. 41. Willd. Sp. 2. p. 11. t. 73. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *chinensis*, pedunc. uniflor. solitariis, fol. oppositis ovatis, nectar. arcuatis. Lin. Hab. in China. Caul. ruber. Flos. purpureus. ☉

3. *latifolia*, pedunc. uniflor. solitariis, fol. ovatis: serrantibus lanceolatis, nectar. flore longiorib. Lin. Rheed. g. t. 48. Hab. in Ind. ☉

4. *capensis*, pedunc. unifl. solitariis, fol. ovatis: crenis piliferis. Thunb. prod. 41. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *oppositifolia*, pedunc. unifloris aggregatis, fol. oppositis linearib. L. Rheed. g. t. 31? Hab. in Zeyl-n. arenosis.

6. *fasciculata*, pedunc. axillarib. uniflor. aggregatis, fol. oppositis lanceolatis. Lam.



*Lam.* enc. r. p. 359. Rheed. 9. t. 147. Hab. in Malab.

7. *cornuta*, pedunc. unifloris aggregatis, fol. lanceolatis, nectaris flore longioribus. Linn. Burm. zeyl. 41. t. 16. f. 1. Hab. in Zeylona. ☉

8. *Balsamina*, pedunc. unifloris aggregatis, fol. lanceolatis, superioribus alternis, nectar. flore brevioribus. Linn. Blackw. t. 583. Hab. sponte in Ind. Ubique colitur.

\*\* *Pedunculis multifloris.*

9. *biflora*, pedunc. bifloris, fol. ovatis serratis. Willd. 1. flor. fulvis maculis rubr. Walter. carol. 219. Hab. in Carolina. †

10. *triflora*, pedunc. solitariis trifloris, fol. lineari-lanceolatis, nectario arcuato flore longiore. Willd. Burm. zeylon. 41. t. 116. f. 2. Herm. par. 105. t. 105. Hab. in Zeylona paludosis.

11. *natans*, pedunc. trifloris solitariis, fol. lanceolatis, nectario brevissimo. Willd. Hab. in Ind. orient.

12. *Nolitangere* (palustris), pedunculis multifloris solitariis, fol. ovatis, geniculis caulinis tumentibus. Fl. dan. t. 588. p. Flor. fulvis, fol. minoribus argute dentatis. Mich. 2. p. 149. Hab. in Europ. et Canad. nemoribus, locisque paludosis, humidis.

584. GRONOVIA. *Petala* 5 et *stamina* calyci campanulato inserta. *Bacca* sicca, monosperma, infera.

1. *scandens*. Linn. Jacq. ic. 2. t. 338. Coll. 3. p. 197. Hab. in Vera Cruce. Planta cucurbitacea. Caul. altissimus. Fol. urentis, pampinea. Linn. ¶

585. KUHNIA. Flos compositus. *Sem.* solitarium: pappo plumoso. *Recept.* nudum.

1. *Eupatorioides*, fol. lato-lanceolatis serratis, corymbis terminalibus. Ventr. Hort. Celt. p. 91. Linn. Fil. Dec. Pl. p. 21. t. 11. Crotonia. Gaertn. de sem. 2. p. 411. Hab. in Pennsylvania.

2. *rosmarinifolia*, fol. lineari-lanceolatis integerrimis margine revolutis pedunc. terminalibus 1-floris. Ventr. l. c. Eupatorium canescens. Ortega. Dec. Pl. p. 34. Hab. in ins. Cuba.

*Obs.* Genus e fam. plant. compositarum s. corymbiferarum Juss. ob antheras liberæ hac in classe obtinuit locum.

AMARANTHOIDEI (gen. 586-592). *Cal.* in hac familia persistens et sæpe pericarpium vices dein gerit; in quibusdam squamis cinctus. *Cor.* 5. *Filam.* 5, nunc basi in urceolum connata (Genera talia potius hinc ad classem Monodelphiam amandanda), nunc libera, setulis aliis 5. (stam. sterilia quorundam) passim interjectis. Styl. simplex aut divis. *Caps.* 1-locularis, monosperma aut polysperma. *Fol.* ut plurimum integra, nunc alterna, nunc opposita, quibusdam stipulis distincta. Flores substantia sicca durabili gaudentes, capitati aut spicati, in genere *Amarantho* monoci in *Tresine* dioici sunt. Maxima *Amaranthorum* et *Caryophyllearum* affinitas in perisperm. farinaceo; sed in his cor. polypetala in illis nulla.

586. COMPIRENA. *Cal.* 5-phyllus coloratus: exterior 3-phyllus: foliolis 2 conniventibus carinatis. *Petala* 5, rudia, villosa (*Cor.* potius 0?). *Nect.* cylindricum, 5-dentatum. *Caps.* circumscissa 1-sperma. *Stylus* semibifidus.

1. *globosa*, caule erecto, fol. ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunc. di-phyllis. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1321. Flos globosus. Rumph. 5. p. 289. t. 100 f. 2. Rheede 10. t. 37. Hab. in Ind. Var. Capitulis rubris et argenteis. ☉

2. *perennis*, fol. lanceolatis, capitulis di-phyllis, flos. perianthio proprio distinctis. Dill. elth. 24. t. 20. f. 22. Hab. in Bonaria. ¶

3. *hispida*, caule erecto, capitulis di-phyllis, fol. crenatis. Rheede mal. 9 p. 141. t. 72. Hab. in Malabar. Flor. caeruleo-scentes.

4. *angustifolia*, fol. lineari-lanceolatis glabris, capitulis terminalibus oblongis subtriphylis. Vahl. symb. 3. p. 45. In India orient. Habitus Gomphrenæ, diversa tantum stylo unico. Vahl.

5. *vermicularis*, caul. repentibus, fol. subteretibus carnosiss., capitulis solitariis terminalibus oblongis. Swartz. obs. p. 101. Illecebrum *vermiculatum*. Linn. Herm. parad. 15. t. 15. Pluck. alm. 27. t. 75. f. 9. Hab. in arenosis maritimis Americæ calidioris. ¶

6. *brasiliensis*, caule erecto, fol. ovato-oblongis, capitulis pedunculatis globosis

R

aphyllis. Lin. Jacq. ic. rar. 2. t. 346. Coll. 2. p. 278. Hab. in Brasilia.  $\bar{h}$

7. *serrata*, caule erecto brachiato, capitulis solitariis terminalibus sessilibus, calyce serratis. Li. Sp. pl. 326. Habit. in Amer. An eadem ac *G. hispida*? vid. Lam. enc. 1. p. 120.

8. *interrupta*, caule erectiusculo, flor. apicatis sessilib. interruptis monogyn. Sw. obs. 108. L'Her. stirp. 1. p. 5. t. 3. Celosia *procumbens*. Jacq. ic. 1. p. t. 51. misc. 2. p. 344. Habit. in aridis arenosis Jamaic. austr.  $\odot$

9. *flava*, pedunc. oppositis bifidis tricapitatis, capitulo intermedio sessili. Hort. cliff. 87. Hab. in Vega Cruce.

10. *arborescens*, arborescens, pilosa, subvolubilis. Lin. suppl. 173. Habit. in N. Granada. Bracteae plures longitudine floris aggregati. Corollula cylindrica longitudine calycis. A. congeneribus valde diversa, tamen genuina. Lin.  $\bar{h}$

587. ACHYRANTHES. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Squamulae 5, basi in tubum connatae, apice sinbriatae stam. alternae. Stigma 2-fidum. Sem. solitarium, cal. foliolis conniventibus obtectum. (Stipulae o.)

\* *Foliis oppositis.*

1. *argentea*, fol. subrotundo-ovatis acuminatis, subtus argenteis, calycib. reflexis spicae adpressis. Willd. Spec. 2. p. 1191. Lam. encyc. 1. p. 539. Bocc. sic. 16. t. 9. Pluck. alm. 260. f. 2. Hab. in Sicilia et ad Cap. b. spei.  $\odot$

2. *aspera*, fol. obovatis acutiusculis, basi attenuatis, calyc. reflexis spicae adpressis. Willd. A. *obtusifolia*, caul. erecto, fol. ovato-cuneiformibus obtusis pubescentibus, cal. glabris. Lam. l. c. enc. 1. p. 539. Burm. zeyl. 16. t. 5. f. 3. Pluck. alm. 26. t. 10. f. 4. Mill. dict. t. 11. f. 2. Hab. in Zeylona, Jamaica. Planta est diuretica et antidiysenterica.  $\bar{h}$

\* *fruticosa*, caul. erecto, fol. ovatis calycibusque glabris. Lam. l. c. An Rumph. amb. 6. t. 12. f. 1? Hab. in India. Frutex 5-6-pedalis. Spicae longae.

3. *lappacea*, caule fruticoso diffuso, fol. glabri. ovatis acuminatis basi attenuatis, spica interrupta, fasciculis lateralibus utriusque fasciculo setarum uncinato. Willd. p. 1192. A. atropurpurea. Lam. encyc. 1.

p. 546.  $\beta$ ? A. *styracifolia*, caul. herbacea, spic. albidis. Lam. Burm. zeyl. 47. t. 18. f. 1. Pluck. alm. 95. t. 82. f. 2. Rheed. 10. t. 59. Hak. in Ind. Ad latera florum lateralium utriusque penicillis purpureis, e setis rigidis uncinatis.  $\bar{h}$

4. *echinata*, caule erecto pubescente, fol. ovalis acutis basi attenuatis subtus pubescentibus, spica interrupta, fasciculis lateralibus utriusque fasciculo setarum uncinato. Willd. Retz. obs. 2. p. 12. Hab. in Ind.  $\bar{h}$

5. *muricata*, caule fruticoso patulo, fol. alternis laevibus, floribus spicatis remotis ovatis, cal. squarrosis. Lin. A. *alternifolia*. Mant. 50. et 344. Hab. in Aegypto, Arabia. Facie Celosiae. Pistil. stigmatibus bifido. Semen 1, nudum, durum. Linn.

6. *patula*, caule fruticoso patulo pubescente, flor. spicis orbiculatis eclinato-uncinatis, (bract. 2, calyciformibus patulis.) Lin. suppl. 160. Habit. in India orient.  $\bar{h}$

7. *prostrata*, caul. prostratis fruticosis, spicis oblongis, fasciculis utriusque fasciculato setarum uncinato. Lin. Hab. in Ind. Spicae e dichotomia pedunculatae, virides, apice purpurascens.  $\bar{h}$

8. *Monsoniae*, caul. ramosis tomentosis, fol. verticillatis subulatis pungentibus, spic. ovato-cylindricis tomentosis terminalibus. A. *pungens*. Lam. enc. 1. p. 546. Illecebr. Montoniae. Lin. fl. Pluck. Mant. 11. t. 334. f. 4. et t. 357. f. 4. Hab. in Indiis.

9. *sanguinolenta*, caule ramoso, fol. oppositis petiolatis ovato-acutis, spic. terminalibus congestis. Lam. enc. 1. p. 546. Linn. Sp. 2. p. 294. Illecebrum. Linn. Willd. p. 1204. Rumph. 7. t. 27. f. 2. Fol. rubra. Pistill. purpureum.  $\bar{h}$

10. *brachiata*, caule erecto herbaceo brachiato, fol. oppositis glabris lanceolato-ovatis, spic. tomentosis lateralibus. Lin. Mant. p. 50. Illecebr. Lin. Willd. p. 1203. Pluck. alm. 11. t. 334. f. 5. Habit. in Ind. orient.  $\odot$

11. *halimifolia*, caul. repentibus dichotomis ramosissimis, fol. obovatis carnosius, capitulis axillaribus. Lam. enc. 1. p. 547. ( $\beta$ . Burm. amer. t. 21. f. 2. Hab. in Peru prope Linam.  $\beta$ . in Antillis.  $\bar{h}$

12. *sarmentosa*, fol. ovatis acuminatis alternis, spicis axillaribus, caule suffruticoso. Vahl. symb. 2. p. 44. Habit. in Ind. orient.  $\bar{h}$

13. *polygonoides*, caule decumbente

tetragono, fol. ovato-cordatis, apicis laxis laevib. Retz. obs. 2. p. 12. Digera arvensis. Forsk. descr. 65. Hab. in Arabia felici, India.

14. *altissima*, caule suffruticoso scandente, panic. terminalibus axillaribusque ramosis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 522. Sloan. hist. 2. p. 142. t. 91. f. 2. Hab. in sylvis montium Jam. An Celosia? h

15. *nivea*, fol. verticillatis ovatis tomentosis, corymb. compactis dichotomis, flor. corollatis. Ait. Kew. 1. p. 286. Hab. in Canariis. h

16. *stellata*, fol. senis linearibus pelucido-maculatis, flor. corymboso-dichotomis. Willd. Hab. in Guiræa. Stipulae numerosae membranaceae albae diaphanae lanceolatae setula terminatae. W. h

17. *corymbosa*, fol. alternis linearibus mucronatis pubescentibus, flor. corymboso-dichotomis. Willd. p. 1196. Syst. Veg. p. 204. Polia arenaria. Loureiro. fl. coch. p. 204. Bocc. mus. 44. t. 39. Pluck. alm. 134. t. 86. f. 6. Hab. in Zeylona. T

18. *tenuifolia*, fol. oppositis linearibus subulatis subius carinatis, flor. corymbosis. Willd. Hab. in Sierra Leona.

19. *dichotoma*, caul. suffruticosus, fol. oppositis linearibus planis acutis, cyma dichotoma. Lin. Hab. in Virginia. Similis A. corymbosae.

20. *fcoideum*, caul. repentibus glabris, fol. lanceolatis in petiolum attenuatis, capit. axillaribus pubescentibus, nitidis. Illecebrum. Lin. Willd. p. 1208. Gomphrena. Lin. S. N. Jacq. amer. ed. pict. t. 90. Hab. in Amer. littoribus, et in Hisp.

β? *sessile*, caul. repentib. bifarie tomentosis, fol. lanceolatis subsessilibus, capit. oblongis glabris. Lin. sub Illecebro. Alternanthera. Forsk. Pluck. alm. t. 133. f. 1. Rumph. 6. t. 15. f. 1. Rheed. 10. t. 9. In Ind. Caul. purpureus. Fol. in tenellis serrata. Lin.

\* \* Fol. alternis.

21. *alternifolia* (globosa), caul. erecto, fol. echinis subglobosis, capit. oppositifoliis. Lin. suppl. p. 159. Pluck. alm. t. 260. f. 1. In Ind. orient. Ⓞ

22. *javanica*, caul. erecto subsimplici incano, fol. alternis oblongis tomentosis, spic. numerosis terminalibus. Illecebrum javanicum. Lin. Willd. p. 1205. Achyranthes alopecuroides. Lam. encyc. 1. p. 548. Iresine javanica. Burm. ind. t. 65. f. 2.

β. *persica*, fol. obovalibus panic. terminali, spic. simplicib. longissimis. Burm. l. c. t. 65. f. 1. sub Iserine. *Acrura* tomentosa. Forsk. secundum. Vahl. symb. 2. p. 44. Habit. in India. Cal. hyalinus: carina viridi. h

23. *bengalensis*, caul. erecto herbaceo, fol. alternis oppositis lanceolatis pubescentibus. Lin. Mant. sub Illecebro. Lam. enc. 1. p. 549.

24. *lanata*, caul. diffusis suberectis, fol. alternis ovatis petiolatis spic. lateralibus tomentosis. Lam. enc. 1. p. 548. Illecebr. Act. Willd. Burm. zeyl. t. 26. f. 1. Rheed. 10. t. 29. Hab. in Ind. Caul. rigidus, subtenuus, parum villosus. Var. fol. rotundis. Retz. obs. bot. 2. 13. Ⓞ

25. *Amaranthoides*, caule fruticoso diffuso, fol. alternis ovato-acutis petiolatis laevibus, spic. filiformibus terminalibus, flor. remotis. Lam. enc. 1. p. 549. Rumph. amb. 5. t. 83. f. 2. Habit. in ins. Java et Mollucis. Stigm. 5. Amaranthus frutescens. H. P. et Dumont-Courret, Bot. Cultiv. 1. p. 648. Digera frutescens. Juss. h

26. *ciliata*, caul. herbaceo, fol. alternis ovato-acutis glabris, petiol. ciliatis, spicis axillaribus filiformibus solitariis, flor. remotis subsquarrosis. Lam. l. c. Hab. in Ind. orient. Flor. antecedenti et fol. amaranthis similis. Lam.

568. CELOSIA. Cal. 3-phyllus, corollae 5-petala facie. Stam. basi nectario plicato conjuncta. Caps. horizontaliter dehiscens. Styl. 2-3-fidus. (Fol. opposita.)

1. *argentea*, fol. lanceolatis, stipul. subfalcatis, pedunc. angulatis, spicis scariosis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1197. Knorr. del. 1. t. 11. Rheed. 10. t. 38. et β. t. 39. Fol. linearib. Hab. in Glina. Ⓞ

2. *albida*, foliis linearibus lanceolatis, caule exstipulato, spicis ovatis, bracteis longitudine corollae. Willd. C. pyramidalis. Burm. ind. 65. t. 25. f. 1. Habit. in Ind. orientali. Ⓞ

3. *margaritacea*, fol. ovatis, stipulis falcatis, pedunc. angulatis, spicis scariosis. Lin. Rheed. 10. t. 38. Hab. in Malabar. Simillima C. argenteae. Stamina purpurea. Ⓞ

4. *cristata*, fol. oblongo-ovatis, pedunc. teretibus substriatis, spicis oblongis. Lin. Lam. ill. t. 168. f. 1. Rumph. 5. t. 84. Hab. in Asia. Var. fol. angustis et laxis, et flor. flavis ac rubris. Ⓞ

5. *comosa*, spicis cylindricis comosis, fol. lanceolatis. Retz. obs. 6. p. 26. Hab. in India orient. Spicae superne steriles et saepius divisae, comosae evadunt e bracteis minutis imbricatis. Caps. operculata disperma. Retz.

6. *paniculata*, fol. ovato-oblongis, caul. assurgente paniculato, spicis alternis terminalibus remotis. Lin. Sloan. hist. 1. t. 91. f. 1. Hab. in Jamaicae occidentalis sexotis aridis. Caulis prostratus. Stigma trifidum. ☉

7. *nitida*, fol. ovato-deltoidibus attenuatis, spicis terminalibus ramosis, flor. distinctis, caul. suffruticoso. Vahl. symb. 2. p. 44. Sloan. hist. 1. p. 142. t. 91. f. 5. Hab. in India occident.

8. *coccinea*, fol. ovatis strictis inauriculatis, caul. sulcato, spicis multiplicibus cristatis. Lin. Hab. in Ind. ☉

9. *castrensis*, fol. lanceolato-ovatis lineatis acuminatissimis, stipulis falcatis, spicis cristatis. Linn. Barr. rar. t. 1195. Boec. mus. t. 66. Hab. in Ind. ☉

10. *corymbosa*, fol. linearibus verticillatis glabris, flor. corymboso-dichotomis. Willd. Retz. obs. 2. p. 13. Hab. in Ind. orientali. Similis Achyranthi corymbosae. Willd. An diversa? ☿

11. *caudata*, fol. ovatis, racemis compositis laxis longissimis, pistillo bifido, caule exstipulato. Vahl. symbol. 1. p. 21. Hab. in Arabia felici.

12. *trigyna*, fol. ovatis acuminatis planis, caule herbaceo, racemo laxo, bract. scariosis, pistillo trifido. Willd. Jacq. hort. 3. p. 12. t. 15. Lam. ill. t. 168. f. 2. Hab. in Senegallia. ☉

13. *virgata*, fol. ovatis acuminatis undulatis, caule suffruticoso, racemo laxo, bract. membranaceis, pistillo trifido. Willd. C. *virgata* fruticosa glabra, fol. caulinis spatulatis, rameis lanceolatis, flor. aggregatis spicatis. Jacq. ic. 2. t. 339. Collect. 2. p. 279. Hab. . . h

14. *polygonoides*, fol. cordatis, caule hispido, racemo spicato laxo, flor. trigynis. Retz. obs. 2. p. 12. Hab. in Malab. Caps. urceolata. ☿

15. *baccatu*, fol. cordatis acuminatis, racemo spicato laxo, flor. trigynis, fructibus baccatis. Willd. Retz. obs. 5. p. 23. Hab. in Ind.

16. *gnaphaloides*, fruticosa lanata, fol. oppositis ovatis subtus albis, capitulo globoso-pedunculato. Lin. suppl. 161. Hab. in

Mente - Video in Brasilia. An Illecebrum? +

17. *nodiflora*, fol. cuneiformibus acutiusculis, spicis globosis lateralibus. Lin. Jacq. hort. t. 68. Burm. zeyl. 16. t. 5. f. 2. Pluck. alm. 27. t. 133. f. 2.

18. *elongata*, fol. ovalibus basi attenuatis incanis, spicis terminalibus longe pedunculatis nudis subcapitatis. Sprengel in Schräd. bot. Journ. 1800. p. 196. Hab. . . (H. P.)

19. *glauca*, fol. alternis lineari-lanceolatis carnosius canis, cor. unicolori limbo 5-dentato, stylo 3-partito. Wendland Hort. Herrenb. p. 4. t. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Cap. 1-locularis, in 2 partes deliscentes, sem. ad repleta. h

Obs. An forte distincti generis? cum a Celosia differt: cor. 1 - petala nec 5 - petala, caps. perpendiculariter, nec transversim deliscentie et stylis tribus.

589. ILLECEBRUM. Cal. 5-phyllus: laciniis apice fornicatis. Cor. o. Stigma simplex, aut bifidum. Caps. 5 - valvis, 1-sperma.

1. *verticillatum*, fol. subrotundis, flor. verticillatis nudis, caul. procumbentibus. Lin. Fl. dan. t. 335. Hab. in Europae pascuiculis, locis praesertim arenosis. ☿

Obs. Inter omnes Linnæi species, dicit b. Gaertner (de fruct. et sem. 2. p. 218), solum I. *verticillatum* characteri generico Linnæano respondet, reliquæ ad Paronychiam, Achyranthem et Celosiam debent referri!

2. *aristatum*, flor. subs fasciculatis, fol. lanceolatis sericeis aristatis. Ait. Kew. 1. p. 260. Hab. in Canariis. ☿

3. *canariense*, fruticosum, fol. ellipticis ocutis, stipulis bracteisque ovatis brevioribus, panic. terminalibus dichotomis. Lin. suppl. 161. Hab. in Teneriffa. h

4. *cymosum*, caule ramoso erecto, fol. subteretibus glabris aristatis, flor. cymosis, bract. brevissimis. Villars de genere Illecebro in Schräd. Journ. f. d. Bot. 1803. p. 406. cum ic. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1306. (exc. syn. quæ ad sequentem speciem pertinent.) Hab. in Hisp. et Mouspelii. ☉

5. *echinatum*, caulibus prostratis, fol. obovato-acuminatis scabris, capitul. axillaribus echinatis. Vill. 1. c. p. 409. Desf.

11. *p. p. 204. Moris. s. 3. t. 29. f. 5. Bocc. sic. t. 20. f. 3. Hab. in Gallia meridionali, Lusitania et Barbaria.*

6. *Paronychia*, flor. bracteis nitidis obvallatis, caul. procumbentibus, fol. laevibus. Lin. *Paronychia nitida*. Gaertn. de fr. 2. p. 218. Hab. in Hisp. et Narbona, et in Delphinatu. Styl. bifidus,  $\overline{\text{T}}$

*p. polygonifolium*, caul. prostratis, fol. ovato-lanceolatis glabris, flor. lateralibus terminalibusque. Vill. l. c. Hab. in Delphinatus alpinis, etiam in Lusitan. in monte Esrella. Link.

7. *italicum*, fol. glabris oblongo-lanceolatis sursum bracteis oppressis, ramis erectis, flor. lateralibus terminalibusque. Vill. l. c.  $\overline{\text{p}}$ . 410. (*Paronychia italica*.) Hab. in Italia et circa Marseille. An prioris var. ?  $\overline{\text{T}}$

8. *narbonnense*, caul. prostratis hirsutis, fol. lanceolatis acutis, margine scabris, flor. lateralibus. Vill. p. 411. l. argenteum. Pourr. Chlor. p. 321. Hab. prope Narbonnam. Cal. margine subpellucidus, dorsum hirtus, intus nervis 3 distinctus. Priori affine.

9. *maritimum*, caulib. prostratis, fol. oblongis acutis, margine scabris, flor. lateralibus. Vill. Circa Aix a cl. Jussieu detectum. l. Polygonifolio *S. Paronychia* habitu simile. V.  $\overline{\text{T}}$

10. *lugdunense*, caul. prostratis ramosissim. hirsutis, fol. lanceolatis linis, bract. quaternis semilanceolato-linearibus. Vill. Hab. . .  $\overline{\text{T}}$

*Obs.* Hæc et antecedens species, dicit cl. Villars, *Herniarias* exacte referunt, quæ ulterius hinc examinari debent, an forte illius generis sint.

11. *serpyllifolium*, caul. nodosis ramosis prostrato-repentibus, fol. obovato-lanceolatis subcarneosis, margine ciliatis, flor. bracteis occultatis terminalibus. Vill. Dauph. 2. p. 358. Hab. ad litora flum. Duranæ, prope Grenoble, Gay, etc.

*p. ? Herniarioides*, caul. nodosis repentibus prostratis, fol. ovato-cordatis ciliatis, flor. terminalibus. Vill. in Journ. bot. p. 413. l. *Herniarioides*. Pourr. Chlor. p. 321. Fol. et bract. majores quam in priore. Germen conicum. Styl. simplex.  $\overline{\text{T}}$

12. *capitatum*, flor. bract. nitidis occultatis capit. terminalia, caul. erectiusculis, fol. ciliatis, subius villosis carinatis — oblongis appressis. Lob. ic. 420. Hab. in G. Narbonensi, Hispania, in colibus prope Montelimar et in Oriente.

13. *niveum*, caul. suberectis ramosissimis, fol. patentib. villosis, bract. maxim. flores occultantib. Enc. bot. 5. sub *Paronychia*. Borrl. ic. 687 et 725? Hab. in Gallia merid. et in Hispania.

14? *subulatum*, radice crassa, caule erectiusculo, fol. subulatis longis, florib. terminalib. Enc. bot. sub *Paronychia*. Hab. in Ind. Juss.

15. *divaricatum*, flor. bracteis subfasciculatis, pedunc. dichotomis paniculatis, foliis ovato-oblongis petiolatis. Ait. Kew. 1. p. 291. Hab. in Canar.  $\odot$

16. *arabicum*, flor. sparsis congestis, bracteis nitidis æquantibus, caul. procumbentib. Corrig. ola *albelia*, fol. oppositis, stipulis hyalinis. Forsk. descr. 207. Hab. in Arabia. Simill. l. *Paronychia*, at Flor. non in capitula terminalia, et bract. non flore longiores. L.

17. *striatum*, caul. erecto cymoso ramoso, cal. suriatis. Enc. bot. 5. p. 25. sub *Paronychia*. Hab. . . Fol. subspathulata. Ramis magis denudati quam in reliquis. l. c. A Commerson detectum.

18. *dichotomum*, caul. erecto pluries dichotomo, fol. distantibus oblongis muticis, flor. cymosis. Enc. bot. l. c. Hab. . . (Herb. Juss.) Caul. elongati subnulli.

19? *linearifolium*, caul. recto villosis, fol. linearibus longis capitula terminalib. Enc. bot. p. 26. sub *Paronychia*. In Herb. Juss. Bract. argenteæ. Capit. majuscula, passim sphaerica.

20. *frutescens*, caul. fruticoso dichotomo, fol. oppositis pulverulentis. L'Herit. stirp. 1. p. 75. t. 37. Hab. in aridis Limæ. An *Achyranthes*?  $\text{h}$

21. *alsinifolium*, caul. diffusis, foliis ovatis, florib. congestis, bracteis nitidis. Mant. Scop. del. ins. t. 13. Tournet. hist. 508. Habit. in Hispania.

*Obs.* Plures species hujus generis, accuratius adhuc examinandi, vide sub genere *Achyranthis*.

390. **ANYCHIA**. Cal. connivens: laciniis oblongis, apice subsaccato. Cor. o. Filam. distincta: setulis nullis interpositis. Stigm. 2, oblonga. Caps. utricularis, non debiscens. Sem. 1, subreniforme. (Fol. opposita, stipulacea. Stam. passim 3.)

1. *Herniariæ*, humifusa pubescens, fol.

oblongo-ovalibus ciliatis aristatis. A Herniarioides. Michaux, Flor. 1. p. 113. Hab. in arenosis Carolinae septentrionalis. Cal. laciniae acumine setaceo distinctae.

2. *Argyrocroma*, caespitosa procumbens subpubescens, fol. linearibus acutissimis, capit. fasciculato-terminalibus, cal apice barbato. Michaux, l. c. Hab. in Carolinae superioris rupibus. Illecebr. Paronychia habitu.

*Obs.* Hoc ad genus, Illecebris valde affine, b. Michaux etiam retulit Queriam canadensem L., quam in planta sylvestri fere semper 5-andram et in culta saepe tantum 2-andram observavit.

591. *GYMNOCARPON*. Cal. 5-partitus, coloratus, persistens. Cor. o. Stam. 10: alterna sterilia. Stigma simplex. Semen 1, cal. indurato tectum.

1. *fruticosum*. Trianthema fruticosa. Vahl. symb. p. 32. G. decandrum. Gmel. syst. p. 423. De f. Atl. 1. p. 203. Juss. gen. pl. Hab. in Aegypto et in deserto prope Cassam. Diffusa, caul. nodosis. Fol. opposita subulata, stipulacea. Cal. purpurasc.

592. *HAGEA*. Cal. 5-phyllus. Petala 5, emarginata. Stylus simplex. Caps. 3-gona, 1-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *Teneriffae*, caule herbaceo prostrato, fol. spathulatis subacuminatis. Polycarpea. Linn. in Journ. d'Hist. nat. 2. p. 3. t. 25. Hab. in monte famoso: Le Pic. ins. Teneriffae.

*Obs.* Ad evitacionem nominis conformitatis Polycarpeae cum Polycarpon, cuius habitum refert, cl. Ventenat illud in inventoris memoriam Hortu. ani Lahaye commutavit.

2. *gnaphalodes*, caul. suffruticoso prostrato, fol. oblongis tomentosis, flor. terminalibus congestis. Schomb. Maroc. 1. p. 117. Roth N. Bot. Beyr. p. 170. sub Illecebro. Polycarpaea microphylla. Cav. in Annal. de ciencias natur. n.º 7. p. 25. Hab. prope Magadore in arenosis.

*Obs.* Ob caps. 3-valvem et ob petala manifesta ab Illecebro differt, forte una alterave species ex Amaranthoideis adhuc hujus loci sunt.

593. *GLAUX*. Cal. 1-phyllus, co-

loratus, 5-lobus. Cor. o. Caps. 1-locularis, 5-valvis, 5-sperma, cal. cincta.

1. *maritima*. Linn. Flor. lan. t. 548. Habit. in Europ. et Americae maritimis, salsis. ¶

594. *BUTTNERIA*. Cor. 5-petala. Nectar. 5-phyllum. Filamenta apice nectaris inserta. Caps. 5-cocca, muricata.

\* *Aculeatae*.

1. *scabra*, fol. lanceolatis dentatis basi subhastatis, rachis, petiolis cauleque angulato aculeatis. Willd. Sp. 2. p. 1117. Jacq. amer. p. 76. Hab. in Amer. merid. Samentosa, aculeis recurvis. ¶

\* *carthagenensis*, fol. ovatis, costa petiolisque aculeatis. Jacq. amer. ed. picta. p. 41. Hab. Carthagenae in monte Popa.

2. *tereticaulis*, fol. lanceolatis acuminatis integerrimis, rachis, petiolis cauleque tereti aculeatis. Willd. p. 1118. Lam. 1. c. 1. p. 517. Cavan. diss. 5. p. 292. t. 149. f. 2. Hab. in Peru. ¶

3. *microphylla*, fol. ellipticis integerrimis emarginatis, aculeis stipularib. Willd. Jacq. hort. t. 29. Lam. enc. 1. p. 517. Cav. diss. 5. p. 292. t. 148. f. 2. Hab. in America. Rami flexuosi. Fol. remota, ovalia. ¶

4. *ovata*, fol. ovatis serratis, petiolis in rimbis, ramis 5-angularibus aculeatis, caule erecto. Lam. enc. 1. p. 516. Cavan. diss. 5. p. 291. t. 149. f. 1. Habit. in Peru. ¶

5. *cordata*, fol. cordatis inermibus, pedunc. subternis inaequalibus septemfloris. Flor. Peruv. 3. p. 9. Cav. diss. 5. p. 291. t. 150. Hab. in Provinciae Chancay sepibus. Incolae fol. contusis ad inorsus araneorum utuntur. ¶

6. *sulcata*, fol. cordato-ovatis serratis, costa petiolisque aculeatis, pedunc. geminis 4-5-floris. Flor. Per. 3. p. 10. In Peruv. praeruptis ciliatis. Pedunc. declinati, bracteolis deciduis involucrati.

7. *hirsuta*, fol. cordatis acutis crenatis, costa petiolisque aculeatis, peduncul. congestis compositis. Flor. Per. 1. c. Hab. in Andium montibus. Flor. umbellati, involucrati.

\* \* *Inermes*.

8. *herbacea*, fol. cordatis acuminatis, dentatis eglandulosis, caule inermi herba-

ees. Willd. Roxb. corom. 1. p. 28. t. 29. Hab. in cacumine montium Ind. ¶

9. *catalpaefolia*, fol. cordatis integerrimis, caule scandente inermi. Willd. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 21. t. 46. Hab. ad Caracas. ¶

595. *AYENIA*. *Cal.* inferus, 5-partitus. *Petala* 5, apice in stellulam connexa, unguibus capillaribus longis in coronae formam arcuatis. *Glandulae* 5, stamini-formes, erectae, petal. disco insidentes. *Nectar.* cyathiforme, 5-fidum. *Stam.* sub petalis circa crenam inserta iisque recondita. *Caps.* depressa, 5-sulcata, 5-locularis, 5-valvis: valvulis bifidis, elastice dehiscens. *Sem.* solitaria. (Flor. Per. 3. p. 11.)

1. *pusilla*, foliis ovatis argute serratis, caul. prostratis. Flor. Per. 1. c. Cav. diss. 5. p. 289. t. 147. Sloan. jam. hist. 1. p. 209. t. 132. f. 2. Hab. in Jamaica et Peruviae praeruptis calidis. Suffruticosa habitu Poterii sanguisorbae. *Caps.* 5-coeca, muricata.

2. *laevigata*, fol. ovatis integris glaberrimis, germine pedicellato, nectario decemfilo radiato. Swartz. prod. 97. Hab. in Jamaica. ¶

3. *tomentosa*, fol. ovato-subrotundis tomentosis. L. Hab. in Cumana. ¶

4. *magna*, fol. cordatis pubescentibus, florum germine sessili, nectario concavo. L. Hab. in Cumana. ¶

*Obs.* Hoc et antecedens genus potius ad eorum familiam, ad *Malvaceam* in classem Monodelphiam transportanda.

596. *GLUTA*. *Cal.* campanulatus, deciduus. *Petala* 5, inferne agglutinata columnae (stipiti) germinis. *Filam.* apice columnae inserta. *Germen* columnae insidens. Fruct. ...

1. *Benghas*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1120. Hab. in Java. Arbor. Fol. alterna sessilia. Panic. terminalis. pedunculata. Passifloris affinis. An potius ad Gynandriam pertinet? ¶

† *MUSACEAE* *PENTANDRAE*, genera 597-598.

597. *HELICONIA*. *Spatha* univer-

salis partialis. *Cal.* o. *Cor.* supera, 3-petala. *Nect.* 2-phyll. *Stigma* 1. *Caps.* trilocularis: loculis monospermis.

1. *caribaea*, fol. basi apiceque rotundatis, spadice erecto radicalibus, spathis distichis multifloris, nectarii folio superiore indiviso. Willd. Sp. 2. p. 1187. Lam. enc. 1. p. 421. Plum. gen. 50. ic. 59. Hab. in ins. Caribaeis. Corolla virescens. Filam. alba. ¶

2. *Bihai*, foliis basi apiceque acutis, spadice erecto radicalibus, spathis distichis multifloris, nectarii folio superiore trifido. Willd. Swartz. obs. 46. t. 5. f. 2. H. luteo-fusca. Jacq. hort. Schoenbr. 1. p. 25. Musa *Bihai*. Lin. Hab. in Amer. calidiore, locis subudis montosis. Habitus Musae, 12-petalis. Corollae croceae, nectarium caeruleum. ¶

3. *humilis*, foliis basi angustatis apice acuminatis, spadice erecto flexuoso radicalibus, spathis distichis multifloris, nectarii folio superiore trilobato. Willd. 1. c. H. fol. basi angustatis, nervis simplicissimis, nect. adnato. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 23. t. 48. 49. Musa *humilis*. Aubl. guj. 2. p. 931. Hab. ad Caracas et in Gujana. ¶

4. *psittacorum*, fol. basi rotundatis inflorescentisque glaberrimis, spadice caulino, nectario lanceolato concavo. Andr. 1. 124. Lin. suppl. 158. Hab. in Surinamo, Jamaica. Flor. coccinei, apice fuso. ¶

5. *hirsuta*, fol. basi rotundatis glaberrimis, spadice caulino flexuoso hirsuto, spathis distichis multifloris, nectario lanceolato. Willd. p. 1188. Linn. suppl. 158. Hab. in America merid. Germen hispidum. Cor. curva dipetala. Petalum superius complicatum hispidum, interius apice macula fusca notatum. ¶

\* *indica*, fol. utrinque attenuatis, spathis paucissimis multifloris. Lam. enc. 1. p. 426. Rumph. 5. t. 62. f. 2. In Ind. et in ins. Molluccis. †

598. *STRELTZIA*. *Spatha* universalis, partialis. *Cal.* o. *Cor.* supera 3-petala: lacin. majoribus subhastatis. *Nect.* 3-phyllum genitalia involvens. *Stigma* 3. *Caps.* 3-locularis: loculis polyspermis.

1. *Reginae*, foliis parallelo-costatis. Willd. Spec. 2. p. 1190. Ait. Kew. 1. p. 285. R 4

t. 2. *Heliconia alba*. Lin. suppl. 157. Hab. ad Cap. b. spei. Folia radicalia petiolata oblonga, subius glaucescentia. Petioli tripedales et ultra, scapi longitudine. Spatha margine purpurascens. Petala lutea. Nect. caeruleum. Ait. ¶

2. *angusta*, fol. costatis reticulato-venosis. Willd. l. c. Thunb. prod. 45. *Heliconia Bihai*. Lin. suppl. 157. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

АРОСТНЕЖ. *Contortae*. L. (Gen. 599-628.)

Plantae perennes aut lignosae. Succus lactens saepius acris, causticus. Fol. opposita, aut verticillata, rarissime, alterna, simplicia, indivisa, integerrima. Flor. plerumque extra-axillares. *Cal.* quinquepartitus imae corollae appressus. *Cor.* 1-petala, regularis. Tubus subnullus mediocris, longus: limbus 5-partitus; laciniis plus minus obliquatis. Appendix corollina, (Nect. Linn.) processibus marginalibus forma variantibus; rarius nulla. *Stamin.* 5. Filam. brevissima aut longiuscula; plana, conniventia. Anth. cordatae 1. sagittatae, acuminatae 5. caudatae raro apice membranaceo obtusae, 2-locul. *Pollen* particulosus: particulis plus minus cohaesibilibus, seu rarius intra singulos antherae loculos in clavulam solidam luteam concretis. Ex his ejusdem antherae clavulis polliniciis, altera a dextra, altera a sinistra suam dirigit extremitatem attenuatam in formam filamentum elastici; cujus ope adnectitur minutissimo corpusculo fusco, supra singulas rimulas stigmaticas adfixo. Istud autem corpusculum, sponte decidens s. avulsu, sibi appensus retinet Linas clavulas pollinicas, ex his antheris proximis prodeuntes. *Ovar.* unicum, oppositum bisulcum, biloculare; ovalis ex axi propendentibus: peracta fecundatione plerumque bipartibile, rarius indivisum. *Stilus* unicus modo brevissimus, modo intra promissum Corollae tubum longus. Stigma: corpusculum crassum, attenuato c. coarctato Ovarii apici subsessiliter impositum, ad ambitum rimulis quinque stigmaticis, antheris alternantibus exaratum: seu plerumque tuberculum discoideum s. cylindraceum pelatim stylum terminans, vario processu saepe superatum, ambitu solo viscida materie illinitum. *Folliculi* gemini, (alterius abortitione solitarii,) discretis rarissime maturitate tantum separabiles; 1-loculares, interiore facie dehiscentes, raro etiam utroque margine

tuncque bivalentes: in paucioribus vero, baccatus seu drupaceus, 2-locularis; posterioris Nucis simplici s. gemina. *Recept.* in Folliculo 1-valvi ad suturam, qua dehiscente saepius fit liberum, posuit, in 2-valvi ad alterum marginem: in aliis ex axiorum habet. *Sem.* plura, propendunt s. retrorsum imbricata; modo coma basilaris ascendens quasi papposa; modo membranaceo-alata, seu etiam nuda; in Bacca Drupaeque interitum paucissima, rarissime etiam solitaria. *Embryo* Albumine carnoso inclusus, directione Seminis, rectus: Cotyledonibus Radicula cylindrica latioribus, plano-appressis. Rich. — A Linnaeo nonnulla genera rubiacea ex gr. *Gardenia*, *Genia* perperam ad hanc familiam sunt relata. Quaedam in prima divisione secundum Jussieu collocata genera Apocynis tantummodo affinia sunt, hinc ab aliquibus ab hac familia separantur.

† *Fructus baccatus aut drupaceus.*

599. **STRYCHNOS.** *Cor.* tubulosa, 5-fida. *Bacca* 1-locularis, cortice lignoso.

1. *Nux vomica*, fol. ovatis, caule ineremi. Lin. Fl. zeyl. 91. Willd. Spec. 2. p. 1052. Roxb. corom. 1. p. 8. t. 4. Blackw. t. 395. Hab. in Ind. Bac. polysperma. h

2. *colubrina*, fol. ovatis acutis, cirrhis simplicibus. Linn. Rheed. mal. 7. p. 10. t. 5. Blackw. t. 403. Rumph. 2. t. 37. Hab. in Ind. h †

3. *potatorum*, fol. oppositis ovatis, acut. quintuplinerviis venosis, cymis axillarib. Willd. Roxb. t. p. 9. t. 5? t. 5? Tetan-kotta. Retz. obs. 2. p. 12. Hab. in montosis ad Madras. Corol. fauce villis albis clausa. Bacca magnitudine Cerati monosperma. For. albisimi aromatici. h

*Obs.* Planta a Clar. Roxburg descripta forte nova species est, ob fol. simpliciter venosa. Willd.

4. *brachiata*; fol. oppositis ovatis oblongisque acuminatis 5-nerviis, caul. brachiato tereti, flor. corymbosis. Flor. Per. 2. p. 30. t. 157. Hab. in Peruv. nemorib. imis. Rami longissimi, penduli, granulosi. Pedunc. axillares. Cor. extus lirsuta. h

600. **IGNATIA.** *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* longissima, infundibuliformis. *Drupa* unilocularis, poly-



sperma. *Sem.* irregularia, angulata.

1. *amara*. Lin. suppl. 149. Willd. p. 1053. vill. Juss. gen. pl. Hab. in Ind. Arb. ramosissima, sarmentis scandentibus. Fol. ovata spithamea. Panic. axillares. Fruct. oratus, magnitudine Pyri. Lin. h

601. THEOPHRASTA. *Cor.* campanulata: laciniis obtusis. *Caps.* pulposa, 1-locularis, globosa, maxima, polysperma.

1. *americana*, fol. longissimis repandodentatis acutiusculis. Lin. Willd. Spec. 2. p. 824. Eresia. Plum. gen. 8. ic. 126. Hab. in Amer. aequinoctiali. Fruct. pomi mediocris magnitudine, croceus, rugosus, sem. rubra carnea continens. Pulpa edulis. h

2. *longifolia*, fol. mucronato-dentatis acuminatis. Willd. Jacq. Coll. 4. p. 156. Ad Caraccas in America. Fol. utrinque attenuata.

602. ANASSERA. *Cal.* parvus, 5-fidus. *Cor.* urceolata, 5-loba, intus villosa. *Stigma* didymum. *Caps.* oblonga, 2-valvis, 2-locularis.

1. *borbonica*, fol. ovatis obtusiusculis, corymbis lateralibus. Anasser. Lam. ill. 2. p. 40. Juss. gen. pl. p. 150. Hab. in Borbonia.

2. *molucaana*, fol. lanceolatis acutis, corymbis subterminalibus. Lam. l. c. Rumph. 7. p. 12. t. 7. Hab. in Molluccis.

603. FAGRÆA. Contorta. *Cal.* campanulatus 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: tubo longissimo. *Bacca* carnea, 2-locularis, polysperma. *Sem.* globosa.

1. *zeylanica*. Thunb. N. G. pl. et in Act. Holm. 1782. p. 125. t. 4. Lam. ill. t. 167. Willd. Sp. 2. p. 830. Fol. opposita obovata, integra, stipulacea? An Rubiacis affinis? h

604. MELODINUS. Contorta. *Cor.* hypocrateriformis: fauce coronula 5-fida lacera. *Stigma* 2. *Bacca* carnea, 2-locularis, po-

lysperma, magna. *Sem.* compressa.

1. *scandens*. Lin. suppl. p. 169. Willd. p. 1274. Lam. ill. t. 179. Hab. in N. Caladonia. Fol. oblongo-ovata. Planta revera digyna? h

605. RAUWOLFIA. Contorta. *Cor.* tubulosa, basi globosa. *Bacca* succulenta, disperma.

1. *nitida*, fol. quaternis lanceolatis acuminatis glaberrimis nitidis, flor. terminalibus. Willd. Sp. 2. p. 1217. Jacq. amer. dict. n. 2. Plum. gen. 19. ic. 236. f. 1. Hab. in Amer. merid. h

2. *canescens*, fol. quaternis oblongo-obovatis acuminatis pubescentibus, flor. terminalibus axillaribusque. Willd. R. hirsuta. Jacq. amer. ed. pict. t. 259. f. 17. Plum. ic. 261. f. 2. Pluck. phyt. 266. f. 2. Hab. in Jamaica, et in fruticeis Caribæarum. Cymæ pedunculatae in dichotomia caulis. Willd. h

3. *tomentosa*, fol. quaternis oblongis utrinque attenuatis tomentosis, flor. terminalibus et axillaribus. Jacq. amer. ed. pict. t. 46. Hab. Carthagenae in rupestribus. *Cor.* candida. Limbus *cor.* in R. pubescentibus obtusus, in R. tomentosa acutus. Willd.

4. *flexuosa*, fol. oblongis obovatisque angustis, racem. flexuosis paucifloris. Flor. Per. 2. p. 26. t. 102. Hab. in Peruv. frutic. Flor. in culta saepe 4-andri. *Cor.* albolutea. l. c.

5. *macrophylla*, fol. obovatis ovatisque emarginatis integerrimisque, racem. erectis multifloris. Flor. Per. l. c. t. 102. f. b. Hab. in Peruv. collibus arenosis. *Cor.* lutescens. Stam. saepe 4.

606. VALLESIA. *Cal.* minimus, *Cor.* hypocrateriformis, utrinque globosa. *Stam.* fauci inserta. *Drupæ* 2, divergentes. *Nux* striato-reticulata, 1-locularis.

1. *dichotoma*, fol. ovatis acutis undulatis, racemis dichotomis. Flor. Peruv. 2. p. 26. t. 151. Cresc. in ruderalis in Peruvia. h

2. *cymbaefolia*, fol. lanceolatis cymbaeformibus apice incurvis. Orteg. Dec. p. 58. Rauwolfia glabra. Cav. ic. 3. p. 50. t. 297. Willd. p. 1218. Hab. in N. Hispan. *Cor.* alba.

607. *OPHIOXYLON*. *Cor.* tubulosa filiformis, medio incrassata: limbo 5-partito. *Stigma* capitatum. *Bacca* didyma, 2-locularis, 2-sperma. Planta polygama. Flor. masculi, hermaphroditis mixti, 2-andri. *Juss.*

1. *serpentinum*, fol. verticillatis, flor. terminalibus conglomeratis. Lin. syst. ed. Reich. 4. p. 329. Rumph. 7. t. 16. Rheed. 6. t. 7. Lam. ill. t. 842. f. 3. Habit. in Zeylona. h

2. *Ochrosia*, fol. verticillatis, florib. dichotome corymbos. *Ochrosia*. *Juss.* gen. pl. Hab. in ins. Borbonia. Priorem speciem ita adaequat habitum, ut vix genere mihi distingui videatur. h

608. *CARISSA*. *Cal.* brevis. *Cor.* tubulosa. *Stam.* inclusa. *Bacca*, 2-locularis: loculis 1-2-aut polyspermis.

\* *Spinosae.*

1. *Carandas*, foliis ovatis mucronatis reticulato-venosis, laciniis corollae lanceolatis. Willd. Sp. 2. p. 1219. Lam. ill. t. 118. f. 1. *Carandas*. Rumph. p. 7. t. 25. Hab. in Ind. h

2. *spinarum*, fol. ovatis acutis venosis, laciniis cor. lanceolato-oblongis. Vahl. symbol. 1. p. 22. Lam. ill. t. 118. f. 2. Rumph. 7. t. 19. f. 1. Habit. in India orientali. h

3. *salicina*, fol. lanceolato-oblongis mucronatis venosis, versus petiolum angustioribus, florib. fasciculatis subcorymbosis. Lam. enc. bot. 1. p. 554. Hab. in India. Sonner. An prioris var.? sed fol. multo angustiora et flor. ad dimidium minores. Lam. h

4. *Arduina*, fol. cordato-ovatis mucronatis subsessilibus, spinis apice bifidis. Lam. l. c. p. 554. *Arduina* hispidosa. L. Willd. Sp. 2. p. 1117. Mill. ic. t. 300. Flor. albi. *Bacca* disperma. Habit. ad Cap. bon. ei. h

5. *edulis*, fol. ovatis acutis aveniis, ramis superne villosis, laciniis cor. lanceolato-linearibus. Vahl. symb. 1. p. 22. Antura. Forsk. descr. 63. Hab. in Arabia felici. h

\*\* *Inermes.*

6. *inermis*, inermis, fol. ovato-cordatis mucronatis aveniis. Vahl. symb. 3. p. 43. Hab. in Ind. orient. h

7. *mitis*, inermis, fol. lanceolatis attenuatis. Vahl. symb. 3. p. 44. t. 59. Hab. in Ind. orient. h

tiog. *GYNOPOGON*. Contorta. *Stigma* bilabiatum, apice villosum. *Drupa* nuce semibiloculari.

1. *stellatum*, fol. verticillatis ternis lanceolatis. Forst. prod. n°. 117. Willd. Sp. 2. p. 1221. Hab. in Societatis Americorum insulis. h

2. *Alyxia*, fol. verticillatis quinis obovatis. Forst. prod. n°. 118. Hab. in Norfolkiae insula. h

3. *scandens*, fol. oppositis ovatis costatis. Forst. prod. n°. 119. Hab. in Societatis insulis. h

610. *CERBERA*. Contorta. *Cor.* infundibuliformis: tubo clavato. *Drupa* monosperma: nuce 2-loculari, 4-valvi.

1. *Ahovai*, fol. ovatis acutis. Willd. Sp. 2. p. 1222. *C. laciniis* cor. undulatis, cal. foliolis reflexis. Andrew. t. 231. *Ahovai* major. Pis. bras. 308. Hab. in Brasilia. *Cor.* flava. h

2. *ovata*, fol. ellipticis obtusis. Willd. C. fol. ovatis sparsis subsessilibus, flor. terminalibus subquinis. Cav. ic. 3. p. 35. t. 270. Habit. in N. Hispania. *Cor.* lutea. *Stigm.* clavatum, umbell. referens. Cavan. h

3. *parviflora*, foliis stellatis obovatis. Forst. prod. n°. 121. Hab. in ins. Americorum. h

4. *Manghas*, fol. lanceolatis: nervis transversalibus. Linn. Petiv. gaz. t. 16. f. 4. Burm. zeyl. 150. t. 70. f. 1. Rumph. 2. t. 81. Hab. in Indiis ad aquas. h

5. *undulata*, fol. lanceolatis utrinque attenuatis undulatis, cymis ramosis divaricatis axillaribus. Andrew. t. 130. *Cerb. maculata*, fol. maculatis, etc. Willd. Sp. p. 1223. *Ochrosia* maculata. Jacq. ic. rar. 2. t. 321. Hab. in ins. Borbonia.

*Obs.* D. Andrew maculas in foliis tanquam praeternaturale quid et in speciminibus siccis a nimia pressione forte ortas respicit, *Cor.* candida, ore amoene rubro.

6. *Thevetia*, fol. linearibus longissimis conflatis, cor. lac. truncatis. Jacq. amer. 48. t. 34. Pluck. alm. t. 207. f. 3. Hab. in Cuba et Martinica rarius. Noces pro crepita culis Americanorum inserviunt. h

\* *Peruviana*, fol. lineari - lanceolatis confertis longis, pedunc. brevissimis paucifloris. C. Thevetia. Flor. Peruv. 2 p. 27. Hab. in Peruviae nemoribus e fructibus, Cascabeles nuncupatis, Indii reticulas longas conficiunt quas strepitus causa in choreis ad collum et genua appendunt.

*Obs.* Haec peruviana planta a priore diversa videtur. Germ. in hac 4-gonum, in illa, secundum Jacquin, subrotundum; stigm. in hac capitatum, acuminatum, denticulis 20 - recurvis ornatum, in illa capitatum subovatum, apice bifido. Jacq. Pedunc. huic suboctoflori, breves in illa saepius unidori. J.

# 611. GELSEMIUM. Cal. 5-dentatus.

*Cor.* infundibuliformis: limbo patente 5-lobo subaequali. *Caps.* compresso-plana 2-partibilis, 2-locularis. *Sem.* plana, valvularum marginibus adnexa. *Juss.*

1. *sempervirens*. Bignonia sempervirens. Lin. G. nitidum, scandens glaberrimum, fol. lanceolatis, flor. fasciculis axillaribus paucifloris, flor. luteis suaveolentibus. Michaux. Flor. 1. p. 120. Hab. in Amer. bor. maritimis. J.

† † *Fructus bifollicaris.*

\* *Semina nuda s. basi non comosu aut papposa, saepe margine membranaeco aucta.*

# 612. VINCA. Contorta. Cor. hypocrateriformis, sauce 5-gona. Folliculi 2, erecti, teretes, angusti. Sem. oblonga, nuda.

1. *minor*, caulib. procumbentibus, fol. oblongo-lanceolatis, margine glabris. Linn. Willd. Sp. 2. p. 1232. Blackw. t. 59. Hab. in sylvis. Sempervirens. J.

2. *herbacea*, caul. procumbentibus, fol. oblongo-lanceolatis, margine ciliatis. Ritabel. Pl. hong. p. 8. t. 8. Hab. in apricis arenosis et in calcariis prope Budam, vere. J.

3. *major*, caul. declinatis, fol. ovatis, junioribus margine ciliatis, flor. pedunculatis. Willd. Hab. in Gallia Narbonensi, Hispania, Helvetia, etc.

4. *lutea*, caule volubili, fol. oblongis. Lin. Amoen. acad. 4. p. 367. Catesb. car. 2. p. 53. p. 53. Hab. in Carolina. Facies Echii. Willd. J.

5. *rosea*, caule suffrutescente erecto, flor. geminis sessilibus, fol. ovato-oblongis, petiolis basi bidentatis. Linn. Mill. dict. t. 186. Hab. in Madag., Java. Var. fol. villosis. J.

6. *parviflora*, caul. herbaceo erecto, fol. (rhomboideo-) lanceolatis, flor. geminis involucreatis. Retz. obs. 2. p. 14. V. pusilla. Lin. suppl. 166. Murr. Comment. goett. 1772. p. 66. t. 4. f. 1. Hab. in Traquebariae hortis, vitium summum. Corol. Lithospermi officinalis magnitudine et colore. C.

# 613. MATELEA. Cal. 5-partitus.

*Cor.* rotata. *Antherae* in capitatum 5-gonum conjunctae. *Stigma* dilatata. *Folliculus* 1, (altero saepius abortivo) verrucosus, 5-gonus. *Sem.* plana, margine crenata.

1. *palustris*. Aubl. guj. 1. p. 278. t. 109. f. 1. Lam. ill. t. 179. Hosta viridiflora. Willd. Sp. p. 1274. Hab. in Gujan. paludosis. Fol. oblongo - ovata acuminata et p. fol. latiora. Aubl. f. 2. Flor. axill. J.

# 614. PLUMERIA. Contorta. Cal.

obtusius, minimus, deciduus. *Cor.* infundibuliformis, tubo subcurvo. *Stigma* 2 - fidum. *Folliculi* 2, deorsum flexi, longi ventricosi. *Sem.* oblonga, basi ala membranacea (crenato-dentata) aucta.

1. *rubra*, foliis ovato-oblongis, petiolis biglandulosis. Lin. Willd. p. 1242. Catesb. carol. t. 92. Ehret. t. 10. Hab. in Jamaica, Surinamo. Arb. procera ramosa.

2. *alba*, fol. lanceolatis revolutis, pedunc. superne tuberosis. Lin. Jacq. Amer. t. 174. f. 2. ed. picta. t. 38. Plumier. Sp. ic. 231. In Jamaica, Priorie habitu, sed parum ramosa.

3. *purpurea*, fol. oblongo-ovatis, margine revolutis, cor. rubris. Flor. Per. 2. p. 20. t. 137. Hab. in Peruv. hortis. Cor. quam in reliquis speciebus minor, fragrantissima: ore laeviter lutescente. l. c. J.

4. *incarnata*, fol. ovato-oblongis acutis, cor. incarnatis disco fulvo. Flor. Per. l. c. t. 138. Cum priore. Flor. cymoso-umbellata. Nimis affinis sequenti dicitur. J.

5. *carinata*, fol. oblongo-ovatis acuminatis carinatis: marginibus planis rubris, cor. magnis tricoloribus. Flor. Per.

p. 21. Cor. in centro lutea, extus ad medium alba, superne rubescens. h

6. *tricolor*, fol. oblongis acutis, marginibus planis venosis, cor. tricoloribus. Flor. Per. t. 139. Cor. tubus ruber, faux crocea, limbus albo-roseus.

*Obs.* Plumieriae nostrae, dicunt auctores Flor. Peruvianae, inter se differunt colore et magnitudine florum (quare forte varietates aut subspecies tantummodo sunt) et cum nec color, nec magnitudo speciem mutet, nobis satis visum est illas seorsim describere. Etiam cum iis potius Plumieria quam Plumeria dicendum est hoc genus, quod comprehendit arbores formosissimas et gratissimas.

7. *obtus*a, fol. lanceolatis petiolatis obtusis. Linn. Catesb. car. 2. p. 93. t. 93. Plum. ic. 232. Habit. in America calidior. h

8. *pubica*, flor. limbo clausis. Jacq. amer. 37. Habit. in Amer. hortis, ubi, secundum Jacquinum, sub nomine *Donzellas* sive Virgines, eo quod nunquam expliciter corollae, quae flavescens et omnium odoratissimae sunt, coluntur.

615. CAMERARIA. *Cal.* minimus acutus. *Cor.* infundibuliformis: tubo utrinque ventricoso. *Antherae* filo longo terminatae. *Folliculi* 2, basi utrinque bilobi, horizontales. *Sem.* imbricata membranae (alae) inserta.

1. *latifolia*, fol. ovatis acuminatis parallelo-costatis nitidis, flor. corymbosis terminalibus. Willd. Sp. 2. p. 1245. Andr. t. 16. Mill. dict. Jacq. amer. 37. t. 182. f. 86. Plum. gen. 18. ic. 72. f. 1. Hab. in America calidior. Cor. alba: fundo flavescens. h

2. *zeylanica*, fol. ovato-oblongis acuminatis parallelo-costatis, corymbis terminalibus, axillaribusque. Willd. Hab. in Zeylona. For. minores. h

3. *lutea*, fol. ovato-oblongis acuminatis reticulato-venosis, umbella pedunculata pauciflora. Willd. Lam. encyc. 1. p. 566. C. *Tumaquarina*. Aubl. guj. 1. p. 210. t. 102. β. *guyanensis* fol. ovatis acuminatis, floribus parvis axillaribus odoratis. Aubl. guj. 1. p. 262. Hab. ad ripas amnis Calibiensis Gujanac. h

4. *angustifolia*, foliis linearibus. L. Plum. gen. 18. ic. 72. f. 2. Hab. in America calidior. h

616. TABERNÆMONTANA. *Con-torta*. Cor. hypocrateriform. tubus angulato-striatus, basi subgloboseus. *Folliculi* 2, horizontales. *Sem.* pulpae immersa. (Fol. opposita.)

1. *citrifolia*, fol. ovatis, floribus lateralibus glomerato-umbellatis. L. Jacq. amer. 38. t. 175. f. 13. ed. pict. Plum. gen. 18. ic. 248. f. 2. Hab. in America. h

2. *laurifolia*, fol. ovalibus obtusiusculis. Mill. dict. n. 3. Jacq. amer. p. 39. Hab. in Jamaica. h

3. *echinata*, fol. ovato-oblongis acuminatis, flor. glomerato-umbellatis, fructibus echinatis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 263. t. 103. Hab. in Gujana. h

4. *grandiflora*, fol. caule dichotomo, calycibus inaequalibus laxissimis. Mont. 53. Jacq. amer. 40. t. 31. Hab. Carthagenae. Cal. fol. alba: exteriora 2 cordata. h

5. *cymosa*, fol. ovato-lanceolatis, flor. cymosis. Jacq. amer. 39. t. 181. f. 14. Hab. Carthagenae. Fol. semipedalia. Folliculi rubescentes pulpa aurantia. h

6. *amygdalifolia*, fol. ovali-lanceolatis, staminibus tubum corollae superantibus. Willd. Jacq. amer. 39. t. 181. f. 15. Hab. in Carthagenae sylvaticis. h

7. *discolor*, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. axillaribus bifloris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 535. Hab. in Jamaica. h

8. *persicariaefolia*, fol. lanceolatis acuminatis, flor. racemosis. Willd. p. 1245. Jacq. ic. rar. 2. t. 390. Collect. 4. p. 159. Hab. in insula Mauriti. h

9. *arcuata*, fol. obovatis oblongis acuminatis, corymb. ternis multifloris, folliculis revolutis-arcuatis. For. Per. 2. p. 22. t. 143. Copiose in Peruviae nemoribus ad Pozuzo vicinis. Arbor succo lacteo, copioso scatet, qui aëri expositus in gummiresinam condensatur.

10. *Sananho*, fol. oblongis acuminatis, corymb. biquadrifidis, fructibus obovato-subrotundis acuminatis. Flor. Per. t. 144. In Peruv. nemoribus. Follic. obtuse digoni. Cor. tubus longissimus. h

11. *elliptica*, herbacea, fol. subternis lanceolatis. Thunb. jap. 111. Hab. in Japonia. Affinis T. *Amsoniae*. L. ¶

12. *alternifolia*, fol. alternis, caule ar-

borescente. L. Rheed. 1. t. 43. Hab. in Malabar. h

617. *AMSONIA*. Contorta. *Cor.* infundibuliformis, fauce clausa. *Folliculi* 2, erecti. *Sem.* teretia nuda oblique truncatis. (Stigma margine annulari. *Fol.* alterna.)

1. *latifolia*, caule glabriusculo, foliis ovato-lanceolatis: superioribus acuminatis. Michaux. Flor. 1. p. 127. Tabernem. Amsonia. Lin. Willd. p. 1246. Hab. in umbrosis humidis sylv. Carolinac.

*Obs.* Cultae fol. minus acuminata et subglabra. M.

2. *angustifolia*, fol. angusto-linearibus crebris erectis pubescentibus. Michaux. l. c. A. ciliata. Walt. In Georgiae sabulosis apricis.

618. *URCEOLA*. Contorta. *Cor.* urceolata. *Nectar.* cylindricum integrum, germen cingens. *Folliculi* 2, 1-loculares, 2-valves. *Sem.* pulposa.

1. *elastica*. Roxb. in Asiat. researches. 3. p. 167. sp. Sprengel in Schrad. Journ. bot. 1800. 2. p. 236. Hab. in India. Flor. paniculati Succus ære coagulatus, resinam offert elasticam, Kaoutchouk similem.

\* \* *Semina basi comosa s. papposa.*

619. *NERIUM*. Contorta. *Cal.* 5-partitus parvus, persistens. *Cor.* infundibuliformis, fauce coronula lacera. *Folliculi* conniventes longe acuminati.

1. *Oleander*, foliis lanceolatis angustis ternis, subtus costatis, cal. lacinias squarosis, nect. planis tricuspidatis. Willd. Sp. 2. p. 1244. Ait. Kew. 1. p. 206. Desfont. Atl. 1. p. 208. Lam. ill. t. 174. Pulchra hæc Arbuscula, per totam aestatem, florens, sponte crescit in India, et in Atlante ad fluviorum ripas. Val. flor. albis.

2. *odorum*, fol. lineari-lanceolatis ternis subtus costatis, lacinias calycinis erectis, nectaris multipartitis filiformibus. Willd. p. 1236. N. *odoratum*, -auth. superne barbato-plumosis. Lam. enc. 3. p. 456. Rheed. g. t. 2. β. Flor. plenis. Herm. lugdb. 447. t. 449. Hab. in India orientali. Priore tenebrius, et in caldariis colendum. h

3. *salicinum*, fol. lineari-lanceolatis

ternis enerviis. Vahl. symb. 2. p. 45. Forsk. descr. 205. Hab. in Arabia felici. h

4? *obesum*, foliis oblongo-lanceolatis sparsis, subtus villosis. Vahl. symb. 2. p. 45. Forsk. descr. 205. Hab. in Arabia felici. h

5. *zeylanicum*, fol. lanceolatis oppositis, ramis rectis. L. Burm. zeyl. 23. t. 12. f. 2. Hab. in India. h

6. *divaricatum*, fol. lanceolatis-ovatis, ramis divaricatis. L. Hab. in India. Flor. albi. ♂

7. *antidysentericum*, fol. ovatis acuminatis petiolatis, follic. apice convexis. Lam. enc. 4. p. 457. Burm. zeyl. 167. t. 77. Rheed. 1. t. 47. Hab. in Malabar, Zeylona, Russia. Flor. albi, odorati. h

8. *coronarium*, fol. ellipticis, pedunc. ex dichotomia ramorum geminis bifloris. Ait. Kew. 1. p. 297. Jacq. ic. rar. 1. t. 52. Coll. 1. p. 138. Burm. zeyl. t. 59. Rumph. 4. p. 87. t. 39. Rheed. 2. t. 53. Hab. in India orientali. Corona petaloidea duplex. An *Tabernaemontana*? Lam. l. c. h

420. *STROPHANTHUS*. Contorta. *Cor.* infundibuliformis: laciniae longissime candate. *Coronulae* faucis dentibus 10 simplicibus.

1. *sarmentosus*, glaber sarmentosus, floribus sub-glomeratis terminalibus et lateralibus, antheris in flum productis. Decand. in Bulletin de Sciences par la soc. Philom. n°. 64. p. 123. t. 8. f. 1. Hab. in Sierra-Leone in Africa. Flor. cum foliis nascuntur, magni, rubri. h

2. *laurifolius*, glaber erectus? fol. subternis, flor. glomeratis terminalibus (post folia nascentib.), anther. in flum productis. Decand. l. c. Hab. in Africa. Non sarmentosus. *Var.* fol. oppositis et ternatim verticillatis. h

3. *dichotomus*, ramis pedunculisque dichotomis, fol. mucronato-acuminatis. Decand. Hab. in India. Echites *caudata*, cor. infundibuliformibus: apicib. linearib. longissimis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1240. Burm. ind. t. 26. Anth. priorum.

β. *rotundata*, fol. ovato-rotundis. Nerium candatum. Lam. enc. 3. p. 458. Hab. in India. Arb.

4. *hispidus*, totus piloso-hispidus, anther. acutis muticis. Decand. l. c. t. 8. f. 2. In Africa. Loro stipularum fasciculus pilorum adesp. Lacin. cor. omnium longissimae ad 7 uncias. h

631. ECHITES. Contorta. *Folliculi*

2, longi, recti. *Sem.* coma instructa. *Cor.* infundibuliformis, fauce nuda. *Antheræ* conniventes in conum.

1. *biflora*, caul. sarmentosis, fol. oblongis, pedunculis subbifloris. Jacq. amer. 38. t. 21. ed. picta. t. 28. Willd. Sp. 2. p. 1237. Plum. amer. 82. t. 96. Nerium sarmentosum, fol. oppositis oblongis acutis, subtus cinereis, tubo floris fauce ampliata. Brown. jam. 180. Hab. in Caribæis. Flor. candidi cum fauce lutea. Pedunc. 1-4-flori. h

2. *quinquangularis*, pedunculis racemosis, fol. obovatis acuminatis. Jacq. amer. 32. t. 25. ed. picta. t. 30. Hab. in America meridionali. Flor. flavo-virescentes. Non lactescit. J. h

3. *annularis*, caule volubili, cor. hypocrateriformibus, tubo annulo elevato. Lin. suppl. 166. Hab. in Surinamo. Caul. scaber. Stigma annulo cinctum. L.

4. *tomentosa*, fol. cordato-oblongis acuminatis, caulique hirtis, floribus racemosis pilosis. Vahl. symb. 3. p. 44. Hab. in Cajen.

5. *suberecta*, pedunc. multifloris, cor. cylindraceis extus hirsutis, fol. subovatis mucronatis subtus pubescentibus. Swartz. obs. 104. Andrew. t. 187. Jacq. amer. 32. t. 26. Sloan. jam. 89. hist. 1. p. 206. t. 130. f. 2. Hab. in Jamaica. Flor. lutei magni. Succus lacteus venenatus. h

6. *domingensis*, pedunc. racemosis, fol. cordato-ovatis rigidiusculis subtus discoloribus, caule volubili. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 529. Jacq. ic. rar. 1. t. 53. Collect. 1. p. 73. In fruticetis maritimis Jamaicae, Hispaniolae. h

7. *agglutinata*, pedunculis racemosis, fol. ovatis emarginatis acuminatis. L. Jacq. amer. 31. t. 23. ed. picta. t. 30. Hab. in fruticetis montosis in Domingo. Flor. parvi, candidi. G

8. *Asperuginis*, pedunculis racemosis, folliculis filiformibus, fol. oblongis acutis superne asperis, caule volubili. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 531. Apocynum scandens, siliquarum externa parte vestibus haerente. Plum. ic. 26. Hab. in fruticetis siccissimis Jamaicae, Hispaniolae. Antecedenti similis. h

9. *torulosa*, pedunc. subracemosis, fol. lanceolatis acuminatis, follic. torulosos longissimis. Jacq. amer. 33. t. 27. ed. picta. t. 34. Swartz. obs. 105. Brown. jam. 181. t. 16.

f. 2. Lam. ill. t. 174. f. 1. Hab. in Jamaica. h

10. *umbellata*, pedunc. umbellatis, fol. ovatis obtusis mucronatis, caule volubili. Jacq. amer. 30. t. 22. ed. picta. t. 29. Sloan. jam. 89. hist. 1. p. 207. t. 131. f. 2. Hab. in Jamaica. Flor. magni, albi, tubo longissimo viridanti. Jacq.

11. *circinalis*, pedunc. axillaribus articulatis multifloris, laciniis corollae undulatis, fol. ellipticis, caule volubili. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 533. Hab. in sepibus montosis Hispaniolae. h

12. *floribunda*, racemis compositis corymbosis, fol. ellipticis acuminatis, costatis, ramis erectiusculis. Willd. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 534. Hab. in fruticetis, montium Jamaicae. h

13. *trifida*, pedunc. trifidis multifloris, fol. ovato-oblongis acuminatis. Jacq. amer. 31. t. 24. ed. picta. t. 31. Hab. in America. Flor. tubo longo purpurascens, limbo sordide virente. J. h

14. *repens*, pedunc. racemosis, fol. lanceolato-linearibus angustis, follicul. tornosis. Jacq. amer. 33. t. 28. ed. picta. t. 35. Hab. in Domingo rupestribus et ad marg. sylvarum. h

15. *corymbosa*, racemis corymbosis, staminibus eminentibus, fol. lanceolato-ovalibus. Jacq. amer. 34. t. 30. et picta. t. 37. Swartz. obs. 105. Hab. in sylvaticis Insulae Domingo. h

16. *costata*, pedunc. cymosis, fol. elliptico-lanceolatis acuminatis. Forst. prod. n°. 123. Rheed. g. t. 14. Hab. insulis Societatis. h

17. *spicata*, spicis axillaribus, brevibus, staminibus eminentibus, fol. subovatis distichis. Jacq. amer. 34. t. 20. ed. picta. t. 36. Hab. in sylv. Carthagenae, ubi arbores vicinas ad 60 pedum altitudinem scandit. h

18. *siphilitica*, fol. ovatis subpetiolatis glaberrimis costatis, paniculis dichotomis, floribus spicatis. Lin. suppl. 167. Hab. in Surinamo. Decoctum herbae Surinamensis in Siphilitide notissimum. h

19. *glandulosa*, fol. cordato-subrotundi acuminatis tomentosis glanduliferis, pedunc. racemosis. Flor. Per. 2. p. 19. t. 135. In Peruviae nemoribus. Plant. tomentosa. Caul. ad articulationes et folia ad cordaturam et per petiolis (et stipulae) glandulifera. h

20. *laxa*, fol. cordatis acutis, basi multiglandulosis, pedunc. longis laxis racemosis

*paucifloris*. Flor. Per. l. c. t. 131. f. b. Hab. in Pillao nemorib. Plant. parum villosa. Rami filiformes subvillosi. h

21. *acuminata*, glabra, fol. ovatis oblongisque acuminatis basi glandulis 5, racemis brevibus, pedicellis geminis. Flor. Per. t. 134. f. a. Cresc. in sylvis Chinchao ad Macora praedium. Cor. alba, extus purpurea.

22. *hirsuta*, fol. oblongo-ovalibus acuminatis basi excavatis, subtus villosis, racemis multifloris. Flor. Per. 2. p. 19. t. 136. In Peruviae nemorib. Fol. ad basin glandula 1-2-praedita. Cal. in flore acutus, in fructu obtusus. L. c.

23. *subsagittata*, fol. oblongo-subagittatis acuminatis: angulis posticis obtusis, pedunc. paucifloris. Flor. Per. l. c. Cum priore. Fol. margine ciliata, basi glandulosa. L. c.

24. *puberula*, fol. ovali-lanceolatis basi utring. acutis subtus puberulis, flor. parvis fasciculato-corymbosis. Michaux. Flor. 1. p. 120. L. *difformis*. Walt? In Carol. inferioris sylvis. Follic. graciles, 1/2 pedales.

25. *scholaris*. fol. subverticillatis oblongis, follic. filiformibus longissimis, umbellis compositis. L. Lignum scholare. Rumph. 2. t. 82. Rheede 1. t. 45. Hab. in India. h

Obs. Arbor ramis ad genicula tantum foliatis, cujus lignum ad varia utensilia adhibetur, inter alia ex eo tabulae conficiuntur, superficie altera figuris variis ornata, altera laevissima, in qua pueri in scholis scribere solent.

26. *truncata*, cymis pedunculatis subsessifloris, lobis corollarum truncatis. Lam. enc. 2. p. 340. Catesb. Car. 2. p. 53. t. 53. Hab. in ins. Bahama. E. *biflora* subsimilis affirmatur. †

27. *lappulacea*, pedunc. racemosis hispida, flor. oppositis follic. utrinque hispido-lappaceis. Lam. l. c. Plum. Spec. 2. Mss. 2. t. 70. Burm. Amer. t. 26. Cresc. a St.-Domingo. Cor. alba. †

28. *succulenta*, aculeis hinis extrafoliaceis, fol. linearibus subtus tomentosis, cor. hypocrateriformibus. Lin. suppl. 167. Hab. ad Cap. b. spei. Filam. barbata. h

29. *bispinosa*, aculeis hinis extrafoliaceis, fol. lanceolatis glabris, cor. hypocrateriformibus. Lin. suppl. p. 167. Hab. ad Cap. b. spei. Var. prioris? Frutices bi hini posteriores succulenti lactescentes bispinosi, ut absque vita fructificatione Euphorbias crederes. L. h

622. *PERGULARIA*. Contorta. Nect. ambiens genitalia cuspidibus 5 sagittatis. Cal. hypocrateriformis: tubo cal. longiore. Folliculi 2, saepius asperi.

1. *glabra*, fol. ovatis acutis glabris, caula fruticoso. Willd. Spec. 2. p. 124. Flos pergularius. Rumph. 5. t. 29. f. 2. Hab. in India. h

2? *edulis*, fol. obvatis integris glabris, caule herbaceo volubili. Thunb. prod. 38. Hab. ad Cap. b. spei. †

Obs. Est *Cynanchi* species secundum Andrew. Repos. p. 8. t. 185.

3. *tomentosa*, fol. cordatis tomentosis. L. Vahl. symb. 1. p. 23. Asclepias cordata. Forsk. descr. 49. Hab. in Arabia. h

4. *purpurea*, fol. cordatis glabris, cor. laciniis linearibus oblongis glabris, umbel. Vahl. symb. 3. p. 44. Asclepias (cordata). Burm. ind. 22. t. 27. f. 2. Hab. in India orientali, China

5. *japonica*, fol. cordatis glabris, cor. laciniis ovatis interne villosis, umbel. simplicibus. Thunb. jap. 111. Hab. in Japonia.

Obs. Cel. Andrew, qui hoc genus ad classeni Gynandriam decandriam amandat, sequentem nectarii delit characterem; Nectarium duplex, genitalia involvens: squamulae exteriores 5 cuspidatae, quinque interiores (quae vera filamenta?) membranaceae: singula occultans stamina (antheras?) duo alterna (quae tunc non pistillo uti in Gynandris sunt adnexa. Secundam eundem P. *glabra* (cui fol. vere ovata sunt) et *japonica* eandem efficit speciem, ab eo P. *minor* denominatam et depiciam, nec non P. *purpurea* a *tomentosa* haud diversa, quas sub nomine P. *odoratissima*, fol. senioribus subtomentosis, cor. viridibus, conjunxit; vid. Ejus Rep. t. 185.

623. *PERIPILOCA*. Contorta. Cor. rotata 5-partita; corona (Nect.) urceolata 5-fida, faucem ambiente, setas 5 exrens. Stigma capitatum, 5-gonum. Folliculi 2.

1. *graca*, floribus interne hirsutis terminalibus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1248. Jacq. Misc. 1. p. 11. t. 1. f. 2. Lam. ill. t. 177. Hab. in Syria, Sibiria. Stigma 10-crenatum. h

2. *maurittiana*, fol. ovatis longe acuminatis, flor. racemosis, fruct. horizontaliter

patentib. Poiret in Enc. bot. 5. p. 188. Cyn. mauritianum, Lam. Enc. 2. p. 236. Rumph. 5. t. 10. Rheed. g. t. 11. In India.

3. *Secamone*, floribus interne hirsutis paniculatis, fol. lanceolato-ellipticis. Secamone. Alp. aegypt. 133. t. 134. Hab. in Aegypto. Differt a praecedente primo intuitu floribus minutis copiosis, h

4. *lavigata*, cor. glabris, laciniis obtusis, cymis trichotomis, fol. oblongo-lanceolatis venosis laevibus, caule glabro. Willd. Alt. Kew. 1. p. 301. P. puniceaefolia caule fruticoso lento, fol. lanceolatis. Cav. ic. 3. p. g. t. 217. Hab. in Canariis. Cor. interne luteo-viridis, laciniis macula fulva notatis. W. h

5. *angustifolia*, cor. glabris, laciniis emarginatis, cymis trichotomis, fol. lanceolatis aveniis laevibus, caule glabro. Willd. p. 1249. Desf. Atl. 1. p. 209. P. fruticosa, fol. aveniis angusto-lanceolatis perennantibus, folliculis horizontalibus basi oppositis. Billard. ic. pl. Syric. 2. p. 13. t. 7. Hab. in Syria et Atlant. Cor. interne purpureascens, in medio macula alba notata. h

6. *esculenta*, glabra, fol. lineari-subulatis, racemis elongatis simplicibus, florib. interne nudis. Lin. suppl. 168. Roxb. corom. 1. p. 13. t. 11. Pluck. amal. 19. t. 359. f. 6. Hab. ad littora fluminum Zeylonae et Malebariae. Var. latitudine foliorum. W. h

7. *emetica*, cor. glabris, corymbis paucifloris axillaribus, fol. lineari-lanceolatis aveniis. Willd. p. 1250. Retz. obs. 2. p. 14. Willd. phytog. 1. p. 6. t. 5. f. 2. In Ind. h

8. *indica*, spicis axillaribus, imbricatis, fol. ellipticis obtusis mucronatis, caule glabro. Willd. p. 1251. Burm. zeyl. 187. t. 83. f. 1. Pluck. mant. 17. t. 359. f. 2. Hab. in Zeylona. h

9. *capsularis*, fol. lanceolatis integerrimis oppositis, cymis axillaribus diffusis. Forst. prod. n.º. 126. Hab. in Nova Zeelandia. †

10. *africana*, fol. ovatis acutis, flor. corymbosis, caule hirsuto. Willd. Jacq. misc. 1. p. 13. t. 1. f. 3. Comm. rar. 18. t. 18. Pluck. alm. 37. t. 137. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. purpurasc. Nect. album campanulatum, 5-gonum: ore rotundato, vagina interior albidula, cum nect. conglutinata ambiens pistillum. Jacq.

11. *tunicata*, fol. oblongis cordatis acuminatis, florib. umbellatis. Willd. o's. 2. p. 15. phytog. Retz. 1. p. 7. t. 5. f. 1. Hab. in Tranqueberia.

12. *sylvestris*, fol. subrotundo-ovatis reticulato-venosis, subtus pubescentibus, floribus umbellatis. Retz. obs. 2. p. 15. Willd. 1. c. 1. p. 7. t. 5. f. 3. Hab. in sylvaticis Zeylonae. h

13. *albicans*, fol. ovatis acuminatis, racemis paucifloris, caul. sulcato candicante. Encycl. bot. 5. p. 191. Hab. in India orient. Commers. Non confundi debet cum Cynancho tuberoso L. quocum cortice convenit. Fruct. ignotus. h

14. *cordata*, fol. ovato-cordatis mucronatis, flor. axillaribus subumbellatis, pedunc. capillaribus. Enc. bot. 1. c. Hab. in India. Sonner. P. indicæ affinis, sed tota glabra. h

15. *parviflora*, fol. ovato-sublinearibus, flor. minimis subsessilibus, caul. volubili. Enc. bot. 5. p. 192. In India a Sonnerat lecta. Non confundenda dicitur cum Cynancho parviflora. Sw., cujus habitum refert. h

16. *virgata*, fol. lanceolatis, flor. longe spicatis subnudis, caul. virgatis, ramis florentibus lateralibus. Enc. bot. 1. c. In Ind. orient. Cor. albidula, parva. h

624. CYNANCHUM. Contorta. Cor. rotata. Nect. cylindricum, 5-dentatum, cor. faucem ambiens, simplex. Folliculi 2.

1. *viminale*, caule volubili perenni aphyll. L. Euphorbia viminalis. L. Spec. plant. 2. p. 649. Bass. Act. bonon. Alp. aegypt. 160. t. 190. Hab. in Africae maritimis et Indiae nemorosis. Caul. nudus, crassitudine calami. h

2. *filiforme*, caule erecto simplicissimo, fol. linearibus, floribus verticillatis axillaribus. Lin. suppl. 169. C. fol. linearibus planis. Thunb. prod. 46. Hab. in Cap. b. spei.

3. *crispum*, caule erecto herbaceo, fol. lanceolatis crispis, floribus lateralibus. Thunb. prod. 46. Cum priore.

4. *tenuellum*, caule herbaceo subvolubili, fol. ovato-oblongis. Lin. suppl. 168. Hab. in Nova Granada.

5. *obtusifolium*, caule volubili herbaceo, fol. oblongis apice rotundatis cum acumine, umbellis lateralibus. Lin. suppl. 169. cfr. Lam. enc. 2. p. 236. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. virides subumbellati. W. ☉

6. *capense*, caule volubili undique coniformi, fol. subcordato-ovatis, pedunculis multifloris.



multifloris. Lin. suppl. 168. Hab. ad Cap. b. spci.

7. *acutum*, caule volubili herbaceo, fol. cordato-oblongis glabris. Apocynum latifolium. Clus. hist. 1. p. 125. Hab. in Sicilia, Hispania, Astracan. Cymae poliferae. W. T.

8. *rostratum*, caule petiolisque hirsutis, fol. cordato-oblongis, petalis lanceolatis planis. Vahl. symb. 3. p. 45. Hab. in insula Trinitatis. Cor. ante explicationem ovata acuminato-rostrata.

9. *granliformum*, caule pedunculisque hirtis, fol. cordato-ovatis acuminatis, petalis ovato-acuminatis. Willd. p. 1254. Cav. ic. 2. p. 14. t. 21. Hab. in America calidiore. Caulis pilis rufis. Cor. maxima hujus generis, viridis, coriacea. T.

10. *nigrum*, caule volubili, fol. oblongo-cordatis glabris acutis, racemis simplicibus paucifloris. Willd. Cav. ic. 2. p. 45. t. 159. Hab. in Mexico. Cor. nigrae. T.

11. *racemosum*, caule volubili fol. ovato-cordatis glabris acuminatis, racemis simplicibus multifloris. Willd. Jacq. amer. 81. t. 54. ed. pict. t. 80. Hab. in Carthagina. Cor. candidae, parvae. T.

12. *excelsum*, caule volubili, fol. glabris cordato-lanceolatis, caps. longis angustis acutis. Desf. Atl. 1. p. 212. Hab. in palmetis prope Tozzer. Fol. glauca. T.

13. *Ipecacuanha*, caule volubili pubescente, fol. cordato-ovatis cuspidatis subtus pubescentib., umbell. simplib. paucifloris villosis. Willd. Jahrb. d. Pharm. 1. 2. p. C. vomitorium, fol. ovato-lanceolatis, corymb. etc. Lam. enc. 2. p. 235. Asclepias *asthmatica*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1270. Hab. in Zeylounae sylvis et in ins. Franciae. Rad. cum vomitoriis ad dosin 24. gr. oblata exercet. Cal. lacin. setaceae.

14. *tomentosum*, caul. volubili tomentoso, fol. subcordato-ovalib. mucronatis subtus tomentosis, umb. subquinguefloris. Lam. l. c. In Ind. oriental.

15. *maritimum*, caule volubili, foliis cordatis hirsutis subtus tomentosis, pedunc. aggregatis. Jacq. amer. 81. t. 56. ed. pict. t. 82. Hab. in Terra Bomba Amer. meridion. Cor. atropurpureae. h

16. *suberosum*, caule volubili hirtis, fol. ovato-cordatis acuminatis, corymbis axillaribus, lacinii cor. lanceolatis. Willd. Dill. elth. 300. t. 229. f. 266. Habit. in America calidiore. h

17. *carolinense*, caule volubili herbaceo hirsuto, fol. ovato-cordatis acutis hirsutis,

flor. subumbellatis, cor. obtusis. Jacq. ic. 2. t. 342. Coll. 2. p. 288. Hab. in Carolina. T.

18. *obliquum*, caule volubili herbaceo hirsuto, fol. cordatis acutis villosis, florib. umbellatis, petalis obliquis ad oras revolutis. Jacq. ic. 2. t. 347. Collect. 1. p. 148. Hab. in Carolina. T.

19. *hirtum*, caule volubili fruticoso inferne suberoso fesso, fol. ovato-cordatis. L. Moris. S. 15. t. 3. f. 61. Hab. in America. T.

20. *crispiflorum*, caule volubili, foliis subtus villosis oblongis cordatis, sinu clauso, petalis apice crispis. Plum. ic. 210. t. 216. f. 1. Hab. in fruticetis Jamaicae et ad isthmum Darien. h

21. *prostratum*, caule prostrato herbaceo, fol. reniformi-cordatis acutis subtus tomentosis. Willd. Cav. ic. 1. p. 5. t. 7. Hab. in Mexico. T.

22. *monspeliacum*, caule volubili herbaceo, fol. reniformi-cordatis acutis glabris. Cav. ic. 1. p. 44. t. 60. Jacq. ic. 2. t. 340. Collect. 4. p. 168. Hab. in Hispania et Narbonne maritimis. h

23. *sibiricum*, caule volubili herbaceo, fol. articulo-cordatis glabris. Willd. in N. Act. herol. v. 2. t. 6. f. 1. Hab. in Sibiria. Non confundendum cum *C. erecto*.

24. *extensum*, caule volubili herbaceo hirtis, fol. reniformi-cordatis acutis, petalis acutis, margine hirsutis. Jacq. ic. 1. t. 54. Misc. 2. p. 353. *C. cordifolium*. Retz. obs. 2. p. 15. Hab. in India orientali. h

25. *reticulatum*, caule volubili, foliis acuminatis glabris planis, umbellis axillaribus. Willd. p. 1258. Retz. obs. 2. p. 15. Hab. in India orientali. h

26. *undulatum*, glabrum, caule volubili fol. oblongis acuminatis, basi attenuatis, undulatis, umbellis capitatis. Willd. Jacq. amer. 85. t. 58. ed. pict. t. 84. Hab. Carthagenae in monte de la Popa. Cal. cinereus. Cor. violaceae. h

27. *parviflorum*, caule volubili filiformi, fol. ovatis apice subulatis, umbellis subsessilibus. Swartz. Fl. ind. occident. 1. p. 517. Plum. ic. 215. f. 1. Hab. in fruticetis sylvaticis montosis Indiae occidentalis. h

28. *erectum*, caule erecto divaricato, fol. cordatis glabris. L. Jacq. hort. t. 38. In Syria. h

29. *hastatum*, fol. subhastato-lanceolatis: auriculis rotundatis, flor. fasciculatis subsessilibus. Hab. in Africa.

30. *angustifolium*, caul. volubili, fol. linearibus angustis, umbellis longe pedunculatis. Hab. ad littora maris in Carolina. Michaux, fl. Ex Herb. Rich.

† *GONOLOBIUM*. Cor. rotata, 5-partita. Appendix (nectar. L.) brevissima, inclusa. Stylus discoideo-5-gonus. *Folliculi* ut plurimum costati sen angulati.

31. *macrophyllum*, sarmentis petiolisque hirtis, fol. amplis abrupte acuminatis pubescentib., cor. lacin. oblongo-ovalibus obtusis. Michaux, Flor. 1. p. 119. sub *Gonolobo*. Vincetoxicum gonocarpos. Walt. Hab. in Carolinae sylvis.

32. *hirsutum*, sarm. petiolisque hirsutissimis, fol. sensim acuminatis utrinque pubescentib., cor. lacin. oblongo-ovalibus obtusis. Michaux, l. c. Vincet. acanthocarpos. Walt. Cum priore. Follic. oblongi sparsim muricati.

33. *lave*, sarment. glabriusculis, fol. subconoido-cordatis, folliculis laevibus. Michaux, l. c. sub *Gonolobo*. Hab. in ductuosis ripariis flum. Mississippi.

34. *obtusifolium*, fol. cordatis suborbiculatis subtomentosis mollioribus. Hab. Ex herbario Rich.

35. *planiflorum*, caul. volubili, fol. cordatis glabris subtus tomentosis, pedunc. subracemosis. L. Jacq. amer. ed. pict. t. 81. Hab. in Carthagen. Amer. Flor. virentes. J.

36? *album*, caule volubili, fol. oppositis ovato-acutis inferne albis umbel. solitariis multifloris. Cav. ic. 4. p. 5. t. 310. sub *Asclep*. In Peru. Cor. rotata, sordide alba. Cornic. clausi, candidi. C.

†† *VINCETOXICUM*. Cor. erecta. *Nectarium squamulos*. *s. callas* 5, *carnosas retusus* *sistens*.

37. *Vincetoxicum* (vulgare), caule erecto, fol. ovatis acuminatis margine tenuissime ciliatis. Willd. Sp. p. 1268. sub *Asclepias*. Flor. Jan. t. 839. Vincetoxicum officinale. Moench, method. p. 717. Hab. in montosis calcareis et in sylvaticis. T.

38. *nigrum*, caul. superne subvolubili, fol. ovatis basi barbatis. Lin. sub *Asclep*. Hab. in Italiae et Galliae meridionalis collibus. Cor. nigrescens. T.

Obs. Ob appendices uniformes solidas duae hae species cum *Cyananthis* majorem affinitatem habent, quin *Ascepedialibus*; an potius distinctum efficiunt genus?

625. *APOCYNUM*. Cor. carn. pannulata. *Filamenta* 5, cum staminibus alterna. *Styl.* subnullus. *Stigma* latum. *Folliculi* longi, lineares.

1. *filiforme*, caule decumbente herbaceo hirtio, foliis lineari-filiformibus, floribus umbellatis. Thunb. prod. 47. Willd. 2. p. 1259. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *hastatum*, caule decumbente herbaceo, fol. hastatis. Thunb. l. c. A. minutum. Lin. suppl. 169. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. filiform. Umb. simplex subsexflora. T.

3. *androsæmifolium*, caule rectiusculo herbaceo, fol. ovatis utrinque glabris, cymis terminalibus glabris. L. Dodl. mem. 59. t. 59. Moris. s. 15. t. 3. f. 16. Hab. in Virginia, Canada. Flor. rosci, muscipalae. T.

4. *cannabinum*, caule rect. herbaceo, fol. oblongis subtus tomentosis, cymis lateralibus folio longioribus. Ait. Kew. 1. p. 307. Michaux, Flor. 1. p. 122. Moris. s. 15. t. 3. f. 14. Hab. in Canada, Virginia. Cor. pallescente-virides. Fol. in culta magis glabra. T.

5. *hypericifolium*, caule erectiusculo herbaceo, fol. oblongis cordatis glabris, cymis folio brevioribus. Aiton. p. 304. Jacq. hort. 3. p. 37. t. 66. Hab. in America boreali. T.

6. *venetum*, caule erectiusculo herbaceo, fol. elliptico-lanceolatis mucronatis, margine denticulato-scabris. Willd. Hab. in Adriatici maris insulis. T.

7. *paniculatum*, caule frutescente volubili, fol. ovato-lanceolatis acutis glabris, floribus terminalibus et axillaribus paniculatis. Lam. encyclop. 1. p. 212. A. Acouci. Aubl. guj. 1. p. 174. t. 107. Hab. in pratis Sinemariensibus Gujanae. h

8. *umbellatum*, caule volubili frutescente, fol. ovatis acuminatis subtus tomentosis, cyma terminali. Willd. Flor. purpurascens. Aubl. guj. 1. p. 275. t. 106. Hab. in Cajenna. h

9. *tiliaefolium*, caul. volubili subfruticoso, fol. cordato-subrotundis acuminatis longe petiolatis. Lam. enc. 1. p. 214. Rheed. g. t. 15. Rumph. 5. t. 175. f. 2? Hab. in India. Sonnerat. Flor. magni in fasciculo umbelliformi axillari.

10. *cotinifolium*, fol. rotundatis obtusis petiolatis viridibus, flor. parvis corymbos. terminalibus. Lam. l. c. p. 215. Hab. in ins. Java.

11. *reticulatum*, caule volubili perenni, fol. ovatis venosis. Rumph. 5. t. 40. Hab. in India. h

12. *cordatum*, caule volubili hirtio, fol. ovatis subius villosis. Thunb. prod. 47. Hab. ad Cap. b. spei. h

13. *lanceolatum*, caule volubili herbaceo striato glabro, fol. lanceolatis, umbellula triflora. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *triflorum*, caule volubili herbaceo piloso, fol. lanceolatis, umbellis lateralibus subtrifloris. Thunb. Lin. suppl. 169. Hab. ad Cap. b. spei.

15. *lineare*, caule volubili, herbaceo glabro, fol. linearibus lanceolatis, floribus paniculatis. Thunb. A. fol. linearibus planis, umb. axillaribus compositis. Lin. suppl. 169. Hab. ad Cap. b. spei.

+ *QUIRIVELA*. Caps. ovalis, cal. tecta, 1-locularis, 5-valvis. Sem. ... ? Flor. ... ?

16. *frutescens*, caule erecto frutescente, fol. lanceolato-ovalibus, cor. acutis, fauce villosis. Lin. Willd. 2. p. 1260. Flor. Zeyl. t. 12. f. 1. *Quirivela zeylanica*, fol. ovato-lanceolatis subacuminatis, flor. racemosis axillaribus. Poir. in Enc. bot. vol. 6. (ined.) p. 24. Lam. enc. 1. p. 115. Kirwacl Zeylonensium. Hab. in Zeylona.

Obs. Hanc plantam non hujus generis, nec ejusdem familiae esse dicitur. In vivis aut melioribus specimenibus hinc ulterius examinari debet.

626. *ASCLEPIAS*. Contorta. Cor. rotata, (saepius) reflexa. Nect. 5. ovata, concava, cor. necticulum exserentia. Anth. corneae longitudinaliter dehiscentes.

\* *Foliis nullis.*

1. *aphylla*, caul. aphylo. Thunb. prod. 47. Willd. Sp. 2. p. 1262. Hab. ad Cap. b. spei.

\*\* *Foliis oppositis planis.*

2. *undulata*, fol. sessilibus oblongis lanceolatis, undulatis glabris, petalis ciliatis. Sp. pl. 312. Comm. rar. 16. t. 16. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *crispa*, fol. cor. lato-lanceolatis undulatis scabris oppositis, umb. terminali. Lin. suppl. 170. A. undulata, fol. revolutorepandis pilosis. Syst. veg. p. 214. Comm. par. 17. t. 17. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. purpurei. h

4. *pubescens*, fol. ovatis venosis nudis,

caule fruticoso pedunculisque villosis. L. Moris. 3. s. 15. t. 3. f. 35. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. purpurascens. h

5. *mucronata*, fol. oblongis mucronatis glabris, umbellis axillaribus. Thunb. prod. 47. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *procera*, fol. obovato-oblongis, petiolis brevissimis, cor. subcampanulatis. Ait. Kew. 1. p. 305. A. gigantea. Jacq. obs. 3. p. 17. t. 69. Houttuyn. 5. t. 44. Hab. in Persia. h

7. *gigantea*, fol. obovato-oblongis, petiolis brevissimis, lacinis cor. reflexis involutis. Ait. Kew. 1. p. 305. Rheed. 2. t. 37. Seb. thes. 1. t. 26. f. 7. Hab. in India orientali. Valde venenata. Nectaria laminas solidas conniventes sistit. Cor. albo-rubroque variegata. h

8. *grandiflora*, fol. petiolatis oblongis pilosis, caule simplici hirtio erecto, flor. axillaribus pedunculatis. Lin. suppl. 170. Habit. ad Cap. b. spei. Umb. nulla. Flos colore Fritill. Meleagridis sessellato. L.

9. *carnosa*, fol. ovatis carnosissimis glaberrimis. Lin. suppl. 170. Hab. in China. +

10. *syriaca*, fol. ovalibus subius tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nutantibus. L. Blackw. t. 521. Hab. in Virginia, circa Astracam. Planta utilissima. Sem. coma pro serico et caules lini adinstar praeparari possunt.

β. *illinoensis*, caule simpl., fol. lanceolato-oblongis sensim acutis subius tomentosis, umbel. subnutantibus tomentosis. A. *syriaca*. β. Michaux. Flor. 1. p. 115. In pratis Illinoensibus.

11. *obtusifolia*, foliis amplexicaulibus oblongis rotundato-obtusis undatis, umbel. terminali longius pedunculata glabra, corniculis exsertis. Michaux. l. c. Hab. a Virginia ad Carolinam.

12. *hybrida*, caul. simplicissimo subto mentoso, fol. petiolatis ovalibus puberulis, umbel. aphyllis terminalibus. Michaux. A. variegata. Walt. Hab. in Carolina. Cor. purpurascens: limbo albente.

13. *amplexicaulis*, tota glauca, caul. decumbentibus simplicibus, fol. cordatis amplexicaulibus, corniculis delitescens. compresso-ligulatis. Michaux. p. 116. Hab. in pascuis aridis subulosis in Georgia. Fol. purpureo-venosa. Umb. e summis axillis et terminales.

14. *humistrata*, fol. sessilibus cordatis

oppositis, caul. prostrato, umbel. axillari-  
ribus. Walt. Flor. carol. p. 105. Hab. in  
Carolina.

15. *amoena*, fol. ovatis subtus pilosius-  
culis, caule simplici bilariam puberulo,  
umbellis nectarisque erectis. L. Michaux.  
Flor. p. 118. In America septentrionali.  
Hab. tus prioris. Petal. purpurea, append.  
longis roscis. M.

16. *purpurascens*, foliis ovatis subtus  
villosis, caule simplici, umbellis erectis,  
nectar is resupinatis. Dill. elth. 32. t. 28.  
f. 31. Hab. in Carolina. Affinis *A. syriacae*,  
uti sequens. ¶

17. *variegata*, fol. ovatis rugosis nudis,  
caule simplici, umbellis subsessilibus: pe-  
dicellis tomentosis. L. Pluck. alm. 34. t. 77.  
f. 1. Hab. in Amer. boreali. ¶

18. *curassavica*, fol. lanceolatis petio-  
latis glabris nitidis, caule simplici, umb.  
erectis solitariis lateralibus. Mill. Swartz.  
obs. 106. Sloan. hist. 2. t. 129. Dill. elth. 34.  
t. 30. f. 33. Hab. in Curassao. Flor. aurantii,  
pulchri. Folliculi ad latera denticulati. ¶

19. *nivea*, fol. ovato-lanceolatis gla-  
briusculis, caule simplici, umb. erectis  
lateralibus solitariis. L. Dill. elth. 33. t. 29.  
f. 42. Plum. sp. 2. ic. 30. Hab. in Virginia  
et America calidiore. Cor. viridis nectar.  
*nivea*. Folliculi edentuli. ¶

20. *lanifera*, fol. planis lineari-lan-  
ceolatis, caule fruticoso, umbellis laterali-  
bus solitariis, cor. lirsutis. Vahl. symb. 1.  
p. 23. t. 7. Hab. in Arabia felici. ¶

21. *parviflora*, fol. lanceolatis acum-  
inatis glabris oppositis basi attenuatis, caule  
suffruto erecto, umbellis lateralibus so-  
litariis. Ait. Kew. t. p. 307. Hab. in Car-  
olina, Florida. ¶

22. *incarnata*, caule erecto superne  
ramoso tomentoso, fol. lanceolatis utrinque  
subtomentosis lanuginosis, umbel. pluribus,  
origine geminis, cornic. exsertis. Michaux.  
p. 115. Jacq. hort. t. 107. Hab. in Canada,  
Virginia, in pratis humidis Illinoensibus.

Obs. Culta, dicit Michaux, l. c., omnibus  
partibus minor, multo magis pubescit, et  
Willdenow. l. c. p. 1267. fol. determinat  
*glabra*.

β. *pulchra*, fol. lanceolatis subtus pu-  
bescentibus, caul. superne diviso, umbellis  
erectis geminis. Willd. p. 1267. Hab. in  
America boreali. ¶

23. *debilis*, glaberrima, caule debili  
erecto simplici, fol. petiolatis ovali-lan-

ceolatis utrinque acutis membranaceis, pe-  
dicel. capillaribus. Michaux. p. 116. Hab.  
in Carol. aquosis umbrosis. Flor. albi.

24. *citrifolia*, fol. ovatis undulatis sub-  
tus discoloribus pubescentibus, umb. termi-  
nali, caul. erecto simplici. Willd. Jacq. ic. 2.  
t. 343. Collect. 2. p. 290. Hab. in Amer. ¶

25. *decumbens*, fol. villosis, caule de-  
cumbente. L. Gron. virg. p. 27. Hab. in  
Virginia. ¶

26. *lactifera*, fol. ovatis, caule erecto,  
umb. prolifris brevissimis. L. Hab. in  
Zeylona. Succ. instar lactis inservit. Burm. ¶

27. *volubilis*, arborea volubilis, fol. op-  
positis planis ovatis integerrimis acuminatis  
umbellis erectis. Linn. suppl. 170. Hab. in  
Zeylona. ¶

28. *alexicaca*, caule volubili, fol. in-  
ferioribus cordatis, superioribus ovatis,  
umbellis sessilibus. Jacq. Collect. 2. p. 101.  
Rheed. p. t. 13. Hab. in Zeylona. ¶

29. *viminalis*, caule suffrutescente volu-  
bili filiformi, fol. oppositis lanceolatis gla-  
bris, umb. lateralibus multifloris. Swartz.  
Fl. ind. occid. 1. p. 519. Sloan. jam. 89.  
hist. 1. p. 207. t. 131. f. 1. Hab. in Ja-  
maicae austr. lis fruticetis sabulosis juxta  
rivos. ¶

30. *laurifolia*, caule erecto, fol. sub-  
sessilibus ovali-lanceolatis sensim angustatis  
acutissimis glabris margine asperiusculis.  
Michaux. p. 117. Hab. in Georg. ad amnem  
Althamiae. Cor. subtus viridescens, supra  
cum appendiculis purpurea. Affinis *A.  
amoenae*. L. et var. sequentis? M.

31. *paupercula*, caul. erectiusculo glabro  
oligophyllo, sursum nudo, fol. linearib.  
longissimis, umb. terminalib. paucifloris.  
Michaux. p. 118. *A. lanceolata* Walt. ? In  
Carol. infer. herbis humidis. Cor. rubella,  
append. lutea.

32. *graminea*, fol. linearib. gramineis  
op. ositis, caul. ramoso, umbel. terminalib.,  
cornicul. erectis mucronatis. Lam. enc. 1.  
p. 283. In India. Caul. tenuis, subangularis.

### \*\*\* Foliis lateralibus revolutis.

33. *arborescens*, fol. revolutis ovatis,  
caule fruticoso subvillosa. Burm. afr. 31.  
t. 13. Hab. in Cap. b. spei montibus. Cor.  
albae. ¶

34. *fruticosa*, fol. revolutis lineari-  
lanceolatis, caule fruticoso. Lin. Herm.  
Mill. dict. t. 35. Pluck. alm. 36 t. 138.  
f. 2. β. *crassifolia*. L. Syst. Veg. p. 214.  
Hab. ad Cap. b. spei. Nect. compressa absque

ungue, ejus loco auriculæ duæ, longiores, reflexæ. L. h

35. *sibirica*, fol. revolutis linearilanceolatis oppositis ternatisque, caule decumbente. Gmel. sib. 4. p. 77. n. 21. Murr. comment. goetting. 1779. p. 23. t. 7. Hab. in Sibiria. Var. fol. alternis, linnis et ternis. T

36. *davurica*, fol. linearibus subulatis piloso-ciliatis oppositis, umb. pedunculatis axillaribus, calycib. pilosis. Willd. p. 1272. Hab. in Davuria. Distincta fol. brevioribus, flor. umbellatis fere magnitudine A. syriacæ. W. T

37. *setosa*, fol. linearibus revolutis oppositis, caule fruticoso. Vahl. symb. 1. p. 23. t. 8. A. setosa. Forsk. Hab. in Arabia felici. h

38. *filiformis*, caule erecto, fol. filiformibus, umb. lateralibus elongato-pedunculatis. Lin. suppl. p. 169. Thunb. prod. 47. Hab. ad Cap. L. spei.

Obs. Ascl. filiformis, Apoc. filiforme, et Cyn. filiforme ut simillima inter se diversa floribus.

39. *verticillata*, fol. revolutis linearibus verticillatis, caule erecto. L. Pluck. mant. 17. t. 336. f. 4. Hab. in Virginia. Pedunc. oppositifolii. Flor. albi.

40. *mexicana*, fol. revolutis linearilanceolatis senis, caule erecto. Willd. p. 1273. A. fol. verticillatis senis lanceolatis. Cav. ic. 1. p. 42. t. 58. Hab. in Mexico. C

\*\*\*\* *Foliis alternis.*

41. *longifolia*, caule decumbente foliisque sparsis prælongo-linearibus puberulis. Michaux. p. 116. Var. fol. subverticillatim approximatis. In Georg. occidentalis sylv. Append. corollæ genicatis. Brevior et corniculo orbata. M.

42. *Linaria*, fol. sparsis subulatis canaliculatis, umb. lateralibus multifloris. Cav. ic. 1. p. 42. t. 57. Hab. . . . T

43. *rubra*, fol. alternis ovatis, umb. ex eodem pedunculo communi pluribus. L. Sp. pl. Gron. virg. 27. Hab. in Virginia.

44. *tuberosa*, foliis alternis lanceolatis hirtis, caule divaricato piloso. L. Michaux. Flor. 1. p. 117. (qui fol. dicit sparsa.) Herm. lugdb. 646. t. 647. Dill. elth. 35. t. 30. f. 34. Hab. in Amer. boreali. T

45. *floridana*, fol. alternis lanceolato-linearibus, subus pubescentib. umbel. terminalibus, caule simplice piloso. Lam.

enc. 1. p. 284. Pluck. Amalib. 18. t. 359. f. 47. Hab. in Florida. †

627. *CEROPEGIA*. Contorta. *Folliculi 2 erecti. Sem. plumosa. Cor. urceolata limbus connivens.*

1. *Candelabrum*, fol. ovatis mucronatis, umbelli pendulis, floribus erectis. Willd. Sp. 2. p. 1275. Rheed. g. t. 16. Hab. in Malabar. T

2. *tuberosa*, fol. ovatis acutis, umbel. erectis, radice repente tuberosa. Willd. Roxb. corom. 1. p. 12. t. 9. Hab. in Indiae locis incultis. T

3. *bulbosa*, fol. obovato-ellipticis cuspidatis, umbellis erectis, radice bulbosa. Willd. l. c. Roxb. 1. p. 11. t. 7. Hab. in siccis nemorosis Indiae. T

4. *biflora*, fol. ovatis, pedunc. bifloris. Willd. Lin. Fl. zeyl. 110. Hab. in Zeylona. Flor. recte extensi. T

5. *juncea*, fol. lanceolatis sessilibus, pedunc. subbifloris, caule carnoso. Willd. Roxb. 1. p. 12. t. 10. In Indiae siccis incultis. Flor. maximi albo-virescentes striis purpureis pulchre variegati. W. T

6. *acuminata*, fol. lanceolatis longe acuminatis, umb. multifloris rectis, radice bulbosa. Willd. p. 1276. Roxb. 1. p. 12. t. 8. Hab. in Indiae nemorosis siccis. T

7. *sagittata*, umb. subsessilibus, fol. sagittatis. L. Mont. 215. Lam. ill. t. 179. f. 1. Hab. in Cap. b. spei arenosis. Cor. coccinea subcylindrica basi minus ventricosa. T

8. *tenuifolia*, flor. umbellatis, fol. linearibus integerrimis. Thunb. prod. 37. Lam. l. c. f. a. Pluck. mant. 17. t. 335. f. 5. Hab. in Cap. b. spei duris. Apud Willd. Sp. 2. p. 1276. male *tenuiflora* nuncupata.

628. *STAPELIA*. Contorta. *Cor. rotata. Nect. duplici stellula tegente genitalia. Folliculi 2. Sem. plumosa.*

\* *Cor. quinquefida, laciniis margine pilosis.*

1. *ciliata*, denticulis ramorum potentibus pedunculatis, corollis supra papillosis margine ciliatis, laciniis ovatis acutis planis. Masson. Stap. p. g. n°. 1. t. 1. Hab. in locis siccissimis Cap. b. spei (ubi omnes species cresunt) infra Bockland Berg. Cor. flavescens. Willd. Sp. pl. 2. p. 1277. 299. h

2. *revoluta*, ramis tetragonis erectis denticulatis, dentibus patentibus, cor. glabra, laciniis ciliatis acutis revolutis. Mass. p. 12. n°. 10. t. 10. Cum priore. Denticuli caulibus recti. Cor. paulo minor pallide violacea. h

3. *hirsuta*, caule aphylo tetragono, denticulis erectis, flore pedunculato, cor. hirsuta. Thunb. procl. 46. Jacq. misc. t. p. 28. t. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. flavescens striis transversalibus atro-violaceis, laciniis apice et margine violaceis. W. h

4. *sororia*, ramulis divaricatis quadrangularibus, angulis denticatis, dentibus remotis acutis incurvatis, cor. unicolori quinquefida, laciniis lanceolatis planis, villosis, margine ciliatis. Mass. p. 23. n°. 39. t. 39. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. nantes, cor. unicolores. h

5. *grandiflora*, ramis quadrangularibus clavatis, angulis denticatis, dentibus remotis incurvatis, cor. magna plana quinquefida, laciniis lanceolatis acutis margine ciliatis. Mass. p. 13. n°. 11. t. 11. Hab. in locis calidis ad Sontags Rivier. h

6. *ambigua*, ramis erectis quadrangularibus clavatis, angulis denticatis remotis incurvatis, cor. magna plana quinquefida, laciniis lanceolatis hispidis, margine ciliatis. Mass. p. 13. n°. 12. t. 12. Hab. in desertis aridis Cap. b. spei. Distincta pedunculis multiflor. Cor. hispida rufa-purpurea, striis transversalibus atro-violaceis variegata. h

7. *pulvinata*, ramis ramulisque tetragonis reclinatis denticatis, cor. quinquefida plana, medio villosa, laciniis patentissimis rugosis acuminatis ciliatis. Mass. p. 13. n°. 13. t. 13. Hab. prope Camies Berg inter frutices. Cor. magna fundo elevato rufa valde villosa. Nect. atro-violacea.

8. *Asterias*, ramis pluribus erectis tetragonis denticatis, dentibus brevibus erectis, cor. magna quinquefida, laciniis lanceolatis margine revolutis ciliatis. Mass. p. 14. n°. 14. t. 14. Hab. ad Cap. b. spei in Karro. Nectaria albidia h

9. *gemmiflora*, ramis pluribus erectis tetragonis denticatis, dentibus suberectis acutis, cor. plana scabra quinquefida, laciniis ovato-lanceolatis, margine ciliatis. Mass. p. 14. n°. 15. t. 15. Hab. in locis aridis inter frutices, ultra Platte-Kloof. Var. cor. punctis aureis sparsis. Ab omnibus satis distincta: laciniis cor. superne 5-nerviis et cor. externe flava purpureo-maculata. h

10. *divaricata*, ramis pluribus tetragonis divaricatis glabris denticatis, dentibus

parvis suberectis, cor. glaberrima quinquefida, laciniis lanceolatis patentibus, margine revolutis ciliatis. Mass. p. 17. n°. 22. t. 22. Cor. Boraginis rubrocarnea. Nectaria aurantiaca. h

11. *rufa*, ramis ramulisque erectis tetragonis anguste denticatis, dentibus erectis, cor. quinquefida, laciniis triangularibus acutis rugosis, margine ciliatis. Mass. p. 16. n°. 20. t. 20. In locis calidis ultra Platte-Kloof. Cor. magnitudine floris Periplocæ græcæ. h

12. *acuminata*, ramis pluribus, suberectis tetragonis denticatis, cor. quinquefida plana glabra rugosa, laciniis caudato-acuminatis margine ciliatis. Mass. 17. t. 17. Hab. in Namaqualand. Cor. laciniis cuspidatis cineris, striis atro-purpureis undulatis apice atro-purpureis, margine albo-ciliato. W. h

13. *reclinata*, ramis pluribus tetragonis reclinatis denticatis, dentibus acutis patentibus, cor. quinquefida recurvata, laciniis patentibus replicatis fimbriatis. Mass. p. 19. n°. 28. t. 28. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. parva, atro-purpurea. Nect. flava. h

14. *elegans*, ramis pluribus confertis oblongis denticatis, dentibus patentibus acutis, cor. quinquefida, laciniis triangularibus hispidis, margine fimbriatis. Mass. p. 19. n°. 27. t. 27. Hab. ad Cap. b. spei in Karro. Cor. atro-violacea, fundo pentagono rufescente. Nect. flava. W. h

15. *caespitosa*, ramis confertis procumb. tetragonis denticatis, dentibus acutis patentibus, cor. quinquefida recurvata, laciniis patentibus replicatis ciliatis. Mass. p. 20. n°. 29. t. 29. Cum. priore sub fruticibus. Cor. atro-purpurea, fundo circulari virescente. h

16. *arida*, ramis pluribus erectis tetragonis denticatis, dentibus patentibus acutis, flor. solitariis pedunculatis, cor. laciniis planis setaceis. Mass. p. 21. n°. 33. t. 33. Hab. in desertis siccis Kannaland. Cor. parva pallide flava, laciniis basi punctatis, fundo circulari flavo. Nect. albidia. h

17. *parviflora*, ramis tetragonis denticatis recurvatis, cor. parva, laciniis angustis planis patentibus margine ciliatis. Mass. p. 22. n°. 35. t. 35. In Namaqualand sub fruticibus. Cor. minima hujus generis, flavo-virescente, fusco-punctata. Nect. aurantiaca. h

18. *subulata*, cor. quinquefida nutantibus, laciniis oblongis acuminato-cuspidatis pilosis, pilis secundis, ramis tetragonis atte-

nuatis nutantibus sub apice floriferis. Willd. p. 1283. Forsk. Cat. pl. Arab. p. 108. n°. 193. tab. 7. Hab. in Arabia felici. h

19. *concinna*, ramis ramuli que erectis tetragonis glaberrimis, angulis dentatis, dentibus erectis, cor. quinquefida plana hispida. Mass. p. 15. n°. 18. t. 18. Hab. in Karro. Cor. cinerea, striis undulatis fuscis setisque candilis, fundo fusco distincta. h

20. *glandulifera*, ramis pluribus subrectis tetragonis, angulis dentatis, dentibus erectis acutis, cor. plana glandulis setaceis clavatis tecta, laciniis ovato-lanceolatis acutis patentibus. Mass. p. 16. n°. 19. t. 19. Hab. circa Nord Olifants Rivier. Cor. sulphurea, pilis albis tecta. Nect. aurantiaca et nigra. h

\*\* *Cor. quinquefidis, laciniis margine glabris.*

21. *pedunculata*, ramis pluribus divaricatis tetragonis subdentatis, pedunc. longissimis, cor. quinquefida, laciniis lanceolatis margine revolutis, angulis fimbriatis. Mass. p. 17. n°. 21. t. 21. Hab. in regionibus aridis Camies Berg. Cor. brunneo-purpurascens, variat colore lutescente. h

22. *aperta*, ramis pluribus divaricatis tetragonis dentatis, dentibus obtusissimis, pedunc. longiusculis, corolla quinquefida plana, laciniis ovatis obtusis rugosis. Mass. p. 23. n°. 37. t. 37. Habit. in Namaqualand prope Kock-Fontain. Similis precedenti, pedunculo et ramis, sed flore distinctissima. Cor. purpurascens, lituris obscurioribus rugosis. Fundus cinerascens nigro-punctatus. h

23. *Gordonii*, ramis ramulisque teretibus tuberculatis, tuberculis spinosis, pedunc. solitariis, cor. magna decemfida. Mass. p. 24. n°. 40. t. 40. Habit. in Groot Namaqualand versus Orange Rivier. Cor. inter maximas hujus generis diametro fere triunciali, plana rotata fusco-flavescens, centro albicante. Nect. nigra. An hujus generis? h

24. *pilifera*, ramis pluribus teretibus sulcatis tuberculatis piliferis, flor. sessilibus solitariis. Mass. 17. n°. 23. t. 23. Lin. suppl. 171. Hab. in Cap. desertis, collibus aridissimis. Cor. atro-purpurea circulo rubro in medio. Comeditur ab Hottentottis, quibus audit Guasap. Mass. l. c. h

25. *caudata*, caule folioso, fol. lineariblongis, flore pedunculato, laciniis cor. linearibus. Thunb. prod. 46. Hab. ad Cap. b. spei. h

26. *articulata*, articulis ramorum oblongis teretibus reticulatis obsolete verru-

cosis, spinulis minutis, flor. subsessilibus cor. supra papillois, laciniis triangularibus. Ait. Kew. 1. p. 310. Mass. p. 20. n. 30. t. 30. Edulis cor. atra. Rami spicae femineae Zeae Mays haud absimiles sunt. Sequenti affinis. h

27. *mammillaris*, cor. quinquefidis glabris, laciniis lanceolatis, pedunc. cor. brevioribus, ramis mediis floriferis erectis hexagonis tuberculatis, tuberculis spinosis. Willd. p. 1287. L. Mant. p. 216. Thunb. prod. 46. Burm. afr. 27. t. 11. †

28. *pruinosa*, ramis tetragonis dentatis, dentibus recurvatis, laciniis cor. planis ovatis pilosis. Mass. p. 24. n°. 41. t. 41. Hab. in regionibus siccis Namaqualand inter fructices. h

29. *ramosa*, ramis pluribus erectis tetragonis dentatis, dentibus obtusissimis, flor. aggregatis subsessilibus, cor. laciniis lanceolatis acutis replicatis. Mass. p. 21. n°. 32. t. 32. Hab. in regionibus Karro, circa aquas thermales. Cor. atro-purpurea, fundo circulari albidot. Flor. proveniunt in callis extra dentes. h

30. *pulla*, subhexagona erecta, aculeis patentissimis, floribus sessilibus aggregatis, cor. laciniis lanceolatis, supra holosericeis replicatis. Ait. Kew. 1. p. 310. Mass. n°. 31. t. 31. S. fasciculata. Thunb. ? Hab. in locis calidis arenosis Karro. Flor. extra dentes quidem nec callo insident. W. h

31. *adscendens*, cor. quinquefidis glabris, laciniis linearibus margine reflexis acutis, pedunc. cor. brevioribus, caule tetragono adscendente apice florifero. Willd. Roxb. corom. 1. p. 28. t. 30. Hab. in arenosis siccis Indiae orientalis. h

32. *quadrangula*, cor. quinquefidis, flor. sessilibus, caule tetragono, ramis divaricatis apice floriferis, dentibus truncatis. Willd. Forsk. descr. 52. t. 6. Hab. in Arabia felici, et circa Mogadore in Barbaria. Schousb. Flor. conferti parvi terminales viridiflorescentes. Succus non lacteus sed aqueus. h

33. *incarnata*, ramis erectis tetragonis dentatis, dentibus patentibus acutis, flor. subsessilibus, cor. laciniis lanceolatis planis. Mass. p. 22. n°. 34. t. 34. Lin. suppl. 171. S. caule aphylo tetragono, denticulis patentibus, flore sessili, laciniis corollae obtusis. Thunb. prod. 46. Hab. campis siccis arenosis. Cor. incarnata, variat colore alio. Mass. Herba editur Afris. h

34. *punctata*, articulis ramorum oblongis subtetragonis dentatis, florib. fasciculatis, cor. laciniis lanceolatis acutis patentibus,

supra papillosis. Mass. p. 18. n°. 24. t. 24. Hab. in Cap. b. spei regionibus Namaqualand. Cor. laciniae albedo-incarnatae, sanguineo-punctatae. h

35. *geminata*, ramis oblongis subtetragonis dentatis, dentibus parvis, floribus geminatis, cor. lacinii lanceolatis acutis margine revolutis. Mass. p. 18. n°. 25. t. 25. Cor. aurantiaco-flava sanguineo-punctata. h

36. *decora*, articulis ramorum oblongis subtetragonis, floribus geminatis, corollarum lacinii lanceolatis acutis, supra scabrosis, margine revolutis. Mass. p. 19. n°. 26. t. 26. Cor. laciniae flavae punctis scabris atropurpureis obsitae, fundus pentagonus pallidus. h

37. *pulchella*, ramis pluribus reclinatis dentatis, dentibus acutis, floribus fasciculatis, cor. quinquefida, lacinii triangularibus acutis, centro orbiculato. Mass. p. 22. n°. 36. t. 36. Cor. flava sanguineo-punctata, lacinii apice fusciscentibus. h

38. *vetula*, ramis pluribus erectis tetragonis glabris, angulis dentatis, dentibus apice incurvatis, cor. plana glabra quinquefida, lacinii lanceolatis obtusis. Mass. p. 15. n°. 16. t. 16. Hab. in montibus ad Hex Rivier Cap. b. spei. Cor. profunde violacea, lincis transversalibus atro-violaceis, lacinii superne trinerviis. W. h

39. *verrucosa*, ramis pluribus suberectis, dentibus ramorum acutis decussatis, cor. plana verrucosa, medio parum elevati in pentagonum, genitalia ambiens, scabrum. Mass. p. 11. n°. 8. t. 8. Cor. flavescens sanguineo punctata. h

40. *irrorata*, ramis pluribus suberectis denticulatis, dentibus subpatentibus acutis decussatis, cor. plana rugosa, lacinii lanceolatis acutis. Mass. p. 12. n°. 9. t. 9. Cor. sulphurea sanguineo-maculata laciniarum apicibus purpurascens. Differt a priore defectu verrucarum et circuli pentagoni floris. h

41. *mixta*, cor. quinquefidis rugosis, lacinii ovatis acuminatis, fundo circulari elevato papilloso, pedunc. longitudine cor. ramis tetragonis adscendentibus basi floriferis. Willd. p. 1292. h

42. *variegata*, cor. quinquefidis rugosis, lacinii ovatis acutis, fundo circulari concavo rugoso, pedunculis cor. longioribus, ramis tetragonis adscendentibus basi floriferis. Willd. Jacq. misc. 1. p. 27. t. 4. Curt. mag. 26. Moris. s. 15. t. 3. f. 4. h

\*\*\* *Corolla decemdentata.*

43. *campanulata*, ramis pluribus sim-

plicibus erectis tetragonis dentatis, dentibus patentibus acutis, cor. decemfida campanulata scabra, tubo barbato. Mass. p. 11. n°. 6. t. 6. Cor. sulphurea maculis elevatis atropurbris, fundo fusciscentis, etiam externe maculata. W. h

44. *barbata*, ramis pluribus tetragonis pentagonisque confertis suberectis, dentibus ramorum acutis subpatentibus, cor. campanulata decemfida, lacinii acutis subpatentibus. Mass. p. 11. n°. 7. t. 7. Cor. campanulata, albido-flavescens, maculis elevatis atropurpureis variegata, pilisque clavatis obsita. Willd. h

45. *venusta*, ramis tetragonis pentagonisque, ramulis patentissimis divaricatis, denticulis ramorum patentibus acutis, cor. decemfida, tubo glabro ampliato in orbiculum elevatum. Mass. p. 10. n°. 3. t. 3. Cor. sulphurea, limbo rubro punctato. h

46. *guttata*, ramis pluribus tetragonis pentagonisque confertis subpatentibus, dentibus ramorum acutis patentibus, cor. decemfida lacinii acutis tubo campaniformi ampliato in orbiculum elevatum. Mass. p. 10. n°. 4. t. 4. Cor. sulphurea sanguineo-punctata. h

47. *humilis*, ramis pluribus quadri- s. quinqueangulatis patentibus, cor. orbiculata decemfida, lacinii quinque longioribus brevioribus patentibus, pedunc. solitariis. Mass. p. 10. n°. 5. t. 5. h

48. *reticulata*, ramis pentagonis denticulatis, dentibus patentibus, cor. decemangulata, tubo intus barbato ampliato in orbiculum elevatum. Mass. p. 9. n°. 2. t. 2. Hab. in cavernulis rupium versus N. Olifants Rivier. Cor. limbus atropurpureus lincis albidis reticulatus, fundus et orbiculus elevatus purpurei. W. h

49. *clavata*, caule simplici crasso clavato reticulatum obsolete verrucoso, apice fructifero. Willd. p. 1295. Patterson. itin. t. 8. † Hab. in Cap. b. spei campis arenosis. Adhuc obscura, cujus fructus tantum notus est. W. h

Obs. Differentias specificas illos Massoni ex antopsia redditae Willdenovianis praetuli, forte melius secundum regulas artis exaratis.

GENTIANEA (Gen. 629-636.) calycis sunt instructo persistente et cor. regulari, 5-partita, marcescente. Stam. cor. inserta, et ejus numero conformia (4-5). Stylus, forte in omnibus, unicus aut demum bifidus. Caps. 1-2-locularis,



2-valvis : valvis margine introflexis, semina plurima parva in valvis marginali inserta. Caulis plerisque herbaceus. Folia opposita, integra, plerisque amara. Flor. in quibusdam bracteati.

629. *SPIGELIA*. Cal. 5-partitus. Cor. infundibuliformis. Caps. didyma, 2-locularis, 4-valvis.

1. *Anthelmia*, caule herbaceo, foliis sessilibus summis 4 verticillatis. Lam. amoen. 5. t. 2. Willd. Sp. 2. p. 824. Hab. in Cajenna, Brasilia. Racemi terminales.

2. *fruticulosa*, caule fruticuloso, fol. ovatis petiolatis : summis quaternis. Lin. ill. p. 474. Hab. in Cayenna, Cal. 1-petalis.

3. *marilandica*, perennis, caule tetragono, fol. omnibus oppositis. L. Curt. mag. t. 202. Michaux. Flor. 1. p. 147. Catesb. carol. 2. t. 78. Hab. in Amer. boreali. Fol. sessilia, ovato-lanceolata. ¶

630. *OPHIORHIZA*. Cor. infundibuliformis. Germen 2-fidum. Stigmata 2. Fructus bilobus.

1. *Mungos*, fol. lanceolato-ovatis. Hab. in India orientali. ¶

2. *Mitreola*, caul. acutangulo, fol. ovatis sessilibus. Michaux. 1. p. 148. Swartz. obs. 59. t. 3. f. 2. (nec. 1.) Cynoctonum sessilifolium. Gmel. syst. Hab. in Americae agrestib. et pascuis. ©

3. *subumbellata*, caule fruticoso, fol. lanceolatis acutis, umbellis axillaribus trifidis. Forst. prod. n.º 66. Hab. in insula Otatehi. ¶

631. *LISIANTHUS*. Cor. tubo ventricoso laciniis recurvatis. Cal. campanul., carinatus. Stigma capitatum bilobum. Caps. 2-locularis, 2-sulca, 2-valvis. Sem. numerosa subimbricata, margine minimo membranaceo cincta.

1. *longifolius*, ramosus, fol. lanceolatis acutis pubescentibus, caule tereti. Willd. Sp. 2. p. 826. Brown. jam. 137. t. 9. f. 1. Hab. in Jamaicae sylvis. ¶

2. *glaucofolius*, fol. oblongis sessilibus, pedunculis elongatis unifloris. Jacq. ic. rar. 1. t. 33. Collect. 1. p. 64. Hab. ... Fol. avenia subius glauca, cor. coerulescens. ¶

3. *exaltatus*, cor. subcampanulatis 5-fidis crenatis, pedunc. longissimo terminali. Lam. ill. p. 478. Gentiana exaltata. Lin. Hab. in St. Domingo. Priori affinis.

4. *caerulescens*, fol. lanceolatis acutis glabris, caule tetragono. W. Aubl. guj. 1. p. 207. t. 82. Hab. in pratis humidis Gujanæ. ©

5. *alatus*, fol. oblongis acuminatis glabris, caule tetragono aalto. W. Aubl. p. 204. t. 80. Hab. in Cajennæ et Gujanæ locis incultis. ©

6. *Chelonoides*, glaber, fol. oppositi subconnatis oblongis, panicula terminali dichotoma racemosa. Lin. suppl. 134. Hab. in Surinami et Cajennæ altis arenosis.

7. *purpurascens*, fol. sessilibus glabris, flor. paniculatis, caule tetragono. Willd. Aubl. guj. 1. p. 201. t. 79. Lam. ill. t. 107. f. 2. Hab. in fissuris rupium Gujanæ. Cor. cernuae, incurvae. ©

8. *grandiflorus*, fol. ovatis acuminatis sessilibus, florib. paniculatis, cor. limbo undulato. Willd. L. fol. connatis ovato-oblongis acutis, flor. virescentibus. Aubl. guj. 1. p. 205. t. 81. Hab. in humidis Gujanæ, Cajennæ. ©

9. *exsertus*, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. trichotomis, genitalibus longissimis. Swartz. Fl. ind. occ. 1. p. 346. Hab. in jugis montium caeruleorum Jamaicae. ¶

10. *frigidus*, fol. ovatis acuminatis, panicula terminali trichotoma, cor. ventricosis, laciniis subrotundis Swartz. l. c. Hab. in regione muscosa monte la Soufrière ins. Dominicae. Diversus a L. alato, quod flores erecti nec penduli et folia petiolata nec sessilia. S. ¶

11. *latifolius*, foliis lanceolato-ovatis acuminatis, pedunc. trichotomis, laciniis cor. erectis, genitalibus inclusis. Swartz. Fl. ind. p. 348. Hab. in montibus altis Jamaicae. Simillimus L. exserto, diversissimus genitalibus inclusis. S. ¶

12. *umbellatus*, fol. elongatis obovatis, flor. terminalibus umbellatis, laciniis cor. brevissimis obtusis erectis. Swartz. p. 350. Hab. in alpihus Jamaicae occidentalis. ¶

13. *corymbosus*, fol. ovato-lanceolatis subpetiolatis, caule tereti striato, corymbis terminalibus. Flor. Per. 2. p. 14. t. 124. L. glaber. Smith. ic. ined. 1. p. 29. t. 29. Willd. p. 828. Hab. in Peruviae nemorib. Cor. lutea. Petioli breves, connati.

14. *calygonus*, foliis lanceolato-ovatis breviter petiolatis, caule obsolete 4-gono, pedunc. 1-floris, cal. 5-gono. Flor. Per. 1. c. t. 126. In Peruviae montib. frigidis. Cor. subringens, rosea rubra. ¶

15. *viscosus*, fol. oblongis breviter petiolatis venosissimis, caule 4-gono sulcato,

corymb. terminalib. viscosis. Flor. Peruv. l. c. t. 125. Hab. in altis locis Munna. Cor. luteo-viridis: laciniae subrotundo-cordatae.

16. *revolutus*, fol. lanceolatis petiolatis, margine revolutis, caule 4-gono striato, corymb. terminalibus. Flor. Peruv. t. 127. In Munna montib. frigidis. h

17. *cordifolius*, dichotomus, fol. cordatis, acuminatis, petiolis brevibus, flor. terminalibus quandoque geminis. Brown. Jam. 137. Lin. Mant. p. 43. In Jamaica. h

18. *acutangulus*, fol. sessilibus, inferiorib. cordatis, superiorib. ovatis, caule 4-gono, panic. dichotoma. Flor. Per. 2. p. 14. t. 122. f. a. Hab. in Panatabuarum montib., locis meridionalib. Cor. lutea subringens, tub. incurvato. ☉

19. *ovalis*, fol. ovalibus aveniis breviter petiolatis, caule tereti, pedunc. corymbosis dichotomis. Flor. Per. 2. p. 13. Hab. in Peruv. nemorib. Cor. viridi-lutea. Caps. pendulae. Caul. virgati. h

20. *carinatus*, fol. subrotundo-ovatis trinerviis sessilibus, foliolis calycinis carina sursum ampliata elatis, Lam. enc. 3. p. 658. t. 107. f. 3. Hab. in Madagascar. h

21. *trinervius*, pubescens, fol. ovatis mucronatis trinerviis, flor. laxe paniculatis terminalibus. Enc. 3. p. 630. ill. p. 476. Hab. in Madagascar. h

22. *campanulaceus*, fol. ovatis acutis petiolatis, flor. terminalib. subinaequalibus. Lam. ill. p. 476. Enc. bot. 3. p. 660. Hab. in Amer. meridionali. Cor. magna. Stam. incurva: 2 breviora? ☉

23. *parvifolius*, caule subuliformi, fol. linearibus, corymb. terminali paucifloro. Lam. ill. l. c. Cum priore. Caul. simpl. Fol. minuta, erecta. Flor. parvi, infundib.

632. *CHIRONIA*. Cal. 5-partitus, subcampanulatus. Cor. subrotata. Pistillum declinatum. Stam. tubo corollae insidentia. Antherae decem spirales. Pericarpium 4-loculare.

1. *trinervia*, herbacea, calycinis foliolis membranaceo-carinatis. L. Willd. Sp. 2. p. 1065. Burm. zeyl. 145. t. 67. Hab. in Zeylona. ☉

2. *Jasminoides*, herbacea, fol. lanceolatis, caule tetragono, calycib. subulatis. Lam. ill. p. 479. t. 108. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

3. *Lychnoides*, caule simplici, foliis lineari-lanceolatis, internodiis longioribus. Hab. ad radices montium Cap. b. spei. Cal. foliola carinata. Cor. purpurea.

4. *uniflora*, caule simplici virgato anguloso, fol. lineari-lanceolatis internodiis subbrevioribus, flor. magno terminali. Lam. enc. 2. p. Ej. ill. p. 480. t. 108. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *Melampyrisfolia*, fol. lanceolatis sessilibus lateralibus decurrentibus, cal. tubo brevior. Lam. ill. p. 479. Cum priore.

6. *nudicaulis*, herbacea, fol. oblongis obtusiusculis, caul. subdiphyllis simplicissimis unifloris, cal. dentibus setaceis. Lin. suppl. p. 151.

7. *campanulata*, herbacea, fol. sublinearibus, calycib. longitudine corollae. L. Hab. in Canada. Caul. ramis longis. Fol. lanceolato-linearibus, laevia. Flor. solitarii, purpurei. L.

8. *gracilis*, ramis laxis setaceo-elongatis 1-floris, fol. lineari-setaceis, cal. setaceo cor. subaequali. Michaux. Flor. 1. p. 146. In Carol. inferiore. Caul. debilis. Cor. rosea: lacin. obovalibus.

9. *paniculata*, erecta firma, fol. lanceolato-linearibus, panic. brachiata multiflora subfastigiata, cal. subulato cor. semibreviore. Michaux. l. c. Cum priore. Caul. lincis 4 subquadrangulus.

10. *angularis*, caule erecto marginato-4-angulo, fol. amplexicaulib., corymb. multifloro, cal. lacin. lanceolato-linearibus. Michaux. Lin. Sp. pl. Hab. in Virginia et Carol. inferioris uliginosis subulosis.

11. *linoides*, fol. linearibus glabris, caule herbaceo fastigiato ramoso. Thunb. Bryn. cent. 175. t. 90. Hab. in Capitiis b. Spei herbidis. h

12. *baccifera*, fol. lineari-lanceolatis glabris, caule fruticoso ramosissimo, fructu baccato. Thunb. prod. 35. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei. Caulis 4-gonus.

Obs. Stigm. peltatum. Bacca 1-locularis, polysperma: *Roestlinia* tetragona. Moench. Method. plant. Suppl. p. 211.

13. *frutescens*, fruticosa, fol. lanceolatis subtomentosis, calycib. campanulatis. L. Mill. dict. t. 37. Lam. ill. t. 108. f. 1.

14. *decussata*, fruticosa subtomentosa, fol. decussatis oblongis lato-linearibus, cal. globosis quinquepartitis. Vent. hort. Cels. p. 31. t. 31. Hab. ad Cap. bon. Sp. Flor. magni. Caul. et cal. magis tomentosus. Sapp. amarus. Prioris var.? h

† *Chloroideae.*

14. *calycosa*, fol. oblongo-obovalibus, flor. solitariis subseptempartitis, cal. foliaceo corollam superante. Michaux. l. c. p. 147. C. dichotoma Walter? In Carol. infer. erecta. Cor. laciniæ obovales.

15. *chloroides*, caul. subdecumbente, fol. lanceolatis/erectis, flor. 7-13-partitis, laciniis oblongis. Michaux. *Chlora* dodecandra. Lin. Willd. Sp. v. 3. p. 341. Hab. in Noveboraco et N. Caesarea.

633. *ERYTHRAEA*. *Cal.* appressus, subpentagonus, 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis: tubo longo. *Antheræ*, post anthesin, spirallyter tortæ. *Stigmata* 2 approximata; rarius simplex. *Caps.* sublinearis, 1-locularis. *Recept.* 2, extantia. (Richard. Cat. hort. med. paris.)

\* *Flor. sessilibus.*

1. *Centaurium*, foliis oblongo-ovalibus basi rosaceis congestis, caule elongato, flor. fasciculato-paniculatis, basi squamis 1-2 cinctis. Gent. Centaurium. Lin. Chironia Cent. Willd. Flor. dan. t. 617. Centaurium vulgare. Rafn. Schum. Saeland. p. 68. Lab. in sylvis. Var. flor. albis.

β. *grandiflora*, major, limbo majusculo concavo petalis latis. In pratis humidis passim. An hujus loci Centaur. Erythraea. Rafn. Schousboe?

2. *chilensis*, fol. lanceolatis, caul. dichotomo corymboso. Willd. Sp. 2. p. 1067. sub Chironia. Gent. peruviana. Lam. enc. 2. p. 642. Few. Peruv. 2. t. 35. Hab. in regn. Chilensis et Peruviae. Fol. 1-nervia. Lam. ☉

3. *conferta*, pumila stricta ramosa, fol. ovalibus obtusis, flor. sessilibus fasciculatis confertis, cal. cor. tubum ad dimidium aequante. Habit. in Hispania. Ex Herb. Richardi.

4. *spicata*, fol. lanceolato-oblongis, ramis dichotome paniculatis, flor. subcæcis, cal. bracteisque cor. subaequalibus. Chironia spicata. Willd. p. 1063. In Europae australioris pratis humidis herbosis, et in Barbaria. Stigma capitatum, integrum.

\*\* *Flor. pedicellatis.*

5. *ramosissima*, subpumila ramosissima, fol. brevioralibus, caul. geniculis aequalibus, flor. subdichotomis basi squamis desti-

tutis. Chironia Gerardi. Schmidt Flor. bohem. 1. n°. 137. Gent. palustris. Lam. Vaill. par. t. 6. f. 1.

β. *inaperta*, pumila simplex ramosaque foliosa, fol. ovatis, flor. ternis limbo connivente acuto. Hujus loci Chir. *inaperta*. Willd. Gent. pusilla. Lam. Vaill. t. 6. f. 2. Hab. in pascuis.

6. *luteola*, patule ramosa setacea, fol. linearibus angustis, cal. patulo cor. subaequali. Cum priore rarius. Pedunc. elongati solitarii. Cor. 4-fida? lutea. Anth. non tortiles?

7. *maritima*, herbacea, fol. oblongo-lanceolatis, caule dichotomo corymboso, tereti, flor. pedunculatis digynis. Chironia. Willd. Cav. ic. 3. p. 49. t. 296. f. 1. In Europae australis maritimis. Cor. lutea. β. *tingitana*, caul. compressiusculo, fol. trinerviis. Schousboe. p. 85.

8. *pyrenaica*, fol. ovato-lanceolatis erectis, cor. lacini lanceolatis. Hab. in Pyrenæis. Cor. alba. Rich.

9. *linarifolia*, cor. infundibuliformi, stylo longo simplice, fol. linearibus subuninerviis. Lam. enc. 2. p. 641. sub Gentiana. Bocc. Mas. 2. t. 43. Barrell. ic. 423. Hab. in Europa australi, Hispania etc. Rad. fusiformis. Flor. purpurasc. Lam.

634. *VOHRIA*. *Cor.* hypocrateriformis, tubo longissimo utrinque tumido, limbo 5-fido, lacini ovatis patentibus. *Antheræ* in fauce tubo subsessiles. *Stigma* simplex. *Caps.* 1-locularis bivalvis. *Sem.* numerosa, scobiformia.

1. *caerulea*, flor. geminatis, cor. laciniis rotundatis. Lam. ill. p. 431. sub Vohiria. Aubl. guj. 1. p. 21. t. 83. f. 2. Lita caerulea. Willd. Sp. p. 1071. Hab. in Gujanae sylvis. ☞

2. *rosea*, flor. geminatis, cor. laciniis acutis. Lam. t. 109. Aubl. l. c. t. 83. f. 1. Lam. ill. t. 109. L. rosea Willd. Cum priore.

5. *spathacea*, caul. multifloro, bract. subspathaceis, cor. laciniis oblongis. Lam. ill. p. 491. Hab. in Gujana.

4. *breviflora*, caul. subtrifloro, fol. membranaceis, cor. tubo cal. duplo longiore. Lam. ill. Cum priore. Richard. Caul 2-pollicaris.

5. *uniflora*, caul. subaphyllo 1-floro, cor. lacini. acutis. Lam. l. c. Gentiana.

6. *aphylla*. Jacq. amer. t. 60. f. 3. Hab. in Martinicae sylvis humilibus. Incoliti vetustarum arborum truncos cava, in quibus tractu temporis aliqua humi portio fuit collecta, quo sensu parasitica posset vocari. Jacq.

### D I G Y N I A.

635. GENTIANA. Cor. 1 - petala.

*Caps.* 2-valvis, 11-locularis, Receptaculis 2, longitudinalibus.

\* *Corollis* 5-9-fidis subcampanulatis.

1. *lutea*, fol. latis ovatis nervosis, cor. subquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. L. Mat. med. p. 75. Mill. dict. Willd. Sp. 2. p. 1327. Froelich. de Gent. p. 15. Asterias. Rœfal. spec. 63. t. 61. Hab. in alpinis et subalpinis pratis. Fol. Veratri. Rad. magna carminativa.

2. *purpurea*, cor. subquinquefidis campanulatis striato-punctatis verticillatis, cal. membranaceis spathaceis. Froel. p. 18. Andrew. t. 117. Flor. dan. t. 50. G. punctata. Villars. delph. 2. p. p. 522. Hab. in alpinis Helveticis, Sabaudis, Pyrenaeis, Delphinatus, Norvegiis. ¶

3. *pannonica*, cor. subsexfidis campanulatis punctatissimis verticillatis, cal. coriaceis truncatis. Froel. p. 21. Fol. caulibus lanceolatis acuminatis. Jacq. austr. 2. t. 136. G. punctata. Jacq. obs. 2. p. 17. t. 39. Moris. s. 12. t. 4. f. 3. In alpinis. A. sequente differt: cor. laciniis subrotundioratis nec ovatis acutiusculis. Willd.

4. *punctata*, cor. subsexfidis campanulatis punctatissimis verticillatis, cal. membranaceis truncatis. Froel. l. c. p. 24. Jacq. aust. 5. t. 28. G. purpurea. Villars. Moris. s. 12. t. 4. f. 2. Hab. in alpinis. ¶

5. *campanulata* (*immaculata*), cor. septemfidis campanulatis striatis immaculatis, cal. septemfidis. Murr. syst. 267. Jacq. aust. 5. p. 43. app. t. 29. G. alpina major, flor. flavis punctis coerentibus. Bauh. pin. 187. Hab. in alp. Carinthiae Garten, et in alpinis Aquilejensibus. ¶

6. *septemfida*, cor. campanulatis septemfidis quinquefidisque, laciniis intermediis ciliatis. Froel. p. 47. Pall. ross. 2. p. 101. t. 92. f. 1.

7. *asclepiadea*, cor. quinquefidis campanulatis oppositis axillaribus subsessilibus,

foliis amplexicaulis ovato-lanceolatis. Froel. Jacq. austr. t. 328. Lam. ill. t. 100. f. 3. G. asclepiadis folio. Bauh. pin. 187. β. *plicata*, caule 1-floro. Schmidt. Hab. in montosis Helvetiae, Austriae, Italiae, Hispaniae, etc.

8. *montana*, cor. quinquefidis campanulatis, fol. cordatis sessilibus. Forst. prod. n. 133. Hab. in Zeelandia.

9. *cruciata*, cor. quadrifidis imberbibus, flor. verticillatis sessilibus, fol. decussatis connato-vaginantibus. Jacq. aust. t. 372. Tretorrhiza. Rencalm. spec. 74. t. 73. Hab. in montosis apricis et sylvaticis. ¶

10. *macrophylla*, flor. quinquefidis sessilibus verticillatis, fol. radicalibus caulium inferne subnudum aequantibus. Froel. Gent. p. 31. Pall. ross. 2. p. 108. t. 96. G. flor. confertis terminaricibus, cor. 4-5-fidis lanceolatis, caule procumbente media parte nudo. Gmel. sib. 3. p. 104. t. 52. Hab. in Sibiria praesertim orientaliore. ¶

11. *adscendens*, cor. quinquefidis campanulatis subsessilibus axillaribus, fol. acutis: radicalibus lanceolatis elongatis. Froel. p. 43. G. decumbens. Lin. suppl. 174. Pall. ross. t. 74. Gmel. sib. t. 51. f. 4. excl. synon. In montosis apricis Sibiriae. ¶

12. *triflora*, cor. campanulatis quinquefidis aggregato-sessilibus, fol. linearibus, flor. alternis productis. Froel. p. 38. Pall. ross. t. 93. f. 1. Hab. in Sibiria orientali, in alpinis Transbaicalensibus. ¶

13. *frigida*, cor. campanulatis quinquefidis terminalibus sessilibus binatis, laciniis obtusis. fol. lineari-oblongis enerviis. Willd. p. 137. Froel. p. 39. Icon. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 13. Schmidt. in Roemer. Archiv. t. p. 144. 2. f. 2. In alpinis annuis Syriacis, Carpathicis. A sequente diversa. ¶

14. *aleida*, cor. campanulatis quinquefidis terminalibus pedunculatis subernis, laciniis acuis, fol. lanceolatis trinerviis. Willd. p. 137. Pall. ross. 2. p. 107. t. 95. Pell. itin. 3. app. n. 52. t. L. fig. 2. Hab. in alpinis ad Jeniseam, ad lacum Baical et inque Camtschatka. ¶

15. *saxosa*, cor. quinquefidis campanulatis, fol. spathulatis. Lin. suppl. 175. Forst. in Act. holm. 1777. p. 184. t. 5. Hab. in rupibus maritimis. N. Zeelandiae. ¶

16. *Pneumonanthe*, cor. 5-fidis campanulatis axillaribus pedunculis, fol. lineari-lanceolatis obtusis. Flor. dan. t. 209. Michaux. Flor. 1. p. 176. In Europae et Americae pratis humidis. Cor. speciosa. Filam. connata. ¶

17. *Saponaria*, caul. cylindrico asperiusculo, fol. ovali-lanceolatis, flor. fasciculatis sessilibus, cor. quinquefidæ lacin. cum acumine obtusis. Michaux. Flor. 1. p. 176. Catesb. car. 1. t. 70. Willd. p. 1338. In Amer. boreal. sylvarum herbosis. Habitat *G. cruciatae*. Cal. lacin. foliaceae. Cor. majusculæ plicæ internæ in lacinulam desinunt. M.

18. *puberula*, caule asperiusculo, fol. lineari-lanceolatis undulosis calycibusque ciliatis flor. sessilib. terminalib. 5-fidis. Mich. l. c. Hab. ad confluentem Riv. Ohio et Missisipi. *G. Pneumonanthe* affinis. Cor. majusculæ lacin. obtusae.

19. *angustifolia*, caule simplici gracili 2-floro, fol. angusto-linearib. patulis, cor. quinquefidæ lacin. in denticulum lacerum desinentib. Mich. p. 177. Hab. in Carol. inferior. pratis. Cor. magna.

20. *villosa*, cor. quinquefidis campanulatis ventricosis, fol. villosis. Froel. Gent. p. 36. Hab. in Virginia. Cor. extus pallida, intus lincato-varia. †

21. *ochroleuca*, cor. quinquefidis campanulatis verticillatis subpedunculatis, fol. ovato-lanceolatis trinerviis laevibus. Froel. p. 35. Pluck. alm. 186. t. 186. f. 1. Hab. in Virginiae, Carolinae locis humidis. ‡

22. *linearis*, cor. quinquefidis campanulatis obtusiusculis terminalibus congestis sessilibus, fol. linearibus acutiusculis. Froel. p. 37. In Pennsylvaniae vallibus montanis. ‡

23. *quinqueflora*, cor. quinquefidis tubuloso-campanulatis terminalibus subquinis, caule ramosissimo alato, fol. amplexicaulis. Froel. p. 51. *G. quinquefolia*. Lin. Hab. in Pennsylvania, Carolina. Statura *G. Amarellae*. ☉

24. *aurea*, cor. subquinquefidis campanulatis verticillatis, fol. ovatis, caule inferne ramoso. Froel. p. 54. *G. involucreata*. Roth. in Act. Haf. 10. p. 434. t. 1. f. 2. A. B. Flor. dan. t. 344. ☉

25. *glauca*, cor. quinquefidis campanulatis sessilibus, fol. ovatis rotundatis. Pall. ross. 2. t. 93 f. 2. Hab. in Camtschatkae alpinis et in insulis Beringii. Caul. digitatis, simplicissimus. Cor. e glauco caerulescens. W. †

\*\* *Cor. infundibuliformibus nudis decemfidis.*

26. *altaica*, cor. decemfida infundibuliformi, lacinis alternis minoribus serrulatis, caule florib. brevior. Pall. ross. 2. p. 109. t. 97. f. 1. Froel. p. 62. *G. grandiflora*. Lax-

mann. in Comment. N. Petrop. 18. p. 526. t. 6. f. 1. Hab. in Sibiriae alpinis summis Altaicis ad nives. ‡

27. *pyrenaica*, cor. decemfida infundibuliformi, caule inferne ramoso, fol. lanceolato-linearibus. Froel. p. 63. Gouan. illust. 7. t. 2. f. 2. Cresc. in Pyrenæis. ‡

\*\*\* *Cor. nudis quinquefidis.*

28. *grandiflora* (*acaulis*. L.), cor. quinquefida campanulata, caul. quadrangulum subaequantem, fol. ovato-lanceolatis trinerviis. Vill. delph. 2. p. 525. Froel. Gent. p. 57. Lam. enc. 2. p. 637. Ciminalis longiflora. Moench. meth. p. 514. Anth. connatae. Plant. culta caulescens. ‡

β. *angustifolia*, fol. oblongo-linearibus enerviis, cor. campanulata excedente. Villars. l. c. p. 526. Bar. ic. 110. *G. caulescens*. Lam. enc. 2. p. 638. Valde amara. Anth. quoque connatae.

γ. *alpina*, fol. ovoidis subcarnosis enerviis obtusis, cor. campanulata caul. elongato aequante. Vill. l. c. t. 10. Praecedentibus minor. Fol. vere rotunda. V. Cresc. cum priorib. in Alpibus, germanicis, italicis et gallicis.

29. *longiflora*, cor. subquinquefida infundibuliformi caul. longiore, fol. confertis sublinearibus. Lam. ill. p. 485. Hab. in Sibiria. Cor. 2. unc. longa.

\* *serpyllifolia*, cor. 5-fida infundibuliformi lobis subintegerrimis acutiusculis, fol. ovatis obtusis. Lam. enc. 2. p. 540. Cam. hort. t. 15. f. 1. Barrel. ic. t. 101. f. 1. Hab. in Italia.

β ? *brachiphylla*, fol. lanceolatis subrotundis brevissimis, cor. infundibuliformi. Vill. delph. 2. p. 528. Barrel. ic. 103. 2. Hab. in summis alpinis Delphinatus. Cor. azurea, dentata.

γ. *elongata*, cor. quinquefida infundibuliformi, caule elongato filiformi subnudo unifloro, cal. oblongo aequali, fol. radicalibus aggregatis. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 88. t. 17. f. 3. *G. uniflora*. Georg. it. 1. p. 203. t. 1. f. 2. Hab. in alpinis.

30. *verna*, caul. simplici pumilo, cor. quinquefida infundibuliformi caulem excedente, fol. ovatis acutiusculis radicalibus confertis majoribus. L. Cor. crenata, lacin. basi appendiculatis. Smith. Brit. 1. p. 285. Engl. bot. t. 461. Barr. ic. 109. f. 1. *G. bavarica*. Jacq. obs. 3. p. 19. t. 71. Barr. 109. f. 2. *Ericale*. Rencal. spec. 75. t. 68. f. 2.

31. *utriculosa*, multicaulis, fol. radicalib. ovatis rosaceis, cor. quinquefidis hypocrateriformibus, cal. plicato-carinatis. L. Barr. ic. 48. 122. f. 2. Hab. in Germaniae australioris, Helvetiae, Italiae et Galliae pratis montanis et subalpinis. ☉

32. *bavarica*, cor. quinquefida infundibuliformi, laciniis obtusis serratis, fol. ovatis obtusis, radicalib. confertis imbricatis, caulinis minoribus. Froel. Gent. p. 71. Villars. delph. 2. t. 10. Schmidt. in Roemer. Archiv. 1. p. 17. t. 5. f. 12. Gentianella elegantissima bavarica. Cam. hort. 65. t. 15. f. 1. Barr. ic. 101. In alpinibus.

33. *pumila*, cor. quinquefida infundibuliformi subserrata, fol. lanceolato-linearibus. Jacq. Obs. 2. p. 29. t. 46. Ej. Flor. austr. 4. t. 302. In Alpib. Una cum antecedente *G. verna* nimis affinis. ☿

34. *imbricata*, cor. quinquefida infundibuliformi caulem superante, fol. imbricatis ovatis acutis margine scabris. Froel. p. 74. Cam. hort. 1. 15. f. 2. Barr. ic. f. 2. Hab. in alpinibus Helvetiae, Carinthiae. ☿

35. *prostrata*, cor. quinquefida infundibuliformi, caul. unifloris prostratis, fol. obtusis subimbricatis. Haenke in Jacq. Coll. 2. p. 66. t. 17. f. 2. Hab. in summis alpium Salisburgensium. ☿

36. *nivalis*, caul. multifloro, cor. quinquefidis infundibuliformibus, ramis alternis unifloris, fol. caulinis lanceolatis. Froel. p. 83. Flor. dan. 17. Hall. helv. t. 17. (β. caule elongato filiformi subramoso. Froel. Barr. ic. 509. f. 2. γ. caule humili subunifloro. Barr. ic. 101. f. 2. Hab. in summis alpinibus. ☉

37. *aquatica*, cor. quinquefidis infundibuliformibus terminalibus sessilibus, fol. margine membranaceis. L. Pall. ross. 2. p. 109. t. 97. f. 2. G. humilis aquatica verna. Amm. ruth. 4. t. 1. f. 1. Hab. in Sibiria, Japonia, China ad aquas. ☉

38? *Scilloides*, caule unifloro prostrato ramoso, fol. obovatis obtusis trinerviis, cor. infundibuliformibus quinquefidis, bracteis binis. Linn. suppl. 175. Hab. in insulis Azoreis. Limbus planus imberbis luteus.

39. *Amarelloides (kentuckensis)* caul. 4-gono, fol. semi-amplexicaulib. ovalibus, flor. subternis pedicellatis, cor. (sublutea) 5-fida, lacin. lanceolatis setaeo-acuminatis. Michaux. Flor. 1. p. 175. Hab. in monticulis Kentucky, Sequentae paullo minor. Cor. obsolete lutea, munita, fauc. glabra. M.

\*\*\*\* *Cor. fauce squamis capillaceo-multifidis acutis, 4-5-fidis.*

40. *Amarella*, flor. fasciculato-s. umbellatis, cor. hypocrateriformib. 5-fidis fauce barbatis: tubo transver-im crispo, cal. lacin. aequalibus, fol. ovato-lanceolatis. Flor. dan. t. 328. Var. flor. 4-fidis. Smith. brit. 1. p. 297. Autumno frequens inylvaticis, et pascuis cal. careis. Sapor valde amara. Huc pertinet *G. germanica*. Willd.

41. *lancifolia*, cor. hypocrateriformib. 4-5-partiis barbatis acutis: laciniis lanceolatis acutis, fol. lanceolatis. Rafn. Flor. Dan. Schumacher. Flor. Saelland. p. 80. G. Amarella. Willd. p. 1347. Hippion axillare. Schmidt. Habit. in Europ. septentrionalis pratis. Aug. Sept. Cor. minor quam in priore. Rad. sava. Willd.

42. *uniflora*, cor. quinquefida hypocrateriformi barbata, laciniis ovatis acutis, fol. ovatis acutis, caule simplicissimo unifloro. Willd. Hippion Gentianella. Schmidt. l. c. p. 23. t. 3. f. 4. In pascuis humidis alpinis Sudetorum et Bavariae. ☉

43. *obtusifolia*, cor. quinquefidis hypocrateriformibus barbatis, tubo calyce subaequali brevior, fol. lanceolatis obtusis. Hippion obtusifolium. Schmidt. bohém. n°. 126. Roem. arch. 1. p. 22. t. 2. f. 3. Hab. in summis montium jugis Bavariae inque Sudetis. ☉

44. *uliginosa*, cor. subquinquefidis hypocrateriformibus acutis fauce barbatis, calycib. subaequalibus, fol. ovato-lanceolatis, caule ramoso tetragono basi subalato. Willd. p. 1347. G. Amarella. Willd. profl. Berol. n°. 293. Hab. in Marchiae Electoralis pascuis udis. ☉

45. *pratensis*, cor. subquinquefidis hypocrateriformibus obtusis fauce barbatis, cal. laciniis inaequalibus, fol. lanceolatis. Froel. Gent. p. 88. Flor. Dan. t. 328. G. campestris. Pall. ross. 2. p. 103. Hab. in Russiae, Sibiriae et Daniae pratis et humidis. ☉

46. *campestris*, cor. quadrifidis hypocrateriformibus obtusis fauce barbatis, cal. laciniis duabus maximis. Froel. p. 91. Flor. dan. t. 367. Hab. in pascuis montanis, sylvat.

47. *auriculata*, cor. quadrifidis quinquefidisque campanulatis intus villosis, cal. laciniis alternis cordatis. Pall. ross. 2. p. 102. t. 92. f. 1. In Sibiria, Camtschatka, etc. ☉

48. *tenella*, cor. quadrifidis hypocrateriformibus fauce barbatis, caule subdiotomo, pedunc. longissimis, fol. subovatis

*obtusiusculis*. Froel. p. 96. Roth. Act. Hafn. 40. p. 436. t. 2. f. 6. Flor. dan. t. 3-8. *G. tetragona*. Lam. Hab. in alpinis Norvegiae inque Islandia. Cal. laciniae subrotundo-ovatae acutae, duae majores et latiores. Willd. ☉

40. *glacialis*, cor. quadrifidis hypocrateriformibus fauce barbata, caule inferne ramoso folioso. Froel. p. 98. Villars. delph. 2. p. 53a. *G. tenella*. 'Towson Travels in Hungary. t. 14. Hippion longepedunculatum. Schmidt. l. c. p. 21. t. 3. f. 5. Hab. in summis alpinis.

50. *dichotoma*, cor. quinquefidis campanulatis fauce barbata, caule dichotomo, pedunc. longissimis, fol. subovatis acutis. Froel. p. 100. Pall. ross. 2. p. 110. Gmel. sib. 4. p. 106. t. 51. f. b. Hab. in Sibiria. ☉

51. *nana*, cor. quinquefidis campanulatis fauce barbata, caul. subdichotomis, pedunc. elongatis, fol. ovatis obtusis. Froel. p. 102. Jacq. Misc. t. p. 151. t. 10. f. 3. Hab. in summis alpinis Carinthiae et Salisburgi ☉

52. *carinthiaca*, cor. quinquefidis rotatis fauce barbata, caul. dichotomis, pedunc. longissimis, fol. ovatis obtusis. Froel. de Gent. p. 103. Swertia carinthiaca. Jacq. misc. 2. p. 53. t. 6. In alpinis Carinthiacis et Salisburgensibus. ☉

53. *sulcata*, cor. quinquefidis rotatis fauce squamosis, calycisque lacinii lanceolatis, fol. linearib. obtusis. Willd. p. 1351. Swertia sulcata. Roth. in Act. Haf. 10. p. 438. t. 1. f. 4. Flor. dan. t. 343. Hab. in Islandia. An a sequente diversa? ☉

54. *rotata*, cor. quinquefidis rotatis, fauce squamosis, lacinii ovatis, cal. lacin. oblongo-ovatis, fol. ovato-lanceolatis acutiusculis. Willd. Cor. quinquefidis rotatis, fauce squamosis, fol. lineari-lanceolatis. Froel. p. 105. Swertia rotata. Lin. Gmel. sib. 4. t. 52. f. 2. Pall. ross. t. 89. Hab. in Sibiria. ☉

\*\*\*\*\* *Cor. quadrifidis hypocrateriformibus, fauce nudis.*

55. *ciliata*, cor. quadrifidis, lacinii serratis medio inciso-ciliatis, fol. lanceolatis linearibusque, caule flexuoso angulato. Froel. p. 109. Jacq. austr. t. 113. Hab. in montibus. ☿

56. *crinita*, cor. quadrifidis, lacinii inciso-ciliatis, fol. lanceolatis acutis, caule erecto tereti. Froel. p. 112. Hab. in Amer. boreali.

57. *barbata*, cor. quadrifidis, lacinii

serrulatis medio inciso-ciliatis, fol. linearibus acuminatis, caule acutangulo stricto. Froel. p. 114. Pall. ross. 2. t. 92. f. 2. Hab. in Sibiria et in pratis alpinis Caucasi. ☿

58. *detonsa*, cor. quadrifidis, lacinii apice crenulatis, inargine utrinque bidentatis, fol. linearibus acutis caule crecto. Froel. p. 116.

636. SWERTIA. Cor. rotata. *Nectariferi* pori ad basin laciniarum corollae. *Caps.* unilocularis, 2-valvis.

\* *Corolla ecalcarata.*

1. *perennis*, cor. quinquefidis, pedunc. tetragonis subulatis, caule indiviso, fol. radicalibus ovalibus. Willd. Sp. 2. p. 1323. Jacq. austr. t. 243. Hab. in alpinis et locis montosis humilibus.

2. *difformis*, cor. quinquefidis terminali sexfida, pedunc. longissimis, fol. linearibus. L. Hab. in Virginia. Flor. albi.

3. *decumbens*, cor. quinquepartitis, fol. lineari-lanceolatis, caulibus decumbentibus. Vahl. symb. t. p. 24. Parnassia polynectaria. Forsk. descr. 207. Icon. t. 5. f. 6. Hab. in Arabia felici.

4. *dichotoma*, cor. quadrifidis, pedunc. nutantibus, fol. ellipticis, caule ramoso. Willd. Gmel. t. 53. f. 3. Pall. ross. 2. t. 91. Hab. in Sibiria. ☉

5. *tetrapelata*, cor. quadrifidis, fol. lanceolatis nervosis, caul. simplice. Pall. ross. 2. p. 99. t. 50. Hab. in Camtschatka. ☉

\*\* CERATIA. Cor. subcampanulata, basi corniculata exsertens.

6. *corniculata*, flor. quadrifidis, cor. subcampanulata, tubo decorsum quadricalcarato. Michaux. Flor. t. p. 97. Gmel. Sibir. 4. t. 53. f. 4. Pall. ross. 2. t. 50. f. 1. Hab. in Sibiriae et Canadae paludosis. Flos. flavo-virens. ☉

7. *umbellata*. cor. quadrifidis, quadricornibus, fol. lanceolato-linearibus connatis, flor. terminalib. umbellatis. Flor. Peruv. 3. p. 21. t. 242. f. b. Hab. in Andium alpinis. Cal. corollaeque lutea. ☉

CORYVOLVULACEI pentandri-digyni.  
(Gen. 637 - 643.)

637. FALKIA. Cal. subinflatus, 5-partitus, 5-angularis. Cor. campanulata, emarginato crenata (crenato-decempartita. Andr.)

*Styli* divaricati. *Stigm.* subglobosa, lanata. *Sem.* 4, globosa, arrillata, in fundo calycis. *Andrew.*

1. *repens*, fol. cordatis longe petiolatis, caul. samentoso. *Andrew.* *Repos.* t. 257, qui bene observavit hoc genus non ad *Hexandriam* pertinere, ad quam retulit *Linne*, fil., *Willd.* *Sp. tom.* 2. p. 248. *Hab.* ad *Cap. bon.* *Sp. Convolv.* exacte refert, sed fructu a convolvulaceis differre videtur.

638. *EVOLVULUS.* *Cal.* 5-phyllus.

*Cor.* rotato-campaulata: lobis subemarginatis. *Styli* 2, profunde bifidi: laciniis capillaribus divergentibus. *Stigm.* simplicia. *Caps.* 2-locularis, 4-valvis, 4-sperma. *Sem.* hina. (*Sem.* solitarium. *Lin.*) *Flor.* *Peruv.*

1. *nummularius*, fol. subrotundis, caul. repente, flor. subsessilibus. *Lin.* *Willd.* *Sp.* 2. p. 1516. *Jacq.* *amer. pict.* t. 260. f. 23. *Sloan.* *hist.* t. p. 157. t. 99. f. 2. *Hab.* in *Jamaicae* pratis. ☉

2. *villosus*, fol. oblongo-ovalibus, caul. procumbentibus, pedunc. longis bifloris. *Flor.* *Per.* 3. p. 30. t. 253. f. b. *Hab.* in *Peruv.* collib. arenosis. *Fol.* perpendicularia. *Cor.* caeruleo-violacea. ☿

3. *incanus*, fol. ovatis acutis, caul. procumbentibus, pedunculis brevibus 1-2-floris. *Flor.* *Peruv.* l. c. p. 30. t. 252. (*E. sericeus*.) Cum priore. Suffrutescens, dense sericeus. *Cor.* caerulea, extus villosa. ♀

4. *cangeticus*, fol. cordatis obtusis mucronatis petiolatis villosis, caule diffuso, pedunc. unifloris. *L. Amoen.* *acad.* 4. p. 306. n°. 121. *Hab.* in *India*.

5. *emarginatus*, fol. reniformibus repandis. *Lin.* *suppl.* p. 186. *Burm.* *ind.* 77. t. 30. f. 1. In *India* orientali. ☉

6. *alsinoides*, fol. oblongo-obovatis obtusis glabrisculis petiolatis, pedunc. trifloris. *Willd.* p. 151. *Rheed.* 11. t. 64. *Hab.* in *Malabar*ia, *Zeylona*. ☉

7. *hirsutus*, fol. ovatis sessilibus utrinque hirsutis, caul. pilosis cespitosus, pedunc. subunifloris. *Lam.* *Encyc.* 3. p. 38. *Ejusd.* *ill.* t. 216. f. 2. *Burm.* *Zeyl.* 11. t. 6. f. 1. et 1. q. f. 1. *Pluck.* *alm.* 116. t. 9. f. 1. *Hab.* in *India* orientali. ☉

8. *linifolius*, foliis lanceolatis villosis sessilibus, caule erecto, pedunc. trifloris

longis. *L. Amoen.* 4. p. 306. n°. 122. *E.* fol. lanceolatis villosis sessilibus, caul. erecto piloso, pedunc. longis submultifloris. *Lam.* l. c. p. 537. *Ej.* *ill.* t. 216. f. 1. *Brown.* *jam.* 152. t. 10. f. 2. *Hab.* in *Jamaica*. *Cor.* subbulbosa caeruleascens.

9. *sericeus*, foliis lanceolatis sessilibus subtus sericeis, pedunc. brevibus unifloris. *Swartz.* *Fl.* *ind.* *occid.* 1. p. 576. *Brown.* *jam.* t. 10. f. 3. *Hab.* in sabulosis aridis *Jamaicae*. Simillima *E. linifolio*, sed distinguitur pedunc. brevissimis unifloris. S. ☉

♂ ? *Commersoni*, flor. axillaribus subsessilibus solitariis albis, fol. parvis linearilanceolatis. *Convolvulus Commers.* *vid.* *Lam.* *enc.* 3. p. 538. In *Montevideo*.

639. *DICHONDRA.* *Cal.* 5-partitus; laciniis subspathulatis. *Cor.* brevicaempaulata, 5-partita. *Stigma* peltato-capitata. *Capr.* subcompressa, partito-didyma. 2-locularis: loculis 1-spermis. *Sem.* globosa.

1. *carolinensis*, pubescens, fol. absque emarginatura reniformibus (senior-biculis?) utrinque viridibus, cal. villosociliatis. *Michaux.* *Flor.* 1. p. 136. Dimidiata repens. *Gmel.* *Hab.* in *Carolina*. *Styl.* 1, sed profunde bipartitus. M.

2. *repens*, fol. reniformibus emarginatis subtus pubescentibus. *Willd.* *Sp.* 2. p. 1353. *Smith.* *ic.* *ined.* 1. p. 8. t. 80. *Lam.* *ill.* t. 183. *Sibthorpia* evolulacea. *Lin.* *Suppl.* p. 288. *Hab.* in *N. Grenada* et *N. Zeelandia*.

♂ ? *peruviana*. *D. repens*, caul. filiformi, repente, fol. reniformibus emarginatis, subtus nervosis sericeis. *Flor.* *Peruv.* 3. p. 22. In *Peruviae* ruderatis. *Cor.* albido-lutea. *Fruct.* dispersus, membrana tenui evalvatus. L. c.

\* *sericea*, fol. reniformibus retusis subtus sericeis. *Swartz.* *Flor.* 1. p. 556. *Willd.* p. 556. *Hab.* in *Jamaica* et in *Ins. Mauritiis*. ☿

640. *GRESSA.* *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* hypocrateriformis. *Filam.* tubo insidentia. *Cap.* supra 2-valvis, 1. s. 4-sperma, basi dehiscens.

1. *cretica*, cor. imberlibus, capsulis monospermis. *Retz.* *obs.* 4. p. 24. *Willd.* p. 1320. *Lam.* *ill.* t. 183. *Desf.* *Atl.* t. p. 220. *Lysimachia* spicatae purpureae affinis. *Pluck.* *alm.* 236. t. 43. f. 6. *Hab.* in *Cretae* litioribus salvis, et ad maris litora prope *Tunecum*. *Cinerea*, pubesc.

2. *indica*,



2. *indica*, cor. apicibus barbatis, capsulis tetraspermis. Retz. obs. 4. p. 23. Hab. in Indiae salsis. Similis *C. creticae*. ☉

641. *NAMA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-partita. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis. *Recept.* 2 - lamellatum. *Sem.* numerosa.

1. *jamaicensis*, caul. decumbente, fol. obovatis, flor. solitariis. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1326. Lam. ill. t. 184. Brown. jam. t. 18. f. 2. Hab. in Jamaica, in saxosis. *Cor.* 5-crenata, longitudine cal. Br. ☉

642. *HYDROLEA*. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* rotata, aut campanulata. *Filam.* basi (et Antherae) cordata. *Styli* longi divergentes. *Stigmata* capitato-peltata. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis.

\* *Spinosae.*

1. *spinosa*, fol. lanceolatis hirsutis, flor. terminalibus. Willd. Sp. 2. p. 1327. Aubl. Guj. 1. p. 281. t. 110. Hab. in Amer. meridionali. Fol. viscosa. L. Flor. interdum 6-fidi, 6-andri, et caps. 3-styla, 3-locularis. Juss.

β? *trigyna*, spinosa, fol. oblongis hirsutis, flor. 3-gynis axillaribus. Swartz. Flor. ind. oct. 1. p. 558. Hab. pro Vera-Cruz et in Acapulco viciniis.

*Obs.* Cavanilles (c. pl. v. 6. p. 19. hanc et priorem in unam conjunxit, quia stylo-  
rum numerus (secundum eundem) in eadem planta variat a 2 ad 4, et quia hae plantae in reliquis conveniunt.

2. *caroliniana*, spinosa, fol. lanceolatis longis, flor. subsessilibus axillaribus. Michx. Flor. p. 177. H. quadrivalvis. Walt. Hab. in aquis stagnantibus. H. spinosae similis dicitur, sed non ita ramosa. Flor. 1-5 fasciculati.

\*\* *Inermes.*

3. *Zeylanica*, caul. inermi, flor. subracemosis, fol. lanceolatis glabris. Vahl. Symb. 2. p. 46. Nama zeylanica. Lin. Flor. zeyl. t. 2. Steris javanica. Mant. p. 54. Lam. ill. t. 184. Burm. ind. t. 39. f. 3. Rheed. 10. t. 28. In Ind. orientali. ☉

4. *urens*, flor. paniculatis (parvis), spicis conjugatis dichotomisque, fol. duplicato-dentatis cordatis. superiorib. ovalibus. Flor. Per. 3. t. 243. Hab. in Peruv. praeruptis calidis, 2-3-orgyalis,

dense hirsuta. *Cor.* violacea limb. extus hispido. ☿

5. *crispa*, flor. panicul. (magnis), spicis conjugatis, fol. multiformibus crispis incisoseratis. Flor. Per. p. 22. t. 244. f. 2. In Andium nemorib. ad margines Pozuzo fluvii. *Cor.* magna alba campanulata. ☿

6. *dichotoma*, flor. solitariis e dichotomiis, fol. oblongo-spathulatis. Flor. Per. l. c. fig. b. Hab. passim in Huanuco urbis arenosis et argillosis. Viscosa. Fol. supra retrossum aspera. *Cor.* alba, lincis caeruleo-violaceis maculata. ☉

643. *CUSCUTA*. *Cal.* 4-5-fidus. *Cor.* 4-5-fida. *Caps.* 2-locularis, basi circumscissa. *Sem.* bina. (Stam. passim. 4. Embryo spiralis. G. Nees. 5. squamae in corol. basi quibusdam.)

1. *vulgaris*, flor. subsessilibus, cor. 4-5-andra fauce nuda, stigmatib. acutis. *C. europaea*. Lin. Smith. Flor. brit. 1. p. 282. Flor. dan. t. 199. Engl. bot. 1. 378. Hab. in agris; ad sepes, in plantis parasitica, quas extinguit, hinc valde nociva.

2. *corymbosa*, flor. pedunculatis corymbosis, cor. ovatis 4-fidis 4-andris fauce nudis, stigm. capitatis. Flor. Peruv. 1. p. 69. t. 115. f. b. Hab. in Peruviae cultis, praesertim supra Medicag. sativam.

3. *Eriophorum*, minor, flor. sessilibus, staminib. squama crenata munitis, stigm. simplicib. L. Smith. l. c. p. 283. Engl. bot. t. 35. Flor. dan. t. 427. *C. europaea*. Lam. enc. 2. p. 229. *C. europaea*. β? Willd. Sp. p. 702. In plantis humilioribus, praesertim in pratis, parasitica. A. vulgari distinctissima; etiam multo tenerior, col. rubella. ☉

4. *odorata*, flor. congestis sessilib., cor. campanulatis, basi squamis fimbriatis, stigm. capitatis. Flor. Per. l. c. t. 105. f. a. Hab. in Lima segetibus et versutis. Cal. albus punct. purpureis maculatus.

5. *americana*, flor. pedunculatis umbellatis, stigm. capitatis, cor. tubulosae limbo patente. Lin. Jacq. Amer. ed. picta. t. 17. *C. surinamensis*. Schill. lepr. t. 2. Sloan. hist. jam. 1. t. 128. f. 1. Hab. in sepiibus et fruticosis Caribaeorum. Flor. parvi aggregati flavescentes. Nectar. e squam. 5, fimbriatis infra stamina, cor. aduata. Jacq.

6. *chinensis*, flor. paniculatis, 5-fidis, cal. anguloso longitudine corollae. Lam. ill. 1. p. 353. Enc. bot. 2. p. 229. Hab. in

China. Flor. subparisi in pedunc. ramosis. Cor. fere globosa, albida. Styli brevissimi, stigm. subcapitata. Lam.

7. *africana*, flor. pedunculatis, pedunc. unifloris, cor. quinquefidis. Willd. p. 703. C. *americana*. Thunb. prod. p. 32. Hab. in Cap. b. spei arboribus. Pedunc. uniflori bractea lanceolata suffulti.

Obs. Hanc in Myrica aethiopa crescentem vidit Linnæus et sub nomine Schreberae descripsit. Willd.

8. *monogyna*, flor. pedunculatis monogynis. Vahl. symb. 2. p. 32. Tournef. Cor. 45.  $\beta$ ? *lupuliformis*, flor. racemosis. Krock. siles. n°. 251. t. 36. Ruxb. Cent. 1. p. 15. t. 23. (Secundum Willdenow.) Hab. in Oriente.  $\beta$  in Silesia et Monspeli. Facies C. *americanae*, et omnia duplo majora. V.

9. *reflexa*, racemis numerosis, cor. 5-partita: laciniis reflexis. Roxburgh. corom. 2. p. 2. t. 103. Hab. in India. Cresc. durante caelo frigido.

644. LINCONIA. *Cal.* laciniæ bractæformes, per paria oppositæ: exteriores minores. *Cor.* (Cal. Juss.) basi urceolata, 5-fida: laciniis palcaeformibus, canaliculatis, basi foveatis. *Caps.* semi infera, 2-localaris, 2-partibilis: loculis 1-spermis.

1. *alopeuosidea*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1266. Herm. afr. 7. Hab. in montosis aquosis Cap. b. Sp. Frutex abietiformis. Fol. linearia, triquetra, subverticillata.

\* *peruviana*, fol. verticillatis subdenis linearibus sessilibus hirsutis basi connatovaginis. Lam. enc. 3. p. 527. Hab. in Peru.

645. VELEZIA. *Cal.* gracilis, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala, parva. *Caps.* 1-localaris, apice 4-valvis. *Sem.* plurima, receptaculo filiformi, centrali affixa.

1. *rigida*. L. Willd. Sp. 2. p. 1329. Barr. rar. t. 1018. Bocc. mus. 2. t. 43. Hab. in Europ. australi: Hispania et in Barbaria prope Mascar. Desf. atl. 1. p. 221. Caul. ramosissimus. Cor. parva limbo rosco. Stam. 5-6. ☉

646. VAHLIA. *Cal.* 5-phylla. *Cor.* 5-petala. *Caps.* infera, unifloralis, polysperma.

1. *capensis*. Thunb. Diss. Nov. gen. c.

c. Willd. Sp. 2. p. 1354. Russelia. Linn. suppl. 175. Hab. ad Cap. b. spei, sabulosis. Statura Silenis. Fol. opposita. Fl. ex summis ramis 2-3. Petala et Antherae nivæ. Th.

647. CARMONEA. *Cal.* persistens, 5-partitus. *Cor.* rotata. *Styl.* capillares. *Drupa* globosa, 6-localaris. *Sem.* solitaria.

1. *heterophylla*, fol. alternatim fasciculatis, flor. racemosis. Cav. ic. 5. p. 438. Hab. in ins. Luzon. etc. Fol. oblongo-ovata, nunc integra, nunc apice tridentata. h

648. ROCHEFORTIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infundibuliformis, sauce aperta. *Fruetus* 2-localaris, polyspermus.

1. *cuneata*, fol. cuneiformibus obovatis integris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 557. Hab. in Jamaicae saxis arboribus montosis. h

2. *ovata*, fol. ovatis emarginatis. Swartz. l. c. p. 557. Hab. in Jamaicae fruticosis lapidosis. h

649. HEUCHERA. *Petala* 5. *Caps.* 2-rostris, 2-localaris.

1. *americana*, viscosa-pubescent, scapis subnudis, thyrso elongato, fol. radicalibus longe petiolatis semptenlobis. Murr. Comm. Gott. 3. p. 66. Cortusa americana, flore squalide purpureo. Herm. parad. 131. t. 131. H. Cortusa. Michaux. 1. p. 171. Habit. in America boreali. Petala purpurascencia. T

2. *villosa*, minor villosissima, fol. acute lobatis, panicul. capillarib. laxiflora. Michaux. 1. p. 172. Cresc. in Carol. infer. montibus. Flor. parvi, albi.

650. GUMULEA. *Cal.* campanulatus, 5-fidus. *Cor.* o. *Germen* semibifidum. *Caps.* 2-localaris, polysperma, birostris.

1. *auriculata*, fol. impari-pinnatis. Flor. Per. 3. p. 23. t. 24. Habit. in Peruviae nemorib. juxta Munnae vicum.

651. BUMALDA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Styl.* villosi. *Caps.* 2-localaris, birostris.

1. *trifolia*, fol. oppositis ternatis. Thunb. jap. p. 114. Ej. Diss. bot. 1. p. 63. Hab. in Japoniae montibus. Racemi terminales. h

652. ULMUS. *Cal.* campanulatus 5-fidus. *Cor.* o. *Caps.* (Nux

Samara. G.) compressa, membranaceo-alata. (Stam. etiam 4 et 8. Flor. conglomerati.)

1. *campestris*, foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, flor. subsessilibus conglomeratis pentandris, fructib. glabris. Willd. Sp. pl. 2. p. 1324. Lam. ill. t. 185. *β. latifolia*, fol. subtus pubescentibus. Cresc. in campestribus, ad vias publicas. Rami divaricati, nonnulli quasi penduli. h

2. *suberosa*, fol. duplicato-serratis basi subaequalibus, flor. subsessilibus conglomeratis tetrandris, ramulis suberoso-alatis. Willd. U. *hollandica* quorund. videtur. U. *campestris* plurium autor. et Linnæi? *β. fruticosa*, humilis, fol. parvulis pubescentibus. Cum priore, *β. ad sepes*. Rami virgati, erecti, ramuli subdistichi. h

3. *alata*, ramis utrinque alato-suberosis, fol. oblongo-ovalibus sensim acutis, basi subaequalibus, fructu pubescente-ciliatis. Michaux. p. 173. U. *pumila*. Walt. ? Arb. medicis, fol. carpineae. Hab. in Virginia et Carolina inferiore.

4. *fulva*, fol. ovali-oblongis longissime acuminate utrinque pubescentibus, gemmis lana densa fulva tomentosis, flor. sessilibus. Michaux. Fl. 1. p. 172. Hab. in Americæ frigidioris regionib. in montibus Alleghaniis. Succus sub cortice viscosus (unde incolis Sliperi-elm.) h

5. *effusa*, fol. duplicato-serratis basi inaequalibus, flor. octandris pedunculatis effusis, fructib. margine ciliatis. Willd. U. *campestris*. Flor. dan. t. 632. U. *montana*. With. Smith. Brit. 282. U. ciliata. Ehrh. Hab. in nemoribus, sepibus. Fol. latiora, quam in præcedente, minusque aspera. Sm.

6. *americana*, ramis laevibus, fol. serratis uncinato-acuminatis, flor. p. dicelatis, fructib. villo densissimo fimbriatis. Michaux. Flor. 1. p. 172. Hab. in Amer. boreali. Stam. 5-8. Fol. subtus pubescentia.

7. *memoralis*, fol. oblongis glabriusculis aequaliter serratis basi subaequalibus, flor. sessilibus. Ait. Kew. 1. p. 320. Hab. in Amer. boreali. h +

8. *pumila*, fol. aequaliter serratis: basi aequalibus. Pall. ross. 1. p. 76. t. 48. Hab. in Sibiria. h

Obs. Statura, dicit Pallas l. c., hujus speciei saepe certat cum quercu. Rami divaricati. Stipul. ferrugineae, membranaceo-saracae. Samarae s. nuculae glabrae, apice neri-ac. Sequens quae in horto Celsii colitur diversa species videtur.

\* *microphylla*, fol. (parvulis) incisoseratis basi attenuatis subaequalibus, ramis virgatis. U. *pumila*, *β. transbaicalensis*. Pall. 1. c. fig. A. B. C. E. Fol. conferta lanceolata-ovata Euphr. officinalis, var. sylvestris, fere similia, sed paulo majora, sub lente tenuiter pubescentia. h

9. *chinensis*, sempervirens? fol. (subparvis) coriaceis nitidis brevi serratis ovatis basi obliquis. U. *pumila* quorundem. Thé de l'abbé Gallois per ironiam. (Cels.). Hab. in China. Colitur in hortis et (durante hyeme) in frigidariis, Statura humilis. Fol. lacte viridia, rigida ex ovato sublanco-lata. h

10. *integrifolia*, fol. integerrimis, stam. 7-9. Roxb. Corom. 1. p. 56. t. 78. In montib. circianensib. Ind. orient. Arb. magna. Cal. 4-5-6-fidus. h.

653. **PLANERA**. Polygama. Cal. membranaceus, subcampanulatus, 4-5-fidus. Cor. o. *Stigm.* 2, oblonga, glandulosa, recurvo-divergentia. *Caps.* (Nux?) subglobosa, membranacea, 1-locularis, non dehiscens, aut laevis, aut squamulosa (non alata), 1-sperma. Masculi floris intermixti stam. 4-6. (Frond. centia et Floratio Ulmi, cui valde affinis. Michaux.)

1. *aquatica*, fol. petiolatis oblongo-ovalibus basi obtusis, aequaliter serratis, caps. scabra. Michaux. Flor. 2. p. 248. Pl. aquatica. Gmel. Syst. p. 150. Hab. ad ripas fluv. Ohio, Mississippi et Carol. Vere.

2. *Richardi*, fol. subsessilibus oblongo-ovalibus crenato-dentatis basi emarginatis, caps. laevi. Michaux. l. c. Ulmus polygama. Richard. Rhamnus carpinifolius. Pallas. Flor. ross. 1. t. 60? Habitat circa mare Caspium.

654. **CELTIS**. Polygama. Cal. 5-partitus. Cor. o. *Styli* divaricati, crassiusculi. *Drhpa* monosperma. *Flor. masculi* (inferioris) cal. 6-partitus et *Stam.* 6. (Folia saepius obliqua. F. lam. elastica?)

1. *australis*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, fructu solitario. Lam. enc. 4. p. 136. C. fructu nigricante. Tournef. Scopoli Delic. 2. p. 97. t. 18. Duhamel. Arbr. 1. p. 143. t. 53. Hab. in Europa australi et Barbaria. Arb. magna, cujus fructus mense Jan. marescunt. Lign. durum, nigrescens.

2. *occidentalis*, fol. oblique ovatis serratis acuminatis, fructu solitario. Lam. l. c. Mill. dict. t. 88. Gaertn. de fr. 1. p. 374. t. 77. f. 3. Scop. l. c. p. 100. G. fol. inferiorib. ternis, superioribus solitariis. Michaux. 2. p. 249. Hab. in Amer. boreali, copiose ad Mississipp. Drupa cerasiformis obscure purpurea.

β? *tenuifolia*, fol. tenuioribus minus acuminatis, dentib. majoribus basi magis rotundatis; vid. Enc. bot. l. c. p. 137 et 138. Cresc. in Ludoviciana; colitur in H. P. An distincta?

3. *Tournefortii* (lutea), fol. parvis ovatis crenato-serratis: junioribus subcordatis, basi obliquis, fructu luteo. Enc. bot. l. c. C. orientalis minor, fol. minorib. et crassiorib., fructu luteo. Tournef. Iter. 2. p. et t. 425. C. orientalis. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 3. Hab. in oriente, nunc in hortis colitur. Lign. candidum. Arb. statura Pruni. T. h

4. *orientalis*, fol. ovato-lanceolatis, basi oblique cordatis serrulatis subtus villosis, panic. axillaribus. Enc. bot. l. c. Rhecl. 4. t. 40. Reiz. obs. bot. 6. p. 34. Hab. in Indiae montosis humidis, ad fluv. ripas. ¶

5. *cordata*, fol. latis oblique cordatis acuminatis subpubescentibus, pedunc. subbifloris. C. crassifolia. Lam. enc. l. c. p. 138. Hab. in Amer. sub nomine imposito in hortis colitur. Fol. serraturae acutae et fere spinulosae.

6. *sineensis*, fol. lato-ovatis crenatis glaberrimis venis prominentibus. Hab. in Sina. Ex hort. Celsii. Fol. majuscula, obtusa.

7. *micrantha*, fol. oblique cordatis ovato-lanceolatis serrulatis superne scarbiusculis. Swartz. Prodr. p. 53. Ejusd. Flor. 2. p. 542. Brown. jam. p. 173. t. 12. f. 2. Au. Kew. 3. p. 437. Rhamnus micrantha. Lin. Plum. gen. ic. 206. Hab. in Antillis. C. *orientalis* affinis, sed fol. superne scabra, nec subtus incano-tomentosa et magis serrulata. Sw.

8. *Lima*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis oblique cordatis serratis superne scarbiusculis. Swartz. Prodr. p. 53. et Flor. p. 545. cfr. Enc. bot. 4. p. 140. Hab. in Ind. occidentali. Priori affinis, sed scarbiusculi singulari differt. Sw.

Obs. Ad Celtas quoque retulit cl. Swartz Rhamnum ignaneum. Lin. sub nomine. C. *aculeata*, cui affinis videtur Celtis *integerrima*. Lam. enc. l. c., quae fol. integerrimis et stylis bifidis distinguitur, sed vix hujus generis est.

655. *HERNIARIA*. Cal. 5-partitus. Cor. o. Filam. 5-sterilia cum staminibus alterna. Caps. 1-sperma.

1. *glabra*, herbacea glabra, glomerulis multifloris spicaeformibus. Lam. enc. 3. p. 124. Willd. Sp. 2. p. 1296. Flor. dan. t. 529. Hab. in apricis, arenosis, siccis. Pallescens, diffusa.

2. *hirsuta*, herbacea hirsuta, glomerulis parvis paucifloris. Lam. l. c. Bauh. hist. 3. t. 379. f. 1. Priore rarior in arenosis.

3. *incana*, fruticulosa, fol. ovato-oblongis pilosis, cal. piloso-incanis. Lam. l. c. Hab. in Europa australi. Rami densi, decumbentes. Flor. fasciculati, axillares.

Obs. Forte non diversa ab *H. lenticulata* L., quae vero pro planta dubia habetur; vid. Litter. Vahl. ad cl. Willdenow. in Schrad. bot. Journ. 1769. v. 1. p. 285.

β? *capensis*, suffruticosa, hirsuta, fol. ovatis. *H. lenticulata*. Thunb. prodr. p. 48. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *alpina*, fol. obovatis acutis glabris margine ciliatis, floribus glomeratis quinquefidis hirsutis. Willd. p. 1297. *H. alpina*, glomerulis paucifloris hirsutis, radice crassa subliguosa. Villars. delph. 2. p. 536. *H. alpestris*, flor. 4-5-fidis etc. Lam. enc. 3. p. 125. Hab. in alpihus Delphinatus et Helvetiae. ¶

5. *fruticosa*, fol. ovalib. congestis acutiusculis hirsutis, flor. glomeratis quadrifidis, hispido-hirsutis, caule fruticoso. Willd. Lob. ic. 85. Hab. in Hispania et Gall. meridionali. Rad. crassiuscula.

6. *polygonoides*, glabra, caule erecto dichotomo, fol. ovatis cuspidatis, flor. terminalibus. Willd. p. 1298. Cavan. ic. 2. p. 27. t. 131. *H. erecta*. Desf. Atl. 1. p. 214. Illecebrum suffruticosum. Lin. Hab. in Hispania et in collib. prope Mascar.

*ATRIPLEX*. Gen. 656-63. *pentandra*, flor. incomplexis s. cor. o., parvis, conglomeratis. Sem. 1.

656. *ATRIPLEX*. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Styl. 2-partitus. Sem. 1, depressum. Flor. seminini intermixti, quibus: Cal. 2-phyllus. Sem. 1, compressum. (Hac nota a sequente genere differt.)

1. *Halimus*, tota, argenteo-glaucis, caul. fruticoso, ramosissimo, fol. deltoidibus

integris. Lin. Halimus latifolius, Bauh. Hab. in Hispania, Lusitania, Angliae, Siberiae, Barbariae et Virginiae maritimis. Fol. subcarnosa, persistentia, aliquando lasi dentata. h

2. *odorata*, cinereo-glaucis, caul. fruticoso, ramis angulatis, fol. petiolatis hastatis, spica simpliciter fructigena crassa supinigi. An A. albicans. Ait. Kew. 3. p. 436? Hab. ad Cap. h. sp. Col. in hortis. Floscul. ex pallescente subpurpurei. Cal. fruct. inflatus subcarnosus complicatus. Olor satis gratus uti fruct. Cucum. Melo. h

3. *mollis*, caul. fruticoso erecto, fol. lanceolatis carnosius mollibus, cal. fructus rotundis integerrimis. Desf. Atl. 2. p. 391. Hab. in Barbariae desertis. Facies sequentis. Cal. planus membranaceus maximus. D.

4. *portulacoides*, albidis-glaucis diffusa, caule fruticoso, fol. subpetiolatis obovatis. L. Sowerb. engl. bot. t. 861. β. Pluck. Alm. 61. t. 61. f. 4. Hab. in Oceani septentrionalis littoribus. h

5. *glauca*, caule suffruticoso procumbente, fol. ovatis sessilibus integerrimis: inferioribus subdentatis. L. Dill. elth. 46. t. 40. f. 46. Barr. rar. 1145. t. 533. Hab. in Galliae australis, Hispaniae et Barbariae maritimis. h

6. *rosea*, caule herbaceo, fol. incanis serratis (profunde sinuatis), fructibus quadrangularibus dentatis. A. sylvestris, fructu roseo compresso. Bauh. pin. 119. Hab. in Europa australiore. ⊙

*Obs.* Cal. fructus lobato-dentatus: laciniis lateralibus truncatis quadrangularibus. Link in Schrad. Journ. 1800. p. 55.

β? *foliosa*, caul. herbaceo, rhombico-oblongis sinuato-dentatis, fruct. triangularibus acutis. Link. l. c. Hab. cum praecedente ad littora Tagus in Lusitania. ⊙

*Obs.* An cum sequente tantummodo prioris varietas? vid. Lam. enc. 1. p. 274.

7. *sibirica*, caule herbaceo, fol. deltoidibus angulatis, calycibus fructus extus muricatis. Hab. in Sibiria. Magnitudo A. hortensis. Fol. infra argentea. Flor. albi. Gmel. ⊙

8. *tatarica*, caule herbaceo, fol. deltoidibus sinuato-dentatis undulatis alternis. Hab. in Tataria. Altitudo humana. ⊙

9. *hortensis*, caule erecto herbaceo, fol. triangularibus. Blackw. t. 66. et 552. β. A. hortensis rubra. Bauh. pin. 119. Habitat sponte in Tataria. ⊙

10. *laciniata*, caule herbaceo, fol. deltoidibus dentatis subtus argenteis. Hab. ad

Europae et Virginiae septentrionalis littora marina. Tota tecta quasi epidermide secedente. Spicæ terminales hermaphroditae antheris laete rubris. Flor. feminei axillares gemini. L. ⊙

β? *sinuata*, caul. herbacea, fol. deltoidibus hastatis sinuatis subtus argenteis cal. seminum spicatis muricatis. Hoffm. Flor. Germ. 2. p. 277. A. laciniata. Lam. enc. 1. p. 275? Moris. 4. 5. t. 32. f. 17.

11. *bengalensis*, caul. herbaceo erecto? fol. oblongo-deltoidibus subhastatis obtusis. Lam. l. c. p. 276. Hab. in Bengaliam. Fol. viridi rubescunt. ⊙

12. *hastata*, caul. herbaceo erecto, cal. valv. faemineis magnis membranaceis reticulatis, margine dentibus longe setaceis. Smith. in Engl. bot. Hoffm. l. c. Moris. 4. 5. t. 32. f. 14. Hab. in Europa frigidior. Genuina A. *hastata* paucis tantum nota videtur.

13. *patula*, procumbens, caul. herbaceo patulo, fol. triangulari-lanceolatis, cal. sem. triangularibus acutis margine et disco dentatis. Smith. Engl. bot. A. *hastata*. Curt. Fl. Lond. A. *virgata*. Schp. Del. insub. 2. p. 14. t. 7? Hab. in cultis et ruderalis.

14. *herbacea*, caul. herbaceo patulo, fol. lanceolatis, ramis decussatis. Hoffm. Germ. 2. p. 277. Schkuhr. Handb. 3. t. 347.

15. *nitens*, caul. erecto herbaceo, fol. nitidis: inferioribus sagittatis eroso-dentatis acuminatis, mediis hastatis, supremis lanceolatis, cal. sem. 3-angularibus integris. Hoffm. l. c. p. 278. Schk. l. c. t. 358. Hab. in Germaniae seculis. E. maximis.

16. *alba*, caul. erecto ramosissimo herbaceo, fol. ovatis, flor. axillaribus glomeratis, cal. fructus angulatis dentatis laevibus. Scop. l. c. t. 8. Hab. . . †

17. *littoralis*, caule herbaceo erecto, fol. omnibus linearibus integerrimis subdentatisque longis. A. angustissimo et longissimo folio. Herm. lugd. 79. Hab. in Europae littoribus maris ⊙

18. *marina*, caule herbaceo erecto, fol. crassiusculis linearibus serratis. A. angustifolia denata. Pet. herb. t. 7. f. 4. Hab. in Angliae, Sueviae littoribus marinis. Pusilla, vix palmaris. ⊙

19. *pedunculata*, caule herbaceo divaricato, fol. lanceolatis obtusis integris, calycibus faemineis pedunculatis. L. Engl. bot. t. 232. Flor. dan. t. 304. Pluck. alm. 61. t. 36. f. 1. Hab. in maritimis. ⊙

*Obs.* Thunbergius hoc genus cum praecedente combinavit.

657. *CHENOPODIUM*. *Cal.* 5-phyl-lus. 5-gonus. *Cor.* o. *Sem.* 1, len-ticulare, superum.

\* *Foliis angulosis.*

1. *Bonus Henricus*, fol. triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. L. Willd. Sp. 2. p. 1299. Flor. dan. t. 579. Hab. in Europae ruderalis. ☿

2. *mucronatum*, fol. triangulari-hastatis obtusis mucronatis, racemis foliosis. Thunb. prod. 48. Hab. ad Cap. b. spei.

3. *triandrum*, fol. cordato-sagittatis, spicis terminalib. aphyllis interruptis. Forst. prod. n°. 129. Hab. in Nova Zeelandia.

4. *urbeicum*, fol. triangularibus subden-tatis, racemis confertis strictissimis, cauli approximatis longissimis subaphyllis. Flor. dan. t. 1248. Hab. in plateis et ruderalis. ☉

5. *Atriplicis* (purpurascens), foliis rhombeo-ovatis lanceolatisque, inferioribus sinuato-dentatis, paniculis axillaribus ramosis, caule erecto. Ait. Kew. 1. p. 311. Lin. suppl. p. 171. Ch. purpurascens. Jacq. hort. 3. p. 43. t. 80. Fol. summae farina tecta. Lam. enc. 1. p. 146. Hab. in China. Facies. *Atriplicis hortensis rubrae*. Flor. tres ad quinque in racemulo sessiles sanguinei. Cal. pentagonus. ☉

6. *rubrum*, fol. cordato-triangularibus obtusiusculis sinuato-dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis, caule brevioribus. Flor. dan. t. 1249. Curt. Lond. ic. Moris. hist. 2. t. 31. Hab. in Europae cultis, ruderatis. Adulta rubet diffusa. Fol. nidita, crassa. Sem. minutissima. ☉

7. *murale*, fol. ovatis inaequaliter den-tatis acutis nitidis, racemis corymbosis nudis, caule ramoso patulo. Willd. Ber-geret. Phyt. ic. Desf. Atl. 1. p. 214. Hab. in Europae et Algeriae muris aggeribusque. Fol. longe petiolata.

☿ ? *guineense*, fol. ovatis inaequaliter dentatis acutis, racemis subramosis nudis erectis, caule simplici erecto. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 345. Hab. in Guinea. ☉

8. *Quinoa* (chilensis), fol. triangulari-ovatis obsolete dentatis, junioribus pulve-ruentibus, racemis confertis petiolis breviorib. Willd. p. 1381. Feuill. peruv. t. 10. Hab. in Chili. Venarum folii par infimum est longe protractum ut inde facies folii triplinervi. W. ☉

9. *serotinum*, fol. deltoideis sinuato-dentatis rugosis glabris uniformibus, ra-cemis terminalibus. L. Hab. in Hispania, Gallia, Anglia, Sibiria. ☉

10. *album*, fol. rhomboideo-ovatis erosis postice integris : summis oblongis, racem-is erectis. Hab. in agris Europae passim. Sem. laevissima nec punctata. Smith. Planta matura albicat. L.

11. *viride*, fol. lanceolata rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfo-liatis. L. Hab. in Europae cultis, agris. Caul. erectus, viridis, angulis purpuras-centibus. †

\* *scifolium*, fol. hastato-sinuatis erosis postice integris : superioribus oblongis in-tegerrimis, sem. punctatis. Smith. brit. r. p. 276. C. viride. Curt. Lond. ic. C. seroti-num. Huds. Hab. in fimeis et ruderalis circa Londinum. Ramor. axillae purpu-rascentes. An C. viride auctorum ? C. vi-ride. L. ut varietatem C. albi, considerat cl. Smith.

12. *punctulatum*, fol. (albo-punctatis) imis rhombeo-ovatis sinuatis, supremis ellipticis, racem. lateralibus spicatis folio-sis. Scop. Delic. insubr. 1. p. 26. t. 11. Hab. . . . Fol. rubro colore tingunt aquam, in qua macerantur. S.

13. *hybridum* (angulatum), fol. cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis di-variantis nudis. Curt. Flor. Lond. ic. C. an-gulatum. Enc. bot. 1. p. 194. C. stramonii folio. Vaill. paris. 36. t. 7. f. 2. Hab. in Europae cultis, ruderalis. Foetens. ☉

14. *Botrys*, fol. oblongis sinuatis, ra-cemis nudis multifidis. Botrys. Dod. Hab. in Europae australis arenosis. ☉

15. *ambrosioides*, fol. lanceolatis den-tatis, racemis foliatis simplicibus. Moris. s. 5. t. 35. f. 8. Hab. in Mexico, Lusitania. ☉

16. *multifidum*, fol. multifidis : segmen-tis linearibus, flor. axillaribus sessilibus. Dill. elth. 78. t. 66. f. 77. Hab. in Bonaria. ♀

17. *anthelminticum*, erectum, fol. ovato-oblongis rariter dentatis, racemis aphyllis, flor. 3-gynis. Lin. Michaux. p. 173. Hab. in Pennsylvania, Bonaria et in Kentucky ru-deralis. ☿

18. *glaucom*, fol. ovato-oblongis repen-dis subtus glaucis, racemis nudis simplicibus glomeratis. Flor. dan. t. 1151. ☿ ? concate-natum. Thuill. Paris. p. 125. Bauh. hist. 2. p. 473. t. 473. Hab. ad Europae fimeia, in fossa passim et glareosis. ☉

\*\* *Foliis integerrimis.*

19. *Vulvaria* (olidum), fol. integerrimis rhombeo-ovatis, flor. conglomeratis axillaribus, caul. diffuso. Flor. dan. t. 1152

Curt. Lond. ic. C. foetidum. Lam. enc. 1. p. 106. Atriplex foetida. Bauh. Garosmus. Dod. 618. Hab. in Europae cultis oleracis, ad vias in ruderalis.

20. *polyspermum*, fol. integerrimis ovatis, cymis dichotomis aphyllis axillaribus, sem. subnudis. Flor. dan. t. 1153. Bitum majus polyspermum a seminis copia. Moris. hist. 2. t. 30. f. 6. Hab. in Europae cultis. Caulis etiam erectus. ☉

21. *caudatum*, fol. ovatis obtusis integerrimis, panicula nuda terminali elongata, caule simplici erecto. W. Jacq. ic. 2. t. 344. Col. 2. p. 325. Hab. in Guinea. ☉

22. *acuminatum*, fol. ovatis acuminatis integerrimis, panic. nuda terminali. Willd. in N. Act. berol. 2. t. 5. f. 2. Habit. in Sibiria. C. septium affinis.

23. *laterale*, fol. caulinis lanceolatis obtusis, ramorum oblongis, pedunc. lateralibus solitariis unifloris. Ait. Kew. 1. p. 313. Hab. ... ☉

24. *scoparium*, fol. planis lineari-lanceolatis margine ciliatis, flor. glomeratis axillaribus. Willd. p. 1306. Oxyris. Dod. pempt. 151. Hab. in Graecia, Japonia, China, Carniolia. ☉

25. *villosum*, fol. linearibus integris planis villosis mollissimis incanis, racem. lanatis. Lam. enc. 1. p. 156. Hab. ... Salsolam refert.

26. *maritimum*, fol. subulatis carnosissimis semiteretibus, floribus glomeratis axillaribus. Flor. dan. t. 489. Moris. 5. t. 33. f. 3. Hab. in Europae marii. ☉

27? *oppositifolium*, fol. subulatis oppositis, glomerulis foliosis axillaribus. Willd. p. 1307. Lin. suppl. 172. Salsola oppositiflora. Pall. it. 2. p. 735. t. O. Hab. in Sibiriae aridis limosis ad Jaikum.

28. *aristatum*, ramosissimum, fol. lanceolatis subcarnosis, integerrimis, corymbis dichotomis aristatis axillaribus. L. C. fol. ex lineari-lanceolatis, racemis conjugatis dichotomis nudis, apice setaceis. Gmel. sib. 3. p. 83. t. 15. f. 1. R. Hab. in Sibiria, Virginia. Panicula magna divaricatissima. ☉

658. BETA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Sem. reniforme, intra substantiam baseos calycis.

1. *vulgaris*, flor. congestis, fol. inferioribus ovatis. Ait. Kew. 1. p. 315. Willd. 2. p. 1308. Gaertn. de fr. 1. t. 75. f. 5. Hab. sponte Europ. australioris marii, nunc ubique colitur. ☉

2. *patula*, flor. congestis, fol. omnibus lineari-lanceolatis, ramis divaricatis. Ait. 1. c. Hab. in Madera. Caulis vix pedalis ramosissimus. ☉

3. *ciela*, flor. ternis radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, spicis lateralibus longissimis. Mill. dict. n°. 2. Hab. in Lusitania ad Tagum. ☉

4. *maritima*, flor. geminis, caul. decumbentibus, fol. triangularibus petiolatis. Mill. dict. n°. 1. Hab. in littoribus maris. ☉

Obs. Typus genuinus B. vulgaris et ciclae videtur.

5. *trigyna*, flor. ternis trigynis, cal. corollinis. Walld. Hongar. p. 34. t. 35. Inventa ad hortos pagi Pazos in Hongaria in comitatu Symreen-i. Flor. in spicis longis ante anthes in nutantibus digestis. †

659. SALSOLA. Cal. 5-phyllus, basi capsularis. Cor. o. Styli 2-3. Caps. 1-sperma. Sem. cochleatum. (Cal. fructus in quibusdam margine membranaceo cinctus.)

1. *Kali*, herbacea decumbens, fol. subulatis spinosis, calycibus marginatis axillaribus. L. Willd. Sp. 2. p. 1310. Flor. dan. t. 818. Moris. 5. t. 33. f. 11. Hab. in littoribus maris. ☉

2. *Tragus*, herbacea erecta, fol. subulatis spinosis laevibus, calycibus ovatis. L. Hab. in Europa australi. ☉

3. *rosacea*, herbacea, foliis subulatis mucronatis, calycib. explanatis. *Rosacea*, caule erecto ramoso, fol. alternis conico-subulatis mucronatis, membranis corollinis purpureis. Cav. ic. 3. p. 44. t. 286. Buxh. cent. 1. t. 14. f. 2. Hab. ad Asiae septentrionalis sulinas et in Arce Alonensi in Hispania. ☉

4. *caroliniana*, herbacea decumbens glabra, fol. dilatato-subulatis spinenscentibus, cal. fructiferis latius explanato-alatis. Michaux. Flor. 1. p. 174. Walt. Hab. ad littora in Carolina. Affinis rosaceae. Gemmae fructificantes valde turgidae. M.

5. *Soda*, herbacea patula, fol. inermibus. L. Jacq. hort. t. 68. Hab. in Europae australis salsis. ☉

6. *sativa*, diffusa herbacea, fol. reteribus glabris, flor. conglomeratis. L. Cav. ic. 3. p. 46. t. 291. In Hispaniae australis marii. ☉

7. *spicata*, herbacea, fol. oblongis obtusis semiteretibus, flor. ternis axillaribus

auspiciatis. Willd. S. falsa. Cav. ic. 3. p. 46. t. 290. Hab. in Hispania. ☉

8. *altissima*, herbacea erecta ramossissima, fol. filiformibus acutiusculis basi pedunculiferis. L. Burx. cent. 1. p. 21. t. 31. f. 2. Hab. ad Salinas Italiae, Saxoniae, Astracani. ☉

9. *trigyna* (triflora), herbacea erecta, foliis filiformibus obtusis carnosis, flor. axillaribus sessilibus ternis, stylo trifido. S. altissima. Cav. ic. 3. p. 46. t. 289. Hab. t. in Hispania. ☉

10. *salsa*, herbacea erectiuscula, fol. linearibus subcarnosis mucicis, calycibus aeculentis diaphanis. L. Jacq. hort. 3. p. 44. t. 83. Hab. in maritimis. ☉

β? *americana*, humilior, subdecumbens, flor. confertioribus. Michaux. 1. p. 174. Ad osium Ilum. St. Laurentii.

11. *nudiflora*, sublignosa ascendens, fol. filiformibus carnosis, flor. glomeratis, fol. glomerulorum longitudine. Willd. p. 1313. Hab. in India orientali, ad maris littora. ☉

12. *flavescens*, sublignosa erecta, fol. teretibus pubescentibus, flor. subglomeratis. Willd. Cav. ic. 3. p. 45. t. 288. Hab. in Hispaniae montibus Orcelitani. ☉

13. *hirsuta*, herbacea diffusa, fol. teretibus obtusis tomentosis. Flor. dan. 187. Hab. in Daniae et Mompelii maritimis. ☉

14. *laniflora*, herbacea, fol. teretibus pubescentibus, flor. axillaribus, antheris coloratis. Willd. Pall. it. 2. app. 104. tab. P. Hab. in Sibiria circa Saratschik. Cal. excrecens in paleas acutas longissimas, lacinibus lateralibus roseis.

15. *arenaria*, caul. diffuso, fol. linearibus pilosis, cal. fructus lacinii membranaceis scariosis venosis ovato-oblongis obtusis. Kochia arenaria. Roth. N. bot. Beytr. p. 175. S. arenaria. Ejusd. Flor. gerin. 2. app. p. 575. Willemetia. Maerklin. Chenopodium. Flor. Wetteravica. p. 356. Camphorosma mopseliaca. Pollich. Palat. n. 176. Hab. in regionib. Rhenanis, Germ. australiore. Cal. laciniae post anthesin (quod in multis *salsolis* obvenit) in alas 5 rotatas albas, venis purpureis pictas increment.

16. *hyssopifolia*, herbacea, fol. linearibus planis, glomerulis florum axillaribus lanatis. Willd. Pall. it. 1. app. n. 107. t. L. Kochia. Roth. Hab. in Sibiriae campis siccis salsis ad Rhymnum. ☉

17. *canescens*, caul. suffruticoso folioso, fol. linearibus acutis tomentosis planis argenteo-sericeis. Hort. Par. Chenopodium sinense.

Willemet in Essais de Melecine et d'Hist. Nat. 3. p. 233. Hab. . . . Rami juniores argentei.

18. *diffusa*, herbacea tomentosa decumbens, fol. lanceolatis. Thunb. prodr. p. 49. S. sericea. Ait. Kew. 1. p. 317. Chenolen diffusa. Willd. Sp. 2. p. 1203. Thunb. Diss. bot. 1. p. . . . Hab. ad Cap. b. sp. maritima. Fol. opposita, argenteo-tomentosa cum acumine carnosio. Styl. filiformis, a-fidus.

19. *polycelosus*, sublignosa diffusa, fol. oblongis, calycibus marginatis glomeratis coloratis. L. Boer. mus. 2. p. 34. t. 34. Barr. rar. 214. t. 275. Hab. in Siciliae, Hispaniae maritimis.

20. *prostrata*, frutescens, fol. linearibus pilosis inermibus. L. Gmel. sib. 3. t. 18. f. 2. Jacq. austr. 1. 200. Hab. in Asia boreali, Hispania, Austria, Helvetia, Sibiria. h

21. *monandra*, caule herbaceo ramoso carnosio subaphyllo, fol. teretibus carnosis, flor. monandris. Willd. Pall. it. 3. app. 83. t. M. f. 1. Hab. in Sibiria ad lacum Altan, inque desertis Astrachanensibus. ☉

22. *vermiculata*, frutescens, fol. fasciculatis teretibus filiformibus, floralibus ovatis acutis carnosio. Willd. S. mycrophylla. Cav. ic. 3. p. 45. t. 287. Barr. rar. 501. t. 215. Hab. in Hispania, Lusitania et Sibiria. h

23. *Arbuscula*, fruticosa, fol. fasciculatis teretibus basi attenuatis incurvis, flor. solitariis sparsis. Willd. Pall. it. 1. app. n. 102. t. K. Hab. in deserto Tatarico ad ripas Lacus salsi Inderiensis. h

24. *aphylla*, fruticosa subaphylla, ramis flosculorum rudimento cooperatis. Lin. suppl. 173. Caroxylon Salsola. Thunb. Diss. Nov. pl. gen. Hab. ad Cap. b. sperin omni Karro. Frutex altitudine humana aphyllus valde irregularis L. h

25. *arborescens*, frutescens, fol. semicylindricis, inferioribus conjugatis. Lin. suppl. 173. Hab. in Sibiria. Caul. ascendentes albi. Cal. scarioso-roseae. h

26. *fruticosa*, fruticosa, fol. carnosis teretibus obtusis imbricatis mucicis. Engl. bot. t. 635. Chenopodium fol. linearibus teretibus carnosio, caule fruticoso. L. Hort. cliff. 86. Hab. in maritimis Galliae, Hispaniae, Angliae, Lusitaniae, Persiae. Sem-pervirens. Bract. ternae. h

27. *indica*, fruticosa, fol. linearibus carnosio semiteretibus, floralibus oblongis obtusis. Willd. p. 1317. Habit. in India orientali. h



28. *sedoides*, suffruticosa, fol. teretibus filiformibus ciliatis, flor. glomeratis axillaribus. Willd. Pall. itin. 1. app. n°. 108. t. M. f. 1. 2. Hab. in Sibiriae humidis salsis. T.

29. *muricata*, fruticosa patula, ramulis hirsutis, cal. spinosis. L. S. monobracea. Forsk. descr. 35. *Bassia muricata*. Allion. Misc. taur. 3. 177. t. 4. f. 2. Buxb. cent. 3. t. 40. Hab. in Europa australi, Aegypto. Cal. Lini, congesti. h

30. *camphorosmoides*, fruticosa spinosa ramosissima, fol. glabris alternis filiformibus cum fasciculis axillaribus. Desfont. Atl. 1. p. 218. Kali orientale fruticosum spinosum, camphoratae-folius. Tourn. Cor. 18. Hab. in incultis prope Flemsen. h †

31. *brevifolia*, fruticosa ramosissima, fol. ovatis confertis brevissimis pubescentibus. Desf. l. c. Boc. sic. 59. In arenis prope Caffam. Fol. uti in *Sedo acris*. D.

32. *mollis*, fruticosa, ramis patentibus, fol. teretibus carnosius glaucis obtusis. Desf. l. c. Cum priore. Fol. glabra, succosa *Sedi albi* fol. similima. D.

33. *oppositifolia*, fruticosa, fol. subulatis inermibus oppositis. Desf. Atl. 2. p. 219. Moris. 5. t. 33. *S. fruticosa*. Cav. ic. 3. t. 285. Hab. in agro Tunetano. Cal. fructus membranæ rosæ latae flabelliformes in campanam conniventes. D. Styl. bifidus. C.

34. *verticillata*, fruticosa erecta, fol. oppositis linearibus semicylindricis, flor. subverticillatis. Schousboe. Maroc. 1. p. 123. Hab. prope Magodore. Fructus nondum observatus. †

35. *glauca*, fruticosa, erecta glaberrima, fol. semiteretibus filiformibus, cal. solitariis bracteatis, fructib. explanatis hyalinis. Bieberst. Tableau, etc. Kali orientale fruticosum altissimum, flor. stam. purpureis. Tourn. Cor. p. 18. Hab. in praecipitis montium inter Kubam et veterem Schemachiam. h

36. *Echinus*, fruticosa glabra, fol. subulatis muticis, spidiis divaricatis floriferis. Bill. Syr. 2. p. 10. t. 5. *Anabasis spinosissima*. Lin. suppl. p. 173. Willd. Sp. p. 1319. Hab. in Aegypto, Persia in monte Libano. Ob fructum potius hujus generis.

37. *platyphylla*, caul. herbaceo ramosissimo, fol. lato-lanceolatis sinuato-dentatis, flor. paniculatis trigynis, cal. fructus margine orbiculari hinc emarginato. Michaux. Flor. 1. p. 174. S. radiata. Desf. in Annal. du Mus. 2. p. 28. t. S. *atriplicifolia*.

Sprengel, *Kochia* Roth. N. bot. Beytr. p. 177? Hab. in Amer. septentrionali. Sub nomine Sals. *Chenopodioides* et latifolia hinc inde colitur. Ob folia, habitus a ceteris omnino alienus est.

Obs. Genus *Salsolae*, nonnullis speciebus *Chenopodii* affine, iterum recognoscere debet: forte dividendum. Cl. Roth. nonnullas species ab hoc genere secundum characterem sequentem separat:

Kochia. Cal. 1-phyllus, campanulatus, 5-fidus: in fructu in marginem foliaceum 5-petaliformem excrescens: fauce clausa dentibus 5, triangularibus. Cor. o. Stylus 1, brevis. Stigm. 2-3, longa. Caps. 1-locularis: 1-2-sperma. Semeu incurvum.

660. ANABASIS. Cal. 3-phyllus. Cor. 5-petala. Bacca 1-sperma, calyce cincta.

1. *aphylla*, aphylla, caule ramoso articulado, articulis emarginatis, ramis apice floriferis. Willd. Sp. 2. p. 1318. *Salsola articulata*. Cav. ic. 3. p. 43. t. 284. Buxb. cent. 1. p. 11. t. 18. Hab. ad maria Caspii littora et circa Tripoliu. h

2. *cretacea*, aphylla, caul. numerosis caespitosus simplicissimis articulatis basi floriferis, articulis emarginatis. Willd. Pall. it. 1. app. n°. 109. t. N. Hab. in Sibiria. T.

3. *foliosa*, fol. subclavatis. L. *Salsola clavifolia*. Pall. it. 2. p. 486. Hab. ad mare Caspiu. ©

4? *tamariscifolia*, fol. subulatis, pericarpis exsuccis. L. Cav. ic. 3. p. 42. t. 283. Hab. in Hispania. Stigm. 3, obtusa. h

661. ANREDERA. Cal. 2-partitus, dorso carinatus. Cor. o. Styl. 2-fidus. Sem. 1, cal. compresso membranaceo-bialato tectum.

1. *spicata*. Juss. Gen. pl. Gmel. Syst. p. 454. *Basella vesiciaria*, fol. subcordatis, pedunc. simplicibus, fruct. orbiculato-compressis vesicariis. Lam. enc. 1. p. 382. Hab. in Peruvia. Caul. scandens. Flor. spicati alterni.

662. BOSEA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Bacca 1-sperma.

1. *Yervamora*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1322. Lam. ill. t. 182. Frutex peregrinus horto Bosiano *Yervamora* dictus. Walt. hort. p. 24. t. 10. Hab. in ins. Canariis. h

663. MICROTEA. *Cal.* 5-phyllus, patens. *Cor.* 5. *Drupa* sicca, echinata.

1. *debilis*. Swartz. Flor. ind. occid. t. p. 543. Lam. ill. t. 182. Willd. p. 1309. Schollera. Robr in Act. hafn. 2. t. p. 210. Hab. in Caribaeis, ins. St. Eustachii, etc. Caul. diffusus. Fol. ovata. Racemi secundi filiformes. ☉

664. PHYLLIS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stigmata* hispida. *Sem.* 2, oblonga, axi filiformi annexa.

1. *Nobla*, stipulis dentatis, fruct. pendulis. L. Dill. Elth. t. 299. f. 386. Lam. ill. t. 186. Hab. in Canariis. Flor. corymbosi. h

665. COPROSMA. Polygama. *Cal.* minimus, 5-dentatus. *Cor.* infundibuliformis. *Styli* longi, basi coherentes. *Bacca* infera, 2-sperma. (Stam. etiam 6-7.)

1. *lucida*, pedunc. compositis. Lin. suppl. p. 178. Forst. gen. n° 69. Murr. Syst. veg. p. 200. Hab. in N. Zeelandia. Similis Phyllidi, glaberrima. Fol. opposita, ovata. Stipul. glaberrima. L.

2. *foetidissima*, flor. solitariis. Lin. l. c. Lam. enc. 2. 98. Ej. ill. t. 854. Cum priore.

*Obs.* Hoc genus, ulterius examinandum, ab ill. Juss. inter Rubiaceas, cum priore, collocatum est.

666. PANAX. Polygama. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* infera, cordata, 2-sperma. *Cal.* in flore Masc. integer.

1. *simplex*, foliis alternis lanceolatis serratis, umbell. compositis. Forst. Flor. austral. p. 75. Hab. in N. Hollandia.

2. *trifolia*, pusilla, rad. subrotunda, fol. ternis: foliolis subsessilibus. Michaux. Flor. Trew-Ehr. t. 6. f. 2. Hab. in Pennsylvania et Novboraca. Fol. glabra nitida, passim quina.

3. *quinquefolia*, rad. fusiformi, fol. ternis: foliol. quinis petiolatis. Michaux. l. c. p. 256. Trew-Ehr. t. 6. Lam. enc. 2. p. 713-714. Planta celeberrima ob radicem Ginzeng s. Ninzin.

4. *attenuata*, fol. ternatis quinquatisve:

foliol. ovatis attenuatis crenatis, caul. arborescente. Swartz. Flor. 2. p. 56a. Hab. in Ind. occident. in monte la Souffire, Guedeloupe et in ins. St. Christophe.

5. *arboorea* (australasia), fol. septenatis dentatis glabris, umb. composita, caul. arboreo. Lin. suppl. p. 441. Hab. in N. Zeelandia.

6. *undulata*, fol. 6-8-tenatis lanceolato-ovatis acuminatis subundulatis, subtus ferrugineo-pubescentibus, flor. paniculatis, caul. arboreo. Aubl. gujan. 2. p. 949. t. 360. F. Morototoni. Ej. et Gmel. Syst. II. p. 465. Hab. in Gujanae sylv. et ad St. Domingo. Arb. 60-100-pedalis, apice foliosa, tota aromatica. Fruct. compress. cordati pubescentes.

7. *fruticosa*, fol. supradecompositis dentato-ciliatis, caul. fruticoso. Lin. Rumph. amb. 4. t. 33. Hab. in ins. Ternate. Altitudine humana, vi diuretica gaudet.

667. CUSSONIA. Involucr. o. *Cal.* 1-phyllustruncatus crenatus. Petala 5, oblonga acuta. Fructus didymus, 2-locularis cal. stylisque coronatus.

1. *thyrsoidea*, fol. quinatis: foliol. simplicibus cuneatis ternatisque apice dentatis. Thunb. Diss. acad. 1. p. 12. et N. act. Ups. 3. t. 12. Lam. ill. t. 187. Willd. Sp. 2. p. 1355. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *spicata*, fol. septenis: foliol. simplicibus lanceolatis ternatisque apice serratis. Thunb. l. c. Act. Ups. t. 3. Cum priore.

*Obs.* Hoc genus a Thunbergio inter umbellatas collocatum, a Jussieu rectius una cum praecedente ob semina pericarpio inclusa, ad fam. Aralias refertur.

~~~~~  
UMBELLATAE familiam exhibent, primo obtutu ab aliis facile dignoscendam, ob flores umbellatim dispositos, et fructus inferos, nulos, in semina duo, ex axe centrali filiformi pendula, bipartibiles. Umbellae sunt aut simplices s. flores in pedunculo communi sessiles, aut compositae s. in umbellulas radiatim pedicellatas divisae; nonnullae anomaliae sunt s. a forma communi aberrantes. Utraque sunt vel nuda, vel involucreatae. Flores constant ex calyce integro aut quinque-dentato, minimo; corolla 5-petala, aequali, aut radiata: petalis exterioribus majoribus. Stamina adsunt 5 et

styli 2. Lagoecia unico tantum gaudet stylo. Plures flores in eadem umbella abortiunt ob stylorum defectum, qui polygami denominantur. Caul. plerisque herbaceus, et folia composita sunt. Diverse harum plantarum partes, praesertim semina, gaudent qualitate calida, aromatica, nonnunquam caustica, imo venenata; radices quarundam edules sunt.

668. ERYNGIUM. Flor. capitati. Involucr. polyphyllum. Cal. proprius, 5-phyllus, superus. Cor. 5-petala. Recept. paleaceum. Fruct. coronatus, 2-partibilis. (Fol. Cardui.)

\* *Foliis laciniatis.*

1. *campestre*, fol. radicalibus petiolatis ternatis: caul. inferiorib. pinnato-lanceolatis, caul. superne ramosissimo. L. Schousb. Maroc. p. 135. Willd. Sp. 2. p. 1358. Jacq. austr. t. 155. Flor. dan. t. 554. *β. lusitanicum*, latifolium. Tournef. 327. Hab. in incultis, ad vias ubique.  $\mathcal{T}$

2. *Bourgati*, fol. omnib. digitatis lacini suborbiculatis, capitul. subrotundis paleis subulatis integris. Ait. Kew. l. p. 326. Gouan, ill. p. 7. t. 3. Hab. in Gallia australi, in Helvetia. Fol. quoad formam ut in Ger. columbino. Involucr. subulata 9-12-phylla. Capit. rarius unicum, amethystinum. Lam.

3. *amethystinum*, fol. radicalibus trifidis basi subpinnatis, bracteis linearibus spinis interjectis. Moris. s. 7. t. 35. f. 2. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 122. Hab. in Syriae montibus et in campis prope Tingidem. Nomen colore plantae exprimit.  $\mathcal{T}$

4. *rostratum*, fol. caulinis pinnatis: radicalibus polymorphis, involucr. inaequalibus, capitulis apice rostratis. Cav. ic. 6. p. 34. t. 552. Hab. in maris Chilensis litore prope Talchuanu urbem. Col. plant. luteo albus.

5. *monocephalum*, fol. amplexicaulibus canaliculatis laxè pinnatis, involuero patentissimo rigido. Cav. l. c. p. 35. t. 553. Hab. in Mexico. Flor. violacei. Involucr. amplum, 30-phyll.

6. *triquetrum*, fol. radicalib. trilobis inciso-spinosis, caul. digitato-palmatis, flor. corymbosis, involucr. 3-4-phyllis subulato-canaliculatis, pedicellis triquetris. Desf. Atl. 1. p. 225. t. 54. Hab. in Barbariae arvis. Col. plant. amethystinus.  $\mathcal{T}$

7. *rigidum*, fol. palmato-laciniatis, bract. rigidis pinnatifidis pungentibus, caul.

crasso. Lam. enc. 4. p. 752. E. Spinalba. Vill. Delph. 2. p. 660. t. 17. Hab. in Galliae alpb., locis incultis. Capit. magna, oblonga, bract. 9-10 pinnatifidis, albidis, spinosis cincta. A sequente omnino diversum.

8. *alpinum*, fol. radicalibus integris cordatis, caulinis lobatis sublaciniatis, bracteis mollihus pinnatifido-ciliatis caerulescentib. Lam. l. c. p. 753. Jacq. ic. rar. t. 94. Hab. in alpbibus.  $\mathcal{T}$

9. *caeruleum*, fol. radicalibus cordato-ovatis, caulinis palmatis, involucri foliolis quinis subulatis basi utrinque spinula minima armatis, paleis mucronatis. Tableau d. prov. sur la côte occidentale de la mer Caspienne. n°. 7. Munting. Phytogr. p. 455. Moris. s. 7. t. 37. f. 13. Habit. in coll. et apricis prov. Schiruanensis.  $\mathcal{T}$

10. *maritimum*, fol. radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capit. pedunculatis, paleis tricuspidatis. L. Moris. s. 7. t. 36. f. 6. Hab. in maritimis. Rad. longissima. Col. pl. glaucus aut albicans.  $\mathcal{T}$

*β. aquifolium*, fol. ovatis acutis spinosis amplexicaulibus, involucr. 6-7-phyllis, fol. intus caeruleis. Cav. Annal. de ciencias natur. n°. 7. p. 32. E. *maritimum*. Flor. Dan. t. 875.  $\mathcal{T}$

11. *ilicifolium*, fol. obovatis dentato-spinosis, margine cartilagineis, caul. dichotomo, involucr. foliaceis, paleis tricuspidatis. Cav. ic. 6. p. 225. t. 53. Lam. enc. 4. p. 757. Hab. in Barbaria et Lusitania.

12. *dichotomum*, fol. radicalibus cordato-oblongis crenatis, umbel. dichotomis, capit. florum rotundo involucr. breviori, paleis tricuspidatis. Desf. Atl. 1. p. 126. t. 55. In collib. incultis circa Masca. Affine E. *plano*, sed omni parte minus. Capit. parva. D.

13. *corniculatum*, fol. radicalibus ellipticis subdentatis petiolatis: caulinis perparvis pinnatifido-laciniatis, caul. trichotomo, involucr. inaequalibus, paleis integris. Lam. l. c. p. 758. Tournef. Inst. p. 327. Hab. in Lusitania. Capit. numerosa, cincta involucr. 5-6-phyllis cujus fol. 3. caeteris longiora cornicula mentientia. Lam.

14. *planum*, fol. radicalibus cordato-ovalibus planis crenatis petiolatis caulinis sessilibus, capit. ovatis pedunculatis. Lam. enc. 4. p. 753. Jacq. Austr. t. 391. Barr. ic. 1174. Hab. in Russia, Polonia, Austria et Gallia meridionali? Capit. et pedunculi amethystini.

15. *tricuspidatum*, fol. radicalibus cordatis : caulinis palmatis, auriculis retroflexis, paleis tricuspidatis. L. Willd. p. 135. Des. Atl. 1. p. 224. E. Bocconi, fol. radicalibus cordato-subrotundis crenatis apice sulcatis : caulinis inferioribus trifidis ; superioribus digitatis, paleis tricuspidatis. Lam. l. c. E. capitulis Psylli. Bocc. Sic. t. 47. Moris. s. 7. t. 36. f. 12. Hab. in Euro. australi, Barb. et Oriente.

16. *creticum*, fol. caulinis digitatis spinosis brevissimis subreflexis, caul. superne corymboso, involucr. subhexaphyllis. Lam. l. c. p. 754-755. Tournef. Cor. p. 23. Hab. in ins. Candia. Col. pl. amethystinum.

17. *glomeratum*, fol. pinnato-lacinatis : lacinis angustis spinosis, thyrso terminali, capit. globosis subglomeratis. Lam. l. c. Cum priore et in Oriente. Rad. longa, apice crassa. Capit. minuta numerosa. Invol. foliola 6, lineari-subulata. L.

18. *dilatatum*, fol. pinnatifidis apice dilatatis trifido-lacinatis spinosis, involucr. hexaphyllis margine spinosis. Lam. l. c. Barrel. ic. 36. Bocc. Mus. t. 71. Hab. in Hispania, Lusitania et Barbaria. An ab E. amethyst. satis diversum?

19. *lateriflorum*, fol. lanceolatis nervosis integerrimis, caul. ramisque flexuosis, capit. lateralib. sessilibus echinatis. Lam. l. c. p. 756. Gramen orientale spicatum, etc. Tournef. cor. p. 39. Cenchrus frutescens. Linn. 7. Hab. in Oriente. Species omnium valde singularis. Caul. flexuosus, sursum ramosissimus.

20. *virgatum*, fol. ovatis inciso dentatis remotissimis, caul. virgato tenui apice corymboso. Lam. l. c. Hab. . . Caul. gracilis. Fol. fere ut in V. Teucrium. Paleae breves 3-dentatae. L.

21. *Galioides*, minutum, fol. sessilibus digitatis spinosis minimis, caul. debili dichotomo, capit. sessilibus. Lam. l. c. Moris. hist. 3. p. 167. n. 19. In Portugaliae humidis. Galium refert ob fol. quasi verticillata. L.

22. *tenuis*, fol. spinosis : radicalib. inaequaliter dentatis : caulinis digitatis, foliolis angusto-lanceolatis, involucr. subulatis serrato-spinosis capit. longioribus, paleis tricuspidatis. Desf. Atl. 1. p. 227. Lam. enc. 4. t. 755. Clus. hist. 2. p. 159. ic. Tabern. ic. 664. Hab. in Hispaniae et Barbariae collib.

23. *odoratum*, fol. inferioribus oblongis dentato-spinosis, superioribus subdigitatis, caul. dichotomo, capit. sessilibus, invol.

brevissimis. Lam. l. c. Tournef. inst. 327. Hab. in Lusitania, locis humidis. Pal. subtridentatae. Medium inter antecedens et sequens. L.

24. *pusillum*, fol. radicalibus oblongis dentatis, caul. dichotomo, capitul. sessilibus. Linn. Desf. Atl. 1. p. 223. Moris. s. 7. t. 36. f. 11. Clus. hist. 2. p. 158. ic. Cresc. in Hispania oriente et Algeriae pratis humilis. Paleae rigidae simplices apice spinosae. L.

25. *serratum*, fol. oblongis serratis : floralib. pinnatis brevibus, capitul. globosis involucri longioribus. Cav. ic. 6. p. 36. t. 554. Hab. in Mexico. Germ. hispidum.

26. *humile*, pedunc. radicalibus fol. 2. oppositis, fol. radicalib. ovatis petiolo brevioribus : caulinis sessilibus oblongis serratis, involucr. 10-phyllis tricuspidatis. Cav. ic. 6. p. 37. t. 856. f. 1. Hab. in regno Quintensi. Fol. serraturae in setulam desinunt.

27. *subcaule*, fol. radicalibus ovatis subcrenatis inermibus longe pedunculatis, pedunc. nudis radicalibus. Cav. ic. l. c. fig. 2. In Nov. Hispania.

28. *ovalifolium*, simplex, fol. ovalibus dentatis, capitulis omnib. pedunculatis involucri paulo breviorib., paleis tricuspidatis. Michaux. 1. p. 163. Hab. in Carolinae subhumidis.

29. *nudicaule*, fol. radicalib. oblongo-spathulatis serratis ciliatisque, caul. nudo, involucr. longitudine capitulorum. Lam. l. c. p. 758. Ill. gen. t. 187. f. 2. Hab. in Monte-Video. Commeris. Fol. radicalia rosacea congesta. Pal. simpl.

30. *fortidum*, pumilum graveolens, fol. spinuloso-serratis : radicalibus cuneato oblongis rosaceo-congestis, caul. dichotomo, paleis longissimis lineari-lanceolatis. Michaux. Flor. l. c. Lam. enc. 4. p. 758. Sloan. jern. hist. 1. p. 264. t. 176. f. 3 et 4. Herm. Lugd. t. 237. Hab. in Amer. boreali et meridionali. Odor valde ingratus. ♂

\* \* *Bromeliae-folia* : fol. integerrimis margine ciliato-spinulosis.

31. *aquaticum*, fol. gladiatis ciliato-spinosis : floralibus indivisis brevissimis. Lam. l. c. p. 758. E. Yuccifolium. Michaux. Flor. 1. p. 164. Jacq. ic. rar. t. 347. Moris. s. 7. t. 37. f. 21. Hab. in Americae paduosis. Paleae lanceolatae, indivisae.

32. *virginianum*, fol. gladiatis serrato-spinosis : floralibus dissectis reflexis, caul. apice corymboso. Lam. l. c. p. 759. E. aquaticum. Michaux. p. 163. Pluck. Alm.

t. 366. f. 3. Hab. in Virginia et Carolina. Palaeae 3-5-cuspidatae.

33. *longifolium*, fol. gladiatis ciliato-spinosis : floribus brevissimis 3-5-fidis, caul. apice dichotomo. Cav. ic. 6. p. 36. t. 555. Hab. in imp. Mexicano. Capit. globosa, cicere minora. Palaeae integrae. C.

34. *abracteatum*, fol. gladiatis subintegerrimis, caul. superne trichotomo, capitulis cylindricis nudis. Lam. enc. 4. p. 759. Hab. circa Paraguay in Monte-Video et Bonaria. Commers.

669. ARCTOPUS. *Umbella simplex*, involucello monophyllo 4-partito spinoso magno cincta. Flosa plures in disco masculi, 4 in radio faeminei. Cal. 5-dentatus. *Petala* integra, oblonga. *Fruct.* 4, in involucello connivente reconditi. *Flor.* masculi in distincta planta : involuero 5-phylo. Juss. (Habitus Eryugii.)

1. *echinatus*. L. Reich. Syst. pl. 4. p. 360. Lam. ill. t. 855. Burm. Afr. p. 1. t. 1. (Mas.) Hab. in Aethiopia. *Flor.* inter fol. terminales. Fol. conferta, sinuata, ciliata, supra spinosa,  $\mathcal{T}$

670. EXOACANTHA. *Involucr.* spinosum. *Involucr.* dimidiata. *Flor.* omnes hermaphroditi, aequales. *Sem.* 1. ovata, striata.

1. *heterophylla*, fol. pinnatis : foliolis radicalibus ovatis dentatis incis, caulinis lanceolatis acutis. Billardiere. Pl. Syriacae. p. 10. t. 2. Lam. ill. t. 100. Willd. 2. p. 1379. Hab. prope Nazareth.  $\mathcal{G}$

671. ECHINOPHORA. *Flor.* laterales masculi : centrali hermaphrodito. *Sem.* 1, involucello immersum.

1. *spinosa*, foliolis subulato-spinosis integerrimis, trifidisque. Cav. ic. 2. p. 24. t. 127. Willd. Sp. 2. p. 1378. Smith. Brit. 1. p. 203. Hab. ad littora maris, praesertim Mediterranei.  $\mathcal{T}$

2. *tenuifolia*, fol. incis inermibus. Column. ecphr. 1. p. 98. t. 101. Moris. 2. 9. t. 1. f. 2. Hab. in Apuliae maritimis apricis, salis. Fol. radicalia ampla, 3-pinnata. Lam.  $\mathcal{T}$

672. HYDROCOTYLE. *Umbella* simplex : *Involucr.* 4-phyllum.

*Petala* integra. *Sem.* semiorbiculato-compressa.

1. *vulgaris*, fol. peltatis orbiculatis undique emarginatis, umbel. 5-floris. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1360. Flor. dan. t. 50. Curt. Lond. ic. Hab. in paludosis et inundatis, etiam in Jamaica. Umb. e centro saepe prolifera.  $\mathcal{T}$

(?) *verticillata*, fol. peltatis ovalibus, umbell. verticillatis. Thunb. l. c. t. 3. Hab. . . . Similis *vulgari* dicitur ; sed. fol. majora, petioli longiores, et umbel. verticillatae.  $\mathcal{+}$

2. *natanans*, fol. reniformibus repando-crenatis natanantibus. Thunb. Dess. acad. p. 412. Cyrill. Pl. rar. Neap. t. 6. Hab. in Italia.

3. *tribotys*, fol. peltatis subrotundo-reniformibus bicerenatis, umb. radiis 3 longissimis, flor. verticillatis subquinis.

4. *umbellata*, fol. peltatis crenatis, umbellis multifloris. L. pedunculatis. Michaux. Flor. 1. p. 161. Hab. in Americae humidis. Differt a prima flosculis non 5, sed pluribus quam viginte, in umbellam simplicem digestis. L.

5. *bonariensis*, fol. subpeltatis reniformi-subrotundis crenatis, umbella composita, radiis ramosis apice lateribusque floriferis. Lam. l. c. enc. 3. p. 147. Cav. ic. 5. p. 60. t. 488. H. multiflora. Flor. Per. 3. p. 24. t. 246? Hab. in arenosis maritimis Bonariae versus Monte-Video e Lima humidis. Umb. composita, prolifera. C.

6. *americana*, fol. reniformibus sublobatis crenatis, umbel. paucifloris sessilibus. Lam. l. c. Michaux. p. 162. Hab. in Amer. et in India orientali.  $\beta$ . gracilis, caul. filiformi stricto, fol. minorib. Michaux.

7. *hirsuta*, hirsuta, fol. reniformibus lobatis crenatis, flor. verticillatis, verticillis quadrifloris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 560. Hab. in sylvis montosis Hispaniolae locis humidis umbris.  $\mathcal{T}$

8. *triflora*, fol. reniformibus crenatis, pedunc. trifloris. Flor. Per. 3. p. 245. Hab. in Chile locis humidis. Caul. repens. Sem. villosa.

9. *globiflora*, fol. reniformi subrotundis duplicato-crenatis, umb. globosis multifloris. Fl. Per. l. c. p. 25. t. 247. In Peruv. nemorib. et humilibus versus Manna. Hirsuta. Caul. purpurasc.  $\mathcal{T}$

10. *gracilis*, fol. peltatis sinuatis crenatis umbell. 6-floris. Flor. Per. 3. p. 26. t. 247. In Peruv. stagnatis. Pusilla. Caul. filiform. villosus. ¶

11. *quinqueloba*, fol. peltatis quinquelobis : lobis acutis duplicato-serratis, umbel. globosis verticillatis. Flor. Per. 2. p. 25. t. 248. Hab. in Peruviae nemorib. Villosa. ○

12. *moschata*, fol. reniformibus septemlobatis serratis villosis, umbellis multifloris. Forst. prod. n.º. 135. Hab. in Nova Zeelandia.

13. *citriodora*, fol. reniformib. 7-9-sinuatis crenatis hirsutis, umb. parva multiflora. Flor. Per. p. 26. In reg. Chilens. campis humilib. et umbrosis. Fol. fricata odorem Melissae aut Citri exhalant. ¶

14. *incrassata*, fol. reniformib. 7-9-sinuatis crenato-serratis : serraturis incrassatis albicantib., umb. multifloris globosis. Fl. Per. 1. c. In Peruviae umbrosis. Caul. purpurasc.

15. *acutifolia*, fol. cordatis acutis sinuatis crenatis, umb. simplicibus globosis multiradiatis. Flor. Per. p. 25. t. 248. Cresc. c. priore. Subvillosa.

16. *asiatica*, fol. reniformibus dentato-crenatis. L. Petiolis scapisque fasciculatis. Lam. enc. 3. p. 152. Thunb. prod. 49. Rumph. 5. t. 169. f. 1. Rh. ed. 10. t. 46. Hab. in India orientali et Cap. b. sp. ? ¶

β ? *lunata*, fol. semilunatis crenatis basi truncatis, petiolis scapisque fasciculatis. Herb. cum priore, cujus tantum var. ?

17. *Sibthorpioides*, fol. cordato-orbiculatis obsolete lobatis crenatis, scapis subsolitariis petiolis longiorib. Lam. l. c. p. 153. Hab. in ins. Franciae. Fol. minima.

18. *Ficarioides*, tota glabra, fol. cordato-subrotundis obsolete angulosis laevibus, petiolis scapisque brevibus, umbel. subquinquefloris. Lam. l. c. Cresc. c. priore. Fol. parva undulata. Flor. 5, minuti subcapitati.

19. *repanda*, fol. rotundato-cordatis (majusculis) subanguloso-repandis : petiolis (nervisque) pilosis, capitulo pedunculato trifloro villosa. H. *Ficarioides*. Michaux. p. 161. Hab. in ulis Cur. infer. †

Obs. A priore diversa videtur. Ceterum tres hae species H. asiaticae omnino affines, et ulterius ex. minandae.

20. *erecta*, fol. cordatis crenatis, scapis paucifloris longitu-line petiolorum. Linn. suppl. 177. Hab. in Jamaica.

21. *villosa*, tomentosa, fol. cordatis integerrimis tomentosis villosis. Linn. suppl. 175. Centella villosa. Lin. Amoen. acad. 6. afr. 98. Mercurialis afra. L. Mant. 298. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. volubilis. Dioscoreae facie. Caul. prostrati apice foliosi floriferique.

22. *glabrata*, glaberrima, fol. obovatis s. lanceolatis acutis trinerviis glaberrimis. Linn. suppl. 175. Centella glabrata, fol. lanceolatis. L. Hab. ad Cap. b. spei.

23. *Ranunculoides*, fol. quinquepartitis incis. umbellis simplicibus. Willd. p. 1363. Hab. in Mexico. Caul. repens geniculatus.

24. *Saniculaefolia*, fol. ternatis subpalmatis, lobis crenatis, lateralibus bipartitis, umbella composita. Lam. enc. 3. p. 147. t. 188. f. 4. Cav. ic. 5. t. 438. f. 2. Hab. in Bonaria.

25. *Solandra*, tomentosa, fol. cuneiformibus ovatis retusis septemdentatis. Linn. suppl. 176. H. tomentosa, fol. obovatis dentatis tomentosis. Thunb. prod. 49. Solandra capensis. L. Hab. ad Cap. b. spei. †

26. *tridentata*, tomentosa, fol. lineari-cuneiformibus apice tridentatis. Linn. suppl. 176. H. fol. cuneatis trifidis villosis. Thunb. Diss. bot. 2. p. 412. t. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Simillima priori.

27. *triloba*, caul. suffruticoso, fol. cuneiformibus trilobatis glabris. Thunb. Diss. acad. p. 412. t. 3. Hab. ad Cap. bon. spei.

Obs. An forte una cum priore *Azorellae* species, cujus habitum refert ?

28. *lineata*, minuta glaberrima, fol. crassiusculis lineari-cuneatis transversim lineatis, umbella pedunculata. Michaux. Flor. 1. p. 162. Hab. in Carol. inferioris inundatis. Affinis H. chineasi. L.

29. *sinensis*, fol. linearibus, umbellis multifloris. Thunb. Diss. acad. 2. p. 411. Hab. in China.

30. *linifolia*, fol. lineari-lanceolatis subulcatis, umbel. paucifloris. Thunb. Diss. acad. 2. p. 411. Lin. suppl. p. 176. Hab. ad Cap. b. spei. Chinesis. L. ? cir. Thunb. l. c.

31. *virgata*, glaberrima fol. semiteretibus sulco exaratis internodiis longioribus. Linn. suppl. 176. Lam. enc. 3. p. 148. t. 188. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Var. humilior, involucri triphyllis. Lam. l. c.

Obs. An hae tres posteriores revera species diversae ?

## 673. AZORELLA. Umbella simplex.

*Cal.* 5-dentatus. *Petal.* 5, ovato-oblonga, obtusa. *Fructus* subglobosus, striatus, calyce persistenti coronatus. *Involucrum* 3-5-8-phyllyum.

1. *linearifolia*, fol. sparsis linearibus, caul. elongato, umbel. composita. Cav. l. c. t. 485. Hab. in N. Hollandia, prope portum Jackson. *Fruct.* striis exasperatis. An Hydrocotyle?

2. *crassifolia*, caespitosa, fol. imbricatis crassis glaberrimis ovatis apice reflexis, umbel. multiflora. A. caespitosa. Cav. ic. 5. p. 57. t. 484. f. 2. Hab. in regn. Chilensis montib. altissimis. Fere omnes species caespitosae sunt. Planta, uti sequens substantia resinosa onusta.

3. *Chamitis*, caespitosa, fol. congestis vaginantibus integerrimis basi setosis, flor. solitariis. *Chamitis integrifolia*. Gaertn. de fr. t. p. 94. t. 22. Bolax. fol. ovatis integerrimis. Commers. Lam. ill. gen. t. 189. f. 1. A. filamentosa. Vahl. Willd. Sp. p. t. 1365. Hab. in Terra del Fuego, in montibus freti Magellani.

*Obs.* Praeter flores solitarios huic speciei adhuc singulare, quod fructus non raro tripartibilis et trispermus, quo natura umbellae defectum compensare voluisset. G.

4. *trifurcata*, fol. trifidis, petiolis nudis. Vahl. symb. 3. p. 48. (A. caespitosa.) Lam. ill. t. 189. f. 2. Bolax. Juss. *Chamitis trifurcata*. Gaertn. sem. t. p. 95. t. 22. f. 4. Hydrocotyle gummiifera. Lam. enc. 3. p. 136. f. 7. e.

5. *gummiifera*, fol. brevioribus densissime imbricatis. Lam. enc. t. c. ill. t. 189. f. 2.

+ FRAGROSA. *Petal.* inaequalia. *Fruct.* ovatus. *Involucrum* 8-phyllyum. Flor. Peruv. 3.

5. *corymbosa*, fol. imbricatis cuneiformibus trifidis minimis. Flor. Per. 3. p. 27. t. 250. In Peruviae alpih. humilis. Facie Lycopodii. Flor. solitariis. Cor. albidolutescens.

6. *spinosa*, fol. cuneiformibus trifidis spinosis. Flor. Per. l. c. In regn. Chilens. aridis et fruticeis.

7. *multifida*, fol. obovato-cuneiformibus multifidis. Flor. Per. l. c. p. 27. t. 249. f. a. Hab. in Andium alpih. Sem. fulvescentia.

8. *crenata*, fol. obovatis: lacinias acute

crenatis. Flor. Per. l. c. fig. c. In Peruv. collib. frigidis. Sem. purpurascens.

9. *cladophisa*, fol. ovatis cuneiformibusque inciso-serratis. Flor. Per. l. c. t. 250. f. b. Hab. in Peruv. collib. frigidis. *Involucrum* poliphyllum piloso-ciliatum.

10. *reniformis*, fol. reniformibus crenatis pilosissimis. Flor. Peruv. 3. p. 26. t. 249. Hab. in Peruviae umbrosis. Sem. fusca.

674. SPANANTHE. Umbella simplex. Cor. aequales. *Involucrum* subheptaphyllum. *Petal.* lanceolata, patentia. *Fructus* ovalis, in dorso 3-striatus.

1. *paniculata*, caul. erecto, fol. latis triangularibus acuminatis crenatis basi barbatis. Willd. p. 1363. sub Hydrocotyle. Spananthe. Jacq. Icon. rar. 3. p. 247. Coll. 3. p. 247. Hab. circa Caracas. ☉

675. BOWLESIA. Umbella simplex triflora. *Flores* fertiles paralleli. *Petal.* aequalia. *Fruct.* 4-gonus, subpyramidalis. *Sem.* extus concava.

1. *palmata*, fol. palmatis multipartitis: lobis lacinatis: lateralib. bipartitis. Flor. Per. 3. p. 28. t. 251. f. a. Hab. in Peruviae collib. arenosis. Succosa, hispida ex scis 4-6 stellatis. ☉

2. *lobata*, fol. lobatis longe petiolatis. Flor. Per. l. c. fig. b. Hab. in Peruviae alpih. Andium. Setae. pag. fol. super. 3-5-fasciculatae, reliquae octonae, stellatae. Pl. procumbens. ☉

3. *incana*, fol. reniformibus crenato-lobatis. Flor. Per. l. c. t. 268. f. a. Hab. in Peruviae collib. Procumbens. Setae 5-6-fasciculatae, reliquae 12 stellatae.

676. SANICULA. Umbellae confertae, subcapitatae. *Fructus* aculeatus. *Flor.* disci abortientes.

1. *europaea*, fol. radicalib. simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. Flor. dan. t. 283. Engl. bot. t. 58. Hab. in sylvib. ¶

2. *canadensis*, fol. radicalibus compositis: foliolis ovatis. Thunb. prod. 49. Hab. in Virginia et ad Cap. b. spei. ¶

3. *crithmifolia*, fol. decompositis linearibus, umbellis trifidis. Willd. in Act. Berol. v. 2. Arteria squamata. Pallas. in N. Act. Petrop. 10. p. 308.

4. *marilandica*, flosc. masculis pedunculatis, hermaphroditis sessilibus. Jacq. collect. 2. p. 293. Icon. rar. 2. t. 348. Hab. in Marilandia, Virginia.  $\mathcal{T}$

677. **ASTRANTIA**. *Involuc.* partialia latiuscula, lanceolata, patentiaequalia, petalis longiora, colorata. *Flor.* plurimiabortientes.

1. *Epipactis*, fol. quinquelobis obtusis serratis, involucri oblongis obtusis serratis, Willd. Sp. 2. p. 1367. Scop. carn. n°. 303. t. 6. Jacq. aust. 5. p. 32. app. t. 11. Hab. in sylvis montanis et subalpinis Carinthiae, Pannoniae.  $\mathcal{T}$

2. *major*, fol. radicalibus quinquelobis, lobis trifidis acutis dentatis, involucri lineari-lanceolatis integerrimis. Willd. p. 1368. Hab. in alpinis Helvetiae, Hetruriae, Bohemiae, Pyrenaeis.  $\mathcal{T}$

3. *carniolica*, fol. radicalibus quinquelobis, lobis oblongis acutiusculis subtrifidis mucronato-dentatis, involucri integerrimis. Willd. Jacq. austr. 6. app. t. 10. Hab. in alpinis Carnioliae, Carinthiae.  $\mathcal{T}$

4. *minor*, fol. radicalibus digitatis, fol. septenis novenisve lanceolatis acutis profunde dentatis. Willd. Lam. enc. 1. p. 320. t. 191. f. 2. Hab. in alpinis Helvetiae, Pyrenaeis.  $\mathcal{T}$

5. *heterophylla*, fol. caulinis integris ovatis cristato-serratis sessilibus, involucri apice ciliato-serratis. Willd. in N. Act. Berol. v. 2. Hab. in Sibiria.

6. *ciliaris*, fol. lanceolatis serrato-ciliatis. Linn. suppl. 177. Jasionne capensis. Berg. Act. ups. 3. p. 187. t. 10. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. simplex junceus, apice divinus in paucos ramos floriferos.  $\mathcal{L}$

678. **BUUPLEURUM**. *Involucra* umbellulae majora, 5-phylla. *Petala* (flava) involuta. *Fructus* subrotundus, compressus, striatus. (Fol. integerrima.)

\* *Herbacea.*

1. *rotundifolium*, involucri universali nullis, fol. perfoliatis. Linn. Blackw. t. 95. Lam. ill. t. 189. f. 1. Hab. inter segetes.  $\odot$

2. *stellatum*, involucri coadunatis: universali triphylo. Linn. B. fol. gramineis, involucro peculiari octies emarginato. Hall. helv. n°. 771. t. 18. Hab. in alpinis Helvetiae.  $\mathcal{T}$

3. *petraeum*, involucri subpentaphyllis coadunatis, universali pentaphyllo, fol. caulinis cordato-lanceolatis amplexicaulibus, radicalibus linearibus. Willd. Sp. 2. p. 1370. Pluck. phytog. t. 50. f. 5.

4. *graminifolium*, involucri heptaphyllis, universali subtriphylo, fol. radicalibus linearibus, scapis monophyllis. Vahl. symb. 3. p. 48. B. petraeum. Jacq. Coll. 1. p. 209. Icon. rar. 1. t. 56. Vill. delph. 2. p. 576. t. 14. Hab. in montibus Galliae, Italiae, Carinthiae.  $\mathcal{T}$

5. *angulosum*, involucri pentaphyllis orbiculatis, universali triphylo ovato, fol. amplexicaulibus cordato-lanceolatis.  $\mathcal{L}$ . Perfoliata alpina. Hab. in Pyrenaeis.  $\beta$ . in Vallesiae alpinis. Var.  $\beta$ . fol. angustissima striata.  $\mathcal{L}$ .  $\mathcal{T}$

6. *pyrenaicum*, involucri pentaphyllis subrotundis emarginatis connatis, universali triphylo, basi inciso, fol. lanceolatis cordatis amplexicaulibus. Willd. Gouan. illust. p. 8. t. 4. f. 1. 2. Hab. in Pyrenaeorum monte Laurenti.  $\mathcal{T}$

7. *longifolium*, involucri pentaphyllis ovatis: universali subpentaphyllo, fol. ovatis amplexicaulibus. Hab. in Germania, Thuringia, inque monte Jura Helvetiae.  $\mathcal{T}$

8. *falcatum*, caul. flexuoso, involucri pentaphyllis acutis, universali subpentaphyllo, fol. lanceolatis, caule flexuoso.  $\mathcal{L}$ . Jacq. austr. t. 158. Hab. in collibus et sylvaticis calcareis, gypsaceis, frequens. Fol. radicalia ovata.  $\mathcal{T}$

9. *exaltatum*, involucri utroque subpentaphyllo minimo, fol. omnibus linearibus: inferioribus elongatis, caul. erecto paniculato. Tableau de la mer Caspienne, etc. no. 8. In pratis montosis et collibus siccioribus, etiam Tauriae.

10. *caricifolium*, involucri pentaphyllis cuspidatis, universali monophyllo lanceolato, fol. linearibus basi attenuatis. Willd. B. gramineum. Villars. delph. 2. p. 573. Hab. in montibus Delphinatus, Vallesiae.  $\mathcal{T}$

11. *Odontites*, umbell. lateralibus oppositifoliis subsessilibus: radiis inaequalibus, involucri pentaphyllis lanceolato-linearibus coloratis longioribus. Desf. Atl. 1. p. 229. Jacq. hort. t. 91. Coll. 3. p. 68. J. Bauh. hist. 3. p. 201. ic. Hab. in alpinis Vallesiae, Italiae rupestrib. et inter Barbariae segetes.  $\odot$

12. *semicompositum*, fol. lanceolatis mucronatis: inferioribus obtusis, involucri subulatis:



subulatis : partiali flor. longiore, umbel. radiis inaequalibus, sem. aspero. Desf. l. c. p. 230. Gouan. ill. p. t. 7. f. 1. Hab. in Hispania, Monspelii et in Algeriae orvis. Var. fol. caul. inferiorib. lanceolatis acutis. D. ☉

13. *procumbens*, caul. procumbente, fol. lineari-subulatis, ramulis paniculatis, involucl. subovatis acutis brevissimis, sem. rugoso. Desf. l. c. Hab. prope Tunetum. Affine B. tenuissimo. ☞

14. *ranunculoides*, involucl. pentaphyllis lanceolatis longioribus : universali triphylo, fol. canlinis lanceolatis. L. Jacq. Collect. 3. p. 66. Park. theatr. t. 338. Hab. in Helvetia et Pyrenaeis. ☞

15. *rigidum*, caule dichotomo subnudo, involuclis minimis acutis. Hab. Monspelii. Fol. lanceolata, nervosa, rigida. Involucl. 3-phyllum.

16. *tenuissimum*, umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris. Engl. bot. t. 478. Flor. dan. t. 1060? Column. cephr. t. p. 85. t. 247. Moris. s. q. t. 14. f. 4. Hab. in Germania, Anglia, Gallia, Italia. Caul. ramosissimus. Fol. linearis. Umbellulae axillares. L. ☉

17. *baldense*, caule erecto ramoso, fol. linearibus, involuclis subtetraphyllis inaequalibus umbella brevioribus, involuclis pentaphyllis. Willd. Turra. giorn. p. 47. t. 1. Hab. in montanis subalpinis Croatiae, Carnioliae et in monte Baldo. ☞

18. *Gerardi*, caule erecto ramosissimo, fol. linearibus acuminatis involuclis pentaphyllis lineari-subulatis umbella longioribus. Willd. Jacq. austr. 3. t. 256. B. junceum. Hab. in Gallia, Italia, Palatinatu, Austria. ☉

19. *junceum*, caule erecto paniculato, fol. linearibus, involuclis triphyllis longitudine umbellae, involucl. pentaphyllis. Willd. Hab. in Gallia, Italia, Helvetia, Germania. ☉

20. *nudum*, caule ramoso aphylo, fol. radicalibus decompositis planis incis, involuclis involuclisque lanceolato-oblongis. Ait. Kew. 1. p. 331. Hab. ad Cap. b. spei. ☞

#### \*\* Frutescentia.

21. *arborescens*, frutescens, fol. oblongis integerrimis petiolatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spei. ☞

22. *fruticosum*, frutescens, fol. lanceolato-obovatis integerrimis sessilibus. Willd. B. fol. obverse ovatis in petiolum

attenuatis. Hort. cliff. 104. Hab. in Galliae australis et Orientis saxosis maritimis. ☞

23. *frutescens* (hispanicum), frutescens, fol. striatis lineari-subulatis rigidis, inflores. ramosa, involucl. subtetraphyllis, involucl. umbellula brevior. Desf. l. c. p. 231. Cav. ic. 2. t. 106. B. angustifolium hispanicum. Barrel. t. 255. Hab. in collib. incultis prope Flemsen.

24. *gibraltarium*, fruticosum, fol. rigidis lanceolatis obliquis erectis mucronatis, involucl. reflexis. Desf. p. 233. Lam. enc. 1. p. 520. B. coriaceum. J. Herit. Stirp. t. 67. Willd. Sp. p. 137. B. obliquum. Vahl. Hab. in Hispan. prope Gibraltari et in Cap. Bon. dicto apud Tunetanos. Affine priori. Fol. utrinque glauca.

25. *plantagineum*, fruticosum, fol. pennantibus lanceolatis nervosis mucronatis, ramis floriferis ramosis striatis, involucl. subulatis adpressis. Desf. p. 233. t. 37. Hab. in Atlant. prope Bongie. Involucl. univ. 5-7-phyllum. ☞

26. *canescens*, fruticosum, fol. ovali-lanceolatis obtusis nervosis subsessilibus. Schoushoe. p. 113. Hab. in fruticeto prope Magadore. Glabrum, glaucescens. Involucl. univ. 5-phyllum. Priori affine.

27. *spinosum*, frutescens, ramis paniculae senilibus nudis spinescentibus, fol. linearibus. Linn. suppl. t. 8. Gouan. illust. p. 8. t. 2. f. 3. Habit. in Hispania. Panicula deflorata in spinas transiens more Alyssi spinosi. L. ☞

28. *difforme*, frutescens, fol. vernalibus decompositis planis incis, aestivalibus filiformibus angulatis trifidis. L. B. fruticans, fol. filiformibus trifidis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. hyemalia Petrowskii, aestivalia Spartii. L. ☞

679. HERMAS. Polygama. Involucl. universale 3-12-phyllum : partiale 2, 1-laterale. Umb. hemisphaerica; radiis (flor. masculis deciduis) truncata. Umbellulae laterales flor. masculis tantummodo instructae. Sem. suborbiculata, compressa, stria longitudinali elevata. (Fol. tomentosa.)

1. *depauperata*, fol. cordato-oblongis supra nudis subamplexicaulibus, axillis superioribus et involucl. lanuginosis. Lam. enc. 3. p. 121. Lin. mant. p. 290. Burm. t. 71. f. 2. Eupleurum villosum. Lin. Sp.

pl. 2. p. 343. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequentibus omnibus.

2. *gigantea*, fol. ovato-lanceolatis supra lanuginosis subtus tomentosis obsolete crenatis. Lin. suppl. p. 435. Lam. l. c. Bupleurum. Thunb. prodr. p. 50. sub Bupleuro. Fol. Verbasci. Caul. 4-pedalis.

3. *capitata*, fol. ovatis incisio-crenatis subtus tomentosis, umbel. capitatis. Thunb. prodr. l. c. Lin. suppl. p. 435. Pl. parva. Fol. fere ut in Dryade octopetala. Umb. radii non truncati. Lam. enc. 3. p. 122.

4. *quinquedentata*, caul. glabro, fol. ovatis quinquedentatis subtus tomentosis, umbel. solitaria. Lin. suppl. l. c. Fol. parva.

5. *ciliata*, caul. glabro, fol. ovatis ciliatis subtus tomentosis, umbel. pluribus. Lin. suppl. p. 436.

680. CAUCALIS. Cor. ut plurimum radiata: disci masculæ. Petala inflexo emarginata. Fructus setis hispidus. Involucrum polyphyllum integrum, aut nullum.

1. *grandiflora*, involucris singulis pentaphyllis: foliolo unico duplo majore, petalis exterioribus maximis. Jacq. austr. t. 54. Willd. p. 1383. Hab. in Europa inter segetes. ☉

2. *daucoides*, umbellis trifidis aphyllis, umbellulis trispermis triphyllis. Jacq. austr. t. 157. Moris. s. g. t. 14. f. 6. Hab. in arvis. Nomen haud aptum. Involucrum universalis loco villus adest albidus.

3. *latifolia*, umbella universali trifida: partialibus pentermis. fol. pinnatis serratis. Jacq. hort. t. 128. Hab. in Germania, Helvetia, Gallia, Oriente inter segetes. Folioli lanceolata. Flor. rubri.

4. *mauritanica*, involucro universali monophyllo, partialibus triphyllis. L. Walth. hort. 127. Hab. in Mauritania. ☉ †

5. *maritima*, humilis pubescens, laciniis foliorum obtusiusculis, umbellis involucriatis bifidis, fructibus ovatis crassis, aculeis inaequalibus flavescentibus. Lam. enc. 1. p. 657. Car. ic. 2. p. 1. t. 10. C. pumila. Vahl. Willd. Daucus muricatus. (3. L. Hab. in maritimis Europae australioris et Barbariae. Caul. fusco-tomentosus. Pedunc. subradicales. ☉

6. *orientalis*, umbellis patentibus, foliolis partialibus supradecompositis laciniatis; laniulis linearibus. Moris. s. g. t. 14.

f. 5. Bellon. it. lib. 3. t. 200. Hab. in Oriente. Semina setis exstantibus apice viscoso-glandulosi. L. ♂

7. *capensis*, caule humillimo aspero, involucris et involuclis subtriphyllis, fructibus globosis muricatis. Lam. enc. 1. p. 657. C. africana. Thunb. prodr. p. 49? Hab. ad Cap. b. spei.

8. *platycarpus*, umbellis trifidis. involucris et involuclis triphyllis, umbellulis dispermis. Lam. enc. 1. p. 650. Gouan. fl. monsp. 285. Moris. s. g. t. 14 f. 2. Colum. ecphr. 1. t. 94. f. 2. Hab. in Gallia australi, Italia. Fruct. magnus purpurascens.

9. *leptophylla*, involucro universali subnullo, umbella bifida, involuclis pentaphyllis. L. Hab. in Europa australiori inter segetes. Fructus setis fulvis s. flavis distinctus. Habitu C. Daucoidis.

10. *humilis*, caul. retrorsum hispidulo, umbell. biradiata, involucro 0, involuclis subpentaphyllis, fructibus elongatis pilis confertis petiolo-uncinatis. Desf. Atl. 1. p. 239. Jacq. hort. 2. t. 165. C. parviflora. Lam. Enc. 1. p. 656. Hab. in Galliae meridionalis et Barbariae segetibus. Involucrum partiale heptaphyllum. Desf. Sem. setis flavescentibus. An ab antecedente diversa?

11. *Anthriscus*, caul. elongato, ramis erectiusculis, folioli ovato-lanceolatis pinnatifidis, involucro universali subnullo. Tordylium Anthriscus. Lin. Jacq. Austr. t. 261. Curt. Lond. ic. Torilis Gaertn. Hab. ad sepes, in ruderalis. Involucrum universale observavi vix ullum, quod ab aliis polyphyllum affirmatur.

12. *arvensis*, involucro universali subnullo, seminibus ovatis, stylis reflexis, fol. decompositis, foliolo ultimo linearilanceolato, caul. remosissimo. Ait. Kew. 1. p. 334. C. helvetica. Mur. r. syst. veg. p. 276. Jacq. hort. 3. p. 12. t. 16. C. infesta. Curtis. Lond. ic. C. segetalis. Thuillier. Hab. in agris. Pedalis, ramis congestis. An hujus loci Scandix infesta. Lin.? ☉

13. *nodosa*, caul. prostrato, umbellis simplicibus sub-sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. Lin. sub Tordilio. Jacq. Austr. app. t. 24. Engl. bot. t. 199. Hab. ad margines agrorum, etc. Sem. latere interiora tantum tuberculata.

681. DAUCUS. Cor. subradiatæ. Flosculi disci abortivi. Fructus pilis hispidus. (Umbella fructus contractus, infundibuliformis.)

1. *Carota*, seminibus hispidis, petioli

rubus nervosis, folior. laciniis angustolincaribus acutis. Lam. enc. 1. p. 634. Flor. dan. t. 723. *β. sylvestris* flosc. centrali rubro sterili. Hab. in pascuis, arvis.

*β. polygamus*, umbel. flosculis marginalibus pluribus masculis. Gouan. illustr. pag. Jacq. hort. 3. t. 38. Hab. in Hispania. Sem. pilis longioribus instructa dicuntur.

*Obs.* Vidi adhuc varietatem *D. Carotae* locis siccis colliculosis lectam, involucr. laciniis integerrimis distinctum; occurrit quoque in Argentorati agris post segetem var. memorabilis a b. Hermann *exigua* denominata, caul. dichotomo divaricato.

\* *maritimus*, involucr. brevibus dissectis, umbellis parvis, fol. tenuiter dissectis glabris lucidis, caul. subnudo. Lam. 1. c. *D. Carota*. *β. Smithi* brit. 1. p. 300. Hab. in Angliae et Galliae meridionalis marijimis. An distincta species?

2. *mauritanicus*, seminibus hispidis, flosculo centrali sterili carnoso, receptaculo communi crasso hemisphaerico, fol. laetis glabris, foliol. ovatis incisuris dentatis. Lam. 1. c. Moris s. g. t. 13. f. 4. Hab. in Hispania, Italia, Mauritania. Conf. *D. grandiflorus*. Desf. Atl. 1. p. 243.

*β. lucidus*, fol. lucidis, caule hirsuto, petiolis laevibus. Linn. suppl. 179. *D. hispanicus* seminibus aculeatis, flosculo centrali sterili nullo, caule nitido. Gouan. illustr. g. Moris 3. s. g. t. 13. f. 4. Hab. in Italia, Hispania, Mauritania. *♂*

3. *gummifer*, involucll. bracteaeformibus simplicibus latis membranaceis ad latera coheratis, fol. laciniis ovatis incisuris dentatis. Lam. Bocc. Mus. t. 20. Hab. in lapidosis, marijimis Europ. australioris.

4. *grandiflorus*, caul. piloso, fol. decompositis: foliolis linearibus acutis, umbel. lateralibus, fol. brevioribus, sem. aculeis peltato-stellatis. Desf. Atl. 1. p. 240. t. 59. Hab. in Algeriae segetibus. Facie *Cauc. grandiflorae*. Petala in ambitu maxima.

5. *parviflorus*, fol. multifariam pinnatis: pinnulis inferiorum ovato-oblongis incisuris: superiorum linearibus acutis, caul. scabro, umbel. distinctis, petal. minutissimis favescentibus. Desf. Atl. 1. p. 241. t. 60. Hab. ad littora prope Arzeau. Petal. minima favescentia. Sem. teretia, apice peltata.

6. *aureus*, caul. dichotomo piloso scabro, cor. radiantibus flavis, acul. rigidis, apice peltato uncinatis. Desf. p. 242. Hab. inter segetes circa Mascar. Petal. in ambitu majora. *⊙*

7. *crinitus*, foliol. verticillatis multifariam pinnatifidis rigidulis acutis, involucr. apice multiartitis, semine crinito. Desf. p. 242. t. 62. Park. Theatr. 1331. In Atlante et in collib. incultis prope Masc. et Flems. Sem. setae longae molles violaceae aut albae. Flor. contriti aromatici. *D.*

8. *Gingidium*, radiis involucri planis: laciniis recurvis. Lin. *Gingidium*. Math. Comm. p. 372. t. 373. Bocc. sic. ic. 40. Moris. s. g. t. 9. f. 10. Hab. Mompeli. *⊙* +

9. *muricatus*, seminibus triglochidi-aculeatis. L. Desf. Atl. p. 243. Moris s. g. t. 14. f. 4. Herm. par. t. 111. Col. cephr. 1. p. 65. t. 94. Hab. in Mauritania, in arvis. Fol. lere Cari Carvi. Cor. ante anthesin purpurascens. Sem. crassa Caulalidis, aculeis validis. *D.* *⊥*

10. *hispidus*, caul. hispido, pil. inferioribus retroversis, fol. subbipinnatis: foliol. ovatis inciso-lobatis villosis, acul. sem. peltato-stellatis. Desf. p. 243. t. 61. Hab. in rupium fissuris ad maris littora. Petala flava. Affin. *D. maritimo*.

11. *glaberrimus*, glaber, fol. pinnatis foliol. ovatis incisuris: terminali trilobis: lac. obtusis, umbellul. distinctis, sem. muricatis. Desf. p. 244. t. 64. Cresc. in sylv. Palmarum prope Tozer. Umbel. parva, umbellul. distinctae in pedunc. longis, facie Ammeos.

12. *copticus*, flor. aequalibus, fol. tripinnatis glabris, foliol. linearibus angustissimis, caul. laevi. Lam. enc. 1. p. 635. Ammi copticum. Lin. Jacq. hort. t. 196. Hab. in Aegypto. Sem. uti in ceteris Daucis.

13. *setifolius*, caul. laevi, fol. setaceis pubescentibus, sem. semicylindricis: angulis ciliato-echinatis. Desf. 1. p. 244. t. 65. Sem. turgida, cinerea, pubescentia. An *Visnaga*? Hab. in collib. prope Mascar.

14. *alatus*, seminib. angulis membranaceis hispidis, flore parvo luteo. Poir. ii. 2. p. 135. Cresc. ad maris littora prope La-Calle.

682. A M M I. *Umbella laxa*. Involucra pinnatifida. Cor. radiata: omnes hermaphroditae. Fructus laevis, striatus.

\* *Y I S N A O A . )* *Daucoides*, umbel. decorata concava.

1. *Visnaga*, fol. decompositis subbifloribus, sem. inter strias villosis, umbel.

V 2

universali basi coalita. Lin. Willd. p. 1391. sub *Dauco*. *Visnaga daucoides*. Gaertn. de fr. 1. p. 92. t. 107. Lab. ic. 716. Hab. in Gallia, in Oriente et in Barbaria. Radii umbellae, calore exsiccati, ad dentiscalpia adhibentur. Schousb. Hinc Gallis *Herbe aux cure-dents*.

2. *Meoides*, fol. multifidis capillaceis, petiolis canaliculatis. Ammi anethifolium. Lam. 1. c. *Dauc. Meoides*. H. Par. Hab. in Oriente. Sem. glaberrima.  $\overline{\text{T}}$

\*\* *Umbel. laxa subdivaricata*.

3. *majus*, fol. inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, superioribus multifidis linearibus. L. Blackw. t. 447. Willd. p. 1392. Hab. in Europae australis et Orientis vinctis, arvis.  $\odot$

4. *glaucofolium*, fol. bipinnatis: foliolis pinnatis trifurcatis linearibus albo-acuminatis. Villars. Delph. 2. p. 592. *Dauc. petraeus glaucofolius*. Bauh. hist. 3. p. 58. Hab. in Gallia meridionali et circa Parisios.  $\overline{\text{T}}$

5. *divaricatum*, sem. striatis ovatis, caul. ramoso divaricato, umbel. radiis subtrifloris. Gmel. Syst. N. L. II. p. 474. sub *Dauco*. Walt. Flor. Carol. p. 114. Hab. in Amer. boreali. Pedale. Sem. glaberrima, profunde striata.

6. *capillaceum*, fol. omnibus capillaceo-multifidis, sem. glaberratis. Michaux. Flor. 1. p. 165. Hab. in Carolinae campestris. Statura Am. copticis. L.  $\dagger$

7. *daucifolium*, fol. supradecompositis, foliol. tripartito-pinnatifidis acutis. Willd. p. 1393. Scop. carn. n. 342. t. 10. *Crithmum pyrenaicum*. Hort. cliff. 94. Hab. in Pyrenaeis, Carniolia.  $\overline{\text{T}}$

683. *ARTEDIA*. *Involucrum* pinnatifidum. *Cor.* radiatæ. *Flor.* disci masculi. *Fructus* compressus, margine lobis membranaceo-scariosis cinctus.

1. *squamata*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1389. Lam. ill. t. 193. Hab. in Libano. Fol. multipartita - tenuia. Sem. non hispida, sed disco glabra striis elevatis, margine lobato-alata, magna.  $\odot$

684. *BUNIU*. *Cor.* uniformis. *Umbella* conferta. *Fructus* ovatus.

1. *Bulbocastanum*, fol. uniformibus, petioli subaequalibus, involucri polyphylo. Willd. p. 1394. Flor. dau. t. 220. *B. minus*

fol. uniformibus, involucri polyphylo fructib. subcylindricis apice crassioribus, stylis reflexis deciduis. Gouan. ill. 10. Moris. s. 9. p. 204. t. 2. f. 1. Hab. in sylvaticis, agris et arvis. Rad. edulis.

2. *majus* (ternatum), fol. canlinis ternatis subsessilibus angustis linearibus, involucr. 3. *B. majus* fruct. ovatis; styl. persistentibus. Gouan. ill. p. 10. Willd. p. 1394. hujus loci. Hab. in Gallia, frequens mihi obvium in pascuis et arbutis prope Montd'or in Auvergne Gall.

3. *flexuosum*, caul. basi attenuato, flexuoso, involucr. subtriphylo. Smith. brit. 1. p. 301. *B. Bulbocastanum*. Curt. Lond. ic. Involucr. 1-3 -phyllum, saepe nullum. Sm.

4. *aromaticum*, foliol. filiformibus, involucr. subhexaphylo, involucl. triphyllis. Lin. Mant. p. 218. Hab. in Creta et Syria. Sem. ovata, minuta, torulis 5, scabrisculis. L.

685. *CONIU*. *Involucella* dimidiata, subtriphylla. *Fructus* subglobosus, 5-striatus, utrinque crenatus.

1. *maculatum*, caule ramosissimo maculato, seminibus striatis Jacq. austr. t. 156. Willd. Sp. 2. p. 1395. Curt. Lond. ic. Hab. in agris, rudertis.  $\odot$

2. *rugosum*, seminibus rugosis. Thunb. prod. 50. *C. suffruticosum*. Berg. cap. 77. Hab. ad Cap. b. spei.

3. *rigens*, seminibus submuricatis, pedunculis sulcatis, foliol. canaliculatis obtusis. L. Hab. ad Cap. b. spei littora maris. Caul. brevis, rigens.  $\text{h}$

4. *africanum*, seminibus muricatis, petiolis pedunculibus laevibus, foliolis planiusculis. Jacq. hort. t. 194. Hab. in Africa. *Glaucum*. Odor Apii graveolentis. L.  $\odot$

5. *dichotomum*, caul. sulcato dichotomo, sem. oblongis compressis sulcatis tuberculosis. Desf. Atl. 1. p. 246. t. 66. Hab. inter segetes prope Mascar. Sem. profunde sulcata.

686. *SELINUM*. *Fructus* ovali-oblongus, compresso-planus, in medio striatus. *Involucrum* reflexum. *Petala* cordata, aequalia. *Cal.* integer.

1. *sylvestre*, caule laevi, radice fusiformi multiplici. Willd. Sp. p. 1398. Linn.

suppl. 180. Flor. dan. t. 412. Moris. 9. 9. t. 17. f. 2. Hab. in Hercynia, Gallia.  $\mathcal{E}$

2. *palastre*, sublaetescens, caule striato, radice fusiformi subdivisa, radiis umbellae hispidis. Willd. Flor. dan. t. 257. Engl. bot. t. 229. S. sylvestre. Jacq. aust. t. 152. S. Tyselinum. Crantz. austr. p. 170. Bauh. hist. In Europae septentrionalis paludibus.  $\mathcal{E}$

3. *austriacum*, caule sulcato, involucrio universali polyphylo, foliol. cuneiformibus incis. Willd. Jacq. aust. t. t. 71. S. argenteum. Vill. delph. 2. p. 636. S. petiolis argenteis et viridibus striis lineatis, semine alis latis albidis. Crantz. fasc. 3. p. 43. t. 14. f. 2. Hab. in montosis Austriae, Italiae, Galliae.  $\mathcal{E}$

4. *sibiricum*, fol. tripinnatis, involucrio universali partiali. decoloribus enneaphyllis. Reitz. obs. 2. p. 16. Hab. in Sibiria.  $\mathcal{E}$

5. *lineare*, caul. sulcato-striato, foliol. pinnatifidis: lacin. linearibus. Schumacher. Flor. Zealand. p. 95. Hab. in Dania, in aggeribus. Caul. strictus, bipedalis. Fol. vaginac membranaceae, glaucae. Involucra cetaeco-capillacea. S.

6? *Carvisolia*, caule sulcato acutangulo, involucrio universali evanido, foliolis lanceolatis incis. apice calloso-mucronatis, pistillis fructus reflexis. Jacq. austr. t. 16. Gmel. sib. 1. p. 204. t. 48. Carvisolia. Vaill. t. 5. f. 2. Vill. Dauph. 2. p. 629. Ob sem. margine membranacea. Hab. in Germania, Helvetia, Sibiria, Austria.  $\mathcal{E}$

7. *appianum*, caul. tereti striato: involucrio universali monophyllo, fol. vaginis amplexicaulib. erectis, foliolis filiformibus mucronatis. Viviani Flor. ital. fragm. t. x. Hab. inter saxa montium Carrarae. Habitu rigido.

8. *Chabraei*, caule tereti striato, involucrio universali nullo, vaginis foliorum laxis, foliolis filiformi-linearibus. Willd. Jacq. aust. t. t. 72. Peucedanum Carvisolia. Vill. delph. 2. p. 630. Hab. in nemoribus Germaniae, Galliae, Italiae.  $\mathcal{E}$

9. *Seguieri*, caule subtereti striato, involucrio universali nullo, foliol. trifidis linearibus mucronatis. Willd. Jacq. hort. t. 61. Sequier. var. 2. p. 41. t. 13. Hab. in Italia, Carniolia. Caul. quadripedalis laevis non striatus, nisi in summitate.  $\mathcal{E}$

10. *Monnieri*, umbellis confertis, involucrio universali reflexo, seminum costis quinque membranaceis. Jacq. hort. t. 62. Hab. in Gallia australi.  $\odot$

11. *decipiens* (frutescens), caule lignoso inferne nudo, fol. inferioribus bipinnatis, pinnulis lanceolatis integris incisisque serratis. Schrad. et Wendl. sert. hannov. fasc. 3. p. 23. t. 13. Hab. . . . Involuc. polyphyllum, foliolis latis lanceolato-cuneiformibus trifidis, margine membranaceis. W.  $\mathcal{H}$

12. *canadense*, nitens glaberrimum, fol. bipinnatis: foliol. multipartitis: lacinii lanceolatis, fructib. ovalibus. Michaux. Flor. 1. p. 165. An Athamantba chinensis. Lin.? Hab. ad ostium flum. St. Laurentii.

13. *Oreoselinum*, fol. triplicato-pinnatis: foliolis ovato-acutis inciso-serratis divaricatis. Athamantba. Lin. Jacq. austr. t. 68. Oreoselinum nigrum. Delarbre, Flor. de la Auvergne. 1. p. 428. Hab. in collibus ardis et ad vinearum margines. Sem. rotundata.

14. *Cervaria*, fol. pinnatis, inciso-angularis, sem. oblongis. Athamantba. Lin. Hort. Cliff. p. 92. S. fol. pinnis semilobatis circumscissatis. Hall. helv. n.º. 804. Roth. germ. 2. p. 354. Jacq. austr. t. 69. Oreoselinum claphobosum. Delarbre l. c. p. 429. Hab. in montosis agrorum et vinearum versusis, etc.

687. MULINUM. *Umbella simplex*. Involuc. polyphyllum. Fructus (turgidus) ovatus, profunde sulcatus: angulis rotundis. Petala lutescentia. Cal. denticulatus.

1. *proliferum*, foliis trifidis vaginantibus: lacinii subulatis, umbel. prolifera. Selinum. Cav. ic. 5. p. 58. t. 486. f. 1. Hab. in Americae meridion. portu Descado. Rad. tortuosa.

2. *microphyllum*, fruticosum, fol. minutis numerosissimis tripartitis: petiolis caul. ambientibus. Cav. l. c. p. 59. fig. 2. Cum priore.  $\mathcal{H}$

3. *spinosa*, fol. quinquepartitis: lacin. lanceolatis acumine pungente, petiol. basi caulem vaginantibus. Cav. l. c. t. 487. f. 1. Hab. in altissimis montibus regni Chilens. in Cordillera. Cal. huic major.

4. *acaule*, fol. ovatis inferne attenuatis, umbel. radicali sessili. Cav. l. c. t. 487. f. 2. Cresc. prope port. Descado. Umb. in centro fol. sedens. Fruct. omnium maximus. Fol. super terram expansa.

Obs. Plantae hac toto habitu a Selinis differunt, quare eas sub distincto genere separavi.

688. *ATHAMANTA*. *Involucr.* polyphyllum. *Fructus* ovato-oblongus, pubescens, striatus. *Petala* inflexa, emarginata. *Cal.* integer.

1. *Libanotis*, fol. bipinnatis planis, umbella hemisphaerica, seminibus hirsutis. L. Jacq. austr. t. 392. Willd. p. 1400. Engl. bot. t. 138. Pluck. alm. rag. t. 153.  $\beta$ . pyrenaica. Jacq. hort. 2. t. 197. Hab. in Sueciae, Germaniae pratis siccis apricis.  $\mathcal{T}$

2. *sibirica*, fol. pinnatis inciso-angulatis. Gmel. sib. I. p. 186. t. 40. f. 1. 2. Hab. in Sibiria. Flor. subtus rubri.  $\mathcal{T}$

3. *condensata*, fol. subpinnatis foliolis deorsum imbricatis, umbella lentiformi. Hab. in Sibiria. Germina villosa. Antherae et receptacula flosculorum purpurea. L.

4. *incana*, tota pubescens incana, fol. supradecompositis, foliolis cuneiformibus quadridentatis, umb. multiradiata globosa. Willd. p. 1402. Hab. in Sibiria.

*Obs.* Similis praecedenti, sed tomento tenui incano, caule crassiore, foliorum forma et parvitate distincta. W.

5. *sicula*, fol. inferioribus nitidis, umbellis primordialibus subsessilibus, seminibus pilosis. Hab. in Sicilia. Fol. inferiora nitida, superiora villosa. Caulis pubescens.  $\mathcal{T}$

6. *Matthioli*, foliolis capillaceis, stylis persistentibus erectis, seminibus oblongis hirsutis. Willd. p. 1403. Jacq. ic. rar. 1. t. 57. A. foliolis elongato-subsetaceis, sem. ovato-acutis striatis hirsutis suavolentibus. Wulff. in Jacq. Coll. 1. p. 211. *Libanotis* rupestris. Scop. carn. n<sup>o</sup>. 315. t. 9. Villars. 2. p. 638. Dalech. hist. p. 758. f. 759. Hab. in Croatia, Carniola et Delphinatu. Rad. longissima.

7. *cretensis*, foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis. Jacq. austr. t. 62. Hab. in Helvetia, Austria, Carniola.  $\mathcal{T}$

8. *annua*, fol. multipartitis: laciniis linearibus teretiusculis acuminatis. Myrrhis tenuifolia annua cretica, semine lanugine alba pubescente. Moris. hist. 3. p. 303. Hab. in Creta. Var. *Cretensis*?  $\odot$

689. *PEUCEDANUM*. *Fructus* ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. *Involucra* brevissima. (Caul. altus. Fol. multifido-linearia.)

1. *officinale*, fol. quinques tripartitis filiformibus linearibus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1405. Gmel. sib. 1. t. 41. Hab. in Europae

australioris pratis pinguibus. Flor. flavescens.  $\mathcal{T}$

\* *gallicum*, fol. quadri-quinques partitis lineari-acuminatis (sublanccolato-linearibus), flor. albis. P. gallicum. Tournef. Hist. d. pl. de Paris. v. 2. p. 478. Hab. in sylvaticis, praesertim prope Fontainebleau. Caul. altus, basi fibris aridis cinctus.  $\mathcal{T}$

2. *arenarium*, fol. subquadripinnatis, umbellis pedunculatis 5-7-fidis, involuc. universali subnullo. Plantar. bonar. p. 18. t. 20. Hab. in clivis arenosis Pestini. Altitudo spectabilis. Rad. profundissime penetrat. Cor. flava. Accedit ad P. *officinale*.

3. *italicum*, fol. tripartitis, foliol. linearibus longissimis. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 2. P. officinale.  $\beta$ . Lin. A prima specie diversum videtur, ob fol. tripartita tantummodo: foliolis 3-plo fere longiorib., etiam multo latioribus.

4. *serotinum*, caul. altissimo, fol. quinques partitis, foliol. ternatis confluentibus. P. *tenuifolium*. Enc. bot. 5. p. 228. Colitur in Hort. Parisiensi. Cor. flavescens. Foliol. basi confluant, apice divergunt.

5. *alpestre*, foliolis linearibus ramosis. Lin. Hort. Cliff. Hab. ...  $\dagger$

6. *capillaceum*, fol. bipinnatis, laciniis capillaceis sulcatis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei, c. sequente.

7. *tenuifolium*, fol. bipinnatifidis, laciniis lanceolatis oppositis alternisque marginatis. Thunb.

8. *sibiricum*, foliolis linearibus acutis, umbellis primordialibus sessilibus. Willd. p. 1406. Hab. in Sibiria. Fol. supradecomposita, foliolis longis linearibus acutis in petiolum partialem decurrentibus. W.  $\mathcal{T}$

9. *japonicum*, fol. quinques tripartitis, foliol. cuneiformib. trifidis. Thunb. jap. 117. Hab. maritimis Japoniae.

10. *Silva*, foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis, involucro universali diphylo. L. Jacq. austr. t. 15. Riv. t. 59. Hab. in Helvetiae, Narbonae, Germaniae, Angliae, subhumidis. Caul. foliola lanceolata, quasi carinata: extimis coadunatis. Flor. lutei, extus albid. L. Involucr. etiam o.  $\mathcal{T}$

11. *alsaticum*, fol. pinnatifidis: laciniis trifidis obtusiusculis, involucro polyphylo. Jacq. austr. t. 70. Hab. in Alsaciae, Austriae, Palatinatus dumetis humidiusculis. Petala lutea.  $\mathcal{T}$

12. *aureum*, fol. tripinnatis, foliolis caulinis lineari-lanceolatis, radicalibus

*oblongis multifidis*. Ait. Kew. 1. p. 341. Hab. in Canariis. ♂

13. *nodosum*, foliis alternatim multifidis, caul. nodoso. L. Hab. in Creta.

14. *geniculatum*, fol. subrotundo reniformibus crenatis. Forst. prod. Hab. in Nova Zeelandia.

690. CRITHMUM. *Involucr. polyphyllum. Fructus ovalis, compressus. Flosculi æquales.*

1. *maritimum*, fol. lanceolatis carnosis. L. Jacq. hort. t. 187. Hab. ad maris litora. ♀

2. *latifolium*, fol. cuneiformibus fissis. Ait. Kew. 1. p. 342. C. fol. pinnatis, foliolis sessilibus obovatis lobatis, lobis dentatis. Linn. suppl. 180. Hab. in maritimis Teneriffae et Salvages. Sesquipedale. Flor. lutei. ♂

3. *canariense*, fol. carnosis bipinnatis basi ample vaginantibus. Cav. in Annal. d. scientias natur. p. 35. Hab. prope Tenerife.

691. CACHRYS. *Involucra polyphylla. Fruct. magnus subovatus, angulatus aut laevis, suberoso-corticatus.*

1. *odontalgica*, fol. radicalibus supradecompositis tomentoso-canis, caule nudo umbellifero, seminibus cortice suberoso laevissimo. Linn. suppl. 181. Willd. Sp. p. 1409. Pall. it. 3. app. n. 75. t. 9. f. 1. 2. 3. Hab. in desertis Sibiriae inter Wolgam et Jaicum. Radix longissima saporis acerrimi unde gaudet vi sialagoga. L. ♀

2. *Libanotis*, fol. bipinnatis, pinnis oppositis linearibus subpungentibus, seminibus sulcatis glabris. Vahl. symb. 3. p. 49. C. semine fungoso sulcato plano minore, fol. Peucedani angustis. Moris. s. g. t. 1. f. 6. Umb. t. 3. f. 3. Hab. in Sicilia. ♀

3. *laevigata*, fol. supradecompositis fernlaceis, lacinis setaceis brevibus, seminibus laevibus non sulcatis glabris. Lam. enc. 1. p. 256. C. peucedanoides. Desf. Atl. 1. p. 250. C. Morisoni. Vahl. Willd. p. 1409. C. semine fungoso laevi, fol. fernlaceis. Moris. umb. 63. t. 3. f. 1. Hab. in Hispania, Gallia australi, Italia et Algeria agris. ♀

4. *humilis*, fol. supradecompositis glabris : foliol. linearibus trifidis mucronatis, seminib. glabrisculis. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 119. Hab. prope Cap Spartel.

5. *microcarpos*, fol. tripartito-decompositis : foliol. setaceis, seminib. clabratissimis crenatis. Tableau de la mer Caspienne. n. 9. Moris. s. g. t. 1. f. 1. Hab. ad margines lapidosos rivorum in montosis inter Kubam et Schamachiam. ♀

6. *sicula*, fol. (glaucis) pinnatis : foliolis linearibus acutis divaricatis, seminib. ovatis sulcatis hispidis. Moris. s. g. t. 1. f. 3. Umb. t. 3. f. 2. Boec. sic. 37. t. 18. Hab. in Sicilia, Hispania et Barbaria. Semina crassissima, sulcata, hispida. ♀

7. *taurica*, fol. bipinnatis, foliolis linearibus acutis, seminibus sulcatis subereulatis. Willd. Hab. in Tauria, inque Sibiria. Sem. triplo minora quam in praecedentibus. Planta dioica W.

8. *cretica*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis serratis, seminibus sulcatis asperis. Lam. enc. 1. p. 257. C. cretica Angelicae folio aphodeli radice. Tournef. cor. 23. Hab. in Creta. ♀

9. *panacisfolia*, fol. pinnatis ternatisque, foliolis oblongis crenatis villosis, seminibus hirsutis. Vahl. symb. 1. p. 25. C. pastinacea. Lam. enc. 1. p. 257. C. tomentosa. Desf. Atl. 1. p. 249. Moris. s. g. p. 267. t. 1. f. 4. C. ungarica panacis folio. Tournef. ins. 325. Boec. sic. 1. t. 1. Hab. in Castilia nova, Sicilia, Barbaria. ♀

10? *crispa*, fol. multifidis, dichotomis foliol. linearibus, caul. humili subdichotomo, sem. alis tenuibus undulato-crispis. Hab. ... Ex hort. b. Monnier Versaliensis. Pulchra. Cor. lutea. Sem. parvula, oculo nudo scabra. An Lascritium?

692. FERULA. *Involucr. universale caducum; partiale polyphyllum. Fructus ovalis, compresso-planus, striis utraque 3. (Caul. ut plurimum altissimus.)*

1. *communis*, foliolis linearibus longissimis simplicibus. L. Willd. p. 1411. Desf. Atl. 1. p. 251. Moris. s. g. t. 15. f. 3. Hab. in Europa australi et in Barbaria. cfr. Lam. enc. 2. p. 454.

2. *sibirica*, foliolis lineari-lubulatis terebintibus, involucrio universali nullo. Willd. Pall. itin. 2. app. n. 102. t. N. Hab. in Sibiriae locis arenosis humidiusculis. ♀

3. *glauca*, fol. supradecompositis : foliolis lanceolato-linearibus planis subtus glaucis. L. Hab. in Sicilia, Italia. ♀

4. *rablensis*, fol. subquadripinnatis, foliolis linearibus planis angustissimis trifidis

simplicibusque. Wulff. Jacq. Coll. 4. p. 312. Hab. in Corinthia.  $\overline{\text{T}}$

5. *tingitana*, fol. laciniatis : laciniulis tridentatis inaequalibus nitidis. F. folio latissimo lucido. Herm. par. 165. t. 165. Moris. s. g. t. 15. f. ult. Hab. in Hispania, Barbaria. Fol. uti in Apio Petroselinio. Lam. enc.  $\overline{\text{O}}$

6. *Ferulago*, fol. pinnatifidis : pinnis linearibus planistrifidis. L. Desf. Atl. p. 251. Moris. s. g. t. 15. f. 1. Hab. in Sicilia et Barbaria.

7. *orientalis*, foliorum pinnis basi nudis, foliis setaceis. Hort. Tournef. itin. 3. p. 239. t. 239. Hab. in Oriente.

8. *Meoides*, foliorum pinnis utrinque appendiculatis, foliis setaceis. Lin. Laserpitium orientale, folio mei, flore luteo. Tournef. cor. 23. Hab. in Oriente.

9. *nodiflora*, fol. linearibus angustissimis, umbell. pedunculatis ad nodos verticillatis. Lam. enc. 3. p. 456. Moris. s. g. t. 15. f. 1. Jacq. austr. 5. appois. p. 28. Barrel. ic. t. 835. Hab. in Carn. et Europ. meridional.

10. *sulcata*, foliol. linearibus, umbell. primordiali sessili lateralibus brevioribus, sem. longe ellipticis profunde sulcatis. Desf. Atl. t. 253. p. 67. Hab. in Algeriae colliib. incolis. Priori affinis.  $\overline{\text{T}}$

11. *canadensis*, lucida canadensis. Lin. Hab. in Virginia.  $\overline{\text{T}}$  +

12. *Assafoetida*, foliis alternatim sinuatis obtusis. L. Kœmpf. amoen. 535. t. 536. Phil. transact. v. 75. an. 1785. Hab. in Persia. Olor alliaceus. Rad. succus condensatus sub nomine indito notus.  $\overline{\text{T}}$

13. *persica*, fol. supradecompositis, fol. multifidis acutis decurrentibus, umbella primordiali sessili. Willd. Hab. in Persia.  $\overline{\text{T}}$

693. **LASERPITIUM.** Fructus oblongus : angelis membranaceis. Petala inflexa, emarginata, patentia.

1. *latifolium*, fol. oblique cordatis dentatis, dentibus mucronatis, seminum alis crispis. Willd. p. 1414. Jacq. austr. t. 146. L. foliis oblique cordatis crenatis, crenis mucronatis, umbella alba. Lam. enc. 3. p. 423. Moris. s. g. t. 19. f. 1. Hab. in Europ. montibus siccis.  $\overline{\text{T}}$  -

2. *Libanotis*, fol. ovatis serratis, terminalibus inciso-lobatis, sem. alis laevibus. Willd. L. umb. purpurea. Lam. l. c. Riv. t. 21. Moris. s. g. t. 19. f. 6. Hab. in Italia.  $\overline{\text{T}}$

3. *capense*, foliolis ovatis integris mucronatis. Thuub. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei.

4 ? *trilobum*, foliolis trilobis incis. L. Pluck. phyt. 223. s. 7. Hab. in Gargano monte, foliola basi cordata.  $\overline{\text{T}}$

5. *aquilegifolium*, foliolis obtusis basi ovatis lobatis. Jacq. austr. 2. t. 147. Hab. in collibus saxosis Austriae. Fructus alis membranaceis brevibus quinis instructa, interjectis quatuor angustioribus. Jacq. Fruct. oblongo-ellipticus, costatus apterygins : Siler aquilegifolium. Gaertn. de fr. 1. p. 92. t. 21.  $\overline{\text{T}}$

6. *gallicum*, foliolis cuneiformibus trifidis, laciniis oblongis obtusiusculis, apice calloso-mucronatis. Willd. Pluck. phytog. t. 198. f. 6. Hab. in Europa australi.  $\overline{\text{T}}$

7. *angustissimum*, foliolis cuneiformibus tri-quinquefidisque, laciniis lanceolatis acuminatis. Willd. p. 1416. Hab. in Europa australi ?

8. *triquetrum*, fol. ovato-oblongis aut alato-pinnatifidis, foliol. ovato-lanceolatis serratis, petiolis late membranaceis. Vent. Hort. Cels. p. 97. t. 97. Hab. Constantinopoli. Succo gummiresinoso scatet.  $\overline{\text{T}}$

9. *formosum*, foliol. pinnatifidis, laciniis linearibus cuspidato-mucronatis. Willd. l. c. Pluck. phytog. t. 199. f. 1. Hab. in Europa australi.  $\overline{\text{T}}$

10. *angustifolium*, foliolis lanceolatis obtusis mucronatis integerrimis sessilibus. Moris. s. g. t. 19. f. 9. Pluck. alm. 207. t. 198. f. 4. Hab. in Europa australi.  $\overline{\text{T}}$

11. *aureum*, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis sessilibus, terminalibus bi-trifidisque. Willd. Tournef. cor. 23. Hab. in Oriente.

12. *prutenicum*, hispidum, foliolis lanceolatis integerrimis : extimis coalitis. Jacq. austr. t. 151. Rivin. pent. t. 23. Hab. in Borussia, Germania, Austria. Involucr. reflexa.  $\overline{\text{T}}$

13. *dauricum*, foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus, involucri universali polyphylo pinnatifido, caule maculato. Willd. Jacq. hort. 3. t. 38. Ligusticum ferulaceum. Allion. ped. n<sup>o</sup>. 1319. t. 60. f. 1. Hab. in Sibiria et in alpihus Italiae.  $\overline{\text{T}}$

14. *sitaiifolium*, foliolis pinnatifidis, laciniis lanceolatis, involucri universali subnullo, caule glabro. Willd. Jacq. austr. app. t. 44. Hab. in Carnioliae et Austriae saxosis asperis.  $\overline{\text{T}}$



15. *Aciphylla*, caule vaginato, petiolis foliorum dilatatis, fol. digitatis linearibus elongatis mucronatis. Linn. suppl. 181. *Aciphylla squarrosa*. Forst. char. gen. p. 135. t. 68. Hab. in Nova Zeelandia.

16. *peucedanoides*, foliis linearilanceolatis venoso-striatis distinctis. Jacq. ic. 2. t. 350. Jacq. Collect. 1. p. 220. Seg. veron. 3. p. 227. t. 17. Pluck. alm. t. 66. f. 1.  $\beta$ . Foliolis linearibus angustissimis. W. Hab. in Baldi Carnioliae et Croatiae alpinis. Rad. crassa.  $\mathcal{T}$

17. *Siler*, foliis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. L. Jacq. austr. t. 145. *Siler montanum*. Moris. s. 9. t. 3. f. 1.  $\beta$ . *Siler angustifolium*. Bauh. pin. 162. Moris. l. c. f. 2. Hab. in Austria, Helvetia, Gallia.  $\mathcal{T}$

Obs. Sem. sulcata absque membranulis. L. Alae sem. angustissimae. Lam.

18. *Archangelica*, fol. decompositis, foliolis ovatis bi-trifidis dentatis subtus hirsutis. Willd. Jacq. ic. 1. t. 58. Coll. 1. p. 214. Dod. pempt. 3. g. t. 318. Hab. in rupesribus umbrosis Carnioliae, Croatiae.  $\mathcal{T}$

19. *Chironium*, foliis oblique cordatis, petiolis hirsutis. Plackw. t. 434. Moris. s. 9. t. 17. f. 1. Hab. Mospellii.  $\mathcal{T}$  +

20. *lucidum*, foliis supradecompositis linearisululatis glabris, involucri universalibus pinnatis. Ait. Kew. 1. p. 345. Hab. in Helvetia.  $\mathcal{C}$

21. *serulaceum*, fol. supradecompositis, foliolis linearibus. L. Tourn. it. 2. p. 111. et t. 121. Hab. in Oriente.  $\mathcal{T}$

22. *hirsutum* (*Halleri*), fol. supradecompositis hirsutis, foliolis multifidis, involucri polyphylli fol. margine membranaceis apice ciliatis. Willd. L. fol. subhirsutis quadripinnatis circumscriptione triangularibus, foliolis parvis multipartitis. Lam. enc. 3. p. 424. L. Halleri. Allion. p. 16m. n. 1315. Vill. delph. 2. p. 625. L. Panax. Gouan. illust. 13. Hall. helv. n. 795. t. 19. Hab. in alpinis. Distinctum a *Thapsia Asclepium*.  $\mathcal{T}$

23. *scabrum*, fol. supradecompositis scabris, foliolis elongato-tridentatis, vaginis petiolorum dentatis laxis, involucri polyphylo. Willd. Cav. ic. 2. p. 72. t. 160. Hab. in Hispania. Simile praecedenti. Stylis decidui.  $\odot$

24. *Thapsioides*, glabrum, fol. multifariam decompositis, foliolis rigidulis nitidis subulatis. Desf. Atl. 1. p. 252. Hab. in Atlantae, Cor. lutea. Sem. crassa.  $\mathcal{T}$

25. *Meoides*, caul. glabro, petiol. hispidis, fol. multifariam decompositis, foliorum conferis aciformibus. Desf. l. c. p. 253. J. B. hist. 3. p. 37. Hab. in monte Lizar Algeriae. Fol. maxima denso caespit. Cor. lutea. Umb. laterales primordiales longiores.  $\mathcal{T}$

26. *Daucoides*, glaberrimum, fol. imis bipinnatis: caulinis pinnatis, foliolis linearibus, sem. alis denticulatis. Desf. Atl. l. c. t. 20. *Caucalis virgata*. Poir. it. 153. In Barbariae maris litoribus. Umb. fructifera excavata.

27. *Fontanesii*, glabrum, caul. subdichotomo, fol. inferioribus longe petiolatis: foliolis angustolinearibus, umbellulis distinctis. L. *peucedanoides*. Desf. p. 255. t. 71. Hab. in arvis prope Sibiam.

28. *gummiferum*, glabrum. fol. planis, foliolis angustis rigidulis, umbell. hemisphaericis distinctis, cor. candidis. Desf. l. c. t. 72. L. *Thapsiaeforme*. Botero Phytogr. Lusit. n. 19. t. 205. Hab. in Barbaria et Lusitania in cultis aridis. Rami succum glutinosum et gravecentem fundunt. D.

29. *polygamum*, fol. pinnatis, foliolis pinnatifidis brevibus, umbel. polygama, seminib. coronatis. Lam. enc. 3. p. 425. Grec. in Barbaria. Poir. habitus Selini, cal. Oenanthis, et semina Laserpii. Stylis longi persistentes. L.

30. *simplex*, scapo nudo aphylo simplici, fol. pinnatis multifidis acutis linearibus, umb. semiglobosa. Lin. Jacq. Misc. 2. t. 2. Ligusticum. Vill. Delph. t. 14. Allioni. t. 71. Hab. in Alpibus.  $\mathcal{T}$

694. *HASSELQUISTIA*. Cor. radiatae, disci masculae s. abortivae. *Petala* incurvato-bifida. Sem. umbellae exteriora orbiculata crenata, interiora haemisphaerica urceolata.

1. *aegyptiaca*, fol. pinnatis: foliolis pinnatifidis. Lin. suppl. p. 179. Willd. Sp. p. 1379. Jacq. hort. t. 87. Hab. in Arabia Aegypto. Caul. teres, villosus. L.  $\odot$

2. *cordata*, fol. inferiorib. ternatis foliol. ovatis crenatis, superiorib. cordatis simplicibus. Lin. Jacq. hort. 2. p. 91. t. 193. Hab. ... Caul. dexusus.  $\odot$

Obs. Genus sequenti nimis affine.

695. *TORDYLIUM*. Cor. radiatae, omnes hermaphroditae. Fructus suborbiculatus, margine callosus,

crenatus aut laevis planus. In  
volucra (longa) indivisa.

1. *syriacum*, involucris umbella lon-  
gioribus. L. Willd. p. 1381. Hab. in Syria. ☉

2. *officinale*, involucris partialibus lon-  
gitudine florum, foliis ovatis laciniatis.  
L. Hab. in Anglia, Narbona, Italia, Si-  
cilia. Flor. carnei.

3. *peregrinum*, seminibus sulcatis ru-  
gosis plicatis, involucri universali mono-  
phylla subtrifido. Caulis hispanica. Cam-  
hort. 37. t. 11. Hab. in Oriente. D.

4. *apulum*, umbellulis remotis, fol. pin-  
natis : pinnis subrotundis laciniatis. Jacq.  
hort. t. 53. T. apulum minimum. Column.  
ecphr. t. p. 122. t. 124. Hab. in Italia,  
Apuliae incultis.

5. *maximum*, umbellis confertis radiatis,  
foliis lanceolatis inciso-serratis. L. Jacq.  
austr. t. 142. Hab. in ruderalis, sepius. ☉

6. *sisifolium*, umbellis confertis radiatis,  
fol. pinnatis, foliol. oblongis serratis. Scop.  
Car. p. 164. t. 8. Willd. p. 1383. Hab. in Cer-  
nuiolae alpinis. Petala rubra.

7. *humile*, fol. inferioribus pinnatis :  
foliol. lobatis incis, caul. inferne piloso,  
involucr. minimis setaceis, sum. margine  
crenatis. Desf. Atl. 1. p. 235. t. 53. Hab. in  
Tunetia inter segetes prope Hamamelif.

8. *absinthifolium*, incanum, fol. de-  
compositis : foliolis cuneiformibus trifidis,  
cor. subuniformibus, fructu villosa. Vent.  
Choix de Pl. p. 22. t. 22. sub Heracleo.  
Hab. in Oriente, Persia. Involucr. parva,  
aequalia.

696. HERACLEUM. *Fructus* ellip-  
ticus, emarginatus, compressus,  
striatus, marginatus. *Cor.* diffor-  
mis, inflexo-emarginata. *Invo-*  
*lucrum* caducum.

1. *Sphondylium*, fol. pinnatis, foliis  
quinis oblongis pinnatifidis acutis dentatis,  
cor. subuniformibus. Willd. Sp. p. 1421.  
Blackw. t. 540. Sphondylium. Riv. t. 4.  
Hab. in pratis, ad vias. ☉

2. *flavescens*, fol. pinnatis, foliolis quin-  
is oblongis pinnatifidis acuminatis dentatis,  
margine scabris, floribus radiatis. Willd.  
l. c. H. angustifolium. Jacq. aust. 2. p. 46.  
t. 173. Hab. in Austria. ☿

3. *angustifolium*, fol. cruciatio-pinnatis :  
foliolis linearibus, cor. roseolosis. β. *ton-*

*sisifolium*, folior. pinnis longissimis. Jacq.  
aust. 2. p. 46. t. 174. Hab. in Succia, An-  
glia, Germania. Flor. uniformes. ☿

4. *elegans*, foliolis decussive pinnatifidis  
dentatis. Willd. p. 1422. Jacq. aust. 2.  
p. 175. Hab. in Austria. ☿

5. *sibiricum*, fol. pinnatis : foliolis quin-  
is : intermediis sessilibus, coroll. uni-  
formibus. L. Gmel. sibir. 1. p. 128. t. 50.  
Hab. in Sibiria. Caul. profunde sulcatus,  
hispidus. Folior. vaginae basis barba alba  
densa. ☉

6. *Panaces*, fol. pinnatis : foliolis quin-  
is : intermediis sessilibus, flor. radiatis.  
Hab. in Apenninis, Sibiria. Fol. subtus  
tomentosa, et pedunc. laeves nec scabris.

7. *tuberosum*, fol. pinnatis, foliolis sep-  
tentis, floribus radiatis. Molina Chil. ed.  
germ. p. 115. Hab. in Chili, in collibus  
arenosis. ☿

8. *austriacum*, fol. pinnatis utrinque ru-  
gosis scabris, flor. subradiatis. Jacq. austr.  
t. 61. Hab. in Austriae alpinis. ☿

9. *lanatum*, fol. ternis petiolo nervisque  
subtus lanato-villosis : foliolis amplis sub-  
rotundo-cordatis, subpalmato-lobatis,  
fract. orbiculatis. Michaux. Flor. 1. p. 166.  
Hab. in Canada.

10. *alpinum*, fol. simplicibus cordatis  
obsolete lobatis serratis. Willd. Sphondy-  
lium fol. subrotundis glabris, obtuse semi-  
trilobis. Hall. helv. n.º. 810. Barr. ic. 55.  
Hab. in Helvetiae alpinis. Scapus nudus.  
Fol. Ficus. L. ☿

β. *pyrenaicum*, fol. simplicibus cor-  
dato-palmatis, subtus tomentosis, fract.  
orbicularibus. Lam. enc. 1. p. 403. Hab.  
in Pyrenaeis. +

11. *pumilum*, fol. bipinnatis, foliolis  
lanceolatis glabris, caule prostrato. Will.  
delph. a. p. 640. t. 14. H. minimum. Lam.  
enc. 1. p. 403. Hab. in alpinis Delphi-  
natis. ☿

697. LIGUSTICUM. *Fructus* oblon-  
gus, 5-sulcatus utrinque. *Corol.*  
aequales. *Petala* involuta integra  
*Cal.* 5-dentatus.

1. *Levisticum*, fol. magnis multipli-  
cibus : foliolis superne incis, L. Blackw.  
t. 275. Willd. p. 1424. Moris. s. q. t. 3. f. 1.  
Angelica paludapifolia. Lam. enc. 1. p. 173.  
Hab. in Apenninis Liguria. ☿

2. *scoticum*, fol. biternatis, foliolis sub-  
rhombis inciso-serratis. Flor. dan. t. 207.

Michaux. r. p. 166. Legit. p. 159. Pluck. alm. t. 66. f. 2. Angelica scotica. Lam. l. c. Hab. ad litora maris in Anglia, Scotia, Suecia, Dania, Canada. Aromaticum.  $\bar{\Gamma}$

3. *aquilegifolium*, fol. triternatis, foliolis trifidis dentatis, stylis divaricatis persistentibus. Willd. p. 1325. *Danica aquilegifolia*. Allion. pedem. n.º. 1392. t. 63. Hab. in saxosis apricis Taurinensium.  $\bar{\Gamma}$

4. *peloponense*, fol. multi, licato-pinnatis. foliolis pinnatum incis. Jacq. aust. 5. p. 33. app. t. 13. Alhamenta Golaka. Hacquet. carniol. p. 14. t. 5. Hab. in Peloponnesiacis, Carniolicis, Rhacis et Gebennicis montibus nemorosis. Fol. maxima. Caul. 3-4-pedalis.  $\bar{\Gamma}$

5. *cicutae-folium*, fol. decompositis: foliol. obtusis uninervosis, ramis divaricatis. Vill. Delph. 2. p. 612. t. 15. L. spiioides. Lam. enc. 3. p. 577. Till. Pis. p. 98. t. 39. f. 2. Hab. in sylvaticis apricis Delphinatus. Facie Oroselini. Petala alba.

6. *austriacum*, fol. bipinnatis: foliolis confluentibus incis integerrimis. Jacq. austr. t. 151. Allion. pedem. t. 43. L. Gmelini. Vill. delph. 2. p. 610. t. 13. Hab. in Italiae, Galliae, Austriae, Silesiae alpinis.  $\bar{\Gamma}$

7. *cornubiense*, fol. radicalibus decompositis incis, caulinis ternatis lanceolatis integerrimis, seminum sulcis obsoletis. Smith. ic. pict. pl. rar. fasc. 2. p. 11. t. 11. Ej. Brit. 1. p. 310. Petiv. herb. brit. 46. f. 9. Hab. in Cornubia (Cornwall in Anglia) dumetis et ad sepes. Rad. resina flava scatet. S.

8. *pyrenaicum*, fol. supradecompositis, foliolis pinnatifidis, lacinii linearibus mucronatis, involucri universali subnullo deciduo, costis seminum membranaceis glabris. Willd. Gouan. illust. p. 14. t. 6. f. 2. Hab. in Pyrenaeis: etiam in montibus Vogesiensibus lectum a D. Nestler.  $\bar{\Gamma}$

9. *candicans*, fol. supradecompositis, foliolis cuneiformibus incis glabris, involucri universali diphylo subfoliaceo, costis seminum membranaceis glabris. Ait. Kew. 1. p. 348. Hab. . . .  $\bar{\Gamma}$

10. *peregrinum*, umb. primariae involucri subnullo, lateralium basi membranaceo: radiis subramosis. Jacq. hort. 3. p. 13. t. 18. Apium hortense magnum, petroselinii sapore. Bauh. hist. 3. p. 99. Hab. in Lusitania. Conf. cum n.º. 6. Folia tripartita: lacinii cuneatis incis glabris petroselinii, sed majoribus. Petioli lateribus membrana alba. L. Pet. flavescentia.  $\bar{\Gamma}$

11. *balcaricum*, fol. pinnatis: foliolis infimis acutis foliolo. L. Hab. in Balcaribus, Romae.  $\bar{\Gamma}$

12. *gingidium*, fol. pinnatis, foliolis rhombico-cordatis obliquis crenatis obtusis. Forst. prod. 140. *Gingidium montanum*. Forst. char. gen. 41. t. 21. Hab. in montibus Novae Zeelandiae.

13. *longifolium*, fol. biternatis, radicalibus decompositis, foliolis linearilanceolatis integerrimis. Willd. p. 1326. Moris. 2. g. t. 15. f. 1? Hab. in Sibiria.  $\bar{\Gamma}$

14. *actae-folium*, fol. duplicato-tripartitis, foliolis ovalibus aequaliter dentatis, involucrellis setaceis, fruct. subalato-costatis. Michaux. l. c. Cresc. ad ripas flum. St. Laurentii.

15? *barbinole*, caul. laevi: nodis barbatis, fol. biternatis (plerisque), fruct. ovalibus margine utroque subdipteris. Mich. p. 107. Hab. in Carol. superiore.

16. *pusillum*, annuum, fol. biternatis multipartitis, umbellulis 3-5-floris, fruct. subsensibris. Michaux. Flor. 1. p. 168. Hab. in sabulosis aridis Carolinae.

17? *bulbosum*, pusillum, radice globosa, caul. debili diphylo, fol. laterali tripartito, pinnulis divisis. Michaux. p. 168. Hab. ad ripas prope Knoxville. Martio solo nivoso floret. M. An distinctum genus?

698. ANGELICA. Fructus subrotundus, solidus, utrinque 3-alat. stylis reflexis. Cor. aequales: petalis incurvis.

1. *Archangelica*, foliorum imparilobato. Flor. dan. t. 206. Blackw. t. 496. Willd. Sp. 2. p. 1438. Hab. ad rivulos.  $\bar{\Gamma}$

2. *sylvestris*, foliolis aequalibus ovato-lanceolatis serratis. Habitat in subhumidis sylvaticis. Caul. laevis rore caesio.  $\bar{\Gamma}$

3. *Razoulii*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis serratis decurrentibus. Gouan. illust. 13. t. 6. Bocc. mus. tab. 99. Hab. in Pyrenaeis.  $\bar{\Gamma}$

4. *verticillaris*, fol. divaricatisimis: foliolis ovatis serratis, caule pedunculis verticillato. Jacq. hort. t. 130. Hab. in Italia? Caul. humanae altitudinis et ultra, rore glaucescente.  $\bar{\Gamma}$

5. *atropurpurea*, extimo foliorum pari coadunato: foliolo terminali petiolato. L. Corn. canad. 198. t. 199. Lam. enc. 1. p. 172. Hab. in Canada. Caul. atropurpureus. Pe-

tala extus ferruginea, intus purpurascens. Flor. parvi viridi-rubicundi. Lam.  $\overline{\text{T}}$

6. *triquinata*, foliolis inciso-dentatis: imperi rhombico sessili, lateralibus decurrentibus. Michaux. 1. p. 168. Hab. in Canada. Petiol. 3-partitus.

7. *lucida*, foliolis aequalibus ovatis inciso-serratis. Jacq. hort. 3 p. 16. t. 24. Corn. canad. t. 197. Moris. s. g. t. 3. f. 8. Hab. in Canada.  $\overline{\text{O}}$

Gen. SIUM. *Fructus* subovatus, compressus, striatus. *Involucrum* polyphyllum. *Petala* cordata.

1. *filifolium*, fol. filiformibus, involucris elongatis. Thunb. prod. 50. Willd. p. 1431. Conium tenuifolium. Vahl. symb. 3. p. 49. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *latifolium (sulcatum)*, caul. elongato sulcato angulato, fol. pinnatis: foliolis lanceolatis aequaliter serratis, umbella terminali. L. Hort. cliff. 98. Flor. Jacq. austr. t. 66. Engl. bot. t. 204. Willd. 2. p. 1431. Hab. in rivulis paludosis.  $\overline{\text{T}}$

*Obs.* Fol. radicalia primo vere sunt supradecomposita et bipinnata, caulina vero et quae aetate gignuntur simpliciter pinnata. Willd. Haec et sequens species plurimum confunduntur.

3. *angustifolium (incisum)*, caul. ramoso striato: fol. pinnatis: foliol. inciso-lobatis umbellis axillaribus pedunculatis, involucro universaliter pinnatifido. Jacq. austr. t. 67. Engl. bot. t. 139. S. nodiflorum. Flor. dan. t. 247. Hab. in aquis. Involucr. etiam integrum.

*Obs.* Nomen triviale Lin. hujus et prioris speciei mutari debet, cum ab omnibus fere auctoribus hae duae plantae ob nomina haec incongrua commulentur.

4. *nodiflorum*, (debile), caul. procumbente, fol. pinnatis: fol. ovatis umbellis axillaribus sessilibus. Moris. hist. s. g. t. 5. f. 3. Hab. ad ripas fluviorum. Involucrum saepe deest, aut 1-phyllum.

5. *repens*, caule repente, foliolis subrotundis dentato-angulatis. Jacq. austr. 3. p. 34. t. 260. Hab. in pratis humidis et inundatis.

*Obs.* Sison inundatum huic simile sed in S. repente, folia sunt latiora obtusiora uniforanea, et umb. quadriradiatae involucri universali instructae. Willd. p. 1433.

6. *Sisarum*, fol. pinnatis: fol. floralibus ternatis. L.  $\beta$ ? *Ninsi*, fol. serratis pinnatis, rameis ternatis, caul. bulbifero. Lam. enc. 1. p. 405. Burm. ind. t. 29. f. 1. Blackw. t. 514. Kaempf. amoen. 817. t. 818. Hab. in China.  $\overline{\text{T}}$

7. *rigidius*, fol. pinnatis: foliolis lanceolatis subintegerrimis. Moris. s. 11. t. 7. f. 1. Hab. in Virginia. Caul. rigidulus, et foliola.

8. *lineare*, fol. pinnatis: foliol. sublan- ceolato-linearibus subserratis. Michaux. Flor. p. 167. In aquis Canadae. Priori affine. Involucr. oligophyllum. Umb. radiis brevibus. M.

9. *japenicum*, fol. pinnatis, foliolis incisis, umb. terminalibus. Thunb. jap. 118. Hab. in Japonia. Caul. flexuosus. Fol. infima maxima. Th.

10. *Falcaria*, foliolis linearibus decurrentibus connatis. Jacq. austr. t. 257. Falcaria. Riv. pent. t. 47. Moris. s. g. t. 8. f. 1. Hab. in agris, inter segetes.

*Obs.* A nonnullis auctoribus distinctum genus hac ex specie conficitur.

11. *grandiflorum*, fol. bipinnatis, foliolis subrotundis inciso-dentatis. Thunb. prod. 50. Hab. ad Cap. b. spei.

12. *paniculatum*, fol. bipinnatis, foliolis linearibus inciso-pinnatifidis. Hab. ad Cap. b. spei.

13. *patulum*, fol. bipinnatis, foliolis trifidis, ramis diffusis. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *graecum*, fol. bipinnatis, foliolis lanceolatis serratis summis confluentibus. Willd. Ligusticum graecum, folio a. ii. Tournef. cor. 23. Hab. in Graecia. Flor. lutei.

15. *decumbens*, fol. bipinnatis, foliolis trifidis, caule decumbente. Thunb. jap. 118. In Japonia.

16. *siculum*, fol. radicalibus ternatis, caulinis bipinnatis. Jacq. hort. t. 133. Zan. hist. 78. t. 128. Hab. in Sicilia, et in collib. Algeriae. Petala lutea.  $\overline{\text{T}}$

17. *asperum*, fol. tripinnatis, pedunc. pedicellisque scabris. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei, cum a sequentibus.

18. *hispidum*, fol. tripinnatis, petiolis pedunculisque scabris. Thunb.

19. *villosum*, fol. tripinnatis, laciis ovatis inciso-serratis villosis. Thunb.

700. *SISON*. *Fructus* ovatus, striatus. *Involucra* sub-4-phylla.

1. *trifoliatum*, fol. omnibus trifoliatis: foliol. dentatis: inferiorib. ovalibus dentatis, pedunc. geminis, fructib. oblongis, Michaux. Fl. p. 168. In Canada superiore.

2. *marginatum*, fol. pinnatis, superioribus quinatis: foliol. sessilibus lanceolatis integerrimis, involucr. nullis, Michaux. Hab. in udis Carolinae.

3. *Amomum*, fol. pinnatis, umbellis erectis. L. Jacq. hort. 3. t. 17. Blackw. t. 442. Willd. Sp. 2. p. 1436. *Sium aromaticum*. Lam. enc. 1. p. 405. Hab. in Galliae, Angliae lutosi et in Carnioli. Umb. universalis 4-fida, radio quarto centrali. L. ☉

4. *segetum*, caul. junceo, fol. pinnatis, umbellis cernuis. Jacq. hort. t. 334. Engl. bot. t. 228. Smith. brit. 1. p. 316. Hab. in Angliae agris et in Helvetia, in solo lutoso calcareo subhumido. Sm. ☉

5. *Ammi*, fol. tripinnatis: radicalibus linearibus: caulinis setaceis: stipularibus longioribus. Hab. in Lusitania, Apulia, Aegypt. Fol. radicalia linearia, supradecomposita, plana: foliolis replicato-imbricatis. L. ☉

6. *inundatum*, repens, umbellis bifidis. Flor. dan. t. 89. *Sium* fol. radicalibus capillaribus multifidis, caulinis pinnatis, ultima pinna trilobata. Hall. helv. n.º 780. Hydrocotyle inundatum. Smith. brit. 1. p. 260. Moris. 6. g. t. g. f. 5. β. Fol. omnibus capillares, caul. suberecto. Schumacher Zae-land. 1. p. 90. Hab. in inundatis. ☉

7. *verticillatum*, foliolis verticillatis capillaribus. L. Light. scot. 2. t. 35. *Sium verticillatum*. Smith. brit. 1. p. 314. Engl. bot. t. 395. Moris. Sect. 3. t. 7. f. 10. Hab. in Anglia, Gallia, in Pyrenaeis, in pratis humidis salis.

8. *salsum*, fol. radicalibus compositis, foliolis subverticillato-fasciculatis lanceolatis, caule aphylo, ramis umbelliferis dichotomis. Lin. suppl. 181. Peucedanum redivivum. Pall. Act. petrop. 1779. 2. p. 252. t. 8. f. 1 - 3. *Sium* nudicaule. Lam. enc. 1. p. 407. Hab. in Sibiria locis siccis limosis aridissimis circa Wolgam. Fol. evanidis caul. nudus ex ramulis umbelliferis cum bracteis subulatis. ☉

9. *sylvaticum*, fol. radicalibus longe petiolatis decompositis, foliolis tripartitis: laciniis cuneatis incis, caul. subaphyllo.

Brotero Phytogr. Lusit. n.º. 18. Hab. in Lusitaniae umbris.

10. *crinitum*, fol. omnibus tripinnatis capillaribus, involucris decomposito-setaceis. Pall. 1. c. p. 250. t. 7. Hab. in Sibiria. ☉

701. *HUANACA*. *Cal.* denticulis minimis, persistens. *Petala* lanceolata, patentia. *Fruct.* ovatus, acutus, lineis tribus striatus. *Involucr.* universale 2 - phyllum, tripartitum longum, partiale polyphyllum.

1. *acaulis*, petiol. elongatis 5-phyllis, fol. setaceis quadripartitis. Cav. ic. 6. p. 18. t. 528. f. 2. Hab. in Americae meridion. portu Desado. Pet. luteo-rubra. Umb. 2. laterales longius pedunculatae, masculae. C.

702. *BURON*. *Involucra* polyphylla. *Fructus* ovatus, striatus, villosus et glaber.

#### \* Herbacea.

1. *macedonicum*, caul. ramosissimo pubescente, foliolis rhombeo-ovatis, incisodentatis, dentibus acuminatis, umb. numerosissimis seminibus hirtis. Ait. Kew. 1. p. 351. Willd. Sp. 2. p. 1439. Blackw. t. 382. Hab. in Macedonia, Mauritania et Cochinchina. Umbel. numerosae albae. ☉

2. *rigidius*, glabrum, foliolis linearibus. L. Bocc. Mus. 2. p. 84. t. 76. Barr. ic. 77. Hab. in Sicilia. Flor. flavescentes. Ferulam refert.

#### \*\* Fruticosa.

3. *tortuosum*, caul. fruticoso nodoso, ramis tortuosis divaricatis, involucro minimo, seminib. globosis striatis hirsutis. Desf. Atl. 1. p. 257. t. 73. Hab. in regu. Tunetano prope Kerwan, ubi denso caespite crescit, odoremque aromaticum spirat. D. h

4. *Galbanum*, foliolis ovato-cuneiformibus acutis argute serratis, umbellis paucis, sem. glabris caule frutescente glauco. Ait. Kew. 1. p. 352. Pluck. alm. 31. t. 12. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Umbellae densae, magnae. h

5. *laevigatum*, foliolis lanceolatis obtusissimae et obsoletissimae crenatis, seminibus glabris, caule frutescente. Ait. Kew. 1. p. 352. Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *gummiiferum*, foliolis incisic acuminatis inferioribus latioribus, seminibus glabris,

caule frutescente. Ait. Kew. 1. Comm. hort. 2. p. 115. t. 58. Hab. in Aethiopia. h

703. CUMINUM. *Fructus* ovatus, striatus. *Umbellulae* 4. *Involucra* 4-fida : foliolis simplicibus et trifidis.

1. *Cyminum*. Lin. Cav. ic. 4. p. 36. t. 360. Moris. s. g. t. 2. Fol. laciniae lineares. Hab. in Aegypto, Aethiopia. ☉

704. OENANTHE. *Flosculi* difformes : in disco sessiles, steriles. *Fructus* striatus, retusus, suberoso-corticatus, coronatus calyce et pistillo. (Umbel. globosae.)

1. *fistulosa*, stolonifera, fol. caulinis pinnis filiformibus fistulosis, involucr. universali subnullo. Flor. dan. t. 846. Engl. bot. t. 363. Moris. s. g. t. 7. f. 8. Hab. in Europae fossis et paludibus. ☞

2. *crocata*, fol. omnibus multifidis obtusis subaequalibus. Jacq. hort. 3. p. 32. t. 155. Hab. in paludibus. Venenata, imprimis radia, succo croceo scätens. ☞

3. *prolifera*, umbellularum pedunculis marginalibus longioribus ramosis masculis. Jacq. hort. 3. p. 35. t. 62. Moris. s. g. t. 7. f. 5. Hab. in Sicilia, Apulia. ☞

4. *globulosa*, fol. bipinnatis, fructibus globosis. Gouan. illust. 18. t. g. Sem. crassa ovata, vix striata. Desf. p. 258. Hab. in Lusitania et in regu. Tunetano. ♂

5. *virgata* (stylota), radicib. tuberosis, foliol. radicalibus argute incisus, ramis virgatis. Poir. it. 2. p. 138. Enc. bot. 4. p. 529. Hab. in Barbaria. Priori affinis. Styli longissimi.

6. *nodiflora*, caul. prostrato, fol. bipinnatis planis, umbell. lateralibus, fructu sulcato scabro. Schousb. Maroc. p. 120. Hab. in Barbar. arenosis juxta fluvios. Involucr. univers. subnullo. ☞

7. *peucedanifolia*, fol. omnibus linearibus, radicalibus bipinnatis, caulinis pinnatis, involucreo universali nullo, radicem napulis ovatis sessilibus. Poll. pal. n°. 192. Fig. 3. Oen. filipenduloides. Thuill. Hab. in pratis uliginosis. Radices nonnullis in regionib. Gallicis (Anjou) a pueris comeduntur.

8. *pimpinelloides*, foliolis radicalibus caucibus fissis; caulinis integris linearibus

longissimis, simplicibus. Hacz. carn. 10. t. 3. Hab. Montispelii et in Europa australi. ☞

9. *inebrians*, foliorum inferioribus pinnis ovatis, superiorum linearibus, petiolis angulatis. Thunb. prod. 49. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *tenuifolia*, fol. bipinnatis, pinnis linearibus, summis indivisis. Thunb. prod. 49. Hab. ad Cap. b. spei, cum tribus sequentibus.

11. *serulacea*, fol. supradecompositis, pinnulis subulatis sulcatis. Thunb.

12. *interrupta*, fol. interrupte bipinnatis, lacinii incisio-serratis. Thunb.

13. *exaltata*, caule striato, seminaibus turbinatis striatis. Thunb. prod. 50.

14. *filiformis*, fol. simplicibus filiformibus retusis, flor. pedunculatis. Lam. ill. t. 283. f. 2. Enc. bot. 4. p. 529. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. pedalis, tortuosus, subnudus.

15. *carolinensis*. Oe. *filiformis*, fol. omnibus simplicibus filiformibus fistulosis. Walt. Flor. Carol. p. 113. †

705. PHELLANDRIUM. *Flosculi* disci minores. *Fructus* ovatus, laevis; coronatus perianthio et pistillo.

1. *aquaticum*, caulis foliorumque ramificationibus divaricatis. Flor. dan. t. 1154. Hab. in fossis. ♂

706. CIGUTA. *Fructus* subovatus, sulcatus. *Involucr.* 0 : partiale 3-5-phyllum.

1. *virosa*, umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. Flor. dan. t. 208. Blackw. t. 574. Hab. in paludibus. Fol. pinnata : foliola lanceolata ternata, acute serrata. Rad. tuberosa succo croceo. ☞

2. *bulbifera*, fol. foeniculaceis, ramis verticillatis bulbiferis. Michaux. Flor. 1. p. 165. Hab. in Virginiae et Canadae aquis.

3. *maculata*, foliorum serraturis mucronatis, petiolis membranaceis apice bilobis. Pluck. alm. 31. t. 76. f. 1. Hab. in Virginiae aquis. ☞

707. AETHUSA. *Involucr.* universale 0. *Involucella* dimidiata,

3 - phylla, pendula. *Fructus* striatus.

1. *Cynapium*, fol. pinnatis, foliol. pinnatifidis nullis. Blackw. t. 517. Curt. Flor. Lond. ic. t. 18. Hab. inter olera, et arvis et in montosis. ☉

*Obs.* Planta nociva et fere venenata cum Apio petroselino aut Chaerophyllo. Scand. ceresfolio. L. cominutari potest sed odore et sapore insipido, praeter notas generis, distinguitur.

708. MEUM. *Cal.* obsoletus. *Petal.* inflexa integra. *Involucr.* universale 1-phyllum: partiale paucifolium sublaterale. *Fruct.* elliptico-oblongus utrinque tricostratus.

1. *heterophyllum*, fol. radicalibus pinnatis: foliolis ovatis incisiss, caulinis multipartito-setaceis, caul. ramosissimus. Moench. meth. p. 86. Aethusa Bonius. Lin. Willd. p. 1446. Jacq. hort. t. 198 Seseli Bunius. Vill. Delph. 2. p. 588. Moris. 2. g. t. 2. f. 16. Hab. in Pereneis et in agris Delphinatus. Flor. parvi flavescentes. Fol. inferiora lucida. Caul. ad nados purpurascens.

2. *Mutellina*, caul. subnudo, fol. duplicato-pinnatis, pinnulis semipinnatis: lobulis lanceolatis. Hall. helv. n. 763. sub seseli. Gaertn. de fruct. 1. p. 106. t. 23. Phellandrium Mutellina. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1444. Jacq. Flor. Austr. 1. t. 56. Hab. in Alpibus. ☿

3. *Athamanta*, fol. omnibus multipartito-setaceis, vaginis petiolorum dilatatis ventricosis, involucro universali monophyllo. Ait. Kew. 1. p. 354. Aeth. Meum. Lin. Willd. p. 1447. M. athamanticum. Jacq. austr. t. 303. Smith. Flor. brit. 1. p. 309. Ligusticum Meum. Crantz. austr. 308. Roth. germ. II. p. 322. Hab. in alpinis et montosis in pratis.

4. *fatuum*, fol. omnibus multipartito-setaceis, vaginis petiolorum angustis, involucro universali polyphyllo. Ait. Kew. 1. p. 355. sub Aethusa. Hab. ... ☿

709. CORIANDRUM. *Cor.* radiata: *Pet.* inflexo-emarginata. *Involucr.* univ. 1-phyllum; Partialis dimidiata. *Fructus* sphaericus.

1. *sativum*, fructibus globosis. Lin.

Willd. Sp. p. 1448. Engl. bot. t. 67. Hab. in agris. *Cal.* stylique persistentes.

2. *testiculatum*, fructibus didymis. Pluck. alm. 120. t. 169. f. 2. Moris. 2. g. t. 2. f. 2. Hab. in Europae australis agris, *Cal.* et styli decidui. ☉

710. MYRRHIS. Umbella composita. *Involuc.* erecta. *Fruct.* oblongus profunde sulcatus: angulis submembranaceis.

1. *odorata*. Scandis odorata. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1449. Jacq. Flor. austr. append. t. 37. Odorata. Rivini. Pent. t. 57. Chaerophyllum. Lam. enc. 1. p. 683. Hab. in sylvis montosis. Sapor praesertim fructus, qui magnus, anisatus. ☿

711. SCANDIX. Umbella simplex. Flor. radiati. *Involucr.* polyphyllum, emarginatum aut pinnato-incisum. *Fruct.* rostro longissimo terminatus, subpilosus.

1. *chilensis*, foliolis integris ovato-lanceolatis. Molina Chil. Willd. Sp. 2. p. 1449. Hab. in regno Chilensi. +

2. *Pecten*, foliolis multifidis semiuib. majoribus subglabris. Jacq. Flor. austr. t. 363. Flor. dan. t. 844. Hab. frequens in agris inter segetes. *Involucr.* foliol. emarginata et incisae.

3. *australis*, foliolis multifidis, semiuib. rostro attenuato incanis pilosioribus, flor. radiatis. Lin. Anisomarathrum. Col. cephr. 1. t. 90. Hab. in Europa australi et Creta.

*Obs.* Priori similis, pro cuius varietate a nonnullis sumitur, sed omnibus partibus tenuior, nec involuc. ita emarginata.

4. *grandiflora*, umbell. subsexfidis, sem. rostro aciculari hispidulo, petalo exteriore maximo. Lam. enc. 1. p. 686. sub Chaerophyllo. S. sem. pedunculo villosa brevioribus. L. Tournef. cor. 23. Hab. in Oriente.

5. *pinnatifida*, involuc. pinnatifidis, fol. digitatis, lacinii multifidis. Vent. Hort. Cels. p. 14. t. 14. Hab. in Persia, inter Amalem et Therun.

712. OLIVERIA. Umbella simplex. *Involucr.* polyphyllum longius. *Cal.* 5-dentatus. *Petal.* 2-partita. *Fruct.* ovato-teres hirsutus.

1. *decumbens*. Vent. Hort. Cels. p. 21

t. 21. Cresc. circa Bagdad, ubi ab Olivier, entomologo celebri inventa est haec species. Fol. 3-5-fida. Odor fere Thymi. V. ☉

713. **ANTHRISCUS**. Umbella composita a. *Involucella* lanceolata erecta. *Fruct.* ovatus pilis scaber, rostro glabro.

1. *vulgaris*, seminib. ovatis hispidis, caul. laevi, umbel. sublateralibus, petiol. margino villosa-ciliato. Scandix Anthriscus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1450. Jacq. austr. t. 154. Caulis scandicina. Roth. germ. 2. p. 31. Chaerophyllum. Lam. enc. 1. p. 606. Hab. f. Europ. praesertim australioris aggeribus, ad sepes inter segetes. Vere. ☉

2. *nodosa*, seminib. subcylindricis hispidis, caule hispido, geniculis tumidis. L. Mant. 356. sub scandice. Moris. s. g. t. 10. f. 4. Hab. in Sicilia, Germania et circa Parisios.

3. *trichosperma*, seminib. hirsutissimis pilis semine duplo longioribus. Lin. Mant. 57, sub scandice. Hab. in Aegypto. Caul. plures, obliqui. Folia bipinnata, foliolis ovato-lanceolatis, inciso-serratis, margine scabris. Flor. conformes, carnei.

714. **CHEROPHYLLUM**. *Involuc.* reflexum, concavum. *Petala* inflexo-cordata. *Fructus* oblongus, laevis, aut striatus, glaberrimus.

\* *Cerefolium*, seminib. laevibus. *Involucr. universale* passim 1-2-phyllum.

1. *sylvestre*, caule striato, geniculis tumidiusculis, sem. laevibus. Jacq. austr. t. 149. Willd. Sp. 2. p. 1452. Hab. in Europae pomariis et cultis. Magna ramosissima odore tetra. Sem. dein fusca.

2. *verticillatum*, glaberrimum, foliis variis: radicalib. pinnatis: fol. majusculis cordatis subaliquis serratis, ceteris decompositis. Hab. in Europa. Hort. Paris. Praeter fol. radicalia priori simile, sed minus.

3. *sativum*, seminib. laevibus, umbell. lateralib. subsessilibus, involucr. universali foliiformi. Scandix cerefolium. Lin. Willd. p. 1450. Blackw. t. 236. Hab. sponte in agris Europae australis, frequens in hortis pro usu culinari colitur. Sem. nigra, dein nigricantia.

4. *procumbens*, seminib. nitidis laevibus, fol. decompositis, caul. procumbente scandix procumbens. Lin. Moris. s. g. t. 11. (f. ult.) Hab. in Virginia. Umb. radiis ut plurimum tribus. Sem. tenuia, nigricantia.

5. *glaberrimum*, fol. radicalibus 2-3-ternatis: foliol. ovatis obtusis; caul. lanceolatis, involucr. submonophyllo, sem. laevibus acutis. Desf. Atl. 1. p. 260. t. 74. sub scandice. Hab. in Atlantide prope Flamsen. Umb. fol. oppositae, pedunculatae.

\* \* *Seminib. striatis*. (Chaerophyllum.)

6. *bulbosum*, caule laevi, geniculis tumido, basi hirsuto. Jacq. austr. t. 63. Pluck. calm. 249. t. 206. f. 2. Hab. ad saepes. Radix turbinata s. obovata. Caulis sexpedalis.

7. *aristatum*, caule laevi geniculis tumido, seminibus hirtis biaristatis. Thunb. jap. 119. Hab. in Japonia. Caul. striatus glaber. Involucra subulata. Sem. oblonga, albo-villosa. Th.

8. *temulum*, caule maculato scabro: geniculis tumidis. Jacq. austr. t. 65. Curt. Flor. Lond. ic. Moris. s. g. t. 10. f. 7. Hab. ad arvos, vias et sepes. Umbellae virgines cernuae. Sem. striata. L. ♂

9. *capense*, caule laevi aequali, seminibus sulcatis, foliolis trifidis glabris. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *scabrum*, caule aequali, foliolis incisis acutis hirtis, pedunc. scabris. Thunb. jap. 119. Hab. prope Jedo in Japonia.

11. *palustre*, fol. tripinnatis latis, foliol. inciso-serratis, fruct. biaristatis divergentibus. ♂. *hirsutum*, fol. hirsutis. Lin. Willd. p. 1455. Lam. enc. 1. p. 683. Jacq. austr. t. 148. Moris. s. g. t. 10. f. 6. Hab. in montosis, praesertim ad rivulos.

12. *aromaticum*, caule aequali, foliolis cordatis serratis integris, fructib. biaristatis. Jacq. austr. t. 150. Bocc. mus. 2. p. 29. t. 19. ♂. Myrrhis orientalis angelicae folio tuberosa radice. Tournef. cor. 22. Hab. in Lusania, Misnia, Austria, Silesia. Fol. Aegopodii Podagrariae. ¶

13. *canadense*, fol. ternatis, foliolis ovato-acutis subincisis. Sison canadense. Lin. Willd. p. 1456. Myrrhis canadensis. Riv. pent. t. 53. Gaertn. de fr. 1. p. 109. Hab. in Amer. septentrionali. Sem. breviuscula, subglobosa.

14. *Claytoni*, foliol. oblongo-ovalibus subpinnatifido-lobatis, umbella pauciradiata divaricata, fruct. laevigatis. Myrrhis. Michaux. Flor. 1. p. 170. Hab. in montib. Alleghensis.

15. *coloratum*, caule aequali, fol. subdecompositis, involuclis coloratis. L. Jacq. hort. t. 51. Moris. s. g. t. 10. f. 6. Hab. in Illyria. Caul. hirsutus. Involucella ovata,



orata, acuminata, luteo-colorata ut in *Bupleuris*. Cor. lutea.

16. *aureum*, caule aequali, foliis incisis, seminib. coloratis sulcatis muticis. Jacq. austr. t. 64. Rupp. jen. 3. p. 282. t. 5. Hab. in Germania, Helvetia. Semina flava sulcis 4, obtusis, remotis.  $\overline{\text{T}}$

17. *arborescens*, fruticosum. L. Syst. 6. Hab. in Virginia. Fol. *Chaerophylli* sylvestris, ampla, supradecomposita, pinnis patentissimis. L. h.  $\dagger$

715. IMPERATORIA. *Fructus* subrotundus, compressus: medio gibbus, margine alato cinctus. *Petala* inflexo-emarginata.

1. *Ostruthium*. L. Blackw. t. 279. Hab. ad radices alpium Helvetiae, Austriae, Alverniae. Fol. ternata, latiuscula, serrata. Involucr. uno alterove foliolo tenuissimo.  $\overline{\text{T}}$

716. SESELI. *Umbellae* globosae. *Involucr.* foliolo uno alterove. *Fructus* ovatus, striatus.

1. *filifolium*, foliis filiformibus, caule flexuoso erecto. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *pimpinelloides*, caule declinato, umbellis nubilibus nutantibus. L. Meum nutans. Moench. meth. p. 86. Habit. in Europa australiore. Fol. pinnata, pinnis multifidis, segmentis alternis. Caul. primo decumbens, subflorescentia ferme erectus foliolo uno alterove: petiolo membranaceo, spathaeformi. Semina ovalia striis 3, elevatis. Lin.  $\overline{\text{T}}$

3. *leucospermum*, caul. erecto flexuoso fol. setaceis, involucr. submonophyllo, involucl. foliolis basi connatis, radiis umbr. germinibusque tomentosis. Plant. hongar. p. 92. t. 98. Cresc. in montib. apricis calcareis Budae. Fruct. sulcatus, coronatus. Umbellulae primo nutantes. Rad. resinosa. L. c.

4. *montanum*, petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, fol. caulinis angustissimis. Blackw. t. 426.  $\rho$ . *multicaule*, fol. bipinnatis, foliolis linearibus simplicibus trifidisque, involuclis subulatis. Retz. obs. 3. p. 27. Jacq. hort. 2. p. 59. t. 129. Memm nudicaule. Moench. method. p. 86. Hab. in Galliae, Italiae collibus. Caul. teres laevis. L.  $\overline{\text{T}}$

5. *striatum*, petiolis rameis membranaceis emarginatis, caule striato, pinnulis subulatis sulcatis. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *glaucum*, petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris: foliolis singularibus binatiisque canaliculatis laevibus petiolo longioribus. Jacq. austr. t. 144. Moris. 3. p. 273. s. g. t. 2, 4. Hab. in Gallia, Austria, Carniolia. Caul. striatus.  $\overline{\text{T}}$

7. *aristatum*, petiolis rameis submembranaceis laxis integerrimis. fol. supradecompositis, foliolis lanceolatis aristatis, fructibus ovatis. Ait. Kew. 2. p. 359. Hab. in Pyrenaeis.  $\overline{\text{Q}}$

8. *annuum*, petiolis rameis membranaceis ventricosis emarginatis. Jacq. austr. t. 55. S. bienne. Crantz. Villars Delph. 2. p. 585. Moris. 3. s. g. t. 6. Hab. in Pannonia, Gallia, Germania. Caul. subsulcatus. Rad. crassa, non annua. Flor. albicanti-subviolacei.  $\overline{\text{T}}$

9. *Chaerophylloides*, petiolis rameis membranaceis ventricosis integris, caule dichotomo paniculato, fol. supradecompositis glabris. Thunb. prod. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

10. *Ammoides*, caul. ramosissimo, fol. radicalibus foliolis imbricatis. L. Jacq. hort. t. 52. Hab. in Lusitania, Italia.  $\odot$

11. *tortuosum*, caule rigido divaricato ramosissimo. Oenanthe striata rigida. L. Hort. cliff. Hab. in Europa australi. Var. foliolis cuneatis.  $\overline{\text{Q}}$

12. *Turbith*, involuero universalis monophyllo, seminib. striatis villosis stylatis. Amoen. acad. 4. p. 310. Hab. in Europa australi.  $\overline{\text{T}}$

13. *Hippomarathrum*, involuclis connato-monophyllis. Jacq. austr. t. 143. Hab. in Austriae, Carnioliae, Germaniae saxoniae.  $\overline{\text{T}}$

14. *pyrenaicum*, fol. duplicato-pinnatis: foliolis incisis acutis, involuclis setaceis umbellula longioribus. Gouan. illustr. p. 11. Hab. in Pyrenaeis.

15. *Saxifragum*, caule filiformi divaricato, fol. duplicato-ternatis linearibus, umbellis subsexfidis. L. Sp. pl. 374. *Pimpinella saxifraga tenuifolia*. Bauh. pin. 160? Conf. Vill. Delph. 2. p. 587. Hab. ad Lacum Genevensem inque Germania.  $\overline{\text{T}}$   $\dagger$

16. *elatum*, caule elongato geniculato callosis, fol. bipinnatis: foliolis teretibus, fructibus scabris. Gouan. illustr. 16. t. 8. Hab. in Austria, Gallia. Fruct. perianth. coronatus. Vill. Delph. p. 580.

\* *carvifolium*, fol. bipinnatis, lacin. decussatis linearibus, ramis erectis, seminib.

laevibus. Vill. Delph. 2. p. 586. Hab. in Delphinatu. Involucr. 2-3-phyllum. Involucr. 5-7-phyllum.

717. **THAPSIA.** (Involucra o.) *Fructus* oblongus, membranaceus. *Petala* flava.

1. *villosa*, foliolis dentatis villosis basi cordonatis. Willd. p. 1464. Moris. t. 9. t. 18. f. 3. Hab. in Hispania, Lusitania, Galloprovincia, Ceto Mopseliensi.  $\bar{\mathfrak{L}}$

2. *foetida*, foliolis multifidis basi angustatis. Blackw. t. 459. Moris. 6. 9. t. 18. f. 7. Hab. in Hispania.  $\bar{\mathfrak{L}}$

3? *polygama*, fol. decompositis, foliolis acutis, involucro apice pinnatifido. Desf. Atl. t. p. 261. t. 75. Hab. prope Bone ad littora. Flor. centrales evanidi.

4. *Asclepiom*, fol. digitatis + foliolis bipinnatis setaceo-multifidis. Moris. 3. 9. t. 18. f. 9. Colum. ceph. t. p. 87. t. 85. Hab. in Apulia Oriente.  $\bar{\mathfrak{L}}$

5. *garganica*, fol. glabris pinnatis: foliolis pinnatifidis: laciniis lanceolatis. Gouan. illustr. 18. t. 10. Magnol. monsp. t. 286. Hab. in Barbaria, Gargano Apuliae.  $\bar{\mathfrak{L}}$

6. *trifoliata*, fol. ternatis ovatis. Hab. in Virginia.

718. **PASTINACA.** *Fructus* ellipticus, compresso-planus. *Petala* involuta, integra.

1. *lucida*, fol. simplicibus cordatis lobatis lucidis acute crenatis. Jacq. hort. t. 199. Gouan. illustr. 19. t. 11, 12. Hab. in Europa australi.  $\bar{\mathfrak{L}}$

2. *sativa*, fol. simpliciter pinnatis. Lin. Willd. Sp. p. 1466. *Pratensis*, fol. pinnatis glabris: foliolis ovato-oblongis inciso-lobatis, exterioribus trilobis. Flor. Dan. t. 1206. P. *sativa*. Mill. dict. Blackw. t. 379. Hab. in pratis.

3. *arvensis*, fol. pubescentibus pinnatis, fol. ovatis sublobatis: impari trilobo. Hab. in agris cultis inter segetes. P. *sativa* quorund. P. *sylvestris*. Mill. ? Videtur distincta species, cum minor sit, fol. minus lobata; etiam loco natali differat.

3. *Opopanax*, fol. pinnatis: foliolis basi antica exsicc. L. Gouan. illustr. p. 19. t. 13, 14. Hab. in Italia, Sicilia et Syria. Petioli subbispidi.  $\bar{\mathfrak{L}}$

4. *dissecta*, fol. caulinis supradecompo-

sitis: rameis subpinnatis; foliolis dissectis. Vent. Hort. Cels. p. 78. t. 78. Hab. in Oriente. Subpilosa. Involucr. universale. Flor. aurci.

719. **SMYRNIUM.** *Fructus* subcompressus, gibbosus, (nigrescens) striatus. *Petala* acuminata, carinata.

1. *perfoliatum*, fol. caulinis simplicibus amplexicaulibus, caul. alato. L. Willd. p. 1467. Plant. rar. Hungar. t. 23. Moris. 3. 9. t. 4. f. 2. Fol. inferiora composita. Enc. bot 3. p. 666. Hab. in Italia, Hisp., Ungaria et Creta. Flor. vere. Fol. caul. flava.  $\bar{\mathfrak{L}}$

2. *aegyptiacum*, foliis floralibus binis simplicibus cordatis integerrimis. Hab. in Aegypto.

3. *laterale*, fol. caulinis ternatis incisis serratis, umbellis lateralibus sessilibus. Thunb. profl. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

4. *Olusatrum*, fol. caulinis ternatis petiolatis serratis. Blackw. t. 408. Habit. in Scotia, Wallia, Gallia, Hispania, Belgio. Foliola rhomboidea.  $\bar{\mathfrak{L}}$

5. *apiifolium*, fol. caulinis cuneiformibus obtusis trifidis dentatis. S. creticum paludis folio. Tournef. cor. 23. Habit. in Creta. Involucr. universale et parziale nullum. W.  $\dagger$

6. *cordatum*, fol. radicalibus suborbiculato-cordatis crenatis: caulinis petiolatis trifoliatis: supremis 3-partitis, umb. radiis brevibus. Michaux. Flor. t. p. 170. Hab. in sylvis montosis Carolinae.

7. *aureum*, fol. biternatis lobo medio 3-5-gono ovali-lanceolatis serrulatis, umbel. brevi radiata. Michaux. Hab. in Carolinae montibus. Flor. plerique abortiunt. Mich. Flosc. omnes fertiles. L.

8. *atropurpureum*, fol. omnibus ternatis: foliolis ovato-acutis serratis, flor. atropurpureis. Lam. enc. bot. 3. p. 667. Hab. in Amer. septentrionali.

9. *intezerrimum*, fol. caulinis duplicatodternatis integerrimis. L. Michaux. p. 171. Hab. in Virginia. Fol. fere Aquilegiae, triternata, glauco-viridia. Umb. radii pauci, setaceo-clongati.

10. *nodiflorum*, fol. ternatim divisis: foliolis ovatis serratis, ramulis verticillato-paniculatis laxis. Allioni. n. 13. 7. t. 72. Ligusticum. Villars. Willd. Sp. p. 1425. Angelica paniculata. Lam. enc. 1. p. 172.

Hab. in alpb. Delphin. et Helvetiae. Sem. subrotunda, gibba, nigricantia.

720. *ANETHUM*. Fructus subovatus, compressus, striatus. Petala involuta, integra, (Hava.)

1. *graveolens*, annuum, fructibus compressis. L. ☉

2. *segetum*, subparvum, fol. caulinis tribus, fructibus ovalibus. Hab. in Lusitania et Gallia. ☉

3. *Foeniculum*, perenne, fruct. ovatis Riv. t. 60. Hab. in cultis oleraceis. ☞

721. *CARUM*. Fructus ovato-oblongus, striatus. Involuerum sub 1-phyllum. Petala carinata, inflexo-emarginata.

1. *Carvi*, caule ramoso, vaginis foliorum ventricosis, involucrio partiali nullo. Willd. Sp. 2. p. 1470. Flor. Dan. t. 1091. Jacq. austr. t. 393. Hab. in pratis. Fruct. aromaticus. ☉

2. *simplex*, caule simplicissimo, vaginis foliorum adpressis, involucrio partiali polyphylo. Willd. l. c. Hab. in Sibiria. Umbellulae capitate.

722. *PIMPINELIA*. Fructus ovato-oblongus. Petala inflexa. Stigm. subglobosa. Umbellulae subglobosae, primo nutantes.

1. *Sacifraga*, caule striato glabro, fol. pinnatis glabris, radicalibus foliolis subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis lineatis us. Willd. Sp. pl. 2. p. 1471. Engl. bot. t. 407. Flor. dan. t. 606. Hab. in pascuis siccis, ad vias in rupestribus. ☞

2. *nigra*, caule striato pubescente, fol. pinnatis pubescentibus, radicalibus foliolis subcordatis incisus obtusis dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. Willd. Hab. in Germaniae siccis. Radix vulnerata caeruleo lactescit. ☞

3. *magna*, fol. uniformibus pinnatis, foliolis omnibus lobatis, impari trilobo. Jacq. aust. t. 366. Engl. bot. t. 408. Flor. dan. t. 1155. Hab. in pratis, sylvaticis. Var. *Flor. rubris*: P. rubra quorundam.

\* *media*, fol. pinnatis, foliolis radicalibus subcordatis subtrilobis serratis, caulinis inciso-angulatis. Hoffm. Flor. germ. 1. p. 146. Jacq. austr. t. 397. P. orientalis. Gouan. ill. t. 157. Cum priore.

4. *lutea*, fol. pinnatis pubescentibus: fo-

liolis cordatis dentatis antice excisis, pedunc. filiformibus paniculatis. Desf. Atl. 1. p. 265. Hab. in Atlantic. Fol. P. *magnae*, radicalia pubescentia. Odor. aromaticus.

5. *dissecta*, fol. omnibus pinnatis, pinnis multipartitis, segmentis subfalcatis acutis. Retz. obs. 3. p. 30. t. 2. P. generensis. Vill. Delph. 2. p. 604. Hab. in pratis, sylvaticis. ☉ ? C. hircina. Roth.

6. *Tragium*, fol. pinnatis erectis, foliolis cuneatis incisus, summis simplicibus, seminib. hirsutis. Vill. Delph. 2. p. 605. Tragium alterum Dioscoridis. Colum. Phytob. p. 75. t. 17. ed. Plancii. Hab. in Delph. ad pedem mont. St. Just. Foliol. prioris anni pubescentia rotundata, dein 3-5-fida.

7. *peregrina*, foliis radicalibus pinnatis crenatis: summis cuneiformibus i cisis, umbellis nubilulis nutantibus. Jacq. hort. t. 231. Column. cephr. 1. p. 108. t. 109. Hab. in Italiae pascuis sterilibus. ☞

8. *Anisum*, fol. radicalibus trifidis incisus. Involucr. 1-phyllum. Fruct. pubesc. Anisum vulgare. Gaertn. 1. p. 102. Hab. in Aegypto et hinc inde colitur. ☉

9. *villosa*, fol. radicalibus bipinnatis: foliolis crenatis basi cuneatis, petalis (crassis) seminibus villosis. Schousb. p. 125. Hab. in arenosis regionis Tingitanac. Rad. tuberosa albidula. Invol. o. ☞

10. *Bubonoides*, foliis radicalib. 2-3-pinnatis: caul. mediis alternis compositis, petiolo latissimo duplo brevioribus, umbel. numerosissimis, sem. villosis. Brotero Phytograph. Lusitan. Fasc. 1. Hab. in Lusitaniae collib. calcariibus.

11. *dichotoma*, pedunc. oppositifoliis, fol. floriferis bibrachiatis, petiolis alato-membranaceis. L. Mant. 58. Hab. in Hispania. Petiolis aucti membrana alba.

12. *dioica*, pumila, umb. numerosissimis compositis simplicibusque, rad. fusiformi, fol. multifidis, linearibus. Jacq. austr. 1. t. 28. P. glauca. Thuill. Seseli pumilum. Lin. Sp. pl. 2. p. 373. Hab. in Austria, Gallia, Helvetia. ☞

13. *glauca*, fol. supradecompositis, caul. angulato ramosissimo. Lin. Gouan. ill. p. 15. Tragoselinum, caul. crasso subeoto divaricato. Hall. helv. n. 788. ? Hab. in Gallia, Italia, Helvetia, Hungaria.

Obs. Similis priori, sed differt statura 2-3-plove altiore, fol. 3-4-plo-pinnatis, umbel. omnibus compositis, ramis non paucis oppositis et floresc. superiore. Plant. rar. Hong. p. 73. t. 72.

14. *capensis*, fol. supradecompositis: lacinias acutis, caul. striato. Thunb. Prodr. p. 51. Hab. ad Cap. b. spei.

15. *leptophylla*, fol. multifido-setaceis, caul. elongato subdichotomo, umbel. trifida. Hab. in Ins. St. Dominica. Caul. tenuis. Fol. tenuissima, petiol. non membranaceus.

723. **APIUM.** *Fructus* ovatus, striatus. *Involucr.* 1-phyllosum. *Petala* aequalia.

1. *Petroselinum*, foliolis caulinis linearibus, involucrellis minutis. Lin. Willd. p. 1475. *β. crispum*, fol. radicalibus amplioribus crispis, Mill. dict. n°. 2. Hab. in Sardinia juxta scaturigines. ♂

2. *graveolens*, caul. sulcato, fol. caulinis cuneiformibus. Flor. dan. t. 790. Ludw. ect. t. 180. *β. dulce*, fol. erectis, petiolis longissimis, foliolis quinquelobatis serratis. Mill. dict. n°. 5. Hab. in humidis, salsis praesertim maritimis. ♂

724. **EGOPODIUM.** *Petala* inaequalia. *Fructus* ovato-oblongus, costatus. *Involucr.* o.

1. *Podagraria*, fol. caulinis summis ternatis ovatis. L. Flor. dan. t. 607. Hab. ad sepes et in pomariis. ♂

## TRIGYNIA.

725. **SEMEGARPUS.** *Cal.* inferus quinquefidus. *Cor.* 5-petala. *Nux* reniformis, receptaculo magno carnoso depresso inserta.

1. *Anacardium*, (longifolium), fol. longis lanceolatis utrinque acutis, racemis terminalibus subpaniculatis. Lam. enc. 1. p. 139. Lin. suppl. p. 182. Willd. Sp. p. 1476. Rumph. Amb. 1. t. 70. Roxb. Corom. 1. p. 11. t. 12. Habit. in montosis, sylvaticis Indiae. Arb. magna, praestat Anacard. officinarium.

2. *latifolium*, foliis alternis petiolatis ovatis subtus pubescentibus. Lam. L. c. Hab. in Ind. orientali. ♀

726. **RHUS.** *Cal.* 5-partita. *Petala* 5. *Bacca* 1-sperma.

### \* Foliis pinnatis.

1. *Coriaria*, fol. pinnatis, foliolis ellipticis obtuse dentatis, subtus villosis. Willd.

Sp. p. 1477. Ludw. ect. t. 122. R. petiolus inter foliola ultima subulatus. Ehrh. Hab. in Europa australi, Syria, Palaestina. ♀

2. *typhinum*, fol. pinnatis, foliolis lanceolatis acuminatis argute serratis, subtus pilosiusculis. Willd. arb. 288. Hab. in Virginia. Spica crassa, purpurasc. ♀

3. *javanicum*, fol. pinnatis ovatis acuminatis serratis, subtus tomentosis. Hab. in China. Ex baccis contusis et aqua coctis, sinenses extrahunt oleum, quo pro vernice utuntur. Lour. ♀

4. *semialatum*, fol. pinnatis serratis, petiolis extimis internodiis, membranaceis. Murr. in Comm. goett. 6. 1784. p. 27. t. 1. Hab. prope Macao, Au diversum a Rh. javanico. ♀

5. *glabrum*, fol. pinnatis lanceolatis serratis utrinque nudis, floribus hermaphroditis. Ait. Kew. 1. p. 365. *β?* viridiflorum. Hortulan. Hab. in Americae septentrionalibus altioribus ad agros et sepes. ♀

6. *elegans*, foliis pinnatis lanceolatis serratis, utrinque nudis, flor. dioicis. Ait. Kew. 1. p. 366. R. glabrum panicula speciosa coccinea. Catesb. carol. app. 4. t. 4. Hab. in Carolina australi. ♀

7. *Vernix*, foliis pinnatis integerrimis annuis opacis alatis, petiolo in tegro aequali flor. dioicis. Toxicodendron fol. alatis, fructu rhomboide. Dill. eldh. 39c. t. 29a f. 377. Pluck. alm. 45. t. 145. f. 1. Hab. in America septentrionali, Japonia. ♀

8. *succedaneum*, fol. pinnatis integerrimis perennantibus lucidis: petiolo integro aequali. L. Hab. in Japonia. China. Affine Rh. Vernix. Fol. hujus majora. Fructus magnitudine Cerasi, nec albus. L. ♀

9. *Copallinum*, fol. pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulado. Pluck. alm. 318. t. 56. f. 1. Hab. in America septentrionali. ♀

10. *alatum*, fol. pinnatis, foliolis ovatis apice serratis, petiolis internodiis omnibus alatis. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

11. *pauciflorum*, fol. pinnatis, foliolis alternis decurrentibus cuneiformibus apice serratis, panicula sessili pauciflora. Linn. suppl. 183. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

12. *Metopium*, fol. pinnatis quinatis integerrimis subrotundis glabris. L. Metopium fol. subrotundis pinnato-quinatis, racemis alaribus. Brown. jam. 177. t. 13. f. 3. Sloan. hist. 2. p. 90. t. 199. f. 3. Hab. in Amer. ♀

13. *striatum*, fol. impari pinnatis : foliolis integerrimis ovato-lanceolatis subtus tomentosis, racemis maximis, baccis striatis. Flor. Per. 3. ag. t. 252. Habit. in Chinchao nemorib. Cort. succus tincturam atram praebeat.

14. *lineatifolium*, foliolis ovatis dentatis lineatis, racem. axillaribus, bacc. striatis. Ortega Dec. pl. p. 83. Hab. in ins. Cuba. Bipedale. h

15. *pumilum*, pubescens, fol. pinnatis multijugis : foliolis ovalibus incidentatis, subtus tomentosis. Michaux. Flor. 1. p. 182. Hab. in Carol. superiore. Altitudine pedali. Fruct. holosericeus.

16. *digitatum*, scandens, fol. pinnatis, foliolis oblongis integerrimis glaberrimis. Linn. suppl. 184. Fol. quinatis, caule scandente cirrhifero. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. h +

\* \* *Foliis ternatis.*

17. *cirrhiflorum*, scandens, fol. ternatis, foliolis integerrimis glabris. Linn. suppl. 184. Hab. ad Cap. b. spei. h

18. *tridentatum*, scandens, fol. ternatis, foliolis incanis serratis, serraturis tribus ad quinque. Linn. suppl. 184. R. caule cirrhifero scandente. Thunb. prod. 52. Cum priore. h

19. *radicans*, fol. ternatis : foliolis petiolatis ovatis nudis integerrimis, caule radicante. L. Duham. arb. 2. t. 98. Hab. in Virginia, Canada. Dioicum. h

20. *Toxicodendron*, fol. ternatis : foliolis petiolatis angulatis pubescentib., caul. radicante. Cornut. canad. 46. t. 97. Barr. ic. 228. Cum praecedente cresc., cujus vix varietas videtur. h

21. *aromaticum*, fol. ternatis, foliolis sessilibus ovato-rhombicis inciso-serratis pilosiusculis. Ait. Kew. 1. p. 367. Conf. Michaux. Flor. 1. p. 184. Hab. in Carolina superiore et Kentucky. h

22. *suaveolens*, foliis ternatis, foliolis sessilibus ovato-rhombicis, inciso-serratis glabris. Ait. Kew. 1. p. 368. Myrica trifoliata. Lin. ? Hab. in America boreali. h

23. *dentatum*, fol. ternatis, foliolis obovatis mucronato-dentatis glabris, caule scabro. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. spei. h

24. *sinuatum*, fol. ternatis, foliolis ovatis obtusis sinuatis subtus villosis. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. spei. h

25. *cuneifolium*, fol. ternatis, foliolis sessilibus cuneiformibus glaberrimis septemdentatis, dentibus mucronatis. Linn. suppl. 183. Hab. ad Cap. b. spei. h

26. *incisum*, fol. ternatis, foliol. sessilibus cuneiformibus inciso-pinnatifidis sulcus tomentosis venosis, calycibus tomentosis. Linn. suppl. 183. Fol. Myriacae quercifoliae. h

27. *albidum*, fol. ternatis : foliolis sessilibus cuneiformibus crenatis utrinque canotomentosis, petiolis marginatis. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 128. Hab. in collib. arenosis prope Mogadore. Vernac. *Tassad*. Cultum canthemi et tomentum exuit. Bac. dulcescentes rubrae. h

28. *tomentosum*, fol. ternatis : foliolis subpetiolatis rhombicis angulatis ovatisque subtus tomentosis. L. Pluck. alm. 319. t. 219. f. 7. Comm. hort. 1. p. 279. t. 92. Fol. majuscula fere ut in Sal. Capraea.

29. *villosum*, fol. ternatis, foliolis obovatis integerrimis sessilibus utrinque pilosis. Ait. Kew. 1. p. 368. Linn. suppl. 183. R. folio subrotundo integro molli et incano. Pluck. alm. 319. t. 219. f. 8. Cano tomento a reliquis distinguitur.

30. *pubescens*, foliis ternatis, foliolis obovatis mucronatis glabris, ramis villosis. Thunb. prod. 52. Hab. ad Cap. b. spei. h

31. *viminale*, fol. ternatis, foliol. longissimis lineari-lanceolatis integerrimis glabris basi attenuatis, intermedio subpetiolato. Ait. Kew. 1. p. 368. Vahl. symb. 3. p. 50. Willd. p. 1484. R. *lanceum*. Linn. suppl. 184 ? Hab. ad Cap. b. spei. Panícula supradecomposita, fol. brevior. Semper-virens. h

32. *angustifolium*, fol. ternatis : foliolis petiolatis lineari-lanceolatis integerrimis, (subseratisque) subtus tomentosis. L. fol. subtus argenteis acutis et margine incis. Pluck. alm. 319. t. 219. f. 6. Hab. in Aethiopia Semper-virens. Fol. ovato-lanceolata. h

33. *rosmarinifolium*, fol. ternatis : foliolis sessilibus linearibus revolutis subtus ferrugineis. Vahl. symb. 3. p. 50. Burm. afr. 251. t. 91. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h

34. *thesera*, spinosum, fol. ternatis, foliolis lineari-lanceolatis integerrimis, petiolis dilatatis. Rh. pentaphyllum. Desf. Atl. 1. p. 267. t. 77. Rhamnus pentaphyllus. Lin. Boec. sic. t. 21. Hab. in Sicilia et Barbaria. Semper-vir. Flor. dioici.

35. *Oxyacanthoides*, spinosum, foliis

ternatis glabris : foliol. angusto-cuneiformibus apice trilobis integrisque flor. dioicis. Dumont. Cours. Bot. Cultiv. 3. p. 568. Hab. in Africa. Spinæ axillares demum foliosae.

35. *Crataegiforme*. Rh. *Oryacantha*, caul. fruticoso inermi, fol. ternatis cœnis, foliol. ovato - cuneatis : medio longiore. Cav. in Annal. de scienc. nat. p. 35. †

36. *laevigatum*, fol. ternatis : foliolis sessilibus lanceolatis laevibus. Hab. ad Cap. b. spei. Panic. longa, tenuissima sempervir. h

37. *lucidum*, fol. ternatis, foliolis obovatis retusis glabris. Thunb. prod. p. 52. Cav. ic. p. 27. t. 132. Pluck. alm. 319. t. 218. f. g. Burm. afr. 252. t. gr. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei, inque Mexico. Sempervirens. h

38. *glaucum*, fol. ternatis : foliolis obcordatis, nonnullis glauco - pulverulentis. Elegans species. Foliol. parvula, nitida emarginata : 2 inferiora minora. Semperv.

39. *undulata*, fol. ternatis : foliol. glabris obovatis undulatis, petiol. canaliculatis dilatatis. Ex Hort. Celsii. Foliol. majus passim subrhomboidale apice in nonnullis subincisis. Diversum a R. suaveolente. Semperv.

40. *aequale*, fol. ternatis : fol. omnib. magnitudine aequalibus subscabris, obovato-lanceolatis integris, caul. petiolisque puberulis. Hinc inde colitur. Fol. majuscula cum parvo mucrone.

41. *lanceum*, fol. ternatis : fol. lanceolatis glabris integerrimis, flor. paniculatis. Foliola 2 inferiora paullo minora, forma aequalia : angulo recto distantia ; margine subrevoluta mucronata. Panic. fol. longior. An Rh. *lanceum*. Linn. suppl. p. 184. aut Thunb. prodr. p. 52 ?

Obs. Tres posteriores species (forte quoque ex Cap. b. spei) accuratius examen adhuc merentur, an forte cum una alterave junct. cognita eadem sint nec ne.

\*\*\* *Foliis simplicibus.*

42. *Cotinus*, fol. simplicibus obovatis. Jacq. austr. t. 210. R. racemis plumosis, fol. ovatis. Hall. helv. n°. 827. Hab. in Lombardia, Carniola, Helvetia, Sibiria, Austria. h

43. *atrum*, fol. simplicibus ovato-oblongis, floribus polygamis. Forst. prod. 142. Hab. in N. Caledonia. h

727. VIBURNUM. Cal. 5-partitus,

superus. Cor. 5-fida. Bacca aut Drupa 1-sperma.

\* *Foliis integerrimis.*

1. *Tinus*, fol. integerrimis ovatis opacis : ramificationibus venarum subtus villosoglandulosis. L. Willd. Sp. 2. p. 1486. Curt. Magaz. t. 38. Hab. in Lusitania, Hispania, Italia et Barbaria. h

2. *lucidum*, fol. coriaceis ex ovato sublan- ceolatis nitentibus integerrimis. V. *Tinus*. var. β. Ait. Kew. p. 370. Hab. in Hispania. Caul. humilis. Cor. majuscula lactea extus rubescens. Caul. subquadrangularis.

3. *rugosum*, foliis lato-ovatis rugosis subtus hirsutis, involucri. universali 7-phylllo. V. *Tinus*. Var. hirta. Ait. ? Hab. in ins. Canariis. Flor. sub finem hyemis. Caul. satis altus, ramis subangulatis pilosis. Flor. subodorati congesti. Huc V. *Tinus*. Var. latifolia et V. strictum Hortul.

4. *Tinoides*, fol. ellipticis glabris integerrimis, ramis cymisque teretibus hirsutis. Linn. suppl. 184. Hab. in America meridionali. h

5. *villosum*, fol. integerrimis ovatis, subtus incano-villosis. Swartz. fl. ind. occid. t. p. 564. Hab. in montibus Jamaicae. h

\*\* *Fol. serratis aut crenatis.*

6 ? *scandens*, fruticose scandens, fol. oblongis serratis, cymis terminalibus, radiis terminatis flore maximo. Linn. suppl. 184. V. *virens*. Thunb. jap. 123. Hab. in Japonia. Stamina 10. styli et fructus ignoti. Thunb. h. †

7. *nudum*, fol. ovalib. subrugosis margine revolutis obsolete crenulatis. Ait. Kew. t. p. 370. V. fol. integerrimis lanceolato-ovatis. Lin. Sp. pl. 383. Mill. ic. 183. t. 274. Hab. in Virginia. Cymae in hac nudae, s. non involucretae. h

8. *prunifolium*, fol. ovatis ovalibusque glabris argute serratis, petiolis marginatis. Ait. Kew. t. p. Pluck. alm. 249. t. 46. f. 2. Hab. in Virginia, Canada. Fol. tenuia, lacte viridia. h

9. *davuricum*, fol. ovatis serratis punctato-pilosis, cymis dichotomis paucifloris. Pall. ross. 2. p. 30. Lonicera mougolica. Pall. ross. 1. p. 59. t. 38. Gmel. sib. 3. t. 25. Hab. in Davuria. h

10. *dentatum*, fol. ovatis dentato-serratis plicatis, fruct. subglobosis. *Lucidum*, fol.

utrinque glabris suborbiculatis. Ait. Kew 1. p. 372. Pubescens. fol. ovalibus acuminatis subtus villosis. Ait. l. c. Michaux. Flor. 1. p. 179.

11. *plicatum*, fol. ovatis obtusis dentato-serratis plicatis. Thunb. in Act. soc. Linn. 2. p. 332. V. dentatum. Thunb. jap. 122. Hab. in Japonia. h

12. *erosum*, fol. ovatis acuminatis eroso-serratis glabris, petiolis tomentosis. Thunb. jap. 124. Hab. in Japonia. h

13. *Lantana*, fol. cordatis serratis venosis subtus tomentosis. In Europae sylvis *β. canadensis*, fol. latioribus minus tomentosis crenatis. *β. grandifolium*. Ait.

14. *Lantanoides* (subdecumbens), petioli nervisque pulverulento-tomentosis, fol. suborbiculato-cordatis abrupte acuminatis dentatis, cymis sessilibus, fruct. ovatis. Michaux. Flor. 1. p. 179. Hab. in sylvis ad rupes in Canada. Priori affinis, sed humilior caul. subprocumbentibus. M. h

15. *tomentosum*, fol. ovatis acuminatis serratis venosis subtus tomentosis, umbellulalateralib. Thunb. jap. 123. Hab. in Japoniae sylvis variis inter Miaco et Jedo. h

16. *hirtum*, fol. ovatis serratis villosis, petiolis hirtis. Thunb. Hab. in Japonia. h

17. *acerifolium*, fol. cordato-ovatis aut trilobis acuminatis argute serratis, petiolis eglandulosis pilosis. Willd. Vent. Hort. Cels. p. 72. t. 72. Hab. in Virginia. Facie fere grossulariae. Petioli basi stipulis linearibus. h

18. *orientale*, fol. trilobis acuminatis grosse obtusiuscule dentatis, petiolis eglandulosis glabris. Willd. p. 1490. Pall. ross. 2. t. 58. fig. H. Hab. in Imcreciae subalpinis. Affine praecedenti. h

19. *Opulus*, fol. trilobis acuminato-dentatis, petiolis glandulosis glabris. Willd. p. 1490. Flor. dan. t. 661. *β. roseum*, cyma globosa, flor. pleno. Hab. in sylvis. h

20. *dilatatum*, fol. obovatis acuminatis inaequalib. dentatis villosis. Thunb. jap. 124. Hab. in Japonia. Caulis cinereus, et pedunculi tomentosi. Stylus simplex. Thunb. + h

21. *macrophyllum*, fol. obovatis acuminatis dentatis glabris. Thunb. jap. 125. Hab. in Japonia. h

22. *cuspidatum*, fol. ovatis cuspidatis serratis villosis. Thunb. Cum priore. Umb. supradecomposita terminalis, flor. radiatibus. Thunb. h

23. *Lentago*, fol. lat.-ovatis acuminatis argute serratis, petiolis marginatis crispis. Ait. Hab. in Canada. Kalm. Cym. sessilibus. h

24. *cassinoides*, fol. ovatis lanceolatisque crenatis glabris, petiolis carinatis eglandulatis. Lin. V. fol. parvulis cuneato-obovalibus crenato-dentatis coriaceis, cymis arcte sessilibus. Michaux. Flor. 1. p. 179. Hab. in umbris sylvarum, juxta rivos Carolinae infer. et Georgiae. h

25. *nitidum*, fol. linearis-lanceolatis supra nitidis obsolete serratis integrisve. Ait. Hab. in America boreali. h

26. *laevigatum*, fol. lanceolatis laevibus remote serratis basi integerrimis. Ait. Cassine Peragua. Lin. Habit. in Carolina, Virginia.

728. CASSINE. Cal. 5-partitus. Petala 5. Bacca 3-sperma.

1. *capensis*, ramulis 4-gonis, fol. petiolatis ovatis retusis crenatis, panicula folio brevior. Thunb. prod. 52. Willd. Sp. 2. p. 1494. Burm. afr. 230. t. 85. Dill. elth. 315. t. 236. f. 305. Hab. ad Cap. b. spei. h

2. *Colpoon*, fol. petiolatis ovatis crenatis, panicula longitudine folii. Thunb. prod. 52. Eronimus Colpoon, flor. quadri-fidis, fol. ovalibus saepius integerrimis. L. Mant. p. 210. Hab. ad Cap. b. spei. An a priore satis diversa? h

3. *barbara*, fol. sessilibus serrato-dentatis cordato-oblongis, ramulis quadrangulis. Lin. Hab. ad Cap. b. spei. h +

4. *Maurocenia*, fol. sessilibus integerrimis obovatis coriaceis integerrimis convexis, flor. axillarib. confertis. Lam. enc. 1. p. 653. Maurocenia Frangularia. Mill. dict. n°. 1. Dill. elth. t. 121. f. 147. Pluck. alm. t. 158. f. 2. In Aethiopia. h

5. *concaea*, fol. alternis subpetiolatis subrotundis integerrimis superne concavis, pedunc. simplicibus axillaribus. Lam. enc. 1. p. 652. Pluck. alm. t. 280. f. 4. C. humilis, quorund. Hab. in Africa. Caul. subtortuosus. An eadem ac Celastorus lucidus? h

6. *laevigata*, fol. aeternis subpetiolatis oblongo-ovatis obtusis integerrimis planiusculis, pedunc. axillarib. racemosis. Lam. enc. 1. p. 652. Hab. in Cap. b. sp. Truncus cortice nigro. Bacca, uti in antecedentibus, trigona. Celastorus affinis. h

7. *oleifolia*, foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis marginatis,

corymb. minimis axillarib. Lam. l. c. Cum priori. Ram. juniores angulati, glabri.

8. *xylocarpa*, fol. petiolatis ovatis sessilib. pedunc. dichotomis fol. breviorib. fruct. ossic. Vent. Choix d. Pl. p. 23. t. 23. Hab. in Antillis, ins. St. Thomae. h

729. *SAMBUCUS*. Cal. 5-partitus. Cor. 5-fida. Bacca. 3-sperma.

1. *Ebulus*, cymis tripartitis, stipulis foliaceis ovatis, caule herbaceo. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1494. Flor. dan. t. 156. Hab. in Europa magis australi, et in Barbaria locis depressis. E

2. *nigra*, cymis 5-partitis, stipul. 2. utrinque setaceis, foliis pinnatis, foliolis ovatis serratis, caule arboreo. Flor. dan. t. 545. Engl. bot. t. 476.  $\beta$ . *laciniata*, fol. bipinnatis, pinnis ternatis, foliol. lanceolatis incis. Retz. obs. 3. p. 30. Hab. in Europa et Japonia. Var. fructu nigro et albo. h

3. *canadensis*, stipul. nullis, cymis quinquepartitis, foliis subbipinnatis foliol. oblongo-oval b. nitidis glabris, caule frutescente. Michaux. Flor. 1. p. 181. Hab. in Canada. Flores ut in *S. nigra*, sed Baccae parvae atro-rubrae dulces. Willd. h

4. *pubescens*, cyma subracemosa, cortice verruculoso, fol. terminalib. quinatis: foliol. ovali-lanceolatis subtus pubescentibus. Michaux. l. c. Hab. in altis montib. Pennsylvan. Canadae et Carolinae. Affinis sequenti; fruct. etiam rubri, sed fol. nunquam ternata. M.

5. *racemosa*, racemis compositis ovatis, caule arboreo. Jacq. Icon. rar. 1. t. 59. Hab. in montibus sylvesticis. Baccae rubrae. h

6. *japonica*, fruticosa, cymis tripartitis, stipulis nullis. Thunb. jap. 125. Hab. in Japonia. Cyma supradecomposita trichotoma nuda absque bracteis. Germen superum. Stigma capitatum. Tb. h

Obs. Uterius examinanda est haec species, quae ob germen superum saltem non hujus generis est.

730. *SPATHHELIA*. Cal. 5-phyllus. Pet. 5. Caps. trigona, 3-locularis. Sem. solitaria.

1. *simplex*. Lin. Lam. ill. t. 209. Spathe caudice simplici, fronde pinnata comosa, racemo simplicissimo laxo terminali. Brown.

jam. 187. Sloan. list. 2. p. 28. t. 171. Hab. in Jamaica. h

731. *STAPHYLEA*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. inflatae, connatae. Nuces 2, globosae cum cicatrice.

1. *occidentalis*, fol. duplicato-pinnatis, capsulis trigonis, seminibus solitariis, caule arboreo. Swartz. prod. 55. Fl. ind. occid. 1. p. 566. Hab. in Jamaicae campestris montium. h

2. *pinnata*, fol. pinnatis. Hab. in Europae australioris succulentis. Styli duo. Styli 2, saepius 3. h

3. *heterophylla*, fol. ternatis quiaatis, pinnatisque serratis. Flor. Per. 3. p. 29. t. 253. In Andium nemorib. Cyp. unica non inflata, subtriloba. Hab. Sambuci.

4. *trifolia*, fol. ternatis. Hab. in Virginia. h

732. *TAMARIX*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 1-locularis, 3-valvis. Sem. coma instructa.

1. *gallica*, flor. pentandris, spicis lateralibus, fol. lanceolatis amplexicaulis imbricatis. Willd. Sp. p. 1498.  $\beta$ . *canescens*, fol. cauleque tomentoso-caulis. Pall. ross. 2. p. 72. t. 79. Hab. in Gallia, Hisp. Italia, Russia.  $\beta$ . in desertis salis maris Caspii. h

2. *africana*, fol. imbricatis minimis, flor. pentandris, spic. tereti densissima, peduncul. squamosis, stylo trifido. Desf. Atl. 1. p. 269. Hab. in Algeria ad maris littora. Affinis priori. Spica crassior. Flor. 2-4-plo majores. h

3. *articulata*, flor. pentandris, spicis lateralibus, fol. brevissimis vaginatis. Willd. Vahl. symb. 2. p. 48. t. 32. Thuja aphylla. L. Hab. in India orientali, Arabia. h

4. *songarica*, flor. octandris decandrisque, fol. filiformibus carnosiss. Pallas in Act. Petrop. 10. p. 374. t. 10. f. 4. Hab. in Sibiria locis salis Songariae. h

5. *germanica*, flor. decandris, spicis terminalibus, fol. sessilibus lineari-lanceolatis. Willd. p. 1499. Mill. ic. t. 262. f. 2. Hab. in inundatis, ad flum. ripas. h

$\beta$ ? *caspica*, caule herbaceo annuo, flore minore. Pall. ross. 2. t. 80. f. B.  $\odot$ . Ad mare Caspium. Var. videtur differre ob caulem herbaceum. Willd.



732. REICHELIA. *Cal.* 5-partitus.  
*Cor.* campanulata 5-fida. *Caps.*  
3-locularis circumscissa poly-  
sperma. *Sem.* receptaculo maxi-  
mo adhaerentia.

1. *palustris*. Aubl. guj. 1. p. 285. t. 111.  
Hab. in Gujanae ad rivulorum ripas. Caul.  
plures tripedales. Fol. alterna integerrima.  
Flor. caerulei, axillares.  $\overline{\text{T}}$

734. SALMASIA. *Cal.* 5-partitus.  
*Cor.* 5-petala. *Styl.* o. *Capsula*  
3-locularis, 3-valvis polysperma.

1. *racemosa*. Willd. p. 1502. Tachibota  
gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 287. t. 112. Lam.  
ill. t. 208. Hab. in sylvis Gujanae. Frutex  
ramis hirsutis rufescentibus. Fol. alterna  
oblonga acuminata integerrima glabra. Flor.  
albi. W.  $\overline{\text{h}}$

735. MALESHERBIA. *Cal.* inferus  
persistens. *Petala* fauci cal. infra  
incisuras insidentia. *Nect. Coro-*  
*nula* 10 squamis, membranaceis  
2-4-crenatis, petalis alternis.  
Anth. incumbentes basi excavata.  
*Styl.* infra apicem germinis orbi-  
culatim affixi. *Stigm.* capitata.  
*Caps.* apice trivalvis. *Sem.* plura  
affixa receptac. 3, linearibus,  
per caps. parietem decurrentibus.

1. *thyrsiflora*, fol. lineari-lanceolatis  
sinuatis dentatis, cal. tubuloso-ventricosus.  
Flor. Per. 3. p. 30. t. 254. Gynopleura tu-  
bulosa. Cav. ic. 4. p. 52. t. 375. Hab. in  
Pernu. argillosis aridis, calidis. Foetida,  
hirsutissima. Cal. et petala lutea utrinque  
villosa, marcescunt.  $\overline{\text{h}}$

2. *linearifolia*, fol. sublinearibus ses-  
silibus ciliaribus villosis, cal. infundibuli-  
formi. Cav. l. c. t. 376. Hab. in montib.  
Chilensibus. Cal. tomentosus. Petal. luteo-  
alba.

736. TURNERA. *Cal.* 5-fidus,  
infundibulif. exterior diphyllus.  
*Petala* 5, calyci inserta. *Stig-*  
*mata* multifida. *Caps.* 1-locu-  
laris, 3-valvis.

1. *ulmifolia*, flor. sessilibus petiolaribus,  
foliis basi biglandulosis. L. Hort.  
cliff. t. 10. Willd. Sp. 2. p. 1503. Sloan.  
jam. hist. t. 127. f. 4. 5.  $\beta$ . *angustifolia*,  
flor. sessilibus petiolaribus, fol. lanceolatis

rugosis acuminatis. Curt. mag. t. 287. Hab.  
in Jamaica, et in America calidiore.  $\overline{\text{O}}$

2. *Pumilea*, flor. sessilibus petiolaribus,  
fol. eglandulosis. Lin. Pet. gaz. 59. t. 38.  
f. 9. Sloan. l. c. t. 127. f. 6. Hab. in Ja-  
maicae campis sabulosis aridis.  $\overline{\text{O}}$

3. *rupestris*, pedunculis axillaribus bi-  
setis, fol. linearibus serratis. Willd. Aubl.  
guj. 1. p. 289. t. 113. f. 1. Hab. in rupibus  
locis humidis Gujanae.  $\overline{\text{h}}$

4. *sidoides*, pedunc. axillaribus bisetis,  
fol. obovato-cuneatis serratis. Hab. in Bra-  
silia. Caul. palmaris.

5. *frutescens*, pedunc. axillaribus bi-  
setis, fol. lanceolatis acuminatis aequaliter  
serratis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 290. t. 113.  
f. 2. Hab. in fissuris rupium Gujanae.  $\overline{\text{h}}$

6. *rugosa*, pedunc. axillaribus aphyllis,  
flor. pentagynis, fol. oblongis eroso-den-  
tatis rugosis. Willd. Piriqueta villosa. Aubl.  
guj. 1. p. 298. t. 117. Burcardia. Schreb.  
Hab. in Gujanae et Cajennae maritimis  
arenosis.  $\overline{\text{O}}$

7. *cistoides*, pedunc. axillaribus aphyllis,  
fol. apice serratis. Lin. Plum. spec. 7.  
icon. 150. f. 1. Sloan. hist. 1. t. 127. 7. Hab.  
in America meridionali. Caulis digitalis.  
Bractee nullae.  $\overline{\text{O}}$

8. *racemosa*, racemis terminalis elon-  
gatis, foliis ovatis dentatis. Jacq. hort.  
vindob. 3. t. 94. Hab. .... Pedunc. longis-  
simi uniflori.  $\overline{\text{O}}$

9. *gujanensis*, racemo terminalib. pau-  
cifloro nudo, fol. linearibus serratis basi  
biglandulosis. Willd. Aubl. guj. 1. p. 291.  
t. 114. Hab. in Gujanae pratis paludosis.  $\overline{\text{O}}$

737. TELEPHIUM. *Cal.* 5-phyllus.  
*Petala* 5, receptaculo inserta.  
*Caps.* 1-locularis, 3-valvis.

1. *Imperati*, fol. alternis. Lam. ill. t. 213.  
Desf. Atl. 1. p. 270. Tournet. inst. 128.  
Hab. in Galloprovincia, Helvetia, et Bar-  
baria ad maris littora.  $\overline{\text{T}}$

2. *oppositifolium*, fol. oppositis. Shaw.  
sfr. 572. f. 572. Hab. in Barbaria.  $\dagger$

738. CORRIGIOLA. *Cal.* 5-phyllus.  
*Petala* 5. *Sem.* 1, triquetrum.

1. *Telephiiifolia*, caul. diffuso pro-  
cumbente, fol. oblongo-ovatis, ramis  
aphyllis, seminib. polygonis. Pourret Chlor.  
Narbon. p. 20. (Vid. Act. Tulos. v. 2.)  
Hab. ad rupes prope Boulou.  $\overline{\text{T}}$

2. *littoralis*, decumbens, fol. linearibus, flor. pedunculatis, calycibus marginibus membranaceis. Willd. Sp. 2. p. 1506. Lam. ill. t. 213. Flor. dan. t. 334. Moris. s. 5. t. 29. f. 1. Hab. in Galliae, Germaniae, Helvetiae et Barbariae arenosis, Humifusa, ramis centrifugis. ☉

3. *capensis*, flor. sessilibus, calycibus viridibus. Willd. p. 1507. C. littoralis. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei ☉ +

739. PHARNACEUM. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 3-locularis, polysperma.

1. *Cerviana*, peduncul. subumbellatis lateralibus, folia linearia aequantibus. L. Willd. p. 1587. Lam. ill. t. 214. f. 1. Gmel. sib. 3. t. 20. f. 2. Cerviana. Minuarti monogr. 1. Trichlis. Hall. Alsiene. Pluck. mant. g. t. 332. f. 11. Hab. Rostockii, in Russia, Hispania, Guinea, Asia. ☉

2. *sperguloides*, fol. fasciculatis verticillatis linearibus acuminatis, umbel. terminalibus paucifloris. Enc. bot. 5. p. 260. Lam. ill. t. 214. f. 2. Hab. in India.

3. *lineare*, umbellis inaequalibus, fol. linearibus, oppositionibus remotis. Linn. suppl. 185. Hab. ad Cap. b. spei.

4. *teretifolium*, fol. filiformibus mucronatis, umbellis lateralibus, caule erecto frutescente. Thunb. prod. 53. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

5. *microphyllum*, tomentosum, pedunc. umbellatis, fol. ovatis teretiusculis obtusis lana intertextis. Linn. suppl. 185. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *marginatum*, fol. ovatis marginatis obtusis, flor. axillaribus sessilibus. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *Mollugo*, pedunc. unifloris lateralibus, flor. longitudine foliorum, caule depresso. Burm. ind. 31. t. 5. f. 4. Burm. zeyl. 13. t. 7. Hab. in India orientali. ☉

Obs. Simillima Illecebro fcoideo. Fructificatio simillima Mollugini verticillatae. Petala vero simillima Glino lotoli. L.

8. *glomeratum*, flor. glomeratis, caul. flexuoso, fol. linearibus. Linn. suppl. 185. Pluck. mant. 163. t. 331. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

9. *serpyllifolium*, pedunc. unifloris,

fol. ovatis. Linn. suppl. 186. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

10. *quadrangulare*, subfruticoseum, fol. linearibus quadrifariam imbricatis. Linn. suppl. 185. Hab. ad Cap. b. spei. Ericaefacie. Flor. albicatus virides. L. ♀

11. *incanum*, pedunc. communibus longissimis, fol. linearibus, stipulis pilosis. Linn. suppl. 186. Hab. in Africa. Caul. profliferus. Rami stipulis tui atis. ♀

12. *albans*, pedunc. communibus longissimis, fol. linearibus exstipulatis. Linn. suppl. 186. Pluck. phytog. t. 304. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. ♀

13. *dichotomum*, pedunc. axillaribus elongatis dichotomis, fol. verticillatis linearibus. Linn. suppl. 186. Hab. ad Cap. b. spei. ☉

14. *distichum*, racemis bipartitis flexuosis, foliis sublinearibus pubescentibus. Pluck. mant. g. t. 332. f. 4. Mollugo racemosa. Lam. ill. Hab. in India orientali.

15. *cordifolium*, racemis bipartitis terminalibus, fol. obcordatis. Hab. ad Cap. b. spei.

16. *bellidifolium*, fol. ovato-spathulatis, caul. nudo, racem. paniculatis dichotomis. Enc. bot. 5. p. 262. Plum. Amer. t. 21. f. 1. Sloan. jam. t. 129. f. 2. Hab. in Jamaica, Guiana. Facie a ceteris differt speciebus.

740. ALSINE. Cal. 5-phyllus. Petala 5, aequalia. Caps. supera, 1-locularis, 3-valvis, polysperma. Recept. centrale liberum.

1. *media*, caul. latere alterno piloso, petalis bipartitis, fol. ovato-cordatis. Flor. dan. t. 525. Curt. Lond. ic. Lam. ill. t. 214. Holostemum Alsiene. Swartz. obs. 118. Stellaria media. Smith. Flor. brit. 2. Hab. in cultis. Stamina numero a 3-7 variant. ☉

\* *prostrata*, fol. oblongis, caul. prostrato dichotomo, flor. 5-andro. Forsk. aegypt. p. 207. Hab. in Aegypto.

+ *SECRETARIA*. Fol. stipulacea. Petala integra. Stam. passim 3 et 4.

2. *viscosa*, caul. paniculato folisque pubescentibus, petal. cal. brevioribus. Schreb. Hoff. Flor. germ. p. 148. Aren. tenuifolia. Flor. dan. t. 389. Hab. in collinis et arenosis Lipsiae, Silesiae. Flor. 3-andri.

3. *segetalis*, glabra, petalis integris, fol. subulatis subsecundis. Lin. A. segetalis graminis fol. unum latus spectantibus. Vaill. paris. 8. t. 3. f. 3. Hab. inter segetes passim. (Stipul. membranaceae incisae. Stam. 3-4.)

4. *mucronata*, petalis integris brevibus, fol. setaceis, calycibus aristatis. Hab. in Helvetia, Gallia. ☉

*Qbs.* Genus dividendum, aut potius supprimendum et ejus species pro petalorum forma tum Stellariis tum Arenariis inscendae, a quibus numero staminum inconstante tantum differre videntur.

741. DRYPIS. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Caps.* circumscissa, monosperma.

1. *spinosa*. Jacq. hort. 49. Lam. ill. t. 214. Mich. gen. 24. t. 21. Hab. in Mauritania, Italia, Istria. Petala angusta. Fol. subulata, subtrigona, mucronata.

742. SAROTHTA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis, colorata.

1. *gentianoides*. Lam. ill. t. 215. Gentiana caule ramisque ramosissimis, fol. subulatis minimis. Gron. Virg. 29. Pluck. mant. 43. t. 342. f. 2. *Hypericum*. Mich. 2. p. 79. Hab. in Virginia, Pennsylvania. ☉

743. BASELLA. *Cal.* 6. *Cor.* 7-fida: laciniis 2 oppositis latioribus, tandem baccata. *Sem.* 1.

1. *rubra*, fol. planis, pedunc. simplicib. L. Willd. p. 1513. Salb. hort. rom. 2. t. 98. Reed. 7. t. 24. Hab. in India. ☉

2. *alba*, fol. ovatis undatis, pedunculis simplicibus folio longioribus. Pluck. alm. t. 63. f. 1. Hab. in China, Amboina. ☉

3. *lucida*, fol. subcordatis, pedunculis confertis ramosis. In India. ☉

4. *cordifolia*, fol. cordato-subrotundis, pedunc. simplicibus folio brevioribus. Lam. enc. 1. p. 377. Hab. in India orientali.

744. PORTULACARIA. *Cal.* 2-phyllus. *Petala* 5. *Sem.* 1, alatriquetrum.

1. *afra*. Jacq. Coll. 1. p. 160. t. 22. Claytonia Portulacaria, caule arboresco erecto.

L. Mant. 217. Dill. elth. 120. t. 101. f. 120. Hab. in Africa. h

## TETRAGYNIA.

745. PARNASSIA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Nectaris* 5, cordata, ciliata apicibus globosis. *Caps.* 4-valvis, 2-locularis. *Recept.* parietalia. *Sem.* membranaceo-marginata. G.

1. *palustris* (europaea), foliis radicalibus cordatis, nectaris multisetis. Englb. bot. t. 82. Flor. dan. t. 584. Hab. in pratis uliginosis. Aug. Stamina primo germini incumbunt, polline disperso eriguntur. T.

2. *caroliniana*, fol. radicalib. suborbiculatis, nect. (appendicibus perigynicis) trisetis. Michaux. Flor. 1. p. 184. Hab. in Carolinae udis. T.

3. *asarifolia*, radical. reniformibus petalis unguiculatis appendicibus trifidis. Vent. Malma. p. 39. t. 39. Hab. in Amer. septentrionali. Ex maximis. T.

## PENTAGYNIA.

746. ARALIA. *Involucr.* umbellulæ. *Cal.* superus, 5-dentatus. *Petala* 5. *Bacca* coronata 5-sperma.

\* *Foliis integris.*

1. *arborescens*, caul. arboresco, fol. simplicibus, umbel. radiis 1-glandulosis. Lin. Willd. 2. p. 1518. Jacq. Schoenbr. 1. p. 26. t. 51. Hab. in Jamaica.

2. *capitata*, arborescens, fol. simplicibus ellipticis integerrimis, paniculis terminalibus, florib. sessilibus capitatis. Swartz. prod. 55. Jacq. amer. 8. p. 61. ed. pict. Hedera capitata. Smith. ic. pict. 1. p. 4. t. 4. Hab. in subalpinis Antillarum, Jamaicae, etc. h

3. *cordata*, herbacea, canle angulato villosio inermi, fol. simplicibus cordatis. Thunb. jap. 127. Hab. in Japonia. T.

\*\* *Foliis lobatis*

4. *japonica*, frutescens, fol. lobatis. Thunb. jap. 128. Banks ic. Kaempf. t. 10. Hab. in Japonia. h

\*\*\* *Foliis digitatis.*

5. *pentaphylla*, arborescens aculeata, fol.

quinatis. Thunb. jap. 128. Cum priore, in Japonia. h

6. *Sciodaphyllum*, arborescens, foliis digitatis, foliolis numerosissimis inaequalibus, racemo longissimo simplici nutante, pedunc. umbellatis. Willd. p. 1519. Swartz. prod. 57. Sciodaphyllum. Brown. jam. 195. t. 19. f. 1. Hab. in sylvaticis montium altissimorum caeruleorum Jamaicae. h

\*\*\* *Foliis supradecompositis et decompositis.*

7. *spinosa*, arborescens, caule foliisque aculeatis, panicul. ramossissima umbel. numerois. Michaux. Flor. 1. p. 186. Comm. hort. 1. p. 89. t. 47. Hab. in Virginia. h

8. *chinensis*, caule petiolisque aculeatis, foliolis inermibus villosis. Reed. 2. t. 26. Hab. in China. Caul. in summitate tantum foliosus. h

9. *hispida*, humilis suffruticosa, caul. petiolisque setis hispidis, foliol. ovatis inermibus inciso-serratis glabris. Vent. Hort. Cels. p. 41. t. 41. Michaux. Flor. 1. p. 185. Hab. in America boreal. a Quebec ad sinum Hudsonis. Fol. subtus albricantia. Umb. pedunculatae terminales et axillares. h

10. *humilis*, caul. annuo, fol. imparipinnatis: foliolis corlatis serratis acutis, flor. umbellatis. Cav. ic. 4. p. 7. t. 313. Hab. in N. Hispania. Caul. tuberculis fuscis variegatur.

11. *racemosa*, caule herbaceo laevi, fol. glabris, pedunc. axillaribus ramosis umbellatis. Willd. p. 1511. Michaux. p. 185. Coll. canad. 74. t. 75. Moris. s. 1. t. 2. f. 9. Hab. in Canada et altis Aeghanis montib. Foliol. cordata. h

12. *nudicaulis*, caule subnullo, foliis binis ternatis. L. Pluck. alm. 98. t. 138. f. 5. Hab. in Virginia. Caul. et fere nullus. Scapus apyllus, trifidus, s. umbellulas tres ferens. L. h

747. *GLOSSOPETALUM*. Cal. semiinferus, 5-dentatus. Cor. 5-petala, petalis ligula adnata instructis. Bacca 5-sperma.

1. *glabrum*, fol. glabris. Willd. Sp. 2. p. 1521. Goupia glabra. Aubl. guj. 1. p. 296. t. 116. Lam. ill. t. 217. Hab. in Gujana. h

2. *tomentosum*, fol. tomentos. Willd. Aubl. guj. 1. p. 296. Hab. in Gujana. h

748. *STATICE*. Cal. 2-phyllus,

integer, plicatus, scarosus. Petala 5. Sem. 1, superum.

\* *ARMERIA*. Scapo simplice, flor. capitatis, cal. communi polyphylo.

1. *Armeria*, scapo (subhumili) piloso, fol. gramineis flaccidis. Hoffm. Flor. germ. p. 150. Engl. bot. t. 226. Hab. in montosis. In hortis ad arearum margines ornandos saepe colitur.

2. *humilis*, fol. linearibus brevibus rigidiusculis, bract. plerisque acutis: infermis acutis. Lank. in Schrad. Journ. 1800. p. 61. St. hispanica minima juniperi folio, majore flore. Tournef. inst. p. 341. Hab. in Lusitaniae monte Gerez.

2. *arenaria*, caul. scapo longo, bract. 2-3 capitulo longiorib. fol. linearib. rigidulis glabris. Hab. in arenosis. (Copiose prope Fontainebleau.) A priore, specie distincta videtur. Hujus loci videtur Statice elongata Hoffm. l. c., qui vero folia dicit hirsuta.

3. *cespitosa*, scapis brevibus aggregatis capitatis, fol. acerosis. Cav. ic. 1. p. 38. Quer. hisp. 6. t. 15. f. 1. S. fol. acerosis, propaginib. numerosis congestis. Ortega Dec. p. 121. S. juniperifolia. Vahl. symb. 1. p. 25. Hab. in Hispaniae montib. Carpentonis et Lusitaniae litoribus.

4. *alliacea*, scapo simplici capitato, fol. linearilanceolatis acutis trinerviis. Willd. p. 1520. Schousb. Maroc. p. 131. S. *alliacea*, scapo junceo capitato, fol. linearilanceolatis, inferne angustatis. Cav. ic. 2. p. 6. t. 109. Hab. in Hispaniae montibus et locis arenosis region. Tingitanae.

5. *cephalotes*, scapo simplici capitato, fol. lanceolatis 9-nerviis. Schousb. p. 132. S. squamis calycinis ovatis acuminatis. Ait. Kew. 1. p. 381. S. Pseud-Armeria. Murr. syst. Veg. 300. Desf. Atl. 1. p. 273. Hab. in Algarbia et Barbaria. Lacin. perianthii seta longa terminatae. D.

6. *lusitanica*, scapo simplici capitato, fol. ovato-lanceolatis. Poirret. it. St. *scorzonerifolia*, fol. linearilanceolatis acutis trinerviis. Lank. l. c. p. 60. Tournef. inst. p. 341. Jacq. hort. Vind. t. 42. Hab. in Barbaria et in Lusitania prope Cabo de Rocca. Planta magna speciosa. Flor. coccinei.

\*\* *LIMONIUM*. Flor. sparsis in scapo paniculato aut spicato s. caule folioso.

7. *fasciculata*, caul. frutescente inferne

nudo, scapo simplici capitato, fol. fasciculatis linearib. canaliculatis recurvis. Vent. Hort. Cels. p. 38. t. 38. Hab. in Lusitania ad littora maris. Caul. inferae nudus.

8. *graminifolia*, scapo paniculato, ramis triquetris, fol. linearibus canaliculatis. Ait. Kew. 1. p. 383. Hab. . . .

9. *Limonium*, scapo paniculato tereti, fol. laevibus nervis undulatis, sub apice mucronatis. L. Flor. dan. t. 315. Engl. bot. t. 102. *Limonium maritimum majus*, Bauh. pin. 192. Hab. in Europae et Virginiae maritimis. Flor. cyanei.

10. *Gmelini*, scapo paniculato angulato, fol. oblongo-ovatis emarginatis plenis cartilagineo-marginatis subtus mucronatis. Willd. p. 1524. Gmel. sib. 2. p. 220. t. 50. Hab. in Sibiria locis salis. Simillima praecedenti, sed fol. firmiter obovata et flor. duplo minores. W. T.

11. *scoparia*, scapo paniculato tereti, fol. oblongo-ovatis coriaceis mucronatis, subtus punctatis. Willd. Hab. in Sibiria. Simill. sequenti sed non pilosa, scapi fere ut in *S. Limonio*. W. T.

12. *latifolia*, scapo paniculato ramosissimo scabro, foliis pubescentibus, pilis fasciculato-stellatis. Smith. in Act. Soc. Linn. Lond. 1. p. 250. *S. Coriaria*. Pall. fl. taur. Hab. in Sibiria. Habitu ad *S. Limonium* accedit. T.

13. *oleaeifolia*, scapo paniculato, ramis angulato-alatis, fol. lanceolatis mucronato-cuspidatis margine cartilagineis. W. p. 1525. Scop. delict. 1. n. 2. t. 10. Barr. ic. t. 790. Hab. in Italia, Hispania.

14. *incana*, scapo paniculato, fol. lanceolatis trinerviis subundulatis apice mucronatis, paniculae ramis triquetris. L. Vahl. symb. 1. p. 25. Hab. in Arabia, inque Sibiria. Fol. radicalia, elliptico-lanceolata, incana, mucronata. T.

15. *auriculataefolia*, scapo simplici ramosoque tereti, spicis lateralibus terminalibusque secundis, fol. spatulatis acutis. Vahl. symb. 1. p. 25. Schousb. Maroc. p. 133. *Limonium lusitanicum auriculae* ursi folio. Tournesf. inst. 342. Hab. ad littora maris Barbariae. T.

16. *cordata*, scapo paniculato, fol. spatulatis retusis. Barr. ic. 805. Hab. ad maris Mediterranei littora. T.

17. *scabra*, fol. radicalibus obovato-oblongis obtusis, ramis scabris. Thunb. prod. 54. Hab. ad Cap. b. speci.

18. *tetragona*, scapo paniculato tetragono, fol. obovatis. Thunb. prod. 54. Cum priore.

19. *reticulata*, scapo paniculato prostrato, ramis sterilibus retroflexis nudis, fol. cuneiformibus mucicis. Engl. bot. t. 328. Smith. brit. 1. p. 312. Pluck. alm. 221. t. 42. f. 4. Bocc. sic. t. 44. p. 4. *dichotoma*, caule apophyllo dichotomo, fol. spatulatis glabris, petalis basi coalitis. Cavan. diss. 1. p. 37. t. 50. Hab. in Melita, Hispania, Anglia et Sibiria. Flor. terminales fasciculati caerulei. Sm. T.

20. *echioides*, fol. radicalibus obovatis, scapo paniculato, flor. remotiusculis sessilib. subarcuatis. Desf. Atl. 1. p. 274. Willd. p. 1527. Gouan. ill. t. 2. f. 4. Magnol. bot. 157. ic. Hab. Monspelii et in Barbaria prope Mazarj ad rupes. Petal. angustissima. Cal. bractea tuberculosa involutus. Desf. C.

21. *globulariaefolia*, fol. acuminatis horizontalibus, panic. laxa, racem. terminalib. secundis. Desf. l. c. Barrel. t. 793 et 794. S. ramosissima. Poir. it. 2. p. 142. Hab. ad thermes prope Bone. Flor. albi. Fol. variat : radical. spatulata.

22. *spatulata (glauca)*, fol. radicalibus spatulatis obtusis glaucis integerrimis longe petiolatis, scapo tereti, flor. racemosis secundis. Desf. Atl. 1. p. 275. Crase. in rupibus prope la Calle. Scap. superne ramosus : ramis paniculatis. D. T.

23. *speciosa*, scapo ramoso tereti, ramis aenipiibus alatis, floribus imbricatis, fol. obovato-cuspidatis mucronatis, margine cartilagineis. Willd. p. 1527. Gmel. sibir. 3. p. 221. t. 91. f. 1. Hab. in Tataria. O.

24. *tatarica*, scapo ramoso divaricato, ramis triquetris, flor. distantibus, fol. lanceolato-obovatis mucronatis. Willd. Boerh. lugdb. 1. p. 76. t. 76. Hab. in Tataria. Var. flor. rubris et albis. O.

25. *Echinus*, scapo paniculato, fol. subulatis mucronatis. L. Burb. cent. 2. p. 18. t. 10. Hab. in Graciae et Mediae desertis. Fol. imbricata, apice mucronato-spinosa.

26. *acerosa*, fol. linearibus subulatis rigidis pungentibus, scapo simplici spicato. Willd. in N. Act. Berol. 2. Hab. in Galatia.

27. *flexuosa*, scapo dichotomo corymboso-fastigiato, spicis capitatis, flor. imbricatis, fol. lanceolato-cuneiformibus obtusis mucronatis trinerviis. Willd. p. 1528. S. rosea. Palk. it. 3. p. 260. Hab. in Sibiria. T.

28. *purpurata*, caule subfoliato. foliis obovato-cuneatis trinerviis mucronatis. L. Thunb. prod. 54. S. peregrina. Berg. cap. 80. Hab. ad Cap. b. spei. Cal. purpurascens, radiis 5, sanguineis. Cor. purpurascens.

29. *longifolia*, caule paniculato scabro erecto, fol. obovato-linearibus. Hab. ad Cap. b. s. ei. †

30. *minuta*, caule suffruticoso folioso, foliis confertis cuneatis glabris mucicis, scapis paucifloris. Bocc. sic. 26. t. 13. f. 3. Desf. Atl. p. 255. Pluck. alm. t. 200. f. 3. Hab. ad mare Mediterraneum et in Barbaria. Caul. caespitosi. †

31. *pectinata*, caule ramisque paniculatis triquetris, fol. obovatis petiolatis, spicis secundis. Ait. Kew. t. p. 385. Hab. in Canariis. †

32. *suffruticosa*, caule fruticoso: superne nudo ramoso, capitulis sessilibus, fol. lanceolatis vaginantibus. L. Gmel. sibir. 2. p. 216. t. 88. f. 2. 3. Hab. in Sibiria. †

33. *monopetala* (scabra), caule fruticoso folioso, flor. solitariis, fol. linearilanceolatis vaginantibus. L. Bocc. sic. 33. t. 17. Limonium fol. Halimi. Tournef. Inst. 342. Hab. in Sicilia, in Barbar. in arenis salis. Gallas saepe fert. Fol. glauca aspera. †

34. *axillaris*, caule fruticoso folioso, panic. spicatis axillaribus, fol. lanceolatis vaginantibus. Vahl. symb. 1. p. 26. t. 6. Forsk. descr. p. 58. Hab. in Arabia felici. †

35. *cylindrifolia*, caule fruticoso dichotomo, fol. tercibus vaginantibus. Vahl. l. & t. 12. Hab. in Arabia, inque Africa boreali. †

36. *linifolia*, caule fruticoso prostrato, flor. paniculatis secundis, fol. linearibus. Linn. suppl. 187. Thunb. prod. 54. Hab. ad Cap. b. spei. †

37. *aurea*, caule fruticoso folioso ramoso, fol. subulatis. S. Limonium calycibus aureis. Amm. ruth. 132. t. 18. f. 2. Hab. in Dauriae campis montosis. Cor. eleganter flava. †

38. *serulacea*, caule fruticoso ramoso, ramulis imbricatis paleis apice pilo terminatis. Pall. it. 3. p. 314. Desf. Atl. t. p. 276. Moris. s. 15. t. 1. f. 23. Pluck. alm. 221. t. 28. f. 4. Hab. in Barbaria, Lusitania, Hispania, in maritimis. Ramuli imbricati paleis minutissimis. Flor. subimbricati, lutei. †

39. *pruinosa*, caule flexuoso ramoso suffrutaceo. S. *aphylla*. Forsk. Hab. in Palestina. Caul. flexuosus.

40. *sinuata*, caule herbaceo ancipiti, fol. radicalibus lyr. tis, caulinis linearibus. Willd. Desf. Atl. t. p. 276. Clus. cur. 33. t. 33. β. Limonium africanum, caule alato, foliis integris hirsutis, petalo pallido flavo, calyce amoene purpureo. Mart. cent. 84. t. 84. Schousb. Maroc. t. p. 134. Hab. in Sicilia, Palaestina, Africa. Cal. violacei. Cor. flavescentes. †

41. *aegyptiaca*, caule herbaceo, fol. radicalibus alternis pinnatifido-sinuatis, cor. lacin. intermediis linearib. perianth. communi bicorni. Viviani Hort. Di Negro. Hab. in Aegypto.

42. *lobata*, fol. sinuatis, caulibus tercibus aphyllis. Hab. in Africa. Cal. albi. Cor. caeruleae.

43. *spicata*, caule nudo simplicissimo, spicis sessilibus alternis, fol. radicalibus sinuato-pinnatis. Gmel. sib. 2. p. 224. t. 91. f. 2. Willd. 2. p. 1512. Hab. in Persia. Radix tuberosa. Cal. et Petala albidia. Gmel.

44. *mucronata* (crispa), caule crispo, fol. ellipticis integris, spicis secundis. Linn. suppl. p. 187. P'Herit. stirp. 1. p. 25. t. 13. Limonium peregrinum appendicibus crispis adactum. Pluck. alm. 221. Hab. in Barbaria ad versuras. Fol. radicalia petiolata elliptica mucronata. Spicae dimidiatae. Cor. rubrescentes.

749. LINUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. 5-valvis, 10-locularis. Sem. solitaria. (Filam. basi coalita.)

\* *Foliis alternis.*

1. *usitatissimum*, calycibus capsulisque mucronatis, petulis crenatis, fol. lanceolatis alternis, caule subsolitario. In cultis.

β. *humile*, cal. capsulisque mucronatis, petalis emarginatis, fol. lanceolatis alternis, caule ramoso. Mill. pict. n.º. 2. Hab. in Europa australi. ☉

2. *perenne*, calycib. capsulisque obtusis, fol. alternis lanceolatis integerrimis, caul. altis numerosis. Engl. bot. t. 40. Smith. brit. 1. p. 343.

β. *procumbens*, sylvestre caeruleum perenne procumbens flore et capitulo minore. Raj. angl. 3. p. 362. Hab. in Sibiria

et Angliæ. Fol. subrecurva. Pet. submarginata.  $\overline{\text{L}}$

3. *grandiflorum*, caul. basi ramoso, fol. angusto-lanceolatis, flor. laxè paniculatis, caps. mucronatis. Desf. Atl. 1. p. 278. t. 78. Hab. in ervis prope Mascar. Sp. pulcherrima petal. maximis roseis. D.

4. *viscosum*, calycibus acuminatis, fol. lanceolatis pubescentibus quinquenerviis, margine glandulosis. Willd. Linum sylvestre latifolium, caule viscoso, flore rubro. Bauh. pin. 214. Hab. in montib. Bononiensibus, Sumano, Augustæ vindelicorum, Ingelstadii. An var. sequentis?  $\overline{\text{L}}$

5. *hirsutum*, calycibus basi nervoso-striatis hirsutis acuminatis sessilib. alternis, fol. alternis hirsutis : rameis oppositis. Jacq. austr. 1. 31. Scop. carn. ed. 2. t. 11. Lam. 1. c. p. 520. Moiss. s. 5. t. 26. f. 5. Hab. in Austriæ, Tatarie graminosis. Fol. floralia et calyces ciliati setis brevissimis, glandulosis. L.  $\overline{\text{L}}$

6. *aquilinum*, fol. alternis lanceolatis, pedunculis bifloris. Molin. chil. ed. germ. 136. Feuille. peruv. 2. t. 22. Hab. in montibus Chili.  $\overline{\text{L}}$

7. *narbonneuse*, calycib. acuminatis, fol. lanceolatis sparsis strictis scabris acuminatis, caul. tereti basi ramoso. Cal. magni, latere membranacei, apice quasi mucrone subulato instructi. L.  $\overline{\text{L}}$

8. *reflexum*, calycib. acuminatis, fol. ovato-lanceolatis acuminatis reflexis laevibus, filam. connatis. Ait. Kew. 1. p. 387. Hab. in Europa australi.  $\overline{\text{L}}$

9. *tenuifolium*, calycibus acuminatis margine glandulosis, fol. sparsis linearisetaceis retrorsum scabris. L. Jacq. austr. 1. 215. Hab. in collib. aridis. Cor. rubro-cæruleo.

$\beta$ . *bicolor*, caul. simplicissimo, fol. confertis margine scabris, cor. lutea, fundo cæruleo, striis purpureis. Schousb. p. 135. In Barbaria.

10. *angustifolium*, foliol. calycinis ellipticis subtrinerviis capsulisque acuminatis, fol. linearilanceolatis trinerviis, caul. numerosis. Smith. brit. 1. p. 344. L. *angustifolium*. Huds. Engl. bot. t. 381. Cresc. in pascuis præcipue maritimis in Angliæ. Julio habitus. L. *tenuifolii*, sed cal. nequaquam glanduloso-ciliati. Styli subclavati. Sm.  $\overline{\text{L}}$

$\beta$ . *decumbens*, caul. adscendente filiformi, fol. sparsis erectis subulatis laevibus mucronatis, flor. pedicellatis, cal. ovatis acutis. Desf. Atl. 1. p. 278. t. 79. Hab. in

regno Tunetano in arvis. Flor. primo vere. Cor. rosea. D.

11. *Selaginoides*, caulibus suffrutescentibus diffusis procumbentibus, fol. filiformibus conferto-sparsis, flor. sessilibus terminalibus. Lam. enc. 3. p. 504. Hab. in Brasilia in Montevideo.  $\overline{\text{H}}$

12. *prostratum*, flor. solitariis lateralibus brevissime pedunculatis, fol. alternis, caulib. prostratis ramosissimis. Lam. enc. 3. p. 504. Hab. in Peru in collibus siccis prope Limam. Fol. ovato-oblonga simillima iis Polygalæ vulgaris. L.

13. *gallicum*, caul. ramosissimo. calycib. subulatis acutis, fol. linearilanceolatis alternis, paniculae pedunculis bifloris, flor. subsessilibus. Ger. prov. 421. t. 15. f. 1. Hab. Montpelii, circa Mans et in collib. prope Genuam. Viviani. Pistilla interdum tria.

14. *maritimum*, caul. sub simplici, calycibus ovatis acutis muticis, fol. lanceolatis trinerviis : inferiorib. oppositis. Jacq. hort. t. 154. In Austria ad Thermas badenses, Montpelii in Oriente et in Italia ad stagna marina.  $\overline{\text{L}}$

15. *corymbiferum*, fol. lanceolatis confertis erectis trinerviis retrorsum asperis, ramis filiformib. corymbosis, cal. subulato-mucronatis. Desf. Atl. 1. p. 279. t. 80. Hab. in Atlante prope Majanæ. Cor. lutea. L. usitatissimi magnitudine.

16. *tenuæ*, fol. linearib. acutis, ramis laxè paniculatis filiformib., flor. pedicellatis, cal. mucronato corollis quadruplo brevioribus. Desf. 1. c. t. 81. Hab. in Algeriæ collib. Differt a L. *gallico* coroll. quadruplo majoribus.  $\odot$

17. *virgatum*, cal. linearilanceolatis acutis, fol. linearilanceolatis alternis, caul. ramoso virgato. Schousb. Maroc. ed. germ. 1. p. 136. Hab. in aggerib. et ad versuras prov. Hahæ. Cor. lutea. Flor. 1-laterales.

18. *alpinum*, calycib. rotundatis obtusis, fol. linearibus acutiusculis subreflexis, caulibus declinatis. Jacq. austr. 4. t. 321. Zanou. hist. p. 146. t. 107. Lam. enc. 3. p. 521. Hab. in Austriæ alpinis. Flor. cæruleæ.  $\overline{\text{L}}$

19. *austriacum*, calycib. rotundatis obtusis, fol. linearibus acutis rectiusculis. L. Hal. in Austria inferiore, Palatinatu.  $\odot$

20. *virginianum*, calycib. acutis alternis, capsulis muticis, panicula filiformi, fol. alternis lanceolatis : radicalib. ovatis. L. Hab. in Virginia, Pennsylvania ad Carolinam. Fol. linearilanceolata sparsa rarius opposita. Michaux. Flor. 2. p. 36.

21. *monopetalum*, cor. monopetalis quinquefidis. Steph. enum. mosq. n°. 214. Hab. in Russiæ sylvia trans Occam. Refert. L. flavum. †

22. *strictum*, flor. glomeratis terminalib. calycib. subulatis, fol. lanceolatis strictis mucronatis; margine scabris. L. Desf. Atl. t. p. 278. L. sessiliflorum. Lam. enc. 3. p. 523. Hab. in Europa australi, et Barbaria. ♂

β. *alternum*, caul. superne corymboso, flor. alternis. Lam. l. c. Schousb. p. 138.

γ. *spicatum*, caul. simplicissimo, flor. spicatis. Lam. Tournef. p. 340. In Lusitania.

23. *monogynum*, fol. alternis lineari-lanceolatis trinerviis, caule suffruticoso. Forst. prod. n°. 145. Hab. in N. Zelandia. h

24. *suffruticosum*, fol. linearib. acutis scabris, caul. suffruticosis. Lin. Cavan. ic. 2. p. 5. t. 108. Borell. ic. 1231. Hab. in regno Valentino. h

25. *salsaloides*, caul. basi fruticulosus imbricato-foliosus, superne nudiusculis filiformibus, fol. subulatis triquetris. Lam. enc. 3. p. 521. β. *crispum*. Lin. sylvestre fruticosum crispum hispanicum, parvo flore albo. Borell. ic. 795. Hab. in Hispania. Rad. lignosa, magna. Caps. minimae, acuminatae. Fol. brevia. Lam.

26. *striatum*, fol. alternis subovatis: nervo marginibusque decurrentibus, flor. terminalib. Walt. Flor. Carol. p. 118. Gmel. Syst. N. Lin. II. p. 514. Hab. in America. Distincta species fol. majusculis brevi-ovatis erectis Camp. hybridæ fere similibus.

27. *arborescens*, fol. cuneiformibus, caul. arborescentibus. Schreb. in Nov. Act. A. N. C. III. p. 478. Alp. exot. 19. t. 13. Hab. in Creta, Italia. h

28. *campanulatum*, fol. spathulatis: basi utrinque punctata glandulosa. L. flor. subsessilib. cal. longis acutis. Lam. enc. 3. p. 524. Willd. p. 1530. L. sylvestre luteum. fol. subrotundis. Bauh. pin. 212. Lob. ic. 414. Borell. ic. 820. Hab. in Galloprovinciæ montibus, in Italia et in Russia, locis aridis.

29. *flavum*, cal. subserrato-scalbris lanceolatis subsessilib., panic. ramis dichotomis. Jacq. austr. 3. t. 214. Lam. l. c. Hab. in Austria et Oriente. Petal. flava; lineis croceis. Var. prioris?

### \*\* *Foliis oppositis.*

30. *africanum*, foliis oppositis lineari lanceolatis, flor. terminalibus pedunculatis. Hab. ad Cap. b. spei. Petala lutea unguibus villosis. h

31. *aethiopicum*, fol. oppositis ovatis mucronatis, caule fruticoso. Thunb. prod. 57. Hab. ad Cap. b. spei. h

32. *nodiflorum*, fol. floriferis oppositis lanceolatis, flor. alternis sessilibus calycib. longitudine foliorum. Lin. L. luteum ad singula genicula floridum. Bauh. pin. 214. Moris s. 5. t. 6. f. 11. Column. ceph. 2. t. 80. Hab. in Italiae pratis argillosis. Cor. flavescens.

33. *catharticum*, fol. oppositis ovato-lanceolatis, caule superne dichotomo, cor. acutis. Engl. bot. t. 382. Curt. Lond. ic. Blackw. t. 362. Hab. in nemorosis et pasculis succulentis. Flor. albi, nondum evoluti penduli. ☉

34. *setaceum*, caul. dichotomo paniculato, fol. setaceis subserrato-scabris subverticillatis, cal. foliolis ovato-lanceolatis ciliatis. Brotero Phytogr. Lusit. n°. 22. t. 6. Hab. in collib. calcareis circa Coimbra in Lusitania.

35. *quadrifolium*, foliis quaternis L. Houttuyn. 6. t. 46. f. 1. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei.

36. *verticillatum*, fol. verticillatis. Boeckm. 2. p. 49. t. 42. Barr. t. 1226. Habitat in Italia. Calyc. et fol. superiora villosa.

750. *ALDROVANDA*. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 5-valvis, 1-locularis, 10-sperma.

1. *vesiculosa*. Lin. Lam. ill. t. 220. Lenticula palustris indica, fol. subrotundis binis capillamentis ad imum barbatis. Pluck. alm. 211. t. 41. f. 6. Hab. in Italiae et Indiae padulosis.

751. *DROSERA*. Cal. 5-fidus. Petala 5. Caps. 1-locularis: apice 3-5-valvis. Sem. plurima. (Styli etiam 6. Fol. pilis glandulosis obsita.)

1. *acaulis*, flore radicali exscapo solitario, fol. oblongis. Lin. suppl. 188. Willd. Sp. 2. p. 1543. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *rotundifolia*, scapis radicatis, fol. orbiculatis. Flor. dan. t. 1028. Roth. germ. II.



p. 373. Hab. in Europae, Americae paludosis. Styli 6. Smith. ☉

3. *longifolia*, scapis radicatis, fol. obovatis oblongis, stigmatib. emarginatis. D. *intermedia*, scap. adscendentibus, fol. ovalibus. Hayne apud Schrad. bot. Journ. 1800. p. 37. Moris. s. 15. t. 4. f. 2. Hab. in locis uliginosis. Var. styl. 9. Smith. Fol. elliptica. ☉

4. *anglica*, fol. oblongis obtusis, flor. 8-gynis, caps. 4-valvibus. Smith. Flor. brit. t. p. 347. D. *anglica*, scapis radicatis erectis, fol. obverse lanceolatis, stigmatib. clavatis. Roth. N. Bot. Beytr. p. 184. Moris. s. 15. t. 4. f. 1. D. *longifolia*. Hayne l. c. p. 40. et plur. auctor. Hab. in paludosis. Styl. 3, profunde bifidi. H.

5. *cuneifolia*, scapis radicatis calycibusque hirsutis, fol. obovato-cuneiformibus. Willd. p. 1544. Hab. ad Cap. b. spei. D. rotundifolia sed major. Fol. reticulato-venosa crassiuscula.

6. *Burmanni*, scapis radicatis calycibusque glabris, fol. spatulatis sessilibus. Vahl. symb. 3. p. 50. Burm. zeyl. t. 94. f. 2. Hab. in Zeylona et Cochinchina. A praecedente distincta: fol. tenuioribus trinerviis, scapo glabro, flor. minorib. W.

7. *capensis*, scapis radicatis, fol. lanceolatis subtus scabris. D. fol. ad radicem longissimis, flor. spicatis. Burm. afr. 209. t. 75. f. 1. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei. Radix exserens fila spiralia. Flor. violacei.

8. *Lusitanica*, scapis radicatis, fol. subulatis subtus convexis, flor. subumbellatis decandris. L. Moris. s. 15. t. 4. f. 4. Pluck. alm. 323. t. 117. f. 2. Cav. in Anal. d. scienc. natur. p. 43. Hab. in Lusitania.

9. *cistiflora*, caule simplici folioso, fol. lanceolatis. L. Burm. afr. 210. t. 75. f. 2. Brey. prodr. 3. t. 22. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. fundus et Stamina nigra. Styli nigri, apice dichotomi usque in capillis. L.

10. *indica*, caule ramoso folioso, fol. linearibus. Burm. zeyl. 207. t. 94. f. 1. Rheed. 10. t. 20. Hab. in India.

11. *peltata*, caule subramoso, fol. triangularibus longe petiolatis peltatis. Willd. p. 1546. Hab. in N. Hollandia. Caul. flexuosus (foliosus.) Racemus terminalis. W.

12. *pedata*, foliis pedatis. Cresc. cum priore. Néé. Vili in Herbario D. Thibaut. Fol. lacinae longe distant, longissimae, di-

chotomae glandulosae; petiol. longissimi. Flor. corymbosi. An hujus generis?

752. GISEKIA. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Caps. 5, approximatae, subrotundae, 1-spermae.

1. *pharnacioides*. L. Lam. ill. t. 227. Koelreutera molluginoides. Murray. in Comm. N. Goeth. 3. p. 67. t. a. f. 1. Hab. in India orientali. Caul. decumbentes. Umb. multiflora. Flor. deorsum penduli. L.

753. LAROCHEA. Cal. 1-phyllus, 5-fidus. Cor. 1-petala intundibuliformis, 5-fida. Squamae 5 ad basin germinis. Caps. 5.

1. *coccinea*, fol. ovatis planis cartilagineo-ciliatis, basi connato-vaginantibus. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1547. sub *Crassula*. Decand. et Redouté, Plant. grass. ic. Knerr. Delic. t. 2. B. 2. Brall. succ. 5. p. 7. t. 50. Flor. terminales aggregati: tubo longo.

2. *falcata*, fol. oppositis subconnatis glabris, in falcem inflexis. Rochea. Decand. l. c. ic. Crass. retroflexa. Meerb. ic. pl. Lugd. Hab. uti prior ad Cap. b. sp. Flor. glomerato-corymbosi in pedunc. dichotomis axillarib. Cor. coccinea: tubo breviusculo pallido.

Obs. Genus hocce dicatum memoriae D. Delarochae, auctoris monographiae de Ixiis et Gladiolis.

754. CRASSULA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Squamae 5 nectariferae ad basin germinis. Caps. 5: (In aliquibus speciebus una pars demitur aut additur.)

\* Frutescentes.

1. *cymosa*, fol. linearib. cartilagineo-ciliatis connato-vaginantibus, caule fruticoso, cyma terminali. Lin. Willd. Sp. 2. p. 1548. C. fol. perfoliatis lanceolato-subulatis ciliatis patulis, caule simplici, panicula composita. Thunb. prod. p. 55. Hab. ad Cap. b. spei cum plerisque speciebus. L.

2. *Rava*, fol. planis connato-perfoliatis laevibus, flor. corymboso-paniculatis. L. Burm. afr. 38. t. 23. f. 2. Pluck. alm. 340. t. 314. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *pubescens*, fol. connatis ovatis acutis villosis, caule ramoso, florib. corymbosis. Lin. suppl. 190. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *pruinosa*, foliis subulatis pruinosis-scabris, flor. corymbosis, caule fruticoso. Mant. 60. Hab. in Cap. b. spei. h

5. *scabra*, fol. oppositis patentib. connatis scabris ciliatis, caule retrorsum scabro. L. Dill. elth. 117. t. 99. f. 117. Panic. composita.

6. *corallina*, fol. connatis deltoidibus obtusis, caule tecto. flor. umbellatis. Lin. suppl. 188. Hab. ad Cap. b. spei. h

Obs. C. *vestita* et *corollina* mira structura foliorum, similes Corallinis Zoophytorum. L.

7. *vestita*, fol. connatis deltoidibus obtusis, caule tecto, floribus terminalibus capitatis. Lin. suppl. 188. Hab. ad Cap. b. spei. h

8. *argentea*, fol. connatis ovatis integris argenteis, caule tecto, corymbo supradecomposito. Lin. Hab. ad Cap. b. spei.

9. *perfoliata*, fol. lanceolato attenuatis crassis connatis canaliculatis, subtus convexis. L. Mill. dict. Plant. grass. ic. Dill. elth. 114. t. 96. f. 113. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei. h

10. *perfoliata*, fol. opposito-perfoliatis ovatis, caule simplici, flor. pedunculato-subverticillatis. Lin. suppl. 190. Caul. rubicundi nudiusculi. Flor. glomerati parvi.

11. *fruticulosa*, fol. oppositis subulatis acutis patentibus subrecurvatis, caule fruticoso. Lin. β. C. *caffra*. L. Mant. 222. Flor. parvi, albi, campanulati.

12. *ramosa*, fruticosa, foliis subulatis supra planis connato-perfoliatis laevibus patentissimis, pedunc. elongatis, flor. cymosis. Ait. Kew. 1. p. 390. C. dichotoma. Lin. suppl. 188. h

13. *mollis*, fol. connatis tereti-trigonis glabris mollibus remotis, caule recto simplici, panicula trichotoma supra-decomposita. Thunb. prop. 55. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *tetragona*, fol. subulatis subincurvis oboleto tetragonis patentibus, caule erecto arborescente radicante. L. Plant. grass. ic. Pedunc. dichotomi. Cor. alba. Brull. succ. 5. p. 18. t. 11. f. 41. Hab. in Aethiopia. Caul. radicat fibris. Cyma trifida, ramosissima, fastigiata. Cor. albae. L. h

15. *muricata*, fol. connatis trigonis ciliato-scabris, ramis tetragonis, caule frutescente. Thunb. prod. 55. Hab. ad Cap. b. spei. h

16. *imbricata*, fol. ovatis acutis quadrifariam imbricatis laevibus, floribus axillaribus sessilibus. Ait. Kew. 1. p. 393. Hab. ad Cap. b. spei. h

17. *obvallata*, fol. connatis oppositis sublanceolatis cultratis approximatis. Lin. Mant. 61. Plant. grass. ic. Simillima sequenti. Petala spatulata, apice aristata globo, ut in sequenti, nec explicanda. L. Caul. et fol. subpurpurascens.

18. *cultrata*, fol. oppositis obovatis subcultratis obliquis connatis integerrimis. Ait. Kew. 1. p. 393. Dill. elth. 115. t. 97. f. 114. Hab. in Aethiopia. h

19. *portulacacea*, fol. ovalibus carnosissimis oppositis punctatis, caul. arboreo, flor. paniculatis. Lam. enc. 2. p. 172. Plant. grass. ic. Cor. magna carnea. Facie Clayt. Portulacariae.

20. *obliqua*, fol. oppositis ovatis obliquis integerrimis acutis distinctis, margine subcartilagineis. Ait. Kew. p. 393. Hab. ad Cap. b. spei. h

21. *spathulata*, fol. petiolatis cordato-subrotundis acutiusculis tenuiter crenatis, corymbis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 395. Plant. grass. ic. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. patens rubra. h

22. *punctata*, fol. oppositis ovatis punctatis ciliatis, inferioribus oblongis. L. Corymbi axillares brevissimi fastigiati. Cor. alba. h

23. *perfilata*, fol. connato-perfoliatis cordatis punctatis. Scop. Del. insubr. 3. p. 12. t. 6. C. perfossa. Lam. enc. 2. p. 1. ill. t. 220. f. 2. Plant. grass. Fol. margine rubentia.

24. *marginalis*, caule fruticoso, fol. cordatis perfoliatis acuminate planis patentibus intra marginem punctatis. Ait. Kew. 1. p. 396. Hab. ad Cap. b. spei. h

25. *cordata*, caule fruticoso, fol. petiolatis cordatis obtusis integerrimis, cymis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 396. h

26. *lactea*, caule fruticoso, fol. ovatis basi attenuatis connatis integerrimis, intra marginem punctatis, cymis paniculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 406. Plant. grass. ic. Cyma magna subthyrsoides. Flos. terminalis saepius 6-petalus.

27. *arborescens*, fol. subrotundis carnosissimis supra punctatis, caule arboreo. C. Cotedon. Murr. syst. veg. 305. Jacq. misc. 2. p. 295. t. 19. h

28. *rupestris*, fol. connatis ovatis integris glabris, corymbo supradecomposito. Lin. suppl. 189.

29. *pinnata*, fol. pinnatis, caule arboreo. Lin. suppl. 191. Hab. in China. ♀

\*\* *Herbacea.*

30. *spinosa*, caule simplicissimo, fol. mucronatis, flor. sessilibus lateralibus. L. Gmel. sib. 4. p. 173. t. 67. f. 2. *Cotyledon spinosa*. Murray. in Nov. Comm. Goett. tom. 7. p. 33. t. 5. Hab. in Siberia.

31. *retroflexa*, fol. connatis oblongis remotis planis, caule simplici, cyma composita, pedicellis retrofractis. Lin. suppl. p. 188. Var. flore rubro et luteo.

32. *lineolata*, caule herbaceo, fol. cordatis sessilibus, pedunc. subterminalibus axillaribus approximatis umbelliformibus. Ait. Kew. 1. p. 331. ♂

33. *centauroides*, caule herbaceo dichotomo, fol. sessilibus oblongo-ovatis cordatis planis, pedunculis axillaribus unifloris. Ait. Kew. 1. p. 39a. Caul. brachiatus.

34. *dichotoma*, caule herbaceo dichotomo, fol. sessilibus ovato-oblongis canaliculatis recurvatis, pedunculis axillaribus unifloris. Ait. Kew. 1. p. 39a. Herm. lugdb. 550. t. 553. Hab. in Aethiopia. ☉

35. *glomerata*, parvula, caule herbaceo dichotomo scabro, fol. ovato-lanceolatis crassis, flor. ultimis fasciculatis. L. Plant. grass. ic. Caul. palmaris, scaber, purpurascens. Flor. conferti in capitula, ut in Valeriana, Sclerantho. Petala calyce triplo minora. L. Var. caule scabrido.

36. *pulchella*, caule herbaceo dichotomo, fol. ovato-oblongis carnosis reflexis, flor. in dichotomiis pedunculatis, pedunculis turbinatis. Ait. Kew. 1. p. 39a. Affinis priori, differt: cor. calyce fere longioribus.

37. *strigosa*, caule herbaceo erecto dichotomo, fol. obovatis strigosis, pedunculis unifloris. L. Syst. Veg. p. 252. Hab. in Aethiopia.

38. *muscosa*, caule herbaceo prostrato, fol. oppositis ovatis gibbis imbricatis, flor. sessilibus solitariis. L. C. fol. connatis ovatis acutis quadrifariam imbricatis, flor. lateralibus. Thunb. prod. 54. Hab. in Aethiopia et ad Cap. b. spei.

39. *pyramidalis*, fol. connatis ovatis obtusis quadrifariam incumbentibus, capi-

tulis sessilibus. Lin. suppl. p. 189. Planta pulchra quadrangularis.

40. *columnaris*, caule pollicari, fol. rotundis imbricatis, fasciculo subrotundo terminali. Lin. suppl. 191. Burm. afr. 19. t. 9. f. 2.

41. *hemisphaerica*, fol. connatis subrotundis ciliatis hemisphaerice imbricatis, caule aphylo thyrsifloro. Thunb. prod. 57.

42. *aloides*, fol. ovatis distinctis acutis ciliatis, caule simplici pilosiusculo, racemo composito, ramis pauculaeformibus. Ait. Kew. 1. p. 394. Pedunc. divisi in cymas trichotomas.

43. *capitella*, fol. oblongo-lanceolatis acutis connatis ciliatis, caule laevi, racemo elongato, flor. fasciculatis subsessilibus. Ait. Kew. 1. p. 394. Lin. suppl. 190. ♂

44. *Cotyledonis*, fol. connatis oblongis tomentosis ciliatis, caule subnudo, flor. corymbosis aggregatis. Lin. suppl. 190.

45. *barbata*, foliis connatis articulatis barbatis hemisphaericis imbricatis, caule subrotundo, flor. verticillatis. Lin. suppl. p. 188.

46. *ciliata*, fol. oppositis ovalibus planiusculis distinctis ciliatis, corymbis terminalibus. Lin. Plant. grass. ic. Dill. elth. 116. t. 98. f. 116. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei. Cor. flava.

47. *odoratissima*, fol. oppositis amplexicaulibus linearibus ciliatis, flor. capitatis. Andrew Repos. t. 26. Ad Cap. b. spei. Flor. lutei, odoratissimi praesertim nocte.

48. *thyrsiflora*, fol. perfoliatis ovatis ciliatis patulis, corymbo composito attenuato. Lin. suppl. p. 90.

49. *spicata*, fol. connatis lineari-subulatis, scapo subnudo, spica verticillata, verticillis inferioribus remotioribus. Lin. suppl. p. 189.

50. *subulata*, fol. subulatis teretibus patentibus, caule herbaceo. L. Pet. gaz. t. 89. f. 8. Herm. lugth. t. 552.

51. *acutifolia*, fol. oppositis carnosis tereti-subulatis patentibus, cyma parva pedunculata. Lam. enc. 1. p. Plant. grass. ic. Hab. . . Differt a priore flor. pedunculo nudo insidentibus.

52. *alternifolia*, fol. serrato-dentatis planis alternis, caule simplicissimo, flor. pendulis. L. Burm. afr. 58. t. 24. f. 1. Hab. in Aethiopia.

53. *rubens*, fol. fusiformibus subdepressis, cyma quadrifida foliosa, flor. sessilibus, staminibus reflexis. L. Plant. grass. ic. Sedum caule hirsuto, ramis simplicibus, floribus in alis sessilibus. Hall. hist. n. 960. Schenck. it. 1. p. 48. t. 6. f. 3. 4. Lichenal. Act. helv. 7. p. 331. t. 11. Hab. in sylvaticis et ad rupes. Facie Sedi.

54. *cespitosa*, caule subdiviso, foliis globoso-subrotundis imbricatis, flor. terminalibus sessilibus. Willd. p. 1560. Cav. ic. 1. p. 50. t. 69. f. 2. Hab. in Hispania. ☉

55. *minima*, fol. petiolatis subrotundis integris, pedunc. unifloris. Thunb. prod. 57.

56. *moschata*, caule herbaceo procumbente, fol. connatis oblongis acutis, pedunculis axillaribus unifloris, flor. tetrandris. Willd. p. 1561. Forst. in Comment. Soc. Gott. 9. p. 26. Hab. in Terra del Fuogo.

Obs. Forte a Crassulis distincta ob singularem filamentorum situm. Willd.

57. *verticillaris*, caule herbaceo, fol. patentibus, flor. verticillatis aristatis. L. Tillaea erecta. Hort. ups. 24. Hab. in Europa australi. Caul. ramosissimus, diffusus. ☉

58. *expansa*, fol. semicylindrico-subulatis supra canaliculatis patentibus, pedunc. axillaribus solitariis unifloris, caul. dichotomis. Ait. Kew. 1. p. 390.

59. *dentata*, foliis petiolatis cordatis. dentatis. Thunb. prod. p. 57.

60. *nudicaulis*, fol. subulatis radicalibus, caule nudo. Dill. elth. 116. t. 99. f. 115. Hab. in Aethiopia. ¶

61. *tecta*, foliis connatis ovatis obtusis cinereo-lamellosis, scapo nudo, capitulo terminali. Lin. suppl. 150.

62. *cephalophora*, fol. connatis lineari-oblongis obtusis integris, capit. lateralibus pedunculatis. Linn. suppl. 150.

63. *montana*, fol. connatis ovatis acutis ciliatis, caule subnudo, flor. aggregatis. Lin. suppl. 189.

64. *turrita*, f. l. connatis quadrifariam imbricatis ovato-oblongis acutis ciliatis. Lin. suppl. 189. ☉

65. *alpestris*, fol. connatis ovatis acutis quadrifariam imbricatis, capitulis pedunculatis, caule folioso. Lin. suppl. 189.

66. *marginata*, fol. connatis ovatis margine membranaceis. pedunculis unifloris, caule debili. Thunb. prod. 56.

67. *tomentosa*, villosa-scabra, foliis connatis lanceolatis villosis ciliatis, caule subnudo terminato, spica verticillata. Lin. suppl. p. 190. Thunb. prod. 56.

68. *crenulata*, fol. connatis lanceolatis punctato-crenulatis, caule folioso, corymbo decomposito. Lin. suppl. 189.

69. *deltoides*, fol. connatis deltoidibus patulis acutis, caule tecto, flor. corymbosis. Lin. suppl. 189. Fol. ut in Mesembr. deltoides.

70. *orbicularis*, sarmentis proliferis determinate foliosis, foliis patentissimis imbricatis ciliatis. Plant. grass. ic. Dill. elth. 119. t. 100. f. 118. Caul. nullus, sed propagines repentes orientes e fol. rosulis. Dec.

71. *sparsa*, fol. alternis subspathulatis acutis integerrimis, racemo composito. Ait. Kew. 1. p. 395.

72. *diffusa*, fol. oblongis basi attenuatis remote crenatis, pedunc. oppositifoliis axillaribusque solitariis. Ait. Kew. 1. p. 395.

73. *prostrata*, decumbens pellucida, fol. lanceolatis acutis. Thunb. prod. p. 54.

74. *pellucida*, fol. subpetiolatis ovato-lanceolatis, filiformi diffuso-pellucido. Thunb. prod. 54. Dill. elth. 119. t. 100. f. 119. Hab. ad Cap. b. sp. cum prioribus.

755. COMMERSONIA. Cal. monophyllus, corollifer. Petala 5. Nect. 5-partitum. Caps. 5-locularis, echinata.

1. *echinata*. Linn. suppl. 189. Lam. ill. t. 218. Rumph. 3. t. 119. Hab. in insulis Societatis. Arbor fol. alternis oblique ovatis, subtus canis. Flor. minuti paniculati cani. L. h

756. SIBBALDIA. Cal. 10-fidus. Petala 5, calyci inserta. Styli e latere germinis. Sem. 5.

1. *procumbens*, fol. ternatis : foliis superne glabris subtus pilosis, flor. corymbosis, petal. lanceolatis acutis longitudine calycis. Willd. in Act. Soc. Ber. 2. S. procumbens, fol. tridentatis. Lin. Flor. Lepp. 111. Flor. dan. t. 32. Hab. in alpinis. ¶

2. *parviflora*, procumbens, fol. ternatis : foliis utrinque strigoso-pilosis tri-

dentatis, flor. glomerato-capitatis, petal. obovatis, cal. duplo brevioribus. Willd. in Act. Soc. Ber. v. 2. *Fragaria orientalis*, flore luteo minimo. Tournef. Cor. 21. Hab. in Capadocia.

3. *erecta*, erecta, foliolis linearibus multifidis. Gmel. sib. 3. p. 186. Amm. rub. 112. t. 15. Hab. in Sibiria.

4. *altaica*, erecta, foliis linearifiliformibus tripartitis. Willd. p. 1567. Lin. suppl. 191. Pall. in Act. petrop. 1773. t. 18. f. 2. Hab. in alpihus Altaicis Sibiriae. Flor. purpurei. ¶

## D E C A G Y N I A.

757. SCHEFLERA. Cal. 5-dentatus, superus. Petala 5. Caps. 8-10-locularis: loculis monospermis.

1. *digitata*. Forst. gen. 23. Willd. p. 1568. Lam. ill. t. 227. Hab. in N. Zeelandia. Arealiae species. Dryand.

## P O L Y G Y N I A.

758. MYOSURUS. Cal. 5-phyllus, deciduus, basi porrectus. Nect. (Petala) 5, lingulata, petaliformia. Sem. numerosa, in receptaculo longo caudæformi.

1. *minimus*, fol. integerrimis linearibus,

Flor. dan. t. 406. Lam. ill. t. 227. Hab. in collibus apricis et agris. Vere. Variat stem. 5-8. Petala antheriformia. ☉

759. CERATOCEPHALUS. Cal. 5-phyllus, persistens. Petala 5, poro ad ungue, mellifero, squamula tecto. Semina plurima, per paria dorso adnata rostro acinaciformi. Receptaculum demum elongatum, spicæforme.

1. *falcatus*, scapo erecto 1-floro, fol. radicalibus cuneiformib. tripartito-multifidis. Ceratocephala spicata. Moench. meth. pl. p. 218. Ranunculus falcatus. Lin. Willd. Sp. II. 2. p. 13. Ran. ceratocephalus. Moris. s. 4. t. 28. f. 22. Bocc. sic. t. 14. f. 3. Jacq. Flor. austr. t. 48. Habitat inter segetes Europ. australioris et in Oriente. Quoad scapum antecedenti generi affinis. Var. Stem. 5-8. ☉

Obs. An cum Myosuro conjungi potest?

760. ZANTHORHIZA. Cal. 6. Petala 5. Nectaria 5, pedicellata. Caps. 5, monospermæ.

1. *apiifolia*. L'Herit. stirp. 1. p. 79. t. 38. Hab. in Nova Georgia et Carolina. Frutex humilis. Fol. Flor. atro-violacei paniculati. h

## M O N O G Y N I A.

Execa quaedam. Prinos. Rubiae et Crucianellae nonnullae. Pavetta pentandra. Oldenlandia pentandra. Loranthi quaedam species. Cornus albidula. Frankenia laevis. Polycnemum oppositifolium. Caesalpinia Crista, pentandra. Cassia pilosa, serpens, nictitans. Chemacacrista, Guilandinæ s. Hyperantheræ quaedam. Ceratonia Siliqua. Bombax pentandrum Polygonum amphibium, Lappathifolium. Samara floribunda, pentandra. Passerina pentandra. Trianthema crystallina. Citharexylum pentandrum.

## D I G Y N I A.

Apocynæ, nonnulla genera secundum Linné. Oldenlandia digyna. Zizyphi (Rhamnus). Cissus hederacea, Ampelopsis, stans (Vitis arborea. L.) Brunia nodiflora, paleacea (quæ digynæ). Polygonum Gliiforme. Scleranthus annuus. Trianthema 5-andra. Polygonum virginianum, etc.

## T R I G Y N I A.

Polygonum ocreatum. Hydrolea trigyna. Mianertia montana. Arenaria rubra,

tenuifolia. Rhamnus Paliurus. Celastrus. Euphorbia antiquorum, maculata, articulata, cyparissias? Aralia capitata. Salsola salsa, fruticosa. Xylophyllae. Lin.

P E N T A G Y N I A.

Spargula arvensis, pentandra. Cerastium pentandrum, semidecandrum. Suriana maritima. Mesembryanthemum pinnatifidum. Erodium. Actinophyllum pentandrum. Muherniae. Lin.

P O L Y G Y N I A.

Ranunculus hederaceus.

## C L A S S I S V I.

## H E X A N D R I A.

## M O N O G Y N I A.

761. MUSA. *Spatha* supera. *Cor.* 2-petala : petalo altero erecto 5-dentato, altero concavo nectarifero. *Stam.* 6 quorum nunc 1, nunc 5 perfecta (ex Linnaeo), *Bacca* oblonga, triquetra, polysperma.

1. *paradisica*, spadice nutante, flor. masculis persistentibus. Lin. Trew. Ehr. t. 18-20. M. cliffortiana. Lin. Mus. 1. t. 1.  $\beta$ . fructu majore. Plum. N. genera p. 24. Hab. in utraque India et Africa. In caldariis communiter colitur.  $\mathcal{T}$

2. *sapientum*, caudice maculato, spadice nutante, flor. masculis deciduis. Lin. Trew. Ehr. 4. t. 21-23. Sloan. Jam. hist. 2. p. 147. Hab. in Amer. orientali.

3. *trogodytarum*, spadice erecto, spathis deciduis. Lin. M. uranoscopus. Rumph. 5. p. 137. t. 61. f. 2. Hab. in Moluccis. Fruct. parvus, irregularis rubicund. stiliis nigricantibus.  $\mathcal{T}$

4. *coccinea*, spadice erecto, flor. capitatis, spat. confertis coccineis maximis apice luteis. Andrew. t. 47. Hab. in China, Sumatra, Java, etc. *Stam.* 5. Germen ovatum, laeve. Stigm. capitatum, laeve.

5. *humilis*, spadice subsexfloro, bacca violacea. Aubl. Guj. 2. p. 931. Hab. in Gujana.  $\dagger$

*Obs.* De priore hujus generis specie consoli meretur C. Medicus Pflanzen-Physiologische Beobachtungen. 1803. Secundum ejus aliorumque observationes hoc genus melius ad Pentandriam transferri debet.

762. URANIA. *Cal.* o. *Cor.* tripetala. *Nectar.* 2-phyllum : foliolo altero bifido. *Capr.* infera, trilocularis, polysperma. *Semina* biserialia, arillo tecta.

1. *speciosa*. Willd. Sp. pl. II. 1. p. 7. *Ravenalia* madagascariensis. Sonner. it. ind. t. 124. 125. Juss. gen. Jacq. hort. Schoenb. 1. t. 93. Hab. in Madagascariae locis padulosis. Arbor facie Musae vel Heliconiae, altissima.  $\mathcal{H}$

763. BROMELIA. *Cal.* 3-fidus, superus. *Petala* 3. Squama nectarifera ad basin petali. *Bacca* trilocularis.

1. *Ananas*, fol. ciliato-spinosis mucronatis, spica comosa. L. Willd. Sp. II. p. 7. Comm. hort. 1. t. 57. Trew. Ehret. t. 2. Blackw. t. 367.  $\beta$ . *inermis*, fructu comoso, fol. inermibus. *Ananas* lucide virens, folio vix serrato. Dill. elth. 25. t. 21. f. 22. A. lucida. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 4. Hab. in Amer. australi. Flor. violacei.  $\mathcal{H}$

2. *Pinguin*, fol. ciliato-spinosis mucronatis, racemo terminali. Jacq. amer. ed. picta. t. 91. Trew. Ehr. t. 51. Pinguin. Dill. elth. 320. t. 240. f. 311. Hab. in Jamaica, Barbados. Pro sepiibus vivis adhibetur.  $\mathcal{H}$

3. *incarnata*, fol. serrato-spinosis obtusis cum acumine, racemo simplici flexuoso, bract. inferiorib. maximis lanceolatis. Flor. Peruv. 3. p. 32. t. 252. Hab. in Andium nemorib. supra arbores. Petal. purpureo-violacea. Bacc. caulescens.

4. *sphacelata*, fol. ensiformib. acutissimis ciliato-sculeatis, spic. axillarib. conico-truncatis, bract. medio sphacelatis.

Y 4

Flor. Peruv. l. c. In regn. Chilens. umbrosis et subhumidis. Bract. basi albescentes. Pet. purpurea.

5. *bicolor*, fol. ensiformib. ciliato-aculeatis: interiorib. puniceis, flor. aggregato-conicis, bract. oblongis. Flor. Peruv. l. c. p. 31. Hab. in R. Chilens. litorib. supra saxa. Bacc. incana. Pet. caerulea.

6. *Karatas*, fol. erectis, flor. acaulibus sessilibus aggregatis. Jacq. amer. Hort. 31. 32. Hab. in Amer. meridionali. Stolones inter folia, peracto fructu, radicanes, propagantes plantam.

7. *lingulata*, fol. serrato-spinosis, obtusis, spicis alternis. Plum. gen. 26. ic. 64. f. 1. Com. priore. Hab. in Amer. meridionali. h

8. *bracteata*, fol. serrato-spinosis, bracteis ovato-lanceolatis, scapo elongato, racemo composito, racemulis subdivisis, flor. sessilibus. Swartz. Houst. reliq. p. 7. t. 16. Hab. in rupestribus et in Jamaica et Vera Cruce. Bract. coccineae. h

9. *paniculigera*, fol. serrato-spinosis bracteis lanceolatis, racemo composito, racemulis subdivisis, flor. pedunculatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 585. Hab. in America. Bracteae lato-lanceolatae semipedales, coccineae. h

10. *chrysantha*, fol. serrato-spinosis, bracteis lanceolatis dentatis, racemo subcomposito fol. brevior, flor. pedunculatis. Willd. p. 9. Jacq. Schoenh. 1. p. 28. t. 55. Hab. ad Caracas. Bract. flavescentes dentatae. h

11. *humilis*, subcaulis, flor. aggregatis sessilibus, axillis stoloniferis. Jacq. Misc. 2. p. 325. Ic. rar. 1. t. 60. Hab. . . h

12. *Acanga*, panicula diffusa, fol. ciliato-spinosis mucronatis recurvatis. Caraguata. Pis. bras. 90. t. 97. Moris. 5. 4. t. 22. f. 7. Hab. in Brasilia. h

764. **PITCAIRNIA**. *Cal.* 3-phyllus semisuperus. *Petala* 3. Squama nectarifera ad basin petalorum aut o. *Stigmata* 3, contorta. *Caps.* 3, introrsum dehiscentes. *Sem.* alata, aut utrinque in setam longam terminata.

1. *bromeliifolia*, fol. ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque glaberrimis. Ait. Kew. 1. p. 401. Schneev. ic. fasc. 4. t. 11. 1/2 Herit. seri. angl. p. 7. t. 11. Hepetis an-

gustifolia. Swartz. prod. 55. Hab. in Jamaica, ad rupes umbrosas. h

2. *angustifolia*, fol. ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque tomentosis. Ait. Kew. 1. p. 401. Hab. in insula St. Crucis. h

3. *latifolia*, fol. integerrimis, basi sub-spinosis. Ait. l. c. Wendl. Hort. Herrnh. t. 3. Bromelia nudicaulis. Lin. Habit. in Amer. meridion. Flor. spicati coccinei. Fl. hyeme.

4. *lanuginosa*, scapo racemoso-spicato simplicissimo, fol. angustis ensiformibus subtus lanuginosis ultra basin aculeatis. Flor. Per. 3. p. 35. t. 258. Hab. ad Pozuzo nemora supra saxa. Flor. violacei. h

5. *pulverulenta*, scapo paniculato composito, fol. ensiformib. subtus pulverulentis: inferioribus petiolatis. Flor. Per. 3. p. 36. t. 259. In Andium nemoribus. Flor. puniceae.

6. *paniculata*, scapo paniculato, panicula decomposita, fol. ensiformib. serrato-aculeatis pulverulentis. Flor. Per. l. c. t. 260. Cor. coccinea. Hab. in Andium montibus.

7. *ferruginea*, scapo paniculato, panicula diffusa, fol. ensiformib. aculeatis, flor. recurvo-falcatis. Flor. Per. l. c. Hab. in collib. aridis prope Limam urbem. Cor. subpurpurea.

+ *Cal. infero, tripartito. Anther. incumbentibus linearibus. Caps. valvis septiferis. Flor. Per. (Pourretia.)*

8. *crystallina*, spica maxima thyrsoides, fol. ensiformib. aculeatis, cal. lanatis. Pourretia lanuginosa. Flor. Peruv. 3. p. 33. t. 255. Hab. in Peruviae nemorosis et collibus. Cor. obscure viridis. Ex spica gummi crystallinum undique profluit. loc. cit.

9. *pyramidata*, spica pyramidata, fol. ensiformib. margine purpureis aculeatis, cor. luteo-virentibus. Flor. Peruv. p. 34. sub Pourretia uti sequens. Hab. in Peruv. montibus supra saxa.

10. *coarctata*, spica composita coarctata, fol. ensiformib. aculeatis, cor. luteis ad basin macula purpurea. Flor. Per. l. c. Renealmia. Fewill. 3. p. 59. t. 39. Puya. Molin. Hist. Chil. Puya Chilensis. Gmel. syst. II. p. 553. Hab. in regn. Chilensis collib. aridis. Chilenses caule substantia suberoso, ad vascula varia formanda utuntur. h

765. **GUZMANNIA**. *Cal.* inferus tripartitus: laciniis convolutis. *Petala* 3, in tubum convoluta.



*Antherae* in cylindrum coalitae. *Caps.* 3-locularis, trivalvis. *Sem.* numerosa, oblonga, nuda.

1. *tricolor*, scap. tricolor, fol. inermibus. Flor. Peruv. 3. p. 39. t. 261. Pourretia sympagantera. Syst. veg. Flor. Peruv. et Chil. p. 82. Hab. in Peruviae montib. ad arborum truncos. Cor. alba, ephemera. ¶

766. *ÆCHMEA*. *Cal.* inferior (aut squama germen amplectens) monophyllus. cyathiformis subtrifidus: *superior* tripartitus coriaceo-scariosus: laciniis margine convolutis. *Petala* 3. *Squamae* 2, ad basin singuli petali. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis. *Sem.* obovata, pulpa molli nidulantia.

1. *paniculata*, scap. paniculato-racemoso, fol. ensiformibus carinatis aculeatis. Flor. Per. 3. p. 37. t. 263. Hab. in Andium nemorib. supra arbores. Cor. luteo-virens. Flor. marcescendo spiralliter convoluti.

767. *TILLANDSIA*. *Cal.* 3-fidus, persistens, subconvolutis. *Cor.* 3-fida, campanulata. *Caps.* 1-3-locularis. *Sem.* comosa.

1. *utriculata*, culmo paniculato, fol. amplioribus attenuatis basi ventricosis, spica assurgenti compressa brachiata, flor. sessilibus. Brown. jam. 194. Willd. Sp. II. p. 11. Hab. in Americae meridionalis arboribus. ¶

2. *serrata*, fol. superne serrato-spinosis, spica comosa. Plum. gen. 10. ic. 72. f. 1. Hab. in America meridionali.

3. *lingulata*, fol. lanceolato-lingulatis integerrimis: basi ventricosis. Jacq. amer. 92. t. 62. Ed. picta. t. 92. Plum. gen. 10. ic. 74. Sloan. jam. 77. hist. 1. p. 189. t. 10. In Amer. meridion. arborib. vetustis parasitica.

4. *tetrantha*, erecta, scapo flexuoso, pedunc. ex spathis quadrifloris reflexis. Flor. Peruv. 3. p. 39. t. 265. Hab. in Andium nemorib. supra arbores et saxa. Petal. violacea.

*Obs.* Utriculus ab omnium foliorum convoluzione formatus aqua repletur, quam per plures dies retinet.

5. *rubra*, panic. simplice rubra, spic. indivisis, fol. ensiformibus subacuminatis.

Flor. Peruv. In Peruv. praeruptis calidis ad Tarmae tractus. Petal. purpureo-violacea.

6. *maculata*, panic. composita, spic. subdivisis, fol. lanceolato-ensiformibus maculatis. Flor. Peruv. 3. p. 40. t. 267. In Andium nemorib. supra saxa et arbores.

*Obs.* Etiam in hac specie aqua pluviolis in folior. urceolo colligitur. Supra parietes et templorum porticus ab indis transfertur, ubi, ornamenti causa, viget. l. c.

7. *biflora*, scap. racemoso, flor. geminis, fol. ensiformibus acutis. Flor. Per. p. 41. t. 268. Cum priore. ¶

8. *parviflora*, panic. simplici spicul. 3<sup>7</sup>, flor. distichis, fol. subulatis basi amplissima. Flor. Per. l. c. t. 269. Petal. albidia. Fol. canescentia, squam. furfuraceis. ¶

9. *heptantha*, spic. septemflora disticha, petal. albis apice violaceis, fol. ensiformibus, subulatis acutissimis. Flor. Per. p. 41. In Peruv. praeruptis calidis.

10. *purpurea*, panic. polystachia rotacea, flor. distichis, fol. ensiformi-subulatis recurvis. Flor. Per. t. 270. Hab. in saxosis et arenosis locis, et collibus. Ect. lamina purpurea.

11. *sessiliflora*, scapo spicato simplici, flor. solitariis sessilibus, fol. sublingulatis retusis. Flor. Per. 3. p. 42. t. 271. In Peruv. locis calidis. Flor. bract. concavis suffultis. ¶

12. *tenuifolia*, spicis alternis imbricatis, flor. distichis, fol. lineari-filiformibus erectis, apice setaceis. Swartz. fl. ind. occ. 1. p. 592. Plum. gen. 37. ic. 232. f. 2. Sloan. jam. t. 122. f. 1. Cum priore.

13. *flexuosa*, spicis laxis flexuosis, flor. distichis remotiusculis, foliis lanceolato-linearibus reclinatis, caule apice subdiviso. Swartz. p. 590. T. *tenuifolia*. Jacq. amer. p. 92. t. 63. Ed. p. Hab. in arborum ramis Jamaicae et Carthagenae.

14. *setacea*, spica simplici, spathis distichis imbricatis, fol. lineari-filiformibus reclinatis glabris. Swartz. l. c. Hab. in Jamaicae arboribus. Similis T. *tenuifoliae*. ¶

15. *paniculata*, fol. radicalibus brevissimis, culmo subnudo, ramis subdivisis adscendentibus. L. Plum. gen. 27. ic. 237. Hab. in America meridionali.

16. *fasciculata*, spicis lateralibus distichis imbricatis, fol. lanceolato-subulatis erectis strictis. Fl. ind. occid. 1. p. 586. T. *clavata*. Lem. Hab. in maritimis Jamaicae, arboribus adhaerens. Swartz. l. c. ¶

17. *nutans*, spicis subdivisis nutantibus, flor. distinctis ovatis, fol. ovato-lanceolatis membranaceis, caule subnudo. Swartz. Fl. ind. occid. t. p. 586. Hab. in montosis Jamaicae ad arborum ramos.  $\overline{\text{T}}$

18. *polystachya*, calmo spicis imbricatis lateralibus. L. Plum. gen. 37. Hab. in Americ. calidiore.

19. *monostachya*, fol. linearibus canaliculatis reclinatis, culmo simplici imbricato, spica simplici. L. Plum. gen. 37. ic. 238. f. 1. Hab. in America meridionali. Flor. nivei.

20. *pruinosa*, spica simplici, spathis imbricatis, fol. lanceolato-linearibus reclinatis, spathisque squamuloso-tomentosis. Swartz. Flor. ind. occid. t. p. 594. In arborum ramis vetustis Jamaicae. Non confundenda cum T. recurvata. Sw.  $\overline{\text{T}}$

21. *canescens*, spicis subternis, fol. linearibus erectis caulem aequantibus incanis. Swartz. Flor. t. p. 595. Hab. ad maris litora Jamaicae in arboribus. T. polystachya proxima.  $\overline{\text{T}}$

22. *angustifolia*, spicis fasciculatis, fol. lineari-lanceolatis suberectis glabris caulem superantibus. Swartz. l. c. Hab. in Jamaica et Hispania. Distinguenda a T. polystachya.  $\overline{\text{T}}$

23. *capillaris*, caul. dichotomo, pedunc. subnifloro capillari, fol. triplo longiori glabro, fol. lineari-subulatis. Flor. Per. p. 47. 271. In Peruv. locis calidis, frequens in muris et supra saxa, arbores. Caespitosa, squamis furfuraceis densis tecta. Sequenti affinis.

24. *recurvata*, pedunc. bifloro, fol. paullo longiori leproso, fol. subulatis declinatis erectisque. Flor. Per. t. 271. Lin. Sp. pl. 2. p. 7. Sloan. Jam. hist. t. p. 190. t. 121. f. 1. Hab. in Jamaicae et Peruviae locis calidioribus supra arbores, saxa et parietes. Cal. purpurasc. Pet. violacea.  $\overline{\text{T}}$

25. *virescens*, pedunc. 1-floro longitudine fol.; bract. solitaria convoluta, fol. lineari-subulatis. Flor. Peruv. p. 43. t. 270. Caps. virescens.

26. *Usneoides*, pedunc. 1-floro brevi, caul. ramoso filiformi flexuoso pendulo, fol. subulato-filiformibus. Flor. Peruv. p. 43. T. *usneoides*, filiformis ramosa intorta scabra. Lin. Willd. l. c. p. 15. Sloan. l. c. t. 122. f. 2 et 3. Cuscuta. Pluck. alm. t. 26. f. 5. Hab. in America.

*Obs.* Incolae haec planta contra haemorrhoidas utuntur. Etiam ad varias res, na-

tura praesertim fragiles, transportandas frequenter sumitur.

768. XEROPHYTA. Cor. 6-partita aequalis, tribus laciniis exterioribus angustioribus. *Stigm.* clavatum. *Caps.* scabra, infera, 3-locularis, polysperma.

1. *pinifolia*. Juss. Willd. Sp. II. p. 15. Lam. ill. gen. t. 225. Hab. in Madagascar. Arida, ramis alternis. Fol. linearis, pungentia.  $\text{h}$

769. BURMANNIA. Cal. prismaticus, coloratus, 5-fidus: angulis membranaceis. *Petala* 3. *Caps.* 3-locularis, recta. *Sem.* minuta.

1. *disticha*, spica gemina. Burm. zeyl. 50. t. 20. f. 1. Willd. p. 16. Hab. in Zeylonae paludosis.  $\overline{\text{T}}$

2. *biflora*, flor. gemino. L. Mill. dict. n. 2. Hab. in Virginiae paludosis.

770. TRADESCANTIA. Cal. 3-phyllus. *Petala* 3. *Filamenta* villos articulis. *Caps.* 3-locularis.

1. *virginica*, erecta, fol. lanceolatis glabris, flor. umbellato-congestis terminalibus. Willd. Sp. II. p. 16. Moris. s. 15. t. 2. f. 4. Hab. in Virginia. Flor. puberules.  $\overline{\text{T}}$

2. *rosea*, erecta, fol. lanceolatis (gramineis), umbel. terminalibus paucifloris involucre longioribus. Vent. Hort. Cels. p. 24. t. 24. Michaux. Flor. t. p. 193. Hab. in Carolinae et Georgiae sabulosis subudis. Fol. longa. Cor. rosea.  $\odot$

3. *latifolia*, caul. erecto simplici, fol. lanceolato-ovatis, flor. terminalibus subumbellatis involucreis. Flor. Peruv. 3. p. 44. t. 272. Hab. in Peruviae collibus, et in montibus Limae. Cal. hirsutus, viscosus. Petal. violacea. Styl. incurvus.  $\odot$

4. *crassifolia*, erecta, fol. ovatis margine et subtus lanatis, flor. umbellato-congestis terminalibus. Willd. Cav. ic. t. p. 54. t. 75. Hab. in Mexico. Caul. lanatus, ramosus. Flor. maximi.  $\overline{\text{T}}$

5. *erecta*, erecta, fol. ovatis basi angustatis glabris, pedunculo terminali nudo bifido racemoso. Willd. Cav. ic. t. p. 53. t. 74. Jacq. ic. rar. 2. t. 354. Coll. 4. p. 114. T. *undulata*. Vahl. Act. Haf. 2. P. 2. p. 27. t. 3. T. *bifida*. Roth. catal. bot. t. p. 42. Cum priore.

6. *discolor*, aculis laevis, bracteis equitantiis compressis, fol. lanceolatis carnosius subtus coloratis. Smith. icon. pict. p. 10. t. 10. Swartz. l. c. p. 607. L'Herit. sert. du gl. p. 8. t. 12. Hab. in America meridionali, in regionibus sinu Mexicano proximis. ☞

7. *malabaria*, erecta laevis, pedunc. solitariis longissimis. Sp. pl. 412. Rheed. g. t. 63. Hab. in Malabaria. ☞

8. *nervosa*, scapo unifloro. L. Mant. 223. Hab. in Suratte? Caul. diffus. Stamina 6, pilis violaceis. Stylus apice hamosus.

9. *divaricata*, caule dichotomo, fol. ovato-lanceolatis glabris, vaginis villosis, florib. paniculatis, filamentis glabris. Vahl. eclog. 1. p. 34. Commelina hexandra. Aubl. gujan. 1. p. 35. t. 12. Hab. ad fluviorum ripas Gujanae, Cajennae, inque insula Trinitatis.

10. *geniculata*, procumbens hirsuta. L. T. caule paniculato, basi repente. Jacq. amer. 94. t. 64. Plum. ic. 116. f. 2. Hab. in America meridionali. ☞

11. *monandra*, diffusa, fol. ovatis acuminate, pedunc. axillaribus multifloris, flor. monandris. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 597. Hab. in nemoribus montium Hispaniolae occidentalis. Filam. huic et a sequentibus glabra sunt. ☞

12. *multiflora*, erecta ramosa, fol. cordatis margine vaginisque ciliatis, pedunc. confertis axillaribus, flor. triandris. Swartz. l. c. p. 569. Hab. in umbrosis sylvaticis montium Jamaicae.

13. *cordifolia*, repens filiformis, fol. cordatis, pedunculis terminalibus solitariis multifloris. Swartz. Flor. 1. p. 601. Hab. in montibus altis Jamaicae, locis umbrosis ramiosis humidis. ☞

14. *procumbens*, caule procumbente radicante, fol. ovatis basi ciliatis vaginatis, pedunc. cymosis axillaribus, flor. 6-andris. Willd. Sp. p. 19. T. *multiflora*. Jacq. ic. 2. t. 355. Ej. Collect. 3. p. 226. Hab. ad Caracas. ☞

15. *parviflora*, repens, fol. ovato-oblongis: floriferis subcordatis, pedunc. umbellatis axillaribus. Flor. Peru. 3. p. 43. t. 272. f. 2. Hab. in Peruvia. Filam. 3. glabra, 3-hirsuta. Fol. subius purpurascens.

16. *axillaris*, caule ramoso basi repente, flor. sessilibus lateralibus. L. Pluck. alm. 135. t. 174. f. 3. Rheed. 10. t. 13. Hab. in India. Fol. linearia, vaginis coloratis longius ciliatis. Stylus clavatus. ☞

16. *formosa*, fol. oppositis connatis. T. *nodiflora*, caule simpliciter flexuato, foliis brevissimis margine et vagina villosis, flor. axillaribus sessilibus glomeratis. Lam. enc. 2. p. 367. Hab. ad Cap. b. spei. Stylus apice barbatus.

17. *cristata*, repens laevis, spathis diphyllis imbricatis. Jacq. Hort. t. 137. Commelina cristata. L. Hab. in Zeylona. Filam. pilis caeruleis cor. breviora. Stylus clavatus. Stigma tubulosum, crenatum. ☞

18. *papilionacea*, repens laevis, spathis triphyllis imbricatis. Burm. ind. 17. t. 7. f. 1. Hab. in India. Spathia refert florem papilionaceum. Cor. violacea. Stam. breviores. ☞

ZANONIA. Cal. 3-partitus. Cal. 3-petals, demum baccans. Filam. villosa. Anth. geminae uniformes. Caps. 3-locularis, corolla baccante inclusa. Zan. *bibracteata*. Cramer Eumer. pl. p. 75.

19. *Zanonia*, erecta, fol. lato-lanceolatis, pedunc. lateralibus solitariis medio geniculatis, bract. geminis. Swartz. prodr. p. 57. Willd. p. 17. Commelina Zanonia. Lin. Z. graminea perfoliata. Plum. gen. 38. Sloan. hist. 1. t. 147. f. 1. Hab. in Jamaicae australioris nemorib. et in Guiana. Caul. altissimus.

771. POLLIA. Cor. infera, 6-petala. Pet. 3-exteriora majora. Bacc. polysperma.

1. *japonica*. Thunb. Diss. acad. 1. p. 13. Flor. japon. p. 138. Caul. articulatus villosus-asperatus. Flor. verticillato-corymbosi. Th. Hab. in Japonia.

772. MNASIUM. Spatha 2-valvis multiflora. Cal. 3-partitus. Cor. 1-petala, tubo brevissimo, tridentata. Antherae foliolo terminatae. Stigm. 3, spiralliter contorta.

1. *padulosum*. Willd. Sp. II. p. 22. Repatea padulosa. Auct. guj. 1. p. 305. t. 118. Lam. ill. t. 226. Hab. in sylvia padulosis Gujanae. Habitu Pontederiac. Cal. squamis imbricatis. Cor. flava. ☞

773. PONTEDERIA. Cor. 1-petala, 6-fida, bilabiata. Stamina 3, apici, tubo corollae inserta. Caps. 3-locularis.

1. *rotundifolia*, fol. orbiculato-cordatis. Lin. suppl. 192. Willd. l. c. Hab. in

Surinamo. Cor. sexfida inaequalis, facie floris neutri Centaureae cyani. L.

2. *azurea*, fol. subrotundo - ellipticis, basi petiolisque incrassatis, flor. spicatis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 607. Hab. in fossis Jamaicae.  $\overline{\text{T}}$

3. *vaginalis*, fol. cordatis, racemo cernuo. Pluck. alm. 215. t. 215. f. 4. Rumph. amb. 6. p. 178. t. 75. f. 1. Rhed. mal. 11. t. 44. Hab. in Indiae orientalis aquosis.  $\overline{\text{T}}$

4. *limosa*, fol. cordato - ovatis, scapis lateralibus unifloris, flor. triandris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 611. Sloan. hist. 1. t. 149. f. 1. Hab. ad ripas limosas fluviorum Jamaicae, Hispaniolae.  $\overline{\text{T}}$

5. *cordata*, fol. oblongo-cordatis, flor. spicatis. Lam. ill. t. 225. Les Liliacées. t. 72. Moris. s. 15. t. 4. f. 8. Hab. in Virginiae aquosis.  $\overline{\text{T}}$

6. *hastata*, fol. hastatis, flor. umbellatis. L. Conf. Willd. p. 24. Pluck. alm. 326. t. 220. f. 8. Moris. s. 15. t. 4. f. 7. Hab. in India.  $\overline{\text{T}}$

774. *HÆMANTHUS*. *Involucr. polyphyllum, multistorum. Cor. 6-partita, supra. Bacca 3-locularis.*

1. *coccineus*, fol. linguiformib. planis laevib. humi adpressis lifariis, umb. coarctata fastigiata involucri breviori, limbo patulo. Ait. Kew. 1. p. 304. Willd. p. 24. Comm. hort. 2. p. 127. t. 64. Les Liliacées. t. 29. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

2. *coarctatus*, fol. linguiformi-oblongis planis laevibus apice callosis erectis, umb. coarctata fastigiata invol. breviori, limbo erecto. Willd. p. 25. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

3. *punicens*, fol. oblongis ellipticis acutis retusis undulatis, umb. coarctata fastigiata, limbo staminibusque erectis. Ait. Kew. 1. Willd. p. 404. Dill. elth. 167. t. 140. f. 2. Trew. Ehret. t. 44. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

4. *multiflorus*, fol. elliptico-lanceolatis acutis concavis erectis, umbella multiflora involucri longiore, pedunculis articulatis, limbo patulo, staminib. ascendentibus. p. 25. Scla mus. 1. p. 20. t. 12. f. 1. 2. 3. Swert. floril. 1. f. 3. Moris. s. 12. t. 12. f. 11. Rndb. clys. 2. p. 210. f. 3. Hab. in Sierra Leone.  $\overline{\text{T}}$

5. *tigrinus*, fol. linguiformibus planis glabris margine ciliatis depressis, umbella coarctata, limbo staminibusque erectis. Willd. H. *tigrinus*, fol. oblongis ciliatis subtus maculatis, scapo maculato, umb.

coarctata. Jacq. Schoenh. 1. p. 29. t. 56. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

6. *quadrivalvis*, fol. oblongis basi angustatis planis patulis superne villosis, margine ciliatis, involucri tetraphyllo umbella coarctata longiore, limbo staminibusque erectis. Willd. Jacq. 1. c. p. 30. t. 58. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. superne spicem versus albo-villosa. W.

7. *pubescens*, fol. oblongo-lanceolatis, undique hirsutis, umbella fastigiato-rotundata, limbo staminibusque erectis. Ait. Kew. 1. p. 404. Lin. suppl. 193. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

8. *ciliaris*, fol. lanceolatis glabris ciliatis, involucri lato umbella rotundata breviori, limbo reflexo. Ait. Kew. 1. p. 404. Amaryllis ciliaris. Linn. suppl. 195. Breyn. cent. 1. 39. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

9. *albiflos*, foliis ellipticis acutiusculis planis glabris margine ciliatis, involucri tetraphyllo umb. rotundata breviori, limbo patulo. Willd. p. 27. Jacq. hort. Schoenh. 1. p. 31. t. 59. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

10. *toxicarius*, fol. lifariis oblongis planiusculis glabris, pedunculis spatha floreque longioribus. Ait. Kew. 1. p. 405. Amaryllis disticha. Lin. suppl. 195. Patters. iter. t. 1. Hab. ad Cap. b. spei in regione Rogge-Veld. Flor. incarnati.  $\overline{\text{T}}$

11. *lancaesolius*, fol. ellipticis basi attenuatis depressis planis glabris, margine ciliatis, pedunc. spatha floreque longiorib. limbo patente. Willd. Jacq. Schoenh. 1. p. 31. t. 60. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

12. *carinatus*, fol. linearibus carinatis. Mill. Cum priore.  $\dagger$

13. *pumilio*, foliis linearibus lanceolatis erectis glabris, pedunc. spatharum florumque longitudine, limbo patenti. Willd. H. *pumilio*, fol. linearibus lanceolatis glabris falcatis, umbella pauciflora. Jacq. 1. c. p. 32. t. 61.

14? *spiralis*, fol. setaceis, scapo filiformi basi spirali flexuoso, involucri subulatis umbella uni-quadriflora brevioribus. Ait. Kew. 1. p. 405. Crinum tenellum. Jacq. ic. rar. 2. t. 363. Collect. suppl. p. 43. Cr. spirale. Andrew. t. 92. Ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

775. *MASSONIA*. *Cor. infera limbo 6-partito. Filamenta collo tubi imposita. Capsula 3-alata 3-locularis polysperma.*

1. *latifolia*, fol. subrotundis patentib., laciniis corollae patulis. Ait. Kew. 1. p. 405.

t. 3. Willd. Sp. II. p. 28. Thunb. Diss. Nov. pl. gen. Hab. ad Cap. b. spei.

2. *angustifolia*, fol. oblongo-lanceolatis erectis, laciniis cor. reflexis. Ait. Kew. t. p. 465. t. 4. M. *lanceolata*. Thunb. Flor. umbellati.

3. *violacea*, fol. ovatis, erectis, flor. racemoso-corymbosis. Andrew. t. 46. Ad Cap. b. spei.

4. *undulata*, fol. lanceolatis undulatis glabris. Hab. in Cap. b. spei interiore.

5. *echinata*, fol. ovatis muricatis pilosis. Lin. suppl. 193. Hab. in Cap. b. spei, ad margines montis Bocklands-Berg. Flor. glomerati inter folia. ¶

776. *GALANTHUS. Petala* 3, concava. *Nectarium* ex petalis 3, parvis, emarginatis. *Stigma* simplex.

1. *nivalis*. Lin. Willd. Sp. 2. p. 29. Jacq. austr. t. 330. Hab. in nemorosis et in pratis Europae australioris. Flor. primo vere. ¶

777. *LEUCOIUM. Cor.* campaniformis, 5-partita, apicibus incrassata. *Stigma* simplex.

1. *vernum*, spatha uniflora, stylo clavato. Jacq. austr. t. 312. Lam. ill. t. 230. f. 1. *Nivaria*. Moench. meth. p. 229. Hab. in sylvis.

2. *aestivum*, spatha multiflora, stylo clavato. Jacq. austr. t. 202. Lam. ill. t. 320. f. 2. Hab. in Europa austral.

3. *autumnale*, spatha monophylla biflora, petal. ovatis apice tridentatis, stylo filiformi. Schousb. Maroc. p. 139. Label. ic. 124. Hab. in Hispania, Lusitania et Barbariae locis aridis. Flor. autumnis sub finem. M. octobr.

4. *trichophyllum*, spatha diphylla biflora, petal. lanceolatis acutis stylo filiformi. Schousb. l. c. p. 140. Cresc. in Barbaria in campis arenosis region. Tingitanæ prope Schaarf el Kaab. Fl. januario.

778. *STRUMARIA. Cor.* hexapetala petens. *Styl.* infra medium incrassatus, s. cum filamentis cohaerens. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* infera subrotunda 3-locularis.

\* *Styli struma cum filamentis connata.*

1. *linguae-folia*, fol. lineari-ensiformi-

mibus rotundato-obtusis planis, scapo tecti, superne compresso, stam. longitudine corollae. Willd. Sp. 2. p. 31. S. *linguae-folia*, styli struma cum filamentis connata utrinque acuta, fol. linguaeformibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 356. Collect. suppl. 45. Hab. ad Cap. b. spei cum sequentibus speciebus. Cor. candida apicibus virescens. ¶

2. *truncata*, fol. lineari-ensiformibus rotundato-obtusis planis, scapo compresso, staminib. cor. longioribus. Willd. S. *truncata*, styli struma cum filam. connata superne truncata. Jacq. ic. rar. 2. t. 357. Cor. candida externe basi rubicunda. ¶

3. *rubella*, fol. linearibus oblique flexis, petalis planis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 358. Collect. suppl. 46. Spathae violaceae. Cor. incarnata. ¶

4. *angustifolia*, fol. linearibus planis, germine triglanduloso. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 359. Collect. suppl. 48. Spathae rubicundae. Cor. candida externe linea rubicunda.

\* \* *Styli struma a filamentis libera.*

5. *undulata*, foliis linearibus oblique flexis, petalis undulatis. Willd. p. 32.

6. *filifolia*, fol. filiformibus, petalis acutis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 361. Coll. 3. p. 222. *Leucium strumosum*. Ait. Kew. t. p. 407. t. 5. *Crinum tenellum*. Lin. suppl. 194.

779. *TULBAGIA. Cor.* infundibulif.

*Limbo* 6-fido. *Nectarium* coronans faucem, 3-phyllum: foliolis bifidis magnitudine limbi. *Caps.* supera.

1. *alliacea*, nectario monophyllo sexdentato, fol. ensiformibus, flor. cernuis. Thunb. prod. 60. Jacq. hort. 2. p. 52. t. 115. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

2. *cepea*, nectario triphylo, foliis linearibus, flor. erectis. Thunb. prod. 60. Antherae sessiles infra os tubi, tres superiores alternae. ¶

780. *NARCISSUS. Petala* 6, aequalia: *Nectarium* (cor. limbo interiore) infundibuliformi, 1-phylo. *Stam.* intra nectarium.

1. *poëticus*, spatha uniflora, nectario rotato brevissimo scarioso (rubro) crenulato, fol. margine inflexis. Engl. bot. t. 275. N. *angustifolius*. Curt. mag. t. 193. Hab.

in G. Narbonensi, Italia, Helvetia, Germania, Anglia.  $\overline{\text{T}}$

2. *biflorus*, spatha biflora, nect. rotato brevissimo membranaceo crenato (albido), fol. acute carinatis, margine inflexis. Smith. Flor. brit. 1. p. 354. Curt. Mag. t. 197. Engl. bot. t. 276. N. poeticus. Huds. Hab. in Angliae campis arenosis. Pet. ochroleuca. Nect. margine albido. S.

3. *incomparabilis*, spatha uniflora, nectario campanulato plicato crispo, petalis dimidio brevioribus, fol. planis. Curt. mag. 121. Nonpareille. Park. theat. 68. Hab. in Hispania, Lusitania.  $\overline{\text{T}}$

4. *Pseudo-Narcissus*, spatha uniflora, nectario campanulato recto crispo, aequante petala ovata. L. Mill. dict. n°. 11. Scop. carn. 2. p. 245. Engl. bot. t. 17. Dod. pempt. 225. f. 12. Hab. in Eur. austr. pratis et montosis.  $\overline{\text{T}}$

5. *bicolor*, spatha uniflora, nectario campanulato margine patulo crispo aequante petala. Gouan. illustr. 22. Rudb. elys. 2. p. 70. f. 7. Hab. in Europa australi, in Pyrenaeis.  $\overline{\text{T}}$

6. *minor*, spatha uniflora, nectario obconico recto crispo sextifido, aequante petala lanceolata. Sp. pl. 415. Curt. mag. 6. Eaub. hist. 2. p. 597. Hab. in Hispania.  $\overline{\text{T}}$

7. *moschatus*, spatha uniflora, nectario cylindrico truncato subrepando, aequante petala oblonga. L. Barr. ic. Rudb. elys. 2. p. 69. f. 6. Hab. in Hispania.  $\overline{\text{T}}$

8. *triandrus* (*pyrenaicus*), spatha subuniflora nectario campanulato crenulato, dimidio brevioribus petalis, staminibus plurimum ternis. L. Curt. mag. t. 48. Rudb. elys. 2. p. 72. f. 12. Hab. in Pyrenaeis. Stamina sex, quorum tria breviora, a nonnullis observata.  $\overline{\text{T}}$

9. *orientalis*, spatha subbiflora, nectario campanulato trifido emarginato, petalis triplo brevioribus. Rudb. elys. 2. p. 52. f. 2. Hab. in Oriente.  $\overline{\text{T}}$

10. *Amancaes*, spatha 3-6-flora, nectario magno campanulato repando sexlobato crenulato, stam. cernuis, fol. ensiformibus. Flor. Per. 3. p. 53. t. 281. f. a. Hab. in collibus Limaee etc. Fior. magni, luteo-sulphurei, fragrantissimi.  $\overline{\text{T}}$

11. *trifolius*, spatha submultiflora, nectario campanulato subtrifido integerrimo, petalis dimidio brevioribus. Sp. pl. 417. Rudb. elys. 2. p. 61. f. 3. Hab. in Europa australi. Similis N. Ionquillae.  $\overline{\text{T}}$

12. *odoratus*, spatha subbiflora, nectario campanulato sextifido laevi, dimidio petalis brevioribus, fol. semicylindricis. Curt. mag. t. 76. N. fol. junceis carinatis, scapo unifloro, scypho sexies emarginato. Hall. helv. n°. 1251. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 7. Hab. in Europa australi. Var. spatha uniflora et multiflora.  $\overline{\text{T}}$

13. *biflorus*, spatha biflora, nectario brevissimo scarioso. Curt. mag. 197. Dod. pempt. 223. f. 2. Park. theat. 74. t. 75. f. 1. Hab. in Hispania, Anglia.  $\overline{\text{T}}$

14. *calathinus*, spatha multiflora, nectario campanulato subaequante, petala fol. planis. Sp. pl. 415. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 5. Hab. in Europa australi, Oriente. Nectar. longitudine petalorum.  $\overline{\text{T}}$

15. *Tazetta*, spatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis alterne latioribus brevioribus, foliis planis. Willd. p. 39. Desf. Atl. 1. p. 282. Knorr. del. 1. t. N. 3. Rudb. 57. f. 11. Hab. in G. Narbonensis, Lusitaniae, Hispaniae maritimis subhumidis. Petal. apice flocculo lanato.

16. *dubius*, spatha multiflora, nectario campanulato truncato triplo petalis ovatis aequalibus brevioribus. Willd. p. 40. Gouan. illustr. p. 22. Rudb. 2. t. 51. f. 2. Hab. Mompelii. Tazetta duplo humilior. Folia linearia. Nectar. campanulatum album integerrimum triplo brevius petalis. G.  $\overline{\text{T}}$

17. *viridiflorus*, spatha multiflora, nectar. campanulato brevissimo, petal. linearibus, fol. teretibus fistulosis. Schousb. l. c. t. 11. Cresc. in locis elevatis saxosis, humidis juxta Tingidem. Scapus teres, floriferus primum prodit, dein folia. Petal. cinereo-viridia. Flor. oct., novembr.

18. *serotinus*, spatha multiflora, nectar. brevissimo integro crenulato, petal. lanceolatis, fol. linearib. canaliculatis. Schousb. Maroc. 1. p. 141. Desf. Atl. 1. p. 283. N. autumnalis minor. Clus. hist. t. 252. Hab. in Europa australi et in Barbaria. Scap. subaeceps. Petal. nivea. Flor. autumn.

19. *Bulbocodium*, spatha uniflora, nectario turbinato petalis majore, genitalibus declinatis. L. Curt. mag. t. 88. Rudb. 2. p. 75. f. 5. Les Liliacées. Hab. inter Ulyssiponem et Hissalim. Fol. subulata.  $\overline{\text{T}}$

20. *Ionquilla*, spatha multiflora, nectario campanulato brevi, fol. subulatis. L. Curt. mag. t. 15. Hab. inter Hissalim et Gades, inter Guadaloupam et Toletum, et in Oriente locis uliginosis.  $\overline{\text{T}}$

781. *PANCRATIUM*. Cor. infundibuliformis: tubo longu. Petala 6. Nectar. (cor. limbus interior) 12-fidum. Stam. nectario imposita.

1. *seylanicum*, spatha uniflora, petalis reflexis. L. Willd. Sp. II. p. 41. Herm. luglb. Gort. t. 693. Comm. hort. 1. p. 75. t. 38. Rudb. p. 179. f. 7. Hab. in India.  $\mathcal{T}$

2. *mexicanum*, spatha biflora, fol. lanceolatis, nectarii dentibus sex staminiferis, intermediis simplicibus. Willd. p. 42. P. spatha biflora. L. Hort. cliff. 133. Dill. elth. app. t. 222. f. 289. Hab. in Mexico et Carolinae inundatis. Michaux. Stam. calycem subaequantia.  $\mathcal{T}$

3. *humile*, spatha biflora, fol. filiformibus, nectarii dentibus sex obtusis bifido-marginatis non staminiferis. Willd. Cav. ic. 3. p. 4. t. 207. f. 2. Hab. in Hispania. Flor. absque fol. octobri.  $\mathcal{T}$

4. *caribaeum*, spatha multiflora, fol. lanceolatis. L. Hort. cliff. 133. Mart. cent. 27. t. 27. Hab. in Jamaica, Caribaeis.  $\mathcal{T}$  +

5. *maritimum*, spatha multiflora, petalis planis, fol. lingulatis, stam. brevissimis. Mill. t. 197. Cavan. ic. A. p. 41. t. 56. Les Liliacées. t. 8. Salisb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 70. t. 9.

$\beta$ ? *carolinianum*, spatha multiflora, fol. linearibus, staminibus nectarii longitudine. L. Catesb. carol. 2. app. 5. t. 5. Rumph. 6. t. 70. f. 2. Hab. in Hispania et Gallia meridionali et  $\beta$ . in utraque India. Stylus declinatus. Filam. inflexa.  $\mathcal{T}$

6. *fragrans*, spatha multiflora, fol. ellipticis, nectarii dentibus sex staminiferis, intermediis nullis. Willd. p. 43. Salisb. l. c. p. 72. t. 11. Trew. Ehret. t. 28. Hab. in Barbados.  $\mathcal{T}$

7. *littorale*, spatha multiflora, foliis lineari-lanceolatis, nectarii dentibus sex staminiferis, spatio intermedio repando. Willd. p. 43. Salisb. p. 74. t. 13. Jacq. hort. 3 p. 41. t. 75. et amer. pict. t. 101. Trew. Ehret. p. 6. t. 27. Hab. in insula Terra-Bomba dicta Americae calidioris.  $\odot$

8. *speciosum*, spatha multiflora, fol. ellipticis, nectar. dentibus sex staminiferis, intermediis simplicibus acutis. Willd. p. 44. P. Cor. tubo triangulo rare striato. Salisb. Act. p. 73. t. 12. Hab. . .  $\mathcal{T}$

9. *declinatum*, spatha multiflora, scapo compresso ancipiti, cor. laciniis tubum excedentibus, fol. lingulatis. Jacq. amer. ed. picta. t. 102. Jacq. hort. 3. p. 11. t. 10.

Commel. hort. t. 87. Hab. in Antillis. Scap. demum declinatus.

Obs. An P. caribaeum. Lin. eadem species? Vid. Enc. bot. 4. p. 733.

10. *illyricum*, spatha multiflora, fol. lanceolatis, nect. dentibus sex acutis bifidis non staminiferis. Willd. p. 45. P. spatha multiflora, fol. ensiformibus, staminibus nectario longioribus. Salisb. l. c. p. 74. t. 14. Seb. thes. 1. p. 17. t. 8. f. 1. Hab. in Galliae maritimis.  $\mathcal{T}$

11. *amboinense*, spatha multiflora, fol. cordato-ovatis acutis, nectarii dentibus sex acutis bifidis non staminiferis. Willd. Rudb. elys. 2. p. 238. f. 17. Hab. in Amboina.  $\mathcal{T}$

12. *croceum*, spatha triflora, fol. lingulatis incurvis, tubo corollae incurvo. Enc. bot. 4. p. 735. Hab. in Peruvia. Cor. crocea. An diversum a n<sup>o</sup>. 16? +

13. *ringens*, spatha subquinqueflora, flor. ringentibus, nectar. brevi, staminib. corollae longitudine, foliis ensiformibus acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 53. Ciliur in Peruviae hortis. Petala reflexa, alba. Nect. viride.  $\mathcal{T}$

14. *flavum*, spatha multiflora, stamin. cor. longioribus, tubo nectario coarctato, petal. p. tubo-reflexis. Flor. Peruv. 3. p. 53. t. 284. Hab. in Peruv. collib. arenosis.  $\mathcal{T}$

15. *coccineum*, spatha multiflora, stam. cor. longitudine, tubo nect. tenui, petal. erectis. Flor. Peruv. l. c. t. 285. Hab. in collib. ad Tarmae oppidi tractus. Cor. coccinea.  $\mathcal{T}$

16. *recurvatum*, spatha 1-3-flora, tubo nectar. gracili recurvato, fol. ensiformib. carinatis. Flor. Peruv. l. c. t. 285. In Peruviae praeruptis. Bulb. extus purpurascens. Cor. cernua, purpureo-lutescens.  $\mathcal{T}$

17. *latifolium*, spatha multiflora, flor. dependentibus, fol. lanceolato-oblongis laeis. Flor. Peruv. l. c. t. 284. Habit. in Peruv. Andium nemorosis humidis. Petal. luteo-rubra, apice viridia.  $\mathcal{T}$

18. *viridiflorum*, spatha 4-5-flora, limb. nect. longitudine petalor., fol. ensiformibus. Flor. Per. p. 55. Hab. in Peruv. nemorib. et locis petrosis. Flor. magui, pulchri.

19. *variegatum*, spatha 4-flora, flor. longissimis, nect. limbo brevissimo, denticulis furcatis retroflexis. Flor. Peruv. l. c. Flor. spithamei, cernui, ex luteo, roseo albo-viridique colore variegati.  $\mathcal{T}$

782. *CRINUM*. *Cor.* supera, infundibuliformis, semisextida: tubo filiformi, limbo patulo recurvato: laciniis subulatis canaliculatis. *Filamenta* faucis tubi inserta, discreta. (*Semina* ad basin cor. vivipara. *Andrew.*)

1? *asiaticum*, fol. linearibus acuminate carinatis, floribus sessilibus, tubo limbo longiore, spatha diphylla. Willd. Sp. II. p. 45. Mill. dict. t. 110. *Amaryllis* vivipara. Lam. enc. 1. p. 123. Hab. in Malabar, Zeylona, America. Bulbi intra capsulas generantur. L. ¶

2. *americanum*, fol. oblongo-lanceolatis, margine glaberrimis, apice coarctato-unguiculato, flor. pedicellatis, tubo limbo brevior. Ait. Kew. 1. p. 413. C. radice fasciculari. L'Hérit. sert. angl. 8. Comm. rar. 14. t. 14. Dill. elth. t. 161. f. 195. Hab. in Amer. Cor. limbus reflexus.

3. *erubescens*, fol. lanceolatis cartilagineo-crenatis apice producto explanato, flor. sessilibus, tubo limbo longiore. Ait. Kew. 1. p. 413. Les Liliacées. t. 27. C. Commelini, cor. apicibus introrsum uncinatis, fol. linearibus canaliculatis. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 40. t. 202. Commel. rar. 15. t. 15. Hab. in America calidiore. ¶

4. *giganteum*, fol. flaccidis undulatis, flor. sessilibus umbellatis, petalis concavis. *Andrew.* t. 160. Hab. in Africa prope Sierra Leone. Pet. albidia. Stam. et pistil. declinata.

5. *urceolatum*, spatha multiflora, flor. campanulato-urceolatis pendulis, tricoloribus, fol. oblongis petiolatis. Flor. Peruv. 3. p. 58. t. 287. Hab. in Andiam memorib. prope Pozuzo. Cor. a medio ad basin lutea, superne viridis, marginibus albidia. ¶

6. *bracteatum*, fol. oblongo-lanceolatis basi attenuatis, margine cartilagineis glabris, apice subcallosis; flor. pedicellatis, tubo limbo brevior. spathis numerosis longioribus. Willd. p. 47. Hab. ... ¶

7? *nervosum*, fol. subrotundis nervosis, filamentis basi dilatatis petiolatis. L'Hérit. sert. angl. 8. *Amaryllis* rotundifolia. Lam. enc. 1. p. 124. Rumph. 6. t. 70. f. 1. Hab. in Philippinis. Scapus multiflorus polyphyllus. ¶

783. *AGAPANTHUS*. *Cor.* infera, infundibuliformis, regularis, sexpartita.

1. *umbellatus*, scapo fol. linearibus longiore, flor. umbellatis, tubo brevissimo.

Willd. II. p. 47. Les Liliacées. t. 4. L'Hérit. sert. angl. *Mauhuia linearis*, fol. linearibus scapo brevioribus. Thunb. prod. 60. Mill. ic. t. 210. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

2. *ensifolius*, scapo fol. lanceolatis brevior, flor. racemoso-umbellatis. *Mauhuia ensifolia*. Thunb. prod. 60. t. 3. Cum priore. ¶

784. *EUSTEPHIA*. *Cor.* supera tubulosa cylindracea bifida. *Nect.* foveæ 6 in tubo corollæ. *Filam.* tricuspidata, discreta.

1. *coccinea*, Cav. ic. 3. p. 20. t. 238. Hab. ... Habitu *Cyrtanthi*, sed nectariis et staminibus distincta. Fol. linearia. Flor. nutantes umbellati. W. ¶

785. *CYRTANTHUS*. *Cor.* supera incurva, tubulosa, clavata, sexfida: laciniæ ovato-oblongæ. *Filamenta* tubo inserta, apice conniventia.

1. *angustifolius*, fol. linearibus canaliculatis, cor. tubo cylindraceo. Willd. p. 48. Ait. Kew. 1. p. 414. Curt. mag. t. 271. *Crinum angustifolium*. Lin. suppl. 195. *Amaryllis* cylindracea. L'Hérit. sert. angl. 15. Hab. ad Cap. b. spei. Fl. purpurei. ¶

2. *ventricosus*; fol. linearibus planis strictis, cor. tubo ventricosio, staminibus adscendentibus. Willd. p. 49. C. angustifolius. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 40. t. 76. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. limbus planus. †

3. *obliquus*, fol. lineari-lanceolatis obtusis planis oblique flexis, cor. tubo obverse conico. Willd. & *Andrew.* t. 265. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 39. t. 75. *Crinum*. Lin. suppl. 195. *Amaryllis* umbellata. L'Hérit. sert. angl. 15. t. 16. Flor. coccinei, limbo virescente. ¶

786. *AMARYLLIS*. *Cor.* varia hexapetaloidæa irregularis. *Filamenta* faucis tubi inserta declinata (aut recta) inæqualia proportionem vel directionem.

\* *Spatha uniflora*.

1. *lutea*, spatha uniflora, corolla campanulata æquali, staminibus strictis. Lin. Syst. Veg. 329. Willd. Sp. 1. p. 50. *Colchicum luteum majus*. Bauh. pin. 60. Hab. in Hispania, Italia, Thracia. Flor. autumnæ. Flor. lutei.

2. *Atamasco*, spatha bifida uniflora, cor. campanulata æquali, pistillo declinato. Les



Les Liliacées. t. 31. Catesb. car. 3. p. 12. t. 12. Pluck. alm. 290. t. 42. f. 3. Moris. s. 4. t. 24. f. 4. Hab. in Virginia. Fl. vere. Flor. albidis subsessile.

3. *aurca*, spatha 1-flora, cor. campanulata patentiuscula, stam. erectis, stylo declinato, bulbo bulbis obvallato. Flor. Peruv. 3. p. 56. t. 286. f. a. Hab. in arvis, inter segetes in Peru. ¶

4. *flammea*, spatha 1-flora, cor. laciniis semiconvolutis superne patentibus reflexis, genitalibus brevibus erectis. Flor. Peruv. 3. l. c. fig. b. Feuill. Obs. t. 3. p. 29. t. 21. Cum priore, cui valde affinis dicitur. Cor. flammeo-coccinea. ¶

5. *pumilio*, spatha diphylla uniflora, cor. infundibuliformi aequali, laciniis revolutis, staminibus inclinatiss, alternis brevioribus. Ait. Kew. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. albida notata, interne lincis sex rubris. Stigma trifidum, lacinae lineares rubicundae apice albae. Ait.

6. *tubispatha*, spatha monophylla tubulosa bifida uniflora, pedunculo spatha duplo longiore. L'Herit. sert. angl. 9. Hab. in Bonaria. ¶

7. *tubiflora*, spatha uniflora diphylla, cor. infundibuliformi, tubo longissimo. L'Herit. sert. angl. 10. Feuill. peruv. 3. p. 29. t. 20. Hab. in Limae, Chancace arenosis. ¶

8. *maculata*, spatha uniflora diphylla lineari, flore pedunculato, genitalibus declinatis. L'Herit. sert. angl. 10. Hab. in regno. Chilensi. Scapus punctis lineis maculatus. ¶

9. *chilensis*, spatha uni-seu biflora subbifolia, flor. pedunculatis, fol. linearibus. L'Herit. sert. angl. 11. Feuill. peruv. 3. t. 21. Cum priore. Flor. purpurei. ¶

10. *clavata*, spatha uniflora diphylla subulata, cor. clavata. L'Herit. sert. angl. 11. Willd. p. 52. Hab. in Africa australi. ¶

11. *formosissima*, spatha uniflora, cor. inaequali, ringente: petalis tribus genitalibusque declinatis. L. Les Liliacées. t. 5. Dill. elib. 195. t. 162. f. 196. Rudb. 2. f. 10. Hab. in America meridionali. Flor. purpurascunt, fol. anteriores. ¶

## \*\* *Spatha biflora*.

12. *reginae*, spatha subbiflora, cor. basi tubulosis campanulatis quinquepartitis, fauce tubi hirsuta. L'Herit. sert. 12. Mill. dict. t. 24. Hab. in Caribaeis. ¶

13. *speciosa*, spatha subbiflora, cor. erectis basi tubulosis campanulatis semi-

quinquefidis, fauce tubi glabra. L'Herit. sert. angl. 12. A. elata. Jacq. Schoenb. t. 62. A. purpurea. Ait. Willd. p. 51. L. i. suppl. 195. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. sanguineo-purpurei magni umbellati. L. ¶

14. *linearis*, fol. linearibus, cor. campanulatis, laciniis duabus angustioribus. Willd. Crinum lineare. Lin. suppl. 195. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. magni, albi. ¶

15. *equestri*, spatha subbiflora, pedicellis erectis sparsis brevioribus, tubo filiformi horizontali, limbo oblique patulo sursum curvo, fauce pilosa. Ait. Kew. t. p. 417. Jacq. Schoenb. t. p. 31. t. 63. Herm. parad. 194. t. 194. Merian. surinam. t. 22. Hab. in America calidior. ¶

16. *reticulata*, spatha subbiflora, cor. basi tubulosis nutantibus, fauce tubi glabra, scapo compresso, fol. oblongis basi attenuatis. Ait. Kew. t. p. 411. Andrew. t. 179. Hab. in Brasilia. ¶

17. *tatarica*, spatha subbiflora, cor. subcampanulatis profunde sexpartitis, lacinia suprema angustissima, inferiore obovata acuminata, fol. linearibus scapo longioribus. Willd. p. 54. Pall. itin. 3. app. n°. 85. t. D. f. 1. Hab. in Siberia. Cor. fere hexapetala.

## \*\*\* *Spatha multiflora*.

18. *Belladonna*, cor. erectiusculis hexapetalis laciniis planis, scapo compresso, fol. acute canaliculatis obtuse carinatis alaberrimis. Ait. Kew. A. spatha multiflora, cor. campanulatis aequalibus ungue reflexis, genitalibus declinatis. L. Sch. thes. t. p. 25. t. 17. f. 1. Hab. in Caribaeis, Barbados, Surinamo. Bulbus viridis. Cor. campanulata, incarnata: fundo viridi-allicante, Pet. 3. interiora basi ciliata. Styl. ruber. Lin. +

19. *miniata*, spatha 2-4-flora, cor. campanulatis ringentibus: lacinia suprema retroflexa; infima angustiori, genital. decurrentibus. Flor. Peruv. t. p. 57. Hab. in Andium nemorib. ad versuras et in hortis. Cor. incarnato-miniata. Bulbus sectus et aeri expositus statim minii colorem acquirit. L. c. ¶

20. *bicolor*, spatha 6-12-flora, cor. subcampanulatis rubris apice vivacientibus: nectar. bicornibus. Flor. Per. 3. p. 57. Hab. in praeruptis Tarmae, etc. ¶

21. *vittata*, flor. pedicellatis, cor. cuneiformi-infundibuliformibus, petalorum exteriorum rachibus interiorum margine adnatis, scapo tereti, stigmatibus sulcatis.

Ait. Kew. 1. p. 418. Curt. mag. t. 129. Les Liliacées. t. 10. L'Herit. sert. t. 15. ¶

22. *falcata*, flor. umbellatis longius pedunculatis sexpartitis; fol. falcatis, margine cartilagineo muricato discolori. L'Herit. sert. 13. Crinum falcatum. Jacq. hort. 3. p. 34. t. 60. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

23. *ornata*, flor. sessilibus, cor. basi tubulosus, tubo spathis limboque longiore curvo, limbi laciniis oblongis aristatis, lacinia infima divaricata, concava. Ait. p. 418. Hab. in Guinea. ¶

24. *longifolia*, flor. pedicellatis, spatha 12-20-flora, cor. basi tubulosus, tubo curvo brevi, limbi laciniis lanceolatis obtusis, fol. lato-subulatis canaliculatis apice flaccidis. Ait. p. 419. Ehret. pict. t. 13. Jacq. ic. 2. t. 362. Herm. parad. t. 195. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

25. *montana*, spatha multiflora, fol. linearisubulatis, petalis alternis mucronatis, genitalibus erectis. Willd. ic. pl. syr. 2. p. 5. t. 1. Hab. in altis montibus Libani. Cor. caerulea. Singularis scapo foliosis, spatha terminali multiflora et axillaribus unifloris. Willd. p. 56. ¶

26. *zeylanica*, spatha multiflora, cor. reclinatis, tubo filiformi longissimo; laciniis uncinatis. L'Herit. sert. angl. 13. A. bulbisperma pericarpio bulbifero. Burm. prod. 19. A. lineata. Lam. enc. 1. p. 123. Crinum zeylanicum. Lin. Ehret. pict. 5. f. 2. Trew. Ehret. t. 13. Tulipa javana. Rumph. 5. t. 105. Hab. in India orientali. Flor. odorati, candidi, striis purpureis. ¶

27. *revoluta*, flor. pedicellatis, cor. basi tubulosus, tubo filiformi brevi curvo, fol. linearibus angustis canaliculatis longis ab ortu flaccidis. Ait. Kew. 1. p. 419. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. suaveolentes. ¶

28. *latifolia*, spatha multiflora, flor. pedicellatis basi tubulosus, fol. oblongo-lanceolatis. L'Herit. sert. angl. 14. Rheet. 11. t. 39. Rudb. f. 12. Hab. in India arenosis. ¶

29. *avrea*, spatha multiflora, cor. basi tubulosus sexpartitis, laciniis linearibus undulatis, genitalibus declinatis, cor. longioribus. L'Herit. angl. p. 14. Les Liliacées. t. 61. Jacq. Schoenb. 1. p. 38. t. 73. Hab. in China. Fol. linearia. Cor. lutea. Limbi laciniæ linearilanceolatae apice incrassatae subuncinatae. Ait. ¶

30. *orientalis*, spatha multiflora, flor. pedicellatis sexpartitis pedunculis sesquipedioribus irregularibus, germinibus cuneiformibus angulatis. Ait. Kew. 1. p. 420. Jacq. Schoenb. 1. p. 39. t. 74. Moris. s. 4.

t. 10. f. 35. Brunswigia. Heist. monog. c. 69. Hab. ad Cap. L. spei. Fol. linguiformia. ¶

31. *sarniensis*, spatha multiflora, cor. revolutis, genitalibus erectis. L. Ehret. select. t. 9. f. 3.

β. *capensis* (*sarniensis*), spatha multiflora, cor. patentissimis apice reflexis, genitalibus rectiusculis cor. longioribus, fol. ensiformi-linearibus. Jacq. Schoenb. 1. p. 34. t. 66. Hab. in Japonia, nunc in Sarnia insula Angliae, ubi per naufragium deportata. β. ad Cap. b. spei.

32. *Fothergillii*, spatha multiflora, cor. hexapetala revoluta, general. erectis, fol. linearibus subcanaliculatis obtusis glaucis. Andrew. t. 163. Hab. in China.

Obs. Ob cor. radiatum et stam. recta cum priore distinctum efficere meretur genus.

33. *marginata*, petalis oblongis revolutis, genitalibus rectiusculis cor. longioribus, fol. lingulatis humi adpressis cartilagineo-marginatis. Willd. p. 59. Jacq. Schoenb. 1. p. 34. t. 65. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. Haemanthi coccinei. W. ¶

34. *curvifolia*, petalis oblongis undulatis revolutis, genitalibus cor. longioribus rectiusculis, fol. strictis linearis-ensiformibus canaliculatis. Willd. Jacq. l. c. t. p. 33. t. 64. Ad Cap. b. spei. ¶

35. *undulata*, petalis linearibus canaliculatis undulatis, genitalibus deflexis cor. brevioribus, stigmate obsoleto. Ait. 1. p. 420. Jacq. hort. 3. p. 11. t. 13. ¶

36. *radiata*, petalis lanceolatis undulatis erectis, genitalibus deflexis divergentibus cor. duplo longioribus, stigmate obsoleto. Andrew. t. 95. Hab. in China. Facie Gloriosae; a: stigm. integrum.

37. *humilis*, spathatri-seu quadriflora, petalis lanceolatis subringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato, genitalibus ascendentibus petal. brevioribus, fol. linearibus obtusis glabris nudis pinnatis. Willd. p. 60. Jacq. Schoenb. 1. p. 36. t. 63.

38. *flexuosa*, spatha multiflora, petalis lanceolatis subringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato, genitalibus ascendentibus petalis brevioribus, fol. linearibus obtusiusculis concavis pustulato-punctatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spei.

39. *Radula*, spatha multiflora, petalis patentissimis, infimo divaricato, fol. facie ad oras muricato-asperis prostratis. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 35. t. 68.

40. *striata*, spatha multiflora, cor. campanulatis aequalibus apice reflexis, fol.

suboratis, dorso striatis. Jacq. hort. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

41. *crispa*, spatha pauciflora, petalis patentissimis crispis, fol. linearibus angustissimis. Jacq. Schoenb. 1. p. 37. t. 72. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. minutissimi. ¶

42. *stellaris*, spatha multiflora, cor. patentissimis planis, tubo brevissimo, staminibus divaricatis cor. brevioribus, stylo recto, fol. linearibus erectis. Willd. p. 61. A. spatha multiflora, petalis patentissimis, tribus alternis infra medium barbatis, fol. linearib. erectis. Jacq. Schoenb. 1. p. 37. t. 71. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

43. *caspia*, spatha multiflora, cor. campanulatis, tubo brevissimo, filam. erectis cor. longioribus, fol. lanceolatis undulatis. Willd. p. 62. Crinum caspium. Pall. itin. 2. app. n<sup>o</sup>. 105. t. O. ¶

Obs. Genus hocce speciosas complectens species, quoad corollae formam, divisionem et staminum directionem forte dividi debet.

787. *MILLA*. Cor. infundibuliformis, limbo sexpartito plano. *Anthere* fauci insertae. *Germen* pedicellatum. *Caps.* supera.

1. *biflora*. Car. ic. a. p. 76. t. 196. Millea. Willd. Sp. II. p. 62. Fol. linearia lata. Cor. magna alba Sisyrinchii.

788. *BULBOCODIUM*. Cor. infundibuliformis hexapetala: unguibus angustis staminiferis. *Caps.* supera.

1. *vernum*. Retz. obs. 2. t. 1. Rudb. elys. 2. p. 128. f. 2. Hab. in Hispania, Helv., Gall. et Russia. ¶

789. *SOWERBEA*. Cor. infera, hexapetala. *Filam.* tria biantherifera, tribus sterilibus interstinctis.

1. *juncea*. Smith. in Act. Soc. Lin. v. 2. Hab. in Australasia. Herba inodora, juncea, radice fibrosa. Scapus nudus umbellifer.

790. *ALLIUM*. Cor. 6-partita, patens. *Spatha* multiflora. *Umbella* congesta. *Caps.* supera. (Flor. capitati aut umbellati.)

\* *Fol. caulina plana. Umbella capsulifera.*

a. *Ampeloprasum*, caule planifolio um-

bellifero, umbella globosa staminib. tricuspidatis, petalis carina scabris. Lin. Willd. Sp. II. p. 63. Smith. brit. 1. p. 335. Rudb. elys. 2. p. 151. f. 1. Hab. in Oriente et in insula Holms Angliae. Fol. unc. 1. fere lata margine denticulato-scabra. Sm. ¶

2. *Porrum*, caule planifolio umbellifero, staminib. tricuspidatis, radice tunicata, fol. basi vaginantib. Blackw. t. 421. Hab. in vineis Helvetiae et in hortis colitur. ¶

3. *lineare*, caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis cor. duplo longioribus. L. dict. n<sup>o</sup>. 4. Gmel. sibir. 1. p. 56. t. 13 et 14. f. 1. Hab. in Siberia. ¶

4. *suaveolens*, scapo nudo teretiusculo, fol. linearibus carinatis, umb. subrotunda, staminib. subulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 364. Collect. 2. p. 305. Hab. in Austria. ¶

5. *deflexum*, caule planifolio umbellifero, staminib. tricuspidatis, longitudine corollae, fol. angusto-linearibus, scapo declinato. Willd. p. 65. Hab. . . ¶

6. *rotundum*, caule planifolio umbellifero, staminib. tricuspidatis, umb. subglobosa, flor. lateralibus nutantibus. Hab. in Europa austr. ¶

7. *Victorialis*, caule planifolio, umbellifero, umb. rotundata, staminib. lanceolatis corolla longioribus, fol. ellipticis. L. Blackw. t. 544. Hab. in alpinis. Flor. flavescent.

8. *subhirsutum*, caule planifolio umbellifero, fol. inferioribus hirsutis, staminib. subulatis. L. fol. radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. Hall. all. 18. Hab. in Africa, Italia, Hispania, Oriente. ¶

9. *magicum*, caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, staminib. simplicibus. L. Sauv. monsp. 18. Hab. . . Fol. radicalia canaliculata ampla. ¶

10. *obliquum*, caule planifolio umbellifero, staminib. filiformibus flore triplo longioribus, fol. obliquis. L. Jacq. ic. rar. 1. t. 62. Misc. 2. p. 308. Gmel. sibir. 1. p. 49. t. 9. Hab. in Siberia. Umb. globosa, primo nutans. ¶

11. *ramosum*, caule subplanifolio umbellifero, staminib. subulatis longioribus, umb. globoso, fol. linearibus subconvexis. L. Gmel. sib. 1. p. 52. t. 11. f. 1. Cum priore. E medio caule ex ala, folio opposito, ramus nudus, longitudine caulis. L.

12. *tataricum*, caule planifolio umbellifero, foliis semicyliadicis, staminibus

simplicibus, umb. plana. Lin. suppl. p. 166. Hab. in Sibiria. Caul. teres, semipedalis.  $\overline{\text{T}}$

13. *roseum*, caule planifolio umbellifero, umb. fastigiata, petalis emarginatis, staminibus brevissimis simplicibus. Desf. Atl. 1. p. 287. Magn. monsp. 11. t. 10. Rudb. elys. 2. p. 166. f. 17. Hab. Monspelii, Pedemonti in vineis et in arvis Algeriae. Flor. magni rubri.  $\overline{\text{T}}$

14. *graminifolium*, caul. umbellifero, umb. subglobosa, stam. simplicibus cor. longioribus, fol. angusto-linearibus basi vaginantibus. Hab. prope Dax (Départ. des Landes) Thore. Caul. ultra pedalis. Cor. campanulata: carina rubra. Cum sequente non confundi debet.

15. *appendiculatum*, caul. umbellifero, stam. subulatis, petalis internis basi auriculatis, fol. angusto-linearibus subcarinatis. Hab. in Pyrenaeis supra saxa. Flor. incolori albi. Ramond.

\* \* *Fol. caulina plana. Umbella bulbifera.*

16. *sativum*, caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminib. tricuspidatis. L. Moris. s. 4. t. 15. f. 4. Hab. in Sicilia.  $\overline{\text{T}}$

17. *Scorodoprasum*, caule planifolio bulbifero, fol. crenulatis: vaginis ancipitibus, staminib. tricuspidatis. L. Hab. in Oelandia, Danis, Pannonia, Germania.  $\overline{\text{T}}$

18. *arenarium*, caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, spatha mucica, staminibus tricuspidatis. L. Flor. dan. t. 290. Rupp. Flor. germ. ed. Hall. 15. t. 2. f. 2. Hab. in Thuringia, Helvetia, Scania. Caul. ante anthesin cernuus. Petal. carina scabriuscula.  $\overline{\text{T}}$

19. *carinatum*, caule planifolio umbellifero, staminibus subulatis, spatha acuta longissima. A. umbella bulbifera, vagina bicorni, fol. carinatis. Hall. all. 27. t. 2. f. 2. Lob. ic. 166. Hab. in Germania, Helvetia, Carniola, Italia longissima.  $\overline{\text{T}}$

\* \* \* *Fol. caulina teretia. Umbella capsulifera.*

20. *Sphaerocephalon*, caule teretifolio umbellifero, fol. semiteretibus, staminibus tricuspidatis corolla longioribus. Mich. N. gen. 25. t. 24. f. 2. Hab. in Italia, Sibiria, Helvetia, Germania.  $\overline{\text{T}}$

21. *convivatum*, caul. teretifolio, spatha brevissima abrupte terminata. capit. sphaerico bulbis confertissimis. Thall. Flor. Paris. p. 167. Hab. in sepiis et dumetis circa Peridos. Flor. purpurascens. A. *vincale* affine.

22. *parviflorum*, caule subteretifolio umbellifero, umb. globosa, staminib. simplicibus cor. longioribus, spatha subulata. L. Hab. in Europa australi. Facie A. *sphaerocephali*.  $\overline{\text{T}}$

23. *Pallasii*, caule subteretifolio umbellifero difformi, staminib. simplicibus corollam aequantibus, stylo brevissimo. Murr. Com. 1. goett. 6. 1775. p. 32. t. 3. Hab. in Sibiria. Cor. exigua purpurea.  $\overline{\text{T}}$

24. *descendens*, caule subteretifolio umbellifero, pedunc. exterioribus brevioribus, staminib. tricuspidatis. L. Hall. all. n. 11. t. 2. f. 1. Rudb. elys. 2. p. 160. f. 20. Hab. in Helvetia.  $\overline{\text{T}}$

25. *moschatum*, caule teretifolio umbellifero, umb. fastigiata subsexflora, petalis acutis, staminib. simplicibus, fol. setaceis. L. Baub. prod. 28. t. 28. Rudb. elys. 2. p. 166. Hab. in Galloprovinciae, Narbonae, Hispaniae apricis elevatis.

26. *farum*, caule teretifolio umbellifero, flor. pendulis, petalis ovatis, staminibus corolla longioribus. L. Jacq. austr. t. 141. Rudb. elys. 2. p. 157. f. 6. Hab. prope Fontainebleau, Monspelii, in Austria. Caul. foliosus, rore glauco. Stam. simplicia.  $\overline{\text{T}}$

27. *pallens*, caule subteretifolio umbellifero, flor. pendulis truncatis, staminibus simplicibus cor. aequantibus. Gouan. illustr. 24. Colum. ephr. 2. p. 6. t. 7. f. 2. Hab. in Italia, Hispania, Monspelii, Pannonia. Cor. campanulata, truncata, alba. Stylus via ulius.

28. *paniculatum*, caule subteretifolio umbellifero, pedunc. capillaribus effusis, staminibus simplicibus, spatha longissima. L. Scop. carn. ed. 2. n. 3. 8. A. fol. teretibus, vagina bicorni, umbella pendula suave purpurea. Hall. opus. n. 25. cum ic. Hab. in Sibiria, Austria, Italia, Helvetia, Carniola, Oriente.  $\overline{\text{T}}$

29. *odoratissimum*, bulbo unicato poroso, fol. linearibus subulatis crassiusculis, spatha brevi squadrifida, flor. umbellatis non bulbiferis. Desf. Atl. 1. p. 289. t. 83. Hab. in arenis deserti prope Olsam et Tozer. Flor. hyeme.  $\overline{\text{T}}$

30. *vincale*, caule teretifolio, bulbifero, staminib. tricuspidatis. L. A. radice multiplici, fol. stylis, capite sphaerico, bulbifero, staminibus alterniter trifidis. Hall. herb. n. 1221. Hab. in Germania, Helvetia et Anglia in pascuis et inter segetes. Spatha decidua. Stam. setis diaphis longis, extra florem eminentibus. L.  $\overline{\text{T}}$

31. *oleraceum*, caule teretifolio bulbifero, fol. scabris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus simplicibus L. Hall. all. n°. 26. f. 2. Hab. in Suecia, Germania, Helvetia, Ingrida. Spatheae foliola basi ventricosa.  $\overline{\text{T}}$

\*\*\* *Folia radicalia. Scapus nudus.*

32. *nutans*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus planis, staminib. tricuspidatis. L. Porrum scapo antequam floruerit, nutante. Gmel. sibir. 1. p. 55. t. 12. Hab. in Sibiria. Stam. dentes obliterantur. Var. aetate et loco, ut vix dignoscatur. L.  $\overline{\text{T}}$

33. *ascenonicum*, scapo nudo tereti, fol. subulatis, umb. globosa, staminibus tricuspidatis. L. Moris. s. 4. t. 14. f. 3. Hab. in Palaestina. Statura fere A. Schoenoprasii. Petala ovato-lanceolata, caerulea. Stam. alterna latissima.

34. *senescens*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus subtus convexis laevibus, umb. subrotunda, staminib. subulatis. Lin. Gmel. sibir. 1. p. 53. t. 11. f. 2. Hab. in Sibiria, Silicia, Silesia, Helvetia.  $\overline{\text{T}}$

35. *illyricum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus lanceolatis planis, umb. fastigiata, staminib. subulatis. Willd. p. 76. Jacq. ic. 2. t. 365. Collect. 3. p. 273. Hab. in vineis et olivetis Austriae littoralis.  $\overline{\text{T}}$

36. *odorum*, scapo nudo teretiusculo, fol. linearibus canaliculatis subtus angulatis, umb. fastigiata. L. Hab. in Europa australi. Cor. albae, odoratae. Germen punctis excavatis.  $\overline{\text{T}}$

37. *inodorum*, scapo nudo subtriquetro, fol. linearibus planis subtus carinatis, umb. fastigiata florifera, staminib. simplicib. Hab. in Carolina. Simile sequentii, sed duplo major. W.  $\overline{\text{T}}$

38. *angulosum*, scapo nudo ancipiti, fol. linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umb. fastigiata. L. Jacq. aust. 5. p. 11. t. 423. Gmel. sibir. 1. p. 58. t. 14. f. 2. Rauh. hist. 2. p. 564. t. 764. Hab. in Sibiriae, Germaniae humidiusculis et montosis.  $\overline{\text{T}}$

39. *fragrans*, scapo tereti, fol. linearib. carinatis obtusis contortis, pedunc. nudis, staminib. planis. Vent. Hort. Cels. p. 26. t. 26. Hab. in Africa. Umb. laxa. Flor. albi, striis purpureis, magni.

40. *striatum*, scapo nudo subtriquetro fol. linearibus subtus striato-sulcatis brevior, umb. fastigiata, petalis obtusis, staminibus simplicibus. Willd. p. 77. Jacq.

ic. 2. t. 366. Collect. suppl. 51. Hab. ad Cap. L. spec.  $\overline{\text{T}}$

41. *narcissiflorum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus subulatis longiore, umb. fastigiata, petalis mucronatis, staminibus simplicibus. Willd. A. caule nudo tereti, umbella terminali inclinata, petalis lanceolatis, staminibus simplicibus brevioribus. Villars. delph. 2. p. 259. t. 6. Hab. in Gallicae australis montibus.  $\overline{\text{T}}$

42. *pedemontanum*, scapo subtetragono, fol. linearibus obtusis, umb. pauciflora. Willd. A. nigrum. Allion pedem. n°. 1881. t. 25. f. 1. Hab. in alpinis Pedemontanis.  $\overline{\text{T}}$

Obs. Ab A. nigro distinctum: fol. linearibus, umb. paucifloris, odore quum A. nigrum plane inodorum. Willd.

43. *nigrum*, scapo nudo tereti, fol. lanceolatis, umb. hemisphaerica, petalis patentibus, staminibus simplicibus. Willd. p. 78. Retz. obs. 1. p. 15. et 6. p. 27. A. multibulbosum. Jacq. aust. 1. p. 9. t. 10. A. monspesulanum. Gouan. illust. 24. t. 16. Desf. Atl. 1. Hab. Algiriae et in Galloprovincia.  $\overline{\text{T}}$

44. *canadense*, scapo nudo tereti, fol. linearibus, capitulo bulbifero. L. Kalm. it. 3. p. 79. Cfr. Michaux. Flor. 1. p. 194. Hab. in Canada.  $\overline{\text{T}}$

45. *mutabile*, scapo tereti, fol. superne subsetaceo-convolutis flaccidis, umb. l. submultiflora, stam. simplicibus. Mich. l. c. p. 195. Hab. in Georgia meridionali. Interdum capitulum totum bulbiferum. M.

46. *ursinum*, scapo nudo triquetra, fol. ovato-lanceolatis petiolatis, umb. f. stigmata. L. Flor. lan. t. 757. Hab. in nemorosis et pratis humidis. Verc.

47. *clusianum*, scapo nudo tereti, fol. linearibus planis ciliatis, umb. pauciflora, petalis obovatis concavis. Retz. Willd. p. 79. Moly Minas. Clus. hist. 1. p. 192. fig. Hab. in Europa australi. Bulbus pisi magnitudine, ovato-turbinate. Cor. candida. Stam. simplicissima.  $\overline{\text{T}}$

48. *triquetrum*, scapo nudo, foliisque triquetris, staminib. simplicibus. D. Rudh. elyx. 2. p. 156. f. 16. Desf. Atl. 1. p. 288. Hab. in Hispania, circa Narionem, et in Algeria. Fol. Sparganii, valde carinata. Cor. alba.  $\overline{\text{T}}$

49. *Cepa*, scapo nudo inferne ventricosus longiore fol. teretibus. L. Hab. ...  $\overline{\text{T}}$

50. *Moly*, scapo nudo subcylindrico, fol. lanceolatis sessilibus, umb. fastigiata. L. Moly flavo flore. Swert. flor. 1. t. 60. f. 2.

Hab. in Hungaria, Baldo, Monspelii, Pyrenaeis.  $\overline{\text{L}}$

51. *tricoecum*, scapo nudo semitereti, fol. lanceolato-oblongis planis glabris, umb. globosa, seminibus solitariis. Ait. Kew. 1. p. 428. Hab. in America boreali.  $\overline{\text{L}}$

52. *fistulosum*, scapo nudo adaequante folia teretia ventricosa. L.  $\beta$ ? A. altaicum. Pall. itin. 2. app. n $^{\circ}$ . 108. Hab. ...  $\beta$ . in Sibiria.  $\overline{\text{L}}$

53. *Schoenoprasum*, scapo nudo adaequante folia teretia subulato-filiformia. L. A. radice multiplici, fol. radicalibus teretibus, scapi longitudine, flor. umbellatis cylindricis. Hall. helv. n $^{\circ}$ . 1226. Flor. dan. t. 971. Hab. in alpestribus Sibiriae, Oelandiae.  $\overline{\text{L}}$

54. *sibiricum*, scapo subnudo tereti, fol. semiteretibus, staminibus subulatis, petal. lanceolatis acutis. Willd. p. 82. Murr. Comment. goett. 6. 1775. p. 33. t. 4. A. roseum. Krock. Siles. t. 43. Buxb. cent. t. 45. Hab. in Sibiria et in montibus Silesiae.  $\overline{\text{L}}$

55. *stellerianum*, scapo nudo tereti, fol. semicylindricis, umb. densis, staminibus subulatis cor. longioribus. Willd. Gmel. sib. 1. p. 63. t. 16. f. 1. 2. Hab. in Sibiria ad Jenicam fluvium.  $\overline{\text{L}}$

56. *capillare*, scapo nudo tereti, fol. capillaceis, umb. pauciflora, petalis lanceolatis acutis. Willd. Cavan. ic. 3. p. 4. t. 206. f. 1. Hab. in regno Valentino.  $\overline{\text{L}}$

57. *setaceum*, scapo nudo tereti, fol. setaceo-subulatis ciliato-serratis, petal. ovato-lanceolatis apice emarginatis. Plant. Hongar. p. 70. t. 68. Hab. in lapidosis apricis in Hungaria. Valvul. spathae in mucronem productae.

58. *tenuissimum*, scapo nudo tereti, fol. lineari-subulatis, umbella pauciflora, petalis subrotundo-ovatis obtusis. Willd. Gmel. sibir. 1. p. 61. t. 15. f. 2. 3. Hab. in Sibiria.

59. *gracile*, scapo nudo tereti longissimo, fol. linearibus canaliculatis, staminibus subulatis basi connatis. Ait. Kew. 1. p. 429. Hab. in Jamaica. Fol. narcissina. Petala inferne cum staminibus connata in tubum viridem. A.

60. *Chamae-Moly*, scapo nudo subnullo, capsulis cernuis, fol. planis ciliatis. L. Cav. ic. 3. p. 4. t. 207. f. 1. Moris. s. 4. t. 16. f. 6. Desf. Atl. 1. p. 288. Hab. in Italia, Hispania et Algeria.  $\overline{\text{L}}$

791. LILIUM. Cor. 6-petala. campanulata: linea longitudinali

nectarifera, laciniis saepius reflexis. Caps. valvulis pilo cancellato connexis.

\* *Cor. campanulatis ereosis.*

1. *cordifolium*, fol. cordatis petiolatis. Willd. Sp. pl. 11. t. p. 84. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 332. Hemerocallis cordata. Thunb. Flor. jap. 143. Kaempf. t. 76. Hab. in Japonia.  $\overline{\text{L}}$  +

2. *longiflorum*, fol. sparsis lanceolatis, cor. tubulato-campanulatis, caule glabro. Thunb. l. c. p. 333. L. candidum. Thunb. jap. p. 133. Hab. in Japonia prope Nagasaki et Miaco. Capl. teres nodulosus. Differt a sequente: fol. basi latioribus, cor. triplo longiori cylindricis. A. L. bulbifero cor. maxima alba. Th. Conf. Andrew Rep. p. 194.

3. *candidum*, fol. lanceolatis sparsis basi attenuatis, cor. campanulatis intus glabris. Curt. mag. t. 278. Knorr. del. 1. tab. L. Blackw. t. 11.  $\beta$ . *peregrinum*, fol. sparsis, cor. campanulatis cernuis, petalis basi angustioribus. Mill. dict. n $^{\circ}$ . 2. Hab. sponte in Palestina, Syria, Gades, Helvetia. Odor gratus, quod non in caeteris.

4. *japonicum*, fol. sparsis lanceolatis, cor. cernuis subcampanulatis. Thunb. jap. 133. Hab. in Japonia. Flor. terminales reflexo-cernui. Cor. campanulata albidula palmaris.

5. *lanceifolium*, fol. sparsis lanceolatis, cor. erectis subcampanulatis. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 333. L. bulbiferum. Thunb. Flor. jap. p. 134. Hab. in Japonia. Caul. angulatus hirsutus. Cor. parvae unguiculatae albae. Axillae foliorum superiorum bulbiferae. Th.

6. *bulbiferum*, fol. sparsis trinerviis, cor. campanulatis erectis: intus scabris. Jacq. Flor. austr. t. 226. Hab. in Europa australiore.  $\overline{\text{L}}$

$\beta$ . *croceum*, fol. sparsis 5-nerviis, pedunc. simplicibus, bulbis o, petal. interne macul. nigris variegatis. Col. in hortis. Conf. Vill. 2. p. 275. An huc potius Jacq. Fl. austr. t. 226?

\*\* *Cor. revolatis.*

7. *Catesbaei*, fol. sparsis lineari-lanceolatis, caule unifloro, cor. erecta, pet. longe unguiculatis margine undulatis, apice reflexis. Willd. l. c. p. 86. Walt. carol. 123. Michaux. 1. p. 997. L. spectabile. Salisb. Icon. rar. 5. t. 5. L. carolinianum. Lam. enc. 3. p. 514. Catesb. t. 58. Hab. in Carolinae humidiusculis.  $\overline{\text{L}}$

8. *speciosum*, fol. sparsis ovatis petiolatis; caule ramoso, ramis unifloris, flore

*cernuus*, cor. revolutis intus papilloso-dentatis. Willd. Thunb. Act. Lin. Lond. 2. p. 332. Kaeimpf. t. 47. Hab. in Japonia.  $\overline{\text{T}}$

9. *pomponium*, fol. sparsis lineari-subulatis, flor. reflexis, cor. revolutis intus papilloso-dentatis. Willd. p. 87. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 5. et ic. t. 65. f. 2. Knorr. del. 1. t. 4. l. fol. sparsis lineari-subulatis, apice caulis nudiusculo. Lam. enc. 3. p. 514.

10. *angustifolium*, fol. linearibus sparsis, pedunc. longissimis. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 6. Hab. in Pyrenaeis, Sibiria.  $\overline{\text{T}}$

10. *chalconicum*, fol. lineari-lanceolatis sparsis, flor. reflexis, cor. revolutis intus punctatis. Willd. l. fol. sparsis lanceolatis, caule usque ad apicem folioso. Lam. l. c. Hab. in Persia, Corniola.  $\overline{\text{T}}$

11. *superbum*, fol. imis verticillatis, caeteris sparsis, flor. racemoso-pyramidalis reflexis, cor. revolutis. Lam. enc. 3. p. 515. Trew-Ehret. 2. t. 11. Catesb. t. 56. Hab. in America septentrionali.  $\overline{\text{T}}$

12. *Martagon*, fol. verticillatis ovato-lanceolatis, flor. reflexis, cor. revolutis. Willd. p. 88. Jacq. austr. t. 351. Knorr. del. 1. t. 6. f. 1. flor. reflexis, alterum hirsutum. Bauh. pin. 87. Hab. in sylv. Vere.  $\overline{\text{T}}$

13. *carolinianum*, glaberrimum, fol. enerviis subverticillatis obovalibus, ramis floriferis crassis ternatis, cor. reflexis maculosis. Michaux. Flor. 1. p. 197. In herbosis humidis Car. inferioris.

14. *canadense*, fol. verticillatis linearibus, flor. reflexis, cor. revolutis campanulatis. Willd. Michaux. 1. p. 197. Berr. rar. 778. t. 125. Moris. s. 4. t. 20. f. 9. Rudb. clys. 2. p. 177. f. 5. Catesb. t. 11. Hab. in Canada, et montib. Alleghanis Carolinae et Virginiae. Pedunc. terni. Cor. basi flavae, punctis atris.

15. *maculatum*, fol. sparsis et verticillatis lanceolatis glabris, cor. campanulatis intus maculatis, limbo reflexo. Thunb. in Act. Lin. Lond. 2. p. 334. l. canadense. Thunb. jap. 135. Hab. in Japonia. Cor. campanulata, limbo reflexo, incarnata, intus maculis purpureis.  $\overline{\text{T}}$

16. *camschatcense*, fol. verticillatis, flore erecto, cor. campanulata, petalis sessilibus. L. Hab. in Canada, Camschatca.  $\overline{\text{T}}$

17. *philadelphicum*, fol. verticillatis, flor. erectis, cor. campanulata, petalis unguiculatis. L. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 13. et ic. t. 165. f. 1. Hab. in Canada.  $\overline{\text{T}}$  +

792. *FRITILLARIA*. Cor. 6-petala, campanulata, supra nuges cavitate nectarifera. Stam. longitudine corollae. Sem. plana.

\* *Caps. trigonis. Bulbo uno super alterum.*

1. *persica*, racemo nudiusculo. foliis obliquis. L. Les Liliacées. t. Hab. in Persia? Racem. longus. Flor. violacei, penduli.

2. *verticillata*, fol. verticillatis lineari-lanceolatis, caule unifloro. Willd. p. 97. Hab. in Sibiria. Fol. exsiccata apice oripantur ac si cirrho essent instructa.  $\overline{\text{T}}$

3. *pyrenaica*, fol. infimis oppositis, flor. nonnullis folio interjectis. L. Hab. in Pyrenaeis, Russia.  $\overline{\text{T}}$

4. *Meleagris*, fol. alternis linearibus canaliculatis, caule unifloro. Willd. Flor. Dan. t. 97a. Hab. in pratis Europa australioris.

Obs. Var. flor. albis (*praecox*), luteis maximis (*italica*) et atropurpureis (*serotina*.)

5. *latifolia*, fol. alternis oblongo-lanceolatis planis, caule unifloro. Willd. p. 92. Hab. ... Colitur in hortis. Fol. viridia, stigm. obtusa canaliculata.  $\overline{\text{T}}$

6. *plantaginea*, fol. radicalib. ovalibus nervosis petiolatis, caul. lanceolatis, caul. 1-floro. Lam. enc. 2. p. 550. Habit. in Oriente. +

\* \* *Ptilium*. L. (*Imperialis*. Juss.) Scapus apice foliosus. Caps. angulis 6-actis. Flor. et Sem. Fritillariae. Rad. tuberosa, basi fibrosa.

7. *imperialis*, flor. sub coma foliosa cernuis, fol. lineari-lanceolatis integerrimis. Curt. mag. t. 194. Ptilium. Lin. Hort. Cliff. p. 119. Frit. racemo comoso inferne nudo. Lin. Willd. p. 50. Imperialis coronata. Le Bot. cultiv. 1. p. 447. Hab. in Oriente, Persia. Var. quoad color. floris et fol. albo-variegata.

10. *lutea*, major, flor. luteis patentiorib. interne non striatis. Lam. enc. 2. p. 549. Tournef. 372.

793. *EUCOMIS*. Cor. infera, 6-partita, persistens, patens. Fil. basi in nectarium aduatum connata. Caps. 3-focularis. Sem.

Z 4

ovata. (Scapus coma foliosa distincta.)

1. *nana*, scapo clavato, fol. lato-lanceolatis acutis. Ait. Kew. 1. p. 43a. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 47. t. 9a. Coll. 4. p. 213. Fritillaria *nana*. L. Hab. ad Cap. b. spei, cum *sequentibus*.

2. *bifolia*, scapo clavato, fol. ellipticis acutis geminis humi adpressis. Willd. Sp. pl. p. 9a. Jacq. ic. 2. t. 449. Collect. 4. p. 215.

3. *regia*, scapo cylindrico, fol. linguiformibus obtusis humi adpressis. Ait. Kew. 1. p. 433. Frit. *regia*. Dill. elth. t. 9a. f. 109. Basilea coronata. Lam. enc. 1. p. 38a.

4. *undulata*, scapo cylindrico, foliis ovato-oblongis undulatis patentibus, comae fol. longitudine fere racemi. Ait. Kew. 1. p. 433. Ornithogalum *undulatum*. Thunb. prod. 6a.

5. *punctata*, scapo cylindrico, fol. oblongo-lanceolatis canaliculatis patentibus, comae fol. brevibus, racemis longissimis. Ait. Kew. 1. p. 433. L'Herit. sert. angl. 18. t. 18. Asphodelus *comosus*. Houttuyn. t. 83. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

764. UVULARIA. Cor. 6-petala, erecta. Nect. fovea baseos petali Fil. brevissima. (Flor. solitarii axillares.)

\* *Stylus* setaceus. Stigm. 3, longa. Caps. compresso-trigona, 3-locularis. Sem. ad hilum atillata.

1. *hirta*, fol. amplexicaulibus hirtis, caule villosa. Thunb. Fl. jap. p. 36. Habit. in Japonia. Caul. pilis longis hirsutus. Flor. ignoti. †

2. *lanceolata*, fol. perfoliatis ovato-lanceolatis acuminatis. Ait. Kew. 1. p. 434. Corn. canad. t. 41. Hab. in America boreali. ¶

3. *perfoliata*, fol. perfoliatis ovatis, caps. truncata. Michaux. p. 199. Moris. 2. 13. t. 4. f. 12. Hab. in Virginia, Canada. ¶

4. *puberula*, fol. utrinque concoloribus ovalibus, basi rotundatis subamplexicaulibus, caps. sessilibus ovatis. Michaux. Flor. 1. p. 197. Hab. in Carolinae montib. altis.

5. *sessilifolia*, fol. sessilibus lanceolato-ovalibus subtus glaucis, caps. stipitata ovata. Michaux. l. c. Hab. in Canada. ¶

6. *cirrhosa*, foliis sessilibus cirrhosis. Thunb. jap. 136. Hab. in Japonia. ¶

\* *Streptopus*. Cor. 6-petala subcampanulata. Stigmata brevissima. Bacca subglobosa, laevigata, carthacea. Sem. hilo nudo. Michaux.

7. *amplexifolia* (distorta), fol. amplexicaulibus, pedicel. solitariis, medio distorto - geniculatis. Michaux. Flor. 1. p. 200. (Streptopus distortus.) Uvularia. Lin. Willd. Sp. 11. p. 94. n°. 1. Moris. 2. 13. t. 4. f. 11. Hab. in Europae montibus et in Canadæ sylv. umbrosis. ¶

8. *rosea*, fol. amplexicaulibus serrulato-ciliolatis, anther. brevibus bicornibus. Michaux. p. 201. t. 18. sub Streptopo. Hab. in Carolinae et Canadæ montibus. Flor. rosei.

9. *lanuginosa*, incana, fol. sessilibus subcordatis, pedicell. geminatis. Michaux. l. c. Hab. in altis montibus Carol. meridionalis. Flor. majusculi, virescentes.

795. GLORIOSA. Cor. 6-petala, undulata, reflexa. Stylus obliquus, apice trifidus.

1. *superba*, fol. cirriferis. L. Andrew. t. 129. Methonica. Herm. lugd. 688. t. 689. Les Liliacées, t. 26. Habit. in Malabar. Petala lanceolata, longa, lateribus undulata, coccinea, prope basin reflexa. Genitalia reflexa. ¶

2. *simplex*, fol. acuminatis. L. Hab. in Senegal. Fol. non cirrhosa. Flor. caerulei.

796. ERYTHRONIUM. Cor. 6-petala, campanulata: Nectario tuberculis 2, petalorum alternorum basi adnatis.

1. *Dens canis*. L. Gmel. sib. 1. p. 39a. t. 7. F. fol. ovato-oblongis glabris nigromaculatis. Gron. virg. p. 151. Hab. in Europa australi, Sibiria et America septentrionali. ¶

797. TULIPA. Cor. 6-petala, campanulata. Stylus nullus.

1. *sylvestris*, caule unifloro glabro, flore (unicolori) subnante, petalis acutis apice barbatis, fol. lanceolatis. Willd. 11. p. 95.

β? *turcica*, flore erecto petalis lanceolato-acuminatis, fol. lanceolato-linearibus. Roth. catal. 1. p. 45. Willd. l. c. Hab. in pratis Filam. basi villosa. Var. flor. pleno. ¶

2. *snaveolens*, parvula, caule unifloro pubescente, flore erecto, petalis obtusis glabris, fol. ovato-lanceolatis. Willd. p. 97. Roth. catal. bot. 1. p. 45. Lobel. ic. 127.



Hab. in Europa australi. Hyeme aut primo vere ab anthophylis in olis colitur. Cor. flavo-coccinea variegata.  $\overline{\text{T}}$

3. *Celsiana*, caul. 1-floro glabro, flor. erecto (luteo), fol. lanceolato-linearibus canaliculatis, petiol. glabris. Les Liliacées. t. 38. Hab. in Oriente? Magnitudine prioris. Colitur in Horto Celsii.

4. *Clusiana*, caul. 1-floro glabro, flor. erecto (albo), petal. foliisque oblongo-acutis glabris 1 infimo vaginante. Les Liliacées. t. 37. Tulipa persica praecox. Clus. posth. p. 9. ic. In Persia? Petal. 3 interiora, basi rubescentia: unguiculo violaceo.

5. *Gesneriana*, caule uniflora glabro, flore (versicolore) erecto, petalis obtusis glabris, fol. ovato-lanceolatis. Willd. p. 97. Hab. sponte in Cappadocia et in Russia.  $\overline{\text{T}}$

6. *biflora*, floribus erectis planiusculis, caule diphylli bi - s. trifloro, fol. linearisubulatis. Linn. suppl. 196. Pall. it. 3. app. n.º 86. t. D. f. 3. Hab. ad Wolam locis desertis maxime argillosis, imo saluginosis. Magnitudine Ornithog. lutei. Petala tria exteriora lanceolata dilute cyanea s. virescentia, interiora alba basi macula magna fulva. L.

7. *Breyniana*, caule multiflora polyphylo, foliis linearibus. L. Breyn. cent. t. 36. Rudb. clys. f. 11. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

798. *ALBUCA*. Cor. 6-petala, interioribus conniventibus, exterioribus patulis, (dorso saepius viridi-coloratis). *Stylus* triquet. *Sem.* plana.

\* *Staminibus tribus fertilibus.*

1. *altissima*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, fol. subulatis canaliculato-convolutis. Dryander, in Act. holm. 1784. p. 202. Jacq. ic. rar. 1. t. 36. Coll. 2. p. 264. Hab. ad Cap. b. spei, cum cæteris speciebus.  $\overline{\text{T}}$

2. *major*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, fol. lineari-lanceolatis, planiusculis. Dryand. l. c. p. 263. Jacq. ic. rar. 2. t. 443. Collect. suppl. 96. Les Liliacées. t. 69. Ornithogalum canadense. L. Sp. pl. 1. p. 368. Moris. s. 4. t. 24. f. 7. Petala exteriora flava, apice et basi macula viridi notata, flavo-marginata, interiora albido-rubrescentia.  $\overline{\text{T}}$

3. *minor*, petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis lineari-subulatis canaliculatis. Dryand. l. c. p. 294.

A. lutes.  $\beta$ . Lam. enc. 1. p. 76. Herm. parad. 209. t. 209. Flor. lutei.  $\overline{\text{T}}$

4. *flaccida*, fol. lanceolato-linearibus flaccidis, racemo brevi, pedunc. patentissimis, flor. nutantibus, filamentis alternis sterilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 444. Collect. 4. p. 291.  $\overline{\text{T}}$

5. *viridiflora*, fol. linearibus canaliculatis foris villosis, racemo paucifloro, pedunc. patentibus, flor. nutantibus, flamm. alternis sterilibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 446. Collect. suppl. 98. Petala exteriora lacte-viridia, interiora luteo-virescentia.

6. *coarctata*, petalis interioribus apice fornicatis, fol. glabris, pedunc. longitudine bractearum. Dryand. l. c. p. 295. Fol. lineari-subulata.

\*\* *Staminibus omnibus fertilibus.*

7. *fastigiata*, pet. interioribus apice fornicatis, fol. linearibus planiusculis, scapo fol. brevior, pedunc. longissimis patentibus. Willd. Dryand. l. c. p. 296. Flor. albi. Pet. exteriora lineariblonga, interiora ovali-oblonga, paulo breviora.

8. *caudata*, fol. lanceolato-linearibus canaliculatis strictis erectis, pedunc. patentissimis. Jacq. ic. rar. 2. t. 442. Collect. 4. p. 201.

9. *setosa*, fol. lanceolato-linearibus, pedunculis patentissimis, floribus erectis, squamis bulbi apice setosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 440. Collect. suppl. p. 100. Flor. erecti.

10. *aurea*, fol. lanceolato-linearibus, pedunc. floribusque erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 441. Collect. 4. p. 202. Petala aures.

11. *abyssinica*, pet. interioribus apice fornicatis, fol. lineari-lanceolatis canaliculatis strictis, pedunc. flor. cernuo brevioribus, bract. lineari-subulatis flore longioribus. Willd. p. 103. Hab. in Abyssinia? Petala flavo-viridia. W.

12. *fragrans*, fol. lineari-lanceolatis canaliculatis glabris, pedunc. patentissimis, flor. cernuis, flamm. omnibus fertilibus, bulbo depresso. Jacq. Schoenh. 1. p. 44. t. 84. Hab. ad Cap. b. spei. Habitus fere Antherici.  $\overline{\text{T}}$

13. *viscosa*, petal. interioribus apice fornicatis, fol. piloso-glandulosis. Dryand. Jacq. ic. 2. t. 445. Collect. suppl. 99. Lin. suppl. 196.

14. *spiralis*, floribus nutantibus, fol. spiralibus villosis-scabris. Lin. suppl. 196. Jacq. ic. rar. 2. t. 499. Collect. suppl. 100.

Hab. ad Cap. b. spei in summitate montis  
Ribecks Castel.  $\overline{\text{T}}$

799. GETHYLLIS. *Cor.* 6-partita,  
tubo filiformi longissimo. *Cal.*  
o, nisi vagina oblique truncata.  
*Th. Bacca* clavata, radicalis,  
unilocularis.

1. *spiralis*, fol. linearibus spirali-  
bus glabris, limbi laciniis ovato-oblongis. Lin.  
suppl. 198. Thunb. Diss. acad. 1. p. 14. Pa-  
piria spiralis. Thunb. in Act. lund. 1. sect. 2.  
p. 111. Ad Cap. b. spei, cum sequentibus.  $\overline{\text{T}}$

2. *ciliaris*, foliis linearibus spirali-  
bus ciliatis, limbi laciniis ovato-oblongis. Lin.  
suppl. 198. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 41.  
t. 70.  $\overline{\text{T}}$

3. *villosa*, fol. linearibus filiformibus spi-  
ralibus villosis, limbi laciniis ovato-ob-  
longis. Lin. suppl. 198.

4. *plicata*, fol. linearibus utrinque at-  
tenuatis plicato-nervosis piloso-ciliatis,  
laciniis limbi lanceolatis. Willd. p. 105.  
Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 42. t. 80. Hy-  
poris plicata. Lin. suppl. 197. Hab. in colli-  
bus arenosis. *Cor.* flava extus virens ns.  $\overline{\text{T}}$

5. *lanceolata*, fol. lanceolatis planis,  
limbi laciniis lanceolatis. Hab. ad Cap. b.  
spei.  $\overline{\text{T}}$

*Obs.* Gethyllides habent faciem Colchici.  
Flor. enim fruct. proferunt absque foliis.  
Sp. pl.

800. CURCULIGO. *Cor.* 6-petala,  
plana. *Spatha* 1-valvis. *Stylus*  
brevisimus. *Stigmata* 3, diver-  
gentia. *Caps.* 1-locularis, 4-  
sperma, spongiosa, rostrata.

1. *orchioides*. Roxb. corom. 1. p. 14.  
t. 13. Gaert. sem. 1. p. 63. t. 16 Willd. II.  
p. 105. Orchis amboinica major. Rumph. 6.  
p. 116. t. 54. f. 1. Hab. in Indiac locis  
umbrosis incultis, prope Samulco. Fol.  
lineari-ensiformia. Flor. flavi longe pe-  
dunculati.  $\overline{\text{T}}$

801. HYPOXIS. *Spatha* 2-valvis.  
*Cor.* 6-partita, persistens, su-  
pera. *Caps.* elongata, basi an-  
guerior. *Scm.* subrotunda nuda.

1. *erecta*, pilosa, scapo subquadrifloro  
fol. lineari-lanceolatis brevioribus, pedunc.  
flore duplo longioribus. Willd. Sp. II.  
p. 106. Ornithogalum hirsutum. L. Sp. pl.  
ed. 1. p. 306. Hab. in Virginia, Canada.  
Ornithog. refert. Fol. lunci pilosi.  $\overline{\text{T}}$

2. *sobolifera*, pilosa, scapo subquadriflo-  
ro, fol. lineari-lanceolatis patentibus  
longitudine scapi. pedunculis flore duplo  
longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 372.  
Collect. suppl. 53. Cum priore, cui valde  
affinis. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

3. *villosa*, villosa, scapo subquadriflo-  
ro fol. lineari-lanceolatis brevioribus, pe-  
dunculis flore brevioribus, fructibus cysti-  
dracis. Willd. p. 107. Lin. suppl. p. 198.  
Jacq. ic. rar. 2. t. 307. Collect. suppl. 51.  
Ad Cap. b. spei. Var. magnitudine.

4. *decumbens*, pilosa, scapo subbifloro  
decumbente fol. lineari-lanceolatis bre-  
vioribus. H. pilosa, capsulis clavatis. L. Mill.  
dict. 1. 3p. f. 2. Hab. in campis arenosis  
montium Jamaicae.

5. *obliqua*, scapo subtrifloro hirsutis, fol.  
lineari-lanceolatis acuminatis subobliquis.  
Jacq. ic. rar. 2. t. 371. Collect. suppl. 54.  
Andrew. t. 195. Halit. ad Cap. b. spei.  
Rad. fibrosa. Ornith. minimum quadrantenus  
refert.

6. *aquatica*, fol. linearibus, scapis um-  
belliferis 4, unifloris. Lin. suppl. 197. In  
Cap. b. spei fossis. Flor. in aliis solitarii her-  
maphroditi, in aliis umbellati mares. L.  $\overline{\text{T}}$

7. *minuta*, fol. triquetris carnosis gla-  
bris, scapis bifidis. Lin. suppl. 197. Thunb.  
prod. 59. Helonias minuta. L. Mant. p. 225.  
Hab. ad Cap. b. spei locis glareosis. *Cor.*  
patens niva. Stylis 3, membranacei germinali  
adhaerentes in figuram pyramidalem.  $\dagger$

8. *alba*, parvula, fol. teretibus glabris,  
scapis subbifidis, petalis immaculatis. Lin.  
suppl. 198. Jacq. Collect. 4. p. 135. t. 2. f. 1.  
Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

9. *ovata*, fol. ovato-lanceolatis integris  
glabris, scapis unifloris. Lin. suppl. 197.  
Thunb. prod. 60. Hab. ad Cap. b. spei.  
Flos pulchellus albus.  $\overline{\text{T}}$

10. *veratrifolia*, scapo unifloro fol. ob-  
longo-ellipticis glabris plicato-nervosis bre-  
vioribus. Willd. p. 109. H. plicata. Jacq. ic.  
rar. 2. t. 367. Collect. suppl. p. 55.  $\overline{\text{T}}$

11. *stellata*, scapo unifloro fol. lineari-  
lanceolatis laxis carinatis glabris brevioribus,  
petalis basi maculatis. Lin. Suppl. 197. Jacq.  
ic. rar. 2. t. 368. Collect. 4. p. 134. Andrew.  
t. 101. Amaryllis capensis. L. Sp. pl. 420.  
Hab. ad Cap. b. spei. Macula nigricans ad  
ungues petalorum.

12. *elegans*, scapo stricto aequali, petal.  
intus albis basi macula lata nigra limbrata.  
Andrew. t. 236. *Cor.* magna patens ut in  
priorib.

12. *linearis* (aurea), fol. lanceolato-linearib. glabris canaliculatis longioribus scapo 1-floro. Andrew. t. 171. Cor. magna, intus aureo-rubra, extus viridis.

13. *serrata*, foliis canaliculatis glabris ciliato-serratis, scapis unifloris. Lin. suppl. 197. Thunb. profl. 60. Jacq. ic. rar. 2. t. 369. Collect. 4. p. 134. Fabricia serrata. Thunb. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

14. *juncea*, fol. canaliculatis pilosis integerrimis scapis unifloris. Smith. spicil. t. 16. Hab. in Carolinae turfosis. ¶

15. *sessilis*, pilosa, acaulis, fructificationibus subradicalibus. Sp. pl. 439. Dill. elth. 298. t. 220. f. 287. Hab. in Carolina. ¶

802. **ERIOSPERMUM.** Cor. 6-petala, campanulata, persistens. *Filamenta* basi dilatata. *Caps.* 3-locularis. *Semina* lana involuta.

1. *latifolium*, fol. subrotundis acuminatis, basi cucullatis. Willd. II. p. 110. Jacq. ic. 2. t. 420. Collect. suppl. 73. Ornithogalum capense, fol. cordato-ovatis. L. Ornith. radice tuberosa cyclaminis folio, flore pallide caeruleo. Breyn. Cent. t. 41. Rudh. 1. p. et f. 14. Hab. ad Cap. b. spei. Cum sequentibus. Racemus pedunculis patulis plus quam decies flore longioribus. ¶

2. *lanceaefolium*, fol. ovato-lanceolatis margine subundulato involuto. Willd. E. fol. lanceolatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 421. Coll. suppl. 72. Racemus pedunculis triplo flore longioribus erecto-patentibus. W.

3. *parvifolium*, fol. ellipticis obtusis planis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 422. Coll. suppl. 74. Pedunculi rectangule-patentes flore quadruplo longiores. W.

803. **ORNITHOGALUM.** Cor. 6-petala, erecta, persistens, supra medium patens. *Filamenta* basi dilatata aut subulata. *Caps.* subrotunda, angulata, 3-locularis. *Sem.* subrotunda, nuda.

1. *uniflorum*, scapo diphylo, fol. oppositis, pedunculo unifloro, petalis exterioribus lanceolatis retusis, interioribus ellipticis duplo latioribus. Willd. Sp. II. p. 111. Nov. Act. Petrop. XVIII. t. 6. f. 3. Hab. in Sibiriae montibus. Refert O. luteum, sed flos triplo major, Stigmata tria, lutea.

2. *fibrosum*, radical. fibrosis intertextis, fol. subquinis radicalibus subulatis canaliculatis, scapo 1-floro brevissimo. Desf. Atl. 1. p. 294. Habitat in arenosis prope Kerwan. Cor. flava extus viresc.

3. *bulbiferum*, scapo folioso unifloro, fol. alternis linearibus subulatis basi bulbiferis, radicalibus filiformibus, petalis aequalibus acutis. Willd. p. 112. Lin. suppl. 199. Pall. itin. 3. app. n°. 106. tab. O. Hab. in aridis limosis ad Wo'gam et Jaicum. ¶

4. *bonariense*, fol. radicalib. longis angustis, spatha diphylla brevi, flor. umbellatis (albido-purpureiscentibus). O. *spathaceum*. Poir. in Enc. bot. 4. p. 618. Hab. in pascuis maritimis in Bonaria s. Buenos Ayres. Commers. Flor. parvi, striati.

5. *spathaceum*, scapo subtereti, spatha univalvi, umbella pedunculata subtriflora. Hayne in Usteri N. Bot. Annal 15. Stück. p. 11. t. 1. Willd. p. 112. O. Haynii. Roth. O. minimum. Fl. dan. t. 612? Hab. in nemorosis humidiusculis prope Hamburgum et in ducatu Oldenburgensi. Scap. folio lanceolato spatuliformi instructus. Flor. flavi.

6. *bohemicum*, scapo folioso subunifloro, fol. alternis lanceolatis, radicalibus filiformibus, pedunc. pilosiusculis; petalis aequalibus lanceolatis obtusiusculis. Willd. Act. bohem. 2. p. 121. iconc. Hab. in saxosis udis Bohemiae. ¶

7. *luteum* (pratense), scapo anguloso diphylo, pedunc. umbellatis simplicibus glabris. L. O. *pratense*, scapo polyphylo, pedunc. simplicibus triquetris glabris. Pers. in Usteri N. Bot. Annal. 5. Stück. p. 8. t. 2. f. 1.

8. *sylvaticum*, majus, scapo diphylo pedunculis simplicibus triquetris glabris Pers. in Usteri N. Annal. 5. St. p. 7. t. 1. f. 1. O. luteum. Fl. dan. t. 612. Hab. in Pomariis, prat. in sylvis.

8. *minimum* (arvense), scapo angulato diphylo, pedunc. pubescentibus umbellatis ramosis. L. O. *arvense*, scapo polyphylo, pedunc. ramosis tereusculis tomentosis, Pers. l. c. p. 8. t. 1. f. 2. Hab. in arvis. Vere. Diversissimum a praecedente, pro quo a plurimis habetur.

9. *circinatum*, hirsutiae canescens, fol. linearibus recurvatis canaliculatis, radicali solitario, caulinis tribus, caule tri-s. quadrifloro. Lin. suppl. 199. Pall. itin. 3. app. n°. 85. t. D. f. 2. Hab. in siccis limosis nitrosis versus Astrachan. Simillimum O. minimo. Vagina laxa fibrosa reticulata fer-

ruginea folium et scapum quasi cucullo circumdans. L.  $\overline{\text{U}}$

10. *paradoxum*, caulescens, fol. multifidis ciliatis, scapo racemoso paucifloro, cor. campanulatis, filam. lanceolatis. Willd. p. 115. Jacq. Collect. suppl. 81. t. 1. Hab. ad Cap. b. spei. Planta florifera aphylla. Fructus ignotus. — Forte proprii generis planta. Willd.  $\overline{\text{U}}$

11. *ambriatum*, fol. linearibus ciliatis, scap. subulifero, bract. pedunc. subaequalibus. Willd. in Act. Soc. Berol. v. 3. Pall. in N. Act. Petrop. 10. p. 309. Hab. in Tauria.

12. *niveum*, racemo paucifloro, petalis lanceolatis, fol. filiformibus canaliculatis, filamentis subulatis. Ait Kew. t. p. 440. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{U}}$

13. *umbellatum*, flor. corymbosis, pedunculis altioribus, filamentis basi dilatatis. O. stipulis maximis, petiolis lateralibus longissimis. Hall. helv. n.º. 1215. Hab. in Pomariis, arvis.

14. *pyrennicum*, racemo longissimo, petalis linearibus, filam. dilatatis, pedunc. floriferis patentibus: fructiferis scapo approximatis. Lin. Engl. bot. t. 499. Jacq. Fl. austr. t. 107. Hab. in alpinis Helvetiae, Cornioliae et in pratis Germaniae, Angliae. Flor. albo-virescentes.

15. *luteum*, filam. alternis ad basin leviter marginatis, racemo pyramidato denso longo, fol. lanceolatis planis ad apicem conniventibus, ad oras villosis. Jacq. ic. rar. 2. t. 434. Collect. suppl. 76. Hab. ad Cap. b. spei.

16. *ovatum*, fol. ovatis integris glabris, racemo ovato. Thunb. prod. p. 62. Hab. ad Cap. b. spei.

17. *ciliatum*, fol. ovatis acutis ciliatis, flor. racemosis. Lin. suppl. 199. Hab. ad Cap. b. spei. Cum 4-sequentibus.

18. *crenulatum*, fol. oblongis obtusis ciliatis, flor. racemosis erectis. Lin. suppl. 198. O. unifolium. Retz. obs. 2. p. 17.

19. *pilosum*, fol. lineari-ensiformibus ciliatis, flor. racemosis, pedunculis incurvis. Lin. suppl. 199. Thunb. prod. 61.

20. *revolutum*, filam. subulatis, fol. sublinearibus planiusculis glabris, scapo flexuoso racemoso, petalis ad oras revolutis. Jacq. Schoenb. t. p. 46. t. 89.

21. *conicum*, racemo conico, filam. subulatis, bracteis membranaceis longitudine pedunculorum, fol. lanceolatis planis

marginis villosis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 428. Collect. 3. p. 232.

22. *narbonense*, racemo oblongo, filam. lanceolatis membranaceis, pedunculis floribusque patentibus. L. Hab. in Galliae australis et Italiae, Sibiriae, Germaniae agris.

23. *latifolium*, racemo longissimo, filam. subulatis, pedunculis flore multoties longioribus, fol. lanceolatis. Willd. p. 119. Jacq. ic. rar. 2. t. 424. Collect. 2. p. 318. Hab. in Arabia, Aegypto. Flos albissimus.

24. *altissimum*, racemo longissimo, filam. subulatis, pedunc. flore duplo longioribus, fol. oblongis apice convolutocuspидatis. O. *giganteum*, scapo racemoque longissimis, bracteis subulatis brevibus. Jacq. Schoenb. t. p. 45. t. 87.

25. *scilloides*, racemo longissimo, filam. subulatis, pedunc. longitudine flor., bracteis pedunculorum longitudine, fol. lineari-lanceolatis laxis, apice convolutis. Willd. O. filamentis subulatis, fol. subensiformibus apice candelatis, racemis longissimis cylindricis. Jacq. Schoenb. t. p. 46. t. 88.

26. *longibracteatum*, racemo longissimo, bracteis pedunculis fere duplo longioribus, fol. lanceolato-ensiformibus. Merr. Syst. 327. Jacq. hort. t. 29. O. *bracteatum*. Thunb.

27. *japonicum*, racemo spicato cylindrico longissimo, scapo striato. Thunb. jap. 157. Fol. radicalia linearia plana scapo breviora. Cor. purpureo-caerulea patens persistens.

28. *comosum*, racemo brevissimo, bracteis lanceolatis longitudine florum, petalis obtusis, filamentis subulatis. Amoen. acad. 4. p. 312. O. fol. linearibus canaliculatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 426. Collect. 2. p. 313. Rudb. elys. 2. p. 435. f. 1.

29. *pyramidale*, racemo conico, flor. numerosis ascendentibus, petalis elliptico-oblongis planis, staminibus lanceolatis aequalibus, stylo brevissimo. Ait Kew. t. p. 447. Jacq. ic. rar. 2. t. 425. Coll. 2. p. 317. Rudb. elys. f. 4. Hab. in collib. Lusitaniae.

30. *tenellum*, filam. subulatis, scapo filiformi laxo racemoso, bracteis pedunc. duplo brevioribus, fol. linearibus canaliculatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 427. Collect. 2. p. 316. Petala lactea lanceolata, linea flavescens.

31. *odoratum*, filamentis lanceolatis, racemo longo, fol. lanceolato-linearibus superne planis humi prostratis. Jacq. ic. 2. t. 432. Collect. suppl. 78. Andrew. t. 260

*Petala lutescentia linea medio viridi notata.*  
Cresc. ad Cap. b. spei. c. sequentibus.

32. *suaveolens*, filamentis lanceolatis racemo brevi, fol. linearibus canaliculatis longitudine scapi. Jacq. ic. rar. 2. t. 431. Collect. 2. p. 316.

33. *secundum*, filamentis lanceolatis, racemo brevi secundo, fol. sublinearibus ad apicem acutum fornicatis, ad oras cartilagineo-muricatis erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 433. Collect. suppl. 79. O. maculatum. Thunb. prod. 62?

34. *fuscatum*, filamentis lanceolatis tribus l. floribus, racemo oblongo, fol. paucis linearibus cuneiformibus, scapo triplo brevioribus, capsulis alato-trilobis. Jacq. ic. rar. 2. t. 429. Coll. suppl. 80.

35. *barbatum*, filamentis subulatis, fol. subgeminis subulatis, petalis tribus alternis ad apicem barbatis. Jacq. Schoenb. 1. p. 47. t. 91.

36. *polyphyllum*, racemo paucifloro, filamentis subulatis, petalis linearibus obtusis, apice callosio-inflexis, fol. linearibus subulatis semiteretibus. Willd. p. 123. Jacq. ic. 2. t. 430. Collect. suppl. 79. Racemus brevis.

37. *juncifolium*, filamentis sublanco-latis, racemo longissimo, foliis subulatis plurimis. Jacq. Schoenb. 1. p. 46. t. 90.

38. *rupestre*, fol. filiformibus carnosis, scapo paucifloro, flor. reflexis. Thunb. prod. 61. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

39. *arabicum*, corymbo multifloro, filamentis subulatis, cor. late campanulata, petalis exterioribus obsolete trilobatis. Ait. Kew. 1. p. 412. O. flor. corymbosis, pedunculis scapo humilioribus, filam. sub-emarginatis. L. Poir. in Enc. bot. 5. p. 616? Rndb. elys. 2. p. 110. f. 1. Besl. 5. t. 12. f. 1. Hab. in Alexandria, Barbaria, Madera. Bractea amplexicaules. Flor. albi, basi fusi?

40. *thyrsoides*, fol. latis ciliatis, corym-bis multifloris racemiformibus, filam. alternis furcatis, fol. lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 412. ¶ Flor. luteis, bracteis pedunculo brevioribus. Ait. Boult. t. 82. f. 3. β. Flor. albis, bracteis longitudine pedunc. Jacq. hort. 3. p. 17. t. 28. Mill. ic. 128. t. 192. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

41. *aureum*, racemo coarctato, sub-corymboso, filamentis alternis emarginatis, fol. lanceolatis cartilagineo-denticulatis. Willd. p. 124. O. miniatum. Jacq. ic. rar. 2. t. 438. Collect. 3. p. 233. β. O. flavescens. Jacq. l. c. t. 437. γ. O. flavissimum.

Jacq. t. 436. Hab. ad Cap. b. spei. Var. flor. rubris, aurantiis, flavis, quas cl. Willdenow. l. c. non puto species distinctas agnoscit.

42. *coarctatum*, racemo multifloro coarctato, filamentis alternis marginatis, fol. linearibus canaliculatis. Willd. p. 125. Jacq. ic. rar. 2. t. 435. Collect. suppl. 77. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

43. *caudatum*, racemo longissimo, fol. lanceolato-linearibus, corollis patentibus, staminibus dilatatis, alternis cuneiformibus. Ait. Kew. 1. p. 412. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

44. *nutans*, floribus secundis pendulis, nectario stamineo campaniformi. Jacq. austr. t. 301. Hab. in Italia, Helvetia et Germania. ¶

804. *SCILLA*. Cor. 6-petala, patens, decidua. Filam. filiformia, petalorum basi adnata.

1. *maritima*, nudiflora, bracteis refractis. L. Willd. Sp. II. p. 125. Blackw. t. 591. Desf. Atl. 1. p. 297. Hab. ad Hispaniae, Lusitan., Siciliae, Syriae littora et in Barbariae arvis. Bulbus crassile fere cap. humani. Fol. lanceolata, stricta. Scapus ante folia, longissimus, multiflorus. Flor. albi.

2. *Lilio-Hyacinthus*, racemo paucifloro, pedunculis ebracteatis, foliis lanceolatis humi adpressis, bulbo squamato. Willd. p. 126. S. radice squamata. L. Hort. cliff. 123. Moris. t. 12. f. 21. Hab. in Biscaja, Aquitania, Hispania, Pyrenaeis.

3. *italica*, racemo conico oblongo. L. Besl. cyst. vern. 42. f. 1. Hab. ... Bracteae longitudine pedicellorum.

4. *lingulata*, foliis lanceolatis planis racemo denso conico, bract. subulatis pedicellis aequantibus. Desf. Atl. 1. p. 298. Poir. it. p. 151. Hab. in Barbariae arvis. Flor. hyeme. Fol. vagina basi cincta.

5. *villosa*, fol. lanceolatis planis villosis, flor. corymbosis. Desf. l. c. p. 299. t. 85 f. 2. In arenis prope Kerwan. Fl. hyeme.

6. *obtusifolia*, scapo laterali, foliis linguiformibus undulatis, flor. racemosis ebracteatis. Desf. l. c. t. 86. Hab. prope La Calie. Flor. S. autumnalis.

7. *parviflora*, fol. linearibus lanceolatis acutis glabris scapo brevioribus, flor. racemosis confertis, bract. brevissimis. Desf. Atl. 1. p. 300. S. numidica. Poir. it. p. 151. Hab. in Algeria.

8. *undulata*, fol. lanceolatis undulatis, flor. laxe racemosis, bract. brevissimis. Desf. Atl. 1. p. 300. t. 68. Hab. in Barbariae collib. incultis. Cor. campanulata, pallide rosea. Flor. autumnu.

9. *tetraphylla*, acaulis, floribus fasciculatis, fol. quaternis ovato-lanceolatis. Lin. suppl. 200. Hab. in Africa.

10. *peruviana*, corymbo conferto conico, fol. in orbem expansis margine ciliatis. Rudb. elys. 1. p. 37. f. 1. Moris. 6. 4. t. 12. f. 19. Desf. Atl. 1. p. 208. Hab. in Lusitania et in Barbariae arvis. Radix tunicata, lanuginosa. Fol. in pl. culta glabra.

11. *japonica*, florum umbella terminali fastigiata. Thunb. jap. p. 137. Hab. in Japonia. Bractae in scapo et sub flor. membranaceae lanceolatae erecto-adpressae. Cor. patens albo-purpurea. T.

12. *amoena*, scapo angulato, pedunc. alternis flore brevioribus, bracteis obtusis brevissimis. Willd. Rudb. elys. 2. p. 34. t. 7. Hab. in Austria, Russia, Germania, Petal. basis lineolis 2 albidis. T.

13. *praecox*, scapo angulato, racemo subcorymboso, pedunculis flore duplo longioribus, bracteis obscuris. Willd. p. 128. Hab. . . A. praecedente habitu, parvitate et praecocitate floris jam primo intuitu distincta. W.

14. *campanulata*, bulbo solido, racemo multifloro oblongo-subconico, cor. campanulatis erectis, bract. bipartitis pedunc. longioribus, fol. lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 444. Scilla hyacinthoides. Jacq. ic. rar. 1. t. 65. Collect. 1. p. 61. Hab. in Hispania, Lusitania. T.

15. *bifolia*, radice solida, flor. racemosis ebracteatis, fol. lanceolatis subbinis in scapo elevatis. Ait. Kew. 1. p. 444. Engl. bot. t. 24. Hab. in Gallia, Germania. T.

16. *verna*, corymbo hemisphaerico paucifloro bracteato, fol. linearibus canaliculatis. Huds. angl. 142. Smith. brit. 1. p. 129. Engl. bot. t. 23. Flor. dan. t. 569. Hab. in Hispaniae et Cambriae pratis et Angliae maritimis.

17. *lusitanica*, racemo oblongo conico, petalis lineatis. L. Rud. elys. 2. p. 34. f. 4. Hab. in Lusitania. T.

18. *orientalis*, flor. erectis racemosis, fol. elliptico-ensiformibus. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 334. S. bifolia. Thunb. jap. 138. Hab. in Japonia. T.

19. *hyacinthoides*, racemo cylindraceo multifloro petalis germine sesquialongiorib.,

pedunculis coloratis, fol. lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 445. Hab. in Madera et Lusit. T.

*Obs.* Nisi saepius a bulbo principe avelantur bulbilli, per annos saepe viginti non florebit. Gouan.

20. *autumnalis*, fol. filiformibus linearibus, floribus corymbosis, pedunculis ebracteatis nudis ascendentibus longitudine floris. L. Cav. ic. 3. p. 38. t. 274. f. 2. Engl. bot. t. 78 Curt. Lond. ic. Hab. in Europa australiori solo glareoso et pascuis sterilioribus. Pet. rosea. T.

21. *mauritanica*, flor. racemosis, bract. binis pedunc. aequantibus, fol. linearibus planis apice involutis. Schousb. maroc. 1. p. 154. Hab. in monte Shibil Kilbir in Barbaria. Priori affinis, sed cor. minores, minus patulae. S.

22. *tingitana*, flor. racemosis, bract. solitariis pedunc. brevioribus, fol. lanceolatis planis, apice involutis. Schousb. p. 155. Cum priore. Bract. persistentes. Cor. majores quam in S. autumnali.

23. *biflora*, racemo laxo, flor. geminis. S. biflora. Flor. Peruv. 3. p. 69. In Peruviae collib. arenosis. Cor. alba.

24? *unifolia*, folio teretiusculo latere subspicato. L. Ornithogalum spicatum unifolium, flore niveo odorato. Grisl. lusit. Hab. in Lusitania.

So5. CYANELLA. Cor. hexapetala: petalis 3 inferioribus propendentibus. Stylus et Stamen infimum declinatum. Caps. subrotunda, 3-locularis. (Stam. etiam 3 deflexa.)

1. *capensis*, caule folioso paniculato, racemis divaricatis, fol. lanceolatis undulatis. Willd. Sp. II. 1. p. 131. Lin. suppl. p. 201. Andrew. t. 191. Jacq. hort. 3. p. 21. t. 35. Hab. ad radices montis Tabularis in Cap. b. spei. Flor. caerulei. T.

2. *orchidiformis*, caule ramoso, racemis erectis, fol. caulinis ensiformibus strictis radicalibus ovatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 447. Collect. 4. p. 211. Cum priore. Fol. glauca, margine cartilagineo-denticulata. Stam. tria deflexa.

3. *lutea*, scapo nudo subramoso: racemis erectis, fol. linearibus lanceolatis planis. Willd. Lin. suppl. 201. Thunb. in Act. holm. 1794. p. 195. t. 7. f. 1. Hab. in campis inundatis arenosis Cap. b. spei. Stam. tria deflexa. T.

4. *alba*, scapo nudo unifloro, fol. filiformibus. Willd. Thunb. l. c. p. 195. t. 7. f. 2. Hab. in Bockland.  $\overline{\text{T}}$

Sc6. ASPHODELUS. Cor. 6-partita, patens. Nect. ex valvulis sex germin tegentibus.

1. *acaulis*, caul. nullo, fol. subulato-triquetris, pedicel. fructiferis reflexis. Desf. Atl. 1. p. 302. t. 89. Hab. in montib. Sibae. Cor. pallide rosea.

2. *luteus*, caule folioso, fol. triquetris striatis. L. Blackw. t. 233 Jacq. hort. t. 27. A. stipulis maximis. Hall. helv. n. 1208. A. luteus flore et radice. Baulh. pin. 28. Hab. in Sicilia et Helvetia.  $\overline{\text{C}}$

3. *creticus*, caule folioso superne nudo ramoso, fol. filiformibus striatis denticulatis subciliatis. Lam. Enc. 1. p. 297. Hab. in Creta.

4. *ramosus*, caule ramoso nudo, fol. ensiformibus carinatis laevibus. L. Hab. in Europa australi.  $\overline{\text{T}}$

5. *albus* (complex), caule nudo simplici, pedunc. confertis longitudine bracteatum, fol. linearibus carinatis laevibus. Willd. p. 133. A. ramosus. Merr. Comm. Goett. 1776. p. 37. tab. 7. Blackw. t. 238. Hab. in saxosis Lusitaniae, Hispaniae, Narbonae, Croatiae.  $\overline{\text{T}}$

6. *fistulosus*, caule nudo, fol. strictis subulatis striatis subfistulosis. Cuv. ic. 3. p. 1. t. 202. Moris. s. 4. t. 1. f. 5. Hab. in Gallo Provincia, Hispania, Creta.  $\overline{\text{T}}$

7. *altaicus*, caule nudo simplici, staminibus cor. duplo longioribus, fol. linearibus canaliculatis. Willd. p. 134. Act. Pemptrop. 1779. p. 260. t. 10. Ad radices mont. Altaicorum.  $\overline{\text{T}}$

8. *liburnicus*, caul. simplici basi folioso, cor. cernuis monopetalis, fol. setaceis. W. Scop. carn. n. 412. t. 12. Hab. in Istria.  $\dagger$

Sc7. PHALANGIUM. Cor. 6-petala patens. Filamenta nuda s. glabra. Caps. ovata. Sem. angulata. (Rad. plerumque fibrosae aut fasciculatae. Fol. plana. Flor. in plurimis albi aut purpurascens. Huc omnia ANTHEICA L. prioris sectionis.)

\* Filamenta filiformia aequalia.

1. *serotinum*, fol. planiusculis, scapo unifloro. Lin. Willd. II. p. 134. sub Anth-

rico, (uti omnes sequentes species.) Ornithogalum striatum. Willd. Sp. II. 112. Fol. crassulis, scapo unifloro. Rag. angl. 3. p. 374. t. 17. f. 1. Hab. in alpinis  $\overline{\text{T}}$

2. *fragrans*, fol. tereti-filiformibus strictis scapo brevioribus, scapo simplici. Willd. p. 135. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 45. t. 86. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

3. *filifolium*, flamm. glabris, radice bulbosa, fol. filiformibus flexuosis glabris, scapo simplici flexuoso. Jacq. ic. rar. 2. t. 414. Collect. suppl. 93. Hab. ad Cap. b. spei in regione Namaquas.

4. *flexifolium*, fol. linearifiliformibus flexuosis reflexis, basi ciliatis scapo ramosi longitudine. Willd. p. 135. Jacq. ic. rar. 2. t. 412. Collect. suppl. 93. Lin. suppl. 207. Hab. ad Cap. b. spei.

5. *filiforme*, fol. filiformi-teretiusculis scaberrimis, petalis lanceolatis. Ait. Kew. 1. p. 451. Hab. ad Cap. b. spei.

6. *exuviatum*, fol. linearifiliformibus canaliculatis, scapo simplici fol. brevioribus, squamis radicanibus transversim rugosis. Willd. p. 136. Jacq. ic. rar. 2. t. 415. Collect. suppl. 89. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{T}}$

7. *elongatum*, fol. linearifiliformibus scapo ramoso brevioribus, racemis elongatis. Willd. p. 136. Anthericum filiforme. Thunb. prod. 62. Hab. ad Cap. b. spei.  $\dagger$

8. *virgatum*, foliis strictis filiformibus acutis, caul. superne ramoso, ramis virgatis simplicibus, flor. minimis caul. folioso sulcato. Poir. in Enc. bot. 5. p. 246. Hab. in Carolina. Cor. alba, medio stria purpurea. Scap. 2-3-petalis.

9. *fastigiatum*, caul. altissimis nudis, ramis pluribus virgatis, flor. subternatis. Enc. l. c. Hab. . . Fol. ? Flor. albi.  $\dagger$

10. *revolutum*, fol. oblongis undulatis, spic. longissimis pyramidalis, petal. revolutis. Ph. spicatum. Enc. bot. l. c. Hyacinthus revolutus. Lin. suppl. p. 204. Hab. ad Cap. b. sp. Cor. pallescens, fascia brunnea.

11. *capillare*, fol. capillaribus substriatis longis, scapo nudo simplici, spica brevi viridescens. Enc. bot. l. c. Hab. . .  $\dagger$

12. *croceum*, bulbosum, fol. gramineis, spica pyramidalis, bract. convoluta-amplexantibus, seminib. subglobosis. Michaux. Flor. 1. p. 196. Hab. in humidis sylv. Georgiae. Flor. crocei.

13. *planifolium*, foliis planis, scapo compresso glabro, flamm. inferne lanatis superne apiculatis. Schousb. Maroc. 1.

p. 157. Willd. II. p. 136. A. bicolor. Desf. Atl. t. p. 304. t. 90. Hab. in Lusitania et in Barbaria, in fructibus Shibil Kibir. Petal. intus niven, extus purpurascens, etiam utrinque purpurea.

14. *gracum*, fol. planis, scapo simplici, floribus corymbosis, filam. lanatis? Syst. Veg. 272. Hab. in Oriente. Fol. linearia, longitudine fere scapi. L. Filam. non lanata. L. Mant. 365.

15. *squameum*, scapo squamis membranaceis tumidis imbricatis. Lin. suppl. 282. Hab. ad Cap. b. spei. Radix tuberibus oblongis tomentosis pluribus, filo pendulis. Cor. infundibuliformis extus subpubescens sexpartita. Var. fol. hirsutis et glabris. L.

16. *comosum*, fol. ensiformibus glabris, scapo ramoso comoso. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei. Tr. †

17. *floribundum*, foliis planis glabris linearis-lanceolatis acutis, scapo simplici, racemo multifloro cylindrico compacto, petalis patentibus, staminibus glabris. Ait. Kew. t. p. 447. Hab. ad Cap. b. spei. Tr.

18. *revolutum*, fol. trigonis scabris, scapo ramoso, cor. revolutis. Mill. dict. n.º. 1. A. fol. linearibus scapo longioribus. Thunb. prod. 62. Comm. hort. t. p. 67. t. 34. Hab. ad Cap. b. spei.

19. *ramosum*, fol. planis, scapo ramoso, cor. planis, pistil. recto. L. Jacq. austr. t. 16. Hab. in rupibus et sylvis calcarcis.

20. *sulphureum*, fol. lanceolato-linearibus canaliculatis, apice obtuso-concavis, scapo racemumque simplicissimis, cor. patentissimis. Pl. Hongar. p. 89. t. 95. Hab. ad Thermas. Fl. Majo.

21. *caeruleum*, fol. ensiformibus, panic. longissima, flor. caeruleis. Flor. Peruv. 3. p. 67. Bermudiana caerulea. Feuill. 2. p. 75. pl. 8. Hab. in R. Chilensis umbrosis. Rad. fasciculata, odore lreos florentinae. Cor. marcida, spiraliiter contorta.

22. *coarctatum*, fol. inferne corinatis, medio coarctatis, pedunc. bifido-dichotomis, pedicel. subumbellatis. Flor. Per. l. c. t. 299. Hab. in Andium montibus. Cor. violaceo-caerulea. Planta tincturam croceam immutabilem praebet.

23. *eccremorhizon*, fol. ensiformibus carinatis, scapo folioso, racem. longis, spatulis 2-3-floris. Flor. Per. l. c. Cresc. in Peruviae collib. Habitat Asphodeli. Rad. tuberosa pendula, lanuginea.

24. *elaucum*, racemo longissimo simplici multifloro, pedunc. florifero patentibus:

fructiferis adpressis. Flor. Per. l. c. p. 63. Hab. in Andium montibus. Fol. ensiformia, supra glauca.

25. *elatum*, fol. planis scapo ramoso, pedunculis aggregatis, corollis planis. Ait. Kew. t. p. 448. Hab. ad Cap. b. spei.

26. *falcatum*, fol. carnosis ensiformibus falcatis glabris, caule ramoso racemoso. Lin. suppl. 202. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. depressa terrae incumbens.

27. *contortum*, fol. planis ensiformibus, caule ramoso, floribus remotissimis. Lin. suppl. 202. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. contorta.

28. *vespertinum*, fol. linearis-ensiformibus carinato-triquetris, scapo ramoso brevioribus. Willd. p. 139. A. filamentis muricatis. Jacq. Schoenh. t. p. 44. t. 85. Hab. ad Cap. b. spei. Tr.

29. *graminifolium*, fol. linearibus planis depressis scapo ramoso brevioribus, petalis alternis undulatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 411. Collect. suppl. 87. Hab. ad Cap. b. spei. Tr.

30. *japonicum*, fol. ensiformibus convolutis glabris, scapo ramoso angulato, flor. racemosis cernuis. Thunb. jap. 138. Hab. in Japonia, China et Java.

31. *niveum*, fol. planis basi plicatis, caul. simplicibus, flor. densissimis longe spicatis bract. niveis pedunc. aequantibus. Enc. bot. 5. p. 248. Hab. in India. Cor. parva.

32. *lanceifolium*, fol. linearibus decumbentibus margine ciliatis scapo ramoso longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 413. Collect. suppl. 92. Hab. ad Cap. b. spei. Tr.

33. *hirsutum*, fol. linearibus hirsutis scapo ramoso brevioribus, racemo longissimo. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei. Tr.

34. *Adenantha*, fol. linearis-ensiformibus basi connatis, glandula inter filamentum et antheram. Forst. prod. n.º. 149. Hab. in N. Caledonia.

35. *pilosum*, scapo simplici folioso glabro, fol. lanceolatis vaginantibus utrinque pilosis. Willd. p. 140. Jacq. ic. rar. 2. t. 416. Collect. suppl. 87. Hab. ad Cap. b. spei. Tr.

36. *undulatum*, fol. ensiformibus falcatis undulatis scapo longioribus. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei. Tr.

37. *triflorum*, fol. canaliculatis-ensiformibus, scapo simplici, bracteis remotis trifloris. Ait. Kew. t. p. 448.



β. A. *bipedunculatum*, flamm. glabris, radice fasciculata, fol. lanceolato-linearib. carinatis, scapo racemoso simplici, bract. subbifloris. Jacq. ic. 2. t. 410. Collect. suppl. 88. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{T}$

38. *canaliculatum*, fol. subcarnosis pilosis ensiformi-triquetris latere angustiori canaliculatis, scapo simplici. Ait. Kew. 1. p. 448. Hab. ad Cap. b. spei. Scapus teres pilosus.  $\mathcal{T}$

39. *Albucoides*, fol. linearibus canaliculatis glabris, margine cartilagineis, scapo simplici. Ait. Kew. 1. p. 449. Hab. ad Cap. b. spei. Petalis luteis, carina viridi, apice toricatis, refert Albucam. Ait. 1. c.  $\mathcal{T}$

40. *Liliago*, fol. planis, scapo simplicissimo, cor. planis, pistillo declinato. Jacq. hort. 1. t. 83. Moris. 2. 4. t. 1. f. 10. Liliago Cordi. Lob. ic. p. 48. Hab. in Helvetia, Germania, Gallia.  $\mathcal{T}$

41. *Liliastrium*, fol. planis, scapo simplicissimo, cor. camp. annulatis, staminibus declinatis. L. Scheuchz. alp. 1. p. 48. et 7. p. 514. Hab. in alpinis Helveticis, Allobrogis. Corol. Liliis candidi.  $\mathcal{T}$

42. *spirale*, scapo spirali. L. Hab. sub monte Leonis Cap. b. spei, locis glareosis.  $\mathcal{T}$

**\*\* Filamenta media incrassata.**

43. *phyzodes*, flamm. glabris, rad. bulbosa, fol. oblongis planis lucidis, racemo subcorymboso. Jacq. ic. rar. 2. t. 418. Coll. suppl. p. 94. A. marginatum. Thunb. Stam. medio dilatata. Facies scillae. Willd. p. 147. Cum sequente ad Cap. b. spei.

44. *pusillum*, flamm. lanceolatis glabris, rad. bulbosa, fol. lanceolato-linearibus in orbem prostratis, racemo corymboso. Jacq. p. c. t. 417. Collec. suppl. p. 94.

Obs. Stam. uti in priore specie, quam ob rem a cl. Willd. in subdivisione peculiari: *Scilloides* illae enumerantur.

45. *coarctatum*, fol. ensiformibus carinatis, medio coarctatis, pedunc. bifido-dichotomis, pedicell. subumbellatis, flamm. ad medium incrassatis. Flor. Ver. 3. p. 67. t. 269. Hab. in Andium montibus. Cor. violaceo-cerulea. Planta tincturam croceam praebet.

808. ANTHERICUM. *Filamenta* barbata, cetera *Phalangii*. (Fol. succulenta, fistulosa. Flor. lutei. *Bulbine*. L.)

1. *frutescens*, fol. carnosia teretibus,

caule fruticoso erecto ramoso. Willd. sp. Pl. p. 142. Plantae grassae. ic. Hab. ad Cap. b. spei, uti omnes quae sequuntur.  $\mathcal{H}$

2. *rostratum*, antheris barbatis, caul. fruticosus radicanibus brevissimis, fol. subulatis teretibus pulposis. Jacq. ic. rar. 2. t. 403. Collect. suppl. 82. Habit. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{H}$

3. *Aloides*, fol. carnosia linguiformi-lanceolatis planiusculis. Willdenow. p. 143. Plant. grassae. ic. Dill. elth. 312. t. 212. f. 300. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. inferne convexa.  $\mathcal{T}$

4. *nutans*, fol. carnosia lanceolatis planis basi concavis, apice reflexis, racemo apice nutante. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 407. Collect. suppl. 86.

5. *incurvum*, fol. carnosia trigonis incurvis brevissimis, racemo elongato cernuo. Thunb. prod. 62.

6. *latifolium*, fol. carnosia lato-ensiformibus glabris, racemo longissimo, caule simplici. Lin. suppl. 202. Jacq. ic. rar. 2. t. 408. Collect. 249.

7. *pugoniforme*, flamm. barbata acule, radice subrotunda perenni, fol. crasso-subulatis antice sulcatis apice teretibus pulposis erectis. Jacq. ic. rar. 2. t. 405. Collect. suppl. 83.

8. *praemorsum*, fol. carnosia linearibus canaliculatis distichis erectis scapo brevioribus. Willd. A. radice perenni difformi praemorsa, fol. subtriquetris. Jacq. ic. rar. 2. t. 406. Collect. suppl. 85.

9. *Asphodeloides*, fol. carnosia subulatis semiteretibus stricis. L. Jacq. hort. t. 181. Hab. in Aethiopia. Fol. margine aspera.  $\mathcal{O}$

10. *longiscapum*, fol. carnosia subulatis semiteretibus flexuosis glaucis, scapo triplo brevioribus. Willd. p. 145. Jacq. ic. rar. 2. t. 404. Collect. suppl. 84. Hab. ad Cap. b. spei.  $\mathcal{H}$

11. *annuum*, fol. carnosia subulatis teretiusculis, scapo subracemoso. L. Hort. ups. 83. Mill. dict. n. 7. Plantae grassae. ic. Hab. in Aethiopia.  $\odot$

12. *hispidum*, fol. carnosia compressis hispidis. L. A. flamm. muricatis, scapo hispido. Jacq. ic. 2. t. 409. Collect. suppl. p. 91. Habitat ad Cap. b. spei. Radix fibrosa.  $\mathcal{T}$

13. *muricatum*, fol. linearibus muri-

caulis striatis, scapo ramoso inferne muricato. Thunb. prod. 63. Scapus bipedalis postea ramosus.

14. *ciliatum*, fol. ensiformibus carnoso-subtriquetris ciliatis, scapo simplici, racemo longissimo. Lin. suppl. p. 202. Fol. longissima.

15. *Cauda felis*, fol. canaliculato-ensiformibus, scapo simplici, racemo oblongo. Lin. suppl. p. 202. A. caudatum. Thunb. prod. 63.

16. *triquetrum*, fol. filiformibus triquetris scapo simplici brevioribus, racemo ovato. Lin. suppl. p. 202.

17. *scabrum*, fol. triquetris serrulatis, caule ramoso scabro, pedunc. fructiferis recurvis. Lin. suppl. p. 202.

18. *cirrhatum*, fol. lanceolatis planiusculis, scapo paniculato, filam. barbatis bicirrhatis. Forst. prod. n. 148. Hab. in N. Zealandia.

19. *crispum*, fol. ellipticis crispis ciliatis, scapo ramoso. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei. †

*Obs.* An omnes hae species revera hujus generis?

809. *NARTHECIUM*. Cor. hexapetala, patens, persistens. Filam. filiformia, hirsuta. Caps. supera prismatica. Sem. utrinque appendiculata.

1. *ossifragum*. Smith. brit. r. p. 368. Engl. bot. t. 535. Anthericum. Lin. Willd. p. 147. Flor. dan. t. 42. Hab. in uliginosis, paludib. turfosis. Fol. ensiformia. Cor. flava. †

810. *XANTHORRHÆA*. Cor. infera, hexapetala, persistens. Filam. plana, nuda. Caps. triquetra. Semina bina, compressa, marginata.

1. *resinosa*. Hab. in Australia, & N. Hollandia. Caud. lignosus resina flava scattens. Scap. longissimus, amento terminatus multifloro. Smith. in Act. soc. Lin. V. †

811. *CONANTHERA*. Cor. supera. Petala 6, reflexa. Antherae in eorum acutum coalitae. Caps.

oblonga, 3-locularis, 3-valvis. Sem. pauca, subrotunda.

1. *bifolia*, pedunc. bifloris, fol. 2-radiculibus, lineari-ensiformibus. Flor. Peruv. 3. p. 68. t. 301. Bermudiana pulposa. Tef. 3. p. 8. pl. 3. Hab. in R. Chiliens. collibus. Petal. violaceo-caerulea basi variegata. Bulb. 1-articulatus.

2. *Echeandia*, scapo simplici, fol. lanceolato-ensiformibus, petal. 3-exterioribus angustissimis, filam. glandulosis. Anthericum reflexum. Cor. ic. 3. p. 21. t. 241. Willd. II. p. 140. Echeandia terniflora. Ortega dec. pl. p. 90. Hab. . . . Cor. lutea.

*Obs.* Hoc genus ad Syngenesiam monogamiam potius transferendum.

812. *ASPARAGUS*. Cor. 6-partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca 3-locularis, supera, polysperma. (Fol. fasciculata.)

1. *officinalis*, caule herbaceo erecta paniculato, fol. setaceis, flor. dioicis, pedunculis in medio articulatis. Lamarck. Encyclop. 1. p. 295. † *Asparagus maritimus*, humilior, divaricatus, griseus. Hab. in arenosis, sylvaticis.

2. *tenuifolius*, humilis, caule herbaceo ramosissimo folioso, flor. hermaphroditis, pedunc. longis sub flore nodosis. Lamarck. Enc. 1. p. 295. Bauh. pin. 594. Hab. in Galliae meridional. montosis et uliginosis.

3. *declinatus*, caule inermi tereti, ramis declinatis, fol. setaceis. L. Hab. ad Cap. b. spei. †

4. *decumbens*, caule herbaceo inermi decumbente ramosissimo, ramis flexuosis, fol. setaceis, pedunc. solitariis terminalibus. Willd. p. 151. Jacq. Schoenb. 1. p. 71. t. 97. Hab. ad Cap. b. spei. †

5. *crispus*, caule herbaceo debili tortuoso, ramis incurvis flexuosis subcrispis, flor. solitariis, pedunc. nudo. Lam. Enc. 1. p. 295. Hab. in ins. Franciae. †

6. *flexuosus*, herbaceus inermis, caule flexuoso, fol. lanceolatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *scandens*, herbaceus inermis volubilis, foliis lanceolatis falcatis. Thunb. prod. 63. Hab. ad Cap. b. spei.

8. *falcatus*, aculeis solitariis reventis,

*ramis teretibus, fol. ensiformibus falcatis, pedunc. axillaribus 1-floris.* Burm. zeyl. 36. t. 13. f. 2. Hab. in Zeylona.  $\zeta$

9. *racemosus*, aculeis solitariis, ramis striatis, fol. fasciculatis lineari-subulatis falcatis, racemis multifloris axillaribus. Willd. Hab. in India orientali. Flor. parvi et pedunc. bracteis oblongis suffulti. W.  $\eta$

10. *retrofractus*, aculeis solitariis, ramis teretibus reflexis retrofractisque, fol. setaceis fasciculatis. Pluk. smalth. 40. t. 375. f. 3. Hab. in Africa.  $\eta$

11. *aethiopicus*, aculeis solitariis reversis, ramis angulatis, fol. lanceolato-linearibus. Mant. 63. Hab. ad Cap. b. spei. Rami flexuosi, angulati.  $\Upsilon$

12. *asiaticus*, aculeis solitariis, caule erecto, ramis filiformibus, fol. fasciculatis setaceis. L. Pluk alm. 45. t. 15. f. 4. Hab. in Asia?  $\eta$

13. *albus*, aculeis solitariis, ramis angulatis flexuosis, fol. fasciculatis triquetris mucicis deciduis. L. A. aculeatus, spinis horridis. Bauh. pin. 590. Moris. s. 1. t. 1. f. 3. Hab. in Lusitania, Hispania et Barbaria. Turiones edules sunt. Caul. albus.  $\eta$

14. *acutifolius*, caule inermi angulato fruticoso, fol. aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis aequalibus. L. Mill. dict. n. 3. Sauv. monsp. 45. Hab. in Lusitania, Hispania, Mompellii et Oriente. Turiones quoque comeduntur.  $\eta$

15. *subulatus*, frutescens inermi, ramis retroflexis, foliis teretibusubulatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.  $\eta$

16. *dependens*, fruticosus aculeatus, ramis reflexis, fol. subulatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.  $\eta$

17. *horridus*, aphyllus fruticulus pentagonus, acul. tetragonis compressis striatis. Linn. suppl. p. 203. Cavan. ic. 2. p. 30 t. 136. Desf. atl. 1. p. 307. Hab. in Hispania et Barbariae arvis. Sequentis var.?  $\eta$

18. *aphyllus*, caule inermi angulato fruticoso, fol. subulatis striatis inaequalibus divergentibus. Moris. s. 1. t. 1. f. 2. A. phyllacanthus. Lam. enc. 1. p. 296. Hab. in Sicilia, Hispania, Lusitania et Barbaria, ad littora maris.

19. *lanceus*, aculeis solitariis, fol. lanceolatis subfalcatis, pedunc. axillaribus solitariis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.  $\eta$

20. *capensis*, spinis quaternis, ramis aggregatis teretibus, fol. setaceis. L. Phok. alm. 1. 78. f. 8. Hab. ad Cap. b. spei. Spinac teruae. Lam.

21. *sarmentosus*, fol. solitariis lineari-lanceolatis, caule flexuoso, aculeis recurvis. Flor. zeyl. 124. Mill. dict. n. 11. Hab. in Zeylona.  $\eta$

22. *verticillaris*, fol. verticillatis. L. A. orientalis, fol. gallii. Tournef. Buxb. cent. 5. app. 47. t. 37. Hab. in Oriente.  $\dagger$

813. DRACENA. Cor. 6-partita, erecta. Filam. medio subcras-siora. (L.) aut simplicia. Bacca 3-locularis, 1-sperma.

1. *Draco*, arborea, fol. subcarnosis apice spinosis. Linn. Willd. Sp. p. 155. Blackw. t. 358. Draco arbor. Habitat in India orientali.  $\eta$

2. *marginata*, fol. angustis planis acutis confertis terminalibus, margine purpureis. Lam. enc. 2. p. 324. Hab. ad Madagascar. Priori affinis.

Obs. Non est D. marginata. Ait. quae nunc dentata nominatur.

3. *indivisa*, arborea, fol. ensiformibus acutis, racemo laterali composito. Forst. escul. n. 33. Hab. ad portum obscurum N. Zealandiae.  $\eta$

4. *umbraculifera*, arborea, fol. ensiformibus acuminatis, panicula terminali densissima sessilibi. Jacq. Schoenh. 1. p. 50. t. 95. Hab. culta in insula Mauriti.  $\eta$

5. *australis*, arborea, fol. ensiformibus acutis, racemo terminali erecto supradecomposito. Forst. prod. n. 151. Hab. in N. Zealandia.  $\eta$

6. *cernua*, arborea, fol. lanceolatis suboblique-flexis, panicula dependente divaricata. Willd. p. 157. Schoenh. 1. p. 50. t. 96. Hab. in insula Mauriti.  $\eta$

7. *ferrea*, arborea, fol. lanceolatis acutis. L. Hab. in China. Fusco-purpurea.  $\eta$

8. *dentata*, fruticosa, fol. dentato-spinosis, racemis axillaribus, bacis polyspermis. Ait. Kew. 1. p. 454. D. *marginata*. Aloe purpurea. Lam. enc. 1. p. 85. Plant. grass. ic. Genus forte intermedium iuxta

aloem et dracaenam. Fol. non succulenta. Hab. in insula Bourbon.  $\text{h}$

9. *terminalis*, arborescens, fol. lanceolatis petiolatis, ramis paniculae patentissimis. Lam. l. c. Willd. II. p. 154. Jacq. ic. 2. t. 448. Collect. 2. p. 337. Rumph. 4. t. 34. Hab. in India, China. Fol. fere cannae. Rad. contra diarrhaeam. Demum purpurascens.

10. *reflexa*, fol. ensiformibus supra basin angustatis; inferioribus reflexis, flor. pedicellis longioribus. Lam. enc. 2. p. 327. Cordyline. Commers. Rumph. 7. t. 35. 7. Hab. in ins. Mauritania. Filam. non incrassata? Bacca flava.

11. *mauritiana*, suffrutescens, fol. ensiformibus, scapo sarmentoso alterne paniculato, flor. pedicellis aequantibus. Lam. p. 325. Hab. in insula Borbonia. Fol. iridea.

12. *striata*, frutescens erecta, fol. lanceolatis oblique falcatis striatis, caule flexuoso. Lin. suppl. 204. Asparagus striatus. Thunb. prod. 65. Hab. ad Cap. b. spei.  $\text{h}$

13. *undulata*, herbacea caulescens erecta, fol. ovatis acutis multinerviis, flor. axillaribus pedunc. Lin. suppl. 204. Asparagus undulatus. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.

14. *erecta*, herbacea caulescens erecta, fol. lanceolatis subulatis subsessilibus. Lin. suppl. 204. Asparagus erectus. Thunb. prod. 65. Hab. ad Cap. b. spei.

15. *borealis*, herbacea subcaulescens, fol. ellipticis subplicatis. Ait. Kew. 1. p. 454. t. 5. Andner. t. 206. Filam. simplicia. Hab. in sinu Hudsonis et Canada.  $\text{h}$

16. *graminifolia*, herbacea acaulis, fol. linearibus. L. Hab. in Asia. Statura Anthrici Phalaugii. Fol. valde striata. Flor. ad singulos dentes racemi 4, 5, quae gumma proleunt. L. Filam. incrassata.

814. DIANELLA. *Cor.* aperta. *Filam.* apice tumida s. incrassata. *Bacca* 3. locularis: loculis 4-spermis.

1. *nemorosa*. Lam. enc. 2. p. 276. Les Liliacés. t. 1. Jacq. Schoenb. 1. p. 49. t. 94. Rumph. 5. t. 73. Dracaena ensifolia. Lin. Willd. Sp. II. p. 158. Hab. in Indiae nemoribus. Fol. iridea. Flor. paniculati, straminei. Bacca amphystica.

815. CORDYLINÉ. *Cor.* externo pubescens. *Filam.* simplicia, basi corol. inserta. *Stigm.* subincrassatum. *Bacca* (turbinata) 1-locularis.

1. *hemichrysa*. Commers. Dianella hemichrysa. Lam. Hab. in insula Borboniae, supra arbores et saxa. Fol. radicalia subius flava et pubescentia. (Ex. observat. cel. du Petit-Thouars.)

816. SANSEVIERA. *Cor.* infera, monopetala; tubo filiformi, limbo 6-partito, revoluta. *Stam.* limbo inserta. *Bacca* 1-sperma.

1. *guineensis*, fol. lanceolatis planiusculis uniformibus, stylo staminibus duplo longiore, bracteis tubo corollae triplo brevioribus, flor. sessilibus. Willd. Sp. II. p. 159. Thyrsoflora. Thunb. prod. 65. Aletris hyacinthoides  $\beta$  guineensis L. Jacq. hort. 1. p. 61. t. 84. Aloe guineensis, radice geniculata, fol. ex viridi et atro undulatis variegatis. Comm. hort. 2. p. 39. t. 20. Hab. in Guinea. Bacca lutea.  $\text{h}$

2. *zeylanica*, fol. glabris oblongis acutis lanceolatis canaliculatis, stylo longitudine staminum, bracteis pedunculi longitudine. Willd. Salmia spicata, fol. rigidis canaliculatis maculatis, flor. spicatis. Cav. ic. 3. p. 24. t. 246. Liriope spicata. Loureiro coch. p. 248. Com. hort. 2. p. 41. t. 27. Hab. in Zeylonia. Fol. carnosius minor.  $\text{h}$

3. *lanuginosa*, fol. nervosis; nervis lanuginosis, inferioribus oblongis, reliquis linearibus, stylo staminum longitudine, pedunc. characteratis. Willd. p. 160. Salmia ebractea. Cav. l. c. Rheed. 11. p. 38. t. 42. Hab. in Indiae arenosis.  $\text{h}$  +

817. CONVALARIA. *Cor.* 6-fida (varia). *Bacca* maculosa, 3-locularis, supera.

\* *Cor. campanulatis.*

1. *majalis*, scapo nudo semicylindrico, fol. ovatis. Willd. Sp. II. p. 160. Flor. dan. 1. 854. Hab. in montosis sylvaticis.  $\text{h}$

2. *japonica*, scapo nudo ancipiti, flor. racemosis secundis, fol. linearibus gramineis, scapo triplo longioribus. Lin. suppl. 204. Kaempfer. amoen. 82. ic. Hab. in Japonia.

3? *spicata*, scapo nudo, racemo spicato, flor. aggregatis. Thunb. jap. 141. Hab. in Japonia. Cor. subglobosa violacea. Fruc. obscurus. Thunb.  $\mathcal{T}$  +

\*\*\* *Polygonatum*, oor. *infundibuliformibus*.

4. *verticillata*, foliis verticillatis. L. Flor. dan. t. 86. Engl. bot. t. 128. Hab. in sylvaticis, montosis, precipitiis.  $\mathcal{T}$

5. *Polygonatum*, fol. alternis amplexicaulis, caule ancipiti, pedunc. axillaribus subunifloris. Flor. dan. t. 377. Engl. bot. t. 280. Hab. in nemorosis, rupibus. Flor. gemini, in apice caul.

6. *multiflora*, fol. alternis amplexicaulis, caule tereti, pedunc. axillaribus multifloris. Flor. dan. t. 152. Engl. bot. t. 229. Hab. in Europae et Americae boreal. sylv. montosis. Flor. 3-ni aut subquini apice bini.

7. *latifolia*, fol. alternis amplexicaulis acuminatis, caule angulato, pedunc. axillaribus multifloris. Jacq. austr. 3, t. 232. Hab. in Austriae, Bavariae, Pannoniae sylv.  $\mathcal{T}$

\* *dichotoma*, fol. cordatis amplexicaulis, caule ramoso dichotomo. Cres. in montibus Gebennicis procul Monspelium. Thibaud. Ulterius examinandum an constans sit species. Differentia ex unico specimine eruta est.

8. *umbellulata*, fol. radicalibus oblongo-ovalibus, scapo radicali nudo pubescente umbellula terminali multiflora. Michaux. Flor. 1. p. 202. Hab. in montibus alleghaniis. Flor. odorati, albi aut intus purpureo-maculati.  $\mathcal{T}$

\*\*\* *MAJANTHEMUM*, corol. *rotatis*.

9. *racemosa*, fol. sessilibus, racemo terminali composito. L. Moris. s. 13. t. 4. f. 9. Hab. in Virginia, Canada, et Carol. montibus.

10. *stellata*, fol. alternis amplexicaulis, racemo terminali simplici. Moris. s. 15. c. 4. f. 7. Hab. in Canada. Flores saepius tetrandri. W.  $\mathcal{T}$

11. *trifolia*, pumila fol. amplexicaulis ovali-lanceolatis ternis, racemo terminali simplici. Michaux. 1. p. 202. Gmel. sibir. t. p. 36. t. 6. Hab. in Sibiriae sylv. et in rupibus à sinu Hudsonis ad Quebec.  $\mathcal{T}$

12. *bifolia*, fol. cordatis, flor. tetrandris quadrifidis. Flor. dan. t. 291. Michaux. Flor. 1. p. 201. Hab. in Europae et Americae borealis sylv. Fol. 2-3, interdum oblongo-ovalis.  $\mathcal{T}$

818. *LAPAGERIA*. Cor. 6-petala, basi trigona. *Petala* 3-interiora latiora, subunguiculata. *Antherae* erectae. *Stigm.* clavatum. *Bacca* supera 1-locularis, polysperma. *Sem.* receptaculo triplici, per parietes, decurrenti affixa.

1. *rosea*, fol. ovali-lanceolatis quinque-nerviis. Flor. Peruv. 3. p. 65. t. 297. Hab. in regn. chilensis sylv. Fruticosa, scandens. Cor. magna, rosea aut roseo-punicea intus punctis albis distincta.  $\mathcal{h}$

*Obs.* Hoc genus (dicunt auctores Flor. Peruv.) dicatum est *Joseph. Lapageriae*, lectissimae feminae, Nap. Bonaparte uxori dignissimae, botanices et hist. naturalis *Fautrici* egregiae.

819. *LUSURIAGA*. Cor. infera, 6-petala. *Petala* 3-exteriora angustiora. *Filam.* receptaculo inserta. *Antherae* erectae, sagittatae. *Stigma* 3-angulare. *Bacca* trilocularis: dissepimentum membranaceum. *Semina* bina: 1-passim abortiente.

1. *radicans*, fol. lanceolatis obliquis. Flor. Peruv. 3. p. 66. t. 298. Hab. in regn. chilens. sylv. *Petala* et genitalia albidolutescentia punctis et lineis rubris variegata.

820. *CALLIXENE*. Cor. 6-petala: petalis alternis basi biglandulosis. *Filam.* basi latiora. *Anth.* versatiles. *Stigm.* 3-gonum. *Bacca* supera, 3-locularis, polysperma.

1. *marginata*. Lam. ill. t. 278. Enargia marginat. Gaertn. de sem. 1. p. 203. t. 59. f. 3. Willd. Sp. II. p. 230. Hab. in freto Magellanico. Suffrut. inferne nodosus aphyllus. Flor. solitarii terminales. Fol. marginetumida.

821. *PHILESIA*. Cor. 6-petala: petalis 3-interioribus longioribus. *Filam.* basi connata. *Anth.* loa-

*rac.*, versalites. *Stigm.* 3-lobum. *Bacca* subtrigona, polysperma.

1. *aurifolia*. Willd. p. 231. Lam. ill. t. 248. Habit. cum priore genere. Ramuli flexuosi. Flor. revoluta. Cor. magna. h

822. HERRERIA. *Cor.* infera, 6-partita. *Stigm.* 3-gonum. *Caps.* triquetroalata, 3-locularis, 3-valvis: valvulae septiferæ. *Sem.* margine membranaceo cincta.

1. *stellata*, caul. volubili aculeato, fol. radiatis lineari-ensiformibus. Flor. Per. 3. p. 69. t. 303. f. a. Salsa Few. 2. p. 716. pl. 7. Hab. in R. Chilens. sylvia. Cor. lutescens, odora. h

823. RIPOGONUM. *Cor.* 6-partita, minima. *Antheræ* longæ, tetragonæ, subsessiles. *Bacca* globosa, 2-sperma. *Sem.* hemisphærica.

1. *scandens*. Forst. N. Gen. pl. ic. Hab. in Australia.

824. FLOSCOPA. *Cal.* 3-fidus inferus pilosus (*Cor.* petal. 3-exteriores?). *Petala* 3, ovata. *Caps.* 2-locularis, 1-sperma.

1. *scandens*, caul. scandente, fol. lanceolatis, flor. fastigiato. Loureiro Coch. 1. p. 238. (Ed. Willd.) Hab. in montibus Cochinchinae. Flor. parvus, dilute violaceus. h

825. ONCUS (Oncorhiza). *Cal.* 2-phyllus inferus. *Cor.* 6-fida, campanulata. *Bacca* 3-locularis.

1. *esculentus*, scandens, fol. cordatis subrotundis, spic. laxis. Lour. l. c. p. 240. In Cochinchinae sylvia. Rad. tuber maximum (unde nomen) farinosum, edule. Diccoreae affine genus.

826. POLYANTHES. *Cor.* infundibuliformis incurva. *Filamenta* faucis inserta. *Germen* in fundo corollæ.

1. *tuberosa*, flor. alternis geminis, radiculis tuberosis, scapo squamoso, fol. linearibus longioribus. Flor. Peruv. 3. p. 66. Willd. Sp. II. p. 164. Amica nocturna.

Rumph. 5. t. 98. Hab. sponte in Java et Peruv. Odor flor. gratus.

2. *pygmaea*, fol. oblongo-ovatis scapo longioribus. Willd. p. 165. Jacq. ic. rar. 2. t. 380. Collect. suppl. 56. Hab. ad Cap. b. spei. Planta simillima Agapantho ensifolio, quocum forte proprium format genus. W. & A.

827. DRIMIA. *Cor.* infera campanulata 6-fida, laciniis revolutis. *Stam.* corollæ inserta. *Stigma* capitatum.

1. *ciliaris*, fol. sublinearibus ciliatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 377. Collect. suppl. p. 41. Hab. in Cap. b. spei, cum sequentibus. Flor. albi.

2. *elata*, fol. lanceolato-linearibus glabris glaucescentibus scapo duplo brevioribus. Jacq. ic. rar. 2. t. 373. Collect. sup. 38. Cor. externe virescens.

3. *pusilla*, fol. lanceolatis glabris bas. canaliculatis, floribus erectis. Willd. Sp. p. 165. D. fol. lanceolato-linearibus glabris, scapum aequantibus. Jacq. ic. rar. 2. t. 374. Collect. suppl. 42. Cor. virescentes uti in sequente.

4. *undulata*, fol. lineari-lanceolatis glabris undulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 376. Collect. suppl. 41. Hyacinthus revolutus. Thunb. prod. 64? Hab. ad Cap. b. spei. W. & A.

5. *media*, fol. lineari-subulatis semiteretibus. D. fol. subulatis antice subcanaliculatis glabris. Jacq. ic. rar. 2. t. 375. Coll. suppl. 40.

*Obs.* Totum genus ab Hyacinthis non satis distinctum est; insertio staminum enim in diversis speciebus Hyacinthi variat. Willd. p. 166.

828. HYACINTHUS. *Cor.* erecta campanulata aut subrotunda 6-fida, passim 6-partita: laciniis æqualibus. (Peri 3-melliferi germinis. Lix.) *Stam.* cor. medio inserta. *Caps.* loculi subbispermi.

\* *Corolla* 6-partita. (Scyllolidei.)

1. *Non scriptus*, racemo cernuo: cor. campanulatis sexpartitis apice revolutis. L. Blackw. t. 61. Scilla nutans. Smith. brit. 1. p. 366. Engl. bot. t. 377. Hab. in Angliæ, Galliæ, Hispaniæ, Italiæ nemoribus, vere.

ß. *cernuus*, minor, cor. campanulatis

*sexpartitis* (incarnatis) racemo cernuo. L. H. hispanicus. Clus. hist. 1. p. 177. Hab. in Hispania. Cor. huic basi ventricosior, praecedenti vero minime. L. ¶

2. *convallarioides*, cor. campanulatis *sexpartitis*, fol. subulatis. Willd. p. 168. Lin. suppl. p. 204. Jacq. Schoenb. 1. p. 42. t. 81. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. lutei.

3. *brevifolius*, cor. *sexpartitis*, racemo cernuo, fol. scapo brevioribus. Thunb. prod. 63. Cum priore.

\*\*\* *Corol. campanulata 6-fida.*

4. *amethystinus*, cor. campanulatis semisextifidis basi cylindricis. H. oblongo caeruleo flore, minor. H. minor hispanicus angustifolius. Hab. in Hispania, Russia. ¶

5. *orientalis*, cor. infundibuliformibus semisextifidis basi ventricosis. Hab. in Asia, Africa.

6. *flexuosus*, cor. campanulatis, racemo aereo, fol. linearibus scapo longioribus. Thunb. prod. 64. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

7. *corymbosus*, cor. infundibuliformibus corymbosis erectis, scapo fol. brevior. L. Jacq. Collect. 3. p. 230. t. 19. f. 2. Hab. in Cap. b. spei pascuis. Folia linearia, angustissima, saepius tria. Scapus fol. brevior. Flor. purpurei.

8. *romanus*, cor. campanulatis semisextifidis racemosis, stam. membranaceis. L. Willd. p. 169. Lam. enc. 3. p. 192. Hab. in Italiae cultis et hortis. Cor. campanulatae (cylindrico-ovatae. Capell.) ultra medium sextifidae, albae. L. Transitum ad sequentem divisionem facit.

\*\*\* *Muscari. Corol. ovatis aut cylindricis brevi incis.*

9. *maritimus*, fol. subulatis, racemo teretibus, cor. cylindricis: summis coloratis sessilibus abortivis. Muscari. Desf. atl. 1. p. 388. Hab. ad maris littora prope veterem Carthaginem. Cor. fere H. comosi.

10. *parviflorus*, fol. subulato-feliformibus, racemo terminali brevissimi, flor. distinctis. Muscari parviflorus. Desf. l. c. p. 309. Cresc. cum priore. Affinis. H. racemoso, sed flor. longe rarioribus et cor. superne latioribus. differt. D.

11. *Muscari*, cor. ovatis omnibus aequalibus. Hort. cliff. 126. Hab. in Asia.

12. *comosus*, cor. angulato-cylindricis:

summis sterilibus longius pedicellatis erectis. L. In agris, passim in sylvis.

\* *monstrosus*, flor. paniculatis monstriosis. L. Hort. cliff. 126. H. *paniculatus*, racemo paniculato sterile, pedunc. ramosis coloratis, cor. campanulatis basi acutis. Lam. enc. 3. p. 193. Moris. s. 4. t. 11. f. 2. Hab. in Italia (Paviae.)

13. *botryoides*, cor. globosis uniformibus, fol. canaliculato-cylindricis strictis. Scop. carn. n°. 424. Lob. ic. p. 108.

14. *racemosus*, cor. ovatis uniformibus confertis, summis sessilibus (sterilibus), fol. laxis dependentibus linearibus. Willd. p. 170. Jacq. austr. t. 187. Knorr. del. 1. t. T. 8. H. junciformis. Lam. l. c. p. 194. Hab. in Europa australi.

\*\*\* *ZUCCANONIA. Cor. cylindrica. Petala sria exteriora longiora, lanceolata setacea, saepe reflexa.*

15. *viridis*, petal. exterioribus subulatis longissimis, fol. linearibus canaliculatis scapo longioribus. Lin. Jacq. ic. rar. 1. t. 66. Zuccangnia viridis. Thunb. Dis. N. genera pl. Pars. IX. Lachenalia viridis. Willd. Sp. II. p. 174. Hab. ad Cap. b. spei.

16. *lividus* (H. *serotinus*. L.), flor. secundis, petal. exteriorib. subdistinctis, interioribus condunatis. L. Cav. ic. p. 18. t. 50. Lachenalia serotina. Willd. p. 175. Hab. in Hispania. Cor. fuscescens: pet. longitudine subaequalia. Flor. initio aestatis.

820. *PHORMIUM. Cor. 6-petala, infera: petalis 3 - interioribus longioribus. Stam. adscendentia, exserta. Caps. oblonga, triquetra. Sem. compressa.*

1. *tenax*. Forst. gen. n°. 24. Cook. it. v. 2. t. 96. P. fol. plurimis, inflorescentia ramosa. Lin. suppl. 204. Hab. in N. Zeelandia. Fol. equitantis, ensiformia 2-3-petala. Incolae ex hac planta Lini speciem fabricant.

830. *IACHENALIA. Cor. 6-petala, infera: petalis obtusis 3-interioribus longioribus. Stam. erecta. Caps. subovata, triquetra. Sem. globosa.*

1. *glauca*, cor. campanulatis sessilib., petalis interioribus longioribus patulis obtusis, stylo staminib. longiore, fol. linearilanceolatis glabris. Willd. Sp. II. p. 172.

Jacq. ic. rar. 1. t. 397. Collect. suppl. 39. Hab. ad Cap. b. spei, cum *sequentibus*. Petala exteriora glauco viridia, apicibus rubicundis, interiora albedo-incarnata. Scap. immaculatus.

2. *orchioïdes*, cor. campanulatis sessilibus, stylo longitudine staminum fol. oblongo-lanceolatis margine cartilagineo-crenatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 350. Collect. 3. p. 241. *Phormium Hyacinthoides*. Lin. suppl. 204. Scapus maculatus.

3. *pallida*, cor. campanulatis brevissime pedunculatis, scapo apice angulato fol. lineari-oblongis brevioribus. Willd. L. mediana. Jacq. ic. rar. 2. t. 392. Collect. 3. p. 242.

4. *hyacinthoides*, cor. campanulatis, fol. lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo duplo longioribus. Willd. p. 173. Jacq. ic. rar. 2. t. 382. Collect. suppl. 58. *Hyacinthus orchioïdes*. Jacq. hort. vind. 2. t. 178. Petala tria exteriora, alba externe apice rubicunda et macula viridi notata, interiora alba emarginata.

5. *angustifolia*, cor. campanulatis, petal. interioribus longioribus, patulis obovatis obtusis, fol. lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo longioribus. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 381. Collect. suppl. 47. Scapus rubro-maculatus. Petala alba patentia.

6. *contaminata*, cor. campanulato-cylindraceis, petalis interioribus lanceolatis obtusis erectis, fol. lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo longioribus. Willd. p. 174. L. orthopetala. Jacq. ic. 2. t. 383. Collect. 3. p. 240. Fol. supra maculis obscure rubentibus adpersa.

7. *pusilla*, cor. cylindricis, stam. cor. longioribus, fol. elliptico-linearibus basi attenuatis scapo longioribus patulis. Willd. Jacq. ic. 2. t. 385. Collect. suppl. p. 71. Fol. rubro-maculata. Scapus vix ullus. Flor. alidi adpersa.

8. *patula*, fol. geminis lineari-lanceolatis canaliculatis pulposo-carnosis, ad medietatem erectis, dein reflexis, cor. campanulatis. Jacq. ic. rar. 2. t. 381. Collect. 4. p. 149. Cor. alba, sub apice macula viridi et petal. interioribus ad apicem linea rubicunda notatis.

9. *fragrans*, fol. geminis lineari-lanceolatis planis maculatis glabris, scapo erecto, cor. pedicellatis subcampanulatis. Jacq. Schoenb. 1. p. 43. t. 82. Cor. candida.

10. *liliflora*, fol. geminis ex oblongo lanceolatis dense facie pustulatis, scapo erecto tereti, cor. patentibus reflexis, petalis sublinearibus. Jacq. ic. 2. t. 387. Collect. suppl. 66. Cor. alba.

11. *pustulata*, fol. geminis lanceolato-linearibus pustulatis, scapo triquetro reclinato, flor. subcampanulatis subsessilibus. Jacq. ic. rar. 2. 386. Coll. 3. p. 244. Cor. alba, apice viridis.

12. *purpureo-caerulea*, cor. campanulatis pedunculatis, petalis interioribus obtusis revolutis, stam. cor. longioribus, scapo apice angulato, fol. lanceolatis pustulatis. Willd. p. 177. Andrew. t. 251. Jacq. ic. 2. t. 389. Coll. suppl. 63. Scillam refert, odorata. Fol. erecta.

13. *unicolor*, fol. geminis lineari-lanceolatis, facie rariter pustulatis, scapo erecto tereti, cor. subcylindricis, petalis interioribus apice patulis, genitalibus declinatis. Jacq. ic. 2. t. 389. Coll. suppl. 61. Cor. violacea depressa.

14. *violacea*, fol. geminibus oblongis maculatis, scapo tereti ascendente, racemo erecto pedunculis patentissimis longitudine florum, fol. basi planis propendulis. Jacq. ic. 2. t. 394. Coll. 4. p. 147. Petala exteriora viridia, interiora violacea.

15. *purpurea*, fol. geminis lineari-lanceolatis immaculatis ad oras subtilissime cartilagineo-crenulatis, flor. pedunculatis patentissimis, cor. subcylindricis. Jacq. ic. 2. t. 393. Coll. suppl. p. 65. Hab. ad Cap. b. spei. Pet. exteriora alba, interiora atrosanguinea.

16. *lanceatfolia*, cor. subcampanulatis patentibus, pedunc. corolla triplo longioribus, petalis linearibus obtusis subaequalibus, fol. ovatis acuminatis. Willd. p. 178. Jacq. ic. 2. t. 402. Coll. suppl. 69. Fol. variegata, latissima. Scapi prostrati.

17. *unifolia*, cor. cylindraceis, pedunc. longitudine corollae, petalis interioribus longioribus obtusis inaequalibus, folio solitario lineari-lanceolato. Willd. L. folio unico canaliculato, racemo laxo. Jacq. Schoenb. 1. p. 43. t. 83. Scapus punctatus.

18. *hirta*, cor. campanulatis pedunculatis, fol. linearibus hirtis. Thunb. prod. 64. Hab. in Cap. b. spei aquosis. Fol. unicum basi late vaginans. Flor. racemosi, albocaeulescentes.

19. *isopetala*, cor. cylindraceis pedunculatis, petalis linearibus obtusis subae-



qualibus, scapo apice angulato, fol. lanceolatis deflexis. Willd. p. 179. Jacq. ic. rar. 2. t. 401. Collect. suppl. 68. Cor. albae, apice atro-purpureae.

20. *tricolor* (*aloïdes*), cor. cylindraceis pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus emarginatis, bracteis acutis, fol. lanceolatis. Willd. p. 179. Phormium Aloïdes, fol. binis radicalibus supra fuscomaculatis. Lin. suppl. p. 205. Jacq. ic. rar. 1. t. 61. Les Liliacées. t. 2.

β ? *luteola*, fol. geminis elongato-lanceolatis subimmaculatis, scapo erecto, cor. propendulis cylindricis cum limbo petalorum interiorum patentissimis. Jacq. ic. 2. t. 395. Coll. 4. p. 148.

21. *rubida*, fol. patulis superne planis, cor. cylindraceis brevissime pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus, stylo stom. longiore, fol. oblongis. Willd. p. 179. Jacq. ic. 2. t. 398. Coll. suppl. 60.

22. *tigrina*, fol. subgeminis, basi ad medietatem usque munito amplexantibus et convolutis, dein lanceolatis et patulis acutis maculatis, scapo erecto maculato, flor. cylindricis punctatis pendulis. Jacq. ic. 2. t. 399. Coll. suppl. 67. Willd. p. 180.

23. *punctata*, fol. geminis lineari-lanceolatis canaliculatis utrinque maculatis erectis, scapo erecto maculato paucifloro, flor. cylindricis incurvulis punctatis pendulis. Jacq. ic. 2. t. 395. Collect. 2. p. 323. Scapus rubromaculatus. Petala exteriora incarnata sanguineo-punctata, interiora alba rubropunctata apice flavescentia.

24. *pendula*, fol. ovato-oblongis, cor. cylindraceis, petalis tribus interioribus longioribus integris, flor. pedunc. pendulis. Ait. Kew. 1. p. 461. Andrew. t. 41. Phormium bulbiferum. Cyrill. Neap. fasc. 1. t. 12.

β. *tricolor*, fol. immaculatis. Jacq. ic. 2. t. 400. Coll. 3. p. 239. Petal. exteriora rubra, interiora flavescentia apice violacea. Willd. l. pendula. Jacq.

25. *quadricolor*, fol. geminis lineari-lanceolatis maculatis, scapo erecto, cor. propendulis cylindricis cum limbo petal. interiorum patulo. Jacq. ic. 2. t. 399. Collect. suppl. 62. Andrew. t. 148.

831. *LANARIA*. Cor. supera, lanata, filamentis longior: limbo 6-partito, patulo. *Peric.* 3-loculare.

1. *plumosa*. Ait. Kew. 1. p. 462. Thunb.

*Argolasia*. Juss. Hyacinthus lanatus, cor. lanatis, caule ramo-o. L. Hab. ad Cap. b. spei. Scapus corymbosus.

832. *VELTHEIMIA*. Cor. tubulosa 6-dentata (pendula). Stam. tubo inserta. Caps. membranacea, triolata, loculis monospermis.

1. *viridifolia*, fol. lanceolatis plicato-undulatis obtusis, dentibus limbi rotundatis rectis. Willd. Sp. p. 181. Jacq. hort. Schoenh. 1. p. 47. t. 78. Aletris capensis. L. Hab. ad Cap. b. spei, uti sequentes.

2. *glauca*, acaulis, fol. lanceolatis glaucis, flor. nutantibus, limbo patente. Ait. Kew. 1. p. 463. Jacq. Schoenh. 1. p. 40. t. 77.

3. *sarmentosa*, acaulis, fol. ensiformibus laxis, flor. spicatis, radicibus sarmentosis. Aletris. Andrew. t. 54. Flor. nutantes rubentes, apice pallescunt. Flor. hyeme.

4. *livaria*, acaulis, fol. ensiformibus canaliculatis carinatis. L. sub Aletris. Knorr. del. 1. t. A. 13. Seb. thes. 1. p. 29. t. 19. f. 3. Flor. coccinei.

5. *pumila*, scapo brevior fol. linearibus acute carinatis. Ait. Kew. 1. p. 464. sub Aletris.

833. *ALETIS*. Cor. infundibuliformis, subsextida rugosa. Filam. laciniarum basi inserta. Caps. semiinfera, superne cal. marcido vestita, 3-locularis, polysperma.

1. *farinosa*, acaulis, fol. lanceolatis membranaceis, flor. alternis. Willd. II. p. 183. A. alba, flor. pedicellatis oblongo-tubulosis, cal. fructus laeviusculis farinosis. Michaux. Flor. 1. p. 150. Hab. in in Amer. septentrionali.

2 ? *fragrans*, caulescens, fol. lanceolatis. L. Hab. in Africa. Cav. 10-12-pedalis. Flor. sordide albi circa vespem durante nocte explicati fragrantissimi. Fl. Maj. Jun. h.

3. *aurea*, flor. subsessilibus breviter tubulatis subcampanulatis, cal. fructus rugosis scaberrimis. Michaux. Hab. in Carol.

Obs. Synonyma Plucknetii et Moriconi a Linnæo ad Heloniam bullatam relata, huc pertinent. Michaux. l. c. p. 190.

834. *YUCCA*. *Cor.* campanulato-patens. *Sylus* nullus. *Caps.* 3-6-locularis, apice pertusa.

1. *gloriosa*, fol. lanceolatis latiusculis integerrimis. L. Willd. Sp. II. p. 183. Michaux. Flor. 1. p. 196. Barr. rar. 70. t. 1194. Hab. in Canada, Peru, et Carolinae littoralibus.

2. *aloifolia*, arborescens, fol. lineari-lanceolatis crenulatis strictis. L. Dill. elth. t. 324. f. 416. Hab. in Jamaica, Vera Cruce, Carolina, etc.

3. *draconis*, arborescens, fol. crenatis nutantibus. L. Dill. elth. 437. t. 324. f. 417. Hab. in America. h

4. *filamentosa*, acaulis, fol. lanceolatis serrato-filiferis. L. Trew. Ehret. sel. t. 37. Hab. in Virginiae et Carolinae littoribus. h

835. *ALOE*. *Cor.* tubulosa, ore subsexfido patulo, fundo nectarifero. *Filum.* receptaculo inserta. *Caps.* supera, 3-locularis, 3-valvis, polysperma. *Sem.* biserialia margine membranaceo. (Flor. ore nunc recto, nunc labiato. Fol. carnosa. s. succulenta crassa.)

1. *dichotoma*, caule dichotomo, fol. ensiformibus serratis, flor. paniculatis, stam. cor. ovata longioribus. Willd. Sp. pl. II. p. 184. A. ramosa. Lin. suppl. 206. Patters. iter. t. 3. 4. 5. Thunb. Diss. de Aloë. n.º. 1. Hab. in monte Bockland Cap. b. spei. h

2. *spicata*, caulescens, fol. planis ensiformibus dentatis, flor. spicatis campanulatis horizontalibus. Thunb. Diss. n.º. 2. Lin. suppl. p. 205. Hab. in Cap. b. spei interioribus regionibus. Ex hujus succo optima Gumma-resina Aloës paratur. Th. h +

3. *umbellata*, caulescens, scapo nudo, fol. crassis maculatis margine spinosis, flor. racemoso-umbellatis. Plant. grasses, cum. ic. et descr. A. *maculosa*. Lam. enc. 1. p. 87. A. perfoliata. Lin. Var. ad Cap. b. spei cum omnibus fere speciebus. Flor. majusculi, rubri.

4. *fruticosa*, caulescens, fol. amplexicaulibus reflexis subrecurvis longis margine spinosis. A. arborescens. Plant. grass. ic. Mill. dict. n.º. 3. Lam. l. c. Scap. bract.

obtectus. A. *cornes de belier*. Gall. fol. formam non male exprimit.

5. *ferox*, caul. arborescente, fol. perfoliatis undique spinosis, staminib. cor. duplo longioribus. Plant. grass. ic. Lam. l. c. n.º. 7. Com. prael. t. 19. A. perfoliata S. Act. Flor. spicati densi, parvuli, bract. setaceis suffulti.

6. *rhodacantha*, caulescens, fol. patulis amplexicaulibus margine rubris spinosis, scapo bract. magnis confertis oblecto. Plant. grass. Specium. Phit. ic. 71. Flor. subspicati, primo erecti.

7. *mitraeformis*, caulescens, fol. crassis margine spinosis inferne adpressis spinulosis, racemis umbellatis. Plant. grass. Lam. n.º. 8. Dill. At. t. 17. f. 19. Scap. subramosus, bracteatus. Var. fol. conniventibus et patulis.

*Obs.* Antecedentes et nonnullae sequentes plerumque ut varietates A. *perfoliatae* habitae sunt quare nomen ipsum suppressendum duxi.

8. *succotrina*, caul. fruticoso, fol. oblongo-ensiformibus submaculatis, margine cartilagineo spinoso. Plant. grass. ic. Lam. enc. 1. p. 85. Trew. t. 333. A. perfoliata, succotrina. Ait. Kew. 1. p. 466. Scap. bracteatus. Flor. penduli, rubri apice virescunt.

9. *vera* (*rubescens*), caul. brevi, fol. amplexicaulibus patulis lanceolatis, margine spinoso ex viridi purpurascens, scapo compresso ramoso bracteis minutissimis. A. *rubescens*. Plant. grass. ic. A. vera. Lam. l. c. n.º. 4. Hab. in Indiis. Flor. parvuli rubri.

10. *vulgaris* (*flava*), fol. patulis lanceolatis margine spinosis, scapo ramoso, ramis bract. duplici amplexis. Plant. grass. ic. Lam. l. c. n.º. 3. p. 86. A. barbadensis. Mill. Act. p. 466. Hab. in India. Flor. majusculi, flavescent.

\* *abyssinica*, fol. lanceolatis patulis duriusculis submaculatis, margine spinis-que rubris. Lam. l. c. n.º. 5. A. vulgaris. (6. Plant. grass. A. maculata vera. Forsk. Arab. p. 73. Hab. in Abyssinia.

11. *picta*, caulescens, fol. ensiformibus dentatis pectis patentibus, flor. racemosis reflexis cylindricis. Thunb. Diss. n.º. 4. Thunb. prod. 61. Plant. grass. ic. Fol. margine spinosa, maculata. Flor. obscure rubri, spicati.

12. *sinuata*, caulescens, fol. ensiformibus sinuato-serratis reflexis, floribus

*racemosis erectis cylindricis*. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 5. Thunb. prod. 61. *A. barbadensis* mitor laete virens et splendens. Dill. elth. p. 23. t. 19. f. 20. Caul. spithameus flexuoso-erectus inaequalis. Thunb. †

13. *humilis*, acaulis, scapo bracteato, fol. trigonis subulatis aculeatis, flor. racemosis reflexis, cylindricis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 6. Les Plant. grass. ic. Flor. longi, rubri apice virides.

14. *arachnoides*, acaulis, fol. caespitosis glaucescentib. trigonis cuspidatis ciliatis, flor. subspicatis erectis cylindricis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 7. Thunb. prod. 61. Plant. grasses. ic. Cor. labiata, albicans. Hab. ad Cap. b. spei in Carro juxta Swartkops Zoutpan. †

15. *atrovirens*, fol. caespitosis patulis brevibus apice trifariis: angulis spinosis, lateribus subtuberculatis. Plant. grass. ic. *A. arachnoides*. β. Thunb. Willd. p. 188. Cor. fuscescens sublabiata.

16. *brevifolia*, fol. caespitosis brevissimis glaucis apice trigonis, margine spinosis, scapo bract. numerosis. Plant. grass. ic. *A. perfoliata*. S. Lin. Comm. Nar. t. 45. Aloës ertichaut. Gall. Flor. congesti penduli rubri.

17. *Serra*, caulesc., fol. caespitosis patulis margine spinosis: spinis inferioribus approximatis coalitis; superioribus remotis, medio subspinosis, scapo dense bracteato. Plant. grass. ic. Flor. rubri.

β? *verrucosa*, acaulis, fol. ensiformib. acutis papillois distichis, flor. racemosis reflexis clavatis. Ait. Kew. t. p. 488. Comm. hort. 2. p. 17. t. 9. *A. carinata*. β. *ensiformis*, fol. ensiformibus planiusculis. Plant. grasses.

18. *carinata*, acaulis, fol. subdistichis acinaciformibus papillois, flor. racemosis cernuis curvatis. Ait. Kew. t. p. 469. Plant. grass. ic. Dill. elth. 22. t. 18. f. 20. Flor. basi ventricosi rubri, apice virides.

19. *maculata*, acaulis, fol. linguiformibus glabris pictis, floribus racemosis cernuis curvatis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 10. Thunb. prod. 5. Hab. ad Cap. b. spei in Hautniquas montibus. †

20. *linguaeformis*, caulinis, fol. linguiformibus subdentulatis glabris distichis, flor. racemosis erectis cylindricis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 11. Thunb. prod. 61. Ait. Kew. t. p. 469. Lin. suppl. 206.

β. *disticha*, flor. racemosis pendulis ovato-cylindricis curvis. L. *Linguaeformis*. Plant. grass. ic.

21. *plicatilis*, subacaulis, fol. linguaeformibus inermibus laevibus distichis, flor. racemosis pendulis cylindricis. Ait. Kew. t. p. 470. Plant. grasses. ic. Curt. mag. t. 457. Flor. rubri, suberecti.

22. *variegata*, subacaulis, fol. trifariis pictis canaliculatis, angulis cartilagineis, flor. racemosis cylindricis. Thunb. Diss. n<sup>o</sup>. 12. Plant. grass. ic. Hab. in Aethiopiae argillosis. Flor. longi, subcurvi, penduli, rubelli. Fol. maculis albis variegata.

23. *viscosa*, subcaulescens, fol. imbricatis trifariis ovatis, flor. racemosis cernuis subbilabiatis. Plant. grass. ic. *A. africana* erecta triangularis et triangulari fol. viscoso. Com. prael. 82. t. 31. Dill. elth. 15. t. 13. f. 13. Hab. in Cap. b. spei campestris. Fol. in cultis saltem non viscosa. Cor. acuminata. †

24. *rigida*, subcaulescens, fol. inermibus, superioribus subspiralibus, patulis rigidis acuminatis. Plant. grass. ic. Cor. bilabiata albedo-virescens. Fol. superiora quoad iconem, rubescunt.

25. *spiralis*, subcaulescens, fol. ovatis, octofariis imbricatis, flor. racemosis recurvis. Thunb. *A. spiralis*, subcaulescens, fol. inermibus ovato-acutis imbricatis octofariis, flor. cylindricis obtusis transverse rugosis. Plant. grass. ic.

26. *margaritifera*, acaulis, fol. subtrigonis acuminatis, tuberculis cartilagineis undique adpersis. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 14. Plant. grass. ic. Aloë *pumila*. Lin. cum varietatib. Flor. erecti? (cernui Ait.) albi subbilabiati. Quoad magnitudinem variat. vid. Willd. p. 188.

27. *retusa*, acaulis, fol. quinquefariis deltoideis. Thunb. prod. 61. Plant. grass. ic. Cor. albicans bilabiata: labio inferiore revoluto. Fol. apice depresso-triquetra. Hab. in Africae argillosis. †

836. AGAVE. Cor. erecta supera tubulosa aut infundibuliformis. Filam. cor. longiora, erecta. Caps. (infera) triangularis, polysperma. (Caps. situ a praecedente genere differt.)

1. *americana*, acaulis, fol. dentato-spinosis, scapo procero, staminibus longioribus, stylo staminibus longiore. Lin.

Willd. Sp. II. p. 192.  $\beta$ . Aloë *variegata*, folior. margine luteo. Hab. in America calidior. Hodie ab ea sepes in Lusitania, et Helvetia. In vario usu apud Peruvianos est; vidl. Flor. Peruv. 3. p. 66. Ex foliis filis et papyrus praeparari possunt.

2. *vivipara*, acaulis, fol. dentatis, scapo ramoso, tubo corollae medio angustato, staminibus corollam aequantibus Willd. Comm. prael. 65. t. 15. Rumph. 5. t. 94. Hab. in America. Panic. bulbifera. Fol. dilatata.  $\eta$

3. *virginica*, acaulis herbacea, fol. cartilagineo-serratis, scapo simplicissimo. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 378. Collect. 2. p. 261. Hab. in Virginia.  $\zeta$

4. *lurida*, subcaulescens, fol. dentato-spinosis, scapo ramoso; stylo staminibus breviori. Hab. in America meridionali. Simillima A. americanae, cor. virescens nec lutea.

5. *tuberosa*, caulescens, fol. dentato-spinosis, rad. tuberosa. Ait. Kew. 1. p. 472. Mill. dict. n<sup>o</sup>. 4.  $\beta$ . spinis duplicibus. Hab. in America.  $\eta$  +

+ **Фуцкжа**. Cor. campanulata, 6-partita, supera. Stam. glandulae inserta, deorsum incrassata, compressa, apice subulata. Caps. infera trilocularis, trivalvis, polysperma.

6. *faetida*, caulescens, fol. integerrimis. L. Furcraea gigantea. Vent. in Bull. Philom. n<sup>o</sup>. 28. Plantae grassc. ic. Jacq. ic. rar. 2. t. 339. Collect. 2. p. 312. Panic. ampla, multiflora. Cor. albido-virescens.  $\eta$

7. *odorata*, acaulis, fol. ciliato-spinosis. Agave cubensis. Jacq. amer. Ed. pict. t. 260. f. 25. Willd. p. 193. A. mexicana, Lam. enc. 1. p. 52. Hab. in Ins. Cuba et Mexico.

Obs. Ob Corol. *hexapetalam* (quae odorem spirat gratum) et filam. (ex Jacquino) basi obovata, compressa, omniumque crassissima, desinentia in superiorem partem subulatam, hanc speciem huic divisioni, s. generi diverso? adnumeravi.

837. **ALSTROEMERIA**. Cor. 6-petala campanulata. aut subbilabiata: petalis 2-inferioribus basi semitubulosis. Stam. declinata, aut erecta. Stigm. 3, linearia. Caps. subrotundo-ovalis, 3-6-angularis, 3-valvis, aut intus pulposa non

dehiscens. Sem. plura, globosa. (Flor. umbellati. Fol. saepius ob petiolos contortos resupinata.)

\* *Caul. erecto aut assurgente.*

1. *peregrina*, caul. erecto-assurgente, fol. lineari-lanceolatis contortis, flor. 2-6. petal. exteriorib. obcordatis acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 58. t. 288. Jacq. hort. t. 50. Curt. mag. t. 139. Willd. Sp. II. p. 194. Hab. in Peruviae et chilensis collibus, praeruptis, maritimis arenosis et glareosis. Rad. tuberoso-pendula longissima.

Obs. Vox *Pelegrina* ab Hispanis in regno Peruviano usitata, significat flos superbus. Willd. l. c. vulgo *Peregrina* non *Pelegrina* appellatur. Flor. Per. l. c.

2. *Ligtu*, caule erecto, fol. spathulato-oblongis, pedunc. umbellae involucri longioribus, cor. bilabiata. Lin. suppl. 207. A. *Ligtu*, caul. erecto, fol. lanceolato-linearibus, flor. umbellatis, petal. subconformibus. Flor. Per. p. 59. Trew. obs. 2. pl. 4. Hab. in Lima et passim in arenosis conceptionis urbis R. chilens. Vernacule *Liutu* (farina e radice praeparata.)  $\zeta$

3. *revoluta*, caul. erecto, fol. lanceolatis, petal. reflexis: interioribus minoribus. Flor. Per. 3. p. 59. Hab. in R. chilensis collibus Prov. Acre. Petal. purpurea, interiora a medio ad basin lutea: punct. purpureis variegata. Rad. hujus et a sequentium ut in priore.

4. *versicolor*, caul. erecto, fol. lanceolato-linearibus, umbel. 2-3-flora, petal. internis angustioribus: infimo brevior, latiore. Fl. Peruv. l. c. Cum priore, in collib. aridis altis. Pet. lutea macul. purpureis.  $\zeta$

5. *haemantha*, caul. erecto, fol. lineari-lanceolatis ciliatis, umb. subsexradiata, pedunc. bifloris, petal. exteriorib. serratis. Flor. Per. p. 60. Cresc. in collib. ruderalis. Petal. sanguinei coloris, 2-interiora longiora, lin. luteis variegata. Var. petal. albido-purpureis et luteo variegatis. l. c.

6. *lineatiflora*, caul. erecto, fol. lanceolatis, umb. 4-7-radiata, pedunc. bifloris basi folio minori suffultis, petal. serratis lineatis. Flor. Per. p. 60. Hab. in Peruv. collibus. Rad. tuberoso-pendula. Petal. purpurea, 2-interiora col. luteo et purpureo variegata.

7. *distichifolia*, caul. ascendente, fol. distichis oblongo-lanceolatis, umb. 3-8-flora, petal. aequalibus: interiorib. planis.

Flor. Per. l. c. t. 287. In Andium nemoribus et in Munae montib. altis. Cor. punicea. Caps. non dehiscentes. Sem. pauc. pulpa nidulantis. l. c.  $\mathcal{T}$

8. *secundifolia*, caul. dependente, fol. secundis lanceolatis acutissimis subtus albis, umbel. subquinqueflora, flor. hirsutis. Cum priore. Pet. 3-interiora lutea punct. nigris maculata, a, ice virida. Stigm. lanuginosa.

\* \* *Caul. volubili.*

9. *Salsilla*, caule volubili, fol. petiolatis lanceolatis acuminatis, umb. ramosa, pedunc. involucri longioribus bracteatis laxis. Lin. suppl. 206. Pedunc. dichotomis trifloris. Flor. Per. p. 61. Fewill. peruv. 2. p. 713. t. 6. Hab. in Lima, et R. chilensis sylvis. Petal. obovata - cuneiformia, tria interiora ad basin macula violacea. Flor. Peruv.

10. *ovata*, caule volubili, fol. lanceolatis, superiori pagina lanuginosis, inferiori lucidis, flor. umbellatis, cor. tubulosis. Cav. ic. 1. p. 54. t. 76. Hab. in Peru. Petal. tria exteriora coccinea apice viridia; interiora viridia, punctis nigris variegata. Caps. magna 6-sulcata. Fol. obliqua. C.

11. *anceps*, caul. volubili ancipiti, fol. lanceolatis acutis, umb. 17 - flora, pet. aequalibus punct. atro - purpureis. Flor. Peruv. p. 61. In Andium nemorib. Fol. lineata.

12. *rosea*, caul. volubili tereti, fol. ovato-lanceolatis, umb. 18-radiata, petal. interiorib. lineis nigris maculatis. Fl. Per. l. c. Cum priore. Pet. rosea. Fol. subtus pubescentia.  $\mathcal{T}$

13. *crocea*, caul. volub. tereti, fol. lineari-lanceolatis subtus pubescentibus, umb. multiflora, petal. aequalib. croceis. Fl. Per. l. c. Fol. sparsa, acutissima, basi contorta. Hab. in Peru.

14. *bracteata*, caul. volubili, fol. lanceolata-linearibus, umb. 5-partita sub 12-flora, petal. interioribus spathulatis. Fl. Per. Petal. purpurea, interiora viridia, basi lutea, marg. punct. violacea.

15. *fimbriata*, caul. volubili, fol. lanceolatis angustis, umb. multiflora, petal. interiorib. fimbriatis. Fl. Peruv. p. 63. Cor. luteo-croceo variegata. Petioli contorti.  $\mathcal{T}$

16. *latifolia*, caul. volubili, fol. oblongo-ovatis acuminatis, umb. multiflora, pedunc. 1-3-floris, cor. rubro-viridi. Fl. Per. p. 64. In Peruv. collibus, Lomas dictis Pet. interiora punct. et lineis violaceis variegata.  $\mathcal{T}$

17. *tomentosa*, caul. subvolubili; fol. lanceolatis margine reflexis subtus tomentosis, umb. multiflora; radiis bifloris. Fl. Per. p. 62. t. 292. In Andium nemorib. locis frigidis et pluviosis. Pet. exteriora coccinea, interiora lutescentia. Sem. in pulpa dulci, eduli, nidulantur. Affinis A. *ovatae*. Cav.  $\mathcal{T}$

\* \* \* *Caul. scandente.*

18. *setacea*, caul. scandente, fol. lanceolatis, umb. simplici radiis numerosis, bracteol. setaceis, cor. parva. Flor. Per. p. 62. t. 292. Hab. in Peru. Andium nemorib. Pet. exteriora punicea, interiora spathuleta lutea.  $\mathcal{T}$

19. *denticulata*, caul. scandente, fol. lanceolato-ovatis acutissimis, margine repando-denticulatis, flor. umbellato-corymbosis. Flor. Per. l. c. t. 293. Cum priore in montib. altissimis, pluviosis. Cor. rubrolutescens.  $\mathcal{T}$

20. *purpurea*, caul. scandente, fol. lanceolatis angulatis subtus pubescentibus, flor. corymbosis subumbellatisque purpureis. Fl. Per. p. 61. t. 294. Hab. versus Pillae vicum. Caps. subturbinata, trigono-alata.

21. *macrocarpa*, caul. scandente, fol. oblongo-lanceolatis, umb. multiradiata, pedunc. bifloris longissimis. l. c. Cum priore. Cor. rubro-lutescent. Caps. nunc. Igland. magnitudine intus pulposa. An diversa ab A. *ovata*. Cav. ?

22. *cordifolia*, caul. scandente, fol. cordatis acuminatis, umb. sexradiata, pedunc. 2-3-floris. Flor. Per. p. 64. t. 290. Cor. rubicundo-lutescens.

23. *formosa*, caul. scandente, fol. lanceolatis longis, umb. semiglobosa, flor. numerosis puniceo-luteis punctatis. Flor. Per. p. 64. t. 266. Hab. in Andium nemorib. ad Munna.

Obs. *Alstroemeria pulchella et formosa*. Lin. suppl. pl. p. 206. et 207, hic sunt omissae, cum forte cum una alterave specie ex tam multis enumeratis, quarum ampla descriptio in Flor. Peruviana extat (ubi vero earum nulla mentio est facta) conveniant.

338. *HEMEROCALLIS*. Cor. campanulata: tubo cylindrico. Stam. declinata. Stigma parvulum, simplex, villosulum.

\* *Fol. oblongis sublanceolatis.*

1. *flava*, fol. lato linearibus carinatis,

petalis planis acutis, nervisque petalorum indivisis. Willd. Sp. II. p. 197. Jacq. hort. t. 137. Les Liliacées. t. 15. Hab. in Helvetiæ, Sibiriae, Hungariae campis. Cor. flava.

2. *graminea*, fol. angusto-linearibus carinatis gramineis, petal. tribus interioribus majoribus undulatis. Andrew. t. 244. Hab. in Europa septentrionali. Media inter priorem et sequentem speciem, cum qua flore fere conveniunt. Cor. extus brunnea, odorata. A. +

3. *fulva*, fol. linearibus (lanceolatis) carinatis, petalis tribus interioribus obtusius undulatis, nervisque petalorum exterioribus ramosis. Willd. Les Liliacées. t. 16. Hab. in China. Flor. e longinquo Liliium bulbiferum s. croceum referunt. ¶

4. *lancifolia*, fol. oblongis utrinque attenuatis. Willd. Hab. in Japonia. ¶

\*\* *Fol. latis subcordatis petiolatis.*

5. *alba*, fol. ovato-cordatis, cor. tubo longo, bract. pedicellis longioribus. Andrew. t. 194. H. *japonica*. Thunb. Willd. p. 198. Les Liliacées. t. 3. Hab. in Japonia. Cor. candida, odorata. Flor. Jul., Aug. in caldariis.

*Obs.* Secundum mentem clar. Andrew I. c. ut synonymia huc referenda sunt Liliium longiflorum et L. japonicum. Willd. L. candidum. Thunb. Fl. japon.?

6. *caerulea*, fol. cordatis, membranaceis brevibus, cor. limbo campanulato. H. caerulea. Vent. Malm. t. 18. Andrew. t. 6. Hab. in China. An huc Liliium cordifolium. Willd. Vid. Andrew. *Obs.* I. c.

839. ACORUS. *Spadix* cylindricus, tectus flosculis. *Cor.* 6-petala, nuda. *Stylus* o. *Caps.* 3-locularis.

1. *Calamus*, scapi mucrone longissimo foliaceo. Ait. Kew. t. p. 474. Moris. s. 8. t. 13. f. 4. (β. A. asiaticus, radice tenuiore. Herm. lugdb. g. Rumph. amb. 5. t. 72. f. 1. Rheed. 11. t. 60. Habit. in Europae, et Indiae fossis. ¶

2. *gramineus*, scapi mucrone spadiceo vix excedente. Ait. Kew. t. p. 474. Hab. in China. Vere flor. proferit praecedentis similis. ¶

840. ORONTIUM. *Spadix* cylindricus, tectus flosculis. *Cor.* 6-

petala, nuda. *Stylus* nullus. *Folliculi* 1-spermi.

1. *aquaticum*, fol. lanceolato-ovatis venosis. Ait. Kew. t. p. 474. Willd. p. 199. Lam. ill. gen. f. 251. Hab. in Virginiae, Canadae paludibus, scaturiginibus. ¶

2. *japonicum*, fol. ensiformibus venosis. Thunb. jap. 144. Bank. Ic. Kaempf. t. 12. Hab. in Japonia. Fol. sunt nervosa nec venosa. Willd. ¶

841. TACCA. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 6-petala, calyci inserta, antherifera. *Stigma* stellatum. *Bacca* sicca, 6-angularis, polysperma, infera.

1. *pinnatifida*, Lin. suppl. p. 251. Lam. ill. t. 232. Leontice Leontopetaloides, fol. simplicibus tripartito-multifidis, cor. monopetalis calyculatis. L. Sp. pl. p. 448. Tacca littorea. Rumph. amb. 5. t. 114. Hab. in India orientali et Tabeni. Fol. similis Dracontio polyphylo. ¶

842. CORYPHA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* globosum, magnum, osseum.

1. *umbraculifera*, frondibus pinnato-palmatis plicatis, petiolis ciliato-spinosis, spadice erecta. Lam. enc. 2. p. 130. Rheed. 3. t. 1-22. Hab. in India. Altitudine 60-700 pedum, et vix floret ante 30. s. 40 aetatis annum, ubi tunc perit. Fol. amplissimum.

2. *rotundifolia*, frondib. orbiculatis palmato-peltatis radiatum plicatilibus petiolis ciliato-spinosis, spadice pendulo. Lam. enc. 2. p. 131. C. Saribus. Gmel. Syst. II. p. 569. Saribus Rumph. t. 1. t. 8. Houttuyn. t. 2. f. 1. 2. Hab. in Moluccis. ¶

*Obs.* C. minor, frondib. palmatis flabelliformibus plicatis subtrifidis, filis interjectis paucis, stipitib. inermibus. Jacq. hort. ut peculiare genus nunc sub nomine Sabal a coryphis separatur.

843. LICUALA. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-partita. *Nect.* truncatum sertiforme. *Drupa* 1-sperma.

1. *spinosa*. Willd. Sp. II. p. 201. Thunb. N. pl. Gen. 3. p. 70. Rumph. t. p. 43. t. 9. Hab. in Moluccis. Frons palmata, laciniis pinnaribus apice truncatis dentatis. W. ¶

844. THIRINAX. *Cal.* 6-dentatus.

*Cor. o. Stigma* infundibuliforme, obliquum. *Bacca* monosperma.

1. *parviflora*. Swartz. Fl. ind. occid. t. p. 614. Willd. p. 202. *Corypha palmacea*, fol. flabelliformibus cum appendiculo ad imum, petiolis tenuioribus flexilibus compressis. Brown. Jam. 190. Hab. in maritimis et aridis Jamaicae, Hispaniolae. Palma 10-20 pedalis. h

845. *CALAMUS*. Cal. 6-phyllus.

*Cor. o. Bacca* exarida, 1-sperma, retrorsum imbricata.

1. *Rotang*, caudice densissime aculeato, aculeis erectis, spadice erecto. Willd. Sp. II. p. 202. C. petraeus. Loureiro coch. p. 260. Rheed. t. 64. 65. Rumph. amb. 5. p. 88. t. 151. Hab. in Indiae sylvis juxta fluentia. h

2. *verus*, frondibus longissimis, spinis confertis longis, spadice brevi, corolla tripetala. Loureiro. Flor. coch. p. 261. Rumph. 5. t. 54. Hab. ad fluviorum ripas Indiae orientalis. Caudex solitarius. Rumph. l. c. h

3. *Draco*, aculeis caudicis adpressis, frondium patentibus, spadice erecto. Willd. p. 203. Rumph. 5. t. 58. f. 1. Hab. in India orientali. h

4. *niger*, aculeis caudicis et frondium horizontalibus, spadice coarctato pendulo. Rumph. 5. p. 101. t. 52. In litoribus Indiae orientalis. Aculei fusco-nigricantes. h

5. *viminalis*, aculeis caudicis patentibus, frondium distantibus reflexis, spadice nuntante. Rumph. 5. t. 55. Hab. in sylvis humentibus Javae et Celebis. h

6. *albus*, aculeis caudicis reflexis, spadice divaricato recto. C. rudentum, caule longissimo aequali, spinis inversis. Lour. coch. p. 260. Rumph. 5. p. 122. t. 52. Vulgatissima species.

7. *equestris*, aculeis caudicis erecto-patentibus, frondium uncinatis, foliolis ellipticis utrinque attenuatis, spadice erecto. Willd. p. 204. Rumph. 5. t. 56. et t. 57. f. 1. Hab. in humidis saxosis Amboinae. h

8. *Zalacca*, aculeis patentibus, spadice radicali. W. Gaert. de fr. et sem. 2. p. 267. t. 139. f. 2. Hab. in sylvis humentibus Javae orientalis, Balesae et Bandae. Fruct. trispermus.

846. *IUNCUS*. Cal. 6-phyllus, persistens. *Cor. o. Stigmata* 3. *Caps.*

1-locularis, 3-valvis. *Sem.* plurima.

\* *Culmis nudis*, (*panicula ut plurimum laterali*.)

1. *acutus*, culmo nudo tereti mucronato, panicula terminali, involucri diphylo spinoso, caps. subrotundis mucronatis. Smith. Brit. t. p. 324. Borel. ic. t. 203. f. 2. Hab. in arenosis maritimis. Caps. triquetrum-subrotunda.

2. *maritimus*, culm. nudo tereti, panic. terminali prolifera, involucri diphylo spinoso erecto, caps. oblongis. Smith. l. c. p. 375. Moris. s. 8. t. 10. f. 15. Cum priore. Caps. prismatica, oblonga.

3. *conglomeratus*, culmo nudo stricto, panicula laterali coarctato-capitata, flor. triandris. Leers. herb. t. 13. f. 1. Fl. dan. t. 1094. Hab. in Europae uliginosis, in pascuis, etc.

4. *effusus*, culmo nudo stricto, panicula laterali, flor. oblongis, caps. obtusa. Flor. dan. t. 1096. Leers. t. 13. f. 2. Hab. in Europae et Americae uliginosis. h

5. *glaucus*, culmo nudo glauco apice inflexo, panicula laterali effusa, ramis elongatis, flor. et caps. acuminatis. Willd. p. 205. Flor. dan. t. 1159. Engl. bot. t. 665. Hab. in ulis. h

6. *inflexus*, culmo nudo, apice membranaceo incurvo, panicula laterali. Moris. s. 8. t. 10. f. 25. Barr. ic. 204. Hab. in Europa australi. Planta obscura. h

7. *rigidus*, culm. nudo superne incurvo pungente, panic. laterali elongata, pedunc. compressis nodosis, cal. mucronato. Desf. Atl. t. p. 312. In arenis ad maris littora. Caps. ? Fol. ?

8. *arcticus*, culmo nudo stricto, umbella laterali, pedunc. multifloris, flor. sessilibus. Willd. p. 206. Fl. dan. t. 1095. Hab. in alpinis Norvegiae, Lapponiae. J. Jacquini similissimus. h

9. *filiformis*, culmo nudo filiformi nuntante, panicula laterali, bracteata subimplici, caps. subrotundis. Smith. Brit. t. p. 372. Pluck. Phyt. t. 40. f. 8. In Europae uliginoso-paludosis turfosis, alpinis. Habitat praecedentium sed minor. Rad. valde repens. Sm.

10. *setaceus*, culmo nudo filiformi nuntante, umbel. laterali composita pauciflora, pedunc. multifloris, petal. subulatis. Rostock de Juncq. Berol. 1801. p. 13. t. 1.

12. Hab. in Pennsylvania. Affinis priori, sed pedunc. ramosis, etc. differt.  $\overline{\text{L}}$

11. *capillaceus*, culmo nudo capillaceo, panicula laterali brevissima, caps. calyce majoribus. Lam. enc. 3. p. 266. Hab. in Brasilia prope Monte-Video.

12. *grandiflorus*, culmo nudo unifloro. fol. teretibus, foliolis calycinis linearisubulatis longissimis inaequalibus. Lam. enc. 3. p. 266. Lin. suppl. 209. Forst. in Comment. Goett. 9. p. 27. t. 5. Hab. in freto Magellanico inque Terra del Fuego. Flos culmum terminans, unicus, magnus.

13. *magellanicus*, culmo nudo unifloro, fol. planiusculis angustissimis culmo longioribus, flore laterali. Lam. l. c. 3. p. 266. Hab. in freto Magellanico. Culmi filiformes angulosi nudi. Germen subrotundum atrum.

14. *rubens*, culmo nudo basi vaginis vestito, involucri spathaceo multifloro terminali. Lam. p. 266. Hab. in Brasilia prope Monte-Video. Capitula sunt e flor. binis vel tribus composita, et squamis totidem longitudine fere florum munita.  $\overline{\text{L}}$

15. *trifidus*, culmo nudo, fol. floribusque tribus terminalibus.  $\overline{\text{L}}$  Flor. dan. t. 107. Hab. in alpinis. Fol. longa, stricta.

16. *monanthos*, culm. folioso 1-floro, fol. subulatis. Hoffm. germ. l. p. 165. Jacq. obs. n.º 33. s. 4. t. 1.

17. *squarrosus*, culmo nudo, fol. setaceis subdistichis, capitulis terminalibus glomeratis aphyllis. Flor. dan. t. 430. Hab. in arenosis, uliginosis. Fol. rigida, squarrosa.  $\overline{\text{L}}$

18. *cymosus*, culm. nudo subanguloso, fol. planis, panic. terminali cymosa, involucri bivalvi. Lam. enc. 3. p. 267. Hab. ad Cap. b. spei. Culm. 8-9-uncialis. Panic. subumbelliformis.

19. *pygmaeus (pallens)*, caespitosus, fol. linearis-setaceis, capitul. pedunculatis: primario sessili, flore linearibus obtusis. Thunb. Flor. Paris. Habitu in uliginosis. Culm. nudus, basi ruler. Involucri. 1-2-pyllum, alterum longius.

20. *capensis*, culmo aphylo compresso, capitulis sessilibus pedunculatisque. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. b. spei.  $\overline{\text{L}}$

21. *marginatus*, fol. planis glabris, corymbo terminali simpliciter prolifero, capit. sub-10-floris, petal. caps. obtusam aequantibus. Rostk. Junc. p. 30. t. 2. f. 3. Hab. in Pennsylvania.

22. *nodosus*, fol. nodoso-articulatis teretibus, corymbo simplice, capitul. globosis, caps. acuminatis corol. longioribus. Rostk. l. c. t. 2. f. 2. Hab. in Amer. boreali.

23. *polycephalus*, fol. nodoso-articulatis, capit. globosis multifloris subpaniculatis, flor. linearib. 3-andris. Michaux. t. p. 192. Var. fol. crassioribus compressis et (*tenuifolius*) fol. subfiliformibus. Hab. in Georgia et Carolina.

24. *alpinus*, humilis, fol. articulatis, panic. simplicissimam subaequantib., capit. laterali terminalique subpedunculata. Villars. Delph. 2. p. 233. Hall. helv. n.º 1321. J. articulatus.  $\beta$ . Willd. p. 211. Hab. in Helv. et Delphin. alpinis, cum quoque legi in uliginosis in Monte aureo (Mont'or en Auvergne). Flor. nigricant. Culm. 5-6-pollicaris. Caps. obtusae.  $\overline{\text{L}}$

**\*\* Culmis foliosis.**

25. *punctorius*, culmo nudo tereti, folio tereti articulato mucronato, panicula glomerata. Lin. suppl. 20. Conf. Lam. l. c. p. 266. Affinitas J. articulati sed omnia robustiora.  $\overline{\text{L}}$

26. *aquaticus*, culmo adscendente, fol. nodoso-articulatis compresso-teretiusculis, panicula composita, etal. (foliolis calycinis) aequalib. obtusiusculis. Willd. p. 212. (J. articulatus.)  $\gamma$ . *aquaticus*. Roth. germ. p. 401.  $\gamma$ . *obtusiflorus*, fol. nodoso-articulatis, flor. obtusis. Hoffm. germ. p. 166. Hab. in Europae aquis.  $\overline{\text{L}}$

27. *sylvaticus*, culmo erecto, fol. nodoso-articulatis teretibus, panicula supra-decomposita, petalis aristatis interioribus longioribus. Willd. l. *acutiflorus*, fol. nodoso-articulatis, flor. acutis. Hoffm.  $\beta$ . *utriculosa*, flor. in fol. excrecentibus. Gramen junceum folio articuloso cum utriculis. Bauh. prod. 12. Hab. in nemoribus humilibus, in uliginosis.  $\overline{\text{L}}$

28. *verticillatus*, culmo decumbente radicante, fol. setaceis, flor. glomeratis verticillatis, glomerulis foliosis. Willd. p. 212.  $\gamma$ . *uliginosus*. Roth. Flor. dan. t. 817.  $\beta$ . *Asiaticus*, caul. longis, radicante. Lam. enc. 3. p. 26. Mich. p. 101. J. *stolonifer*. Wobleben. Flor. Hallens. suppl. p. 13. c. 10. Wulf. in Jacq. Collect. 3. p. 31.  $\gamma$ . *sapiens*, culmo erecto humiliore, dichotomo, fol. canaliculatis filiformibus, capitulo triphylo. Moench. bass. Fl. dan. t. 106. Hab. in Europa et America boreali, locis uliginosis et palludibus,  $\gamma$  in siccioribus.  $\overline{\text{L}}$

29. *acuminatus*,



27. *acuminatus*, culm. folioso erecto, fol. subnodoso-articulatis, panic. terminali composita : glomerulis pedunculatis sessilibusque, flor. acuminatis triandris. Michaux. Flor. 1. p. 192. Hab. in Carol. inferiore. Facie J. articulati.

28. *Tenageja (Vaillantii)*, culmo ramoso paniculato, flor. solitariis sessilibus, petalis ovato-oblongis, capsula subglobosa. Lin. suppl. p. 208. Flor. dan. t. 1160. Vaill. par. t. 20. f. 1. J. Vaillantii. Thuill. par. Hab. in paludosis exsiccatis. ☉

29. *aristatus*, rad. bulbosa, culm. folioso erecto compresso, fol. angustis subcanaliculatis, panic. composita, flor. triandris, cal. bracteisque aristatis. Michaux. l. c. Hab. in Georg. et Carolina. Facie J. bulbosi. Petala exteriora aristata.

30. *bulbosus*, culmo subcompresso indiviso, fol. linearibus canaliculatis, corymbo terminali, petal. obtusis capsula subrotunda obtusa brevioribus. Willd. p. 213. l. fol. linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. L. Flor. dan. t. 431. l. compressus. Jacq. Moris. s. 8. t. 9. f. 11. Hab. in pascuis, humidis ad vias. Rad. bulbosa ? ☞

31. *multiflorus*, culm. inferne nodoso folioso, fol. teretibus, panic. terminali elongata erecta, pedunc. inaequalibus multifloram decompositis fasciculatis. Desf. Atl. 1. p. 313. t. 91. Hab. in Barbariae paludibus. Flor. J. effusi s. glauci. D.

32. *foliosus*, culm. nodoso ramoso folioso, fol. canaliculatis, panic. terminali erecta, lacin. cal. aciformibus. Desf. p. 313. t. 92. Hab. in Algeriae paludibus. Flor. J. bufonini.

33. *tenuis*, culm. folioso simplice teretisculo, fol. canaliculatis, corymb. terminali dichotomo bract. brevioribus, caps. oblonga obtusa petal. brevioribus. Rostk. lunc. p. 24. t. 1. f. 3. J. *bicornis*, fol. radicalib. subsetaceis, culm. nudo, involucri. setaceo a-phylo, etc. Michaux. 1. p. 191. Hab. in Georgia Carolina. Cal. acutissimis. M.

34. *bufonius*, culmo dichotomo, fol. angulatis, flor. oblongis solitariis sessilibus. L. Flor. dan. t. 1098. Hab. in inundatis, ad vias.

35. *cephalotes*, culmo aphylo tereti, fol. canaliculatis, capitulis subumbellatis. Thunb. prod. 66. Hab. ad Cap. l. spei. +

36. *stygicus*, fol. setaceis depressiusculis, pedunculis geminis terminalibus, glumis solitariis subbifloris. L. Smith. ic. inrd. 3.

p. 55. Hab. in Succ. paludibus. Culmi spithamei, simplices. Folia altitudine culmi, erecta. Petala exteriora purpurascens, interiora pallida. Stigm. reflexa. L.

37. *triceps*, fol. canaliculatis basi ventricos, capitulis tribus multifloris involucri terminalibus. Rostkow. p. 48. t. 1. f. 4. Hab. in Sibiria. Inv. lucr. a-valve, capitul. quodlibet basi cingens, illoque 3-plo longius. Petal. castanea. R.

38. *castaneus*, fol. planis amplexicaulis, capit. terminali subgemino multifloro basi foliato, bract. acutis. Smith. brit. t. p. 383. Hab. in Scotiae alpib. paludosis. Rad. laxa repens, sarmentosa.

39. *Jacquini*, culm. 1-folio, fol. canaliculatis, capit. terminali solitario multifloro. Rostk. l. c. p. 49. Willd. p. 215. Jacq. Flor. austr. 3. t. 221. J. nigricans. Lam. Cresc. in alpinis. Capitul. splendeus, nigricans.

40. *biglumis*, folio subulato, gluma biflora terminali. L. Flor. dan. t. 120. Hab. in alpinis helv. et scoticis. ☞

41. *triglumis*, fol. planis, gluma triflora terminali. L. Flor. dan. t. 132. Hab. in alpinis. ☞

42. *pilosus*, fol. planis pilosis, corymbo subsimplici, pedunc. unifloris nutantibus, petal. capsula brevioribus ovatis acutis. Willd. p. 289. Curt. Lond. ic. Leers. herb. t. 13. f. 19.

43. *vernalis*, fol. planis pilosis, pedunc. simplicibus, inferioribus reflexis. Hoffm. germ. p. 168. Hab. in sylvis. Vere. ☞

44. *maximus* (nemorosus), fol. planis pilosis, corymbo decomposito, pedunculis elongatis divaricatis subtrifloris, petal. aristatis longitudine capsulae. Willd. p. 117. l. *maximus*, fol. planis pilosis. Retz. Fl. dan. 441. l. *maximus*. Roth. germ. l. p. 157. l. latifolius. Wulff. in Jacq. Coll. 3. p. 59. l. sylvaticus. Curt. lond. ic. Smith. brit. p. 385. Hab. in montosis sylvaticis. ☞

45. *spadiceus*, fol. planis glabris, vaginis pilosis, corymbo decomposito divaricato, pedunc. subquadrifloris, petal. mucronatis capsula acuta brevioribus. Willd. p. 218. Villars. delph. 2. p. 236. t. 6. Habit. in alpinis et montosis. ☞

46. *parviflorus*, fol. planis vaginisque glabris, corymbo decomposito divaricato, pedunc. unifloris, calyc. foliolis acutis muticis. Willd. p. 218. Rostkow. de Junc. p. 26. t. 1. f. 1. Ehrh. Beit. 6. p. 139. Hab. in alpinis Lapponiae. ☞

B b

46. *glabratus*, fol. planis culmoque glaberrimis, corymbo decomposito divaricato, pedunc. subunifloris, cal. ciliatis, petal. acuminatis. Rostko. l. c. p. 28. Habit. in alpih. salisburgensib. Simil. J. maximo, sed fol. glabris et pedunc. plerumque trifloris diversus. R.

47. *luteus*, fol. planis, vaginisque glabris, corymbo composito conferto, pedunculis multifloris, petal. acutiusculis splendentib. Willd. Allion. ped. n°. 2085. Villars. l. c. Hab. in alpihus.

48. *serratus*, fol. ensiformibus planis serratis sulcis canis, paniculae vaginis subulatis perfoliatis. Lin. suppl. p. 208. Hab. ad Cap. b. spci. Panic. conglomerata.

49. *albidus*, fol. planis pilosis, corymbo decomposito, pedunc. subquadri-floris, calyc. foliolis mucronatis, interioribus paulo longioribus, radice fibrosa. Willd. Hoffm. germ. I. angustifolius. Wulf. in Jacq. Collect. 3. p. 56. I. niveus. Leers. herb. t. 13. f. 6. et plurium autorum. Hab. in nemorosis.

50. *niveus*, fol. planis pilosis, corymbo composito, pedunc. subquiquefloris, calyc. foliolis acutis, interioribus duplo longioribus, radice repente. Willd. p. 770. Scheuch. gram. 320. t. 7. f. 7. Moris. s. 8. t. 9. f. 39. Hab. in alpihus et montosis sylvaticis. Flor. majores quam in priore, elegantius nivei.

\* *brevifolius*, fol. linearibus canaliculatis pilosis, corymb. composito glomerato, fol. subaequali, capit. subdecemfloris, petal. obtusis: interioribus duplo longioribus. Rostk p. 35. Hab. in montib. Lusitaniae. Petal. alba, splendentis. An var. prioris?

51. *campestris*, fol. planis pilosis, spicis pedunc. ovatis subcernuis: intermedia sessili, calycinis foliolis mucronatis capsula obtusa longioribus. Willd. p. 221. Leers. t. 13. f. 5. Hab. in Europae pascuis siccioribus. ¶

52. *pediformis*, fol. plano-carinatis pilosis, flor. oblongis, spica labata nutante. Villars. Dauph. 2. p. 238. Hab. in montibus Delphinatus et Redemonte. Balbis. Caul. in meo specimine, altus, nudus.

53. *congestus*, pilosus, culmo stricto erecto, capitul. congestis, sessilibus, cal. ovatis aristato-acuminatis. Thuill. Paris. p. 179. Junc. villosus, panic. compacta. Vaill. bot. p. 119? Hab. in sylvaticis, subhumidis.

54. *erectus*, vagin. pilosis, spicis ovatis, inaequaliter pedunculatis strictis, petal. caps. dimidio fere longioribus. J. multiflorus. Hoffm. germ. 1. p. 169. J. intermedium. Thuill. Hab. in sylvaticis. Spic. fuscescentes, intermediae breviter pedunculatae.

55. *sudeticus* (nigricans), fol. planis glabris vaginis pilosis, spicis pedunculatis umbellatis, intermedia sessili, petalis mucronatis longitudine capsulae. Willd. I. spicatus. Krock. siles. n°. 559. t. 52. Hab. in sudetis Silesiae summis humidis. Spic. subsecundae nigrae. ¶

56. *spicatus*, fol. planis, spica racemosa nutante, basi composita, caps. acutis. Smith. brit. 1. p. 386. Flor. lapp. t. 10. f. 4. Flor. dan. t. 270. I. alpinus latifolius, panic. racemosa nigricante pendula. Till. pis. gr. Hab. in Lapp. et Scotiae alpihus. ¶

847. APHYLLANTHES. Cal. persistens, glumaceus imbricatus. Cor. 6-partita limbo patente. Caps. supera, 3-locularis, 3-valvis, polysperma.

1. *monspeliensis*. Lin. Lam. ill. gen. t. 252. Moris. s. 5. t. 25. f. 12. Desf. Atl. 1. p. 285. Hab. in Europ. australi et Barbar. collib. arenosis. Facie Junci. Caul. fere pedalis, nudus.

848. LEONTICE. Cal. 6-phyllus, deciduus. Cor. 6-petala. Nect. 6-phyllum, unguibus corollae insidens, limbo patens.

1. *Chrysogonum*, fol. pinnatis: foliol. verticillatis lanceolatis acutis tricuspidatis. Willd. Sp. II. p. 148. L. fol. pinnatis: petiolo communi simplici. L. Hort. cliff. 122. Moris. s. 3. t. 15. f. 7. Habit. inter Graeciae segetes. ¶

2. *Leontopetalum*, fol. radicalibus bitermatis, caulibus ternatis, fructu ovato. Willd. L. fol. decompositis: petiolo communi trifido. L. Moris. s. 3. t. 15. f. 6. Hab. in Apulia, Hetruria, Creta. ¶

3. *vesicaria*, fol. hibernatis, fructibus obovatis inflatis. Willd. Pall. it. 3. app. n°. 84. t. V. f. 2. Hab. in Sibiria. Vere.

4. *altaica*, fol. radicalibus decompositis: caulibus quinatis, foliolis lanceolatis. Willd. p. 149. Pall. in Act. Petrop. 1779. p. 25. t. 8. f. 1-3. Hab. in montib. Altaicis, Bract. ellipticae. ¶

849. CAULOPHYLLUM. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-petala, cal. opposita. *Antheræ* loculis margine dehiscens. *Drupa* 1-sperma.

1. *Thalictroides*. Michaux. Flor. 1. p. 205. t. 21. *Leontice*. Willd. Sp. II. p. 148. n.º 5. Hab. in montosis amer. septentr. Subpedale. Epimedio sub simile. Fol. terna, pinnato-lobata. Flor. paniculati.

850. DIPHYLLEIA. *Cal.* 3-phyllus, deciduus. *Cor.* 6-petala, cal. opposita. *Antheræ* membrana a basi ad apicem solubili dehiscentes. *Bacca* 1-locularis. *Semina* 2-3, subrotunda.

1. *cymosa*, glabra, fol. subpalmatis, anguloso-serratis, cyma multiflora. Mich. l. c. p. 203. t. 19-20. Hab. in rivulis montium Carol. septentrion. Fl. Majo. Statura Podophylli petati.

851. BERBERIS. *Cal.* 6-phyllus. *Pet.* 6, ad ungues glandulis 2. *Stylus* o. *Stigm.* umbilicatum. *Bacca* 1-locularis, 2-4-sperma. (Filam. primo glandulis adhærentia, dein elasticæ eriguntur.

1. *vulgaris*, racemis simplicibus pendulis, fol. obovatis ciliato-dentatis. Willd. Sp. II. p. 227. Blackw. t. 163. *β. asperma*, bacis aspermis. Canadensis aculeis triplicibus, serraturis foliorum remotis. Hab. in Europæ sylvis, Oriente, Libano, atque in America boreali. h

2. *ilicifolia*, racemis simplicibus corymbosis, fol. obovatis coriaceis spinoso-dentatis. Willd. p. 228. Lin. suppl. 210. Hab. in Tierra del Fuego in rupium fissuris. h

3. *microphylla*, pedunc. trifloris, fol. obovatis integerrimis submucronatis, spinis trifurcis. Forst. in Comm. Goett. 9. p. 29. Cum priore.

4. *monosperma*, racem. multifloris nantibus, fol. ovalibus obovatisque mucronatis, acul. trifidis. Flor. Peruv. 3. p. 52. Hab. in Tarmæ præruptis. *Bacca* nigra 1-sperma, sem. orbiculatum. h

5. *flexuosa*, racem. aggregatis inaequalibus paucifloris, fol. obovatis inermibus, aculeis ternis coalitis. Flor. Peruv. l. c. t. 281. f. a. Hab. in Andium præruptis calidis, *Bac.* nigra, 4-5-sperma. h

6. *lutea*, pedunc. pluribus aggregatis 1-floris, fol. obovatis mucronatis et subtricuspidatis. Flor. Per. 3. p. 51. t. 280. Cum priore. Caul. rimosus, cinereo-lutescens. Lign. luteum, amarum. Flor. plures 5-andri.

7. *virgata*, flor. subternis 5-andris, fol. parvis obovato-cuneiformibus mucronatis, acul. tricuspidatis parvis. Flor. Per. l. c. t. 281. f. b. In Andium nemorib. *Bac.* ovali-oblonga.

8. *latifolia*, pedunc. 3-6-nis, flor. hexandris, fol. oblongo-obovatis mucrone minimo, acul. parvis tricuspidatis. Flor. Per. p. 52. t. 282. *Bac.* atra, 3-4-sperma, stigm. pedicellato rostrata.

9. *tomentosa*, pedunc. ternis 1-floris inaequalibus, fol. ovalibus dentato-spinosis mucronatisque. Flor. Per. l. c. t. 282. Ad Conceptionis urbis tractus. *Bacc.* 2-3-sperma, rostrata.

10. *cretica*, pedunc. subbifloris, fol. lanceolato-obovatis integerrimis submucronatis. Willd. p. 229. Lycium creticum. Alp. exct. 21. t. 20. Hab. in Creta.

11. *sibirica*, pedunc. unifloris solitariis, fol. obovatis ciliato-dentatis. Willd. orb. 35. Pall. ross. 2. p. 41. t. 67. Hab. in alpib. Altaicis, Sibiriae. h

12. *ruscifolia*, fol. lanceolatis coriaceis? utrinque unidentatis integrisque, flor. racemosis. Ex Herb. Juss. Lam. ill. gen. t. 223. f. 2. Hab. in Montevideo.

13. *buxifolia*, fol. inermibus ovato-lanceolatis ovatisque integerrimis pedicel. 1-floris. Lam. ill. t. 253. f. 3. Ex Herb. Juss. Cum priore. Commers. Fol. parvula, venosa.

14. *empetrifolia*, fol. linearibus angustis, flor. solitariis. Juss. Lam. l. c. f. 4. Hab. ad fretum magellanicum. Fol. juniperiformibus facile distinguenda.

15. *inermis*, fol. ramisque inermibus, flor. solitariis. Juss. Hab. in Fretto Magell. Pedicelli sublongi.

852. PRINOS. *Cal.* 6-fidus. *Cor.* 1-petala, rotata. *Bacca* 6-sperma.

1. *verticillatus*, fol. obovato-lanceolatis acuminatis duplicato-serratis, venis subtus pilosiusculis. Willd. Sp. II. p. 225. P. Gronovii. Michaux. Flor. l. p. 236, qui hoc genus ad Dioeciam amandavit. Hab. in Virginiae paludibus. h

B b 2

2. *montanus*, fol. ovatis serratis utrinque nitidis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 622. Hab. in fruticetis montium Jamaicae. h

3. *dioicus*, fol. oblongo-ovatis subserratis glabris coriaceis, pedunc. axillaribus subunifloris, flor. dioicis tetrandris Vahl. eclog. 2. p. 25. t. 14. Habit. in insula Montserrat. h

4. *nitidus*, fol. oblongo-ovatis serratis nitidis membranaceis, pedunc. axillaribus unifloris, flor. tetrandris. Vahl. eclog. 2. p. 26. Cum. priore.

5? *glaber*, fol. cuneato-lanceolatis obtusiusculis glabris apice serratis. Ait. Kew. 1. p. 478. Conf. Michaux. 2. p. 236. Hab. in Canada. Arbor. Pedunc. uniflori, axillares. Cal. et Cor. ut in praecedentibus. Willd. p. 226. h

6. *lucidus*, fol. ellipticis acuminatis laevibus apice subserratis. Ait. Kew. 1. p. 478. Hab. . . . h

7. *Sideroxyloides*, fol. subrotundis integerrimis. Swartz. prod. 58. Fl. ind. occ. 1. p. 624. Hab. in ins. Caribaeis. h

8. *ambiguus*, fol. ovalibus utrinque acuminatis, flor. quadrifidis : masculis ad imos ramulos congestis, foemininis solitariis. Michaux. 2. p. 236. An Cassine caroliniana. Walt.? Hab. in Carolina.

853. *COSSINIA*. Cal. inferus, 5-partitus. Cor. 4 - s. 5 - petala. Caps. 3-locul. apice dehiscens, loculis subtrispermis. (Flor. paniculato-racemosi.)

1. *triphylla*, fol. ternatis subtus tomentosis : foliolis oblongis obtusis. Lam. enc. 2. p. 132. t. 256. et ill. gen. Cossignea. Willd. p. 226. Jussieu. Hab. in ins. Borbonis. h

2. *pinnata*, fol. pinnatis : foliol. quinis lanceolatis, subtus tomentosis. Lam. l. c. t. 256. Hab. in ins. Mauritiis.

854. *NANDINA*. Cal. inferus, polyphyllus, imbricatus. Cor. 6-petala. Bacca exsucca, disperma.

1. *domestica*. Thunb. jap. 147. Lam. ill. t. 261. Banks. ic. Kaempf. t. 13. 14. Hab. in Japonia. Fol. composita, foliolis lanceolatis ternis. Panic. terminalis. h

855. *LINDERA*. Cal. o. Cor. 6-petala, infera. Stigm. 2. Caps. 2-locularis.

1. *umbellata*. Thunb. jap. 145. t. 27. Lam. ill. t. 263. Hab. in Japonia. Flor. subumbellati. h

856. *CAPURA*. Germen superum. Cal. o. Cor. 6-fida. Stam. intra tubum. Signa globosum. Bacca.

1. *purpurata*. L. Mant. 225. Habit. in Indi. Arbor ramis brachiatis. Fol. opposita, ovata. Flor. axillares. L. h

857. *LORANTHUS*. Cal. o. s. margo brevis, concavus. Cor. 6-fida, revoluta, inferne agglutinata : lacin. lineari - spathulatis. Stam. ad apices petalorum. Bacca infera, 1-sperma, umbilicata s. cal. coronata. (Fructus parasitici. Cor. etiam 5-5-7-fida. Stam. 4-5.)

1. *Scurrula*, pedunc. unifloris cengestis, fol. obovatis. L. Willd. Sp. II. p. 232. Roxb. Corom. n°. 140. Pet. gaz. t. 63. f. 8. Hab. in China. Flor. 4-andri. h

2. *tetrapetalus*, flor. ad articulos quatuor verticillatis tetrapetalis, fol. oblongis oppositis subsessilibus. Lin. suppl. p. 211. Forst. prop. n°. 156. Hab. in N. Zeelandia. Fol. elliptica coriacea.

3. *glaucus*, pedunc. axillarib. unifloris, fol. ovatis glaucis. Thunb. prod. 58. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *biflorus*, fol. ovato-subrotundis, pedunc. axillaribus bifloris, cor. tubulosa arcuata. Lam. enc. 3. p. 600. Hab. in Ind. orientali.

5. *cuneifolius*, flor. axillarib. 1-3-nis, bract. cyathiformi 3-gona 1-dentata, fol. cuneiformib. acuminatis. Flor. Peruv. 3. p. 46. t. 276. In Peruviae vallibus. Cor. punicea. Bacc. nigra. h

6. *dichotomus*, pedunc. geminis dichotomus, bract. semicyathiformi, fol. 3-4-nis verticillatis oblongis. Flor. Peruv. p. 45. t. 274. In Peruv. Andium nemorib. Cor. inferne punicea, superne lutea.

7. *Buddlejoidea*, fol. ovatis, flor. congestis axillaribus quadrifidis, calyce truncato, fruct. turbinatis. Lam. enc. 3. p. 600. Hab. in India. h

*Obs.* Inflorescentia simillima Buddlejæ diversifoliae, sed distinguitur a Buddlejæ germine infero, cor. tubo incurvo, et laciniis profunde divisim inaequalibus. Lam.

8. *nodosus*, fol. ovato-rotundatis, pedunc. axillaribus fasciculatis, cor. tubo longissimo, articulis notosis. Lam. enc. 3. p. 601. l. c. Hab. in Peruv. Pedunc. in dichotomia caulis.

9. *clavatus*, fol. ovatis obtusis, flor. congestis lateralibus subsessilibus longe tubulosis. Lam. enc. 3. p. 572. Hab. in ins. Madagascar. h

10. *parvifolius*, pedunc. axillaribus trifidis, pedicellis unifloris, fol. ovatis integris. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 628. Hab. in montibus Jamaicæ supra ramos arborum. h

11. *falcatus*, racem. paucifloris axillaribus, fol. linearibus obtusis lateraliter falcatis glaucis. Lin. suppl. p. 211. Hab. Madras in arboribus. Flor. falcati fulvi.

12. *uniflorus*, racemis simplicissimis longitudine foliorum, pedunc. unifloris elongatis, fol. obovato-obtusis mucronatis. Willd. p. 233. Jacq. amer. 98. t. 69. Ed. picta. t. 100. l. c. parviflorus. Lam. enc. 3. p. 595. Hab. in Domingo sylvaticis. h

13. *europæus*, racem. simplicibus terminalibus, flor. dioicis. Jacq. Flor. aust. t. 30. Habit. in Austriæ quercubus parviticis et in Sibiria. Statura Visci albi. Flor. dioici. Bacca flavescens.

14. *acutifolius*, flor. racemosis, pedicell. 1-3-floris, bract. minima orbiculata, fol. lanceolatis acutissimis. Flor. Peruv. p. 48. t. 274. In Peruviae præruptis calidis. Caul. ramosissimus. Bacca nigra.

15. *sarmentosus*, racem. brevibus, flor. ternis sessilibus, bract. ovatis, fol. oblongo-lanceolatis carinatis. Flor. Peruv. 49. t. 278. In Andium nemoribus. Petal. lutescentia. Bacc. viscosa, grisea.

16. *acuminatus*, racem. axillarib. bract. minimis concavis, fol. ovatis longe acuminatis. Flor. Per. l. c. Cresc. cum anteceden, cui affinis, sed differt: ram. non radicalibus, fol. subveniens, et Sûgm. capitato-petato. l. c.

17. *retroflexus*, racem. compositis, flor. retroflexis subternis minimis, bract. foliisque ovatis. Flor. Peruv. p. 49. t. 279. Hab. cum prioribus. Caul. saepe punctatus. Rad. toruosa, ferruginea.

18. *lanceolatus*, flor. racemosis hexandris, pedicell. 3-floris, bract. ovata reflexa, fol. lanceolato-oblongis. Flor. Peruv. 3. p. 47. t. 278. Hab. in Andium nemoribus. Cor. lutea.

19. *punctatus*, racem. longissimis, pedicellis subverticellatis trifloris, flor. 6-andris, bract. obovata, fol. obovatis. Flor. Per. t. 277. Cum priore. Rami oppositi, saepe verticillato-terni.

20. *heterophyllus*, flor. racemosis 6-andris, pedicell. trifloris, bract. ovata scabra, fol. polymorphis. Flor. Per. p. 48. t. 273. Hab. in R. chilensis sylvis, præsertim supra Myrti species. Cor. albidopurpureas.

21. *longiflorus*, corymb. axillaribus, flor. pentandris nutantibus, fol. ovato-lanceolatis obtusis venosis. Willd. p. 235. Lam. enc. 3. p. 572. Hab. in Ind. orientali. h

22. *elasticus*, corymbis axillaribus, flor. pentandris nutantibus, fol. oblongis utrinque attenuatis nervosis. Willd. L. cor. junioribus medio fenestratis. Lam. l. c. Rheed. 10. t. 3. Cum priore, hab. in India orientali. h

23. *grandiflorus*, flor. corymboso-racemosis pentandris pendulis, bract. ovata-concava, fol. ovalibus subvenosis. Flor. Per. 3. p. 45. t. 273. Hab. in Peruv. Andium nemorib. Bac. caerulea.

24. *americanus*, racemis subramosis cymosis, flor. nutantibus, fol. ovatis difformibus. Swartz. obs. 132. Jacq. amer. 97. t. 67. Ed. picta. t. 98. Hab. in Amer. arbor. maritimis. h

25. *glaucus*, flor. racemoso-corymbosis 5-andris, bract. lanceolata, fol. ovato-lanceolatis. Flor. Per. t. 275. In Peruvia. Flor. secundi. Bac. atropurpurea.

26. *ellipticus*, flor. corymboso-umbellatis 7-andris, pedic. 3-floris, bract. ovata reflexa, fol. ellipticis. Flor. Per. 3. p. 47. t. 276. Cor. 7-petala, lutea.

27. *occidentalis*, racemis simplicibus, flor. irregularibus. L. Amoen. acad. 5. p. 396. Viscum laticilius et subrotundis foliis, flore purpureo. Sloan. jam. 168. hist. 2. p. 92. t. 200. f. 2. Hab. in Amer. arboribus. h

28. *tetrandrus*, flor. aggregato-umbellatis 4-andris, bract. 3-partita ciliata, fol. ovatis. Flor. Per. 3. p. 46. t. 275.

B b 3

*Periclymenum*, etc. Few. Obs. 2. pl. 45. Hab. in R. chilensis sylvis. Adhibetur ad tingendum pulchro colore nigro. h

29. *verticillatus*, flor. aggregato-capitatis subverticillatis 6-andris, bract. ovatis, fol. ternis lanceolatis. Flor. Per. l. c. Cor. punicea semiquinquefida. Bac. purpureo-nigra.

30. *Loniceroides*, flor. aggregata capitatis, fol. ovato-lanceolatis petiolatis. Lin. Willd. p. 236. Rheede 7. t. 29. *Periclymenum*, etc. Pluck. alm. t. 212. Hab. in Asia. Fol. saepius 5-andri.

31. *pedunculatus*, fol. ovato-cordatis, racemis simplicibus solitariis, flor. ternis pedunculatis. Jacq. amer. 98. Hab. in Carthagenae arboribus maritimis inundatis. Racemi axillares fol. breviores. Flor. parvi.

32. *sessilis*, fol. ovatis, racemis simplicibus solitariis, flor. ternis sessilibus. Jacq. amer. 99. Habit. in sylvis Carthag. Rami diffusi fragiles. Flor. insident pedunc. partiali incrassato. Jacq. h

33. *marginatus*, fol. ovatis subacuminatis margine scariosis, racemis solitariis axillaribus, pedicellis trifloris. Lam. enc. 3. p. 596. Hab. in Brasilia. Fol. integerrima. h

34. *Stelis*, racemis trichotomis, pedunc. trigonis, flor. aequalibus. L. Hab. in Cumanæ arborib. h

35. *pauciflorus*, racemis tripartitis fol. brevioribus, fol. obovatis. Swartz. Fl. ind. occid. 1. p. 627. Hab. in arboribus Jamaicae interioris. h

36. *brasiliensis*, hexapetalus, fol. lanceolato-ovatis, cor. ante florescentiam longe tubulosis rectis clavatis. Lam. enc. 3. p. 570. Hab. in Brasilia. h

37. *pentandrus*, racemis simplicibus, flor. quinquefidis racemosis, fol. alternis petiolatis. L. Hab. in India. Ramis ad folia dilatatis. Fol. alterna, subnervia, figura Lauri. L. h

38. *spicatus*, spicis quadrangularibus, fol. oppositis. Jacq. amer. 97. t. 68. Ed. picta. t. 99. Hab. Carthagenæ. h

39. *ovalifolius*, spic. solitariis geminisque brevibus, flor. confertis hexandris minimis, fol. ovalibus subaveniis carnosiss. Flor. Per. 3. p. 50. Affinis L. *spicato*. Pet. purpurea.

40. *longibracteatus*, spic. terminalibus, bract. floriferis, flor. pentandris, fol. lan-

ceolatis enerviis. Lam. enc. 3. p. 599. Hab. in Peru. Flor. e fovea bractearum.

41. *cucullaris*, fol. lato-lanceolatis falcatis nervosis, bract. cordatis cucullatis subtrifloris. Lam. in Journ. d'Hist. natur. n°. 12. p. 444. t. 23. Hab. in Guiana. h

42. *polystachyus*, spic. ternis laxis, flor. sessilibus minimis, fol. ovato-lanceolatis amplis. Flor. Per. l. c. Pet. purpurea. Bac. luteo-fusca.

43. *emarginatus*, spic. axillaribus, fol. cuneato-ovatis emarginatis. Swartz. Flor. ind. occid. 1. p. 625. Hab. in montib. Hispaniolæ. h

858. CLEOME. *Glandule* nectariferæ 3, ad singulum sinum calycis singulæ, excepto infimo. Cal. 4-phyllus. *Petala* omnia adscendentia. *Caps.* siliquosa pedicellata, unilocularis, bivalvis. (*Stam.* 4-6-12-20 et plura, subtetradyma.)

\* *Fol. non manifestis.*

1. *junceæ*, fruticosa, aphylla, corymbis lateralibus, genitalibus elongatis gynandris octandris, reliqua lineari tomentosa. Lin. suppl. p. 300. Willd. Sp. III. p. 564. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. vix ulla, nisi parvae equanulæ. L. h

\*\* *Fol. compositis : 3-5-7-tenis.*

2. *heptaphylla*, flor. gynandris, fol. subseptenatis, caule aculeato. L. Habit. in Indiis. ☉

3. *pentaphylla*, flor. gynandris, foliis quinatis, caule inermi. Jacq. hort. t. 24. Rheed. g. t. 24. Hab. in India. ☉

4. *triphylla*, flor. gynandris, fol. ternatis, caule inermi. L. Herm. lugdb. t. 565. Hab. in Indiis. ☉

*Obs.* Tres præcedentes (2, 3, 4.) ex eadem planta olim prognatas evincunt folia imprimis floralia sessilia, vix itaque specie sunt sufficienter diversæ. L.

5. *polygama*, flor. superioribus masculis tetrandris, fol. ternatis, foliolis sessilibus margine subaculeatis. L. Willd. Sp. III. p. 565. Sloan. hist. 1. p. 134. t. 124. f. 1. Hab. in Jamaica. ☉

6. *icosandra*, flor. icosi-tetrandris, fol. quinatis. L. Rumph. t. 96. f. 3. Burma. Zeyl. t. 99. Hab. in Zeylona. ☉

9. *viscosa*, flor. dolecantris, fol. quinatis ternatisque. L. Mort. Rheed. g. t. 23. Hab. in Zeylona, Malab. Stam. 10 ad 15. ☉

8. *dodecandra*, flor. dolecantris, fol. ternatis. L. Burm. zeyl. 216. t. 100. f. 1. Sloan. hist. 1. p. 149. t. 124. f. 1. Hab. in Indiis. Caul. viscoso-pubescent. Stam. 10-14. Siliqua sessiles, subinflatae. ☉

9. *uniglandulosa*, fol. sparsis ternatis lanceolatis integerrimis, flor. 1-glandulosis dodecandris. Cav. ic. 4. p. 3. Hab. in N. Hispan. praesertim in Acapulco. Caul. villosus. Cor. alba. Sism. 14-16.

10. *felina*, polyandra hispida, fol. ternatis cuneiformibus strigosis, flor. axillaribus solitariis pedunculatis, siliquis linearibus compressis. Lin. suppl. p. 300. Hab. in Zeylona. Folia linguam referunt felinam. L.

11. *Chelidonii*, polyandra hirsuta, foliolis quinis s. septenis cuneiformibus scabris, racemis terminalibus, siliquis filiformibus. Lin. suppl. p. 300. Hab. prope Transchauc. Cor. rubra Chelidonii hybridi. Siliqua filiformis.

12. *gigantea*, flor. hexandris, fol. septenatis, caule inermi. Jacq. obs. 4. p. 1. t. 76. Hab. in Guinea. Sexpedalis et ultra sempervirens. Racemus terminalis. Qualitas saporis urentissima, odoris virosissima. L.

13. *aculeata*, flor. hexandris, fol. ternatis integerrimis, stipulis spinescentibus. L. Hab. in Amer. Flor. solitarii, parvi.

14. *spinosa*, flor. hexandris, fol. septenatis quintisque, caule spinoso. Jacq. amer. Marogr. bras. 33. t. 34. Hab. in Amer. meridionali. Rami divaricati. ☉

15. *serrata*, flor. hexandris, fol. ternatis: foliolis linearilanceolatis serratis. L. Jacq. amer. 190. t. 190. f. 43. Hab. in America meridionali. ☉

16. *ornithopodioides*, flor. hexandris, fol. ternatis: foliolis ovalilanceolatis. L. Dill. elth. 359. t. 266. f. 345. Buxb. cent. 1. p. 6. t. 9. f. 24. Hab. circa Peram in agris. Flor. flavi. ☉

17. *violacea*, flor. hexandris, fol. ternatis ciliariisque: foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. L. Barr. ic. 865. Hab. in Lusitania. Petala atropurpurea sentia atomis flavis. Lateralia 2 cordata. ☉

18. *arabica*, flor. hexandris, fol. glandulosis inferiorib. ternatis lanceolatis ob-

tus, siliquis fusiformibus viscoso-scabris. Lin. dec. 3. t. 8. Desf. Atl. 2. p. 39. Shaw afr. f. 558. Hab. in Arabia et Barbaria. Petala lutea, apice purpurea. ☉

19. *tenella*, flor. hexandris, fol. ternatis linearifiliformibus. Willd. p. 570. Retz. obs. 4. p. 28. Pluck. phyt. 1. 294. f. 3. Hab. in aridis arenosis orientalis. Cor. lutea. ☉

20. *filifolia*, flor. hexandris, fol. septenatis ternatisque filiformib. Vahl. symb. 1. p. 48. C. *angustifolia*. Forsk. descr. 120. Hab. in Arabia felici ad agrorum margines. Caul. debilis. ☉

\*\*\* *Fol. simplicibus.*

21. *gujanensis*, flor. hexandris, foliis linearifiliformibus sessilibus. Willd. Auhl. Guian. 2. t. 173. Flor. axillares flavi.

22. *monophylla*, flor. hexandris, fol. simplicibus ovato-lanceolatis petiolatis. L. Burm. zeyl. 217. t. 100. f. 2. Rheed. g. t. 34. Hab. in India. ☉

23. *capensis*, flor. hexandris, fol. simplicibus sessilibus linearilanceolatis, caule angulato. L. Hab. ad Cap. b. spei et in India. Caul. facie Epilobii. Fol. Genistae.

24. *procumbens*, flor. hexandris, fol. simplicibus lanceolatis petiolatis, caulibus procumbentibus. L. Jacq. amer. 189. t. 120. Sloan. hist. 1. t. 123. Hab. in Jamaicae et Hispaniolae aridis sabulosis. ☉

Obs. Genus hoc ex Capparidis familia a Linnaeo ad classem Tetradynamiam esse amendandum.

859. **STEPHANIA.** *Cal.* campanulatus, bilobus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* bina, inferiora longiora. *Germen* pedicellatum. *Stylus* o. *Stigma* capitatum. *Caps.* ?

1. *Cleomoides*. Willd. Sp. II. p. p. 239. Capparidis paradoxa. Jacq. Schoenb. 1. p. 58. t. 111. Hab. ad Caraccas Amer. Frutex 6-petalis. Flor. axillares solitarii. Cal. aurantius bilobus ventricosus. Cor. flava calyce paulo longior, petalis rectis. Cum Capparidibus nil commune habet, praeter germen pedicellatum. W.

\* RUBIACEAE 6-andrac. Genera 860-865.

860. **HILIIA.** *Cal.* duplex, inferus, 6-phyllus, superus 2-f-phyllus. *Cor.* 6-fida, tubo cylindrico longior. B b 4

gissimo. *Antherae* intra tubum faucem corol. subsessiles. *Sem.* comosa.

1. *longiflora*, cor. sexfilis, laciniis lanceolatis revolutis, fol. ovatis acutis. Swartz. obs. 135. t. 5. f. 1. Willd. p. 239. Andrew. t. 145. H. parasitica. L. Jacq. amer. Ed. picta. t. 97. Hab. in fruticetis humidis montium Jamaica et in Brasilia. Flor. flavi. Non est parasitica. Sw. h

2. *tetrandra*, cor. quadrifidis, laciniis ovatis, fol. obovatis. Sw. Pl. ind. occid. 1. p. 630. In montib. altis Jamaicae.

861. COUTAREA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* magna, infundibuliformis, 6-fida, tubo incurvo ventricoso. *Filam.* tuli basi inserta. *Stigm.* sulcatum. *Caps.* infera 2-locularis, 2-valvis, polysperma. *Sem.* imbricata, margine membranaeaeo. (Flor. basi bibracteati, interdum 7-audri. A.)

1. *speciosa*. Aubl. Guj. p. 314. t. 122. Juss. gen. pl. Portlandia hexandra. L. Willd. Sp. 1. p. 936. Jacq. amer. ed. pict. p. 35. t. 63. Hab. in Cartagenae fruticosis et in Guiana. Flor. pulchri, suaveolentes fere tripollicares, carneo-albi. J.

862. ISERTIA. *Cal.* superus, 6-dentatus. *Cor.* infundibuliformis, 6-fida. *Stigma* 6-fidum. *Pomum* 6-loculare, polyspermum.

1. *coccinea*, fol. lanceolato-ellipticis subtus villosis-incanis acuminatis utrinque acutis, pedunc. racemosis bifidis. Vahl. eclog. 2. p. 27. Willd. p. 240. Lam. ill. t. 259. Guettarda coccinea. Aubl. guj. 1. p. 317. t. 123. Hab. in sylv. Cajen. Gujan. Arbor 10-12-pedalis, ramis tetragonis. Panicula terminalis. h

2. *parviflora*, fol. oblongis: inferiorib. basi subcordatis, thyrs. ovato. Vahl. p. 28. t. 15. Hab. in ins. Trinitatis. Fol. glabra, interdum subtus subvillosa. V.

863. RICHARDIA. *Cal.* 6-partitus, persistens, superus. *Cor.* infundibuliformis, 6-fida. *Stigm.* 3, capitata. *Fructus* 3-partibilis. *Sem.* 5, truncata. (Capit. radiata foliolis. Una pars floris passim demitur. Flor. Peruv.)

1. *scabra*, caul. hispido brachiato, fol.

ovato-lanceolatis scabris. Lin. Sp. pl. p. 470. Lam. ill. t. 254. Hab. in Vera-Cruz. Caul. erecti? pilis reflexis.

2. *pilosa*, fol. oblongo-lanceolatis: floralibus geminis quaternisque, flor. capitulato-umbellatis. Flor. Peruv. 3. p. 50. In ruderalis et segetib. Cercado et Lima. Fl. toto anno. Caul. procumbens, rami inferiores brachiati. Anther. et Stigm. pilosa.

864. STEVENSIA. *Cal.* bifidus, deciduus. *Cor.* tubulosa: limbo plano 6-7-fido. *Antherae* (6-7) in cor. fauce sessiles. *Caps.* 2-locularis, polysperma, apice quadrifariam dehiscens.

1. *buxifolia*. Poiteau in Annal. d. Mus. Cah. 21. p. 233. t. 60. Cresc. in ins. St. Dominica septentrionali. Flor. solitarii albi, odorati, externe submentosi. Fol. subtus alba, reticulata. h

865. PSATHURA. *Cal.* superus, 6-dentatus. *Cor.* campanulata, intus barbata, 6-fida. *Stigm.* lamellatum. *Drupa* sicca, striata, coronata, 6-locularis: loculis 1-spermis.

1. *borbonica*. Willd. Sp. II. p. 229. Lam. ill. gen. t. 260. Hab. in ins. Borbonia. Rami nodosi fragiles. Flor. corymbosi. h

866. CANARINA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-fida, campanulata. *Stigmata* 6. *Caps.* infera, 6-locularis, polysperma.

1. *Campanula*. Lin. Lam. ill. t. 259. Campanula canariensis. L. fol. oppositis hastatis dentatis petiolatis. L. Syst. veg. Pluck. alm. 76. t. 276. f. 1. Hab. in ins. Canariis. Fol. petiolata, hastata. Flor. edichotomia. h

867. FRANKENIA. *Cal.* 5-fidus, infundibulif. *Petala* 5. *Stigma* 2-3-partitum. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis.

#### \* Herbaceae.

1. *laevis*, flor. solitariis, petalis subrepandis obtusis, fol. linearibus basi ciliatis. Willd. Sp. II. p. 241. Hab. in Eur. australis maritimis et circa Astracan.



*Obs.* Ab Illicitanis, in Hispania, ut praestans remedium habetur in mitigandis symptomatibus calculosis. — Cav. ic. pl. 2. p. 15.

2. *Nothria*, flor. fasciculatis, petalis acutis, fol. linearibus basi ciliatis. Willd. *Nothria repens*, Berg. cap. 171. t. 1. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *hirsuta*, flor. fasciculatis, petalis subrepandis obtusis, fol. linearibus oblongis, caule hirsuto. Willd. Hab. in Apulia, Creta, in Siberia. h

4. *pulverulenta*, flor. solitariis, petalis subrepandis, fol. subrotundo-ovatis subtus pulverulentis, Hab. in litoribus, ©

\*\*\* *Fruticosa*.

5. *corymbosa*, fruticosa, fol. linearibus pulverulentis margine reflexis, flor. corymbosis. Desf. Atl. 1. p. 315. t. 93. Hab. ad maris littora prope Arzean in Barb. Fol. *F. laevis*, perennantia.

6. *thymifolia* (ericoides), fruticosa erecta ramesissima, fol. (cinereis) linearibus confertis brevissimis, flor. axillaribus. Desf. p. 316. Barrel. t. 714. Hab. in Barbar. arenosis, et in Hispan. prope Arangues quoque inventa a D. Thibaud. Ericam refert. Fol. quasi crustosa, vix ciliata. Flor. subsecundi.

7. *microphylla*, fruticosa levis, fol. oppositis quadrifariam imbricatis subteretibus, flor. solitariis subterminalibus. Cav. ic. 6. p. 77. t. 537. f. 1. Hab. in America meridion. Née. Cor. albid. Caul. ramosissimi decumbentes. h

863. FLOERKEA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Stylus* bifidus. *Utriculus* dicocus.

1. *lacustris*. Fl. proserpinacoides. Willd. in Act. Soc. Nat. cur. Berolin. v. 3. 1801. Hab. in Pennsylvaniae lacubus, et paludosis.

869. PEPLIS. *Cal.* campanulatus: ore 12-fido. *Petala* 6 (aut 8.), calyci inserta. *Caps.* 2-locularis, polysperma.

1. *Portula*, flor. hexandris axillaribus solitariis subpetalis, fol. petiolatis subrotundo-ovatis. Willd. Sp. II. p. 243. P. flor. apetalis. L. Flor. dan. t. 64. Lam. ill. t. 262. Hab. in inundatis. ©

2. *indica*, flor. tetrandris spicatis brac-

teatis, fol. oblongo-obovatis sessilibus. Willd. Hab. in India. Caul. ascendens.

870. GAHNIA. *Cal.* gluma 1-valvis, 2-5-flora. *Cor.* gluma 2-valvis, *Stylus* dichotomus. *Sem.* 1.

1. *procera*, paniculis spicatis pluribus elongatis, flos. hexandris. Forst. prod. n°. 358. Lin. suppl. 211. Hab. in N. Zeelandiae collibus.

2. *schoenoides*, culmis flexuosis, paniculis compositis spicatis rigidis subsolitariis. Forst. prod. n°. 159. Hab. in ins. Tahiti.

871. BAMBOS. *Squamae* tres spiculas subquinquefloras tegentes. *Cal.* o. *Cor.* gluma 2-valvis. *Stylus* 2-fidus. *Sem.* 1.

1. *arundinacea*, panicula ramosa divaricata. Willd. p. 245. (Bambusa.) Reiz. obs. 5. p. 24. Roxburgh. corom. 1. p. 55. t. 79. Nastus. Juss. Rheed. 1. t. 16. Hab. in India utraque. h

2. *verticillata*, spica terminali simplici verticillata. Willd. Kunth. amb. (B. stricta. Roxb. l. c. t. 80. ? Verticill. sessilis globularis, congestus. R.) Hab. in India. h

872. EHRHARTA. *Cal.* gluma 2-valvis, abbreviata, uniflora. *Cor.* gluma duplex, utraque bivalvis, exterior compressa acinaciformis, transversim sulcata. (*Styl.* 1-2.)

1. *cartilaginea*, culmo indiviso, panicula simplici, cor. exteriori retula submutica, foliorum margine cartilagineo crispo. Smith. ic. ined. p. 33. Thunb. prod. 66. Eh. Mnemateja. Lin. suppl. p. 209. Eh. nutans. Lam. enc. 2. p. 346. Habitat omnes species ad Cap. b. spei. Gramen pulchrum.

2. *bulbosa*, culmo indiviso, panicula ramosa multiflora, cor. exteriori emarginata aristata. Smith. loc. cit. E. aristata. Thunb. Trochera striata. Richard. Panic. simplex laxa. Th. prod. append. p. 188.

3. *longiflora*, culmo simplici, panicula ramosa multiflora, cor. exteriori mucronata tuberculato-hispida, flor. triandris. Smith. p. 32. t. 32.

4. *panicca*, culmo diviso, panicula subramosa, flor. erectis digynis. Smith. 1. t. 9. Eh. erecta. Lam. enc. 2. p. 347. Hab. ad Cap. b. spei. h

5. *calycina*, culmo ramoso, panicula subsimplici, caly. colorato cor. sequante. Smith. ic. 1. p. 33. t. 33. E. glum corollinis exterioribus subpilosus. Thunb. prodr. app. p. 1188. Aira capensis. Lin. suppl. 108.

6. *ramosa*, cor. glabris muticis, panic. coarctata, culm. ramoso. Thunb. prodr. corrig. Melica ramosa. Ejusd. p. 21.

7. *melicoides*, cor. glabris muticis, panic. patentissima, fol. subfiliformibus. Th. l. c. Mel. capensis. Ejusd. l. c.

8. *gigantea*, cor. hirsutis aristatis, panic. verticillata, culm. erecto. Thunb. prodr. sub Melica.

9. *geniculata*, corol. lirtis, panicula coarctata, culm. decumbente. Thunb. sub Melica.

## DIGYNIA.

873. *ORYZA*. Cal. gluma 2-valvis, 1-flora. Cor. 2-valvis, subaequalis, semini adnascens.

1. *sativa*. L. Willd. p. 247. Catesb. car. 1. p. 14. t. 14. *mutica*, glum. obsque aristis. *Y glutinosa*, sem. glutinosus. Loureiro. Collitur in Indiae paludosis, hinc etiam in Europa. Var. quoad seminis formam; vid. Willd. l. c.

874. *NECTRIS*. Cal. 6-partitus, laciniis 3-interioribus minoribus obtusis. Cor. o. Caps. subcarnosae, stylis coronatae, uniloculares, 1-2-spermae.

1. *aquatica*. Willd. Cabomba aquatica. Aubl. guj. 1. p. 321. t. 124. Mich. Flor. 1. p. 206. Lam. ill. t. 265. Hab. in stagnis et rivulis Cajen. Gujanae, et Carolinae. Fol. inferiora capillatæ-multifida, superiora natantia peltata. Flor. flavi. Sem. globosa.

875. *ATRAPHAXIS*. Cal. 2-phyllus. Petala 2, sinuata. Stigmata capitata. Sem. 1.

1. *spinosa*, pamis spinosis. L. PHerit. stirp. nov. 1. p. 27. t. 14. Dill. el. 47. t. 40. f. 47. Hab. in Media et Sibiria. Sem. compressum.

2. *undulata*, inermis, fol. undulatis. Polygonum undulatum. Berg. cap. 135. Polygonum. Thunb. prodr. 77. Dill. elth. 36. t. 32. f. 36. Hab. ad Cap. b. spec. Pet. o. Sem. subrotundum. L. h

## TRIGYNIA.

876. *RUMEX*. Cal. 3-phyllus. Petala 3, conniventia. Sem. 1-triquetrum.

\* *Flor. hermaphroditis. Valvulis granulato notatis.*

1. *Patientia*, valvulis integerrimis; unica granifera, fol. ovato-lanceolatis. L. Willd. Sp. II. p. 249. Hab. in Italia, in Germania. Col. in hortis.

2. *sanguineus*, valvulis integerrimis; unica granifera, fol. cordato-lanceolatis. L. Blackw. t. 49a. Hab. in Virginia. Fol. venis rubris succo sanguineo.

3. *purpureus*, valv. dentatis graniferis, fol. cordatis; petiolis venisque purpureis. Enc. bot. 5. p. 63. R. sanguineus. *β. latifolius*. Hort. Paris. Hab. . . R. sanguineum refert, sed fol. multo latioribus, praesertim valvul. dentatis differt.

4. *spathulatus*, fol. obovatis obtusis, valvul. graniferis. Thunb. prodr. 67. Hab. ad Cap. b. spec.

5. *verticillatus*, valvul. integerrimis; omnibus graniferis, fol. lanceolatis; vaginis cylindricis. L. Hab. in Virginia.

6. *Britannica (xanthorhiza)*, valvulis integerrimis; omnibus graniferis, fol. longo lanceolatis; vaginis obsolete, laceris. L. Michaux. 1. p. 217. R. hiennae. Moench. meth. p. 354. Hab. in Virginiae et Carolinae aquis nec in Europa.

7. *Hydrolapathum*, valvul. integerrimis graniferis, fol. lanceolatis strictis glabris acutis integerrimis basi attenuatis. Ait. Kew. 1. p. 481. R. aquaticus. Smith? et plurium autorum. Hab. in fossis, ad fluviorum ripas.

8. *crispus*, valv. integris omnibus graniferis, fol. lanceolatis undulatis acutis. Hab. in Europae humosis.

9. *Nemolapathum (conglomeratus)*, valvulis linearibus obtusis integerrimis omnibus graniferis, verticillis glomeratis, fol. inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis undulatis. Liu. suppl. p. 212. R. conglomeratus. Roth. germ. I. II. 422. R. limosus. Thuill. ? R. crispus. *β. Pollich.* Hab. in nemoribus humidis, ad rivulos, in paludibus. A priore satis diversus. Rami divaricati. Flor. ad dimidium minores.

10. *persicarioides*, valvulis dentatis : omnibus graniferis, fol. lanceolatis undulatis. L. Hab. in Virginia. Valv. dentibus utrinque tribus longis. ☉

11. *aegyptiacus*, valvul. trifido-setaceis : unica granifera. L. Till. pis. 43. t. 37. f. 1. Hab. in Aegypto. ☉

12. *dentatus* (*multiflorus*), valvulis dentatis, omnibus graniferis, fol. lanceolatis. L. caps. seminibus alba et crenata. Dill. elth. 191. t. 158. f. 191. Hab. in Aegypto. Humilis. Rami verticilli multiflori. Fol. obliqua. ☉

13. *maritimus*, valvul. deltoideis setaceo-dentatis graniferis, fol. linearibus, verticillis confertis. Smith brit. 1. p. 253. Petiv. brit. t. 2. f. 8. R. aureus. Withering. Hab. in paludosis, praesertim maritimis.

14. *palustris* (*aureus*), valv. lanceolatis graniferis basi dentatis, fol. linearilanceolatis, verticill. distantibus. Smith. l. c. p. 594. Bocc. mus. t. 104. Curt. Lon. 3. t. 23. Petiv. l. c. f. 7. Hab. in paludosis et ruderalis humidis. Rad. intus rubra. Curt. Fol. acuta : radicalia maxima. Sm.

15. *crispatus*, valvul. obtuse cordatis graniferis, cristato-dentatis, fol. inferiorib. lanceolatis, margine crispatis, spic. aphyllis. Michaux. Flor. 1. p. 217. Hab. in Kentucky. Affin. C. persicarioid. Facie R. acuti. M.

16. *divaricatus*, valv. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis obtusis pubescentibus. L. Till. pis. 93. t. 37. f. 2. Hab. in Italia. ☉

17. *acutus*, valv. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis acuminatis. Hab. in Europae succulentis. T.

18. *obtusifolius*, valvul. dentatis graniferis, fol. cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. Hab. in pratis.

19. *pulcher*, caul. ramosissimo, valv. dentatis : subunica granifera, fol. radicalibus panduriformibus. L. Hall. helv. n<sup>o</sup>. 1593. Till. pis. 93. t. 37. f. 2. Moris. s. 5. t. 37. f. 13. Hab. in ruderalis, ad vias. Rami floriferi recurvati.

\*\*\* Valvul. granulo destitut. s. nudis.

20. *bucephalophorus*, valvul. dentatis nudis, pedicellis planis reflexis, incrassatis. L. Col. cephr. 1. p. 141. t. 150. Hab. in Italia. ☉

21. *aquaticus*, valvulis integerrimis

nudis, fol. late cordatis glabris acutis. L. Hab. ad ripas fluviorum et paludum, passim. T.

22. *Lunaria*, valvul. laevibus, caule arboreo, fol. subcordatis. L. Pluck. alm. 8. t. 252. f. 3. Hab. in Canariis. Panic. oppositifolia. h

23. *imbriatus*, cal. laciniato - smbrhiatis subplumosis, fol. cordatis, rad. tuberosa. Enc. bot. 5. p. 65. D. repandus Bocc. Hab. ad Cap. b. sp. Panic. terminalis, flor. albidis pendulis.

24. *vesicarius*, valv. omnibus maximis membranaceis reflexis, fol. indivisis. L. Moris. s. 5. t. 28. f. 7. Hab. in Africa. Valv. rubellae, venosae. ☉

25. *roseus*, valvulae fructus alterius alba maxima membranacea reticulata, fol. erosiss. Lin. Desf. Atl. 1. p. 320. R. fol. subcarneosis laciniato-hastatis panduraeformibusque petiolatis. R. *lacerus*. Balbis Misc. bot. p. 19. Hab. in Aegypto et Barbar. arvis. ☉

26. *tingitanus*, valvul. cordatis obtusis integerrimis, fol. hastato-ovatis erosiss. Moris. s. 5. t. 28. f. 8. Shaw. specim. n<sup>o</sup>. 5. ic. Hab. in Barb., Hisp. Fol. petiolata, subsabra, basi subhastata et erosa.

27. *scutatus*, fol. cordato-hastatis, caule tereti. β. *Rumex glaucus*, flor. hermaphroditis, valvulis nudis, fol. cordato-hastatis obtusis glaucis, caule suffruticoso. Jacq. ic. rar. 1. t. 67. Collect. 1. p. 64. Hab. in Helvetia, Gallia, inter acervos lapideum.

28. *nervosus*, valv. integerrimis nudis, fol. oblongis trinerviis. Vahl. symb. 1. p. 27. Hab. in montibus Hadiensib. Rami striati, articulis apice fuscis. Cal. reflexus. h

29. *digynus*, flor. digynis, fol. orbiculatis emarginatis. L. Fl. lapp. p. 132. Flor. Jacq. Collect. 2. p. 30. Moris. s. 5. t. 36. f. penult. Hab. in alpinis.

30. *lanceolatus*, fol. lanceolatis reflexo-marginatis, caule angulato. Thunb. prod. p. 67. Hab. ad Cap. b. spei. +

\*\*\* LAPPATHUM. Floribus dictinis.

31. *alpinus*, flor. hermaphroditis sterilib. semineisque : valvul. integerrimis nudis, fol. cordatis obtusis maximis. Blackw. t. 262. Hab. in Helv. et Galliae montosis. Fol. magnitudine Rhei. ☉

32. *spinosus*, flor. androgynis : cal.

femineas monothyllis reflexo-uncinatis. Nibo spinosa, Moench. meth. p. 318. Beta cretica, semine spinoso. Bauh. hist. 2. p. 662. Hab. in Creta, et in subhamidis juxta Tingidem. Schousb.

33. *tuberosus*, flor. dioicis, fol. lanceolato-sagittatis; hamis patentibus, radice tuberosa. Hab. in Italia. Affinis R. Acetosae sed Folia hamis postice magis hiantia et Stipulae longiores. T.

34. *multifidus*, flor. dioicis, fol. hastatis: auriculis palmatis. Bocc. mus. 2. t. 126. In alpinis Calabriae, Meturiae, Orientis.

35. *Acetosella*, flor. dioicis, fol. omnibus petiolatis lanceolato-hastatis: auricul. integris. Flor. dan. t. 1161.  $\beta$ . R. multifidus. Thuill. Hab. in arenosis, sylv.

36. *thyrsoides*, caul. simplicis, fol. hastatis, panic. coarctata. Desf. Atl. 1. p. 321. Hab. in Barbaria. Priori affinis. Cal. foliola colore rosea.

37. *Acetosa*, flor. dioicis, caul. elongato, fol. oblongis sagittatis. L. Engl. bot. t. 127. Hab. in pascuis, sylvaticis.

38. *aculeatus*, flor. dioicis, fol. lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis: valv. ciliatis. L. Bauh. prodr. t. 55. Hab. Creta, Hispania. Similis R. Acetosellae. Flor. femineorum interiores valvulae ciliatae aculeis minimis. L.

39. *luxurians*, flor. dioicis, fol. cordato-hastatis, caulibus angulatis diffusis, valvulis exterioribus subulatis, interioribus orbiculatis. Lin. suppl. p. 212. Bocc. mus. 165. t. 126. Hab. in alp. Bonosiensibus. Radix tuberosa. T.

40. *arsifolius*, flor. dioicis, fol. omnibus petiolatis hastatis, auriculis simplicibus divaricatis, caule erecto. Aut. K. w. 1. p. 487. Lin. suppl. p. 212. R. abyssinicus. Jacq. hort. 3. p. 48. t. 98. Hab. in Abyssinia. h

41. *bipinnatus*, flor. dioicis, fol. bipinnatis. Lin. suppl. p. 211. Hab. in Marocco. Flor. androgyni. Valv. cordatae nudae, margine venis sanguineis pictae. Schousb. Maroc. ed. germ. p. 170.

877. FLAGELLARIA. Cal. 5-partitus. Cor. o. Bacca 3-1-sperma.

1. *indica*. Lin. Lam. ill. t. 266. Romph. 5. t. 59. f. 2. Rheed. 5. t. 53. Hab. in India et Guinea. Humanam altitudinem superans. Fol. terminata cirrho.

878. SCHEUCHZERIA. Cor. 6-partita. Cal. o. Antherae lineares. Stigm. sessilia, lat. raliae. Caps. inflata, distinctae, subdispermæ.

1. *palustris*. L. Fl. lapp. t. 10. f. 1. Lam. ill. gen. t. 268. Flor. dan. t. 76. Hab. in paludosis, etiam in Canada.

879. TRIGLOCHIN. Cal. 3-phyllus. Petala 3, calyciformia. (Cal. 6-phyllus, foliolis 3-superioribus eum inferioribus alternantibus. Cor. o. Roth.) Stylus o. Caps. basi dehiscens.

1. *palustre*, capsulis trilocularibus laevibus linearibus basi attenuatis. Willd. p. 264. Flor. dan. t. 490. Hab. in uliginosis. ♂

2. *bulbosum*, radice bulbosa fibris oblecta. L. Jacq. ic. rar. 2. t. 454. Hab. ad Cap. b. spei. Tr. palustri simile. Styli protracti et patentis, qui in T. palustri erecti et obsoleti. L.

3. *striatum*, caps. subrotundis trigonis trilocularibus. scapo nudo striato, spic. simpliciter coarctata. Flor. Peruv. 1. c. Hab. in Peruv. lacubus et inundatis. Rad. fusiformis, scapos plures protrudens.

4. *ciliatum*, caps. ovatis trigonis trilocularibus, culm. apice contorto, spica composita. Flor. Peruv. 3. p. 72. Hab. in Peruv. collib. frigidis. Flor. bract. 2, ovatis, ciliatis stipati.

5. *triandrum*, fol. subsetaceis scapum subaequantibus, flor. trifidis triandris, caps. trigono-subrotundis. Mich. Flor. 1. p. 208. Hab. in inundatis in Amer. boreali.

6. *maritimum*, capsulis sexlocularibus ovatis. L. Flor. dan. t. 306. Roth. germ. II. p. 418. Hab. in maritimis, et pascuis, etiam in America.

880. WURMBEA. Cal. o. Cor. infera, 6-partita: tubo hexangulato. Filam. fauci inserta. Styli subconniventes. Caps. oblonga, 3-quetra. Sem. rotunda.

1. *capensis*. Thunb. Diss. bot. 1. p. Andrew. t. 221. Lam. ill. t. 270. Melant. Wurmb. Thunb. prodr. Hab. in collib. arenosis Cap. b. spei. Fol. lanceolata, cucullata.

*Obs.* Dantur nonnullae hujus plantae varietates ab Thunbergio ut tales fixae, quas Willdenowius Sp. pl. II. p. 265. tanquam distinctas species exhibuit.

881. MELANTHIUM. Polygamum.

*Cal.* o. *Cor.* rotata, 6-partita: laciniis basi biglandulosis. *Filam.* ex elongatis unguibus *cor.* *Caps.* subovata (tricocca), apice subtrifida, 3-locularis. *Sem.* plura, alato-membranacea. (Fol. elongata, debilia.)

1. *virginicum*, flor. paniculatis, petalis ovalibus. Michaux. Flor. 2. p. 251. Willd. Sp. II. p. 266. Hab. in Amer. boreal. humidis. Panic. pyramidalis. Flor. albidolividis.

2. *racemosum*, panic. racemoso-oblonga, petal. orbiculatis. Michaux. Hab. in altis montib. Carol. septentrion. Flor. obsolete pallidi. Priore minus altum. An M. *lactum*. Ait. Kew. 1. p. 448. Willd. p. 267.

3. *sibiricum*, flor. paniculatis, petalis sessilibus acutis, fol. linearibus. Willd. p. 267. Hab. in Sibiria. ¶

4. *capense*, flor. racemosis, petalis punctatis, fol. lanceolatis cucullatis. Willd. Hab. ad Cap. b. spei. ¶

5. *triquetrum*, fol. triquetris glabris caule longioribus, flor. spicatis. Lin. suppl. 213. Thunb. prod. 67. Cum priore.

6. *ciliatum*, petalis unguiculatis, fol. basi cucullatis: ensiformibus cartilagineo-ciliatis, flor. spicatis. Lin. suppl. 213.

7. *juncum*, fol. lineari-subulatis, superioribus basi dilatatis, spica flexuosa, petalis unguiculatis. Willd. p. 268. Jacq. ic. rar. 2. t. 451. Collect. suppl. p. 103. Ad Cap. b. spei. ¶

8. *secundum*, fol. linearibus, spica secunda, petalis unguiculatis. Willd. Enc. bot. 4. p. 29. t. 269. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

9. *phalangioides*, fol. linearibus canaliculatis, racemo multifloro, pedunculis flore longioribus, petalis sessilibus. Willd. Enc. 4. p. 28. Antlericum subtrigynum. Jacq. ic. rar. 2. t. 419. Collect. 3. p. 273. Hab. in Carolina. ¶

10. *indicum*, petalis lineari-lanceolatis, fol. linearibus. L. Hab. in Trauqueb. Radix

bulbosa. Statura Ornith. lutei. Flor. atropurpurei. Petala angusta. Fol. angustolincaria.

11. *viride*, fol. ovato-lanceolatis vaginantibus, cor. reflexis. Thunb. prod. 67. Andrew. t. 233. Hab. ad Cap. b. spei. Cor. viridipurpurea.

12. *uniflorum*, fol. lineari-lanceolatis caule subunifloro longioribus, petalis lanceolatis subunguiculatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 450. Collect. 4. p. 100. Ad Cap. b. spei. ¶

13. *eucomoides*, fol. oblongo-lanceolatis cucullatis, caule trifloro, petalis subhastatis unguiculatis. Willd. Jacq. ic. rar. 2. t. 452. Collect. suppl. 104. Ad Cap. b. sp. ¶

14. *pumilum*, fol. lanceolatis basi barbatis, caule subtrifloro, petalis sessilibus. Willd. p. 270. Forst. in Comm. goett. 9. p. 30. t. 6. Hab. in Tierra del Fuego. Caul. cespitosus. Cor. alba, inflexo-cucullato.

15. *gramineum*, acaule, fol. imbricatis gramineis, flor. sessilibus. Cav. ic. 6. p. 64. t. 587. f. 1. Hab. cum sequente prope Moya-dor. Broussonet. Pet. nervosa.

16. *punctatum*, acaule, fol. imbricatis carinatis lanceolato-acuminatis, flor. sessilibus punctatis. Cav. l. c. t. 588.

882. VERATRUM. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala, eglandulosa. *Caps.* 3, polyspermæ. In flor. masc. Pistilli rudimentum.

1. *nigrum*, fol. ovalibus plicatis, racem. composito, cor. patentibus, bract. linearibus. Jacq. Flor. t. 336. Moris. s. 12. t. 4. f. 1. Hab. in Sibir. et Hungar. apricis siccis.

2. *album*, fol. ovalibus plicatis, racemo supradecomposito, corol. erectis, bract. lanceolatis. Lin. Jacq. Flor. austr. 4. f. 335. Flor. dan. t. 1120. Habitat in Europae et Amer. borealis montosis ad rivulos. ¶

3. *parviflorum*, fol. subovatis lanceolatisque planis glabris, panic. ramulis filiformibus, cor. stellatis: laciniis ovali-lanceolatis acutis. Michaux. Flor. 2. p. 250. Hab. in Carol. montibus altis. Cor. viridis Intermedium inter hoc et antecedens genus. M.

4. *luteum*, racem. simplicissimo, fol. sessilibus. Lin. Reich. syst. 4. p. 297. Hab. in Virginia, Canada. Fol. angusta, lanceolata. Rad. bulbosa, +

883. *ZIGADENUS*. *Cor.* hexaphyllus, patens: laciniis supra basin angustatam biglandulosis. *Stam.* ad contactum ovarii inserta. *Styl.* 3, contigui. *Caps.* membranacea, 3-locularis. *Sem.* plurima, aptera.

1. *glaberrimus*, fol. lineari-lanceolatis angustis recurvis longis. Michaux. t. p. 214. t. 22. Hab. in Carol. infer. herbosis, humidis. Caul. subpedalis. Flor. Veratri albi.

*Obs.* Stamina situ et cor. figura Veratro affine, et glandulis Melanthio, sed fructu braeprimis discrepat ab utroque hocce genus. M.

884. *MEDEOLA*. *Cal.* o. *Cor.* 6-partita, revoluta. *Bacca* 3-sperma.

1. *virginica*, caul. lanuginoso, fol. verticillatis, ramis inermibus. L. Michaux. t. p. 214. Pluck alm. 401. t. 328. f. 4. Hab. in Virginia. Fol. in apice caul. 3.

2. *asparagoides*, fol. alternis ovatis, basi subcordatis obliquis. Ait. Kew. t. p. 489. Dracaena medecoloides. Lin. suppl. p. 203. Hab. in Aethiopia. An hujus generis? Fol. alterna pinnata. Flor. penduli e pedicello unifloro.

3. *angustifolia*, fol. alternis ovato-lanceolatis. Ait. Kew. p. 490. Till. pis. 17. t. 12. f. 2. Hab. ad Cap. b. spec. T.

885. *TRILLIUM*. *Cal.* patens, 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 3-locularis.

1. *cernuum*, fol. ovalibus, basi angustatis, flor. pedunculo cernuo. L. Michaux. Flor. t. p. 216. Willd. Sp. II. p. 216. Hab. in Carol. Styl. distinctus.

2. *erythrocarpum*, foliis subcordatis abrupte subpetiolatis, flor. erectiusculo, bacca oblonga. Michaux. p. 216. In Carol. septentrion. montib. et in Canada. Bacc. coccinea.

3. *rhomboides*, fol. lato rhomboides, pedunc. inclinato. Michaux. Flor. t. p. 213. *F. erectum*, flor. pedunculo erecto. Lin. Flore atropurpureo. *β. album*, flor. minore albo. *γ. grandiflorum*, flor. amplissimo exalbido. Hab. in Carol. montib. excelsis.

4. *pusillum*, fol. ovali oblongis obtusis

sessilibus, pedunci erecto, petal. interioribus sublongioribus. Hab. in Carol. infer. Petala carnea.

5. *sessile*, fol. lato-ovalibus, flore sessili erecto. L. Catesb. car. t. p. 50. t. 50. Hab. in Virgin., Carol. Bacc. globoso-depressa.

886. *COLCHICUM*. *Spatha*. *Cor.* 6-partita: tubo radicato. *Anth.* incumbentes. *Caps.* 3, connexae, inflatae.

1. *autumnale*, fol. planis lanceolatis erectis, petal. ovatis. Engl. bot. t. 153. Willd. p. 873. *β. C. vernum*, petalis foliisque angustioribus, simul crescentibus. Hab. in pratis humidioribus. Flor. autumno et fol. una cum fructu vere profert, excepta var. *β*, quae rara.

2. *montanum*, fol. linearibus patentissimis, petal. lineari-lanceolatis. Allion pedem. t. t. 74. f. 2. Fol. una cum florib. autumno erumpunt. L.

3. *variegatum*, fol. undulatis patentibus, petal. ovato-lanceolatis variegatis. Hab. in Oriente. Petal. maculata fere ut in Fr. Meleagride.

887. *MERENDERA*. *Spatha*. *Cor.* campanulata, 6-partita. *Anth.* rectae, sagittatae. *Caps.* 3, basi connexae, latere interiore dehiscences.

1. *Bulbocodium*. Ramond in Bull. Soc. philom. n. 47. t. 12. f. 4. Les Liliacées. t. 25. *Bulbocodium vernum*. Desf. Alt. IIab. in Pyrenaeis et in Barbaria.

*Obs.* Medium tenet inter antecedens et *Bulbocodium* genus et quoad antheras Croco affinis est.

888. *HELONIAS*. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Styli* 3, distincti. *Caps.* 3-locularis, 3-cornis oligosperma.

1. *latifolia*, fol. lanceolatis acuminatis, scapo subaphyllo, spica flor. brevissime pedicellatis confertis. Michaux. Flor. t. p. 212. H. bullata. Lin. Willd. p. 213. Les Liliacées. t. 13. Mill. ic. t. 222. (mala). Hab. in Pennsylvaniae et Marylandiae paludosis. Spica purpurascens *Bistortae*, fol. Orchidis.

*Obs.* Nomen *bullata* ex aliena Plucknetii phrasi deduxerat Linnaeus. M. l. c.

2. *angustifolia*, fol. angustissimis, scap. inferne folioso, spica laxiuscula, sem. linearibus. Michaux. l. c. Hab. in herbos. et fruticetis Carol. inferioris. Flor. exalbidi. Caps. oblongiuscula. Fol. longissima. M.

3. *erythrosperma*, fol. lineari-longissimis, scapo folioso, caps. abbreviata, seminibus ovatis. Michaux. Hab. in umbrosis rivul. Carol. inferioris. Flor. virescentes. Sem. arillata?

4? *dubia*, fol. angustissimis gramineis, scapo nudo, spica gracili, flor. parvis sessilibus. Michaux. p. 213. Hab. in Georg. et Florid. sabulosis.

5? *pumila*, fol. lanceolatis enerviis. Jacq. ic. rar. 3. t. 451. Coll. 2. p. 260. Hab. in Carol. Caul. foliosus, Spic. capitata. Germ. *inferum*. Willd.

889. XEROPHYLLUM. Cor. rotata. *Filam.* basi contigua. *Stigm.* 3, revoluta, basi subconnata. *Caps.* subglobosa, apice triplici rima dehiscens, 3-locularis 2-sperma.

1. *setifolium*, fol. subulato - setaceis. Michaux. l. c. p. 210. Helon. Asphodeloides. L. Pluck. mant. t. 342. f. 3. Hab. in Pennsylvania. Fol. arida, subgraminea. Spic. racemiformis. M.

890. TOFIELDIA. Cal. trifidus. *Petala* 6. *Caps.* superæ, tres, basi conjunctæ, polyspermæ.

1. *palustris*, scapo foliolo oblecto petal. lineari-obovatis. T. palustris. Huds. Smith. brit. t. p. 397. Engl. bot. t. 516. Heloneas borealis. Willd. II. p. 274. Heritiera anthericoides, var. *ramosa*. Com. de Sternberg, in Bot. Zeitung. t. p. 83. c. Erlang. 1802. (3? *borealis*, scapo toto? nudo. Anthericum cabryculatum. Lin. Hab. in turiosis alpinis.

*Obs.* An genuinum Anth. calyculatum. Lin. diversum est? A nonnullis hæc species male cum Narthecio conjungitur.

2. *pubescens*, spica oblonga interrupta, petal. lanceolatis acutis. Narthecium. Michaux. Flor. 1. p. 209. Anth. calycul. Gronov. Hab. in Carol. inferiore. Caps. subglobosa.

3. *pumila*, tota glabra, spica conglobata bracteata. Narthec. Michaux. l. c. Cresc.

ad lacus Mistassius. Fol. brevissima. Scap. filiformis.

4. *falcata*, fol. falcatis striatis distichis, flor. racemoso-spicatis. Iridogalvia falcata. Flor. Peruv. 3. p. 68. t. 302. Hab. in Andium montib. altis. Scap. squam. ovatis obtectus. Cor. albidio-purpurea.

5? *glutinosa*, scapo glutinosa-scabro, spica fasciculis paucis alternantibus. Michaux. p. 210. Cresc. a Quebec usque ad lacum Mistassius. Habitu Anth. ossifragi. Caps. ovoidea. M.

891. NOLINEA. Cor. 6-partita, patens. *Stylus* brevissimus. *Caps.* 3-gona, membranacea, 3-locularis, dissepimentis bipartilibus dehiscens. *Sem.* solitaria, hinc convexo-incurva.

1. *georgiana*. Michaux. Flor. 1. p. 208. Hab. in Georgia. Fol. undique versa, coriaceo-graminea. Scap. racemiflorus, ramosus, flor. parvulis albis.

*Obs.* Genus hinc Phalangio, inde Heloniae affine est. M.

892. SABAL. Flor. hermaphroditi. *Spathæ* partiales. *Filam.* libera, basi incrassata. *Bacca* (Drupa?) 1-3-sperma (per abortum). *Semen* osseum. *Embryo* lateralis.

1. *minor* s. *Adansoni*. Guernsent observat. sur le sabal d'Adanson in Bull. de la soc. Philom. n°. 67. t. 25. Corypha minor. Jacq. hort. vind. 3. p. 8. t. 8. Chamerops acaulis. Michaux. Flor. 1. p. 207. Hab. in Amer. boreali. Frond. palmatæ flabelliformes. Stipes inermis.

893. CHAMÆROPS. Polygama. *Spatha* compressa. *Spadix* ramosus. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala. *Filam.* submonodelpha. *Drupa* 3, monospermæ. Flor. masculi divici. (Ovarium 3-loculare, locul. 1-spermis, 2-abortantibus. Michaux.)

1. *Palmetto*, caul. arborese, stipitib. inermib. Michaux. Flor. 1. p. 206. Corypha Palmetto. Walt. Hab. in Amer. borealis maritimis.

2. *serrulata*, caul. repente, stipitibus (minutim) aculeato-serrulatis, drupis ovoideis. Michaux. l. c. Cum priore.

3. *humilis*, acaulis, frond. palmatis plicatis, stipitib. spinosis. Lin. Desf. Atl. 2. p. 436. Phoenix humilis. Cav. ic. 2. p. t. 115. Hab. in Hispania et in Barbaria. Filam. basi in urceolum coacta. Radices et pars inferior caud. juniorum sub terra recondita comeditur. Dioica?

β. *arborescens*, candice 14-16-petali, quae in Hort. parienti colitur, cum haec species in loco natali nullum caulem protrudit.

4? *excelsa*, frond. palmatis nervosis serratis, stipit. inermibus. Thunb. jap. p. 130. Rhapis flabelliformis. Ait. Kew. t. p. 473. L'Her. stirp. 2. t. 100. Hab. in Japonia. Stylus 1. An Corypha?

894. HYDROGETON. *Scapus* radicalis. *Cor.* 3-petala. *Filam.* basi dilatata. *Fistilla* 3, simplicia. *Caps.* 3, membranaceae, 2-spermæ. *Semina* parieti caps. aduata.

1. *fenestralis*. Fol. lineari-elliptica, obtusa, perforata. Rad. magna, edulis. Nomen vernaculum *Ouvirandra* (Mirbel. Hist. natur. d. plant. v. 4. p. 117.) i. e. radix edulis, haec tuberosa est et aquatica. Sequenti generi affine. Hab. in Malagascariae aquosis. (Ex. observ. D. Dupetit-Thouars.)

895. APONOGETON. *Amentum* e squamis compositum. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Capsule* 4, trispermæ. (Stam. passim 7 et 12.)

1. *monostachyon*, spica simplici, fol. cordato-ovalibus. Lin. suppl. 214. Thunb. diss. Nov. Pl. gen. 4. p. 76. c. ic. Willd. Spec. II. p. 927. Spathium. Lour. Conch. 1. p. 173.

β. *lineare*, spica simplici, fol. linearibus. Vahl. symb. 3. p. 51. Hab. in Indiae orient. inundatis, inter *Oryzam*. Radix bulbosa. Fol. radicalia natantia.

2. *crispum*, spica simplici, fol. ensiformibus crispis. Thunb. Diss. Nov. Pl. gen. p. 73. Radix fibrillosa.

3. *distachyon*, spica bifida, fol. lineari-oblongis natantibus, bracteis integris, flor. polyandris. Ait. Kew. 1. p. 405. Thunb. Hab. in rivulis Cap. b. spei. Radix bulbosa. Stam. 6-12. Bulbi assati eduntur.

4. *angustifolium*, spica bifida, foliis lineari-lanceolatis erectis, bracteis bipar-

titis, flor. hexandris. Hab. ad Cap. b. spei. Bract. albae basi rubrae.

## HEXAGYNIA.

896. WENDLANDIA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-petala, succulenta. *Styl.* reclinatus. *Caps.* 6, uniloculares, monospermæ.

1. *populifolia*. Willd. Sp. II. p. 275. Wendl. Hort. Herrenh. Fasc. 3. t. 16. Hab. in Carolina. Caesalpinia smilacea. Angl. Fol. alterna cordato-ovata, pendula integerrima. Racemi simplices supra axillares. Flor. parvi albi. Willd. h

897. OTTELIA. *Spatha* 1-phylla, 5-alata. *Cal.* superus, 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 10-locularis, polysperma.

1. *alismoides*. *Damasonium indicum*. Willd. p. 276. *Stratiotes alismoides*, fol. cordatis. L. Rheed. 11. t. 46. Hab. in aquis Ind. orientalis. Scap. uniflorus.

898. DAMASONIUM. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Styli* 6. *Caps.* (Nuces?) acuminatae, 1-3-spermæ, stellatim patentes.

1. *stellatum*. Dalech. hist. Juss. gen. pl. Alisma. L. Willd. p. 277. n. 4. Cart. Lond. t. 28. Habit. in fossis et stagnis passim.

## POLYGYNIA.

899. ALISMA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Caps.* plures, monospermæ.

1. *Plantago*, fol. ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. L. Flor. dan. t. 561. β. *angustifolia*, fol. lanceolatis. Hab. in aquosis. ¶

2. *flava*, fol. ovatis acutis, pedunculis umbellatis, fructib. globosis. L. Hab. in America meridionali. ¶

3. *sagittifolia*, fol. sagittatis, fructib. obovatis obtusis. Willd. Sp. II. p. 277. Hab. in Guinea. ¶

4. *cordifolia*, fol. cordatis obtusis, flor. dodecandris, seminibus uncinato-muricatis. L. Sp. pl. 487. Swartz obs. 139. Moris. s. 15. t. 4. f. 6. Plum. spec. 7. ic. 234. f. 2. Hab. in Amer. australi et septentrionali. ¶

5. *paruasifolia*,



5. *parnassifolia*, fol. cordatis subrotundis acutis, capsulis aristatis. Hab. in paludibus.  $\overline{\text{T}}$

6. *repens*, caul. subrepentibus adscendentibus, ad nodos inferiores radicosis et foliosis, fol. lanceolatis petiolatis, verticillis simplicibus. Lam. enc. 2. p. 515. Cav. ic. 1. p. 41. t. 55. Hab. in humidis Hispaniae et Barbariae.

7. *natans*, fol. ellipticis obtusis, pedunc. solitariis. L. Vaill. act. act. 1719. p. 29. t. 4. f. 8.

8. *ranunculoides*, fol. lineari-lanceolatis, fructib. globoso-squarrosis, 5-gonis. Flor. dan. t. 122. Engl. bot. t. 316. Hab. in paludosis, fossis.  $\overline{\text{T}}$

9. *subulata*, fol. subulatis. L. Hab. in Virginia.

M O N O G Y N I A.

Guettardae quaedam species. Genipa. Schradera. Tectonia grandis. Amyrus zeylanica. Limonia trifoliata. Lythrum lineare, Parsonsia, Hyssopifolia. Cassia glandulosa. Trientatis europaea. Polygona quaedam. Lauri nonnullae species. Dodonaea viscosa. Bocconia frutescens. Mimosa hexandra. Chloria imperfoliata. L. Gaura tripetala.

D I G Y N I A.

Swertia difformis. Velezia rigida. Leersia hexandra.

# C L A S S I S V I I .

## H E P T A N D R I A .

### M O N O G Y N I A .

900. *TRIENTALIS*. *Cal.* 7-phyllus. *Cor.* 7-partita, aequalis, plana. *Bacca* exsucca, (Stam. 5, 6 et 7.)

1. *europaea*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis. Flor. dan. t. 86. Engl. bot. t. 15. *β. americana*, fol. angusto-lanceolatis. Michaux. 1. p. 220. Hab. in sylvis et juniperetis.  $\mathcal{T}$

901. *DISANDRA*. *Cal.* subseptem-partitus. *Cor.* rotata, septem-partita. *Cal.* 2-locularis, polysperma.

1. *prostrata*, prostrata. Lin. suppl. 214. *Sibthorpia peregrina*, fol. reniformibus crenatis, pedunc. geminis. L. Sp. pl. 2. p. 880. Lam. ill. t. 275. *β? africana*, fol. orbiculatis integris crenatis, pedunc. solitariis. L. Habit. in Oriente et insula Madera.  $\mathcal{T}$

902. *PISONIA*. *Cal.* campannatus quinquefidus. *Cor.* 0. *Bacca* 1-locularis monosperma.

#### \* *Aculeatae.*

1. *aculeata*, spinis axillaribus horizontalibus, fol. ovatis utrinque attenuatis, corymbis axillaribus. Willd. Sp. p. 283. Lam. ill. t. 80r. Pluck. alm. 318. t. 108. f. 2. Sloau. hist. 2. p. 25. t. 167. Habit. in Amer. meridionali.  $\mathcal{h}$

2. *villosa*, spinosa, fol. ovato-obtusis, pedunc. subdivaricatis villosis. Poir. in Enc. Bot. 5. p. 347. Hab. in Ind. occid. Sonner. Flor. racemosi.

#### \* \* *Inermes.*

3. *subcordata*, fol. cordato-subrotundis, fruct. siccis subelevatis pentagonis, angulis apice muricatis. Swartz. prod. 60. Fl. ind. occid. 2. p. 641. Hab. in Antigua.  $\mathcal{h}$

4. *nigricans*, fol. ovatis acuminatis, flor. cynosis erectis, fructibus baccatis. P. inermis. H. Hab. in Jamaicae, Hispaniolae sylvestribus.  $\mathcal{h}$

5. *coccinea*, fol. lanceolato-ovatis; pedunc. terminalibus laxis, flor. nutantibus, fruct. baccatis. Swartz. prod. 60. l. c. 2. p. 945. Hab. in fruticetis Hispaniolae.  $\mathcal{h}$

6. *mitis*, fol. ovatis, flor. axillaribus. Willd. p. 284. Hab. in India orientali.  $\mathcal{h}$

903. *TOVARIA*. *Cal.* 7-phyllus, *Cor.* 7-petala. *Discus* planus, 7-gonus, stellaeformis, cui *Stam.* inserta. *Stigm.* peltatum. *Bacca* 1-locularis, pulposa. *Sem.* compressa. (Numerus partium passim octonarius.)

1. *pendula*, fol. ternatis, racem. longissimis, flor. secundis. Flor. Per. 3. p. 73. t. 306. Hab. in Peruviae runcationib. et fluviumque ripis.  $\mathcal{G}$

904. *PETIVERIA*. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* 0. *Stylus* lateralis. *Stigma* penicilliforme. *Sem.* 1; aristis quatuor reflexis apice instructum. (Stam. 6-8.)

1. *alliacea*, flor. hexandris. L. Trem. Ehr. 33. t. 67. P. fol. oblongo-ovatis, spicis longis terminalibus. Brown. jam. 274.

*β. octandra*. Jacq. amer. 201. Plum. gen. 50. ic. 219. Hab. in Jamaic. nemorosis aridis. h

905. *PANCOVIA*. *Cal.* campanulatus, 4-partitus. *Pet.* 5, unguiculata, plicato-crispa, dentata, cucullata. *Stam.* adscendentia; calyce longiora.

1. *bijuga*. Willd. Sp. II. p. 285. Hab. in Guinea. Arb. ramulis ferrugineo-pubescentibus. Fol. alterna, pari-pinnata. Racemi interfoliacei multiflori. W. h

906. *ÆSCULUS*. *Cal.* 1-phyllus, ventricosus. *Cor.* 4, s. 5-petala, inæqualis, pubescens, calyci inserta. *Caps.* 3-locularis. *Sem.* magna castaneæformia.

\* *Capsulis echinatis, cor. 5-petala planiuscula.*

1. *Hippocastanum*, fol. digitatis septen-, cor. pentapetalis patulis. Willd. Sp. p. 285. *β. inermis*, fruct. nudiusculo, fol. variegatis. Enc. bot. 3. p. 712. Hab. sponte in Asia septentrionaliore. Flor. polygami. h

\*\* *PAVIA, cor. 4-petala, connivente, caps. laevibus.*

2. *Pavia* (rubra), fol. quinis glabris petalis obovatis, unguibus longitudine calycis. Ait. Kew. 73 p. 494. *Pavia*. Doerb. lugdb. 2. p. 260. t. 260. Trev. chret. *Pavia* rubra. Enc. bot. 5. p. 94. Hab. in Carol., Florida, Brasilia. h

3. *lutea*, fol. quinq. subtus ad costam pubescentibus aequaliter serrulatis, corollis tetrapetalis, petalor. unguibus calyce longioribus. Willd. p. 285. (Ae. Bava.) Ae. *lutea*. Wanzeh. Act. Soc. Berol. 8. p. 133. t. 6. Hab. in Carolinae montib. excelsis. In solo pingui ad altitudinem Ae. Hippocastani assurgit. Michaux.

4. *macrostachys*, humilis, foliol. quinis subtus subtomentosis, spica tenui longissima. Michaux. Flor. 1. p. 220. Ae. parviflora. Walt. Ae. nana. H. P. Hab. ad ripas Ammis Savannah. 3-4-petalis. Flor. albidis, plerumque heptandri. Arb. stoloniifera. M.

907. *PETROCARYA*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 14, quorum 7-sterilia. *Drupa* carnosa, cribrata. *Nux* bilocularis, loculis monospermis.

1. *montana*, foliis ovatis acuminatis.

Willd. p. 28-. Parinari montana magno fructu. Aubl. guj. 1. p. 514. t. 204. 205. Hab. in sylvis interioris Gujanæ. h

2. *campestris*, fol. cordatis acuminatis. Willd. Parinari fructu parvo. Aubl. p. 517. t. 206. Hab. in sylvis Gujanæ. h

908. *IONESIA*. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* infundibuliformis, tubo clauso carnoso, limbo 4-fido. *Nectar.* annulus fauci tubi corollæ insertus, staminiferus. *Legumen.*

1. *pinnata*. Roxb. Asiat. Researches. 4. p. 355. Rheed. 5. t. 59. Habit. in India orientali. Arb. mediocris. Flor. aurantii cymosi. Legum. acinaciforme. h

## D I G Y N I A.

909. *LIMEUM*. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, æqualia. *Caps.* globosa, 2-locularis.

1. *africanum*, fol. oblongis petiolatis. Lin. suppl. 214. Hab. ad Cap. b. spei, cum 2 sequentibus. Statura Corrigiolæ s. Telephii. h

2. *capense*, fol. ovatis sessilib. Thunb. prod. p. 68. L. aphyllum. Lin. suppl. 214.

3. *aethiopicum*, fol. linearis-lanceolatis. Thunb. prod. 68.

## T E T R A G Y N I A.

910. *ASTRANTHUS*. *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriformis, limbo 14-fido. *Sem.* 1, parvum, superum.

1. *cochinchinensis*. Loureiro cochin. 1. p. 274. Willd. Sp. II. p. 291. Hab. in Cochinchina. Arbor. ramis paucis adscendentibus. Fol. ovata serrata lanuginosa alterna. Spicæ longæ simplices axillares. L.

911. *SAURURUS*. *Cal.* amentum squamis 1-floris. *Cor.* o. *Germ.* 4. *Baccæ* 4, 1-spermae.

1. *cernuus*, caule folioso polystachio. L. Lam. ill. t. 1. Mathuskea. Gm. syst. p. 589. Pluck. alm. 343. t. 117. f. 3. 4. Hab. in Virginia. Stamina vix numerantur, nisi deflorato amento persistentia. L.

## H E P T A G Y N I A.

912. *SEPTAS*. *Cal.* 7-partitus. C c 2

*Petal* 7. *Germina* 7. *Caps.* 7, polysperme.

1. *capensis*. L. *Andrew.* t. 60. *Lam. ill.* 8. 276. *Crassula* Septas, fol. connatis crematis subrotundis, caule subaphyllo umbellifero. Thunb. prod. 57. Hab. ad Cap. b. opei. Rad. tuberosa.

913. **ACTINOPHYLLUM.** *Cal.* margo integer. *Cor.* calyptraeformis, desiliens. *Bacca* 7-angularis, 7-locularis. *Sem.* solitaria subossea. (Flor. conglomerati. Styl. 5-7. Stam. etiam 5, 6, 8, 9.)

1. *angulatum*, arboreum, foliosis 7-11-nis, cor. obovatis angulatis truncatis. Flor. Per. 3. p. 73. t. 307. Hab. in Peruviae collib. nemorosis. Arb. spectabilis.

2. *pedicellatum*, scandens, foliol. 9-13-nis, racemis septenis, flor. pedicellatis umbellatis, cor. hemisphaericis. Flor. Per. l. c. t. 308. In Peruviae nemorib. ad Munna tractus. Gummi crystallinum ut ex priore exsudat. 2

3. *conicum*, scandens, foliol. 7-13-nis, racem. ternis binisque, corol. conicis. Flor. Peruv. p. 75. t. 309. In Peruv. nemorib. *Bacca* globosa, hyacinthina.

4. *acuminatum*, scandens, foliol. 7-11-nis, racem. 2-5-nis, corol. acuminatis acumine obliquo. Flor. Peruv. t. 310. Cum priore. Frut. scandens. Recept. flor. favosum.

5. *pentandrum*, erectum, foliol. 7-11-nis, racemis solitariis ternisque, corol. conicis obtusis. Flor. Per. p. 73. t. 311. *Bacca* 5-gona, albicans.

914. **GILBERTIA.** *Cal.* 7-dentata. *Cor.* 7-petalus. *Stigm.* patentis, ovata. *Caps.* loculamenta 1-sperma, in stellae formam disposita. *Sem.* oblonga. (Numerum partium interdum 8-9-narius.)

1. *umbellata*, fol. oblongis obsolete denticulatis. Flor. Peruv. 3. p. 75. t. 312. Hab. in Peruviae nemorib. Munna. Arb. 3-ulnaris. *Caps.* et cortex parum aromatica. *Polysciac* Forst. valde affine *genus*. l. c.

## MONOGYNIA.

*Casia.* *Pal.* 1-nis. *Drocontium*, *Calla*, *Houttuynia*, secundum Willdenow

## DIGYNIA.

*Polygonum orientale* et alia. *Aponogeton*. Lin.

## HEPTAGYNIA.

*Phytolacca stricth.*

# CLASSIS VIII.

## OCTANDRIA.

### MONOGYNIA.

915. *TROPEOLUM*. *Cal.* 1-phyllus, 5-fidus, calcaratus. *Petal.* 5, inaequalia. *Nuc.* coriacea, sulcata. *Sem.* 1, subrotunda.

1. *minus*, fol. peltatis subrepandis mucronatis, petalis acuminato-setaceis. L. Willd. Sp. II. p. 298. Curt. mag. t. 68. Hab. in Peru. Var. flor. pleno, quae perennat. ☉ ☿

2. *majus*, fol. peltatis, repandis, petalis obtusis. E. Peru in Europam venit 1684.

3. *hybridum*, fol. subpeltatis, quinquelobis integerrimis, petalis variantibus. L. Mant. p. 64. Berg. act. holm. 1764. p. 32. t. 1.

*Obs.* A praecedente orta Holmiae semine rarius, sed ramis propaganda planta. Fol. latius cuneata, nuntia, margine omni ascendente, hinc fere cucullata. L.

4. *peruvianum*, fol. peltatis palmato-quinquelobis basi excavatis, petal. inferioribus ciliatis, superioribus incisus maximis. Flor. Peruv. 3. p. 75. Jacq. Schoenbr. t. 1. p. 51. t. 68. Hab. in Peru ubi ornamenti gratia colitur. Fol. in Peruvia non dentata. L. c. ☉

5. *bicolorum*, fol. peltatis septem-lobis basi transversim truncatis, petal. inciso-ciliatis. Flor. Per. l. c. t. 313. Hab. in Andium nemorib. humidis. Petal. 2-superiora lutea minora, 3-inferiora coccinea punctata.

6. *dipetalum*, fol. supeltatis sextemlobis, cor. dipetala, petal. spathulatis crenulatis.

Flor. Per. 3. p. 77. t. 313. In Andium montibus. Succosum, subglaucum. ☿

7. *tuberosum*, fol. peltatis quinquelobis basi transversim truncatis, petal. dentatis cal. fere longitudine. Flor. Per. t. 314. Copiose in Peruviae praeruptis incolae radices, tuberoso-pendulas, coctas quotidie comedunt.

8. *ciliatum*, fol. peltatis palmatis sexlobis, stipul. bracteolisque ciliatis, petal. integerrimis cal. subaequantibus. Flor. Per. p. 77. Hab. in R. chilensis sylvis. Caul. filiformis, nitidus, ramosissimus.

9. *pentaphyllum*, fol. digitato-quinatis: foliol. ovalibus integri subpetiolatis, petal. omnibus sessilibus brevibus acutis integerrimis. Lam. enc. t. p. 605. Ejusd. ill. t. 277. f. 2. Hab. ad Monte-Video. Pet. cal. breviora.

10. *polyphyllum*, caul. prostrato, petiol. elongatis alternis polyphyllis (fol. digitato 5-10-phyllis). Cav. ic. 4. p. 65. t. 365. Hab. in chilensi Monte-Cordillera. Foliola in orbem expansa: majora dentata. Pet. cal. longiora. ☉

916. *MAGALLANA*. *Cal.* 3-partitus, calcaratus. *Petala* 5, inaequalia. *Fruct.* trialatus, monospermus (per abortum). *Sem.* oblongum. (*Filam.* basi breviter coalita.)

1. *porifolia*, caul. herbaceo scandente, fol. alternis trifidis, flor. axillaribus. Cav. ic. 4. p. 51. t. 374. Hab. in Amer. meridionali. Flor. lutei. Hoc genus navigatori celeberrimo Ferd. Magallano consecratum est.

917. *OSBECKIA*. *Cal.* 4-fidus: lobis squama ciliari interstinctis. *Cor.* 4-5-petala. *Antherae* rostratae. *Caps.* 4-5-locularis, calycis tubo truncato cincta. *Receptac.* compressum, semi-ovatum. *G.* (Stam. 8-10.)

1. *chinensis*, fol. sessilibus, calycib. glabris. Willd. Sp. II. p. 300. *O.* pedunc. trifloris bracteatis. Lin. suppl. p. 215. Lam. ill. gen. t. 283. Osbeck. it. 213. t. 2. Hab. in China. Caul. brachiatus. Fol. angusto-lanceolata, trinervia.

2. *zeylanica*, fol. petiolatis, cal. hispidis. Willd. *O.* pedunc. unifloris nudis. Lin. suppl. *O.* chinensis. Gaertn. de fr. 2. p. 202? Pluck. alm. 142. t. 173. f. 4. Hab. in Zeylena. Fol. linearis-lanceolata, ut tota planta, strigosa. W.

*Obs.* Osbeckiae a Rhexiis differre videntur germine infero, quum capsula Rhexiae calyce inclusa. Willd., a *Melastomis* non satis distinctae, et potius cum iis conjungendae. Lam. enc. bot. 4. p. 647.

918. *RHEXIA*. *Cal.* urceolatus, 4-5-fidus. *Pet.* 4, calyci inserta, obliqua. *Antherae* declinatae. *Caps.* setosa, 4-locularis, intra ventrem calycis. *Receptac.* sub-lunatum. *Sem.* numerosa, cochleata. (Stam. etiam 10.)

\* *Foliis sessilibus perisquis.*

1. *virginica*, caul. alato subpiloso, fol. sessilib. sub-lanceolatis trinerviis serrato-ciliatis, calycib. glanduloso-ciliatis. Willd. Sp. II. p. 301. Michaux. Flor. p. 222. Pluck. alm. 235. t. 202. f. 8.  $\beta$ . *septemnervia*. Walter, statura majore, fol. 5-7-nerviis (in inundatis). Hab. in Amer. boreali. Caul. angulis membranaceis.  $\overline{\eta}$

2. *mariana*, caul. hirsutissimo, fol. sessilibus lanceolatis trinerviis villosis-ciliatis, cal. stellato-pilosis. Willd. Michaux. 1. p. 221. Lam. ill. t. 283. f. 1. Pluck. mant. 123. t. 428. f. 1. Hab. in Marilandiae pratis. Var. fol. purpureis et rubellis, fol. plus minusve latioribus.

3. *trichotoma*, flor. solitariis axillaribus terminalibusque, fol. sessilibus oppositis lanceolatis hirsutis. Vahl. symb. 2. p. 48. Rottb. pl. surinamens. p. 9. tab. 5. Hab. Surinami.  $\eta$

$\beta$ . *exaltida*, fol. linearibus, flor. pallidis. Michaux. R. lanceolata. Walter.

4. *petiolata*, fol. subovatis trinerviis ciliatis petiolatis, caps. globosis, anther. nudis. Walt. carol. p. 130. Hab. in Carolina.

5. *ciliata*, caul. subquadrangulo glabro, fol. parvulis subpetiolatis ovalibus subtus glabris, supra parce hispidulis, margine ciliatis, flor. involucreis. Michaux. 1. c. Hab. in Carol. infer. Flor. violaceo-purpurei. Affn. priori.

6. *lutea*, caul. 4-angulo hirsuto, fol. inferioribus cuneato-oblongis obtusis; superiorib. lanceolatis. Michaux. p. 222. Walt. 1. c. Hab. in Florida et Georgia. Flor. lutei. Anth. breviusculae uti in priore. M.

7. *Alifanus*, foliis subovatis cauleque erecto sublaevibus, cal. corollaeque glanduloso-pilosis. Walt. carol. p. 130. Hab. in Carolina.

8. *glabella*, caul. cylindraceo glabro, fol. sessilibus erectis lanceolatis laevibus glabris integris, flor. brachiato-subpaniculatis, cal. hirsuto-glutinosis. Michaux. 1. p. 223. In Carol. et Georgiae sylv. Flor. majusculi, dilute purpurascens. Priori affinis.

9. *Jussiaeoides*, pubescens, fol. lanceolatis alternis constans margine scabris. Lin. suppl. 215. Hab. in Surinamo. Fol. margine scabra ex minutissimis serraturis.  $\eta$

10. *bivalvis*, decandra, fol. sessilibus glabris ovatis obtusis trinerviis, capsula bivalvi. Willd. p. 302. Vahl. eclog. 1. p. 38. Melastoma bivalvis. Aubl. guj. 1. p. 404. t. 155. f. 4. Hab. in pratis paludosis Gujanac.  $\odot$

11. *trivalvis*, decandra, fol. sessilibus glabris linearis-lanceolatis acutis, obsolete trinerviis, capsula trivalvi. Willd. Vahl. eclog. 1. p. 39. M. trivalvis. Aubl. guj. 1. p. 406. t. 155. f. 6. Hab. in pratis paludosis Gujanac.  $\odot$

\*\* *Fol. petiolatis.*

12. *hypericoides*, decandra, villosissima, fol. ovatis acutis integerrimis brevissimis petiolatis septemnerviis, panicula terminali. Willd. p. 303. M. villosa. Aubl. guj. 1. p. 428. t. 168. Hab. in pratis humidis Cajennae. Facies Hyperici montani.  $\odot$

13. *glutinosa*, fol. oppositis trinerviis laevibus, flor. thyrsoides. Lin. suppl. p. 216. Mutis. amer. v. 1. t. 6. Hab. in N. Granada. Melastomis similis, ramulis articu-

latis. Summitates ramulorum et calyces glutinosi. L.

14. *quinquenervis*, fol. ovatis acutis quinquenerviis, pedunc. dependentibus subcorymbosis, petal. convolutis. Flor. Peruv. 3. p. 83. t. 318. f. 6. Hab. in Peruviae montibus et collibus. Petal. violacea. h

15. *rosmarinifolia*, fol. subpetiolatis oblongo-linearibus trinerviis, margine revolutis, pedunc. 3-5-floris pendulis, petal. convolutis. Flor. Peruv. t. 318. Hab. in collib. ventosis, aridiusculis. Petal. violacea, nocte et mane patentia.

16. *lutescens*, fol. ovatis trinerviis rugosis, pedunc. trifloris pendulis, petal. convolutis. Flor. Per. p. 84. t. 319. Cresc. in montibus, locis pluviosis. Flor. latescentes pasim 10-andri. h

17. *dicrananthera*, fol. ovatis 5-nerviis, pedunc. subcorymbosis, petal. patentibus. Flor. Peruv. t. 320. Hab. in Peruviae sylvis. R. villosae affinis. Petal. rosae.

18. *echinata*, fol. ovatis 5-nerviis subtus lanuginosis supra echinatis, pedunc. 1-3-floris : petal. magnis patentissimis. Flor. Peruv. 3 p. 85. t. 319. Hab. in collibus, ventosis. Flor. violacei, 10-andri. h

19. *recurva*, fol. petiolatis ovatis minimis, caul. 4-angulari articulo apice recurvo, flor. terminalibus subsolitariis. Poirr. in Enc. bot. 6. p. 6. Hab. in Cajenna. Stam. exserta. Anth. versatiles.

20. *flexuosa*, hirsutissima, fol. lanceolatis serrulatis 5-nerviis, pedunc. corymboso-dichotomis, petal. reflexis. Flor. Per. p. 85. t. 320. In Peruv. runcationibus. Pet. parva, alba.

21. *ochypetala*, hirsuto-hispida, foliis lanceolatis 5-nerviis, pedunc. trifloris, petal. patentissimis acuminatis. Flor. Per. p. 86. t. 321. Hab. in montibus apertis, praeruptis. Petal. purpurea acumine parvo. Flor. bract. 2, caducis tecti, 10-andri. h

22. *glomerata*, foliis petiolatis ovatis integerrimis trinerviis villosis, flor. terminalibus glomeratis. Willd. p. 304. Rotb. pl. surinamens. p. 8 t. 4. Hab. in Surinami pratis depressis.

23. *longifolia*, decandra, pilosa, foliis lanceolatis integerrimis quinquenerviis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis fol. brevioribus. Hab. in America aeternali.

24. *aspera*, decandra, foliis petiolatis ovatis quinquenerviis, calyce squamoso-bracteato. Willd. Tibouchina aspera. Aubl. guj. 1. p. 446. t. 177. Hab. in aridis Gujanac. Calyx squamis imbricatis tectus. h

25. *uniflora*, fol. petiolatis ovatis serratis, flor. axillaribus solitariis decandris, caule alato dichotomo. Hab. in Cajenna. Caul. herbaceus, viscosus. Fol. margine o. pil. glandulosis ciliato serrata. Capsulae Coriandri.

26. *inconstans*, fol. ovatis hispidis, setis adpressis, subius incanis trinerviis, pedunc. terminalibus subunifloris. Osbeckia ornata. Swartz Fl. ind. occid. 2. p. 647. Hab. in summo monte Montansery St. Christophori. h

27. *latifolia*, fol. petiolatis subrotundis acutis quinquenerviis hirsutis, pedunculis terminalibus unifloris. Willd. p. 305. Aubl. gujan. 1 p. 336. t. 129. f. 2. Hab. in pratis Gujanac.

28. *villosa*, fol. petiolatis subrotundis ovatis acutis quinquenerviis villosis, flor. geminis terminalibus subsessilibus. Willd. Aubl. 1. c. p. 334. t. 129. f. 1. Cum priore in pratis.

29. *aquatica*, foliis oppositis cordatis crenulatis hirsutiusculis, panic. terminalibus trichotomis, ramulis filiformibus patentissimis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 650. Melastoma aquatica. Aubl. p. 430. tab. 169. Hab. in inundatis Gujanac, Surinami, Jamaicae, Dominicae. h

ONACR. (Gen. 918-922.) *Cal.* superus, tubo longo distinctus : limbo 4-5 persistente, aut deciduo. *Petala* summo calyci inserta, haecida. *Stam.* numero varia : 2, 4, 6, 8, 10 et plura. *Fructus* plerumque inferus, est vel capsula, aut bacca, aut drupa, ut plurimum polysperma, 1-multilocularis. *Fol.* alterna, aut opposita. *Caul.* herbaceus vel frutescens.

919. OENOTHERA. *Cal.* tubulosus : 4-fidus, laciniis deflexis deciduis. *Petala* 4, cal. inserta. *Stigm.* 4-fidum. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis, infera. *Sem.* nuda, receptaculo centrali, 4-gono affixa.

\* *Caps. elongatis teretibus sessilibus.*

1. *biennis*, fol. ovato-lanceolatis planis caule muricato-villoso, caps. conicis deor-

sum subturgidis. Mill. ic. t. 89. f. 2. Flor. dan. 446. Lam. ill. t. 219. f. 1. Hab. in Virginia, unde 1614. nunc vulgaris in Europa. Stam. coroll. breviora. W. ♂

2. *suaveolens*, foliis ovato-lanceolatis obsolete dentatis, caps. elongatis crassitudine subaequalibus, cor. magna. Hab. in America. Col. in hort. ob odorem aurantium et magnitudinem florum. Oen. grandiflora. Ait? Antecedente omnib. partibus maior. Caps. sulcatae, deorsum subcrassiores.

3. *parviflora*, foliis ovato-lanceolatis planis, caule laevi subvillosa, staminibus cor. longioribus. Willd. Sp. II. p. 306. Mill. ic. 189. f. 1. Hab. in America septentrionali. Fructus apex margine octifido, nec quadrifido. Caul. ruber, scaber. L. ♂

4. *muricata*, fol. lanceolatis planis, caule purpurascente muricato, stamin. longitudine corollae. Willd. Murr. in N. Comment. Goett. VI. p. 24. t. 1. Habitat in Canada. Similis antecedenti, sed fructus os non 8-fidum. L. ☉ ♂

5. *longiflora*, fol. denticulatis, caul. simplicibus pilosis, petalis distantibus bilobis, flor. tubo longissimo. Jacq. hort. t. 172. Curt. magn. 365. Habitat in agro Bonariensi. Petala flava, biloba, post anthesin rubescunt. Caps. hirsutae. ☉ ♂

6. *mollissima*, fol. lanceolatis undulatis, tomentosis. Dill. elth. agr. t. 219. f. 286. Hab. in agro Bonariensi, et R. Chilensis campis. Petal. primo flava dein purpurea. ☉

7. *nocturna*, fol. lanceolatis repando-dentatis pubescentibus, caule tereti pubescente. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 455. Collect. 3. p. 205. Lam. ill. t. 219. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei. Fruct. ovato-oblongus. Cor. praecedentis, petalis flavis, dein rubicundis. ☉

8. *villosa*, fol. lanceolatis villosis, caule angulato hirsuto. Thunb. prod. 75. Cum priore. †

9. *prostrata*, fol. sublanceolatis acutis dentato-sinuatis, caps. linearib. obtuse 4-gonis coronatis-curvatis. Flor. Per. p. 79. t. 315. Hab. inter Peruv. segetes. Petal. latea purpureaque, obcordata. A flnis videtur Oe. *sinuata*.

10. *sinuata*, decumbens molliter pubescens, fol. lanceolatis dentato-sinuatis (incis), flor. axillariis villosis. Michaux. Flor. 1. p. 224. Murray in comm. Goett. 5. t. 9. In Amer. bor. arida.

11. *tenella*, fol. linearis-obovatis, caps. cylindricis curvatis. Flor. Per. t. 316. Cav. ic. 4. p. 66. t. 396. f. 2. Hab. in R. Chil. campis. Pet. purpurea, cal. duplo longiora.

12. *odorata*, fol. lineari-lanceolatis subdentatis undulatis, caule villosa suffruticoso. Jacq. ic. rar. 3. t. 456. Collect. suppl. 107. Hab. in Patagonia. Fol. rigida. Flor. magnitudine Oe. longiflorae. W.

13. *tenuifolia*, fol. inferiorib. oblongis, superiorib. linearibus, caps. cylindricis rectis, petal. crenulatis. Flor. Per. p. 81. t. 317. Cav. ic. 4. p. 67. t. 397. Onagra linariaefolia. Few. 3. t. 34. Hab. in collib. siccis, campis. Pet. albis-purpurea. Flor. Per., luteo-rubra. Cav.

14. *dentata*, fol. sublinearibus denticulatis, caps. cylindricis angustissime curvatis. Flor. Per. p. 82. t. 317. Oe. caps. tenuissimis tetragonis. Cav. ic. 4. p. 67. t. 392. Hab. in arvis, segetib. locis arenosis. Pet. obovata, obsolete crenulata lutea.

\* \* Caps. *ventricosus angulatis quibusdam pedicellatis.*

15. *acaulis*, fol. pinnatifidis: lacinia terminali majore denticulata. Cav. ic. 4. p. 60. t. 399. Oe. *grandiflora*, fol. interrupte pinnatis pinnatifido-lyratisque, caps. sessilibus obovatis 4-gonis alatis. Flor. Peruv. 3. p. 78. t. 318. Hab. in N. Chilensis arvis et ruderalis. Pl. initio florescentiae acaulis, postea caulescens. Pet. alba. Fl. Per. 1. c. ♂

16. *virgata*, fol. lyratis lanceolatisque dentatis, caps. pedunculatis clavatis. Flor. Per. p. 29. t. 315. Hab. in Peruvian segetib. et ruderalis. Flor. subpaniculati, purpurei. Var. fol. vix incis.

17. *tetraptera*, (mutabili) fol. lanceolatis basi pinnatifido-dentatis, capsulis pedicellatis obovatis quadrialatis. Willd. p. 309. O. foliis alternis subpinnatis crispis, flore mutabili, fructu tetraptero. Cavan. ic. 3. p. 40. t. 279. Hab. in Sotoluca N. Hispaniae. Flores maximi, candidi, post florescentiam purpurei. †

18. *glauca*, fol. lato-ovalibus repando-subdentatis laevigatis glaucis, caps. ovato tetragona. Michaux. 1. p. 224. Hab. in Americae boreal. sylvis.

19. *hybrida*, caul. erecto villosa, fol. utrinque pubescentibus lanceolatis remote dentatis undulatis, caps. subspicatis ovato-tetragonis subscitipatis. Michaux. p. 225. Hab. in Carol. superiore.



20. *fruticosa*, fol. lanceolatis subdentatis acutis, capsulis pedicellatis oblongo-clavatis angulatis. Willd. p. 310. Curt. mag. t. 332. Hab. in Virginia. Flor. magui, aurei. Cal. purpureo-cens. Flor. lutei.

21. *pumila*, fol. lanceolatis integerrimis obtusis, capsulis pedicellatis elliptico-obovatis angulatis. Willd. Curt. mag. t. 355. Hab. in America septentrionali. Petala lutea, obcordata, lineata. Caps. octangulares,  $\overline{\text{r}}$ .

22. *rosea*, fol. ovatis utrinque attenuatis dentatis, capsulis pedicellatis oblongo-obovatis angulatis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 3. Oe. purpurea. Enc. bot. 4. p. 554. Oe. rubra. Cav. ic. 4. p. 68. t. 400. Hab. in Peru. Pet. rubra.  $\overline{\text{r}}$ .

23. *purpurea*, fol. glaucescentibus glabris lanceolatis integerrimis utrinque attenuatis obtusis, caps. sessilibus ovatis angulatis. Willd. O. foliis ovato-lanceolatis glaucescentibus integerrimis, caps. sessilibus, stigm. atropurpureo. Curt. mag. t. 352. Hab. in America boreali. Pet. purpurea. Caul. semipedalis. Folia glaucoviridia. W.

24. *pusilla*, minutum pubescens, caul. simpliciter, fol. lanceolato-oblongis obtusiusculis integris, caps. sessilibus obovato-turbidatis subaequaliter 8-gonis. Michaux. 225. Hab. in rupibus ad l. cus Mississins. Pl. 4-6-uncialis. Flor. ad summitatem axillares. M.

25. *chrysantha*, caul. debili subpubescente, fol. lanceolatis obtusiusculis planis integris, caps. sessili clavata acutangula. Michaux. p. 225. Cresc. a Quebec ad sinum Hudsonis. Subpedal. Flor. parvi aurei. M.

26. *linearis*, pubescens gracilis, fol. linearibus, caps. stipitatis subrotundo-4-gonis villosis. Michaux. Hab. in Carol. superiore.

27. *subulata*, fol. subulatis, caps. clavatis 4-gonis superne alatis. Flor. Per. 3. p. 82. t. 316. Hab. in Chili apricis, arvis. Petal. bifida, purpureo-rubra.

920. *GAURA*. Cal. 4-fidus, tubulosus. Cor. 4-petala, adscendens versus latus superius. Nux infera. 1-sperma.

1. *biennis*, fol. lanceolatis dentatis, pet. obovatis adscendentibus patulis, stylis staminibusque deflexis, caule herbaceo.

Willd. Sp. II. p. 311. Michaux. Flor. 1. p. 226. Curt. mag. t. 339. Flor. spicatoscymbosi, rubelli. Hab. in Virginia, Pennsylvania.  $\overline{\text{r}}$

2. *angustifolia*, fol. linearibus confertis, repando-undulatis, spicae fructibus dissitis oblongo-4-gonis utrinque acutis subeandicantibus. Michaux. l. c. Hab. in Carol. inferiore. Flor. duplo minores.

3. *fruticosa*, fol. lineari-lanceolatis denticulatis, petalis obovato-lanceolatis adscendentibus adpressis, stylis staminibusque rectis, caule fruticoso. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 457. Collect. 1. p. 142. Hab. in Amer. meridionali.  $\overline{\text{h}}$

4. *mutabilis*, fol. ovatis dentatis, pet. ovatis acutis cruciatim patentibus, stylis staminibusque rectis, caul. fruticoso. Willd. Cav. ic. rar. 3. p. 30. t. 258. Curt. mag. t. 388. Hab. in N. Hispania. Cor. flava post anthesin rubescit, An a priore specie diversa?

5. *tripetala*, fol. lanceolatis subdentatis, flor. hexandris. Cav. ic. 4. p. 66. t. 396. f. 1. G. hexandra. Orteg. Hab. in Mexico. Pet. 3, coccinea. Nux 3-gona.

921. *EPILOBIUM*. Cal. 4-fidus, tubulosus. Petala 4. Caps. oblonga, infera. Sem. comosa. (Flor. rubelli.)

\* *Staminibus declinatis.*

1. *spicatum*, caul. elongato simpliciter, fol. alternis lanceolatis glabris venosis, pedunc. ebracteatis, spica pyramidata. Lam. enc. 2. p. 373. E. *angustifolium*. Willd. Sp. II. p. 313. et plur. auctor. Flor. dan. t. 289. Curt. Lond. ic. E. *antonium*. quorumd.

2. *latifolium*, fol. alternis lanceolato-ovatis subdentatis breviusculis aveniis, flor. inaequalibus axillaribus et terminalibus. Flor. dan. t. 565. E. *frigidum*. Retz. Scand. ed. 2. n. 459. Act. Haf. 10. t. 8. f. 23. Hab. in Europ. septentrionalis uliginosis?

Obs. Rad. densa, compacta. Caul. pedalis fere. Fol. vix unc. 1. longa, avenia, infima squamiformia. Flor. prioris sed non spicati.

3. *angustifolium*, caul. ramosissimo, fol. sparsis anguste linearibus aveniis, pedunc. unibracteatis. Lam. l. c. 374. E. *angustissimum*. Ait. Willd. rosmarinifolium. Haenke. Moris. 5. 3. t. 11. f. 2. Hab. in Groenlandia, inque alpibus.  $\overline{\text{r}}$

\* \* *Staminibus erectis regularibus.*

4. *hirsutum*, caul. ramoso, fol. oppositis lanceolatis serratis decurrenti-amplexicaulibus. L. Flor. dan. t. 326. Curt. Lond. ic. E. amplexicaule. Lam. enc. l. c. Hab. ad latera rivulorum. Cor. calyce duplo major. Stigm. crassum 4-fidum.

\* *incanum*, totum incanum, caul. ramosissimo, fol. subamplexicaulibus lanceolatis dentatis, stigm. crasso 4-fido. E. *tomentosum*. Vest. Hort. Cels. p. 90. t. 90. Habitat ad margin. rivulorum in oriente. Praeter caniticum albicantem et patriam alienam a priore non diversum. An tantum varietas?

5. *pubescens*, fol. (mediis) oppositis lanceolatis subpetiolatis pubescentib., caul. villosissimo simplicissimo. Roth. germ. II. 435. Flor. dan. t. 347. E. villosum. Curt. Lond. ic. E. parviflorum. Hoffm. E. molle. Lam. enc. 2. Moris. s. 3. t. 11. f. 4. Hab. ad fossas et in pratis.  $\overline{\text{E}}$

6. *villosum*, fol. alternis lanceolatis serratis hirsutis. Thunb. prod. 75. Hab. ad Cap. b. spei.

7. *montanum*, fol. subpetiolatis oppositis ovatis dentatis, stigm. 4-partito. Smith. brit. 1. p. 410. Flor. dan. t. 922. Curt. l. c. t. 14.

$\beta$ . *alpestre*, foliis oppositis alternisque ovatis denticulatis subsessilib. glabris, caul. simplicissimo obtusangulo, flor. axillaribus subsessilibus, caps. utrinque attenuatis tetragonis. Schmidt. bohém. n°. 377. Hab. in montosis, nemorosis, ad muros etc.

$\gamma$ . *trigonum*, caul. simplice obsolete trigono, fol. ternis ovatis dentatis sessilibus. Hab. in Silesia et in Helvetia. Ludw. E. *alpestre*? Schleicher. An E. *alpestre* Schmidt bohém. diversum?

8. *roseum*, fol. oppositis alternisque ovato-lanceolatis petiolatis serratis glabris. Roth. germ. 2. p. 458. Schreb. Sp. p. 147. E. *roseum*, fol. petiolatis ovatis dentatis, caul. subtetragono, stigm. indiviso. Smith. brit. 1. p. 411. Hab. in uliginosis ad margines rivulorum. Caul. (ramosus), superne villo candido obiectus. R. *incanum*. S. Flor. parvi carnei. Stigm. clavatum. S.

$\rho$ . *glabellum*, fol. oblongis dentatis obtusis, imis oppositis, caule teretiusculo erecto. Forst. prod. n°. 160. Hab. in N. Zeelandia.

10. *denticulatum*, fol. sublanceolatis

denticulatis: inferiorib. oppositis, petal. aequalib. bifidis. Flor. Per. 3. p. 78. t. 314. Hab. in Peruv. et chilens. ripis. Pet. rosea. Suffrutescens.

11. *rotundifolium*, fol. oppositis subrotundis denticulatis. Forst. prod. n°. 161. Hab. in N. Zeelandia.

12. *tetragonum*, fol. lanceolatis denticulatis, imis oppositis, caule ramoso tetragono, stigm. indiviso. Smith. p. 412. Flor. dan. t. 1029. Curt. Lond. 23.

$\beta$ . *obscurum*, fol. oppositis alternisque, lanceolatis glabris serratis basi decurrentib. Schreb. Hab. in palustribus. Stigm. clavatum. S.

13. *palustre*, fol. sessilibus lanceolatis subdenticulatis, caul. tereti ramoso, stigm. indiviso. Smith. brit. 1. p. 413. Engl. bot. t. 346. Hab. in palustribus. Stigm. lineare, indivisum.

14. *origanifolium*, fol. oppositis ovatis acutis subdentatis, caul. basi erecto glabro. Lam. enc. 3. p. 576. Hab. in alpestribus. Sequente, quacum confunditur, major. Fol. ferme aequalia, infima minora.

15. *alpinum*, fol. oppositis ovato-lanceolatis integerrimis, siliquis sessilibus, caule basi repente. L. Flor. dan. t. 322. Lightf. scot. t. 10. f. 1. E. *anagallidifolium*. Lam. Hab. in alpidus ad rivulus. Racem. subtriflorus.

$\beta$ ? *pumilum*, caul. simplici basi incurvo subpubescente, fol. oppositis sessilib. ovato-lanceolatis acute serratis. Hab. in subalpinis. Caul. spithameus. Fol. sensim angustiora, magis rugosa, Flor. terminales, pauci.

922. FUCHSIA. *Cul.* infundibuliformis, coloratus, superus, deciduus. *Petala* (Nectar. L.) 4, fauci calycis insidentia, ejusque laciniis alternantia. *Nect.* glandula octosulcata. *Stigm.* capitato-tetragonum. *Bacca* oblonga, obtuse 4-gona, 4-locularis. *Sem.* numerosa, obovata, disseminatis adherentia. (Flor. penduli.)

1. *coccinea*, pedunc. 1-floris axillaribus, cor. convoluta, fol. ternis lanceolatis. Willd. Sp. II. p. 340. Duham. Traité d'Arbres. Ed. nov. t. 13. Hab. sponte in R. chilensi et ad fret. Magellanicum. Cor. violacea. ( $\beta$ ? *F. triphylla*. L.)

2. *serratifolia*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. 3-4-oppositis oblongis serratis. Flor. Peruv. 3. p. 86. t. 323. Hab. in Peruv. locis subhumidis et subumbrosis. Cal. villosiusculus, roseo-ruber. Pet. punicea. h

3. *denticulata*, pedunc. axillaribus 1-floris, fol. ternis oblongo-lanceolatis denticulatis. Fl. Peruv. p. 87. t. 325. f. a. Cresc. in ripis et praeruptis calidis. Cal. purpureus. Pet. punicia obovata. ©

4. *ovatis*, pedunc. axillarib. racemosis foliosis, fol. 3-nis oppositisque ovalibus utrinque pubescentibus. Flor. Per. l. c. t. 524. Hab. in Muanae nemorib. Flor. punicea. h

5. *corymbiflora*, pedunc. terminalib. ternis corymbosis foliosis, fol. oblongo-lanceolatis. Flor. Per. l. c. t. 325. f. b. Hab. in nemoribus, loc. umbris.

5. *macrostema*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. ternis ovatis subsinuato-dentatis, petal. patentibus obovatis. Flor. Per. p. 88. t. 324. f. b. Thilco. Feuill. Hist. 3. t. 47. Hab. in Chili uliginosis. Pet. caerulea. Stam. passim. 10. h

7. *decussata*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. ternis oppositisque lanceolatis obsolete denticulatis. Flor. Per. p. 88. t. 324. f. b. Cresc. in umbris et subhumidis. Cal. roseo-puniceus.

8. *lycioides*, fol. pedunc. axillarib. cal. laciniis reflexis, fol. ovato-lanceolatis subternis. Andrew. t. 120. Hab. in Amer. septentrionali. Bac. subglobosa nigrescens? h

9. *simplicicaulis*, pedunc. terminalib. quaternis 1-floris involucratiss, fol. quaternis lanceolato-linearib. Flor. Peruv. p. 89. t. 322. Hab. in Peruviae sylvib. Bacc. pubescens. Cal. roseus pubescens.

10. *rosea*, fol. fasciculatis inaequalib. alternisque lanceolatis integerrimis. Flor. Per. p. 88. In R. chilensis praeruptis. Fol. ex eodem centro 8. Flor. rosea.

11. *excorticata*, pedunc. axillarib. 1-floris, fol. ovatis alternis (longe petiolatis.) Lin. suppl. p. 217. Lam. enc. 2. p. 566. Skinnera. Forst. prod. n. 163. Hab. in N. Zeelandia. Fol. subtus canescentia, enuissime serrata.

12. *apetala*, pedunc. terminalibus corymbosis-umbellatis, fol. sparsis ovatis acuminatis integerrimis. Flor. Per. 3. p. 89. t. 322. Flor. magni. Cresc. in nemoribus.

923. MEMECYLON. *Cal. superus*, fundo striato, margine integerrimo. *Cor.* 1-petala. *Antherae* insertae lateri apicis filamenti. *Bacca* coronata calyce cylindrico.

1. *capitellatum*, fol. ovatis petiolatis, umbellis capitatis axillaribus subsessilibus. Willd. II. p. 347. Lam. (Desrousseaux) enc. 4. p. 89. et ill. t. 284. f. 1. Hab. in Zeylona. h

2. *tinctorium*, fol. oblongo-ovatis petiolatis, corymbis axillaribus. Willd. M. ramiflorum. Lam. enc. 4. p. 86. Hab. in India orientali. Fol. flavo-viridia. h

3. *grande*, fol. acuminatis. Retz. obs. 4. p. 26. Hab. in India orientali. Arb. Fol. opposita. Pedunc. axillares.

4. *cordatum*, fol. cordatis subsessilibus, umb. compositis axillaribus pedunc. Lam. enc. 4. p. 89. et ill. t. 284. f. 2. (p. ? fol. minoribus amplexicaulis, fructu globoso. Lam. l. c. Hab. in insula Mauriti, in India orientali. ♂

924. COMBRETUM. *Cal.* 4-dentatus, campanulatus, superus. *Cor.* 4-petala, calyci inserta. *Stam.* longissima. *Caps.* quadrangularis: angulis membranaceis, 1-locularis. *Sem.* 1, oblongum. (Flor. quidam 10 andri.)

1. *laxum*, fol. oppositis, racemis laxis bracteatis, cal. interne villosis. Willd. Sp. p. 315. Lam. ill. gen. t. 282. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. ¶

2. *secundum*, fol. oppositis, racemis secundis bracteatis, cal. glabris. Lam. ill. t. 282. f. 1. Jacq. amer. t. 176. f. 30. Ed. pict. t. 260. Hab. in fructibus Carthag. Rami fructi et fol. fricata male olent.

3. *purpureum*, fol. ovato-oblongis calycibusque nudis, spicis simplicibus secundis. Vahl. symb. 3. p. 51. C. coccineum, flor. decandris, spicis laxis paniculatis. Lam. enc. 1. p. 734. ill. t. 282. f. 2. Cristaria. Sonnerat it. 2. t. 140. Hab. in Madagascar. h

4. *decandrum (album)*, fol. oppositis oblongis acuminatis, racemis laxis bracteatis, flore longioribus, flor. decandris distichis. Willd. Roxb. corom. 1. p. 43. t. 59. Hab. in montosis sylvaticis Ind. orient. h

5. *alternifolium*, fol. alternis, flor. decandris. Jacq. amer. Ed. pict. t. 260. (*C. decandrum*). Hab. in Carthago. Fruct. ad 20 pedes scandit. h

*Obs.* Forte melius novum et distinctum efficit genus. Cal. et Cor. 5-fida. Caps. 5-alares, non rigidae. Jacq.

925. *VUIMANNIA*. Cal. 4-fidus, Cor. 4-petala. Nect. squama ad basin filamentorum. Nux semilunata, compressa, monosperma

1. *elliptica*. Vahl. symb. 3. p. 51. t. 60. *Samadera*. Gaertn. de fr. et sem. 2. p. 352. t. 166. f. 3. Hab. in India orientali. Arb. Fol. alterna elliptica. Flor. umbellati. h

926. *GRISLEA*. Cal. 4-fidus. Pet. 4, ex incisuris calycis. Filam. longissima, adscendentia. Caps. globosa, supera, 1-locularis, polysperma.

1. *secunda*, fol. petiolatis glabris, corymbis axillaribus secundis. Willd. p. 320. Hab. in America calidior. h

2. *tomentosa*, foliis sessilibus subtus tomentosis, corymbis axillaribus patulis. Willd. p. 321. Roxb. corom. 1. p. 29. t. 31. *Lythrum fruticosum*. Lin. Hab. in collibus Indiae et Chinae. Cortex lacerus. h

927. *ROXBURGHIA*. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala. Nectar. foliola 4 lanceolata, medio petalorum inserta. *Antherae* geminae, e basi folii nectarii dependentes. Caps. unilocularis, bivalvis, polysperma. Sem. receptaculo spongioso inserta.

1. *Gloriosa*. R. gloriosoides. Roxb. corom. 1. p. 29. t. 32. Willd. Sp. p. 321. Habit. ad radices montium Indiae orientalis. Planta scandens media inter Liliaceas et Asclepiadaceas. Radix tuberosa. Fol. petiolata cordata. Cal. flavus cor. purpurea major. W.

*SAPINDI*. Cor. his 3-4-5-petala, quibusdam in medio villosa, s. glandulosa, aliis petal. inferiore ad unguem aucta, stam. 6-10, plerumque 8, cum petalis disco inserta. Styl. numero varius 1 aut 3. Fruct. est vel drupa, vel capsula 1-3-occa: coccul. monospermis. Plantae

sunt vel frutices aut arbores, rarius herbae, fol. alternis, plerumque 1-2-3-ternatis aut pinnatis distinctae.

928. *ORANTHROPHE*. Cal. 4-partitus. Cor. 4-petala, medio barbata. Germen didymum. Baccæ 2, monospermae.

1. *integrifolia*, fol. ternatis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis subsimplicibus. Willd. Sp. II. p. 322. Lam. ill. t. 309. f. 1. Jus. gen. pl. Hab. in insula Borbonia. h

2. *serrata*, polygama, foliis ternatis scabris, foliolis petiolatis ovatis acuminatis serratis, racemis simplicibus. Willd. Roxb. corom. 1. p. 44. t. 61. Hab. in montosis Indiae orientalis. T

*Obs.* In locis altis arbor evadit, in depressis frutex. Baccæ comeditur, et radix adstringens contra diarrhoeam adhibetur. R.

3. *Cobbe*, fol. ternatis, foliolis petiolatis ovatis acutis serratis, subtus pubescentibus, racemis simplicibus, pedunculo tomentoso. Willd. Rhus Cobbe, fol. ternatis, foliolis ovatis acuminatis serratis, pedunc. tomentosis. L. Sp. pl. 382. Hab. in Zeylona. h

4. *Cominia*. fol. ternatis, foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis subtus pubescentibus, racemis compositis. Willd. p. 323. *Schmiedelia Cominia*. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 667. Rhus *Cominia*. Sloan. hist. 2. p. 100. t. 208. f. 1. Hab. in montosis Jamaicae occident. h

5. *occidentalis*, fol. ternatis, foliolis subsessilibus, racemis simplicibus. Willd. S. hmidelia. Swartz. l. c. *Allophylus racemosus*. Swartz prod. 62. Hab. in frutetis montosis Hispaniolae. Foliola lateraliter basi obliqua, subtus leviter tomentosa. h

6. *Schmiedelia*, fol. ternatis, foliol. petiolatis subserratis nudis, racem. simplicibus. *Schmiedelia racemosa*. Lin. Willd. Sp. II. p. 335. Burm. ind. t. 32. f. 1. Hab. in Ind. orient. Ram. flexuosi. Flor. digyni.

7. *rigida*, fol. simplicibus denticulato-spinosis, flor. racemosis. Sw. Fl. ind. occid. sub *Schmiedelia*. Hab. in montosis aridis Hispaniolae. h

8. *Allophylus*, fol. ovalibus acuminatis integerrimis. *Allophylus Zeylanicus*. Lin. Hab. in Zeylona. Arb. Periscae facie. Racem. brevissimi ex alio. L.

920. EUPHORIA. *Cal.* 5-phyllus.

*Pet.* 5, reflexa, medio intus subvillosa. *Bacca* 2 (altera plerumque abortiva) corticosa, tuberculata. 1-locularis, 1-sperma. (*Stam.* 6, saepius 8. *Juss.* *Stam.* 7. *Lam.*)

1. *punicea* (Litschi). fol. pinnatis, foliol. ovato-lanceolatis utrinque glabris, bacis scabris puniceis. *Lam. enc.* 3. p. 573. et ill. t. 306. Litschi chinensis Sonner. it. t. 129. Dimocarpus. Willd. Sp. II. p. 346. Scytalia. Gaertn. de fr. t. 137. Sapindus edulis. Ait. Hab. in Ind. orient. Fruct. edulis, sapore gratus. Arb.

2. *longana*, foliolis ovato-oblongis: nervis lateralibus subtus eminentib., bacis laeviusculis luteis. *Lam. l. c.* p. 575. Buchoz. ic. color. t. 99. Hab. in China. Arb. Antecedente multo procerior. Fruct. vero minores, minus boni.

930. CUPANIA. *Cal.* 5-phyllus.

*Cor.* 5-petala, apice cucullata.

*Stylus* 3-fidus. *Caps.* 3-locularis 3-velvis, loculis submonospermis.

*Sem.* arillata.

1. *tomentosa*, foliis pinnatis, foliolis obovatis retusis, inferne ferrugineo-tomentosis. Swartz. Fl. ind. occident. 2. p. 657. Willd. Sp. II. p. 327. Trigonis tomentosa. Jacq. amer. 102. Hab. in montosis sylvaticis Hispaniolae. *Petal.* 3-angularia, intus hirsuta. Jacq. h.

2. *glabra*, fol. pinnatis, foliolis ovatis obtusis crenatis glabris. Swartz. Fl. ind. occident. 2. p. 659. Hab. in montosis Jamaicae, Hispaniolae. h.

3. *Saponaria*, fol. pinnatis: foliolis oblongis attenuatis integerrimis, subtus scabris pubescentibus. Swartz l. c. 2. p. 661. Hab. in India occidentali. h.

4. *laevis*, fol. pinnatis bijugis, corymbis paniculatis, fructibus obovato-truncatis triquetris. Willd. p. 329. sub Molinaea. *Lam. illust.* t. 305, f. 1. Hab. in insula Borbonia. *Caps.* obovatae triquetra-alatae.

5. *canescens*, fol. pinnatis bijugis, racemis paniculatis, fructibus ovatis. Roxb. Corom. 1. p. 43. t. 60. Willd. l. c. Hab. in montosis Indiae orientalis. Panic. axillaris. *Caps.* trisulcata, non alata.

6. *alternifolia*, fol. pinnatis, foliolis alternis retusis, panicula coarctata. Willd.

*Lam. illust.* t. 305, f. 2. Hab. in ins. Borbonia. h.

7. *lenticifolia*, caul. fruticoso, fol. alternis abrupte pinnatis: pinnulis lanceolatis integerrimis, flor. paniculatis. *Guioa lenticifolia*. Cav. ic. pl. p. 50. t. 373. Hab. in Amer. insul. Babae. *Caps.* 3-alatae.

*Obs.* Secundum observationes posteriores ill. Jussieu, genus Molinaea ab eo constitutum, Cupanis inseri debet, quibus etiam adjicienda Toulicia Aubletii?

931. THOUINIA. *Cal.* 4-partitus.

*Petala* 4, medio villosa. *Stigm.* 3-fidum. *Caps.* 8, monospermae, alatae.

1. *simplicifolia*, fol. simplicibus sinuato-dentatis. Poiteau in *Annal. d. Mus. d'hist. natur. Fasc.* 13. p. 71. Hab. in ins. Dominica. Frut. ramosissimus. Fol. castaueaeformis.

2. *trifoliata*, fol. ternatis. Poiteau, l. c. Hab. cum priore. Herb. *Juss.* Flor. spicati, axillares uti in priore.

932. EPHIELIS. *Cal.* 5-partitus.

*Cor.* 5-petala, basi squamæ 2 appendiculata. *Caps.* oblonga, 1-locularis, disperma.

1. *guyanensis*. E. fraxinea. Willd. Sp. II. p. 328. Mataiba guyanensis. Aubl. guj. 1. p. 331. t. 128. *Lam. ill. gen.* t. 298. Hab. in Gujanae sylv. Arb. 50-60-petalis. Fol. abrupte pinnata. Panic. divaricatae.

933. MELICOCCA. *Cal.* 3-partitus.

*Petala* 4, reflexa infra calycem. *Stigma* subpeltatum. *Drupa* corticosa.

1. *bijuga*. *Lam. ill.* t. 306. Jacq. amer. 108. t. 92. Ed. pict. t. 109. Comm. hort. 1. t. 94. Hab. in Amer. meridionali. Arb. procerâ, elegans. Nucces comeduntur h.

934. KOELREUTERIA. *Cal.* 5-phyllus.

*Cor.* 4-petala irregularis. *Nect.* squamæ 4, bifidae. *Caps.* inflata, 3-locularis, loculis dispermis.

1. *paniculata*. Duham. arb. ed. nov. t. 36. K. paulliuoides. Herit. sert. angl. 18. t. 19. Sapindus chinensis, fol. pinnatis,

foliis laciniatis. Lin. Hab. in China. Arbuscula 8-12-pedalis. Flor. flavi.

*Obs.* Vidi in Herbario Jussieui alteram speciem, fol. ternis simpliciter serratis, distinctam, prope diem cum nonnullis aliis hac ex familia, ab illo describendam.

335. HEDWIGIA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* tubulosa, 4-fida. *Caps.* trilocca, 3-locularis. *Nuces* solitariae.

1. *balsamifera*. Swartz. Flor. ind. occident. 2. p. 672. An *Tetragastris* ossea Gaertn. de fr. 2. p. 130. t. 2. hujus loci. Hab. in montosis sylvaticis Hispaniolae Arb. excelsa, fol. pinnatis. Racemi terminales.

*Obs.* Species tantummodo generis *Burserae* videtur, a quo solummodo numero part. fructificat. differt. Et nomen *Hedwigia* inter muscos conservandum ob viri immortalis meritis in illustrandam hanc plantarum familiam.

936. AMYRIS. *Cal.* 4-dentatus. *Petala* 4, oblonga, patentia. *Stigma* subcapitatum. *Bacca* drupacea, 1-sperma, per abortum.

1. *polygama*, caule arboreo, fol. simplicibus sparsis lanceolato-ovatis integerrimis. Cavan. ic. 3. p. 20. t. 239. Willd. Sp. II. p. 333. Hab. in K. Chilensi. h

2. *Elemifera*, foliis ternatis quinato-pinnatisque subvis tomentosis. Lam. enc. 1. p. 359. Plum. ic. 100. Hab. in Carolina, et ins. Antill. h

3. *sylvatica*, fol. ternatis crenatis acutis. Jacq. amer. Ed. picta. t. 188. Hab. Caribaeae, in sylvis maritimis. h

4. *maritima*, fol. ternatis crenulatis obtusis. Jacq. amer. 107. Hab. in America, in rupestris maritimis. Frut. nanus.

5. *Katuf*, fol. ternatis, apice serratis, pedunc. confertis bifidis. Vahl. symb. 1. p. 28. Forsk. descr. 80. Hab. in Arabia. h

6. *gileadensis*, fol. ternatis integerrimis, pedunc. unifloris lateralibus. L. Vahl. symb. 1. p. 28. t. 11. A. Opobalsamum. Forsk. aegypt. p. 79. Hab. in Arabia felice. Var. sequentis? h

7. *Opobalsamum*, fol. pinnatis: foliolis sessilibus. L. Alp. aegypt. 48. t. 60. Ballesan. Bruce itin. cum ic. p. Balsamca mecca-

nensis. Gleditsch. Act. Soc. Nat. Berol. 3. p. 127. t. 3. f. 2. Hab. in Arabia. h

8. *toxifera*, fol. pinnatis: foliol. petiolatis quinis oblongis acuminatis planis, panic. axillari elongata. Willd. Toxicodendrum. Catesb. 1. t. 40. In Carol.

9. *Protium*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis quinis oblongis acuminatis undulatis, racemis axillaribus. Willd. p. 337. *Protium javanicum*. Burm. ind. 88. Rumph. arab. 7. p. 54. t. 23. f. 1. Hab. in India orientali. Nectar. e receptaculo marginato. h

10. *dentata*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis novenis ovatis acuminatis dentatis, racemis axillaribus. Willd. Cum priore. Ab omnibus fol. margine dentato distincta. Pedunc. uniflori, elongati. W. h

11. *anisata*, fol. pinnatis, foliolis petiolatis tredecimis ovato-lanceolatis obsolete dentatis inaequalibus, paniculis axillaribus. Willd. Hab. in Guinea. Similis praecedenti. Panic. corymb. pedunc. multifloris. h

12. *zeylanica*, fol. pinnatis petiolatis glabris, racemis interruptis axillaribus, flor. involucris hexandris. Retz. obs. 4. p. 25. Hab. in Zeylona. h

13. *oleosa*, foliis pinnatis subtrijugis, flor. racemosis, haec. ovatis ex caeruleo nigris. Lam. enc. 1. p. 362. Rumph. 2. t. 54. Cresc. in Moluccis. +

14. *balsamifera*, fol. bijugis. L. arborescens, fol. bijugatis ovatis glabris, racemis laxis terminalibus. Brown. jam. 208. Lucinium. Pluck. alm. 227. t. 201. f. 3. Sloan. jam. t. 168. f. 4. Hab. in Jamaica. h +

ICICA. *Cal.* 4-5-dentatus. *Petala* 4-5, oblonga, basi conniventia. *Stigm.* capitatum, 4-sulcatum. *Drupa* coriacea, 2-4-valvis, 2-4-sperma.

15. *enneandra*, fol. ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis basi attenuatis reticulato-venosis, panic. axillaribus terminalibus racemosis. Willd. p. 335. *Icica enneandra*. Aubl. guj. 1. p. 343. t. 134. Hab. in sylvis Gujanae. h

16. *heterophylla*, fol. ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis simpliciter venosis, racemis simplicibus. Willd. *Icica Aracouchini*. Aubl. p. 343. t. 133. Cum priore.

17. *gujanensis*, fol. pinnatis, foliolis quinis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis congestis axillaribus. Aubl. guj. 1.

t. 131. *J. viridiflora*. Lam. enc. 3. p. 225. Hab. ad maris littora, in sylvis Gujanæ. h

18. *ambrosiaca*. fol. pinnatis, foliolis septenis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis multifloris subcorymbosis axillaribus. Willd. Lin. suppl. 216. *Icica heptaphylla*. Aubl. t. 130. Cum priore. h

19. *decandra*. fol. pinnatis, foliolis petiolatis quinque oblongis utrinque acuminatis, panic. axillaribus divaricatis. Willd. *Icica*. Aubl. guj. 1. p. 346. t. 135. Hab. in sylvis maritimis. h

20. *altissima*. fol. pinnatis, foliolis septenis petiolatis oblongo-obovatis acuminatis, racemo simpliciter axillari. *Icica*. Aubl. guj. 1. p. 342. t. 132. Le Cèdre blanc. (p. ligno magis rubro. Le Cèdre rouge incol. Hab. in sylvis Gujanæ. h

937. *CEDROTA*. Cal. 6-partitus, laciniis concavis. Cor. o. Germen glandula cinctum. Fruct...

1. *longifolia*. Willd. p. 338. Aniba gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 327. t. 126. Lam. ill. t. 298. Hab. in sylvis desertis Gujanæ. Arbor. exelsa. Fol. lanceolata, reticulato-venosa. Panic. axillaris.

938. *XIMENIA*. Cal. 4-fidus. Petala 4, pilosa, revoluta. Drupa monosperma.

1. *americana*. spinosa, fol. oblongis, pedunc. multifloris. L. multiflora. Jacq. Amer. 106. t. 277. f. 31. Ed. picta. t. 107. Plum. gen. 6. ic. 261. f. 1. Lam. ill. gen. t. 297. Aubl. guj. 1. p. 324. t. 125. Hab. in Amer. Flor. albidis, odore suavissimi. Fruct. lutei.

2. *elliptica*. caule inermi, fol. elliptico-lanceolatis, pedunc. multifloris. Forst. prod. n.º. 162. Hab. in N. Caledonia. h

3. *inermis*. fol. ovatis, pedunc. unifloris. L. Amyris arborescens, fol. ovatis glabris: vetustioribus confectis, petiolis submarginatis, flor. solitariis. Brown. jam. 209. Hab. in Jamaica. h

939. *DODONÆA*. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Filam. brevissima. Anther. oblongæ. Caps. 3-ocularis, tripartita. Sem. bina.

1. *viscosa*. foliis oblongis obtusis basi angustatis viscosis. Willd. Sp. p. 343. Trew. chret. 12. t. 9. Cav. ic. pl. 4. p. 14. t. 327.

*Ptelea viscosa*. L. Sp. pl. 2. p. 173. Hab. in Jamaica et Amer. calidior. Cal. 3-4-5-phyllus.

2. *triquetra*. fol. lanceolatis, utrinque attenuatis, ramul. triquetris, flor. dioicis. Andrew. t. 230. Willd. l. c. ? D. *triquetra*, caule fruticoso triquetro glabro, fol. alternis lanceolatis glabris, flor. cymosis axillaribus. Wendl. obs. bot. p. 44. Hab. in N. Hollandia. Anth. (in flor. masc.) flavæ. Styl. longus, rubellus. h

3. *angustifolia*. fol. linearibus margin. revolutis. Lin. suppl. p. 218. Hab. ad Cap. b. spei, in India australi et in montib. Jamaicæ. h

940. *VALENTINIA*. Cal. 5-partitus, coloratus, patens. Cor. nulla. Caps. baccata, tetrasperma, pulposa.

1. *illicifolia*. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 689. Plum. ic. 167. f. 2. Pluck. alm. t. 196. f. 3. Hab. in petrosis Hispaniolæ et in Cuba. Fol. alterna ovato-lanceolata, margine undulato-spinosa. Flor. subumbellati coccinei. Sw. h

941. *LAUSONIA*. Cal. 4-fidus. Petala 4. Stamina 4-parium. Caps. 4-ocularis, polysperma. Sem. angulata.

1. *inermis*, ramis inermibus. L. Desf. atl. 1. p. 325. *Q. alba*, fol. sessilib. ovatis utrinque acutis, petalis albis patentibus. Lam. enc. 2. p. 106. Cyprus, Henna, Alcaenna. Reuw. itin. 60. t. 60. (bona.) Hab. in India, Aegypto, et Barbaria. h

Obs. Est Cyprus antiquorum, et tincturae croceæ inservit, qua cutis et pelum et manuum phalanges a mulieribus cantur.

2. *spinosa*, ramis sub-spinosis. L. Lam. ill. t. 296. Cyprus. Rumph. amh. 4. p. 42. t. 17. Rheed. 1. t. 40. Hab. in India. Flor. racemosi, axillares.

Obs. L. *inermis* et *spinosa* eadem species certo, quæ junior *inermis*, vetusta vero spinescit ramis induratis. Desf. Atl.

3. *Acronychia*, inermis, fol. longe petiolatis cuneiformibus. Lin. suppl. p. 299. *Acronychia lacvis*. Forst. gen. n.º. 27. Hab. in N. Caledonia. Differt fol. ad insertionem subarticulatis, calyce minimo. h

3 ? *purpurca*, fol. subsessilib. lanceolatis, petalis crectis purpureo-coeruleis. Lam.

enc. 3. p. 107. Rheed. 4. t. 57. Hab. in India orientali. Flor. corymbosi terminales. h

*Obs.* Genus aliud, huic Stam. 4, et Cor. 1-petala. Desf. l. c. p. 326.

942. MELICOPE. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* glandulæ 4, didymæ, germina cingentes *Caps.* 4, monospermæ.

1. *ternata*. Forst. prod. Forst gen. n.º. 28. Lam. ill. t. 294. Entaganeum laevigatum. Gaertn. sem. 1. p. 351. t. 59. f. 6. Hab. in N. Zealandia. h

943. HAGENIA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala plana. *Nectar.* foliola 5, petalis quadruplo breviora. *Caps.* ?

1. *abyssinica*. Willd. Sp. II. p. 337. Lam. ill. t. 311. Cusso Bruce iter, cum ic. Hab. in Abyssinia. Arb. Fol. interrupte pinnata cum impari. Panic. nutans.

944. CARAPA. *Cal.* 4-partitus. *Petal.* 4. *Nectar.* cylindricum, octodentatum, antheras gerens. *Caps.* unilocularis, quadrivalvis. *Nuces* difformes, angulatæ, numerosæ.

1. *gujanensis*, fol. multijugis, foliol. oblongis acuminatis. Lam. enc. 1. p. 621. Auhl. guj. 2. p. 32. t. 387. Lam. illust. t. 301. Willd. Sp. II. p. 331. Habit. in Gujanæ sylvis. Arbor simillima Guacrae, ex maximis. Ex nucibus oleum : huile de carapa præparatur.

2. *molluccensis*, fol. subtrijugis, foliol. ovato-acutis. Lam. l. c. Rumph. 3. p. 92. t. 61. p. fol. scutifloribus. t. 62. Hab. in ins. Molucc. ad oras maris. Fruct. granata refert. †

945. GUAREA. *Cal.* 4-dentatus. *Petala* 4. *Nectar.* cylindricum, ore Antheras gerens. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* solitaria.

1. *trichilioides*. Lin. Cavan. diss. 7. p. 366. t. 210. Jacq. amer. 126. t. 176. f. 37. Hab. in Brasilia et in Ind. occident. Flor. racemosi. Fol. pinnata, nitida. Arb.

946. XYLOCARPUS. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* 8-fidum, cui *Filam.* inserta.

*Drupa* exsucca, magna, 4-5-sulcata. *Nuces* 8-10, difformes.

1. *granatum*. Koenig, im Naturforscher (Promtuar. hist. nat. Halæ Saxon. editum.) Fasc. 20. p. 2. Willd. Sp. II. p. 328. Rumph. 3. t. 61. Hab. in Ind. orient. littoribus. Arb. Fol. opposita, integerrima. Flor. racemosi.

947. HONCKENIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* staminiformia. *Caps.* echinata, 5-locularis, 5-valvis, polysperme. *Sem.* arillata.

1. *scifolia*. Willd. Sp. II. p. 325. Uster. delect. 2. p. 201. t. 4. Hab. in Guinea. Fol. alterna subtus tomento fulvo tecta. Flor. terni coerulescens-violacei. Valde æstiva Aubletia. W. h

948. MIMUSOPS. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 16-phyllum. *Drupa* acuminata.

1. *Elenzi*, foliis alternis ovatis acuminatis. Willd. II. p. 325. Roxb. corom. 1. p. 15. t. 14. M. stylis cor. longitudine. Lam. enc. 4. p. 186. Ej. ill. gen. t. 300. Elengi. Rheede. 1. t. 20. Rumph. 2. t. 63. Hab. in India. h

2. *hexandra*, foliis alternis obovatis emarginatis, flor. hexandris. Willd. p. 326. Roxb. corom. 1. p. 16. t. 15. Hab. in montib. Circarsiensibus Indiae. h

3. *obtusifolia*, fol. alternis remotis obtusis, stylis cor. longioribus. Lam. enc. l. 2. M. Kauki. Willd. p. 326. Binectaria. Forst. Rumph. 3. t. 8. Hab. in India. h

949. NIOTA. *Cal.* quadrifidus. *Petala* 4-5. *Anth.* sagittatæ. *Stigma.* acutum. *Caps.* lignosa, 1-sperma.

1. *tetrapetala* (Commersemi), petalis 2. Poir. in Enc. bot. 4. p. 490. Lam. ill. gen. p. 299. Hab. in Ind. orient. Comm. Arb. fol. alternis, ovalibus integerrimis. Flor. subumbellati in pedunc. longissimo pendulo.

2? *pentapetala*, petal. 5, flor. pentandris. Poir. l. c. Rheed. 6. t. 18. Hab. in Malabar. Januar. flor. Arb. 30-petalis. Fol. prioris cum fruct. valde amara.

950. JAMBOLIFERA. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala, infundibulif. *Filam.*



*Filam. planiuscula. Stigma simplex. Fruct...*

1. *pedunculata*. L. Vahl. symb. 3. p. 52. t. 61. Dryand. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 232. Clf. Lam. enc. 3. p. 195. et Juss. Gen. pl. Hab. in India.

*Obs.* Arbor ad Myrium accedens Juss. ad Onagras relata, inter plantas dubias aut obscuras pertinet.

951. *ACER. Cal. 5-fidus. Petala 5. Samar. 2, basi unitae, superae, 1-spermae, alatae.* (Flor. nonnulli masculi, et interdum dioici.)

1. *tataricum*, fol. cordatis indivisis serratis: lobis obsoletis, flor. racemosis. L. Pallas Flor. ross. p. 9. t. 3. Hab. in Tartaria. Racem. compositus, erectus: Flor. albi.

2. *Pseudo-Platanus*, fol. quinquelobis inaequaliter serratis obtusis, racem. pendulis subtomentosis. Duham. arb. 1. t. 36. f. 1. Engl. bot. t. 363. Hab. in sylvis, ad sepes. Var. fol. variegatis.

3. *platanoides (lactescens)*, fol. quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, flor. corymbosis erectiusculis glabris. L. Duham. t. 10. f. 1. Habit. in sylvaticis montosis. Petioli abrupti lactescunt. Caps. glabrae.

β. *laciniatum*, fol. laciniatis crispis.

4. *rubrum*, fol. quinquelobis subdentatis subtus glaucis, flor. dioicis, umbellatis sessilib. L. Mill. ic. t. 8. f. 2. Duham. t. 10. f. 5. Hab. in Amer. boreali, in uliginosis. Floret primo vere, antequam frondescit. Flor. rubri. Germ. glabrum.

5. *dasycarpum*, fol. quinquelobis acuminatis subtus pubescentibus, flor. dioicis glomeratis, germinib. tomentosis. Ehrh. Beytr. 4. p. 24. A. eriocarpum. Michaux. Flor. 1. p. 253. A. tomentosum. H. Par. Hab. cum priore. Flor. April. Arb. procera.

6. *saccharinum*, fol. quinquepartito-palmatis acuminato-lentatis, subtus pubescentibus. L. Duham. t. 11. f. 3. Hab. in Amer. boreali. Flor. apetalis, racemosis. Reichard Syst. 4. p. 332. Caps. turgidae. Fol. autumnio rubescent.

7. *dissectum*, fol. multipartito-palmatis: laciniis subinnatis - serratis. Thunb. Flor. jap. p. 160. Hab. in Japonia cum 4 sequentibus. Rami 2-3-chotomi. Var. fol. rubris: Th.

8. *japonicum*, fol. multipartito-incisis villosis, flor. subumbellatis. Thunb. jap. p. 181. Fol. subrotunda, 13-partita, serrata.

9. *palmatum*, fol. palmatis serratis glabris, flor. umbellatis. Thunb. l. c.

10. *septemlobum*, fol. 7-lobis glabris: lobis acuminatis aequaliter acute serratis. Thunb. jap. p. 162.

11. *pictum*, fol. septemlobis glabris: lobis acuminatis integris. Thunb. jap. p. 162. Rami cinerei.

12. *striatum*, caul. lineis albicantibus striato, fol. trilobis acuminatis serratis, racem. pendulis, petal. ovalibus. Lam. enc. 2. p. 381. A. *pensylvanicum*. Lin. ? A. canadense H. Par. Duham. 1. t. 12. f. 11. Erable jaspé Gal. Hab. in Canada, passim in montibus alleghanis, Pensylv. et Carol. Arb. mediocri altitudine, sed pulchra.

13. *spicatum*, fol. trilobis quinquelobisque acuminatis inaequaliter serratis subtus pubescentib., racem. spiciformib. erectis, petal. linearibus. Lam. l. c. A. *monnaum*. Willd. arbor. berol. p. 7. A. *parviflorum*. Ehrh. l. c. p. 25. Hab. in Amer. septentrion. Flor. omnium parvuli.

14. *campestre*, fol. quinquelobis obtusis glabris, racem. erectis, cortice suberoso rimoso. Engl. bot. t. 364. Hab. ad sepes, in sylvaticis. Caps. rubicundae, alis patentib.

15. *Opalus*, fol. rotundatis lobatis obtuse dentatis subtus glaucis, caps. subglabris: alis semipatentibus. Lam. enc. 2. p. 382. (A. rotundifolium.) A. *Opalus*. H. Par. Hab. in Italia. Frut. arborescens, ramosissimus, ram. junior. rubicundi. Flor. subcorymbosi, erectiusculi, albi. Caps. subglobosae.

*Obs.* *Apolifolium*, foliis quinquelobis subrotundis obtuse dentatis, fruct. cymosis: alis approximatis. Vill. Dauph. 3. p. 802. A. *montanum*. C. B. pin. p. 431. Hab. in Delphin. Helvetiae montosis, a priore forte non diversum.

16. *monspessulanum*, fol. trilobis integerrimis glabris annuis. L. Duham. 1. t. 10. f. 8. A. trifolium. Bauh. Hab. Monspeli, Italia et Germania. Fol. juniora pubescentia.

17. *creticum*, fol. coriaceis trilobis integerrimis pubescentibus perennantibus. L. Duham. t. 10. f. 9. Hab. in ins. Creta. Fol. Anemon, hepaticae: juniora integra.

D d

*Obs.* Lamark hanc prioremque speciem sub nomine *A. trilobatum*, conjunxit. An sequens tantum var. junior?

\* *sempervirens*, fol. ovatis integerrimis sempervirentibus. Lin. Mant. p. 128. Species dubia, a nemine, praeter Millerum, descripta. †

18. *trifidum*, fol. indivisis trifidisque integris. Thunb. jap. p. 163. Hab. in Japonia.

19. *Negundo*, fol. impari-pinnatis, flor. dioicis. Duham. 1. t. 11. f. 10. Hab. in Pensylvan. ad Carolinam. Arb. magna, fol. fraxiniformibus, ab omnibus distincta.

952. *CHLORA*. *Cal.* 8-10-phyllus. *Cor.* 1-petala, 8-fida. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *perfoliata*, fsl. perfoliatis. L. Willd. Sp. II. p. 340. Gentiana fol. radicalibus ovatis, caulinis triangularibus. Hal. Moris. Hab. in collibus siccis. Fol. glauca. ☉

β. *mascariensis*, cor. duplo majoribus 9-10-partitis, stam. 8-10. Desf. Atl. 1. p. 327. Ad rivulos prope Mascar.

2. *quadrifolia*, fol. quaternis. Habit. in Europa australi. Pedunc. terminales, quinque: singulis in medio bractee 2, oppositae. L.

3. *sessilis*, acaulis, flor. quadrifidis Willd. p. 341. Gentiana sessilis. L. Feuil. peruv. 3. p. 20. t. 14. Hab. in R. chilensi.

4? *imperfoliata*, cor. sexfidis. Hab. in Italia. Fol. sessilia ovata. Filam. sex. Styli duo conglutinati. Fruct. ignotus. L.

953. *MICHAUXIA*. *Cal.* multifidus. *Cor.* rotata, 8-10-partita, revoluta. *Nect.* 8-valve, staminiiferum. *Caps.* 8-10-locularis, polysperma.

1. *strigosa*, fol. radicalibus pinnatifidis, caul. strigoso. Ait. Kew. 2. p. 8. Herit. monograph. Mindium. Adans. Juss. Campanula fol. radicalibus dentato-pinnatis, caulinis cordatis sessilibus. Gron. virg. 19. Moris. 2. 5. t. 3. f. 31. Hab. in Oriente, Syria, Libano. ♂

2. *laevigata*, fol. radicalibus ovatis serratis, caulinis oblongatis semialexicaulibus, caul. laevi glaberrimo. Vent. Hort. Cels. p. 81. t. 81. Hab. in Persia, in monte Albourg. Fol. pilosa.

954. *JEFFERSONIA*. *Cal.* 5-phyllus, coloratus, deciduus. *Cor.* 8-petala, incurvo-patentia. *Stam.* ovarium ambientia. *Caps.* obovata, substipitata, 1-locularis, infra apicem dehiscens. *Sem.* plura, oblonga, ad basin arilata.

1. *diphylla*. Barton in Act. Philad. J. Bartonis. Michaux. Flor. 1. p. 237. Podophyllum diphyllum. Lin. syst. veg. ed. 15. p. 523. Hab. in montib. occidentalib. Tennessee. Acaulis; pedunc. nudus, 1-florus. Fol. conjugata.

955. *ANTICHORUS*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* supera, subulata, 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* plurima.

1. *depressus*. L. fasc. pl. p. 3. t. 2. Lam. ill. t. 295. Jussiaea edulis. Forsk. Hab. in Arabia. Flor. axillares, bini. Fruct. reflexi. Planta pusilla.

956. *BUGINVILLÆA*. *Cal.* 6. *Cor.* tubulosa, medio coarctata. *Stam.* receptaculo insidentia, inclusa. *Fruct.*... (Flos tubulosus bractea majusculæ s. involucri insidens.)

1. *bracteata*. B. spectabilis. Willd. Sp. II. p. 348. Lam. ill. t. 294. Hab. in Brasilia. Fruct. facie Pisoniae, sempervirens, aculeatus. Fol. ovato subrotunda, integerrima.

957. *NÆÆA*. *Involucr.* 2-3-phyl-lum, squamæforme. *Cor.* tubulosa. *Stam.* cor. breviora, alternantia longiora. *Drupa* monosperma, coronata. *Nucleus* tunicatus.

1. *verticillata*, fol. quaternis lanceolatis. Ruiz. et Pavon Syst. veg. Fl. Peruv. p. 90. Hab. in Peruviae nemoribus. Fruct. 3-ovrgyalis.

2. *oppositifolia*, fol. oblongo-ovalibus acuminatis. Ruiz et Pav. l. c. p. 91. In Peruv. sylvis. Flor. sero autumnuo; uti prior, quadriorgyalis. ♀

*Obs.* Ad Familiam Nyctagineam secundum cl. Jussieu in Annal. d. Museum, cal. x. p. 275. c. priore genere pertinet.

958. *BORONIA*. *Cal.* 4-fidus, persistens. *Petala* 4, ovata. *Nectar.* coronatum. *Filam.* ciliata, incurva. *Stigm.* capitatum. *Caps.* 4, 2-valves. *Semina* subsolitaria, arillata.

1. *pinnata*, fol. imparipinnatis linearibus; pedunc. axillarib. dichotomis, filam. apice obtusis glandulosis. Andrew. t. 58. Vent. Hort. Malmis. p. 38. Cresc. in N. Hollandia. Cor. Febr. Maj. E. Fam. Rutacea. Cor. rubella.

959. *CORREA*. *Cal.* campanulatus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 4-locularis, 4-valvis dissiliens: locul. 1-2-spermis.

1. *alba*, fol. ovatis obtusis subtus albidis, flor. terminalib. subumbellatis, petal. basi conniventibus. Venten. Malmis. p. 13. t. 13. Andrew. t. 18. Willd. Sp. II. p. 324. Hab. uti sequentes, in N. Hollandia.

2. *rufa*, fol. subrotundis subtus ferrugineis, flor. solitariis axillaribus et terminalib. Vent. l. c. Mazentoxeron rufum. Labillard. Voyag. à la recherche de la Peyrouse. 2. p. 11. t. 17.

3. *reflexa*, fol. ovatis reflexis, cor. cylindricis. Vent. Maz. reflexum. Labillardiere. l. c. t. 19.

4. *revoluta*, fol. lanceolatis serrulatis, margine revolutis Vent. l. c. — Hoc genus Rutaceis affine est.

960. *TETRATHECA*. *Cal.* 4-dus, inferus. *Cor.* 4-petala. *Anth.* 4-loculares. *Caps.* 2-loculares, 5-valvis: valv. medio septiferis. *Sem.* subbina.

1. *junceae*, glabra, fol. alternis lanceolatis, caul. acutangulo, ramis elongatis nudiusculis. Smith. N. Holl. 1. p. 5. t. 2. Willd. Sp. II. p. 321. Hab. in N. Hollandia, cum seq.

2. *oppositifolia*, fol. subsparsis lanceolato-linearibus oppositis; flor. erectis.

3. *ericaefolia*, fol. verticillatis linearibus, flor. cernuis.

*Obs.* Duas has species vidi in Herbario D. Thibaud, a cl. Née in Australasia collectas.

961. *OXYCOCCLUS*. *Cal.* superus, 4-fidus. *Cor.* 4-partita: laciniis sublinearibus revolutis. *Filam.* conniventia. *Anth.* tubulosæ, bipartite. *R. Bacca* polysperma.

1. *palustris* (europæus), foliis ovatis integerrimis revolutis, caule filiformibus repentibus nudis. *Oxycoccus*, s. *Vaccinia* palustris. J. Baub. 1. p. 525. ic. *Vaccinium*. L. Flor. dan. t. 80. Lam. ill. t. 286. f. 3. Scollera Roth. germ. 2. p. 442. c. bon. descr. Hab. in uliginosis, sphagnosis, sempervivens. *Bacca* purpurea.

β ? *macrocarpus*, foliis integerrimis ovali-oblongis planis obtusis, caule repentibus filiformibus. *Vac. macrocarpum*. Ait. Kew. 2. p. 13. t. 7. Lam. ill. t. 286. f. 4. V. *oxycocc.* β. oblongifolius. Michaux. Flor. 1. p. 228. Hab. in Canadæ turfosis paludosis.

2. *hispidulus*, fol. subrotundo-ovalibus acuminatis, caule repentibus hispido. Lin. Willd. Sp. II. p. 355. Michaux. l. c. t. 23. sub *Vaccinio*. *Arbutus thymifolia*. Ait. A. filiformis. Lam. enc. Hab. in Amer. bor. cupressetis humidis. Caule ferrugineo-hirsutus. *Bacca* nivea, edulis.

3. *erythrocarpus*, fol. ovalibus acuminatis serrulatis ciliatisque, caul. erecto. Michaux. p. 227. sub *Vacc.* Hab. in Carol. septent. montib. altis. Cor. ante anthesin longa, conoidea. *Anth.* exsertæ. *Bac.* coccinea. h

*Obs.* Habitu, loco natali, præsertim cor. forma a *Vacciniis* (quæ ob stamina utplurimum 10, ad decandriam sunt relata), differt hoc genus.

962. *MENZIESIA*. *Cal.* monophyllus. *Cor.* monopetala, ovata. *Filam.* receptaculo inserta. *Caps.* supera, quadrilocularis, dissepimentæ et marginibus inflexis valvularum. *Sem.* numerosa, oblonga.

1. *ferruginea*, flor. folisque terminalibus fasciculatis lanceolatis planis, subtus laevibus. Jussieu in Annal. du Mus. d'hist. nat. 1. p. 55. Smith ic. ined. 1. p. 56. t. 56. Willd. p. 355. Lam. ill. t. 285. Hab. in Amer. boreali. h

2. *polifolia*, flor. terminalibus racemosis, fol. alternis ovatis revolutis subtus incano-tomentosis. Juss. l. c. *Andromeda Daboecia*. Lin. Syst. veg. *Erica Daboecii*.

Ej. Sp. pl. Willd. p. 385. Smith. brit. 1. p. 420. Engl. bot. t. 35. Hab. in montib. Hiberniae occidentalis. h

3? *pilosa*, fol. pilosis apice niveis. Lin. ill. gen. p. 494. Journ. d'hist. nat. 1. p. 410. conf. Juss. Annel. l. c. p. 56. Hab. in Amer. bor.

963. *ERICA*. *Cal.* 4-phyllus, persistens. *Cor.* 4-fida, persistens. *Filam.* receptaculo inserta. *Antherae* bifidae. *Caps.* membranacea, 4-8-locularis. *Dissepimenta* e valvularum margine. *Sem.* singulis loculis plura.

† *ARISTATAE*. \* *fol. oppositis.*

1. *glutinosa*, antheris aristatis pistilloque inclusis, coroll. globoso-ovatis, fol. oppositis sparsisque ciliato-glandulosis linearib. Willd. Sp. pl. II. p. 356. Thunb. Diss. de Erica n. 48. Icon. horti Kewens. t. 17. E. droseroides. Lam. enc. 1. p. 489. Andromeda droseroides, racemis secundis, foliis linearibus pilosis viscidis. L. Mant. 239. Petiv. mus. t. 161. Hab. ad Cap. b. spei in planitie montis Tabularis. *Cor.* ovata violacea, collo atropurpureo, limbo minuto albo.

*Obs.* Omnes fere species, quae parvi frutices sunt, ad Cap. bon. spei afric. crescent, hinc ad plurimas indicio loci natalis in spatii compendium omitta est.

2. *lutea*, anth. aristatis styloque inclusis, coroll. oblongo-ovatis, flor. terminalibus, fol. linearibus trigonis glabris oppositis, ramis deflexis. Willd. p. 357. Lam. ill. t. 287. f. 2. Wendland de Erica. p. 13. t. 4. Andrews Erica. n. 11. c. Icon. Hab. ad Cap. b. spei. *Cor.* subrostrata lutea. h

\* \* *foliis ternis.*

3. *paniculata*, aristata, fol. ternis trigonis glabris, flor. lateralibus aggregatis, caule erecto. Pluk. alm. 136. t. 279. f. 2. Seb. mus. 2. p. 46. t. 44. f. 4. Hab. ad Cap. b. spei. h

4. *depressa*, anth. aristatis inclusis, cor. campanulatis, stylo incluso, flor. raris, fol. ternis, caule depresso. L. Mant. 230. Thunb. Diss. n. 50. t. 6. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei in lateribus rupum et planitie montis Tabularis. *Cor.* campanulata rubra. h

5. *halicacaba*, anther. aristatis, stylo incluso, cor. campanulato-ovatis inflatis, flor. terminalibus solitariis, foliis ternis linearib. trigonis. Willd. p. 358. Thunb.

Diss. n. 51. Icon. horti Kewens. t. 1. Lam. ill. t. 288. f. 2. (mala). Hab. in rupibus praeruptis cum priore. *Cor.* magna, flavo-virescens. h

6. *Monsoniana*, anth. aristatis inclusis, stylo incluso, cor. oblongo-ovatis, calyce duplici colorato, flor. terminalibus subso-litariis, fol. ternis oblongis obtusis. Willd. Thunb. Diss. n. 52. t. 1. fol. 2. Icon. horti Kewens. t. 7. Hab. in montibus Hottentots Holland. Flor. magn. albi. h

7. *discolor*, anth. aristatis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis, calyce duplici, flor. terminalibus ternis, fol. ternis glabris. Willd. p. 359. E. discolor. Andrews Erica. n. 3. c. Icon. mala. Hab. ad Cap. b. spei. *Cor.* pallide purpurea, apice virescens. h

8. *densifolia*, anth. aristatis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis pubescentibus, flor. axillaribus, fol. ternis oblongis imbricatis. Willd. *Cor.* pubescens. h

9. *cruenta*, anth. aristatis inclusis, stylo exserto, cor. tubulosis incurvis, calyce simplici glanduloso-dentato, flor. axillaribus verticillatis, fol. ternis margine scabris. Willd. p. 360. Icon. horti Kewens. t. 13. Andrews Erica. ic. *Cor.* punicea cylindrica uncialis, parum incurva, glabra. h

10. *nigrita*, anth. aristatis, cor. campanulatis, stylo incluso, calycibus imbricatis trifloris sessilibus; cap. tomentosa. E. larin-cina. Berg. cap. 94. Seba mus. 2. p. 11. t. 9. f. 7. Hab. in summitate montis Diaboli. Flores albi. Antherae obtusae, nigrae. h

11. *phylicoides*, anth. aristatis inclusis, stylo incluso, cor. campanulatis calyce paullo longioribus, flor. axillaribus nuntantibus, fol. ternis sexfariam imbricatis. Willd. p. 361. Habitus Phyllicae cricoi-dis. h

12. *regerminans*, anth. aristatis, cor. ovatis, stylo incluso, cal. acutis, flor. racemosis. L. Thunb. Diss. n. 54. Caulis, ramis junceis. *Cor.* ovato-globosa rubra, ore obtuso. Ramus spicam continuat. L. h

13. *urceolaris*, anther. aristatis, cor. ovato-conicis villosis, stylo incluso, cal. lanceolatis, flor. umbellatis, fol. ternis. Ait. Kew. t. p. 15. Icon. horti Kewens. t. 16. F. pentaphylla. Lin. Syst. veg. 302. E. castra. Lin. Sp. pl. Edit. 1. et 2. Seba mus. 1. p. 32. t. 21. f. 2. h

14. *marifolia*, anth. aristatis, cor. ovato-conicis, stylo mediocri, fol. ternis ovatis, pubescentibus. subtus albidis. Ait. Kew. 2.

p. 15. Icon. horti Kewens. t. 14. Rami pilosi. Folia subtus alba. Flores umbellati. h

15. *planifolia*, anth. aristatis exsertis, cor. campanulatis, fol. ternis quaternisve ovatis acutis glanduloso-ciliatis. Willd. p. 362. E. thymifolia. Wendl. obs. p. 48. Pluk. mant. 69. t. 347. f. 1. Rami pilis apice glanduliferis. h

16. *Airta*, aristata, fol. ternis linearibus hispidis, flor. umbellatis, cal. scabro rudi. Thunb. Diss. n.º 56. t. 2. f. 3. Corollae globosae subvillosae, longe pedunculatae. Willd. h

17. *bicolor*, aristata, fol. ternis ovatis scabris, flor. ternis cernuis glabris, cal. villosa colorato. Thunb. Diss. n.º 51. h

18. *articularis*, anth. aristatis inclusis, cor. globosis cal. colorato multo minoribus, fol. ternis linearibus margine membranaceis. Willd. p. 363. Thunb. Diss. n.º 58. E. pulchella Andr. E. n.º 51. c. 1c. Cal. ovatus incarnatus. Cor. alba. Stylus atropurpureus. Stigma coeruleus. h

19. *viridipurpurea*, anth. aristatis, cor. campanulatis, stylo incluso, fol. ternis, flor. sparsis. L. Syst. veg. p. 301. Lin. Diss. n.º 9. cum fig. flor. E. pelvisiformis. Salisb. l. c. p. 376. Thunb. Diss. n.º 5c. Hab. in Lusitania. Variat fol. quaternis. h

\*\*\* foliis quaternis.

20. *catervaeefolia*, caul. angulato pubescente, tubo anguste obovato. anther. foraminosis. Salisb. in Act. Soc. Lin. 6. p. 372. E. pubescens. β. villosa. Thunb. In monte Tafelsberg.

21. *pubescens*, fol. laminis parum replicatis fimbriatis, cor. lineari pubescente, limbo erecto, caps. glabra. Salisb. Andrew. Eric. n.º 60. ic. E. hirtiflora. Curt. mag. t. n.º 481. E. pubescens, var. hispida. Th. Fol. quaterua.

22. *tardiflora*, cal. adpresso ovato-cuneato, cor. lineari pubescente, limbo brevissimo recurvo, cap. hirta. Salisb. p. 373. E. pubescens. Curt. mag. n.º 480.

23. *parviflora*, cal. adpresso rhombo-cuneato, cor. lineari pubescente, calcaris. auricularibus, caps. glabra. Salisb. E. pubescens. Lin. Diss. de Erica. n.º 19. E. parviflora. Lin. Sp. pl. p. 606.

24. *exigua*, cal. adpresso ovato connato, cor. lineari pubescente: tubo ovali, limbo brevissimo, calcar. lineari-attenuatis, peric. glabro. Salisb. E. pubescens, var. parviflora. Thunb. Fol. 3-na, saepius 4-na.

25. *persoluta*, aristata, fol. ternis quaternisque trigonis glabris, flor. umbellatis calyce ciliato. Thunb. Diss. n.º 62. E. strigosa. Willd. p. 365. Wendl. de Er. fasc. 2. p. 25. ic. E. subdivaricata. Berg. cap. p. 114. Hab. in campis arenosis Cap. b. spei. Cor. alba. h

26. *gracilis*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. campanulatis, calyce colorato, lacin. linearib. glabris, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearibus glabris adpressis, caule glaberrimo. Willd. p. 365. Wendl. obs. bot. p. 47.

27. *strigosa*, anth. aristatis, cor. campanulatis glabris, stylo exserto, fol. quaternis pubescentibus ciliatis. Ait. Kew. 2. p. 17. E. axillaris. Salisb. l. c. p. 325. Cor. pallide rubens. Anth. inclusae oblongae nigricantes. Stigm. nigro-purpureum. Ait. h

28. *arborea*, anth. aristatis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. ternis, ramulis incanis. L. Syst. veg. 302. E. scoparia. Thunb. E. procera. Salisb. l. c. p. 328. Hab. in Europa australi. Flor. Convallariae, albi. Caul. incani. L. h

β. *stylosa*. Rudolphi. in bot. Journ. 1800. p. 233. E. arborea quorund. E. caffra. Lin. Crisc. cum antecedente, Styl. cor. multo longior. Stigm. depresso-capitatum.

29. *stricta*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. ovatis, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearibus glabris horizontalibus. Willd. Donn. Catal. hort. Cantab. p. 45. Hab. ad Cap. b. spei et in insula Corsica legit G. Jony. Cal. viridis. Cor. rubra ovata, lacinii reflexis. h

30. *florida*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. globosis, cal. villosa reflexo, flor. terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus pilosis. Willd. p. 367. Thunb. Diss. n.º 64. t. 6. f. 1. h

31. *mucosa*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. globosis mucosis, pedunc. ternis terminalibus flore longioribus, fol. quaternis linearib. margine cartilagineo serratis. Willd. Andrews Erica. ic. Iron. horti Kewens. t. 15. Berg. cap. 112. Hab. ad Cap. b. spei inter urbem et Bay falso. Calyx scariosus mucosus. Cor. mucosa. h

32. *pitulifera*, aristata, fol. quaternis linearibus ciliatis, umbellatis, calyce naviculari apice ciliato glabro. Thunb. Diss. n.º 65. Habit. in montibus versus Bay falso. h

33. *amoena*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. campanulatis, calyce colorato villosa, flor. axillaribus verticillatis, fol.

quaternis linearibus imbricatis villosis. Willd. p. 368. Wendl. obs. p. 48. h

34. *Tetralix*, anth. aristatis, cor. ovatis, stylo incluso, fol. quaternis ciliatis, flor. capitatis. Lin. Flor. dan. t. 81. Hab. in Europa boreali. h.

35. *inflata*, aristata, fol. quaternis linearibus glabris, flor. umbellatis ventricosis, cal. subulato glabro. Thunb. Diss. n°. 67. t. 2. f. 2. Cor. ventricosa pallide sanguinea, subpollicaris. h

36. *gilva*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. cylindricis, calycinis foliolis membranaceis, flor. axillaribus verticillatis, fol. quaternis linearibus glabris cartilagineo-mucronatis. Willd. p. 370. Wendl. obs. 48. Cor. magna, sordide flavescens, apice virescens. h

37. *verticillata*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. cylindricis supra basin constrictis, flor. penulis verticillatis, foliis quaternis patentibus. Willd. p. 370. Andrews Erica. n°. 21. c. Icon. Cor. coccinea supra basin constricta. h

Obs. Cl. Salisbury (l. c. p. 366.) hanc ut varietatem sequentis respicit.

38. *Pattersonia*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavata, flor. horizontalibus terminalibus, foliis quaternis quinque glabris: junioribus confertissimis. Willd. p. 355. Thunb. prodr. suppl. p. 189. E. *Pattersonia*. Andrews Erica. n°. 7. c. Icon. Wendl. Ericarp. 15. t. 5. Cor. flava. Anth. inclusae.

\*\*\*\* *foliis senis.*

39. *mammosa*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. clavato-cylindraceis, flor. umbellatis, fol. subsenis linearibus reflexis. Willd. E. *abietina*. Thunb. Diss. 68. auctoritate ejus specim. Salisb. Buxb. Cent. 4. p. 25 t. 41. 42. E. *abietina*. Willd. p. 369. excl. syn. Lin. Hab. ad Cap. b. spei. Caulis rigidulus, lineis albis subulatis a cicatriculis foliorum decurrentibus. Cor. sanguinea, longissima. Antherae cor. longiores. h

40. *empetrifolia*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. campanulatis, flor. verticillatis, fol. semis linearibus pilosis. Willd. p. 371. Thunb. Diss. n°. 70. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. ut Lycopodii, quasi spiraliter, unde numerus eorum difficilis. Th. h

41. *mollearris*, cal. 4-fido, cor. lineari laevi: tubo uercolari, limbo recurvo-patentissimo, caps. hirsuta. Salisb. p. 370.

E. *empetrifolia*. Schaevegt. n°. 17. c. 12. Habitu praecedentis, sed flor. diversi. S.

42. *spicata*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis, flor. in ramorum apice verticillatis, fol. quaternis senisve linearibus glabris. Willd. Thunb. Diss. n°. 71. t. 4. f. 3. Wendl. Eric. 2. p. 27. E. sessiflora. Lin. suppl. 222. Hab. ad Cap. b. spei in montibus inter Nordhoek et Bay falso. Frutex fuscus. Cor. saepius cernua.

\*\*\*\*\* *foliis octonis.*

43. *octophylla*, anth. aristatis, stylo incluso, cor. cylindraceis ventricosis, flor. umbellato-capitatis, fol. linearibus octonis truncatis. Willd. p. 372. Thunb. Diss. n°. 72. t. 3. f. 1. E. fascicularis. Lin. suppl. 215. Hab. in montibus Hottentots-Holland. Cor. grossa purpurea. Anth. longitudine cor.

Obs. Has duas sub nomine E. *radi-florae* conjunxit Salisb. l. c. p. 860.

44. *fascicularis*, anth. aristatis, stylo exserto, cor. cylindricis clavatis, flor. numerosis verticillatis horizontalibus, foliis octonis linearibus glanduloso-denticulatis. Willd. p. 373. Icon. horti Kewens. t. 6. E. coronata. Andrews Erica. Cor. uncialis, sanguinea, apice viridis. Anth. inclusae.

++ CAISTATX. \* *foliis sparsis.*

45. *obliqua*, anth. cristatis, stylo incluso, cor. ovatis viscosis, flor. terminalibus umbellatis, fol. suboppositis sparsis linearibus arcuatis truncatis. Willd. p. 373. Thunb. Diss. n°. 73. t. 1. f. 3. Icon horti Kewens t. 3. Pedunc. flore longiores colorati visci, bracteis 3 instructi. W.

\*\* *foliis oppositis.*

46. *vulgaris*, anth. aristatis, cor. campanulatis subaequalibus, calycibus duplicatis, fol. oppositis sagittatis. L. Fl. dan. t. 627. Hab. in campis sterilibus, sylvestricis arenosis. Var. fol. hirsutis et squarrosis. vid. Willd.

Obs. Hanc stirpem, si quae alia in toto ordine proprium debet constituere genus, jure antiquiore profecto suum nomen retinisset, sed cum tot aliae stirpes, apud omnes Botanicos jam eodem cognomine gaudeant, satius duxi hanc unam novo insignire titulo: itaque *Callunum* appellavi, ob nam, ejus frequentissimum in scopis conficiendis. *Essentia generis* qua differt ab Erica, est in pericarpio (capsulae) valvis, ad latera loculorum debiscentibus, septis axi relictis, habitus, absque ullo rudimento petiolis pedunculare, omnino sessilis. Salisb. l. c. p. 317.

\*\*\* *foliis ternis.*

47. *gnaphalodes*, anth. cristatis, cor. ovatis tectis, stylo inclusio, fol. ternis, stigm. quadripartito. Berg. cap. p. 119. Thunb. Diss. n°. 75. Pluck. mant. 68. t. 346. f. 11. Houttuyn. t. 21. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei in collibus arenosis. h

48. *corifolia*, anth. cristatis, cor. ovatis, stylo inclusio, col. turbinatis, fol. ternis, flor. umbellatis. Berg. cap. 108. Thunb. Diss. n°. 77. Seb. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 3. Pet. gaz. 7. t. 3. f. 7. Hab. in campo sabuloso infra Taffelsberg et Sternberg. Cor. purpurea. Stigm. capitatum.

49. *calycina*, anth. cristatis, stylo inclusio, cor. ovatis magnitudine cal. colorati patenti, fol. ternis adpressis. Willd. p. 375. Thunb. Diss. n°. 78. Andrews Erica. ic. Seb. mus. 2. p. 13. t. 11. f. 7. Hab. in summitate montis Tabularis.

50. *bracteolaris*, anth. cristatis inclusis, cor. prismaticis, bract. numerosis imbricatis purpureis flor. obvolvendis, fol. ternis, flor. fasciculatis. Lam. enc. 1. p. 482. Facie Diosmae. †

51. *triflora*, anth. cristatis, cor. globoso-campanulatis, styl. inclusio, fol. 3-nis, flor. terminalib. Lin. Mant. p. 374. Thunb. Diss. n°. 79. t. 5. f. 2.

52. *pyrolaeformis*, foliorum laminis cuneatis, calyce ovato-cuneato, cor. bilineari, tubo 4-angulo, spærico, calcaribus late auricularibus. Salisb. l. c. p. 351. E. triflora. Willd. Sp. pl. exclusis synonym. Persimilis praecedenti, sed differt, tubo cor. apice intus sub sinibus limbi, in tot carinas canaliculatas, extremitate pilis aliquot minutis barbata, prominente. Salisb.

53. *scoparia*, anth. cristatis, cor. campanulatis, stigmatate exserto peltato, fol. ternis. L. Syst. veg. 302. E. *fucata*. Thunb. Willd. p. 387. E. *scoparia*, ramis virgatis, fol. ternis patentibus flor. triplo longioribus, cal. viridibus. Rudolphi in Bot. Journ. 1801. p. 232. E. major scoparia, fol. deciluis. Bauh. pin. 465. E. coris folio IV. Clus. hist. 1. p. 42. Hab. Monsp. in Hisp., Eur. australi. h

54. *Bergiana*, cristata, fol. ternis lanceolatis scabris, flor. subternis, cal. reflexo ciliato. Thunb. Diss. n°. 81. E. *quadriflora*. Willd. Sp. II. p. 379. Wendl. Er. fasc. 2. p. 29. c. Icon. Hab. in Roo de Sands Kloof. Cor. campanulata purpurea obtusa.

55. *formosa*, cristata, fol. ternis ovatis integris glabris, flor. umbellatis sulcatis,

cal. patenti integro. Thunb. Diss. n°. 82. t. 3. f. 3. Fol. obtusa patentia. Cor. albidia, globosa. Anth. stylusque inclusus.

56. *rubens*, cristata, fol. ternis linearibus integris glabris, flor. umbellatis globosis, cal. lanceolato brevi, ramis glabris. Thunb. Diss. n°. 83. Cor. sanguinea, magnitudine piperis. Anth. stylusque inclusus.

57. *incarnata*, cristata, fol. ternis ovatis integris glabris, flor. umbellatis ovatis, cal. integro, ramis villosis. Thunb. Diss. n°. 84. Obs. E. *incarnata* hortulanor. diversa est. Cal. foliola glabra, adpressa purpurea. Cor. oblonga alba. Anth. inclusae.

58. *cinerea*, anth. cristatis, cor. ovatis, stylo subexserto, fol. ternis, stigm. capitato. Flor. dan. t. 38. Curt. Lond. fasc. 1. t. 25. bon. Hab. in Eur. media, inque Oriente, (copiosa circa Parisios.) Flor. exsiccati caerulei.

59. *australis* anth. cristatis, cor. cylindricis, stylo exserto, fol. ternis patentibus. L. Syst. veg. 303. Thunb. Diss. n°. 86. Wendl. de Er. fasc. 9. p. 13. ic. Hab. in Hispania. Cor. obtusa, calyce triplo longior, lacin. cor. canescentes. L.

\*\*\* *foliis quaternis.*

60. *ramentacea*, anth. cristatis, stylo inclusio, cor. globosis, flor. umbellatis, fol. quaternis linearibus trigonis patentibus glabris. Willd. p. 379. Lam. ill. t. 287. f. 3. Andrews Erica. Wendl. de Er. p. 17. t. 6. Cor. purpurea.

61. *lateralis*, anth. cristatis, cor. globoso-campanulatis, cal. adpressis ciliatis, flor. terminalibus et axillaribus secundis, fol. quaternis glabris horizontalibus. Willd. p. 380. Var. E. *rubens humilis* Wendl. Er. fasc. 3. p. 13. c. Icon. Fol. acerosa, linearitrigona. Flor. numerosi, purpurei.

62. *margaritacea*, anth. cristatis, stylo exserto, cor. globoso-campanulatis, flor. terminalibus subumbellatis, fol. quaternis linearitrigonis glabris erectis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 20. Flor. terminales. Cor. alba, tubus urceolatus. Filam. apice inflexa. Stigma subquadrilobum. A.

63. *baccans*, anth. cristatis, stylo inclusio, cor. globosis cal. coloratis magnitudine, flor. umbellatis terminalibus, fol. quaternis linearitrigonis margine cartilagineis glabris imbricatis. Willd. p. 381. Andrews Erica. Thunb. Diss. n°. 88. Seb. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 3. Hab. in collibus arenosis Cap. b. spei. Pedunc. purpurei. Cor. campanulato-subglobosa, rubra.

64. *pendula*, anth. cristatis, stylo in-

D d 4

cluso. cor. ovatis, umb. multifloris terminalibus, fol. quaternis quinque glabris oblongis margine revolutis, ramis pendulis. Willd. Wendl. obs. 48. Cor. ovata. Anth. stylusque inclusus.

65. *physodes*, cristata, fol. quaternis linearibus, flor. umbellatis viscosis, cal. ovato brevi. Thunb. Diss. 89. Andrews Eric. 44. c. icon. Hab. in plauitite montis Tabularis. Cal. ovatus. Cor. viscida.

66. *laxa*, cristata, fol. quaternis linearibus, flor. umbellatis glabris, cal. ovato ciliato. Thunb. prodr. suppl. p. 189.

67. *cernua*, cristata, fol. quaternis ovatis ciliatis, flor. capitatis, cal. ciliato. Thunb. Diss. n. 90. E. cernua. Montin Act. ups. 2. p. 297. t. 9. f. 3. mala. Hab. in Koude Bokkeveld. f.

68. *lanceolata*, cristata, flor. capitatis cernuis, fol. quaternis lanceolatis erectis glabris. E. cernua lanceolata. Wendl. de Er. fasc. 8. p. 13. ic.

69. *retorta*, anth. suberistatis, fol. quaternis recurvis, cor. ovato-oblongis, stylo mediocri. Lin. suppl. p. 220. Andrews Eric. n. 15. Lam. ill. t. 288. f. 1. Hab. in montibus Hottentots - Holland. Cor. inflata, viscida. Filam. linearia, membranacea.

††† Mutica. \* *foliis oppositis*.

70. *tenuifolia*, anth. muticis inclusis, cor. calyceque sanguineis, fol. oppositis. L. Seb. mus. 1. p. 157. t. 71. f. 6.

\*\* *foliis ternis*.

71. *albens*, anth. muticis inclusis, cor. ovatis oblongis acutis, racemis secundis, fol. ternis. L. Mant. 231. Curt. Bot. mag. n. 440. c. Icon. Flor. subspicati, albi. L. ochroleuci?

72. *bracteata*, mutica, fol. ternis lanceolatis glabris, flor. umbellatis bracteae petiolatis coloratis obvallatis. Thunb. Diss. n. 3. Hab. in montibus Platte Kloof. Flor. umbellati bract. obvallati. Bract. interiores totae sanguineae. Th.

73. *Thunbergii*, anth. muticis medio-cribus, cor. planis, tubo globoso, stylo exserto, fol. ternis. Lin. suppl. p. 220. Thunb. Diss. n. 4. Mont. Act. ups. 2. p. 290. t. 9. f. 2. mala. Hab. in Koude Bokkeveld. Caul. rufescens. Flor. terminales pedunculati. Cor. tubus subglobosus. Anth. purpureae, bifidae.

74. *tetragona*, mutica, fol. ternis lanceolatis, flor. racemosis secundis tetragonis.

Thunb. Diss. n. 5. t. 4. f. 2. Lin. suppl. 225. Flor. lutei.

75. *umbellata*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, stylo exserto, fol. ternis acerosis. L. Syst. veg. 306. Icon. horti Kewensis. t. 5. Loeff. it. 138. Hab. in Lusitania. Anth. basi gibboso-caudatae. Cor. coerulescentes.

76. *nudiflora*, anth. muticis exsertis, cor. cylindricis, stylo exserto, fol. ternis, ramis tomentosis. L. Mant. 229. Smith. ic. incl. 1. p. 57. Thunb. prodr. suppl. Caul. hispido tomentosus. Th.

Obs. Ab. E. ramosa differt, fol. ternis glabris, calyce glabro. Willd. Fol. ciliata dicit Thunb. l. c.

77. *petiolata*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis calyce colorato bracteato parum longioribus, flor. terminalibus, fol. ternis lanceolatis glabris. Willd. p. 386. E. mutica, fol. ternis lanceolatis glabris, flor. umbellatis campanulatis, caule decumbente. Thunb. Diss. n. 7. t. 6. f. 2. bona. Facies Rosmar. offic. Lin. Hab. in mont. Tabulari.

78. *Bryantha*, anth. muticis, stylo exserto, cor. campanulata, flor. racemosis corymbosis, fol. ternis oblongis obtusis. Willd. Thunb. Diss. n. 8. Andromeda. L. Mant. 238. Pall. ross. 2. p. 57. t. 14. f. 1. Bryanthus repens serpillifoli, flor. roseo. Gmel. sib. 4. p. 133. t. 57. fig. 3. Hab. in Sibiria ad portum Ochotenfens, in Camtschatka et in insula Bergii. Planta densis caespitibus uti Serpillum provenit.

79. *Stelleriana*, anth. muticis inclusis, stylo inclusio, cor. campanulatis, flor. terminalibus geminis, fol. subternis oblongo-linearibus obtusis. Willd. p. 387. Pallas. ross. 2. Hab. in Camtschatka. Simillima praecedenti.

80. *axillaris*, mutica, fol. ternis trigonis glabris, flor. racemosis globosis, ramis tomentosis. Thunb. Diss. n. 10. Hab. ad Cap. b. spei. Flor. axillis foliorum solitarii, pedunculati, globosi, minuti.

81. *imbricata*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, cal. imbricatis, stylo exserto, fol. ternis. Syst. veg. 306. Lin. Diss. n. 53. cum fig. floris. Hab. in colibus arenosis.

82. *sexfaria*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. campanulatis cal. colorato imbricato brevioribus, flor. ternis terminalibus, fol. ternis linearibus trigonis glabris sexfariam imbricatis. Willd. p. 383. Icon. horti Kewensis t. 11. Tota glabra. Flor. tres



brevissime pedunculati, albi. Cal. foliola subrotunda.

83. *melanthera*, anth. muticis mediocribus, cor. campanulatis calyce 4-fida duplo longioribus, stylo longe exserto, pericarpio sericeo, fol. ternis. Lin. Mant. 232. E. *lysimachiaeflora*. Salisb. l. c. p. 332.

84. *cristaeflora*, anth. muticis, fol. ternis trigonis glabris, flor. umbellatis, calycib. 4-phyllis, limbo tubo triplo longiore, basi integro, caps. laevi. Salisb. p. 332. E. *mesanthera*. Thunb. Diss. n. 12.

85. *leucanthera*, mutica, foliis ternis trigonis glabris, flor. umbellatis, anth. exsertis albis. Willd. Sp. II. p. 389. Lin. suppl. 223. Cor. alba.

86. *taxifolia*, anth. muticis inclusis, cor. ovata calyce colorato tecta, flor. umbellato-corymbosis, fol. linearis-trigonis margine cartilagineis. Willd. p. 389. Icon. hort. Kewens. t. 19. Wendl. Eric. fasc. 11. p. 19. c. Icon. Caul. ramis cicatrisatis. Cor. tubo carneo, laciniis purpureis. Filam. alba. Anth. flavae, ovatae.

87. *spumosa*, anth. muticis inclusis, cor. ternis calyce communi obtectis, stylo exserto, fol. ternis. Willd. Sp. pl. II. p. 390. Hab. ad Cap. b. spei in planitie montis Tabularis. Cal. imbricatus, sanguineus. Cor. campanulatae flavicantes. Stylus longissimus nutans. L.

88. *capitata*, anth. muticis inclusis, cor. globoso-campanulata cal. lanato tecta, flor. sessilibus, fol. ternis linearibus obtusis villosis. Willd. p. 390. Wendl. Er. ic. Petiv. gaz. 5. t. 2. f. 10. Seba musc. 1. p. 30. t. 20. f. 1. Andrews. Er. 34. c. Icon. Cal. lanugine flavesciente dense obtusis.

89. *Bruniades*, anth. muticis exsertis, cor. campanulata cal. lanato tecta, flor. umbellatis, fol. ternis linearibus obtusis pubescentibus. Willd. p. 391. Andrews. Eric. l. L. Syst. veg. p. 306. E. *capitata*. Thunb. Diss. n. 15. Pluck. mant. 69. t. 347. f. 9. optima. Cal. alba lana obtectus tegit totam cor. sul truncatam. L.

90. *carbasina*, anth. muticis exsertis, cor. campanulata, cal. dense lanato 4-phyllis multo longiore, flor. sparsis, nect. sericeo. Salisb. l. c. p. 333. E. *Bruniades*. Lin. mant. p. 378. Fol. praecedentis latiora et magis tomentosa. S.

91. *calyculata*, anth. muticis exsertis, cor. subrotundata brevi glabra, flor. ramulorum terminalibus umbellatis, foliis ternis acuminatis ciliatis subulatis imbricatis.

Wendl. de Er. fasc. 4. p. 5. c. ic. Cor. albo-ferruginea. Styl. exsertus.

92. *tenuissima*, anth. aristatis inclusis, cor. minima obovata obtusa glabra, stylo incluso, flor. ramul. terminalibus umbellatis erectis et cernuis, fol. 3-4-nis linearis-filiformibus glabris subimbricatis Wendl. de Er. fasc. 6. p. 9. c. ic.

93. *Passerina*, mutica, fol. ternis ovatis glabris, flor. subsolitariis, cal. tomentosis. Thunb. Diss. n. 26. Lin. suppl. 221. Petiv. Gaz. t. 3. f. 7. Cor. campanulata. Germen albo-tomentosum.

94. *totta*, mutica, fol. ternis oblongis hispida, flor. ternis, cal. ciliatis. Thunb. Diss. n. 17. Rami hispidi. Flor. ultimis ramulis terminales, solitarii, cernui, albid.

95. *absynthoides*, anth. muticis inclusis, cor. ovato-campanulatis viscidis, stylo exserto, stigmate peltato, fol. ternis. L. Syst. veg. 304. Thunb. prodr. suppl. Mant. 66. E. virgata. F. hispida. Willd. suppl. 11. p. 394. ex Salisbury. 8. Thunb. Diss. n. 18. Pluck. mant. 68. t. 347. f. 14. In monte Tabulari et in dunis versus Bay falso. Frutex statura Absynthii paniculatus caule rufo. Cor. pallidae. L.

96. *ciliaris*, anth. muticis inclusis, cor. ovatis grossis, stylo exserto, fol. ternis ciliatis racemis secundis. Syst. veg. 304. Curt. bot. mag. n. 484. c. Ic. bon. Loefl. it. 138. Hab. in Lusitania et in Gallia (Depart. d. Landes.) Bipedalis. Cor. magna, ore contracto.

97. *pilifera*, anth. muticis, fol. ternis glabris mucronato-piliferis, flor. terminalibus aggregatis. Thunb. prodr. suppl. p. 188.

98. *scariosa*, anth. muticis, fol. ternis linearibus glabris, flor. racemosis campanulatis, bract. remotis. Thunb. l. c.

99. *caerulea*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. ovatis, pedunc. terminalibus quaternis quinisque flore nutante multo longioribus, fol. ternis linearibus obtusis cartilagineo-denticulatis. Willd. p. 363. Anomoda caerulea. L. Sp. pl. 563. A. taxifolia. Pall. ross. t. p. 54. t. 73. f. 2. Fl. lapp. t. 1. f. 5. Gmel. sib. 4. p. 131. t. 57. f. 2. In alpihus Norvegiae, Lapponiae, inque Sibiria.

100. *Petiverii*, anth. muticis exsertis, cor. cylindraccis, calycinis foliolis subrotundis bracteatis, flor. pedunculatis solitariis terminalibus, fol. ternis squarrosopatentibus. Willd. p. 394. Lam. ill. t. 288. f. 3. Thunb. Diss. n. 21. Flor. solitarii, terminales. Cor. lutea. Similis E. Pluckenetii,

\*ed Cal. duplex. Cor. luteae, acute quadrifidae. Fol. squarroso-imbricata. Lin.

101. *Banksii*, anth. muticis exsertis, cor. cylindrica limbo revoluta, cal. foliolis coloratis oblongis obtusis bracteatis, flor. sessilibus geminatis terminalib. fol. ternis linearibus clavis erectis. Willd. p. 305. Andrews Erica. n. 26. c. Icon. Caul. decumbens. Fol. linearis-trigona. Cor. viridilutea. Stigma viride. W.

102. *Sebana*, anth. muticis exsertis, cor. clavata incurvata, calycinis foliolis scariosis oblongis obtusis bracteatis, flor. ternis terminalib. fol. ternis linearibus squarropatentibus. Willd. Donn. index horti cantab. 45. Icon. horti Kewens. t. 30. E. Plukenetii. Berg. cap. 91. descriptio. Seba mus. 1. p. 32. t. 21. f. 4.

103. *monadelpha*, anth. muticis exsertis, cor. cylindrico-ovata, cal. foliol. coloratis obtusis bracteatis, flor. ternis terminalib., fol. ternis linearibus obtusis adpresso-erectis. Willd. p. 396. Andrews Erica. n. 22. c. Icon. Filam. dilatata margine leviter cohaerentia. W.

104. *Plukenetii*, anth. muticis longissimis exsertis, cor. cylindricis, stylo exserto, cal. simplicibus, fol. ternis. L. Syst. veg. 325. Thunb. Diss. n. 22. Icon. horti Kewens. t. 9. optima. Chamaepithys aethiopica, fol. laete virentibus, flore oblongo phoeniceo plusquam eleganti. Pluck. mant. 45. t. 344. f. 3. Seba mus. 2. t. 25. f. 5.

*Obs.* Plures varietates vid. apud Wendl obs. bot. p. 45-46. et Willd. Sp. p. 396.

105. *versicolor*, anth. muticis subexsertis, cor. clavato-tubulosis glabris, flor. pedunculatis terminalibus, fol. ternis linearibus ciliatis. Willd. p. 397. Andrews Erica. Cor. tubus aurantiaco-sanguineus superne flavus, laciniiis limbi viridibus. W.

106. *perspicua*, anth. muticis inclusis, cor. tubulosis villosis, flor. sessilibus terminalibus solitariis, fol. ternis linearibus ciliatis. Willd. p. 397. Wendl. Erica. p. 7. t. 1. Er. Linnaei Hortulan. Cor. albidodiaphana. W.

107. *Aitoni*, anth. muticis inclusis, cor. hypocrateriformi, flor. umbellatis, foliis ternis linearibus patentibus erectis. Willd. p. 398. E. Aitonia. Andrews Erica. n. 21. c. Icon. Cor. figura et magnitudine Jasmini officinalis. Tubus sanguineus, viscosus. Limbus albus planus.

\*\*\* *foliis quaternis, quinis et senis, pluribusve.*

108. *cephalotes*, anth. muticis inclusis,

stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis, cal. pubescentibus, flor. capitato-verticillatis, fol. senis linearibus. Willd. p. 398. Thunb. Diss. n. 23. Cor. purpurea.

109. *pulchella*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-campanulatis, cal. glabris, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus. Willd. p. 398. Thunb. Diss. n. 24. t. 4. f. 1. E. retroflexa. Wendl. de Er. fasc. p. 3. c. ic. Er. argutifolia. Salisb. l. c. p. 364.

110. *vestita*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. pubescentibus tubulosis curvatis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis adpressis linearibus margine cartilagineis scabris. Willd. p. 399. Andrews Erica. Var. flor. albis et purpureis.

§. *longifolia*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. pubescentibus tubuloso-clavatis, flor. axillaribus verticillatis, fol. subdenis linearibus margine cartilagineis scabris. Willd. p. 399. Donn. ind. horti cantab. p. 42. Icon. horti Kewens. t. 4. E. pinea. Wendl. Erica p. 11. t. 3.

*Obs.* Hanc cum priore conjunxit sub nomine *E. longiflorae* cl. Salisbury.

111. *pinca*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. glabris clavato-curvatis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus lanceolatis. Willd. Thunb. Diss. n. 26. Cor. alba, pollicaris.

112. *Leea*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. glabris tubuloso-clavatis subtetragonis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis rigidis. Willd. p. 400. Andrews Erica. n. 20. c. Icon.

113. *coccinea*, anth. inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavata pubescente, cal. villosis, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus, basi margine glandulosis, subpubescentibus. Willd. p. 400. Wendl. Er. 3. p. 9. c. Icon. Er. abietina. Lin. Sp. pl. et Hort. Cliff. p. 148. n. 9. auctoritate ipsius specimenis. Salisb. l. c. p. 364. Seb. mus. 1. p. 32. t. 21. f. 4. Cor. pubescentes. Flor. copiosi.

114. *purpurea*, anth. muticis exsertis, stylo exserto, cor. tubulosa glabra, flor. axillaribus verticillatis, fol. senis linearibus. Willd. Andrews Erica. n. 4. c. Icon.

115. *concinna*, anth. muticis inclusis, cor. cylindricis basi attenuatis, flor. terminalibus umbellatis, fol. subdenis glabris. Ait. Kew. 2. p. 23. Er. abietina. Andrews Erica. n. 64. c. Icon. Cor. carnea, extus villosiuscula. Germen turbinatum concavum, margine crenulato. L.

116. *grandiflora*, anth. muticis exsertis, cor. cylindraceis subincurvis glabris, stylo elongato, flor. axillaribus pedunculatis, fol. subnervis acerosis glabris, Willd. p. 104. Icon. horti Kewens. t. 8. Curt. mag. 189. c. Icon. *β. exurgens*. Andrews Erica. ic. Flos maximus aurantio-flavus.

117. *cylindrica*, mutica, fol. quaternis trigonis glabris, flor. terminalibus cylindricis glabris. Thunb. Diss. n. 29. Cor. alba, glabra semipollicaris.

118. *curviflora*, anth. muticis, cor. curvato-clavatis glabris, flor. solitariis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. p. 402. Wendl. 1. Er. 3. p. 7. c. Icon. Andrews Eric. n. 40. c. Icon. Seb. mus. 2. t. 19. f. 5. Hab. ad rivulorum latera prope Drakenstein. Cor. sanguinea glabra.

119. *simpliciflora*, anth. muticis exsertis, cor. tubuloso-clavatis rectis, flor. terminalibus solitariis sessilibus, fol. quaternis lineari-trigonis glabris. Willd. Donn. catal. horti. cantab. 45. Er. curviflora. L. Syst. veg. 305. auctoritate ipsius speciminis. Salisb. l. c.

120. *tubiflora*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubulosis pubescentibus, flor. terminalibus solitariis sessilibus, fol. quaternis lineari-trigonis pubescentibus. Willd. L. Syst. veg. 305. Seb. mus. 2. t. 19. f. 5.

121. *lanata*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubuloso-clavatis pubescentibus, flor. terminalibus subsolitariis, fol. quaternis linearibus villosis imbricatis erectis. Willd. Wendl. obs. 45. Ej. Er. fasc. 5. p. 5. c. ic. Simillima praecedenti, cor. magis curvata, brevior.

122. *spuria*, cal. ovato cuneato, cor. 7-8-lineari pubescente, tubo cylindrico urceolari, limbo revoluti, pericarpio obpyramidalis. Andrews Er. n. 46. ic. E. culcitiflora. Salisb. p. 357. Facie antecedentis.

123. *ignescens*, anth. muticis subexsertis, cor. cylindrica glabra, apice hirta, styl. exserto, flor. racemoso-pyramidalibus, fol. quaternis linearibus villosis patentibus. Wendl. de Er. fasc. 8. p. 3. c. ic. Cor. luteo-ignescens.

124. *splendens*, anth. muticis exsertis, cor. tubulosa clavata pubescente, styl. exserto, flor. terminalibus racemosis, fol. quinque plurimisque linearibus glabris obtusis. Wendl. l. c. p. 5. c. ic.

125. *procera*, anth. muticis inclusis, styl. exserto, cor. tubulosis basi ventricosis, flor.

subsolitariis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis pubescentibus. erectis. Willd. Wendl. obs. 45.

126. *conspicua*, anth. muticis subinclusis, cor. cylindricis curvis longissimis pilosis, limbo revoluti, stylo exserto, fol. quaternis glabris. Willd. Sp. pl. II. p. 404. Ait. Kew. 2. p. 22. Icon. horti Kewens. t. 12. Andrews Eric. n. 29. c. Icon. Cor. flava longe tubulosa, incurva, pubescens.

127. *glandulosa*, mutica, fol. quaternis linearibus glanduloso-pilosis, flor. clavatis glabris, cal. hispidis. Thunb. Diss. n. 32. Cor. cylindrico-clavata, sanguinea, pollicaris.

128. *transparens*, mutica, fol. quaternis trigonis ciliatis, flor. terminalibus subsolitariis. Willd. Sp. pl. II. p. 404. Filamenta in hoc calcarata. Thunb. prod. 71. E. cerinthoides.

129. *cerinthoides*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. tubuloso-clavatis piloso-viscosis, flor. verticillatis nutantibus, fol. quaternis linearibus reflexis villosis glandulosis. Willd. Sp. pl. II. p. 405. Andrews Eric. n. 25. c. Icon. E. coris folio. Breyne. cent. 25. t. 13. Seb. mus. 2. p. 22. f. 4. et t. 34. f. 6.

130. *pectinifolia*, fol. laminis angusto ovato cuneatis, pectinatis, cal. rhombeco spathulato, cor. 5-7-lineari, intus lanata. Salisb. l. c. p. 367. E. Cerinthoides. Thunb. Diss. 53.

131. *Sparmanni*, anth. muticis inclusis, stylo exserto, cor. tubulosis strigosis villosis, calyce lanato, flor. sessilibus quaternis, fol. quaternis oblongis ciliatis imbricatis. Willd. p. 405. Lin. suppl. 219. Act. holm. 1778. p. 24. t. 2. Singularis capitulis florum semper divisus in flores quatuor. Th.

132. *Massoni*, anth. muticis inclusis, cor. cylindricis grossis, flor. capitatis, fol. octofariis imbricatis pubescentibus. Willd. II. p. 406. Icon. horti Kewens. t. 18. Curt. mag. 306. c. Icon. Thunb. Diss. n. 35. t. 3. f. 2. Andrews Erica. n. 9. c. Icon. Hab. in montib. Hottentots Holland. Flor. in capitulo terminali sessiles. Cor. cylindrica grossa.

133. *ventricosa*, anth. muticis inclusis, stylo incluso, cor. oblongo-ovatis, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearibus ciliatis. Willd. Sp. pl. II. p. 426. Thunb. Diss. n. 36. t. 1. f. 1. Andrews Erica. n. 2. c. Icon.

134. *ampullacea*, anth. muticis inclusis,

stilo exserto, cor. striatis basi globoso-ovatis, superne cylindraceis, flor. terminalibus umbellatis, fol. quaternis linearib. ciliatis reflexis. Willd. p. 406. *F. ampullacea*. Curt. mag. 303. c. Icon. Cor. pallide purpurea, lineis saturationibus longitudinalibus, basi globoso-ovata, superne elongata cylindracea, W.

135. *fastigiata*, anth. muticis inclusis, cor. hypocrateriformibus fasciculatis, stilo incluso, fol. quaternis. Syst. veg. 305. Lin. Diss. 44. c. fig. flor. Thunb. Diss. n. 17. Limbus subtus ruber, supra albus, lacinias subcordatis.

136. *incurva*, anth. muticis exsertis, stilo exserto, cor. campanulatis, flor. terminalibus capitatis, fol. quaternis incurvis ciliatis. Willd. p. 407. Wendl. obs. 47. Accedit ad *E. empetrifoliam*.

137. *inflexa*, anth. muticis, fol. quinis trigonis incurvis glabris, flor. racemosis ovatis, cal. viridi. *E. incurva*. Thunb. prodr. suppl. p. 188.

138. *globosa*, anth. muticis inclusis, stilo exserto, cor. campanulatis, cal. imbricatis, flor. terminalibus globoso-capitatis, fol. quaternis linearibus cartilagineo-dentatis, apice callosis. Willd. p. 408, †

139. *comosa*, anth. muticis inclusis, cor. ovato-oblongis, stilo incluso, fol. quaternis, flor. congestis. L. Mant. 234. Thunb. Diss. n. 38. Icon. horti Kew. t. 18. Cor. ovato-cylindrica: limbo plano.

140. *denticulata*, anth. muticis inclusis, stilo incluso, cor. ovatis, cal. fol. membranaceis ciliato-dentatis, flor. terminalibus sessilibus, fol. quaternis linearibus trigonis glabris. Willd. p. 408. L. Mant. 229. *E. dentata*. Thunb. Diss. n. 39. Caul. distort. *E. vulgaris*. Cor. subinfundibuliformis.

141. *Muscari*, anth. muticis inclusis, stilo incluso, cor. ovatis subtetragonis, cal. foliolis lanceolatis integerrimis, flor. terminalibus sessilib. fol. quaternis linearitrigonis glabris. Willd. p. 409. Andr. Er. Icon. Cor. pallide flavae, subtetragonae.

142. *viscaria*, anth. muticis inclusis, stilo incluso, cor. campanulatis glutinosis, cal. foliaceis ciliatis, flor. subracemosis, foliis quaternis linearibus glabris. Willd. p. 409. Icon. horti Kewens. t. 1. Thunb. Diss. n. 40. Cor. campanulata valde mucosa purpurascens.

143. *pyramidalis*, anth. muticis inclusis, stilo exserto, cor. hispidis campanulato-infundibuliformibus, flor. umbellatis, fol.

quaternis linearibus triquetris pubescentibus. Willd. p. 410. Ait. Kew. 3. p. 491. Curt. mag. 366. c. Icon. Cor. campanulato-infundibuliformis pilis brevissimis tecta.

144. *mediterranea*, anth. muticis exsertis, stilo exserto, cor. cylindraceo-campanulatis, flor. axillaribus, pedunc. flore brevioribus, fol. quaternis linearibus glabris. Willd. Curt. bot. mag. n. 471. c. Icon. Thunb. Diss. n. 41. Baub. hist. 1. p. 356. Hab. in Eur. australi. Caul. ramis albicantibus angulatis.

145. *multiflora*, anth. muticis exsertis, stilo exserto, cor. campanulatis, flor. axillaribus, pedunc. longitudine floris, fol. quinis linearibus glabris. Willd. p. 411. Thunb. Diss. n. 42. *E. juniperifolia*. Garid. aiz. 160. t. 3. Hab. in Anglia, G. Narbonne, Oriente et Relement. Caul. 2-3-pedal. Cor. potius ovata. Balbis.

146. *herbacea*, anth. muticis exsertis, cor. oblongis, stilo exserto, fol. quaternis, flor. secundis. L. Syst. veg. 305. *β. carnea*. L. Jacq. austr. t. 32. Habit. in Europa australiori.

*Obs.* Flores autumno col. herbacei, oblongi sunt, vere amoene rubri: anth. fuscis prominulis.

147. *purpurascens*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, stilo exserto, fol. quaternis, flor. sparsis. L. Syst. veg. p. 306. *E. procumbens dilute purpurea*. Baub. pin. 486. Hab. in Europa australi.

*Obs.* Haec cum praecedente a Salisbury. l. c. conjuncta est sub nomine *E. saxatilis*.

148. *vagans*, anth. muticis exsertis, cor. campanulatis, stilo exserto, fol. quaternis, flor. axillaribus confertis. Smith. Engl. bot. t. 3. *E. multiflora*. Huels. Hab. in Africa, Tolosae et in ericetis Cornubiae.

149. *cubica*, anth. muticis inclusis, cor. campanulatis acutis, stilo incluso, fol. quaternis patentibus. Lin. Andrews Eric. 39. (ic. mala.) Thunb. Diss. n. 46. Flor. terminales corymbosi. Cal. scariosus. Cor. purpurea, basi pallida.

150. *racemosa*, muica, fol. quaternis lanceolatis villosis, flor. racemosis globosis, calycib. tomentosis. Thunb. l. c. n. 47. t. 5. f. 1. Rami verticillati et elongati, pubescentes. Flor. incarnati subnantes in ramulis racemosi. Thunb. Inflorescentia in axillis *simplex* non racemosa. Salisb. l. c. p. 343.

++++ *Obs.* Numerosae sequentes species seorsim hic enumerantur, cum auctor haud animadvertit, quibus divisionibus sint inserendae.

151. *spiculifolia*, pedunc. ebracteatis, cal. breviter 4-fido, cor. 1-lineari, laevi, tubo cyathiformi 4-angulo, filamentis muticis. Salisb. Trans. of the Linnean Society. Vol. VI. p. 316. Hab. in monte Olympo. Singularis ob defectum bractearum. S.

152. *asperifolia*, folior. laminis linearibus, cor. lineari viscidis, tubo sphaerico, filamentis saepius calcaratis, pericarpio (caps.) lanato. Salisb. l. c. E. *setacea*. Andrews. Hab. in Hottentots Holland.

153. *oxycoccifolia*, caule decumbente, filiformi, folior. laminis ovatis, cor. lineari campanulata hirsuta, filamentis muticis. Salisb. l. c. p. 325. Cum priore in humidis. Simillima *Vaccinio oxycocco*. L.

154. *sicaefolia*, folior. laminis mucronatis, cor. lineari extus hirsuta, tubo cyathiformi, calcaribus linearibus attenuatis, pericarpio glabro. Salisb. Hab. in Hottentots Holland.

155. *fausta*, folior. laminis setosis, cor. 2-3-lineari, extus pubescente, tubo urceolari, calcaribus aurito-attenuatis, valde serratis. Salisb. p. 326.

*Obs.* Similis Er. hirtae Thunb. sed differt fol. basi letioribus, antheris linearibus, quae in E. hirta versus apicem sensim augustatae. S.

156. *tomentosa*, folior. laminis angusto linearibus, cal. planiusculo, cor. lineari, utrinque tomentosa, calcaribus longis recurvis. Salisb. p. 327.

157. *auricularis*, folior. laminis linearibus lanceolatis, cor. 2-lineari, extus pubescente, tubo ovato, calcaribus minutis, auricularibus. Salisb.

158. *helianthemifolia*, fol. binis, laminis obovatis planiusculis, cor. lineari, utrinque pubescente, calcaribus longis. Salisb. p. 328.

159. *polytrichifolia*, caule tomentoso, bracteis remotis, cal. basi sensim angustato, cor. lineari, calcaribus cuneatis. Salisb. l. c. p. 329. Hab. prope Lisboa. Banks.

*Obs.* Similis Er. scopariae. Sed flores inodori, cor. oblonga: tubo poculiformi, stigma filulaeformis, nec peltatum, pericarpium pyriforme. S.

160. *tenuis*, caule divaricato, foliorum laminis linearibus, cor. lineari, campanulata, laevi filamentis brevissimis, calcaribus lineari-attenuatis. Salisb. p. 329. Hab. . . .

161. *glomiflora*, folior. laminis anguste cuneatis, cal. bracteis imbricatis, cor. 2-lineari viscidis, tubo sphaerico, calcaribus villosissimis. Salisb. l. c. p. 330.

162. *carduifolia*, folior. laminis setosis, pedunc. longis, cor. 2-lineari laevi, tubo globoso, filam. brevissimis. Salisb. l. c.

163. *tubercularis*, cor. lineari, tuberculis aspera, tubo globoso, filamentis muticis, pericarpio longe stipitato. Salisb. l. c. Hab. . . .

164. *campanularis*, caule glabro, folior. laminis angustis, cor. 2-lineari campanulata laevi, filamentis brevissimis muticis. Salisb. l. c. E. *tenuifolia*. Hortul. Flos Convall. majalis, luteus.

165. *blanda*, flor. glomeratis, cor. lineari, limbo tubo dimidio longiore, laciniis semiorbicularibus, stigmate lato. Salisb. p. 331.

166. *scripifolia*, foliolis minute ciliatis, cor. lineari, limbo basi integro obtuso, filam. muticis. Salisb. p. 331. E. cubica. Thunb. Diss. n. 46.

167. *lavandulaefolia*, caule incano, bracteis juxta calycem, cor. bilineari, tubo 4-angulo, limbo incurvo, filam. inferne latissimis. Salisb. Hab. in Hottentots Holland. h

168. *humifusa*, fol. binis, laminis ovalibus, cor. lineari, limbo amplo, stylo longe exserto. Salisb. p. 332.

169. *corydalis*, folior. laminis lanceolato-cuneatis, cor. bilineari, limbo basi integro, antheris dorso alatis. Salisb. p. 334. Hab. ad Cap h. spei. h

170. *azaleaefolia*, folior. laminis lanceolatis, cor. lineari, hirta, antheris exsertis, pene totis foraminosis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

171. *vesicularis*, fol. vesiculis nigris adspersis, cor. lineari, viscido-pubescente, calcaribus parallelis cuneatis, pericarpio sericeo. Salisb. l. c. p. 335. E. *conacca*. Hortulan.

172. *verniciiflua*, fol. viscidis, cor. bilineari, limbo recurvo, calcaribus curvis cuneatis hirtis, pericarpio laevi. Salisb.

173. *Lachneaeifolia*, foliorum laminis ovalibus pubescentibus, cor. bilineari, limbo recurvo, calcaribus longis, anguste cuneatis. Salisb. l. c. p. 335. *E. Lachnaca*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

174. *lyrigeria*, fol. lucidis, cor. lineari, limbo recurvo, calcaribus serratis, antheris lyraceformib., pericarpio tomentoso. Salisb. l. c. p. 336.

175. *salax*, fol. lividis, cal. adpressa, cor. lineari, filam. brevissimis, pericarpio laevi, stigmate lato. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

176. *cumuliflora*, fasciculis 7-12-floris, cal. incano, cor. bilineari, limbo inferne ciliato, pericarpio hirsuto, stigmate angusto. Salisb. l. c. p. 336. Hab. in Hottentots Holland.

177. *genistaeifolia*, fasciculis 3-floris, cal. viscido, cor. bilineari, limbo inferne ciliato, pericarpio laevi, stigmate lato. Salisb. l. c. p. 337. Hab. . . .

178. *periplocaeifolia*, folior. laminis lanceolatis cuneatis, pedunc. longis, cal. brevi orbiculari, cor. 1-2-lineari, stigmate angusto. Salisb. l. c. p. 337.

179. *lucida*, cal. minute ciliato lucido, cor. lineari, calcarib. auricularibus, incis-serratis, stigmate angusto incluso. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

180. *munda*, bracteis cal. -que integerrimis, cor. lineari, calcaribus auricularib. ciliatis, pericarpio hirsuto. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

181. *fabrilis*, fol. dense imbricatis, cor. lineari, cal. vix longiore, calcaribus integerrimis, antheris minutis, pene didymis. Salisb. l. c. p. 338. Hab. in Hottentots Holland. h

182. *dianthifolia*, fol. binis longis, cal. ovato-cuneato, cor. trilineari, calcaribus serratis, pericarpio glabro. Salisb. l. c. Hab. ad Cap. b. spei. h

183. *brevifolia*, folior. laminis ovatis, cor. lineari, cal. longiore, calcarib. lineari-attenuatis, seminibus striatis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

184. *chlamydiflora*, foliorum laminis linearibus hirsutis, cor. bilineari, cal. vix longiore, calcaribus auricularibus, seminibus oratis. Salisb. Hab. in Hottentots Holland. h

185. *selaginifolia*, caule tomentoso,

cor. lineari laevi, tubo globoso, calcaribus latissimis orbicularibus. Salisb. l. c.

186. *pannosa*, folior. laminis parum reduplicatis, cor. bilineari lanata, filam. latis breviter calcaratis, stylo exserto. Salisb. p. 339. Hab. in Hottentots Holland.

187. *ciliciflora*, fol. ternis minutis, cal. pilosissimo, bracteis distincto, cor. lineari hirsuta tetrandra, filam. muticis. Salisb. Anther. pene didymae, valde barbae. An *Blaeria*, uti 5 sequentes? P.

188. *xeranthemifolia*, fol. ternis, laminis valde incurvis, cal. lanato, imbricato, cor. lineari lanata tetrandra. Salisb. Hab. in Hottentots Holland.

189. *nodiflora*, fol. ternis, cal. infundibuliformi villosissimo, cor. lineari hirsuta tetrandra, anth. breviter foraminosis. Salisb. l. c. p. 340.

190. *rosculosa*, cal. fimbriato, cor. lineari, tubo angustissimo, superne repente dilatato tetrandra, filamentis angustissimis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

191. *exilis*, fol. quaternis, cal. infundibuliformi glabro, cor. lineari glabra, tetrandro, filamentis muticis. Salisb. l. c. E. *scabra*. Thunb. prodr. p. 72.

192. *labialis*, fol. ternis, laminis glabris, cal. bilabiato fimbriato, cor. lineari, 2-bilabiata, 4-5-andra, Salisb. Hab. in Hottentots Holland.

193. *barbigera*, cal. bracteis imbricato, profunde 4-fido barbato, cor. bilineari, glabra, 4-5-andra, filam. muticis, stylo angustissimo. Salisb. l. c. p. 341. Hab. in Hottentots Holland. h

194. *bruniaceifolia*, fol. longis, bracteis juxta calycem: exteriore longissima, cor. lineari hexandra, filam. calcaratis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

195. *turmalis*, pedunc. brevissimis, cal. minuto adpresso, cor. bilineari, 4-5-andra, filam. muticis, anth. latis. Salisb. l. c. p. 342. Facies autecedentis, sed penitus distincta, cal. triplo minore. S.

196. *equisetifolia*, fol. ternis, fasciculis 3-5-floris, pedunc. longis glabris, cor. lineari, 4-5-andra, filam. muticis. Salisb. E. *articularis*. Hortulan. Hab. . .

197. *diotaeiflora*, cal. late cuneato, cor. lineari, tubo amphoraeformi, anth. parum exsertis, pericarpio pubescente. Salisb. p. 352.

198. *manipuniflora*, caule incano, flor. in axillis interruptis, cor. lineari, tubo cyathiformi, anth. in sertum erectis. Salisb. p. 344. E. verticillata. Forst. fl. p. 210. Hab. juxta Bujuchtar.
199. *padibunda*, fol. 3-4-nis, cor. bilineari, viscida, tubo ovato, anth. latis, exsertis hirtis, pericarpio turbinato hirtio. Er. *nutans*. Wendl. Er. fasc. 3. p. 5. v. icon.
200. *filiformis*, bracteis juxta calycem, cor. lineari glabra, limbo recurvo, anth. longe foraminosis, stigmate angusto, fol. ternis. Salisb. l. c. p. 345. Hab. in Hottentots Holland. h
201. *turgida*, pedunc. brevissimis, cor. lineari, hirta, tubo modiali, calcarib. cuneatis: anth. brevissimis. Salisb. p. 345. Hab. . . .
202. *vestiflua*, folior. laminis incurvo patentib. juniorib. pilosis, flor. solitariis, cor. 7-9-lineari, tubo cylindraco. Salisb. p. 346. Hab. . .
203. *socciflora*, folior. laminis recurvo-patentibus, cor. 4-6-lineari, tubo ovato-pyramidalis, pericarpio ovato. Salisb. Er. *sebana*. β. viridis. Andr. Er. n°. 59. c. Icon. E. *Petiverii* Hortulan.
204. *follicularis*, folior. luminis patentibus, floribus solitariis, cor. 5-7-lineari, basi inflata, nectario plinthiformi. Salisb. l. c. Er. *Petiveriana*. Andr. Er. n°. 25. c. Icon. Var. β. Er. *melastoma*. Andr. Er. n°. 43.
205. *penicilliflora*, cor. bilineari, cal. obducta, tubo sphaerico, anth. in penicillum auctum convergentibus. Salisb. E. *Petiverii* vera. Hortulan.
206. *placentae-flora*, fol. obtusissimis, cor. calyce obducta, tubo rapaeformi, flamm. sensim dilatatis, stigmate angusto. Salisb. l. c.
207. *squamaeflora*, bracteis supra medium pedunculi sparsulis, cor. lineari, cal. brevior, anth. acuminulatis, pericarpio late ovato. Salisb. p. 349. Hab. prope Bay Falso. h
208. *caesia*, cal. bracteis imbricato, cor. lineari, cal. brevior, anth. obtusis, septo lato, pericarpio ovato. Salisb.
209. *flexuosa*, bracteis supra medium pedunculi sparsulis, cor. lineari, cal. longior, anth. obtusis septo angusto, nectario grandi. Salisb. l. c. p. 349. E. *flexuosa*. Andr. Er. n°. 33. c. Icon.
210. *lasciva*, cal. bracteis imbricato, cor. lineari, cal. parum brevior, anth. a basi foraminosis, stigmate peltato. Salisb. l. c. p. 349. E. *imbricata*. Thunb. Diss. n°. 11. auctoritate ejus speciminis. Facile dignoscas antheris longe foraminosis. S.
211. *stylosa*, pedunc. longis, bracteis juxta calycem sparsulis, cor. lineari calyce parum longior, anth. acuminulatis, pericarpio ovali. Salisb. l. c. Stylus longissimus. Hab. . .
212. *diosmaefolia*, fol. lividis, cor. bilineari, lacinis imbricatis, flamm. angustissimis, calcaribus exquise attenuatis serrulatis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.
213. *palliflora*, caule angulato, folior. laminis lanceolato cuneatis, cor. lineari calyce parum longior, calcarib. auricularibus glabris. Salisb. l. c. p. 351. Hab. in Hottentots Holland.
214. *tegulaefolia*, folior. laminis ovalib. pubescentibus, cor. lineari, tubo parum 4-angulo turbinato, calcaribus grandibus orbicularibus. Salisb. l. c. p. 351. Hab. in Hottentots Holland.
215. *modesta*, fol. parvis dense imbricatis, cor. 3-lineari tomentosa, tubo late ovato, limbo recurvo, calcaribus lineari-attenuatis. Salisb. l. c. p. 352.
216. *holosericea*, folior. laminis argute replicatis, cor. 3-lineari, holosericea, tubo ovato, anth. hirtis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h
- Obs.* Species pulcherrima, ab omnibus hucusque cognitis cor. sua holosericea facile dignoscenda. S.
217. *glauca*, fol. ternis glaucis succulentis, cor. 3-lineari extus torrida, calcaribus suborbicularibus. Salisb. p. 353. Andrews Er. 47. cum Icon.
218. *versicolor*, cal. incurvo erecto, cor. 8-lineari, tubo plus minus 6-costato, flamm. muticis, basi dilatatis. Salisb. l. c. Andrews Fric. n°. 12. c. Icon. Var. fol. viridibus et glaucis, cor. parum vel saturate coccinea. E. *costata*. Andrews Eric. n°. 46. c. icon.
219. *decora*, cal. plano, marginibus crassis, cor. 8-10-lineari, viscido-pubescenti, tubo clavato, calcaribus longis pubescentibus. Salisb. Erica Eweri. Hortulan. Hab. . . .
220. *nana*, caule humifuso, fol. obtusis, cor. 9-11-lineari, extus rorulenta, tube

clavato compresso, calcarib. longis. Salisb. *Er. depressa*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

21. *sacciflora*, cal. late ovato acuminalato, cor. 6-8-lineari glabra: tubo cylindraceo, calcaribus longis, anth. linearibus valde papulosis. Salisb. Habit. in Hottentots Holland. h

22. *cylindriflora*, fol. ciliatis, setis decompositis, cal. recurvulo, cor. 9-lineari glabra, tubo cylindraceo, calcarib. brevibus. *E. serratifolia*. Andrews Er. n. 36. c. Icon. Salisb. l. c. p. 356.

23. *cyrtillaeiflora*, caul. tenui, cor. 2-3-lineari pubescente, tubo anguste campanulato, limbo brevi, filamentis muticis. Salisb. l. c. p. 357. Habit. in Hottentots Holland. h

24. *velitaris*, cor. 2-3-lineari pubescente, tubo obovato, limbo recurvo patente, calcarib. longis argute cuneatis parum serratis. Salisb. Hab. . . .

25. *cuspidigera*, pedunc. glabris, cal. ovato-cuspidato, cor. 11-12-lineari, pubescente, limbi interstitiis basi lanceolatis, anth. hirtis. Salisb. p. 358.

26. *bibax*, (*flammea*), cal. foliolis imbricatis inaequalibus, cor. 8-lineari pubescente, tubo valde clavato, laciniis basi imbricatis. Salisb. *E. curviflora*. Thunb. Diss. 30. *E. flammea*. Hortulan. Hab. ad Cap. b. spec. h

27. *buccinaeformis*, pedunc. pubescentibus, cor. 9-10-lineari pubescente, limbo recurvo patente, filamentis pubescentibus. Salisb. p. 359. *E. tubiflora*. Thunb. Diss. n. 31. Hab. . . .

28. *stagnalis*, folior. laminis hirsutis, pedunc. glabris, cor. 10-11-lineari hirsuta, anth. rectis papulosis. Salisb. Hab. . .

29. *longiflora*, pedunc. glabris, cal. recurvo patente basi extus convexa, cor. 18-20-lineari pubescente, limbo obtuso. Salisb. l. c. p. 359. *E. elata*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

30. *sordida*, ramis sparsis lanatis, flor. aepius solitariis, cal. adpresso basi extus convexo, cor. 12-lineari, rare lanata. Andrews Erica. n. 56. c. Icon. *Er. laniflora*. Wendl. Er. 2. p. 23. c. Icon. Salisb. l. c. p. 360.

31. *exurgens*, folior. laminis recurvis acutis, cor. 13-15-lineari viscida, tubo infundibuliformi, laciniis ovato-cuneatis.

Andrews Er. n. 13. c. Icon. *Er. phariaeformis*. Salisb. l. c. p. 361. Dignoscenda ab omnibus aliis, cor. laciniis versus apicem attenuatis bifidulisque. S.

32. *cerviciflora*, cor. 5-6-lineari pubescentula, tubo angusto urceolari, limbo patente, filam. minute calcaratis. Salisb. l. c. p. 362. *E. inaperta*. Hortulan.

33. *calamiformis*, cal. adpresso, cor. 9-10-lineari glabra, tubo cylindraceo-urceolari, limbo recurvo, pericarpio laevi. Salisb. l. c. p. 362. *E. radiata*. Andrews Er. n. 53. c. Icon.

34. *pulviniformis*, folior. laminis attenuatis serrulato ciliatis, flor. in rudimentis ramulorum longiusculis, cor. 7-9-lineari viscida, tubo cylindraceo urceolari. Salisb. l. c. p. 364. Hab. in Hottentots Holland.

35. *sceptiformis*, caul. stricto, pedunc. brevissimis, cal. calloso, foliolis late spatulatis inciso serratis, cor. 7-10-lineari rorulenta. Salisb. p. 365.

36. *clavaeiflora*, pedunc. brevissimis, cal. foliolis orbiculato-spatulatis, integerrimis, cor. 10-12-lineari rorulenta. Salisb. p. 365.

37. *alveiflora*, pedunc. glabris, cor. 7-9-lineari rorulenta, tubo cylindraceo urceolari, inferne 5-angulo. Salisb. l. c. p. 366. *E. gelida*. Hortulan. Hab. in Hottentots Holland. h

38. *brachialis*, cor. 6-8-lineari utrinque hirsuta, tubo curvo pyramidalis, anth. inclusis longissimis. Salisb. l. c. p. 367. Hab. in Hottentots Holland. h

39. *doliiformis*, fol. hirsutis, bracteis juxta calycem, cor. 4-5-lineari viscida, tubo urceolari, calcarib. brevibus cuneatis. Salisb. l. c. p. 368. *Er. mammosa*. Thunb. Diss. n. 60. c. fig.

40. *pyxidiflora*, cal. quadrifido, cor. bilineari laevi, tubo-obovato limbo incurvo-patente, pericarpio hemisphaerico glabro. Salisb. l. c. p. 371. *E. empetroides* Hortulanis. Flores odorem cereae spirant.

41. *notaeiflora*, cal. tetraphyllo, cor. 2-lineari laevi, tubo calathiformi, limbo recurvo patente, stigmato inclusio. Salisb. p. 371. Hab. in Hottentots Holland. h

42. *sesta*, caule valde angulato, fol. 4-nis, cor. bilineari viscida, tubo angusto urceolari, filamentis muticis. Salisb. l. c. p. 371. Hab. in Hottentots Holland. h

243. *fallax*,



243. *fallax*, cor. bilineari viscida, tubo urceolari parum costato, filamentis longitudine tubi calcaratis, pericarpio viscido. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

244. *parilis*, 3-lineari viscida, tubo urceolari parum costato, flamm. vix longitudine tubi minute calcaratis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland.

245. *pubigera*, cal. patente ovato acuminato, cor. lineari pubescente, limbo longiusculo recurvo, pericarpio hirtio. Salisb. p. 372.

246. *pusilla*, cal. adpresso late ovato-cuneato, cor. lineari pubescente, tubo calathiformi, limbo longitudine tubi, pericarpio glabro. Salisb. l. c. p. 374. Hab. ad Cap. h. spei. h

247. *tragulifera*, cal. imbricato, cor. bilineari tubo urceolari, limbo recurvo, calcaribus hirsutis, anth. latissimis foraminosis hirsutis. Salisb. l. c. Hab. in Hottentots Holland. h

248. *curvirostris*, folior. lamenis linearibus, cal. adpresso, cor. lineari, tubo sphaerico, calcaribus pubescentibus, stylo, sursum curvo. Salisb. p. 375. E. *declinata*. Hortulan. Flores gravem, fere nauseosum odorem spirant.

249. *gracilis*, cal. minuto, cor. lineari, tubo ovali, limbo recurvo, calcarib. lineari attenuatis hirtis. Salisb. l. c. p. 375. E. *imbecilla*. Hortul. Hab. . . .

250. *intervallaris*, caule tenui, fol. verticillis remotis, 1-2-lineari tubo ovato cylindraceo oreolato, pericarpio hirtio. Salisb. l. c. p. 375. Hab. . . .

251. *quadriflora*, caule glabro, cor. lineari, tubo poculiformi, limbo erecto, calcarib. lanceolato-cuneatis integerrimis. Salisb. l. c. p. 375. Habit. in Hottentots Holland. h

252. *turrigera*, fol. angustis, cal. recurvo horizontali, cor. bilineari, tubo haemiphaetico, laciniis basi imbricatis. Salisb. l. c. p. 377. E. *cupressina*. Hortulan.

253. *turbiniiflora*, caule glabro, cor. lineari laevi, tubo turbinato 8-angulo, limbo incurvo, calcaribus auricularibus, glabris. Salisb. l. c. p. 377.

254. *bleana*, folior. lamenis ovato-cuneatis, cor. 4-5-lineari viscida, tubo urceolari, laciniis basi imbricatis, flamm. latissimis. Salisb. l. c. p. 379. Habit. in Hottentots Holland. h

255. *verecunda*, fol. 4-nis, spicis coar-

tatis, cor. bilineari laevi, tubo ampboraeformi, limbo crenulato. Salisb. l. c. E. *cernua*. Andrews Erica. n.º. 48. c. Icon.

256. *pulchella*, cor. bilineari glabra, tubo urceolari, parum 4-gono, calcarib. cuneatis hirsutis, anth. hirsutis. Salisb. Hab. in Hottentots Holland. h

257. *embothriifolia*, folior. lamenis lineari lanceolatis, spicis coarctatis, cor. 4-lineari, tubo superne admodum ventricosus, anth. exsertis. Salisb. l. c. p. 379.

258. *curvisolia*, fol. ternis, lamenis recurvis, spicis coarctatis, cor. 4-lineari viscida, tubo ovato pyramidalis, calcaribus lineari attenuatis. Salisb. l. c. p. 380. Hab. in Hottentots Holland. h

259. *squarrosa*, cor. 5-6-lineari viscida, tubo ovato pyramidalis limbo obtuso, calcaribus marginalibus, anth. laevibus. Salisb. l. c. p. 380.

260. *capax*, folior. lamenis ovato cuneatis, cor. 5-11-lineari viscida, tubo late ampullaeformi, limbo retuso. Salisb. l. c. p. 381. Hab. in Hottentots Holland.

261. *legnaeformis*, fol. ternis, cor. 12-14-lineari viscida, tubo ovato apice ventricosus, limbo tubo 4-plo breviori ovato. Salisb. p. 382. E. fol. 3-nis erecto-patulis, cor. legnaeformi viscida limbi laciniis ovatis, tubo 4-plo breviorib. Vent. Malmaisi. t. 33. E. *jasminiflora*. Andrews Erica. n.º. 49. Icon.

262. *pavettaeflora*, pedunc. brevissimis, cor. 5-10-lineari, limbo intus furinoso, filamentis juxta apicem antherae calcaratis. Salisb. Hab. ad Cap. h. spei. h

263. *fistulaeflora*, cal. minute ciliato, cor. 5-6-lineari, tubo angusto-cylindraceo urceolari, limbo brevissimo, flamm. muticis. Salisb. p. 383. E. *cylindrica*. Thunb. Diss. n.º. 39.

264. *niliflora*, caule pubescente, cal. obcuneato serrato, cor. 3-lineari, limbo tubo timidio breviori, calcaribus minutissimis auricularibus. Salisb.

265. *Walkeria*, caule glabro, cal. anguste lanceolato serrato, cor. 4-5-lineari, limbo duplo breviori, anth. breviter foraminosis. Andrews Erica. n.º. 45. c. Icon. E. *pulchra*. Salisb. l. c. p. 384.

266. *daphneflora*, caule ovato cuspidato vix serrato, cor. 3-lineari, limbo tubo duplo breviori recurvo deflexo, filamentis muticis. Salisb. p. 384. Hab. in Hottentots Holland. h

267. *pellucida*, caule gracili, cal. spatulato serrato, cor. 5-6-lineari, limbo tubo triplo brevior, filam. muticis. Salisb. Hab. in Hottentotis Holland. h

268. *bordoniaeflora*, fol. binis, cal. 3-lineari, late ovali acuminulata, cor. 3-lineari, tubo ovato, pericarpio obovato. Salisb. p. 386.

269. *hyssopifolia*, folior. laminis pube densa ciliatis, cor. bilineari, versus apicem hirta, laciniis crispis retusis. Salisb. p. 387. Hab. ad Cap. b. speci. prope Bay Falso. h

964. *OPHIRA*. *Involucr.* 2-valve, 3-florum. *Cor.* 4-petala, supera. *Bacca* 1-locularis.

1. *stricta*. Lam. ill. gen. t. 293. Hab. in Africa. Fol. opposita, ovato-linearia. Flor. laterales. h

965. *GRUBBIA*. *Involucr.* 2-valve, triflorum. *Cor.* 4-petala, infera. *Stigma* simplex.

1. *rosmarinifolia*. Berg. cap. 90. t. 2. f. 3. Hab. ad Cap. bon. Speci. Flor. axillares, conglomerati, hirsuti. B. h

966. *LAGETTA*. *Cor.* supera, caudica, tubulosa, quadridentata, glandulis 4, petaliformibus. *Cor.* fusertis. *Drupa* pilosa, pisiformis, 1-sperma, infera. *Lam.*, tecta.

1. *linteraria*. Lam. enc. 3. p. 376. Ej. ill. t. 289. *Daphne* Lagetto. Swartz. Flor. ind. occid. 2. p. 680. Willd. p. 419. Hab. in montib. Jamsic. et ad St. Domingo. *Cor.* interior est compositus e reticulo linteraeformi, unde nomen *bois-dentelle* apud incolas. Flor. spicati. h

*Obs.* Non solum genere a *Daphne* differt sed et familia, quae *Elaeagni* est. L.

*THYMELAE* (Gen. 967-972.) instructae sunt cor. (sed potius cal. colorato) 1-petala, infera, tubo in plurimis longo tenui, piloso, ore nunc nuda, nunc squamulis petaloideis aut glandulis obsita. Stam. 2-4-8-10, ut plurimum duplici serie inserta. Pistillum simplex. Fructus est drupa, vel semen 1, nudum, arillatum aut cor. part. interiore tectum. Caul. plerumque lignosus, frutescens. Fol.

simplicia, integerrima plerisque, et communiter alterna.

967. *DAPHNE*. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida, corollacea, marcescens, *Stamina* includens. *Drupa* 1-sperma.

\* *Floribus lateralibus.*

1. *Mezereum*, flor. sessilib. ternis caulinis fol. lanceolatis deciduis. L. Flor. dan. t. 268. Hab. in sylvis. Var. flor. albis. h

2. *Thymelaea*, flor. sessilibus axillari-bus, fol. lanceolatis, ramis simplicissimis. Vahl. symb. t. p. 28. D. fol. lanceolatis glaucis utrinque glabris. Lam. encycl. 3. p. 434. *Thymelaea alpina* glabra, floeculis subluteis ad folior. ortum sessilibus. Pluk. alm. 366. t. 229. f. 2. Hab. in Hispania et Mompelii. h

3. *pubescens*, flor. sessilibus laterali-bus aggregatis, fol. lanceolato-linearibus, caule pubescente. L. Mant. 66. Hab. in Austria. Flor. angusti, tubo filiformi. Diversa videtur a D. *Thymelaea*. L. h

4. *vermiculata*, flor. sessilibus laterali-bus solitariis glabris, fol. lineari-lanceolatis villosis. Vahl. symb. 1 p. 28. Barr. ic. 231. Hab. in Arragonia.

5. *villosa*, florib. sessilibus lateralibus solitariis, fol. lanceolatis planis ciliatis pilosis confertis. L. Sp. pl. 570. Tournef. inst. 504. Hab. in Lusitania et Hisp. Fol. polygoni, utrinque pilis albis remotis oblecta. Flor. angusti, parvi. h

6. *Tartouira*, flor. sessilibus laterali-bus aggregatis, basi squamis imbricatis, foliis obovatis nervosis sericeis. Vahl. symb. 3. p. 53. Lam. ill. gen. t. 290. f. 2. *Tartou-Raire* galloprovinciae mompelien-sium. Lob. ic. 371. Barr. ic. 221. Habitat in Galloprovincia. Flor. passim solitarii dioici. h

7. *tomentosa*, flor. sessilibus axillari-bus, col. oblongis obtusis utrinque sericeo-tomentosis. Lam. enc. 3. p. 436. An Till. Pis. 165. t. 49. f. 2? Hab. in Oriente. Antecedenti affinis, sed major.

8. *nitida*, flor. lateralibus aggregatis sessilibus basi nudis, fol. lineari-oblongis sericeis enerviis. Vahl. symb. 3. p. 53. S. argentea. Lam. enc. 3. p. 436? Hab. in mont. calcareis Tuneti. h

9. *alpina*, florib. sessilibus aggregatis

sublateralibus, fol. lanceolatis obtusiusculis, subtus tomentosis. L. p. Pluck. alm. 366. t. 29. f. 3. Hab. in alpinis. h

10. *coridifolia*, flor. axillaribus sessilibus solitariis conferto-spicatis, fol. lineari-subulatis nudis. Lam. l. c. Ej. ill. gen. t. 260. f. 3. Hab. in Hispan., Gallicia. Herb. Juss. Parva, facie Ericae.

11. *thesioides*, flor. axillarib. sessilibus subgeminis, fol. linearibus glabris, ramulis simplicibus. Lam. l. c. p. 437. et Ej. ill. f. 4. Cresc. cum priore?

12. *Laureola*, racemis axillaribus quinquefloris, fol. lanceolatis glabris. Lam. Jacq. Flor. austr. t. 183. *Laureola*. Dod. Blackw. t. 62. Hab. in sylv. Europ. australioris. Sempervirens. Flor. virescentes.

13. *pontica*, pedunc. lateralibus bifloris, fol. lanceolato-ovatis. L. Andrew. Repos. t. 73. Tournef. itin. 3. p. 180. t. 180. Hab. in Ponto in oriente. Flor. penduli, acuti, flavi. h

14. *pendula*, capitul. lateralibus pedunculatis involucrentibus nutantibus, fol. lanceolato-ellipticis alternis glabris. Smith. ic. ined. t. p. 34. t. 34. Willd. Sp. p. 419. *Scopolia composita*. Lin. suppl. 409. Hab. in Java. Arb. Stipulae nullae. Pedunc. in axillis foliorum post eorum casum solitarii nutantes filiformes. S.

\* *Floribus terminalibus.*

15. *tinifolia*, racem. compositis erectis, flor. terminalibus confertis, fol. oblongis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 683. Habit. in montib. Jamaicae.

16. *Gnidium*, racem. terminalibus paniculatis, fol. lineari-lanceolatis acuminate-cuspidatis. Willd. p. 420. Hab. in Hisp., Italia, G. Narbonensi, et in Barbaria, in locis aridis. Flor. parvi, odorantes, albicantes.

17. *rotundifolia*, hirsuta, flor. terminalibus congestis sessilibus, fol. oppositis ellipticis subpetiolatis obtusis glabris. Lin. suppl. 223. Hab. in ins. Namoka. Rami tomentosi. h

18. *foetida*, glabra, flor. terminalibus congestis sessilibus, fol. oppositis petiolatis ovato-oblongis acutis. Lin. suppl. 223. Hab. in insula Tahiti. An distincta a priore?

19. *indica*, capitulo terminali pedunculato, fol. oppositis oblongo-ovatis glabris. L. Hab. in China. Odor gratissimus, t

20. *odora*, capitulo terminali subsessili multifloro, fol. sparsis oblongo-lanceolatis glabris. Ait. Kew. 2. p. 26. Banks ic. Kaempf. t. 16. Hab. in China, Japonia. Flor. albi, odorati. An eadem ac *indica*?

21. *occidentalis*, pedunc. axillaribus, flor. terminalibus umbellulatis dioicis, fol. alternis lanceolatis glabris. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 685. Hab. in mont. Jamaicae australis. h

22. *Cneorum*, flor. fasciculatis terminalibus sessilibus, fol. lanceolatis nudis mucronatis. L. Pollich. Flor. pal. t. 1. f. 4. Jacq. Fl. austr. t. 426. Duham. arb. 2. t. 94. Hab. in montosis et subalpinis. Caul. humifusi. Flor. suaveolentes, rubri. Vere et aestate denuo floret. h

23. *altaica*, flor. terminalibus subsessilibus, fol. oppositis oblongo-lanceolatis obtusis basi angustatis glabris. Willd. Pall. ross. 1. p. 53. t. 35. Hab. in Sibiria, in alpinis Altaicis. Flor. albi, in capitulum congesti. h

24. *squarrosa*, flor. terminalibus pedunculatis, fol. sparsis linearibus patentibus mucronatis. L. Burm. afr. 134. t. 49. f. 1. Hab. in Aethiopia, et in Cap. b. spec. h

25. *glomerata*, flor. subsessilibus glomeratis terminalibus, fol. ovato-lanceolatis glabris involucrentibus, caule simplicis. Lam. enc. 3. p. 435. Hab. in Oriente. Flor. albi. h

26. *oleoides*, flor. geminis terminalibus sessilibus, fol. elliptico-lanceolatis glabris. L. Schreb. dec. 13. t. 7. D. salicifolia. Lam. enc. 3. l. c. Alp. exot. 44. t. 43. Hab. in Creta. Flor. parvi, albi, 2-3.

27. *collina*, flor. fasciculatis terminalibus, fol. obovatis obtusis supra glaberrimis subtus villosis. Smith. spicil. t. 18. Duham. ed. nov. t. 1. t. 11. D. *sericea*, flor. aggregatis terminalibus sessilibus, fol. lanceolatis subtus villosis, lacinis corollae obtusis. Vahl. symb. 1. p. 28. D. *oleaeifolia*. Lam. l. c. p. 440. Habit. in collibus Italiae australis. et in Creta. h

968. DIRCA. Cal. o. Cor. tubulosa limbo obsolete. Stam. tubo longiora. Bacca 1-sperma.

1. *palustris*. L. Lam. ill. t. 293. Duham. arb. 1. t. 212. Hab. in Virginiae paludosis. h

969. *GNIDIA*. *Cor.* infundibuliformis, 4-fida: squamis 4-petaloides ad faucem. *Nux* subdrupacea. (Semen subbaccatum.)

1. *pinifolia*, fol. sparsis trigonis, flor. umbellato-capitatis. Thunb. prod. p. 76. Willd. p. 424. Ramis verticillatis. Andrew. t. 52. Wendl. obs. bot. p. 15. t. 2. f. 17. Lam. ill. t. 291. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei, cum speciebus sequentibus, quae sunt Fl. involucratæ, albi Anth. quatuor supra faucem pilis cinctæ. h

2. *juniperifolia*, fol. linearibus-subulatis planis laevibus, ramulis glaberrimis, flor. solitariis binisve glabris terminalibus. Lam. enc. 2. p. 765. *G. pinifolia*. Lin. f. suppl. p. 225.

3. *radiata*, fol. subulatis triquetris acutis, capitulis terminalibus sessilibus radiatis, bracteis lanceolatis. L. Wendl. l. c. t. 2. f. 12. Scaber, prolifer. Petala pilosa. h

4. *carinata*, fol. lanceolatis obtusis carinatis glabris, floribus capitatis. Thunb. prod. 76.

5. *scabra*, fol. lanceolatis acutis scabris, flor. capitatis. Thunb. prod. 76.

6. *simplex*, foliis omnibus linearibus acutis, flor. terminalibus sessilibus. Lin. Andrew. t. 70. Breyn. cent. 10. t. 6. Flor. ex apice rami villosa, lutei.

7. *capitata*, fol. sparsis lanceolatis glabris, flor. capitatis, bracteis obvallatis, pedunc. nudo. Lin. suppl. p. 224. Thunb. prod. 76. Flos Passerinae similis. +

8. *laevigata*, fol. oppositis ovatis glabris, quadrifariam imbricatis, flor. terminalibus subcapitatis. Thunb. prod. 67. Wendl. obs. p. 17. t. 2. f. 14. Andrew. t. 89. Lam. ill. t. 291. f. 2. Flor. flavi.

9. *biflora*, fol. sparsis lanceolatis glabris, flor. lateralibus binis, ramis divaricatis. Thunb. prod. p. 76.

10. *racemosa*, fol. obovato-lanceolatis laxis glabris, flor. racemosis axillaribus. Thunb. prod. p. 76.

11. *tomentosa*, foliis sparsis ovato-oblongis glabris, margine scabris. Lam. G. pubescens. Berg. cap. 124.

12. *argentea*, fol. sparsis obovatis tomento-o-argenteis, flor. capitatis Thunb. prod. p. 76.

13. *imbricata*, fol. oblongis quadrifariam imbricatis sericeis, flor. terminalibus in axillis foliorum. Lin. suppl. 225.

14. *sericea*, fol. oppositis ovatis tomentosis, flor. terminalibus. Thunb. prod. p. 76. Wendl. obs. p. 16. t. 2. f. 13. Lam. ill. t. 291. f. 3. Passerina sericea. L. Faux floris coronata filis 8 coloratis. L.

15. *oppositifolia*, fol. oppositis lanceolatis ovatisque tomentosis, flor. terminalibus. Thunb. prod. p. 76. Andrew. t. 225. p. Passerina laevigata, fol. ovatis glabris acutis, flor. obtusis. L. Spec. pl. 2. p. 513. Nectandra laevigata. Berg. cap. 134. Squamulae 8. Burm. afr. p. 137. t. 49. f. 3.

16. *daphnaefolia*, decandra, fol. oblongis planis integerrimis, capitulo terminali pedunculato involucrato, floribus quinquefidis. Lin. suppl. 225. Hab. in Madagascar. Var. fol. hirsutis et nudiusculis, et flor. magnitudine. Involucr. ut in Daide, sed pentaphyllum. h

970. *STELLERA*. *Cal.* 6. *Cor.* 4-fida, medio ventricosa. *Stam.* fauci inserta, brevissima. *Nux* 1, rostrata.

1. *Passerina*, fol. linearibus, flor. axillaribus quadrifidis. Willd. Sp. II. p. 429. Hab. in agris, inter segetes. Facie Thesii.

2. *altaica*, fol. lanceolatis acutis, fl.-r. capitato-racemosis quadrifidis. Hab. in montib. altaicis. Thiebaut.

3. *Chamaejasme*, fol. lanceolatis, flor. terminalibus racemosis nudis quinquefidis. Willd. Amm. ruth. 16. t. 2. Hab. in Sibiria.

971. *PASSERINA*. *Cal.* 6. *Cor.* 4-fida, nuda. *Stylus* filiformis, lateralis, longus. *Stam.* tubo imposita. *Nux* 1, corticata.

1. *filiformis*, fol. linearibus convexis quadrifariam imbricatis, ramis tomentosis. L. Wendl. obs. p. 18. t. 2. f. 15. Willd. Sp. II. p. 430. Breyn. cent. 10. t. 6. Hab. in Aethiopia, ad Cap. b. spei. h

2. *hirsuta*, fol. carnosus extus glabris, caulibus tomentosis. L. Wendl. l. c. t. 2. f. 16. P. Metnau. Forsk. Hab. in Galloprovincia, Italia, Oriente et Barbaria. h

3. *salsolaefolia*, fol. subulatis hirsutis, tubo elongato superne incrassato tomentoso. Poirret Enc. 5. p. 41. Hab. . . Herb. Lam.

4. *ericoides*, fol. linearib. laevibus subimbricatis, cor. globosis. L. Hab. ad Cap. b. spei. Facies tota *Ericae*. L. h

5. *nervosa*, fol. lanceolatis glabris tricostatis, flor. capitatis. Thunb. prod. 75. Hab. ad Cap. b. spei. h

6. *cephalophora*, fol. trigonis quadrifariis, capit. lanatis. Thunb. prod. 75. Hab. ad Cap. b. spei. h

7. *capitata*, fol. linearibus glabris, capit. pedunc. tomentosis. L. Wendl. p. 18. t. 2. f. 17. Lam. ill. gen. t. 291. f. 3. Burm. afr. t. 48. f. 3. Habit. ad Cap. b. spei. Stam. supra faucem 15, quorum 8 interiora castrata. h

8. *globosa*, fol. suborbiculatis cymbiformibus interiorib. glabris, superiorib. hirsutissimis, flor. glomeratis. Poir. l. c. p. 42. Lam. ill. gen. t. 291. f. 4. Burm. afr. t. 46. f. 3? Hab. ad Cap. b. spei. h

9. *orientalis*, fol. lanceolatis subcar-nosis obtusis glabrisculis, flor. axillarib. Willd. p. 431. Hab. in Oriente et in Hispania. h

10. *ciliata*, fol. oblongo-lanceolatis ciliatis, flor. axillaribus, caule villosa. Willd. Burm. afr. t. 47. f. 2. Sel. mus. 2. 1. 12. f. 9. Hab. ad Cap. b. spei. Flores purpuri. h

11. *doica*, flor. axillaribus geminis, fol. lineari-lanceolatis glabris. Lin. suppl. p. 223. Gouan. illustr. p. 17. t. 17. f. 1. Lam. enc. 3. p. 439. sub *Daphne*. Hab. in Pyrenceis. Flor. axillares, bini, albo-flavescentes. h

12. *calycina*, flor. axillarib. solitariis calyculatis, fol. lineari-lanceolatis glabris, cal. lib. prostratis. Lapeyrouse. Mem. p. 2. t. 15. Lam. l. c. Ej. ill. t. 290. f. 3. Willd. p. 416. Sub *Daphne*. Cum priore.

13. *nivalis*, ramis prostratis, fol. lineari-bus obtusiusculis carnosius subciliatis, flor. axillarib. dicicis. Ramond in Bullet. d. scienc. n°. 41. p. 131. f. 4. Hab. in summis Pyrenceis, circa Mont-Perdu. Rad. crassa, ramosa. Flor. flavescentes. An a priore satis diversa?

14. *tinctoria*, fol. linearib. obtusius tomentosis, flor. axillarib. sessilibus. Pourret Chlor. narbon. p. 27. Hab. in G. Narbonn. a Baccellone ad Mont-Ferrat. Flor. flavi. Tincturae inscribit.

15. *nitida*, fol. confertis enerviis linearibus obtusiusculis sciticeis, flor. axillarib.

glomeratis sessilibus. Desf. Atl. r. p. 331. t. 94. *Daphne nitida*. Vahl. symb. 3. p. 53. Habit. in montosis incolitis in Barbaria. Magnitudine variat. Flor. pallidi.

16. *virgata*, ramis virgatis villosa-tomentosis, fol. lanceolatis villosis obtusis, flor. axillarib. aggregatis sessilibus. Desf. l. c. t. 95. Hab. in oris Barbariae prope Flem-sen. Flor. albi.

17? *striata*, fol. ovatis acutis argute striatis, flor. subaggregatis: limbo patulo. Poir. enc. bot. 5. p. 44. Lam. ill. f. 291. f. 2. Hab. . . Fruct. ignotus.

18. *uniflora*, fol. linearibus oppositis, flor. terminalibus solitariis, ramis glabris. L. Wendl. obs. p. 19. t. 2. f. 19. Lam. ill. t. 291. f. 1. Hab. in Aethiopia. h

Obs. Antherarum rudimenta 8 latent in fundo floris. Lin., quae secundum Wendl. squamae glandulaceae sunt, ut in quibusdam *Gnidii*, quare haec species, uti putat, potius ad hoc genus transferri posset.

19. *grandiflora*, glaberrima, fol. oblongis acutis concavis extus rugosis, flor. terminalibus sessilib. solitariis. Lin. suppl. p. 226. Hab. in Africa. Rami uniflori.

20. *canescens*, fol. oblongis quadrifariam imbricatis lanato-tomentosis, flor. terminalib. lanatis. Willd. p. 432. Hab. in Marocco. h

21. *spicata*, fol. ovatis villosis, flor. lateralibus solitariis. Lin. suppl. p. 226. Wendl. t. 2. f. 19. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequentibus; refert spicam foliosam.

22. *laxa*, fol. ovatis sparsis, flor. capitatis, ramis laxis cernuis. Lin. suppl. p. 226. Wendl. t. 2. f. 20. Similis *P. ericoidi*.

23. *stricta*, fol. ovatis hirsutis, flor. capitatis, ramis rigidis. Thunb. prod. 75.

24. *Anthylloides*, fol. ovatis villosis, flor. capitatis hirsutis. Lin. suppl. p. 226. Flor. extus albi, intus lutei.

25. *pentandra*, fol. ovatis hirsutis, spicis ovatis terminalib. Thunb. prod. p. 76.

Obs. Hoc genus *Daphnis* valde est affine, fructu tamen differt. Ab eo vero *Pimeleae* nisi staminum numero diversae videntur.

972. LACHNÆA. Flor. capitato-conglomerati. Cal. c. Cor. 4-fida: limbo inaequali. Filam.

E e 3

longa, situ subæqualia. *Nux* subdrupacea.

1. *Eriocephala*, capitulis solitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis. L. Willd. p. 434. Andrew. t. 104. Lam. ill. gen. t. 202. f. 3. Thunb. prod. 75. sub Passerina. Hab. in Aethiopia et Cap. b. spei, cum sequentib. Capitula cincta lana candida, bracteisque membranaceis.

2. *conglomerata*, capitulis confertis a fol. laxis. L. *phylicoides*, foliis linearisubulatis glabris laxè imbricatis, capitul. parvis confertis tomentoso-albis. Lam. enc. 3. p. 374. ill. gen. t. 202. f. 2.

3. *buxifolia*, fol. ovalibus sessilib. glaberrimis, flor. capitatis tomentoso-lanatis. Lam. l. c. p. 373. ill. t. 202. f. 1. Gnidia filamentosa. Lin. suppl. p. 224.

### D I G Y N I A.

973. *GALENIA*. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 6. *Caps.* subrotunda, 2-sperma.

1. *africana*, erecta fruticosa, fol. linearibus subcarnosis. Lin. suppl. p. 227. Willd. Sp. II. p. 436. Lam. ill. t. 314. Hab. in Africa. Flor. sessiles, pallidi, minuti, in panicula dichotoma.

2. *procumbens*, procumbens, fol. ovatis canaliculatis apice paulo recurvato. Lin. suppl. l. c. Thunb. prod. p. 77. Hab. ad Cap. b. spei.

974. *WEINMANNIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Caps.* 2-locularis, birostris.

#### \* *Foliis compositis.*

1. *glabra*, fol. pinnatis, foliol. obovatis crenatis laevibus. Lin. fl. suppl. Lam. ill. gen. t. 313. f. 1. W. pinnata. L. Sp. pl. 515. Hab. in Jamaica. Fol. pinnata, petiolo communi alato, articulis subovatis. Racemi terminalis. h

2. *trichosperma*, fol. impari pinnatis, petiol. communi alato: articulis quadrangulatis, racem. axillarib. Cav. ic. 6. p. 45. t. 567. Hab. in San Carlos de Chilae.

3. *hirta*, fol. pinnatis, foliolis ovatis serrato-crenatis, subtus racemisque hirsutis. Swartz. Fl. ind. oec. 2. p. 691. Hab. in altis montibus Jamaicae australis. Articuli petioli communis subcordati. h

4. *tomentosa*, foliis pinnatis, foliolis ovatis integerrimis subtus tomentosis, stipulis caducis. Lip. suppl. p. 227. Hab. in

N. Granada. Arb. valde ramosa. Petiol. communis articulis obovatis. Racemi versus apicem densissimi, quasi spicae.

5. *trifoliata*, fol. ternatis, foliol. elliptice lanceolatis serratis glaberrimis, panic. compositis. Lin. suppl. p. 227. Lam. ill. t. 313. f. 2. Hab. ad Cap. b. spei.

#### \* *Foliis simplicibus.*

6. *racemosa*, fol. simplicibus obovato-ellipticis obtusis dentatis, racemis glabris. Willd. p. 438. Supulae nullae. Lin. suppl. p. 227. Hab. in N. Zeelandia.

7. *parviflora*, fol. simplicib. ovatis serratis subsessilibus, racemis terminalibus ternis quinisque. Forst. Hab. in ins. Tabeiti.

8. *ovata*, fol. simplicib. ovatis crenato-dentatis, flor. racemosis. Cav. l. c. p. 45. t. 566. Hab. in fossis in Peruv. Arb. 18-petalis. Germ. auctum disco 8-glanduloso, uti in praecedente. C.

9. *paniculata*, fol. simplicib. lanceolatis serratis, flor. paniculatis. Cav. ic. 6. p. 44. t. 565. Hab. in R. Chilensi ad littora. Arboreae. Flor. nonnulli 5-petali, 11-gyni. C.

975. *CODIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Receptaculum* commune involucreatum. *Involucreum* 4-phyllum.

1. *montana*, montana. Lin. suppl. 288. Forst. gen. n°. 30. Lam. ill. t. 314. Hab. in N. Caledonia. Fol. opposita elliptica. Capitula globosa, h

976. *MOEHRINGIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* 1-locularis, 4-valvis.

1. *muscosa*. L. Lam. ill. t. 314. Alsine, fol. linearibus connatis. Hall. Scheuch. alp. 503. t. 6. Pluck. alm. 13. t. 75. f. 1. Hab. in albis et montosis in sylvis muscosis et ad fontes et scaturigines. h

p. *sedoides*, seu dasiphylla, fol. brevioribus, crassioribus, caul. elongato nudo? - Balbis Miscell. bot. p. 20. t. 5. Hab. prope Turin ad rupes, locis siccis. An distincta species? Sedum dasiphyllum referre dicitur.

ΠΟΛΥΓΟΝΟΝ. Stamina calyci s. corol. calycinæ insident, definita. Fructus 2

semen unicum, nudum aut calyce tectum, cujus embryo perispermio farinaceo est immersus. Fol. alterna, vagina stipulari distincta. Caul. plerisque herbaceus, etiam arborescens. Propter sequentia 3 genera huc etiam pertinent Rumex, Rheum, Astraphaxis et Eriogonum?

## T R I G Y N I A.

977. POLYGONUM. *Cal. o. Cor. 5-partita, calycina. Sem. 1, angulatum, tectum. (Stam. et styli numero incerti.)*

\* *Atraphaxoides caule frutescente, flor. racemosis.*

1. *frutescens*, caule fruticoso, foliis lanceolatis uirgine attenuatis, ochrea lanceolata internodiis brevior, petalis binis exterioribus minoribus reflexis. Willd. Sp. II. p. 440. P. caule fruticoso, calycinis foliolis duobus reflexis. L. Gmel. sib. 3. p. 68. t. 12. f. 2. Lam. ill. t. 315. f. 2. Hab. in Sibiria, Dauria. h

2. *grandiflorum*, caule fruticoso, fol. ovato-oblongis acutis, ochrea lanceolata internodiorum longitudine, pet. aequalib. erectis. Willd. Hab. in Oriente. Facie Polygalae Chamæbuxi. Flor. axillares pedunculati maximi hujus generis, Myrti communis fere magnitudine. W.

3. *polygamum*, caul. ramosissimo, fol. spatulatis, cor. obovatis patentib., ochreis integris. Vent. Hort. Cels. p. 63. t. 63 Polygonella parvifolia. Michaux. Flor. 2. p. 240. Hab. in Carol. aridis. Flor. racemosi polygami. V., spicati dioici. M. h

\*\* *Flor. axillaribus.*

4. *maritimum*, flor. octandris trigynis axillaribus, fol. ovali-lanceolatis semper-virentibus, caule suffrutescente. Hab. in littoribus. h

\* *littorale*, fol. crassis succulentis, caul. minus ramoso. Link in Schrad. bot. Journ. 1800. p. 54. P. maritimum. Roj. Syn. p. 147. exc. synonym. Smith. brit. t. p. 429.

5. *aviculare*, caul. decumbente, herbaceo, flor. octandris trigynis axillaribus, fol. lanceolatis, margine scabris, stipul. nervis remotis. Smith. brit. p. 429. Lam. ill. t. 325. f. 1. P. caul. procumbente herbaceo. L. Hab. in cultis ruderalis ad vias. Var. fol. latis, et caul. erecto: P. *erectum*. Roth. germ. II. p. 458.

\* *monsperiense*, erectum, fol. ellipticis crenulatis, caul. erecto, stipulis scariosis incis. Hab. Monsperlii. Thiebaud. Distincta species videtur.

6. *arenarium*, flor. 8-andris trigynis, apicis terminalib. aphyllis, fol. lanceolato-linearibus, caulibus angulatis declinatis herbaceis. Plant. rar. Hungar. p. 69. t. 67. Cresc. in arena mobili in Hungaria. Cal. corollinus magnus, primo purpureus, dein albo-rubellus, tandem atrosanguineus. P. avicul. affin. l. c.

7. *ramosissimum*, flor. triandris, trigynis, caulib. strictis ramosissimis striatis, stipul. abbreviatis margine laceris, fol. lanceolatis. Michaux. Flor. 1. p. 258. Hab. in regione Illinoensi. Facie P. avicularis.

8. *tenuis*, pumilum, caul. gracill. ramoso acutangulo, fol. longis linearibus strictis acuminatis, stipul. tubulosis apice villosis, flor. alternis subsolitariis. Mich. p. 238. Hab. in Canada. Stip. castaneæ.

9. *Bellardi*, erectum, flor. axillaribus octandris trigynis, fol. elliptico-lanceolatis, vaginis ciliatis. Allion. pedem. n.º. 2052. t. 90. f. 2. Hab. in agro Pedemontano, in Gallia et prope Lisbon.

10. *setosum*, flor. octandris trigynis, axillaribus, fol. subulato-linearibus, stipulis setaceo-laceris, caul. subfruticoso. Jacq. obs. bot. 3. p. 8. t. 57. Hab. in Armenia. T

11. *erectum*, flor. octandris trigynis axillaribus, fol. ovalibus, caul. erecto herbaceo. L. Hab. in Philadelphia. ©

\*\*\* *Flor. spicatis, spicis teretibus.*

12. *Bistorta*, caule simplicissimo monostachyo, fol. ovatis in petiolum decurrentibus. L. Flor. Dan. Engl. bot. t. 509. Hab. in montibus et pratis humidis. T

13. *viviparum*, caule simplicissimo monostachyo, fol. lanceolatis, margine revolutis. Smith. brit. t. p. 428. Flor. dan. t. 13. P. fol. nervosis, radicalibus ovato-lanceolatis, caulinis linearibus. Hall. helv. n.º. 1558. Pluck. t. 151. f. 2. Hab. in subalpinis, pascuis duris.

14. *lapathifolium (pallens)*, floribus hexandris digynis, stipulis muticis, pedunc. scabris, seminibus utrinque concavis. Ait. Kew. 2. p. 30. P. pennsylvanicum. Curt. lond. ic. P. scabrum. Moench. meth. Hab. promiscue cum sequente, pro cuius varietate ut plurimum habetur, spica pallida et pedunc. scabris distinctum. T

E e 4

\* *nodosum*, caul. elongato maculato ad geniculos nodoso, vaginis nullis, fol. ovato-lanceolatis, spica ramosa. Hab. in humidis, in ruderalis rarius. Caul. 3-pedalis, unc. 1. crassus. Fol. margine et ad petiolo scabra. An a *Persicaria* specie diversum?

15. *Persicaria*, flor. hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, fol. lanceolatis, pedunc. laevibus, stipul. ciliatis. L. Flor. dan. t. 702. Curt. lond. ic. Hab. in humidis et ad vias. Flor. rubri. Var. fol. viridibus et nigro-maculatis.

β. *incanum*, flor. hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, fol. oblongo-lanceolatis subtus pubescentibus. Willd. Schmid. bohem. n°. 341. P. tomentosum. Schrank. bay. 1. p. 669. t. 3. 669. Pet. H. Brit. t. 3. f. 8. Hab. in agris.

16. *mixta*, flor. hexandris submonogynis, fol. lineari-lanceolatis planis, spic. erectiusculis, caul. basi repente. Ait. Kew. 2. p. 31. Curt. lond. ic. P. *angustifolium*. Roth. germ. II. p. 453. P. strictum. Al-lion. ped. n°. 2051. t. 67. f. 1. Moris. 3. t. 29. f. 5. Hab. in agris et pascuis. Spica rubra.

17. *amphibium*, flor. pentandris semidigynis, spica ovata. Flor. dan. t. 282. Engl. bot. t. 456. α. *natans*, fol. ellipticis natantibus. β. *terrestre*, fol. hirsutis lanceolato-acuminatis. Hab. in stagnis. β. in humidis rarius florens. ¶

18. *Hydropiper*, flor. hexandris semidigynis, fol. lanceolatis undulatis, spic. filiformib. nutantibus, caul. erecto, stipulis submuticis. Blackw. t. 119. Curt. Lond. ic. Hab. in subhumidis ad fossas, gregarie.

19. *mite*, flor. 8-andris semitrigynis, fol. anguste lanceolatis hirsutis, stipul. hirsuto-ciliatis, spic. linearib., bract. ciliatis sulimbricatis. P. *Hydropiperoides*. Mich. Flor. 1. p. 219. Hab. in Amer. boreali. Facie antecedentis, non *acre*. Flor. purpurascens. M.

20. *hirsutum*, flor. 8-andris semitrigynis, fol. lanceolatis, pedunc. elongato distachyo, spic. linearibus, caul. adscendente hirsuto. Michaux. l. c. Hab. in Carol. inferior. herbosis udis.

21. *ocreatum*, flor. pentandris trigynis, fol. lanceolatis. L. *Persicaria* spicis longis copiosissimis, fol. ex lineari lanceolatis, vaginis debilibus. Gmel. sib. 3. p. 51. n°. 39. t. 8. Hab. in Sibiria. Vaginae integrae, ventricosae, ampliores caule. Folia revoluta. L.

22. *filiforme*, flor. pentandris digynis, spicis filiformibus, fol. ovatis, stipulis ciliatis. Thunb. jap. 163. Hab. in Japonia. Caul. lineis elevatis obsolete, villosus, pilis adpressis, ferrugineus. Stipulae intra-foliaceae inflatae.

23. *glabrum*, flor. hexandris digynis, spicis virgatis, ochreis truncatis nudis, fol. lanceolatis acuminatis glabris. Willd. p. 447. Hab. in Ind. orientali. A sequente distinctum; fol. lanceolatis valde acuminatis glabris. Var., stam. A. P. filiformi fol. longioribus triuncialibus. W.

24. *barbatum*, flor. hexandris trigynis, spicis virgatis, ochreis truncatis setaceo-ciliatis, fol. oblongis acutis glabriusculis. Willd. Sloan. jam. 48. hist. 1. p. 17. t. 3. f. 1. Rheed. 12. t. 77. Hab. in China. Caul. rufus.

25. *tinctorum*, flor. hexandris trigynis, spic. virgatis, stipul. glabris truncatis ciliatis, fol. ovatis acutiusculis glabris. Ait. 2. p. 51. Willd. p. 445. Hab. in China. Flores ruberrimus. Spic. longae, ramosae.

26. *virginianum*, fol. ovalibus, spic. longissimis, flor. remotis inaequalibus 5-andris digynis. Michaux. Flor. 1. p. 258. Willd. Sp. II. p. 442. Hab. in Amer. bor. sylv. umbrosis. Flor. pallidi. Styl. prolongatus, recurvus, persistens. ¶

27. *australe*, fol. lanceolato-linearib., stipulis longo-barbatis, spica filiformi, flor. approximatis. Hab. in N. Hollandia. Née. (Ex herb. Thiebaud.) Bract. deltoideae, ciliato-aculeatae.

28. *tomentosum*, flor. hexandris trigynis, spicis virgatis, ochreis truncatis hispidis setaceo-ciliatis, fol. ovatis acuminatis utrinque incano-tomentosis. W. Houttuyn Syst. t. 49. f. 1. Pluck. alm. 288. t. 210. f. 7. Hab. in Zeylona. Var. β. Fol. inferiora utrinque scabra, nec albicantia tomentosa.

29. *orientale*, flor. heptandris digynis, fol. ovatis, caule erecto, stipulis hirtis hypocrateriformibus. L. Curt. mag. t. 213. Hab. sponte in Oriente et India. In hortis ornamenti causa colitur. Omnium specierum facile altissimum, flor. rubris, passim albis, pulchris distinctum.

30. *pensylvanicum*, flor. octandris digynis, pedunc. hispidis, fol. lanceolatis, stipulis muticis. L. Sp. pl. p. 519. Pedunc. scabri, setis rigidiusculis apice gluten secernentibus. Spicae subracemosae flosculis pedicellatis. L.



\*\*\* *Flor. paniculato-racemosis, fol. linearibus aut ovatis nec basi excisis.*

31. *articulatum*, fol. octandris trigynis, spic. articulatis paniculatis, stipul. vaginalibus truncatis integris, fol. linearibus. J. Willd. p. 450. Hab. in Canada. Spicae filiformes, imbricatae bract. turbinatis, paucul. terminant. L.

32. *divaricatum*, flor. octandris trigynis racemoso-paniculatis, fol. lanceolatis laevibus, caule divaricato patulo glabro. Willd. p. 451. Buxb. cent. 2. p. 31. t. 31. Hab. in Sibiria.

33. *alpinum*, flor. octandris trigynis racemoso-paniculatis, fol. ovato-lanceolatis glabris margine ciliatis, caule ramoso, geniculis barbatis. Willd. p. 451. Allion. pedem. t. 68. f. 1. Boc. mus. 2. t. 27. Hab. in alpinis, et in insula Corsica. ¶

34. *undulatum*, flor. octandris trigynis racemoso-paniculatis, fol. lanceolatis undulatis superne scabris, subtus pubescentibus, caule ramoso inferne pubescente, geniculis ciliatis. Willd. Murr. in Comm. goett. 1774. p. 34. t. 5. P. sibiricum. Lin. suppl. p. 228. Gmel. sib. 3. p. 56. t. 10. Hab. saxosis humidiusculis in Sibiria. ¶

35. *sericeum*, flor. octandris trigynis racemosis, fol. ovatis incano-pubescentibus, caule decumbente. Willd. Pall. it. ed. min. 3. p. 233. P. flor. pedunculatis in spicis laxissimis. Gmel. sib. 3. p. 58. t. 9. f. 2. Hab. in Sibiria ad lacum Baical. ¶

36. *serratum*, fol. crenatis. L. Hab. in Mauritania. †

\*\*\* *Helxine fol. subcordatis, s. basi excisis.*

37. *corymbosum*, flor. octandris trigynis, pedunc. glanduloso-pilosus, fol. oblongo-lanceolatis subsessilibus, bracteis membranaceis ciliatis. Willd. p. 452. Hab. in Java. Sequenti affine.

38. *chinense*, flor. octandris trigynis, pedunc. scabris, foliis petiolatis ovatis, bracteis s. fol. summis cordatis. L. Burm. ind. go. t. 30. f. 3. Hab. in India, China. Fol. ovato-cordata.

39. *sagittatum*, fol. sagittatis, caule aculeato. Gmel. sib. 3. p. 61. t. 13. f. 2. Flor. capitatis 8-andris. Michaux. 1. p. 241. Hort. cliff. 151. t. 12. Hab. in Virginiae, Marilandiae et Carol. merid. s.

40. *arifolium*, fol. hastatis, caule retrorsum aculeato. L. Pluck. smalth. 67.

t. 398. f. 3. Hab. in Virginiae, Floridae et Carolinae montib. Flor. 6-andri, semidigyni.

41. *acetosaeifolium*, flor. 8-andris trigynis, fol. hastato-lanceolatis crassiusculis, caul. laevi volubili, fructu subbaccato. Vent. Hort. cels. p. 88. t. 88. Coccoloba sagittifolia. Ortega Dec. p. 60. Hab. in Brasiliæ. ¶

42. *crassifolium*, fol. hastatis, inferioribus ovatis, reliquis lineari-lanceolatis, caule decumbente glabro. Willd. Murr. Comment. goett. 1774. p. 37. t. 6. Hab. in Sibiria locis apricis.

43. *perfoliatum*, fol. triangularibus, caule retrorsum aculeato, stipulis perfoliato-foliosis patentibus subrotundis. Burm. ind. go. t. 31. f. 2. Lam. ill. t. 315. f. 3. Hab. in India. Pedunc. pauciflori, aculeati.

44. *tataricum*, fol. cordato-sagittatis, caule inermi erecto, seminib. subdentatis. L. Gmel. sib. 3. p. 64. t. 13. f. 1. Hab. in Tataria. ☉

45. *emarginatum*, fol. cordato-sagittatis, caule erecto inermi, seminibus 7-icetruuncatis emarginatis, alis cartilagineis Roth. Catal. bot. 1. p. 48. Hab. in China. ☉

46. *Fagopyrum*, fol. cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminibus angulis aequalibus. L. Mart. Flor. rust. t. 46. Hab. in Asia, nunc ut frumentum quibusdam in arenosis regionibus colitur. ☉

47. *Convolvulus*, fol. cordato-hastatis, caule volubili angulato, flor. obtusa is. L. Flor. dan. t. 744. Curt. Lond. ic. Hab. in Europae et Amer. agris. Anth. violaceae.

48. *cilinode*, subpubescens, caul. angulato debili, stipulis subacutis basi ciliatis, fol. cordatis, fructub. apteris. Michx. Flor. 1. p. 241. Hab. in Canada. Priori affine.

49. *dumetorum*, fol. cordatis, caule volubili laevi, flor. carinato-alatis. L. Flor. dan. t. 759. Hab. in Europae sylvis, frutices scandens. Anth. albae.

50. *scandens*, fol. cordatis, caule volubili, flor. carinatis. L. Pluck. alm. 143. t. 177. f. 7. Sloan. jam. 46. hist. 1. p. 138. t. 50. f. 1. Hab. in Americae sylvis. Flor. 8-andri, trigyni, cal. fruct. majusculi, tripteris. Michx. ¶

51. *multiflorum*, fol. cordatis, caule volubili, angulato, florum panicula ramosa, Thunb. jap. 169. P. chinense. Houttnya. Syst. 6. t. 49. f. 3. Hab. in Japonia. ¶

978. *BRUNICHA*. *Cal.* 1-phyllus, demum coriaceus, angulatus, 5-fidus: lacin. revolutis. *Cor.* o. *Caps.* supera, 1-locularis, 1-sperma. *Sem.* inversum lobatum. (Siam. 8-10.)

1. *cirrhus*, caul. scandente, fol. cordato-sagittatis. Gaertn. de fr. et sem. 1. p. 214. t. 45. f. 2. Hab. in Bahama. Col. in H. P. Cal. inferne ventricosus et elongatus in pedunc. planum, arcuatum, basi attenuatum. G.

979. *COCCOLOBA*. *Cal.* 5-partitus, coloratus, demum baccatus. *Cor.* o. *Bacca* calycina, monosperma.

1. *uvifera*, foliis cordato-subrotundis nitidis. L. Willd. Sp. 11. p. 457. Jacq. amer. 112. t. 73. Lam. ill. t. 316. f. 2. Catesb. car. 2. p. 96. t. 96.

β. *leoganensis*, fol. subrotundis integerrimis nitidis planis, racemis fructuum erectis. Jacq. amer. 113. t. 178. f. 33. Hab. in America. Arb. magna, pulchra.

γ. *latifolia*, fol. integris latissimis basi corctatis. Enc. bot. 6. p. 61. Lam. ill. t. 316. f. 4. Ex Amer. meridion. Priori affinis. Fol. tenuiora, membranacea fere, cordato-orbiculata.

3. *australis*, fol. cordato-ovatis acutis, flor. polygamis. Forst. prod. n°. 176. Hab. in N. Zelandia. h

4. *pubescens*, fol. orbiculatis pubescentibus. L. Sp. pl. 523. Mill. dict. n°. 2. C. *grandifolia*, fol. subrotundis integerrimis rugosis. Jacq. amer. 113. Pluck. phyt. 222. f. 8. Hab. in America. Arbor praealta, a 60-80 ped. Lignum durissimum. Fol. maxima, rugosa, subus pubescentia.

5. *diversifolia*, fol. ramusculorum ovatis, ramorum ovato-cordatis. Jacq. amer. 114. t. 76. Hab. in Domingo. Arb. 10-12-pedalis.

6. *flavescens*, fol. ellipticis obtusis mucronatis, basi condatis. Willd. p. 458. Jacq. amer. 114. t. 75. Hab. in Domingo. Magnitudine prioris.

7. *excoriata*, fol. oblongo-ovatis acutiusculis basi cordatis, racemis pendulis. Plum. ic. 146. f. 1. Hab. in America. h

β. fol. breviorib. ovato-subacutis, racemis praelongis pendulis. Poir. enc. 6. p. 62. Hab. in Porto-Ricco. Ledru.

8. *nivea*, fol. oblongis acuminatis venosis, supra nitidis, racemis erectiusculis. Swartz. Flor. ind. occid. 2. p. 693. Hab. in montosis aridis Jamaicae. Arb. 20-pedalis.

9. *punctata*, fol. lanceolato-ovatis. L. Jacq. Am. Ed. pict. t. 114. Hab. in Amer. Racem. breves, recti.

10. *obtusifolia*, fol. oblongis obtusissimis. Jacq. amer. 117. t. 74. Hab. in Carthagera. h

11. *microstachya*, fol. ovatis obtusis glaberrimis, racemis nutantibus. Hab. in India occidentali. Rami cinerei. Fol. petiolata, fere sesquiuncialia. Racemi brevissimis. W. h

12. *emarginata*, fol. coriaceis subrotundis exciso-emarginatis. L. Jacq. obs. 1. p. 181. t. h. Hab. in America calidior. Fructificatio? h

13. *barbadensis*, fol. cordato-ovatis undulatis. L. Jacq. obs. 1. t. 8. Hab. in Barbados. h

14. *tenuifolia*, fol. ovatis membranaceis. Lam. ill. t. 14. f. 3. Brown. jam. 210. f. 3. In Jamaica. h

980. *PAULLINIA*. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 4-phyllum, inaequale. *Caps.* turbinata, trigona, 3-locularis: loculis monospermis. *Receptac.* centrale. *Sem.* ad dimium arillata. (Fol. ternata aut pinnata.)

\* *Caps. pyriformibus: valve nudis aut carinato-alatis.*

1. *Cururu*, capsulis pyriformib. obtusis, foliis ternatis, foliolis oblongis dentato-serratis subacuminatis, petiolis alatis. Schumacher in Act. Hist. Nat. Haf. 3. p. 2. t. 121. Willd. p. 460. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 61. f. 4. *Cururu*. Plum. gen. 34. ic. 111. f. 2. Hab. in America calidior. Caul. glaber subangulatus. h

2. *pinnata*, caps. pyriformibus tricornibus, fol. pinnatis, foliolis oblongis obtuse serratis acuminatis, petiolis marginatis. Schumacher. l. c. p. 121. Lam. ill. t. 318. f. 2. Jacq. l. c. t. 62. f. 12. Hab. in Brasilia, in Anülles.

\*\* *Capsulis ovatis.*

3. *Meliacifolia*, fol. pinnatis: foliol. trijugis subsessilibus lanceolatis remote

dentatis, subtus pubescentib., fruct. alis apice prominulis. Juss. in Annal. d. Mus. Cah. 23. p. 357, t. 66. f. 2. Hab. in Brasilia. Caul. scandens. h

4. *Thalictrifolia*, fol. subtripinnatis summis simplicibus, foliol. ovatis parvis integris aut subdentatis, caps. trialata. Juss. l. c. t. 65. f. 1. Cum priore. Petiol. communis et caul. subtomentosus. Pedunc. spiralis. h

5. *acutangula*, fol. pinnato-quinatis: foliol. oblongo-ovatis acuminatis dentato-serratis, caps. obovatis triangulo-alatis. Ruiz et Pavon. l. c. p. 93. Sub *Semariilaria* ut sequens, cum qua iisdem in locis crescit.

6. *obovata*, fol. pinnato-quinatis, foliolis lanceolatis serratis, caps. obovatis. Ruiz et Pavon syst. Pl. Flor. Peruv. et Chil. p. 93. Hab. in Peruv. nemoribus. Scandens. h

7. *tetragona*, caps. tricarinatis tricor-nibus, fol. pinnatis, foliolis ovatis subserratis acutis glabris, petiolis nudis. Schumacher. Act. Hist. Nat. Haf. 3. p. 2. t. 122. Aubl. guj. r. p. 355. Hab. in Cajenna. Caul. 4-gonus. Antecedenti affinis.

8. *Vespertilio*, caps. alatis, alis horizontalibus, fol. pinnatis, foliolis ovatis apice inciso-serratis, petiolis nudis. Schumacher. Act. Hist. Nat. Haf. 3. p. 122. t. 11. f. 1. Hab. in Insula St. Christophori Americæ. Caul. vix angulosus, laevis.

9. *curassavica*, caps. valvulis semio-bordatis, fol. biternatis, foliolis crenatis ovalibus imparibus ovato-cuneatis, petiolo intermedio marginato. l. c. p. 123. t. 11. f. 2. Jacq. t. 61. f. 8. Plum. gen. 34. ic. 111. f. 1. Hab. in Curassao. Caulis sulcatus, angulis villosis ferrugineis. Sch. h

10. *barbadensis*, caps. valvulis semio-vatis villosiusculis, fol. biternatis, foliolis ovalibus integerrimis serratisque coriaceis, petiolis submarginatis. Schum. p. 123. Jacq. t. 62. f. 9. Hab. in Barbados. h

11. *polyphylla*, caps. valvulis capsula-rum semiobovatis, fol. supradecompositis, foliolis ovato-cuneatis, apice crenatis supra glabris subtus petiolisque villosis. Schum. l. c. p. 124. Willd. p. 461. Jacq. l. c. t. 61. f. 10. Hab. in Amer. australiore. Cirrh. axillaribus. h

12. *tomentosa*, fol. pinnatis: foliolis ovato-rhombeis repandis obtusis capsulis-que tomentosis, petiol. marginatis. Schum. l. c. p. 121. Jacq. obs. t. 61. f. 13. Hab. in

Amer. Fol. ovato-oblonga, remote cre-nata.

13. *senegalensis*, caps. ovatis, fol. pinnatis: foliol. sessilibus ovatis remote crenatis, impari majore: petiol. margi-natis, caul. angulato subtomentoso. Juss.

14. *sphaerocarpa*, fol. pinnatis: foliol. subsessilibus ovatis glabris remote crenatis acumine obtuso, petiolo nudo, caul. tereti. Juss. l. c. Hab. in Guinea. Rich.

15. *subrotunda*, fol. pinnato-quinatis: foliol. oblongis superne serratis, caps. subrotundis. Ruiz et Pavon syst. l. c. p. 92. (*Semariilaria*.) Hab. in Peruv. nemoribus. Frut. scandens. Arillus edulis.

### \* \* \* Fructibus ignotis. †

16. *nodosa*, fol. ternatis, petiol. nudis, foliol. medio obovato. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 62. f. 3. Willd. p. 460. Hab. in America.

17. *carthagenensis*, foliis biternatis, petiol. omnibus marginatis, caul. inermi. Jacq. l. c. t. 62. f. 6. Hab. Carthagenæ in Amer. h

18. *caribæa*, fol. biternatis, petiol. omnibus marginatis, ramis aculeatis. Jacq. l. c. t. 62. f. 7. Hab. in Caribæis.

Obs. Ob ramos aculeatos et petiolos secundum ill. Jussieu *Supindis* minus affinis species est, sed uti et sequens alia ad genera forte amandanda.

19. *cauliflora*, fol. pinnatis, pinnula infima ternata, petiolo ad apicem marginato, basi nudo, flor. corymboso-capitatis axillaribus et terminalibus. Willd. p. 463. Jacq. ic. rar. 3. t. 450. Collect. 4. p. 176. Hab. in America ad Caracas.

20. *japonica*, foliis quinato-pinnatis petiolulatis marginatis, caule herbaceo inermi. Thunb. jap. 170. Hab. in Ja-ponia. Foliola infima ovata subsessilia in-ciso-bifida vel trifida, pollicaria. Th. T

21. *diversifolia*, fol. supradecompositis, petiolis marginatis: infimis pinnatis reli-quis ternatis. Jacq. l. c. t. 62. f. 14. Hab. in America. h

22. *Cupanaefolia*, fol. pinnatis: foliol. bijugis sessilibus ovato-oblongis remote cre-natis glaberrimis, pedunc. cirrhosis. Juss. l. c. Hab. in sylv. Gujanæ. Rich.

23. *connarifolia*, fol. pinnatis: foliol. bijugis sessilibus coriaceis ramisque ferru-gineis, petiol. nudis, pedunc. acirrhosis. Juss. Cum priore.

24. *fibulata*, fol. pinnatis : foliol. breve petiolatis ovatis subcoriaceis subdenticulatis ferrugineis inferne subtomentosis, pedunc. cirris incrassatis fibuliformibus floriferis. Juss. Hab. in sylvat. ad ripas in Guiana. Rami ferruginei.

25. *rufescens*, foliol. bijugis subpetiolatis ovato-lanceolatis remote crenatis subtus tomentoso-ferrugineis, supra nigrovirentibus. petiol. nudis, ramis subangulatis ferrugineis. Juss. l. c. Cresc. ubi antecedens. Pedunc. cirrhosi autacirrhosi. J.

26. *Ingaefolia*, fol. magnis pinnato-3-jugis : foliolis atro-virentibus obtuse acuminatis, petiol. basi nudo, ultra marginatis, ram. striatis punctato-scabris. Juss. l. c. p. 350. Hab. in Guianae sylvis, flumin. Amazonio conterminis. Pedunc. nunc ramoso-paniculati, nunc simplices ultra medium cirrhosi et floriferi. J.

981. *SERIANA*. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 4-phyllum. *Samarae* 3, longitudinaliter connatae, globosae, inferne in alam membranaceam dilatatae.

1. *sinuata*, alis capsular. postice dilatatis, fol. ternatis, foliolis ovato-lanceolatis dentato-sinuatis. Schum. in Act. Haf. 3. p. a. p. 126. t. 12. f. 1. Willd. p. 467. Paullinia Seriana. L. Jacq. obs. 3. p. 17. t. 61. f. 2. Lam. ill. t. 318. f. 1. Hab. in America calidiore. h

2. *divaricata*, fol. biternatis, foliolis ovatis integerrimis subacutis lucidis petiolatis, petiolis nudis. Schum. l. c. t. 11. f. 2. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 666. sub Paulinia. Hab. in sylvis Jamaicae. h

3. *caracasana*, alis caps. postice rotundatis, foliis biternatis. foliolis oblongis utrinque acutis remotissime dentatis, petiolis nudis. Willd. p. 465. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 52. t. 99. sub Paulinia. Hab. ad Caracas. h

4. *racemosa*, alis caps. postice dilatatis antice subsinuatis, fol. biternatis, foliolis ovatis profunde serratis. Schum. p. 127. t. 12. f. 3. Hab. in Vera Cruce. h

5. *spectabilis*, alis caps. postice dilatatis, fol. biternatis, foliol. obovatis terminalibus retusis, petiolis alatis. Schum. t. 12. f. 4. Hab. in America. Foliola integerrima; terminale emarginatum. W.

6. *mexicana*, foliis biternatis, foliolis obovatis integerrimis omnibus emarginatis,

petiolis alatis, racemis compositis. Willd. Schum. t. 11. f. 3. Paulinia fol. ternato-decompositis, caule aculeato. L. Hort. cliff. 152. Hab. in Mexico. Fruct. ignotus. †

7. *angustifolia*, fol. biternatis, foliol. lineari-lanceolatis integerrimis acutis, petiolis alatis. Willd. Paull. mexicana. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 61. f. 5. Plum. gen. 34. ic. 113. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. h

8. *Iupulina*, alis caps. semiovalibus, fol. biternatis crenatis subtus ferrugineis, foliol. terminalibus subrhombicis lateralibus ovatis, petiolis subulatis. Schum. p. 127. t. 12. f. 5. Hab. in America. h

9. *lucida*, alis caps. semiovalibus, fol. biternatis, foliol. ovatis acutis serratis petiolis subnudis. Schum. l. c. p. a. t. 128. Hab. in insula St. Crucis. Fol. apice lucida.

10. *triternata*, fol. triternatis, foliol. ovatis obtusis repandis, petiolis alatis, racemis paniculatis. Willd. p. 466. Paull. L. Mant. 236. Jacq. obs. 3. p. 11. t. 62. f. 11 ? Plum. gen. 34. ic. 112. Hab. in Amer. in ins. St. Dominica, ubi ab incolis demominatur. Liane à poisil. Ad pisces, eos venenando, capiendos adhibetur.

982. *CARDIOSPERMUM*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 4-phyllum, inaequale. *Caps.* 3, connatae, inflatae.

1. *Halicacabum*, caule, petiolis, foliolisque inciso-dentatis glabris. Willd. Sp. II. p. 764. Lam. ill. t. 317. Rumph. 6. t. 24. f. 2. Hab. in Indiis. ☉

2. *hirsutum*, caule petiolisque hirsutis, foliolis dentatis glabris. Willd. Habit. in Guinea. Caul. quadripedalis et ultra scandens. Fol. simpliciter et grosse dentata. W. Simile priori, sed triplo majus. W.

3. *Corindum*, fol. subtus tomentosis. L. C. villosum, fol. incisus obtusis, petiolis brevibus. Mill. dict. n° 3. Hab. in Brasilia. ☉

7. *grandiflorum*, foliis pubescentibus, capsulis acuminatis maximis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 698. Hab. in fruticetis sepiisque Jamaicae. ‡

983. *SAPINDUS*. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Caps.* carnosae, connatae, ventricosae.

1. *Saponaria*, inermis, fol. pinnatis,

foliolis ovato-lanceolatis, rachi alata. Ait. Kew. 2. p. 35. Willd. p. 468. Comm. hort. 1. p. 183. t. 94. Hab. in America juxta littora in Georgia. Michaux. Fruct. glabrosi, terebinthinacei. M.

2. *longifolius*, fol. pinnatis, foliolis lanceolatis glabris, unico terminali, rachi simpliciter. Vahl. symb. 3. p. 53. Hab. in India orientali? h

3. *spinosus*, fol. abrupte pinnatis, caule spinosissimo. L. Brown. jam. 207. t. 20 f. 2. Hab. in Jamaica. h

4. *laurifolius*, fol. pinnatis, foliolis ovato-oblongis attenuatis glabris, rachi simpliciter, petalis margine tomentosis. Vahl. symb. 3. p. 54. Rheed. 4. t. 19. Hab. in Malabar. h

5. *emarginatus*, fol. pinnatis, foliolis oblongis emarginatis subtus villosis, rachi simpliciter, petalis margine tomentosis. Vahl. l. c. Hab. in India orientali. h

6. *rubiginosus*, fol. pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acutis subtus villosis, rachi simpliciter, petalis glabris. Willd. p. 469. Roxb. corom. 1. p. 44. t. 62. Hab. in montosis circassiensib. Arb. utilis.

7. *tetraphyllus*, fol. pinnatis, foliolis lanceolato-oblongis glabris, rachi simpliciter, racemis subsimplicibus, petalis glabris. Vahl. l. c. Hab. in India orientali. h

8. *rigidus*, fol. pinnatis, foliolis ovato-oblongis, rachi simpliciter, cor. fructibusque glabris. Vahl. l. c. Gaertn. de sem. 1. p. 341. t. 70. f. 3. Pluck. alm. 255. t. 217. f. 7. Hab. in America. Racemus supradecompositus pedalis. V. h

9. *arborescens*, fol. pinnatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, panicula axillari simpliciter. Willd. Aubl. guj. 1. p. 359. t. 139. Hab. in sylvis Gujanæ. h +

10. *frutescens*, foliis pinnatis, foliolis alternis lanceolatis acuminatis glabris, panicula axillari simpliciter. Willd. Aubl. p. 355. t. 138. Hab. in sylvis Gujanæ. h +

984. *PONAEA*. Cal. 5-partitus. Cor. 4-petala. Caps. trilocularis, triala: loculis monospermis.

1. *saponarioides*. Willd. Sp. II p. 470. Toulicia gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 359. t. 140. Lam. ill. t. 311. In sylvis Gujanæ. Fol. abrupte pinnata. h

985. *CORNIDIA*. Cal. obtuse trigonus, integerrimus, semisuperus, germinis aceretis. Cor. 4-petala. Stylis divergentes. Caps. 3-corniculata, 3-locularis, 3-valvis. Semina numerosa.

1. *umbellata*. Ruiz et Pav. syst. veg. Fl. Per. p. 91. Arb. excelsa, fol. oblongis. Cresc. in Peruv. nemoribus.

## TETRAGYNIA.

986. *PORLIERA*. Cal. 4-phyllus, æqualis. Petala obovata, conniventia. Squamæ nectariferæ 8. Stamina æqualia, dorso nectarii inserta. Drupae 4, connatae. (Guajaco affine genus.)

1. *hygrometra*, fol. abrupte pinnatis: foliol. linearibus. Ruiz et Pavon. Flor. Per. et Chil. prodr. p. 55. t. 9. et syst. vegetab. p. 94. Hab. in Peruv. ruderalis et apricis. Lignum sudorificum et antirheumaticum. Fol. hygrometrio inserviunt.

987. *FRANCOA*. Cal. 4-partitus, persistens. Cor. 4-petala. Stylus o. Stigm. plana. Caps. 4, basi connatae, carinatae. Semina numerosa, suturis carisarum affixa.

1. *appendiculata*, acutis, fol. cordatis ovatis obtuse angulatis, petal. foliol. appendiculatis. Cav. ic. 6. p. 77. t. 56. Hab. in ins. San Carlos, etc. Flor. racemosi.

Obs. Auctor putat, quod *Staupanke* amplissimo sonchi folio. Feuil. Peruv. 2. p. 44. t. 31. alteram hujus generis efficit speciem, qualis planta vero a cl. Willd. Sp. pl. II. p. 487. ad *Panke* Molinae relata est. *Panke tinctoria*. Mol. et Willd. secundum Flor. Peruv. 1. p. 29. *Gunnerae* species est.

988. *GALVESIA*. Cal. 4-phyllus. Petala sessilia. Stam. 4. alternantia breviora. Corpus glandulosum sub germine. Drupae 4.

1. *punctata*, fol. lanceolatis oblongisque serratis punctato-pellucidis. Ruiz et Pavon syst. veg. l. c. p. 97. Hab. in R. Chilensis nemorib., et stagnatis, etc. Fol. fragrantia, aromatica.

989. *CALANCHOE*. Cal. 4-phyllus.

*Cor. hypocateriformis*, 4-fida : lacin. acutis, tubo ventricoso, *Squamæ nectarif.* 4 ad basin germinum lineares. *Capsula* 4, superæ, 1-loculares, polysperma. (Plantæ succulentæ. Fol. plus minusve incisa. Flor. flavi.)

1. *lanceolata*, foliis lanceolatis apice serratis, panic. villosa. *Cotyledon lanceolatum*. Vahl. symb. 2. p. 51. Hab. in Arabia.

2. *laciniata*, fol. laciniato-pinnatifidis : summis integris. Decand. Pl. grass. ic. *Cotyledon laciniata*. Lin. Rumph. 5. t. 95. Hab. in ins. Java, Bourbon et Moluccis.

3. *ægyptiaca*, fol. spatulato-subrotundis concavis. Pl. grass. ic. *Cotyl. nudicaulis*. L. syst. veg. 14. p. 351. Willd. Sp. pl. II. p. 258. Pluckn. Alm. 1. 208. f. 3. (malæ.) Hab. in Ægypto in monte Melhan. Forsk. Flor. auranii.

\* *spatulata*, fol. spatulato-subrotundis crenatis planiusculis. Plant. grass. ic. *Cotyl. hybrida*. H. Par. Hab. in China? Affinis valde antecedenti.

4. *Verea*, fol. ovatis repando-crenatis, flor. corymbozo-paniculatis. *Verea crenata*. Andrew. i. 21. *Verea*. Willd. Sp. II. p. 471. *Cotyledon crenatum* Vent. Malm. t. 49. Hab. in Sierra Leone. Subfruticosa. Cor. flava : ore aurantiaco.

5. *pinnata*, fol. quinato-pinnatis, foliol. obovatis crenatis : crenis filamento-barbatis, flor. longis pendulis. Lam. enc. 2. p. 141. Hab. in ins. Franciæ. 3-4-pedalis. Panic. ramosa. Flor. penduli. Fol. crenarum fila radicales referunt. Lam.

β. *floripendula*, fol. subconcavis crenis nudis. Lam. l. c. *Crassuvia floripendia*. Commers. Lam. l. c.

6? *alternans*, fol. orbiculato-spatulatis integerrimis. Vahl. symb. 2. p. 51. sub *Cotyledon*. Hab. in Arabia.

*Obs.* Nomen *Kalanchoë* jam prius ab Adansonio (Fam. d. Pl. 2. p. 248.) his plantis, erat impositum. *Cotyledoni* generi, quidem affines, sed præter stam. numerum etiam cor. forma ab eo discrepant.

990. PARIS. *Cal.* 4-phyllus. *Petal.* 4, angustiora. *Antheræ*

filam. medio adnexæ. *Bacca* 4-locularis.

1. *quadrifolia*, fol. quaternis. L. Flor. dan. t. 139. Herba Paris. Matth. Hab. in nemoribus. Var. fol. 3-5.

991. ADOXA. *Cal.* 2-3-fidus, infernis. *Cor.* 4-s. 5-fida, supera. *Bacca* 1-locularis, 4-s. 5-sperma, calyce coalita. (Flor. laterales 9-10-andri.)

1. *Moschatellina*. L. Engl. bot. t. 753. Curt. Lond. ic. Lam. ill. t. 320. Hab. in nemoribus. Vere. Flor. virescentes, odorati.

992. EJIATINE. *Cal.* 4-phyllus. *Petal.* 4. *Capr.* 4-locularis, 4-valvis, depressa, polysperma : dissepimenta suturis opposita.

1. *Hydropiper*, fol. oppositis, flor. alternis. Hoffm. germ. p. 186. Schuhr Handb. t. 109. Vaill. paris. 5. t. 2. f. 2.

β. *triandra*, fol. floribusque oppositis. Hoffm. l. c. Schuhr t. 109. Vaill. l. c. Hab. in inundatis. ☉

2. *Alsinastrum*, foliis verticillatis. L. Lam. ill. t. 320. f. 1. Hab. in fossis. Facie fere Hippuridis. Fol. emersa quaterna, ovata.

993. HALORAGIS. *Cal.* 4-phyllus, superus. *Petal.* 4, caduca. *Drupa* sicca. *Nux* 4-locularis.

1. *Cercodia*, fol. serratis, florib. verticillatis. Ait. Kew. 2. p. 37. Willd. Sp. II. p. 473. H. *Tetragonia*. L'Herit. stirp. nov. 1. p. 82. H. *alata*, fructu quadrialato. Jacq. ic. rar. 1. t. 69. *Cercodia erecta*. Murray in Comm. goett. 1780. p. 3. t. 1. Lam. enc. 1. p. 682. Ej. ill. gen. t. 319. *Tetragonia iæefolia*. Lin. suppl. 257. Fol. ovato-lanceolata, venosa. Pedunc. scabri, demum reflectuntur infra folia.

2. *prostrata*, fol. integerrimis, flor. solitatis axillaribus. H. fructib. globosis. Forst. prod. n. 779. L'Herit. stirp. nov. 1. p. 82. Hab. in Botanicis insula et in N. Caledonia. Facie Ammanniæ. Rami glabri. ¶

---

M O N O G Y N I A.

*Dais octandra*. *Richardia scabra*. *Vaccinia nonnulla*. *Andromeda octandra*, *ericoides* *lycopodioides*. *Elaeocarpus serratus*. *Diospyri quaedam*. *Rivina octandra*. *Jussieuæ* *plures species*. *Rutæ flor. laterales*. *Fagara octandra*, *Elaphrium*. *Rhizophora Mangle*. *L. Ammannia sanguinolenta*, *octandra*. *Melastomæ plures species*. *Trichilia pallida*. *Portulaca quadrifida*, *meridiana*. *Zygophyllum Morgana*. *Cleome juncea*. *Capparis ferruginea*. *Monotropa Hypopithys* (*quoad flor. laterales*). *Caseariæ nonnullæ species*. *Petiveria alliacea*. *Limonia monophylla*. *Aesculus Pavia*. *Quivisia ovata*, *heterophylla*. *Samidæ quaedam*.

D I G Y N I A.

*Ulmus effusa*. *Chrysopenia* (*flor. lateral.*) *Polygon. pennsylvanicum*.

T R I G Y N I A.

*Hortensia speciosa*.

T E T R A G Y N I A.

*Myriophyllum verticillatum*. *Forskoleæ secundum Murray*, *Willdenow*.

P E N T A G Y N I A.

*Sedum pusillum*, *pulchellum*, *ternatum*. *Michaux*.

O C T O G Y N I A.

*Phytolacca octandra*.

---

## C L A S S I S I X.

## E N N E A N D R I A.

## M O N O G Y N I A.

## 994. LAURUS. Cal. 4-6-partitus.

Nectar. glandulis 3. bisetis, germen cingentibus. Filam. interiora quorum 3-alterna sterilia glandulifera. Drupa 1-sperma. (Stam. 3, 5, 6, 7, 8 et 14. Flor. passim dioici.)

1. *Cinnamomum*, fol. suboppositis trinerviis ovato-oblongis, nervis versus apicem evanescentibus, panic. terminali. Lam. enc. 3. p. 441. Willd. Sp. II. p. 477. Blackw. t. 354. Burm. zeyl. 62. t. 27. Hab. in Zeylona et in America. Dioica. Arb. 18-24-pedalis.

2. *Cassia*, fol. triplinerviis lanceolatis. L. panic. laxis sublateralibus. Lam. l. c. p. 444. Ej. ill. t. 321. f. 2. Burm. zeyl. 63. t. 28. Blackw. t. 319. Carua. Rheed. t. t. 57. Hab. in Malabaria, Sumatra, Java. h

3. *Culiban*, fol. triplinerviis suboppositis. Lin. Rumph. 2. t. 14. Lam. l. c.

3. *Malabratum*, fol. suboppositis praelongis utrinque acutis triplinerviis transverse venosis. Lam. p. 445. Kaon-Karua. Rheed. 5. t. 53. Malabratum. Lobel. ic. 308. Hab. in montosis Malabaricae. Prima specie altior, cui affinis. Flor. paniculati, termin.

4. *Camphora*, foliis sub-triplinerviis lanceolato-ovatis, panic. latentibus. Lam. p. 446. Jacq. Coll. 4. p. 221. t. 3. f. 2. Blackw. t. 347. Hab. in Japonia. h

5. *montana*, fol. triplinerviis ovato-acuminatis perennantibus, flor. racemoso-paniculatis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 100. Hab. in altis montibus Jannicae australis. Habitu L. Camphorae simillima. S. h

6. *Chloroxylon*, foliis trinerviis ovatis coriaceis, nervis apicem attingentibus. L. Brown. jam. 187. t. 7. f. 1. Hab. in Jamaica. h

7. *cupularis*, fol. ovatis glabris, panic. sessilibus subterminalibus, fruct. glandiformibus cal. cupulari exceptis. Lam. l. c. p. 447. t. 321. Aubl. Guian. 1. p. 361. Hab. in ins. Mauriti. et Borbonia. Var. fol. latissimis.

8. *glauca*, fol. nervosis lanceolatis perennantibus, ramulis tuberculatis, flor. solitariis. Thunb. jap. 173. Hab. in Japonia. Folia acumine obtuso, margine reflexo, subtus glauca vel lutea in ramulis sparsi, solitarii. Oleum fructuum pro candelis inservit. Th.

9. *pedunculata*, fol. oppositis nervosis oblongis integerrimis, flor. solitariis pedunculatis. Thunb. jap. 177. Cum priore. Caul. fruticosus. Flor. versus apicem ramulorum sparsi.

10. *caustica*, fol. ovalibus rugosis perennantibus, flor. quadrifidis. Willd. p. 479. Hab. in Chili. Arbor. venenata.

11. *nobilis*, foliis lanceolatis coriaceis subundulatis venosis perennantibus, flor. subquadrifidis dioicis. Hab. in Italia, Hispan. et Oriente. h

12. *indica*, fol. venosis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis cicatricibus, flor. racemosis pubescentibus. L. Wendl. obs. bot. p. 21. t. 3. f. 22. Pluck. alm. 210. t. 304. f. 1. Seb. thes. 2. p. 90. t. 84. f. 6. Hab. in Madera, et in Canar. Cal. 6-partitus.

13. *foetens*, fol. venosis ellipticis acutis perennantibus, axillis venarum subtus villosis,



13. *lasis*, racemis elongatis compositis paniculiformibus. Ait. Kew. 2. p. 39. L. maderiensis. San. Hab. in ins. Canariis et in Madera. h

14. *Persea*, fol. ovatis coriaceis transverse venosis perennantibus, flor. corymbosis. Jacq. obs. 1. p. 38. Swartz. obs. 152. Hab. in America calida. Stam. 6. Fructus magnus pyriformis gratissimus.

15. *Borbonia*, fol. lanceolatis perennantibus, calycib. fructus baccatis. L. excl. synon. Catesb. Borbonia. Plum. gen. 4. Hab. in Carolina, Virginia. h

16. *caroliniensis*, fol. perennantibus ovali-lanceolatis inferne subglauces, pedunc. simplicib., flor. fasciculo subcapitato terminatis, cal. lacin. exterioribus duplo brevioribus. Michaux. Flor. 1. p. 243. Catesb. car. 1. p. 63. t. 63. In Carol. et Ludovisia. Bacc. subglobosa, utroque aculea. Var. ramul. et fol. glabris et pubescentibus.

17. *Catesbaei*, fol. perennantibus lato-lanceolatis ramulisque glabris, panic. brevipedunculatis, cal. subrotati lacin. subaequalibus. Michaux. p. 244. Catesb. 11. t. 28. Frut. 6-9-pedalis. Stam. perfecta 6. Bacc. ovata nigra. h

18. *martinicensis*, fol. oblongis acuminatis coriaceis perennantibus planis, racemis paniculatis, pedunc. calycibusque tomentosis. Willd. p. 481. Jacq. Collect. 2. p. 109. t. 5. f. 2. Hab. in sylvis Martinicae. Ad L. coriaceam accedere videtur. W.

19. *exaltata*, fol. lanceolato-ovatis subcoriaceis, perennantibus planis, flor. racemoso-corymbosis, fructu calyce urceolato glabro semitecto. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 702. Hab. in sylvis montium Jamaicae occidentalis. h

20. *alpigena*, fol. ovatis obtusis convexiusculis coriaceis, subtus venosis glaucescentibus, racemis erectis folio longioribus. Swartz. l. c. Hab. in summis montibus Jamaicae australis. h

21. *triandra*, foliis lanceolata-ovatis acuminatis membranaceis planis, floribus triandris, fructu calyce fere tecto. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 706. Hab. in montibus Jamaicae occident. Flor. numerosi decidunt steriles. Sw.

22. *sanguinea*, fol. lanceolato-ovatis acuminatis, subtus venoso-reticulatis, racemis terminalibus, lateralibusve erectis folio brevioribus, calyce turbinato fructum basi cingente. Swartz. l. c. Nectandra. Rothb. pl. surin. 10. Hab. Surinami. h

23. *surinamensis*, fol. lanceolato-ovatis acuminatis, ramis patentissimis, racemis filiformibus, lateralibus axillaribusve. Swartz. p. 708. Willd. p. 482. Nectandra bijuna. Hab. in sylvis Gujanae, Surin. etc. h

24. *hexandra*, fol. lanceolatis, racemis axillaribus, flor. hexandris. Swartz. l. c. Ajoave gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 311. t. 120. Hab. in sylvis interioribus Gujanae. h

25. *salicifolia*, fol. lanceolatis acuminatis planis perennantibus coriaceis, racemis. Swartz. p. 709. Hab. in India occidentali. h

26. *globosa*, fol. ovatis glabris, cym. pedunculatis axillaribus, drupa globosa. Lam. enc. 3. p. 751. Aubl. Gujan. p. 364. Sloan. hist. 2. p. 21. t. 166. f. 1. Hab. in Jamaica, St. Domingo.

27. *coriacea*, fol. ovatis acuminatis planis reticulato-venosis subcoriaceis, racemis erectis fol. brevioribus. Swartz. 5. p. 710. l. parvifolia. Lam. enc. 3. p. 451? Hab. in montibus Jamaicae. h

28. *Leucoxylo*, fol. oblongo-lanceolatis planis perennantibus, racemis axillaribus folio brevioribus, cal. fructiferis pedunculisque incrassatis verrucosis. Swartz. 2. p. 711. Hab. in sylvis montium Jamaicae. Cal. tumidus ex albedo-verrucosus. Sw. h

29. *membranacea*, fol. oblongis acuminatis venosis margine convexis coriaceo-membranaceis, racemis erectis folio brevioribus. Swartz. 2. p. 713. Hab. in montibus excelsis Jamaicae, Hispaniolae. L. Borboniae proxima. h

30. *patens*, foliis oblongis utrinque acuminatis planis membranaceis, racemis erectis folio longioribus, ramisque patentibus diffusis. Swartz. l. c. p. 715. Hab. in Jamaicae montosis. ©

31. *parviflora*, foliis oblongo ellipticis acuminatis planis membranaceis, racemis terminalibus axillaribusve folio brevioribus erectis confertis subpaniculatis. Swartz. p. 717. Cum priore cresc. Quoad figuram folior. et racemorum L. Leucoxylo similis. Sw.

32. *pendula*, fol. oblongis apice brevi attenuato venosis membranaceis subtus glaucescentibus, racemis laxis, fructibus pendulis nudis. Swartz. p. 713. Hab. in sylvis montium Jam. occident.

33. *floribunda*, fol. ovato-lanceolatis planis membranaceis venosis, racemis axillari-terminalibus folio longioribus paniculatis, pedunc. longissimis. Swartz. p. 721. Hab. in sylvis montium Jam. australis. h

F f

34. *lucida*, fol. oblongis serratis, ramulis ternis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus. Thunb. jap. 174. Hab. in Japonia. h.

35. *umbellata*, fol. ovatis serratis, ramulis umbellatis, flor. racemosis. Hab. in Japonia. h.

36. *aestivalis*, fol. venosis oblongis acuminatis, utrinque glabris, annuis, subtus rugosis, ramis supra axillaribus. L. Mill. dict. n.º 8. Hab. in Virginia ad ripas rivulorum. Frut. 8-10-pedalis. h.

37. *Diospyrus*, fol. oblongo-ovalibus inferne subtomentosis, flor. glomerato-umbellatis dioicis, pedicell. villosis. L. diospyroides. Michaux. Flor. 1. p. 243. L. melissaeifolia. Walt. ? Hab. in Amer. boreali. Virgata humilis, nudiflora ut plerumque species Amer. frigidioris. M. E.

38. *geniculata*, ramis divaricatis flexuosis, fol. deciduis lanceolatis, basi subtus barbatis, flor. umbellatis polygamis. Michaux. p. 244. Conf. L. axillaris. Lam. enc. 3. p. 453. Hab. in aquis stagnantibus Carolinae.

39. *Benzoin*, foliis enerviis ovatis utrinque acutis integris annuis, flor. glomeratis lateralibus. Comm. hort. 1. p. 189. t. 97. Arbor benzoinum redolens. Pluk. alm. 42. t. 139. f. 3. 4. L. *Pseudo-Benzoin*. Michaux. Fl. p. 243. Hab. in Virginia. h.

*Obs.* Succus, odore quidem *Benzoin*, sed hanc resinam non proferit, quae forte a Terminali Benzoin provenit.

40. *Sassafras*, fol. deciduis integris trilobisque flor. dioicis. L. Michaux. p. 244. Trew. Euret. t. 53. 60. Catesb. car. 1. p. 55. t. 55. Amer. boreali. Stam. flor. mas. 9, foem. 6. brevissima. M. Remedium optimum sicut sudorificum, aperiens.

995. *ANACARDIUM*. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5, reflexa. *Anther.* 9, filam. decimo castrato. *Nux* reniformis, supra receptaculum carnosum, s. pedunc. ampliatus pyriforme.

1. *occidentale*. L. Jacq. amer. 124. t. 181. f. 35. Blackw. t. 369. Cassuvium. Lam. ill. t. 322. Rumph. 1. t. 69. Rbed. t. 54. Hab. in Indis. Fol. simplicia magna. Flor. panicul. Pedunc. spongiosus esculentus. (Pomme d'acejou.)

*Obs.* Est planta polygama dioica. Fila-

mentum longius in aperis floribus sterile est, in clausis vero Antheram gerit magnam, torosam. Rott.

996. *PLEGORHIZA*. *Cal.* o. *Cor.* monopetala. *Caps.* 1-locularis, 1-sperma.

1. *adstringens*. Willd. Sp. II. p. 487. Enc. bot. 5. P. Guajcuru. Molin. chil. Hab. in Chili provinc. borealiorib. Fol. radical. caespitosa. Flor. terminales pedunculati plurimi. Semen unic. oblongum subcompressum. M. h.

997. *CASSYTA*. *Cor.* calycina, 6-partita. *Nect.* glandulis 3, truncatis, germen cingentibus. *Filam.* interiora glandulifera. *Drupa* 1-sperma.

1. *filiformis*, filiformis laxa. L. Lam. ill. t. 32. Volutella aphylla. Forsk. desc. 84. Calodium cochinchinense Loureiro. Fl. ed. Wild. 1. p. 303. Rumph. 5. t. 184. f. 4. Herba cuscutae; fructificatio lauri. L.

2. *corniculata*, ramis lignosis spinosis. L. Burm. ind. 93. t. 33. f. 1. Hab. in Celebis montib. inter truncos putridos. Fol. lanceolato-linearia. h.

998. *PALOVEA*. *Cal.* duplex: exterior urceolatus, 2-lobus, interior infundibuliformis coriaceus, 4-5-lobus. *Petala* 3? *Legumen*.

1. *guyanensis*. Aubl. 1. p. 365. t. 141. Lam. ill. t. 323. Ginannia Schreb. Gen. p. 231. Hab. in Guyana. Fol. simplicia. Flor. spicati bracteati, legum. longum.

*Obs.* Genus ulterius examinandum, cuius filament. decimum forte sterile; ac potius in Decandriam pone Bauhiniam collocandum; cfr. Juss. gen. pl.

999. *ERIOGONUM*. *Cal.* subcampanulatus, 6-fidus. *Cor.* o. *Sem.* 1, triquetrum, cal. tectum. (Flor. pedicellati e communi involucro campanulato proveniunt.)

1. *tomentosum*, caul. herbaceo dichotomo, fol. ternis verticillatis obovatis. Michaux. Flor. 1. p. 246. t. 24. Hab. in aridis, pinetis Carol. et Georgiae. Flor. albid. Genus Polygonum, sed vagina stipulari destitutum. M.

TRIGYNIA.

1000. RHEUM. *Cal. o. Cor. 6-fida*, persistens. *Sem. 1*, triquetrum.

1. *rhaponticum*, fol. obtusis glabris, venis subtus pilosiusculis, sinu baseos dilatato, petiolis supra sulcatis margine rotundatis. Ait. Kew. 2. p. 41. Willd. Sp. II. p. 488. Sabb. hort. 1. t. 34. Hab. in Thracia, etc.

2. *undulatum*, fol. subvillosis, petiolis aequalibus, Lin. Syst. veg. 385. Amoen. acad. 3. p. 312. t. 4. Hab. in China, Siberia. h

3. *palmatum*, fol. palmatis acuminatis. Lin. fasc. 7. t. 4. Hab. in China.

4. *compactum*, fol. sublobatis obtusissimis lucidis argute denticulatis glaberrimis. L. Hab. in Tartaria, China. Fol. coriacea s. compacta, petiol. sulcati. ¶

5. *tataricum*, fol. cordato-ovatis integris planis glaberrimis, petiolis semiteretibus angulatis, panic. sulcata. Lin. suppl. p. 229. Hab. in Tataria minore. Fol. magna radicalia humo incumbentia. L.

6. *Ribes*, fol. obtusissimis subverruculosis, venis subtus spinulosis, petiolis supra planis margine rotundatis. Ait. Kew. 2. p. 42. Desf. in Annal. d. Mus. p. 1. t. 49. Dill. elth. 191. t. 158. f. 192. (folium.) Hab. in Persia, Libano, Carmelo.

7. *hybridum*, fol. supra glabris, subtus pilosiusculis sublobatis acutis, sinu baseos angustato, petiolis supra obsolete sulcatis

margine rotundatis. Ait. Kew. 2. p. 42. Murr. Comm. goett. 1779. p. 7. t. 1. Hab. in Asia boreali. Petiol. plani. h

8. *leucorhizum*, fol. transverse ovalibus depressis, panic. seminifera divaricata, cal. foliolis binis multoties majoribus. Pall. in N. Act. petrop. 1792. p. 381. Hab. in montosis deserti Songarici in Siberia. Fol. radicalia ad terram appressa, per oram asperata denticulis minutissimis cartilagineo-rigidis. Petioli compressi laeves succul. P.

1001. PLÆA. *Cor. 6-partita*, patens. *Caps. subrotundo-trigona*, (tres conjunctæ?) trifolcularis: septo non manifesto. *Sem. numerosa*, oblonga, margini valvularum adnexa. (Spica spathis 1-floris.)

1. *tenuifolia*, fol. ensiformi-attenuatis longissimis. Michaux. I. p. 248. t. 25. Hab. in uilis sylv. Car. inferioris. Spath. convolutae amplexantes.

*Obs.* An cum *Toffelda*, potius conjungendum genus? à quo staminum numero solummodo differre videtur.

HEXAGYNIA.

1002. BUTOMUS. *Cal. o. Petala 6. Caps. 6*, polyspermæ.

1. *umbellatus*, L. Engl. bot. t. 631. Flor. dan. t. 604. Curt. lond. ic. Iuncus floridus. Bauh. Habit. in aquosis.

MONOGYNIA.

Amyris (Icica) enneandra. Gardenia Thunbergia. Guettarda speciosa. Brownacea enneandra.

# C L A S S I S X.

## D E C A N D R I A.

### M O N O G Y N I A.

Λευκίνοσμον, *filamentis distinctis, cor. nunc regulari, nunc irregulari, s. papilionacea.* (Gen. 1003-1033.)

1003. SOPHORA. *Cal.* 5-dentatus, campanulatus, superne gibbus. *Cor.* papilionacea: alis longitudine vexilli. *Legum.* moniliforme. (Fol. pinnata: foliol. plerumque numerosa.)

1. *tetraptera*, foliis pinnatis, foliolis lanceolato-oblongis villosiusculis, leguminibus membranaceo-quadrangulis, caule arboreo. Ait. Kew. 2. p. 43. Lam. ill. gen. t. 325. f. 3. Willd. Sp. II. p. 499. Hab. in N. Zeelandia. Arb. 10-12-pedalis, floret primo vere, antequam frondescit. h

2. *microphylla*, fol. pinnatis, foliol. minutis obovatis villosiusculis, leguminibus membranaceo-quadrangulis, caule arboreo. Ait. K. l. c. p. 43. Lam. ill. t. 325. f. 1. S. *tetraptera*. Lin. suppl. 230. Habitat cum priore.

3. *avescescens*, glabra, fol. pinnatis, foliolis oblongis glabris, caule herbaceo. Ait. p. 43. Hab. in Sibiria. Fruct. torulosus, glaber.

4. *alopecuroides*, fol. pinnatis, foliol. oblongis villosis, caule herbaceo. L. Mill. dict. n.º 1. Kniph. cent. 10. n.º 94. Dill. elth. 136. t. 112. f. 136. Buxb. cent. 3. p. 25. t. 46. Hab. in Oriente. h

5. *tomentosa*, fol. pinnatis, foliol. subrotundis tomentosis. L. Herm. lugdb. 168. t. 171. Lam. ill. t. 325. f. 2. Hab. in Zeylona. h

6. *occidentalis*, fol. pinnatis, foliolis subrotundis incanis subtomentosis. Swartz. obs. 154. Trev. Ehret. 27. t. 59. Hab. in America. An var. *præcedentis*? Fol. minus tomentosa, et fere subtus tantum subtomentosa. Sw.

7. *obliqua*, fol. abrupte pinnatis, subtus ferrugineis, foliol. parvulis basi obliquis, pedunc. verrucosis, Hab. in Amer. australi? (Herb. D. Thibaud.) Pedicelli villosi et fol. subtus subvillosa, hæc quasi quadrangula, superiora ovata. Legum. longum torulosum in pedicellis squamosis.

8. *retusa*, fol. pinnatis, foliol. retusis, junioribus leguminibusque tomentosis. Hab. in insula Franciæ. Commer. Foliol. ovato-lanceolata apice emarginata. Flor.?

9. *japonica*, fol. pinnatis, foliol. pluribus ovatis glabris, caule arboreo. L. Hab. in Japonia. Arbor alta, fol. nitidis. Petal. chroleuca (alba. L.) unguicul. rubellis. Flor. æstate.

10. *heptaphylla*, fol. pinnatis, foliol. septenis glabris. L. Rumph. amb. 4. p. 60. t. 22. Hab. in India. h

11. *monosperma*, fol. impari-pinnatis, pinnis 5-jugis, leguminibus monospermis, caule arboreo. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 272. Podalyria. Enc. bot. 5. p. 440. Hab. in insulis Indiæ occidentalis. Arbuscula decemipedalis cort. albid. Rami ferrugineo-tomentosi. Panic. terminales, ramosæ. Cor. magna, coerulesca, odorata. Sw.

12? *argentea*, petiol. diphyllis spiniscentibus, pedunc. racemoso-multifloris terminalibus. Pall. in Act. petrop. 2. 1792. p. 373. t. 9. Podalyria. Willd. Sp. II. p. 502. Hab. in Sibiria. Flores? Legum. planum 1-spermum. h

1004. *VIRGILIA*. *Cal.* 5-dentatus, gibbus. *Cor.* papilionacea. *Ale* nervillo breviores. *Legum* compressum, ant subteres, polyspermum. (*Fol.* pinnata.)

1. *capensis*, *fol.* pinnatis, *foliol.* lanceolatis subtus incanis, *legum.* tomentosis, caul. fruticoso. *Lam.* ill. gen. t. 326. f. 2. *Sophora*. *Lin.* *Podalyria*. *Willd.* p. 501. *Hab.* ad Cap. b. Sp. *Flor.* albi. *Fur.* *Amorrhæ.* C.

2. *azorea*, *fol.* pinnatis, *foliol.* ellipticis acutiusculis, inferne subnatis, *legum.* glabris. *Willd.* sub. *Podalyria*. *Lam.* ill. t. 326. f. 1. *L'Her.* *Stirp.* nov. t. p. 157. t. 75. *Cresc.* in *Abyssinia*. *h*

3. *secundiflora*, caul. fruticoso, *fol.* sparsis impari-pinnatis, *flor.* racemosis secundis. *Car. ic.* 5. p. 1. t. 401. *Broussonetia*. *Ortega* *decad.* 5. p. 61. t. 7. *Hab.* in *N. Hispania*. *Cor.* caerulea. *Legum.* tomentum.

1005. *PODALYRIA*. *Cal.* subbilabatus, 5-fidus. *Cor.* papilionacea, alæ vexilli longitudine. *Legumen* læve, ventricosum, polyspermum.

1. *australis* (*caerulea*), *fol.* ternatis petiolatis, *fol.* obovato-lanceolatis obtusis, stipulis lanceolatis petiolo duplo longioribus. *Willd.* *Vent. Hort. Cels.* p. 56. t. 56. *S. caerulea*. *Tr. Pl. rar.* t. 14. *S. australis*. *L.* *Hab.* in *Amer.* *Legum.* acuminata. *Flor.* caerulei.

2. *tinctoria*, *fol.* ternatis petiolatis, foliis subrotundo-obovatis obtusis mucronatis, stipulis obsolete oblongis acutis petiolo multoties brevioribus. *Willd.* *Legum.* parvulis longius stipitatis. *Mich.* *Lam.* ill. gen. t. 327. f. 1. *Hab.* in *Amer.* septentr. *Flor.* lutei. *Rad.* tincturam nigram præbet.

3. *alba*, ramis divaricatis flexuosis; *fol.* ternatis petiolatis, foliis oblongis obtusis, stipulis subulatis petiolo brevioribus, *legum.* obovatis. *Michaux.* p. 264. *Sophora* *alba*. *L.*

4. *villosa*, pubescens, *fol.* subsessilibus, *foliol.* ovali-oblongis obtusis; stipul. linearib., spica terminali. *Michaux.* *Flor.* t. p. 267. In *Car.* septentrion. *Flor.* pallidi. *Caly.* subsemi-quadrifidi. *M.*

5. *mollis*, pubescens, *foliol.* subrhomboides lanceolatis, stipul. foliaceis lanceolatis, spic. terminali. *Michaux.* *Hab.* in *Carol.* superiore. *Flor.* lutei.

6. *lupinoides*, *fol.* ternatis petiolatis,

*foliol.* elliptico-lanceolatis obtusis pubescentibus, stipulis lanceolatis petiolo longioribus. *Willd.* p. 504. *Lam.* ill. t. 327. f. 2. *Sophora* *lupinoides*. *L. Pall.* it. 2. p. 676. *Hab.* in *Camischatka*. *Flor.* lutei. *Stipulae* ensiform. *magnæ.*

7. *myrtyllifolia*, *fol.* simplicib. obovatis utrinque sericeis obtusis cum acumine, pedunculis unifloris, calycibus basi intrusis tomentosis. *S. rotundifolia*, *fol.* simplicib. obovatis sericeis, *flor.* axillaribus, pedunculis longitudine foliis. *Thunb.* *prod.* 79. *Sub Sophora.* *Retz.* obs. 1. p. 86. In *Cap. b. spei.*

8. *biflora*, *fol.* simplicibus obovatis subtomentosis, pedunc. bifloris. *L.* *Hab.* ad *Cap. b. spei.* *Flores* purpurascens.

9. *pedunculata*, *fol.* simplicibus ovatis tomentosis, *flor.* axillaribus, pedunc. folio longioribus. *Sub Sophora.* *P. buxifolia*. *Willd.* p. 565. *Lam.* ill. t. 317. f. 4. *Hab.* ad *Cap. b. spei.* *Tomentum* rufum. *Flor.* solitarii pedunc. longo insidentes. *h*

10. *hirsuta*, *fol.* simplicibus hirsutis, superioribus ovalis, inferioribus subrotundis, ramis teretibus, laciniis calycinis lanceolatis longitudine alarum. *Ait.* *Kew.* 2. p. 46. *Sub Sophora.* *Hab.* ad *Cap. b. spei.* *h*

11. *obcordata*, *fol.* simplicib. obcordatis sericeis candicantibus, floribus solitariis subsessilibus, *legum.* minimis 1-spermis. *Lam.* enc. 5. p. 445. *Ill.* gen. t. 327. f. 5. *Hab.* in *Senegal.* *Flor.* ignoti. *An Ononis?*

12. *cuneifolia*, *fol.* cuneiformib. emarginatis sericeis, pedunc. fol. brevioribus, cal. basi intrusis. *Vent. Hort. Cels.* p. 99. t. 99. *Hab.* ad *Cap. b. spei.* *Arbosc.* elegans, *fol.* sericeis et *flor.* lacteis distincta.

13. *perfoliata*, foliis suborbiculato-perfoliatis, *flor.* solitariis axillaribus, leguminib. subglobosis. *Michaux.* *Flor.* I. p. 263. *Crotalaria* *perfoliata*. *L.* *Habit.* in *Carolinae* aridis. *Flor.* lutescentes.

14. *uniflora*, pubescens, *flor.* solitariis axillaribus pedunculatis, *foliol.* lanceolatis, stipulis setaceis. *Mich.* I. c. *Sophora* *lanceolata*. *Walt.* ? *Hab.* in *Carol.* et *Georg.* *Fol.* sessilia. *Flor.* lutescentes.

*Obs. Gompholobium.* *Smith.* in *Act. soc. Linn.* IV. idem genus, saltem ob fructum, videtur.

1006. *PULTENÆA*. *Cal.* 5-dentatus, utrinque appendiculatus. *Cor.* papilionacea, alis vexillo  
F f 3

brevioribus. *Legumen* uniloculare, dispermum. (Fol. simplicia.)

1. *stipularis*, fol. linearibus mucronatis subciliatis, stipulis solitariis binerviis laceris. Smith. Nov. Holl. 1. p. 35. t. 12. Willd. p. 506. Totum genus provenit in Nova Hollandia seu Australasia.

2. *paleacea*, fol. linearibus mucronatis glabris, capitulo terminali, bracteis oblongo-acuminatis dentatis flore longioribus. Willd. h

3. *linophylla*, fol. linearib. obtusis mucronatis strigosis, capitulis terminalibus paucifloris, bracteis scariosis bifidis calyce multo brevioribus. Willd. l. c. Sert. hannov. p. 28. t. 18. h

4. *daphnoides*, fol. obovatis glabris mucronatis, floribus terminalibus capitatis. Willd. Wendl. obs. 43. Ej. Hort. Herrenb. p. 7. t. 18.

5. *villosa*, fol. oblongis pilosis, florib. axillaribus, caule villosa. Willd. h

6. *tuberculata*, fol. imbricatis ovato-linearibus glabris, tuberculis minutis exasperatis, flor. axillaribus fol. aequantibus. Ex Herb. D. Thibaud.

*Obs.* A praecedente, quantum ex brevi diagnosi divinare licet, diversa est Stipulae scariosae, margine villosae. Fol. conferta, convexa, summa parum ciliata, flor. obtegentia.

1007. *DAVIESIA*. *Cal.* angulatus, simplex (s. nudus), quinquefidus. *Cor.* papilionacea. *Legum.* compressum, monospermum.

1. *ericoides*, hirsuta, fol. sparsis linearibus, margine revolutis, flor. axillaribus. *Pultenaea* ericoides. Vent. Malm. p. 35. t. 35. Hab. ut sequens in Australasia.

2. *junceae*, petiol. teretibus: primordiis foliosis, fol. ternatis lanceolatisque deciduis superiorib. nudis longissimis. Vent. Choix de pl. l. p. 6. t. 6. (D. *denudata*.) *Sophora juncea*. Sert. Hannoveran. p. 9 t. 3. *Pultenaea juncea*. Willd. Fol. distincta rarius observantur.

1008. *ANAGYRIS*. *Vexillum* aequicarina breviores in corolla papilionacea. *Legumen*.

1. *foetida*. L. Lam. ill. t. 328. Hab. in

Europ. austral. montibus. Folia alternata ternata. Flores subracemosi. Willd. h

1009. *CERCIS*. *Cal.* 5-dentatus, inferne gibbus. *Cor.* papilionacea: vexillo sub alis brevi. *Legumen*. (Fol. integra.)

1. *Siliquastrum*, fol. orbiculatis cordatis. L. Lam. ill. t. 328. F. Duham. Ed. nov. t. 7. Hab. in Europ. australi.

2. *canadensis*, fol. cordatis acuminatis pubescentibus. L. Mill. ic. 2. Hab. in Virginia. Fol. ad axillas nervor. villosa. Flor. parvuli. M. h.

1010. *BAUHINIA*. *Cal.* 5-fidus, irregularis, deciduus. *Petala* petala, oblonga, unguiculata: superiore magis distante, omnia calyci inserta. *Legumen* longum, pedicellatum, sublanceolatum. (Filum. in nonnullis basi unita. Fol. biloba.)

1. *scandens*, caule cirrhifero. L. Willd. Sp. II. p. 508. Rheed. 8. t. 29. Hab. in Malabar, Amboina, Cumana. h

2. *parviflora*, racemis axillaribus terminalibus nutantibus, petalis linearibus, lobis foliorum rotundatis glabris. Vahl. symb. 3. p. 55. Hab. in India orient. Circhi nulli h

3. *racemosa*, flor. triandris extus staminibusque basi hirsutis, fol. subtus sericis, lobis rotundatis. Vahl. symb. 3. p. 56. t. 63. Lam. enc. 390. In India.

4. *aculeata*, caule aculeato. L. Jacq. amer. 119. t. 177. f. 2. Plum. gen. 23. ic. 14. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. h

5. *divaricata*, fol. ovatis, lobis divaricatis. L. Hort. cliff. t. 15. Lam. ill. t. 824. f. 3. Hab. in Amer. Stam. diadelph. L. h

6. *aurita*, fol. basi subtransversis, lobis lanceolatis porrectis trinerviis, petalis lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 48. Fol. ovato-cordatis lobis longissimis parallelis. Mill. ic. 41. t. 61.

7. *porrecta*, fol. cordatis, lobis porrectis acutis trinerviis, petalis lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 48. Jacq. hort. Schoenb. 1. p. 52. t. 100. Hab. in Jamaica, Hispaniola. Flor. diadelph. subdecandri.

8. *ungulata*, fol. ovatis, lobis parallelis. L. Hab. in America.

9. *variegata*, calyc. monophyllis rumpentibus; etalis sessilibus ovatis, folior. lobis ovatis obtusis. Ait. l. c. p. 48. Rheed. t. 1. 32. Hab. in Malabarica, Maderae arenosis. Petal. rosei, luteo-purpureoque variegati. h

10. *candida*, fol. cordatis subtus pubescentibus, lobis ovatis obtusis, calycibus superne attenuatis elongatis. Ait. Hab. in India orientali. h

11. *purpurea*, flor. triandris, foliorum lobis ovalibus obtusis. Ait. Kew. 2. p. 49. Rheed. t. 1. 33. Hab. in Indiae arenosis. Flor. purpurascens.

12. *tomentosa*, fol. cordatis, lobis semiorbiculatis tomentosis. L. Burm. zeyl. 44. t. 18. Rheed. t. 1. 35. Hab. in India. Cor. campanulata, albo-flavescens. h

13. *acuminata*, fol. ovatis, lobis acuminatis semi-ovatis. L. Rheed. t. 1. 33. Hab. in India orientali. Cor. campanulat., albae. Stamina diadelphe. L.

14. *gujanensis*, fol. binatis, foliol. acuminatis, caule cirrhoso. Willd. B. foliis petiolum divis, foliol. acutis. Lam. enc. p. 391.  $\beta$  *Outimouta*, caule cirrhifero, fol. cordiformibus bipartitis, subtus aureis. Aubl. guj. t. p. 375. t. 144. Hab. in sylv. Gujanae. h

15. *diphylla*, fol. binatis, foliol. inaequalibus obtusis 5-nerviis, cirrho simplici laterali. Symes it. ad Regn. avam. 3. Lond. 1800. t. 7. Hab. in India.

16. *rubescens*, fol. ad petiolum usque divis, foliol. semiorbiculatis obtusis. Lam. l. c. illust. gen. t. 329. f. 2. Hab. in Africa. Caul. nudus. h

17. *Pes caprae*, caul. arboreo, fol. cordatis glabris, lobis apice divergentibus, flor. racemosis. Cav. ic. 5. p. 3 t. 404. Collecta c. sequentibus in Amer. australi a cl. Née. Stam. diadelphe. h

18. *latifolia*, caul. fruticoso, fol. cordatis rotundato-bilobis, flor. racemosis glabris. Cav. l. c. p. 4. t. 405. Petal. alba. Caul. inermis. h

19. *rotundifolia*, fol. alternis subrotundis, lobis semiorbiculatis subtus tomentosis, flor. racemosis. Cav. t. 406. B. *tomentosae* affinis, sed stam. diadelphe et cor. campanulata. +

20. *lunaria*, fol. glabris cordatis, lobis subrotund., flor. racemosis tomentosis. Cav.

t. 407. Aff. B. *racemosae*. Stam. diadelphe. Cor. rubra.

21. *Pauletia*, caul. fruticoso aculeato, fol. ovatis bilobis, lobis obtusis, flor. geminis, in racemum foliosum dispositis. *Pauletia* aculeata. Cav. l. c. p. 6. t. 410. Cresc. in Panamæ viciniis. Petal. undulata et luteo-rubra uti in sequente.

22. *inermis*, inermis, caule arborescente, fol. ovatis, lobis acutis, flor. racemosis terminalibus. *Pauletia inermis*. Cav. p. 6. t. 409. Hab. in Acapulco viciniis.

Obs. Beat. auctor ex hac et antecedente specie genus peculiare constituit: ob *cal. persistentem*, petal. *linearia*, filum. *basi connexa*, in corpus crassum etc. et nomine viri probi nec non meriti condecoravit: sed characteris, quibus à Baubiniis, L. differunt, vix sufficere videntur, ut ab iis removeri possint.

23? *latifolia*, caule fruticoso, fol. lobis acutis, legum. latissimis. Cav. l. c. p. 5. t. 406. Hab. in Ins. Philippicis. Legum. semipedal. An *Hymenaea*?

1011. HYMENÆA. *Cal.* turbinatus coriaceus. 5-partitus. *Petala* 5, subæqualia. *Stylus* intortus. *Legumen* magnum, dilatatum, repletum pulpa farinacea. (Fol. conjugata.)

1. *courbaril*, foliol. coriaceis subaveniis basi inaequalibus, paniculae flor. pedunculatis. Vahl. eclog. 2. p. 30. Willd. Sp. II. p. 512. Lam. ill. gen. t. 330. f. 1. Pluk. alin. 66. t. 82. f. 3. Hab. in Amer. meridionali. Arb. resinosa, utilissima.

2. *venosa*, fol. membranaceis venosis, basi subæqualibus, paniculae flor. subsessilibus. Vahl. l. c. p. 31. Hab. in Cajenna. h

3. *verrucosa*, foliol. venosis basi inaequalibus, panic. flexuosa divaricata, pedunc. multifloris, legum verrucoso. Willd. Gaert. sem. 2. p. 306. t. 139. f. 7. Lam. ill. t. 330. f. 2. Hab. in Madagascar. h

1012. AFZELIA. *Cal.* tubulosus, limbo quadrifido, deciduo. *Petala* 4, unguiculata: summo maximo. *Filamenta* 2-suprema; sterilia. *Legum.* multiloculare. *Semina* basi arillata.

1. *africana*. Smith. in Act. soc. Linnaen. v. 4. Hab. in Africa æquinoziali. Arb. fol.

alterna abrupte pinnata. Flor. racemosi, sanguinei. Legum. lignosum. Sem. nigra: arillo coccineo. S.

1013. CYNOMETRA. Cal. 4-phyllus. *Antheræ* bifidæ. Legum. carnosum lunatum, 1-spermum. (Fol. conjugata.)

1. *cauliflora*, trunco florifero. L. Willd. Sp. II. p. 539. Rumph. 1. t. 52. Lam. ill. t. 331. Hab. in Indiis. Arb.

2. *ramiflora*, ramis floriferis. Rumph. 1. t. 63. Rheed. 4. t. 31. Cresc. in India. Arb. præcedente alior. Legum. minora.

1014. CASSIA. Cal. 5-phyllus. *Petalæ* 5, æqualia. *Antheræ* suprenæ 3, steriles; infimæ 3, rostratæ, in filam. longioribus incurvis. Legum. membranaceum, 2-valve.

1. *aphylla*, caule fruticoso dichotomo aphylo. Cav. ic. 6. p. 41 t. 561. Hab. in Amer. boreal. 2-petalis. Legum. lineare.

2. *diphylla*, fol. conjugatis, stipulis cordato-lanceolatis. Cav. ic. 5. p. 80. t. 600. f. 1. Hab. in India. ☉

3. *lanceolata*, fol. 11-jugis obovatis venosis, stipul. lanceolatis appressis, foliol. subaequantibus. Hab. in Cajenne. (Herb. Lamark.) Legum. longe pedicellatum, glabrum, stipul. longæ.

4. *rotundifolia*, fol. 2-jugis subrotundis, stipul. parvis ovato-acuminatis, petiol. subaequantib., caule subvillosa. Hab. in Amer. austr. (Herb. Juss.) Flor. axillares solitarii, pedicel. longis instructi.

5. *absus*, pilosa, fol. 2-jugis obovatis, gland. duabus subulatis inter infima. L. Senna quadrifolia, siliqua plana hirsuta, flore aureo sanguineo. Burm. zeyl. 212. t. 97. Hab. in Ind a, Aegypto. ☉

6. *viminea*, fol. 2-jugis ovato-oblongis acuminatis, glandula oblonga inter infima, spinis subpetiolaribus obsolete tridentatis. Sloan. jam. 2. p. 49. t. 189. f. 6. 7. Hab. in Jamaicae montibus altissimis interioris sylvaticis. h

7. *Apocouita*, arborescens, fol. 2-3-jugatis amphis ovali-oblongis, racem. axillaribus. Aubl. Gujan. p. 379. t. 146. Hab. in Gujana. Arb. satis alta.

8. *Tagera*, procumbens. fol. 3-jugis glandulis petiolaris, stipulis ciliatis cordatis acuminatis. L. Rheed. mal. 2. p. 103. t. 52? Hab. in India.

9. *Tora*, erecta, fol. 3-jugis obovatis, exterioribus majoribus, glandula subulata inter inferiora. L. C. *timensis*, Lam. Dill. clth. 72. t. 83. f. 73. β C. *humilis*, siliquis foeni græci. Plum. Spec. 18. t. 72. f. 2. Hab. in India. ☉

10. *dicapsularis*, fol. 3-jugis obovatis glabris: interioribus rotundioribus, glandula interjecta globosa. Th. Merian. sur. t. 32. Plum. spec. 18. t. 76. f. 1. Hab. in India. h

11. *emarginata*, fol. sub-4-jugis ovatis subintegris, florib. racemosis irregularibus, caule arboreo. Swartz. obs. 157. Sloan. hist. 2. p. 44. t. 180. f. 1 s. 3. 4. Hab. in Caribæis. h

12. *obtusifolia*, fol. 3-jugis ovatis obtusiusculis. L. Dill. clth. 71. t. 62. f. 72. Hab. in Cubæ et Jamaicae ruderalis.

13. *sennoides*, fol. 3-jugis, foliol. averse ovatis, glandula obtusa inter infima, stipulis subulatis, caule arboreo. Jacq. ic. rar. 1. t. 70. Collect. 1. p. 74. W. Hab. in India orientali h

14. *acuminata*, fol. 3-jugis, foliol. ovatis acuminatis, glandula sessili inter foliola. Willd. p. 517. C. *apocouira*. Aubl. guj. t. p. 375. t. 146. Hab. in Gujanæ sylvis. h

15. *corymbosa*, fruticosa, fol. 3-jugis lanceolatis subfalcatis glabris, glandula inter infima, corymbis pedunculatis axillaribus, leguminibus cylindricis. Lam. enc. 644. Hab. in Bonaria. C. *falcata* hortulanorum. h

Obs. Sub nomine C. *falcata* frequens hic colitur, a qua tamen diversa. C. *crassifolia* et *corymbosa*? Orteg. decad. 10. p. 122-124, ab hac non differre videntur.

16. *longisiliqua*, fol. 4-jugis, foliol. extimis lanceolatis, glandula subulata infra infima interque extrema. Lin. suppl. p. 230. Hab. in America. Legum. tetragonum, hirtum brevius. h

17. *falcata* (herbacea?) fol. 4-jugis ovato-lanceolatis retrofalcatis, glandula bascos petiolorum. L. Hort. cliff. 159. Hab. in America. ☉ +

18. *sericea*, fol. sub-4-jugis ovatis hirsutis, glandula subulata inter foliola, peduncul. 4-floris, leguminibus tetragonis. Swartz.



Flor. 2. p. 724. *C. sensitiva*. Jacq. ic. var. 3. t. 459. Collect. 2. p. 362. Hab. in gramin. subalpinis Jamaicæ. ☉

19. *occidentalis* (*foetida*), fol. sub-5-jugis ovato-lanceolatis margine scabris, exterioribus majoribus, glandula baseos petiolorum. L. *C. americana foetida*. Tourn. institut. Comm. hort. 1. p. 51. t. 26. Sloan. jam. hist. 2. t. 176. 3. 4. Pedunc. multiflori. Hab. in America. Legum. angusta linearis falcata. Michaux. ☉

20. *linearis*, herbacea glabra, fol. sub-6-jugis lanceolato-ovalibus acutissimis, gland. basilari, pedunc. subbifloris, legum. linearib. rectis. Michaux. Flor. 1. p. 261. Hab. in Carol. Præcedenti nimis affinis, floratione præcocior. ☉

21. *grandiflora*, fol. 5-jugis ovatis margine pubescentibus, pedunc. axillarib. brevibus subtrifloris, gland. globosa sessili. *C. chinensis*. Lam. enc. 1. p. 644. Rumph. t. 2. 23. Hab. in China. Flore magno, flavo memorabilis. L. ☉

22. *ornithopoides*, fol. 4-jugis, foliol. ovato-cuneiformibus mucronatis, piloso-ferrogineis, legum. linearibus articulatis erectis tomentosis, mucrone recurvo terminatis. Lam. 1. c. Hab. in Amer. meridion. Gland. conico-filiformis ad singulum fol. par. L.

23. *torosa*, fol. 5-jugis, foliol. ovato-oblongis, gland. subpetiellata baseos petiolorum, legum. cylindricis, utrinque juxta suturas torulosis, torulis transversalibus. Cav. Descr. de Las. plant. p. 131.

24. *Canca*, fol. sub-6-jugis, foliol. ovato-lanceolatis subciliatis, gland. sessili in petiolor. basi, flor. subumbellatis, legum. subquadrangularibus. Cav. 1. c. Hab. in Cumana.

25. *planisiliqua*, fol. 5-jugis ovato-lanceolatis glabris, glandula baseos petiolorum. Plum. Sp. 1. 77. Hab. in Amer. calidiore. h

26. *patula*, fol. 5-6-jugis oblongis acutiuscul. glabris, glandula baseos petiolorum, ramis lacribus. Ait. Kew. 2. p. 51. Hab. in India occidentali. h

27. *atomaria*, fol. 5-jugis ovatis submentosis, petiolis terebibus eglandulatis. L. Hab. in America. Petioli atomis subterrugineis adpersi. Fol. utrinque viridia, tactu tomentosa. L.

28. *lineata*, fol. 5-jugis oblongiusculis subtus pubescentibus subaequalibus, gland. obsoleta sub infimis, peduncul. unifloris.

Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 726. Hab. in ruderalis et cultis Jamaicæ. ☉

29. *pilosa*, fol. 5-jugis eglandulatis, stipul. semicordatis acuminatis, caule stricto piloso. L. Hab. in Jamaicæ austr. aridis. Flor. pentandri.

30. *arborescens*, fol. sub-5-jugis ellipticis glabris, glandula oblonga inter inferiora, stipulis subulato-falcatis, racemis axillaribus. Vahl. symb. 3. p. 56. Hab. in India orientali. h

31. *Senna*, fol. sejunctis subovatis, petiolis eglandulatis, legum. reniformibus. Hab. in Aegypto. ☉

32. *orientalis*, fol. 5-jugis lanceolatis aequalib., gland. supra basi petiolorum. Cassia lanceolata. Forsk. Aegypt. 85. n.º 58. Lam. enc. 1. 646. Cassia orientalis. Tabern. ic. 507. *Senna alexandrina*, fol. 4-jugis lanceolatis acutis. Mill. Hab. in Oriente. Legum. arcato. Cum priore confusa; videtur *Senna vera* officinarum. Saltem antecedente multo efficacior est.

33. *ruscifolia*, fol. subsejugis ovato-lanceolatis glabris, glandula ad petioli basin, tomento compresso marginato. Willd. Jacq. ic. var. 1. t. 71. Collect. 1. p. 43. Hab. in Maderæ rupibus. h

34. *bisflora*, fol. 6-jugis oblongiusculis glabris, inferioribus minoribus, glandula subulata inter infima, peticellis subbifloris. L. Hort. cliff. 159. Plum. spec. 18. ic. 78. f. 1. Hab. in America. h

35. *chinensis*, fol. pinnatis ex quatuor ad septem parib., foliol. lanceolatis, gland. supra basin costæ, legum. transversim costato. Jacq. ic. var. 1. t. 73. Collect. 1. p. 64. Hab. prope Peking in China. h

36. *multiglandulosa*, fol. 6-jugis ovali-oblongis obtusis pilosis, exterioribus majoribus, gland. subulatis omnium parium, siliquis linearibus. Ait. Kew. 2. p. 52. Jacq. ic. var. 1. t. 72. Collect. 1. p. 62. Hab. in ins. Teneriffa. h

37. *hirsuta*, fol. 6-jugis late ovatis acuminatis lanatis. Lin. suppl. 237. Hab. in America.

38. *glauca*, fol. 6-jugis, foliol. ovatis infra glaucis et venosis, gland. oblongis pluribus, legum. linearibus rostris compressis et mucronatis. Lam. enc. 1. p. 647. Rheed. 6. p. 17. t. 9. et 10. Hab. in Pondichery.

39. *tomentosa*, fol. 6-8-jugis, foliol. oblongo ovatis, basi obliquè mucronatis subtus tomentosis, gland. pluribus subulatis, racemis axillaribus, legum. tomentosis. Lam. l. c. et Lin. suppl. p. 231? Racini quoque flavo-tomentosi. Hab. in Brasilia.

β? *albida*, fol. 2-7-jugis, oblique ovalibus sericeis, gland. subulatis, pedunc. subquadrifloris, legum. obsolete 4-gonis hirsutis. Orteg. dec. p. 92. Hab. in N. Hispania.

40. *serpens*, fol. 7-jugis, flor. pentandris, caul. filiformibus prostratis herbaceis. L. Hab. in J. moicæ pascuis aridis. ☉

41. *mexicana*, fol. 7-jugis, foliol. obtusiusculis pubescentibus ciliatis, glandula cylindrica inter infima. Willd. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 41. t. 203. Habitat in Mexico.

42. *angustifolia*, fol. 7-jugis lanceolatis, extimis majoribus, petiolis eglandulatis, caule fruticoso. Vahl. symb. 1. p. 29. Hab. in Arabia. A. C. Senna differt legum. non curvatis. V. h

43. *ligustrina*, fol. 7-jugis lanceolatis, extimis minoribus, glandula baseos petiolorum. L. Dill. elth. 350. t. 259. f. 338. Hab. in Virginia, Bahama. h

44. *florida*, fol. 7-jugis ovali-oblongis glabris emarginatis eglandulosis, flor. racemosis, bract. spatulatis mucronatis. Vahl. symb. 3. p. 57. Hab. in India orient.

45. *stipulacea*, fol. sub-8-jugis ovato-lanceolatis, glandula inter inferiora, stipul. ovatis maximis. Ait. Kew. 2. p. 52. Feuill. peruv. 3. p. 56. t. 42. Hab. in Chili. h

46. *alata*, fol. 8-jugis obovali-oblongis, exterioribus minoribus, petiolis eglandulatis, stipulis patulis. L. Veget. 328. Swartz. obs. C. *herpetica*, Jacq. obs. 2. p. 24. t. 45. f. 2. Rumph. 7. t. 8. Legum. margine crenato-membranaceo. Fol. magna emarginata. Hab. in Amer. calidiore. T

47. *siamea*, fol. 8-9-jugis ovato-oblongis obtusis glabris, petiol. eglandulatis, corymb. pedunculatis axillaribus terminalibusque. Lam. enc. 1. p. 548. Hab. prope Siam. Comm. Legum. planum marginatum. +

48. *marilandica*, fol. 8-jugis ovato-oblongis aequalibus, glandula baseos petiolorum, flor. spicato-peniculatis. L. Dill. elth. 351. t. 250. f. 319. Hab. in Amer. boreali. Legum. lineare arcuatum.

49. *fastigiata*, fol. 9-jugis oblongis gla-

bris, gland. pedicellata inter omnia foliola, flor. racemosis. Vahl. symb. 3. p. 57. Hab. in India. h

50. *frondosa*, fol. 9-jugis ovali-oblongis glabris obtusiusculis, glandula cylindrica inter inferiora, petiola basi eglandul. Ait. Kew. 2. p. 35. C. *cristata*, Jacq. ic. rar. t. 74. Collect. 1. p. 82. Hab. in India occidentali. h

51. *tenuissima*, fol. 9-jugis oblongis, glandula subulata inter infima. L. Hab. in Havana. h

52. *virgata*, fol. 10-jugis ovato-lanceolatis villosis, glandula petiolarum pedicellata, pedunc. unifloris foliolis longioribus. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 728.

53. *angustisiliqua*, fol. 10-jugis lanceolatis, gland. pedicellata inter infima, legum. angustis et compressis. L. l. c. p. 649. Burm. amer. t. 78. f. 2. Hab. in America australiore. Flor. magni, racemosi. h

54. *sophera*, fol. 10-jugis lanceolatis, glandula baseos oblonga. L. Burm. zeyl. 213. t. 98. Rumph. 5. t. 97. f. 1. Rheed. 2. t. 52. Hab. in India umbrosis. Cor. albedo-flavescentis venis fuscis. Legum. subsalcatum, lineare.

55. *bracteata*, fol. 10-jugis oblongis obtusis eglandulatis, racemosis elongatis, bract. magnis ovatis imbricatis, legumine quadrangulati compresso. Lin. suppl. 232. Hab. in Surinamo. Fol. pelalia. Racem. maximus. Bract. magnae imbricatae nervosae, caducae. L.

56. *auriculata*, fol. 12-jugis obtusis mucronatis, glandulis subulatis pluribus, stipulis reniformibus barbatis. L. Pluk. alm. 341. t. 314. f. 4. Hab. in India.

57. *brevifolia*, ramosissima subglabra, fol. 12-jugis obovatis, pedunc. lateralibus unifloris, fol. longioribus. Lam. encycl. 1. p. 652. Hab. in Madagascar. Commers. Fol. minutissima, approximata. h

58. *angustissima*, fol. multijugis, foliol. perexiguis aristatis tomentosis, stipul. lanceolato-setaceis, pedunc. bipartitis, caul. hirsuto. Lam. l. c. p. 651. Hab. in ins. Java. Commers.

59. *niaricans*, fol. 14-jugis lineari-oblongis obtusissimis mucronatis, glandula baseos sessili. Vahl. symb. 1. p. 30. Hab. in Arabia felici. h

60. *polyphylla*, fol. multijugis, foliol.

ellipticis obtusis ciliatis, glandula oblonga, sessili inter infima, pedunc. subbifloris. Willd. p. 527. Jacq. ic. rar. 3. t. 460. Collect. 4. p. 104. Hab. in insula Porto-Rico. h

61. *Chamaecrista*, fol. multijugis, glandula petiolaris subpedicellata, stipulis ensiformibus. Hab. in Jamaica, Barbados, Virginia. Flor. subgemini. Fol. pennaeformia. Petala 2-superiora macula purpurea. Legum. pubesc.

62. *glandulosa*, fol. multijugis multiglandulatis, stipulis subulatis. L. Breyn. cent. 64. t. 24. Hab. in Jamaica, Guadeloupe. Flor. hexandri, anth. 2-longissimis. L.

63. *mimosoides*, fol. multijugis linearibus: glandula bascos petiolorum obsoleta, stipulis setaceis. L. Hab. in Zeylona. Stip. lanceolatae, seta terminatae. Stam. 2, quorum 7 cum antheris oblongis. Legumina linearis. L.

64. *fasciculata*, glabriuscula, fol. subjugis, gland. sessili, fascic. multifloris, legum. glabellis arenatis adscendentibus. Michaux. Flor. 1. p. 262.

65. *microphylla*, fol. multijugis linearibus mucronatis, gland. inter infima, stipulis lanceolatis mucronatis, pedunc. solitariis unifloris, caule ramoso virgato. Willd. p. 529. Hab. in ins. St.-Crucis. Loment. compressum, lineare, affinis praecedenti, W. +

66. *pumila*, fol. multijugis, basi ciliatis mucronatis, glandul. petiolaris pedicellata, caul. ramosissimo hirsuto. Lam. l. c. p. 651. Pluk. alm. 251. t. 120. f. 1. Hab. in Ind. orient. Flor. minimi. Legum. compressum, subvillosum.

67. *flexuosa*, fol. multijugis, stipul. dimidiato-cordatis. L. Breyn. cent. 65. t. 23. Hab. in Brasilia. ☉

68. *capensis*, fol. multijugis, foliol. linearibus, caule flexuoso-erecto villosulo. Thunb. prod. 79. Hab. ad Cap. b. spei.

69. *niticans*, tota pubescens, fol. multijugis, flor. pentandris, caule erectiusculo. Pluk. alm. 341. t. 314. f. 5. Rumph. 6. t. 61. f. 1. Hab. in Amer. bor. Flor. minuti, immaculati. ☉

70. *procumbens*, fol. multijugis eglandulatis, caule filiformi procumbente. L. Roth. Catal. 2. p. 43. Comm. petrop. t. 11. Pet. sic. 243. Hab. in Indiis, apricis siccis. Stam. 10, glandula in fol. aetate evanescit. Roth. ☉

1015. *CATHARTOCARPUS*. Cal. 5-partitus, deciduus. Cor. regularis, 5-petala. Filam. inferiora arcuata. Legum. longum, teres, lignosum, pluriloculare: loculis pulpa farctis.

1. *Fistula*, fol. 5-jugis ovatis acuminatis, petiolis eglandulosis, petalis planis ovatis, Cassia *fistula*. Lin. Gaertn. de Fr. 2. p. 313. Lam. ill. t. 332. Rumph. 2. t. 21. Hab. in India, Aegypt et America. Arb. magno, Juglandem referens, flor. pulchros profert.

Obs. Usus fructus ejusque pulpa notissimus, unde nomen huic generi a reliquis Cassiis diverso inditum.

2. *Bacillus*, fol. 2-jugis ovatis obliquis, glandula inter infima. Gaertn. l. c. Houst. Reliq. t. 17. Cassia bacillaris. Lin. Suppl. p. 231. Willd. Sp. II. p. 614. Hab. in Surinamo. Frut. 12-pedal. Racem. axillares. Legum. subcarvum, acum., filiformi terminatum. L.

3. *grandis*, fol. 20-jugis oblongis obtusis, subbilocericis eglandulatis. Lin. Suppl. p. 230, sub Cassia. Cassia *brasiliiana*. Lam. enc. 1. p. 649-650. C. *mollis* Vahl. Willd. p. 526. Breyn. cent. t. 21. Hab. in Surinamo, Brasilia et St.-Domingo. Arbor robusta, legum. 1-semi-pedale, ultra unc. latum, superne canaliculatum, venis prominulis, pulpa ingrata, amara. L.

4. *javanicus*, fol. 12-15-jugis, foliolis ovatis obtusis glabris, legum. subcylindricis longissimis. Lam. l. c. sub Cassia. Vahl. symb. 3. p. 58. Willd. Sp. II. p. 527. Commel. hort. 1. p. 217. t. III. C. *Fistula sylvestris*. Rumph. Amb. 2. p. 88. t. 22. Hab. in Java et in ins. Moluccens. Fruct. pulpa molli destitutus dicitur. Fol. eglandulosa, basi obliqua. V.

1016. *PARKINSONIA*. Cal. 5-fidus. Petala 5, plana, ovata: superiore ovato-subrotundo, ungue erecto longissimo. Legum. torosum.

1. *aculeata*. Lin. Lam. ill. t. 336. Jacq. amer. Ed. pict. t. 129. Hab. in Amer. calidiore. Arb. 12-petalis, elegantissima. Fol. rachis compressa, lata, cui adhaerent foliol. minutissima.

1017. *TACHIA*. Cal. turbinatus, 5-partitus. Cor. 5-petala, subaequalis. Stam. calyci inserta,

longa, omnia foecunda, tria superiora breviora. *Legumen*.

1. *paniculata*, fol. pinnatis, foliol. oppositis. Cubaea. Schreb. Willd. p. 530. Tachigali paniculata. Aubl. guj. t. p. 372. t. 143. f. 1. Lam. ill. t. 339. Hab. in sylvis Gujanae cum sequente. *h*

2. *trigona*, fol. pinnatis, foliol. alternis. Aubl. t. p. 374. t. 143. f. 2. Praecedentis varietas?

*Obs.* Nomen Cubaea cum Cobaea nimis est consonum, ut assumi possit.

1018. *CÆSALPINIA*. *Cal.* 5-partitus, lacinia infima majori subfornicata. *Petala* 5. *Stam.* basi lanata, omnia foecunda. *Legum.* compressum.

\* *Inermes*.

1. *elata*, inermis, foliol. linearib. obtusis cum acumine, corymbis compositis, calycibus coriaceis tomentosis, petalis fimbriatis, *stam.* longissimis. Swartz l. c. Hab. in India. *Filam.* atropurpurea, basi villosa.

2. *coriaria*, inermis, foliol. linearibus obtusis, racemis paniculatis, calycibus glabris, *staminib.* corolla duplo longioribus. Willd. p. 532. Poinciana coriaria. Jacq. amer. 173. t. 175. f. 36. Ed. pict. 250. f. 35. Hab. in maritim. Curacao et Carthagenae. *h*

*Obs.* Legum. matura ab incolis, quibus *Libidibi* audiunt, ad coadensenda coria addibentur. *J.*

3. *brasiliensis*, inermis, foliol. ovato-oblongis, rachidibus pubescentibus, calycibus tomentosis, *staminibus* corolla brevioribus. Swartz. Hab. in Carolina, Jamaica, et Brasilia. *h*

\*\* *Aculeatae*.

4. *bahamensis*, ramis aculeatis, foliol. obovatis emarginatis, flor. albidis. Lam. enc. t. p. 461. Catech. Carol. 2. p. 51. t. 51. Hab. in ins. Bahama et Jamaica. Fol. duplicato-pinnata.

5. *vesicaria*, caule aculeato, fol. obcordatis subrotundis, racem. spicatis. Lam. enc. t. p. 461. Lin. Sp. pl. p. 545. *C. bijuga*. Swartz. Willd. Sp. II. p. 530. Poinciana bijuga. Lin. Sloan. hist. 2. p. 50. t. 181. f. 2, 3. Pluk. t. 165. f. 1. Hab. in Jamaica. Legum. nigra, sulcata. *h*

6. *pulcherrima*, aculeata, foliol. ob-

longo-ovalibus emarginatis, calycibusque glabris, corymbis simplicibus, petalis fimbriatis, *staminib.* longissimis. Swartz. obs. p. 166. Poinciana pulcherrima. L. Jacq. amer. 122. et ed. pict. t. 120. Lam. ill. t. 333. Hab. in Indis. Flor. speciosi, e croceo et coccineo variegati, aut solum croci. *Stam.* longissima incurva. Frutex 12-pedalis.

7. *echinata*, caule ramisque aculeatis, foliol. ovatis obtusis, leguminib. echinatis. Lam. enc. t. p. 461. Pseudo-Santalum rubrum, s. arbor Brasilia. Bauh. pin. p. 393. Hab. in Brasilia. Arb. grandis (*Bois de Bresil*), cujus lignum tincturae communi rubrae inservit. *h*

8. *Sappan*, caule aculeato, foliol. oblongis, inaequilateralibus (obliquis) emarginatis. Roxb. corom. t. p. 17. t. 16. Lam. ill. t. 335. f. 1. Lignum Sappan. Rumph. 4. t. 21. Rheed. G. t. 2. Hab. in Indis. Arb. 10-15-pedalis, cujus lignum coctum tincturam praebet, primo nigram, sed, alumine admixto, amoene rubram.

9. *Crista*, aculeata, foliol. ovalibus, racem. simplicibus, petalis ovatis, calyce glabro brevioribus, *staminibus* calyce longioribus. Swartz. l. c. Plum. gen. t. 68. Hab. in Jamaica. *h*

10. *mimosoides*, caule petiolis pedunculisque aculeatis, foliol. oblongis obtusis parvis, leguminibus lanuginosis. Lamerck. enc. t. p. 462. Ej. ill. t. 335. f. 2. Rheed. G. t. 8. Hab. in India. Est sensitiva ut nonnullae Mimosae. Racem. hispidulus. Flor. magni, flavi. *L.*

1019. *HOFFMANSEGGIA*. *Cal.* 5-partitus, persistens. *Petala* 5, unguiculata patentia, superiore latiore, basi glandulosa. *Filam.* pilosoglandulosa. *Stigm.* clavatum. *Legumen* lineare, compressum, polyspermum. (Petioli axillis glandulis pedicellatis.)

1. *salcaria*, caul. suffruticoso decumbente, fol. bipinnatis, pinnul. ovatis glaucis. Cav. ic. 4. p. 64. t. 392. Larrea glauca. Orteg. Hab. in montibus altis Amer. meridionalit. Legum. arcuatum.

2. *trifoliata*, subcaulis, petiolis radicalibus trifoliatis, fol. pinnatis. Cav. l. c. p. 61. t. 393. f. 1. Hab. in Amer. meridion. aridis. Legum. rectum, villosum.

1020. *POMARIA*. *Cal.* turbinatus, 5-partitus, caducus. *Petala* 5, sub-

unguiculata : superiore concavo breviori. *Filam.* inferne hirsuta. *Stigm.* capitatum. *Legum.* 1-loculare, dispermum.

1. *stendulosa*, caule fruticoso, fol. tota glandulis nigri obsita. Cav. ic. 5. p. 2. t. 402. Hab. in N. Hispania. Fol. bipinnata, alterna. Flor. racemosi, lutei. h

1021. **ZUCCAGNIA.** *Cal.* persistens, 5-partitus. *Petala* 5, ovata : superiore concavo. *Filam.* inferne pilosa. *Stigm.* infundibuliforme. *Legum.* subovatum compressum, 1-loculare, 1-spermum.

1. *punctata*, fol. pinnatis, pinnul. ellipticis alternis punctatis glutinosi, flor. racemosis terminalibus. Cav. ic. 5. p. 2. t. 403. Hab. in montib. chilensibus. *Legum.* crinitum. h

*Obs.* An tria haecce Cavanillesii genera, inter se et priori nimis affinis, potius in unum conjungi debent?

1022. **GUILANDINA.** *Cal.* 1-phyllus, hypocrateriformis. *Petala* calycis collo inserta, subaequalia. *Legumen* subrhomboideum, 1-loculare. *Sem.* dura.

1. *Bonduc*, aculeata, pinnis ovatis, foliol. aculeis solitariis. L. Lam. enc. 1. p. 434. et ill. t. 336. Rumph. 5. t. 48. Hab. in Indiis. h

2. *Bonduccella*, aculeata, pinnis oblongo-ovatis, foliol. aculeis geminis. L. Lam. l. c. Rumph. 5. t. 49. f. 1. Rheed. 2. t. 22. Hab. in Indiis. h

3. *Nuga*, caule inermi, fol. petiolo primario subtus aculeis geminis. L. Rumph. 5. t. 50. Hab. in Amboina. +

4. *paniculata*, ramis petiolisque aculeatis, florib. paniculatis chracetatis, leguminibus monospermis laevib. Lam. enc. 435. Rheed. 6. t. 19. Hab. in Malabar et N. Bibernia. h

5. *axillaris*, aculeata, fol. pinnatis, flor. axillaribus subsolitariis, leguminibus monospermis villosis. Lam. l. c. Rheed. 6. t. 20. Hab. in India.

1023. **MORINGA.** *Cal.* 5-partitus. *Petala* calyci inserta, inaequalia. *Caps.* longissima, 3-valvis. *Semina* alata.

1. *zeylanica*, flor. semidecandris, fol.

subbipinnatis, foliol. inferioribus ternatis, leguminib. trigonis. Willd. Sp. II. p. 536, et Vahl. symb. 1. p. 30. Sub nomine generico *Hyperanthera* usque species. *M. oleifera*. Lamarck. enc. 1. p. 398, et ej. ill. gen. t. 337. Jacq. ic. rar. 3. t. 461. Collect. 2. p. 371. Rumph. 1. t. 74, 75. Hab. in Zeylona, America et Aegypto, locis arenosis. Arb. cujus radix et legum. comeduntur. Oleum ex seminib. expressum non rancidum fit. *Legum.* longissimum, triquetrum. h

2. *arabica*, florib. semidecandris, fol. bipinnatis, apice simpliciter pinnatis. Vahl. symb. 1. p. 30. (Hyper. semidecandria.) *Gymnocladus arabica*. Lam. enc. 1. p. 733. Hab. in Arabia. Stam. s. fertilia, caps. cylindrica.

1024. **ADENANTHERA.** *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Anthera* apice exteriore glandulae globosae affixa. *Legum.* membranaceum.

1. *pavonina*, fol. decompositis utrinque glabris, foliol. alternis. L. Willd. Sp. II. p. 350. Jacq. coll. 4. p. 212. t. 23. Lam. ill. t. 334. Hab. in Ind. h

2. *falcata*, fol. decompositis subtus tomentosis. L. Rumph. 3. t. 117. Cum prior. h

3. *scandens*, fol. pinnatis lujngis, foliol. ovatis obliquis glabris, circhis terminalibus bifidis. Forst. prodr. n° 1117. Hab. in ins. Mallicollo. h

1025. **CADIA.** *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, aequalia, obcordata. *Legumen* polyspermum:

1. *purpurea*. Forsk. descr. p. 90. L'Herit. in Magaz. encycl. 5. p. 29. *Spondonea tamarindifolia*. Desfont. in Decal. philos. 7. p. 259. Hab. in Arabia felici. Fol. imparipinnata, foliol. numerosissimis. Cor. recepta alba dein rosea.

1026. **PROSOPIS.** *Cal.* hemisphaericus, 4-dentatus. *Petala* 5, lineari-lanceolata, apice recurva. *Filamenta* petalor. basi adnata, capillacea. *Stigma* simplex. *Legumen* polyspermum, longum.

1. *spicigera*, L. Burm. ind. 102. t. 25. f. 3. Roxb. corom. 1. p. 45. t. 61. Lam. ill. t. 340. Hab. in India. Arb., ramis spinosis. Fol. alterna conjugata, foliol. pinnatis, sine impari. Flor. parvi. *Legum.* lineare tereusculum, edule. R.

1027. *EPERUA*. *Cal.* monophyllus, limbo 4-partito. *Petalum* 1, subrotundum, laterale basi convolutum. *Filam.* basi incrassata, barbata, 5-sterilia. *Legumen*.

1. *falcata*. Aubl. guj. 1. p. 369. t. 142. Lam. ill. 338. Panzera. Willd. Sp. pl. p. 540. Hab. in sylvis Gujanac ad ripas. Arb. 60-pedalis. Fol. pari-pinnata. Panic. e racemis simplicibus elongata.

1028. *HEMATOXYLON*. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capr.* lanceolata, 1-locularis, 3-valvis: valvis navicularibus.

1. *campechianum*. L. Lam. ill. t. 340. Willd. Sp. pl. p. 547. Catesb. car. 3. p. 66. t. 66. Hab. in Campeche Americæ. Fol. abrupte pinnata, foliol. obcordatis, flor. spicati parvi. h

1029. *CRUDIA*. *Cal.* monophyllus, limbo 4-fido. *Cor.* o. *Filamenta* basi dilatata. *Samara* subdisperma, orbiculata.

1. *spicata*, fol. pinnatis, foliol. oblongo-lanceolatis acuminatis. Willd. p. 539. *Apaltona* spicata. Aubl. guj. 1. p. 383. t. 147. Hab. in sylvis Gujanac. h

2. *aromatica*, fol. simplicibus ellipticis acuminatis. Willd. Touchiroa aromatica. Aubl. guj. 1. p. 385. t. 148. Lam. ill. t. 339. Hab. in sylvis Gujanac. Racemi axillares ut in præcedente, cui simillima. W

1030. *DETARIUM*. *Cal.* 4-fidus. *Petala* o. *Filam.* alterna breviora. *Drupa* orbiculata, mollis. *Nuc.* compressa, 1-sperma, fibris reticulata.

1. *senegalense*. Gmel. Syst. II. p. 700. Juss. gen. pl. p. 402. Arb. fol. alterna, impari-pinnata. Flor. racemosi. Hab. ad Senegal.

1031. *COPAIFERA*. *Cal.* o. *Petala* 4. *Legumen* ovatum. *Semen* 1, arillo ovato.

1. *officinalis*. L. Jacq. amer. Ed. pict. Lam. ill. t. 342. Hab. in Brasilia, Antillis. Fol. alterna, impari-pinnata. Arb.

1032. *MYROXYLON*. *Cal.* campanulatus, 5-dentatus. *Petala* 5, supremo reliquis majore. *Ger-*

*men* corolla longius. *Legumen* apice monospermum.

1. *peruiferum*, fol. abrupte pinnatis bi-jugis, foliol. suboppositis. Willd. p. 546. Lin. suppl. p. 233. Hern. mex. p. 51. cum ic. Hab. in America meridionali. Arbor pulcherrima, balsamum peruvianum præstat. Racemi axillares. Calyx viridi-canescens, cinctus extra orificium petalis antherisque albis, intra continens legumen viride, quod singularem faciem representat. L.

2. *pedicellatum*, fol. impari-pinnatis subquinquejugis, foliol. alternis, legumino pedicellato. Willd. Myrospermum pedicellatum, leguminibus pedicellatis. Lam. enc. 4. p. 191. illust. t. 341. f. 1. Hab. in Peru. h

3. *frutescens*, fol. impari-pinnatis septemjugis, foliol. alternis, legumine sessili. Willd. Myrosp. frutescens. Lam. l. c. f. 2. Jacq. amer. pict. t. 118. Hab. Carthagenæ. Frut. 8-10-pedalis. Cor. exalbido-rosea. Fruct. scatet balsamo ingrato et forti. J.

1033. *SCHOTIA*. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, calyci inserta, lateribus invicem incurvamentibus, clausa. *Legumen* pedicellatum.

1. *speciosa*. Jacq. ic. rar. 1. t. 75. Collect. 1. p. 93. Gujatum afrum, fol. multijugis acutis. L. Hab. in Senegal et ad Cap. b. Sp. Fol. octojuga. Foliol. ovato-oblongo, perennia. Stipulae ramis adpressæ. Semina ab incolis comeduntur. h

1034. *TOLUIFERA*. *Cal.* 5-dentatus, campanulatus. *Petala* 5, infimo maximo, obcordato. *Styl.* nullus.

1. *balsamum*. Hab. in America.

*RUTACEÆ* (gen. 1035-1042.) præcipue distinguuntur petal. 4-5, foliol. calycinis alternis, fructu supero lobato, s. pluricapsulari, et embryone plano in perispermio carnoso. Fol. sunt sæpius opposita, plerumque composita, nunc nuda, nunc stipulis donata. Nonnullæ odore forti resinoso distinctæ.

1035. *GUAIAECUM*. *Cal.* 5-fidus, inæqualis. *Petala* 5, calyci inserta. *Capr.* angulata, 3 s. 5-locularis.

1. *dubium*, fol. conjugatis oblongo-lan-

ceolatis obtusis. Forst. prod. n°. 186. Willd. p. 558. Hab. in insula Tongatabu. h

2. *officinale*, foliol. bijugis obtusis. L. Lam. ill. t. 342. Sloan. hist. 2. p. 133. t. 222. f. 3. Hab. in Hispaniola, Jamaica, Antill. Arb. ligno duro; caps. triangulares.

3. *sanctum*, foliol. multijugis obtusis. L. Blackw. ill. t. 350. f. 3, 4. Comm. hort. p. 171. t. 88. Pluk. alm. 139. t. 95. f. 4. Hab. in Am. Caps. 4-angulares. Fol. sub-8-juga, ovato-oblonga mucronata. Lam. enc. 2. p. 615.

4. *verticale*, fol. subquinquejugis ovali-oblongis brevicauminatis, petal. verticalib. Orteg. Dec. p. 93. Hab. in N. Hispania. Ramosissimum: Pet. carerulea, unguib. contortis. Pericarp. turbinatum, pedicellatum. Sem. funiculo appensa. O.

1036. ZYGOPHYLLUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Filam. basi squamulosa: squamis germen conniventibus. (Nectarium 10-phyllum. L.) Caps. ovato-pentagona, 5-locularis.

1. *simplex*, fol. simplicibus sessilibus cylindricis. L. Portulacoides. Forsk. flor. aegypt. p. 88. et ej. ic. t. 12. B. Hab. in Arabia.

2. *cordifolium*, fol. simplicibus oppositis sessilibus subrotundis. Ait. Kew. 2. p. 60. Lin. suppl. 232. Hab. ad Cap. b. spei. h

3. *Fabago*, fol. conjugatis petiolatis, foliol. obovatis, pedunc. erectis, calyce glabro, petalis indivisis, caule herbaceo. Willd. Sp. II. p. 560. Lam. ill. t. 345. f. 1. Hab. in Syria, Mauritania, Sibiria. Caps. prismaticeae. h

4. *foetidum*, fol. petiolatis, foliol. obovatis, flor. nutantibus, petalis reflexis incisis. Schrad. et Wendl. sert. hannov. p. 17. t. 9. Ad Cap. b. sp. Pet. subaurantia basi purpurea. h

5. *retrofractum*, fol. conjugatis petiolatis, foliolis ovatis, caule fruticoso ramisque retrofractis. Thunb. prod. 80. Hab. ad Cap. b. spei. h An a priori diversum?

6. *maculatum*, fol. conjugatis petiolatis, fol. lineari-lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 60. Cum priore. Petala lutea, macula cordata rubra ad basin, omnium distincta.

7. *coccineum*, fol. conjugatis petiolatis: foliol. cylindricis carnosissimis laevibus. L. Z. desertorum. Forsk. ic. t. 11. Shaw. afr. f. 231. Hab. in Africa, Sibiria.

8. *album*, fol. conjugat. petiolatis, foliol. clavatis carnosissimis arachnoideo-incanis. L. Lin. dec. 1. t. 8. Desf. atl. 1. p. 338. Forsk. it. t. XII. f. A. Hab. in Aegypto, Barbaria et Canariis. Procumbens cano-album. Petala lato-lanceolata.

9. *Morgsana*, fol. conjugatis subpetiolatis, foliol. obovatis, caule fruticoso, caps. subtetraptera. Lam. enc. 2. p. 442. Burm. afr. 7. t. 3. f. 2. Dill. elth. t. 116. f. 141. Hab. ad Cap. b. spei, cum 5 sequentibus. Caulis articulatus. h

10. *capense*, fol. conjugatis sessilibus: foliol. obovatis, caule fruticoso. Lam. enc. 2. p. 443. Flor. rubris et fol. sessilibus a seque differre dicitur. †

11. *microphyllum*, fol. conjugatis, subsessilibus, foliol. ovatis laevibus, caule fruticoso. Thunb. prod. 80. Foliol. ovalibus minutis, capsulis emarginatis. Lin. suppl. p. 232. Fol. subpetiolata. Petal. capillares solitarii. Petala flava. Caps. retusa. L.

12. *prostratum*, fol. conjugatis scabris, caul. decumbente, genicul. hirtis. Thunb. prod. app. p. 139.

13. *sessifolium*, fol. conjugat. sessilibus, foliol. lanceolato-ovalibus margine scabris, caule fruticoso. L. Dill. elth. t. 116. f. 142. Burm. afr. 4. t. f. 1. Petala crenata. h

14. *spinosum*, fol. conjugatis sessilibus, foliolis linearibus, carnosissimis supra planis, caule fruticoso. L. Burm. afr. 5. t. 2. Folia quaternaria, linearia, carnosissima, supra plana, subtustereuscula. Corollae nutantes, luteae. An a priori satis distinctum?

15. *aestuans*, fol. conjugatis sessilibus, foliol. obovatis retusis. L. Hab. in Surinam. Caules diffusi. Supulae quinae, reflexae. L.

16. *arborescens*, fol. pinnatis, caule arboresc. Jacq. amer. 130. t. 83. Ed. pict. t. 24. Hab. in Amer. calidiore. Arb. 40-pedalis, speciosissima, cujus lignum durum et sub terra sepulchrum non corrumpitur, et veluti in lapidem mutare fertur. J.

17. *lanatum*, fol. ternatis, foliol. subtus papillois, florib. pentagynis, caule flexuoso articulis lanato. Willd. Hab. in Sierra Leone. Foliola subrotunda mucronata. Pedunc. axillares. W. †

1037. FAGONIA. Cal. 5-phyllus. Petala 5, cordata. Caps. 5-locularis, 10-valvis: loculis 1-spermis. Sem. compressa.

1. *cretica*, spinosa, fol. ternatis, foliol.

lanc. L. Lam. ill. t. 346. Hab. in Oreta, et in montib. prope Mascar. Desf. Caul. patens, dichotomus, nodoso-geniculatus.

2. *hispanica*, inermis. L. Mill. dict. Hab. in Hispania. Planta dubia, an var. prioris? ♂

3. *arabica*, spinosa, foliol. linearib. convexis subvillosis apic. brevioribus. L. Lam. enc. 2. p. 447. Hab. in Arabia et Barbaria. Facie Ulicis.

4. *indica*, fol. simplicibus ovalibus, spinis geminis. L. Burm. ind. 102. 34. f. t. Hab. in Persia. †

1038. **TRIBULUS**. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5, patentia. *Stylus* 0. *Caps.* 5, gibbæ, plerumque spinosæ, polyspermæ.

1. *maximus*, fol. subquadrijugis: exterioribus majoribus, pericarpis decaspermis muticis. L. Jacq. ic. rar. 3. t. 462. Collect. 4. p. 110. Willd. p. 566. ill. t. 346. f. 2. Hab. in Jamaicae aridis.

2. *lanuginosus*, fol. subquinquejugis subaequalibus, seminibus bicornibus. L. Burm. zeyl. 265. t. 106. f. 1. Hab. in Zeylona.

3. *terrestris*, foliol. sexjugis subaequalibus, seminib. 4-cornibus. L. Lam. ill. t. 346. f. 1. Moris. 2. t. 8. f. 9. Hab. ad semitas arva in Europ. australi et Barbaria. ☉

4. *cistoides*, foliol. octojugat. subaequalibus. L. Jacq. Schoenbr. 1. p. 54. t. 103. Coll. suppl. p. 109. Pluck. alm. t. 67. f. 4. Hab. in Amer. australiore. ☿

1039. **LARREA**. *Cal.* 5-phyllus, deciduus. *Petala* 5, unguiculata. *Germen* 5-sulcatum. *Nuces* 5, 1-spermæ.

1. *nitida*, caule fruticoso, fol. oppositis-pinnatis nitidis, fructib. glabris. Cav. ic. 6. p. 40. t. 559. Hab. cum sequentib. in Amer. meridion. Flor. axillares, solitarii, luteo-virentes.

2. *divaricata*, fol. oppositis sessilib. bilobis: lobis divaricatis. Cav. l. c. t. 560. f. 1. Fol. villosa. Stip. in tuberculum incrassatae.

3. *cuneifolia*, fol. oppositis subsessilib. cuneatis apice bilobis: setula inter lobulos prominente. Cav. l. c. p. 41. t. 560. f. 2. Fol. villosa.

1040. **DICTAMNUS**. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, patula. *Filamenta* punctis glandulosis adspersa. *Caps.* 5, coalitæ.

1. *Fraxinella*.  $\alpha$  *albus*.  $\beta$ . *purpureus*. Lam. ill. t. 344. Fraxin. Rencal spec. 122. t. 121. Hab. in Germania, Gallia, Italia. Flores ut plurimum purpurei. ☿

1041. **RUTA**. *Cal.* 4-5-partitus. *Petala* concava. *Receptac.* punctis melliferis decem cinctum. *Caps.* lobata. (Petala quibusdum 4 et Stam. 8.)

1. *graveolens*, fol. supradecompositis, foliol. oblongis, terminali obovato, petal. integerrimis. Willd. Sp. 2. p. 542. Lam. ill. 345. t. 1. Blackw. t. 7. Hab. in Europa australi, Alexandria, Mauriania. Flos primarius 5-fidus, reliqui quadrifidi.

2. *montana*, fol. supradecompositis, foliol. omnibus linearibus, petal. integerrimis. Willd. Ait. Kew. 2. p. 57. R. tenuifolia. Desf. atl. 1. p. 336. R. legitima. Jacq. ic. rar. 1. t. 76. collect. 1. p. 74. Sylvestris. Mill. Thuill. paris. Hab. in collibus Helvetiae, Eur. austral. et Barbariae.

3. *chalepensis*, fol. supradecompositis, foliol. lanceolatis, petal. ciliato-dentatis. Hab. in Arabia. Simillima R. graveolenti. ♀

4. *angustifolia*, fol. inciso-pinnatifidis, laciniis lineari-cuneatis, flor. corymbosopatulis, petal. ciliatis. Mor. hist. 2. S. p. t. 35. f. 8? Hab. in ruderalis Montspeli. (Thiebaud.) R. montanae quoad fol. subsimilis.

5. *pinnata*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis, basi attenuatis serrato-crenatis, petal. integerrimis. Ait. Hab. in Canariis.

6. *patavina*, fol. ternatis, sessilibus linearib. integerrimis, basi attenuatis. Willd. Mich. N. gen. pl. 22. t. 19. Hab. prope Patavium. Petala plana, integra. ♀

7. *linifolia*, fol. simplicibus lanceolatis glabris, filamentis ciliatis, caule simplici herbaceo. Willd. Lam. ill. t. 345. f. 2. Barrel. t. 1186. Hab. in Hispania, in ruderalis, et in agro Tunetano. ♀

8. *villosa*, fol. lanceolatis petiolatis cauleque villosis, petal. oblongis, flam. basi lanatis Tableau de la côte occid. de la mer Caspienne, n<sup>o</sup>. 15. R. fruticulosa. Delabillard. Willd. In Oriente. ☿

9. *tuberculata*,



c. *tuberculata*, fol. lineari-lanceolatis, subtus caulibus, capsulisque tuberculatis. For. arab. p. 86. Hab. in Aegypto. (Herb. Juss.) Caul. ramosissimus. *h*

10. *rosmarinifolia*, fol. linearib. subtus punctatis, caul. ramosissimo. Hab. in Hispania. Herb. Juss. Rad. fusiformis. *h*

1042. ERIOSTEMON. *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5, sessilia. *Filam.* plana, ciliata. *Anth.* pedicellatae terminales. *Styl.* e basi germinis. *Caps.* 5, nectario toruloso insidentes. *Sem.* arillata.

1. *australasium*, fol. lanceolatis subrugosis. Smith. in Act. soc. Linn. v. 4. Hab. in Australasia. *h*

2. *capense*, fol. ovato-linearibus, subtus glandulosis. Diosma uniflora. L. Vid. hujus operis, p. 247. Hab. ad Cap. b. sp. *h*

1043. CROWEA. *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5, sessilia. *Filam.* plana subulata, pilis connexa. *Anth.* filam. adnatæ. *Styl.* e basi germinis. *Caps.* 5, coalitæ. *Semina* arillata.

1. *saligna*, fol. lanceolatis glabris, flor. axillarib. rubris. Andrew Repos. t. 79. *C. saligna*, caul. ramisque triquetris glabris, fol. alternis lanceolatis integerrimis flor. solitariis axillaribus. Vent. Hort. Malmaisis. t. 7. Hab. in Australasia. *h*

1044. QUASSIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petal.* 5. *Nect.* 5-phyllosum. *Drupæ* 5, distantes, bivalves, monospermæ, receptaculo carnosio insertæ. (Flor. etiam monoici aut 5-andri.)

1. *amara*, flor. racemosis hermaphroditis, fol. impari-pinnatis; foliol. oppositis sessilibus, petiol. articul. alato. Lin. suppl. 235. Lam. ill. t. 343. f. 1. Hab. in Surinamo. Frutex nec arbor. W. Petiolus more citri alatus.

*Obs.* Lignum Quassiae venale non ex hoc frutice venit, sed ab excelsa, quæ minus amara. Vid. Willd. l. c.

2. *Simaruba*, flor. paniculatis monoicis, fol. abrupte pinnatis, foliol. alternis subpetiolatis, petiolo nudo. Lin. suppl. 234. Lam. ill. t. 343. f. 2. *Simarouba amara*. Aubl. guj. 2. p. 859. t. 331, 332. Hab. in locis

arenosis Amer. australioris. Corticæ lætescens amarus. Panic. axillares amplæ. *Drupæ* ovatae, subnigrae, receptaculo carnosio lateraliter affixæ.

3. *excelsa*, flor. polygamis pentandris paniculatis, fol. impari-pinnatis, foliol. oppositis petiolatis, petiolo nudo. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 74a. Hab. in submontosis Jamaicae et Caribæarum. *h*

1045. SIMABA. *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5. *Filam.* basi dilatata, pilosa. *Caps.* 5, coriaceæ, 1-spermæ, receptaculo carnosio insertæ.

1. *guyanensis*. Aubl. guj. 1. p. 400. t. 153. *Zwingera amara*. Willd. Sp. II. p. 569. Hab. in sylvis Gujanæ. Frut. octopetalis. Folia alterna impari-pinnata. Pedunculi triflori, axillares. Flor. albidæ. W.

1046. GOMPHIA. *Cal.* 5-phyllus. *Petal.* 5. *Anthera* subsessiles. *Drupæ* 2 s. 5, monospermæ, receptaculo subrotundo, carnosio insertæ.

1. *angustifolia*, fol. lanceolat. extrorsum serratis, panicula terminali, petalis calyce longioribus. Vahl. symb. 2. p. 49. Willd. p. 570. Hab. in India orientali. *h*

2. *nitida*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis serratis, panicul. terminalib., calycib. corollæ aequalibus. Vahl. symb. 2. p. 49. Hab. in sylvis Jamaicae. *h*

3. *jabotapita*, racemis terminalib., petalis calyce triplo longioribus, drupis receptaculo immersis, foliis ovato-lanceolatis serratis. Willd. Ochna jabotapita. L. Plum. amer. 42. ic. 153.

4. *laevigata*, fol. lanceolatis obtusissimis integerrimis emarginatis, panicula terminali. Vahl. l. c.

5. *laurifolia*, racem. terminalibus, drupis receptaculo superimpositis, fol. oblongis utrinque acuminatis integerrimis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 741. Hab. in montib. Jamaicae. *h*

1047. THRYALLIS. *Cal.* 5-partitus. *Petal.* 5. *Caps.* 3-cocca. *Sem.* mucronato-incurva.

1. *brasilensis*. L. Martegr. bras. 97. f. 3. Hab. in Brasilia. Ramis articulatis. Fol. opposita, ovata. Stipulae setaceæ. Flor. parvi lutei.

1048. CODON. *Cal.* 10-partitus.  
*Cor.* campanulata, 10-fida. *Caps.*  
bilocularis, polysperma.

1. *Royeni*. L. Hab. ad Cap. b. sp. Fol.  
alterna, ovato-cordata.

1049. POTALIA. *Cal.* turbinatus,  
5-partitus. *Cor.* 1-petala, 10-  
fida. *Filam.* annulo nectarifero  
inserta. *Bacca* sexsulcata, 3-  
locularis, polysperma.

1. *amara*. Aubl. gujan. t. p. 304. t. 151.  
Lam. ill. t. 348. Nicandra. Willd. II. p. 541.  
Hab. in Guian. sylv. Corymb. pauciflorus.  
*Cor.* alba. T.

HESTERIA Decandree (gen. 1050-  
1055).

1050. LIMONIA. *Cal.* 5-partitus.  
*Petala* 5. *Bacca* 3-locularis.  
*Sem.* solitaria.

\* *Spinosae.*

1. *monophylla*, fol. simplicib., spinis  
solitariis. L. Willd. p. 541. Roxb. Corom. 2.  
p. 59. t. 83. Hab. in India orientali. Folia  
oblonga-ovata. Pedunc. axillares. h

2. *trifoliata*, fol. ternatis, spinis gemi-  
nis. L. Jacq. ic. rar. t. 463. Collect. 3. p. 176.  
Andrew. t. 143.  $\beta$  inermis, foliis sessilibus.  
Willd. Sonnerat. it. p. 101. t. 63. Hab. in  
India orientali. Flor. trifidi.

3. *acidissima*, fol. pinnatis, petiolis ala-  
tis, spinis solitariis. L. Lam. enc. 3. p. 517.  
Rump. 2. t. 43. Hab. in India. h

4. *crenulata*, foliol. hijugis oppositis,  
petiol. alatis foliaceis. Roxb. l. c. Rheed. 4.  
p. 31. t. 14. Hab. in oris Coromandelicis. h

\* \* *Inermes.*

5. *lucida*, inermis, fol. simplicibus,  
pedunc. axillaribus. Forst. prod. n<sup>o</sup>. 191.  
Hab. in insula Mallicollo.

6. *mauritiana*, fol. subternatis, foliolis  
ovatis integris subacuminatis, panic. axilla-  
ribus. Lam. enc. 3. p. 517. Hab. in insula  
Mauritii. Habitus Rhois. h

7. *arborea*, fol. alternis quinatis, foliol.  
linearibus serratis laevibus. Roxb. l. c. Hab.  
in Coromandelia.

8. *pentaphylla*, inermis, fol. subqui-  
natis, ovatis integris. Retz. obs. 5. p. 24.

Roxb. l. c. p. 60. t. 84. Hab. in India. Racemi  
breves compositi. h

9. *madagascarensis*, fol. pinnatis, fo-  
liolis alternis subquaternis lanceolatis den-  
tatis, panic. brevib. axillaribus. Lam. Hab.  
in Madagascar. Kbus refert.

10. *minuta*, inermis, fol. pinnatis, ra-  
cemis corymbosis terminalibus. Forst. prodr.  
n<sup>o</sup>. 190. Cresc. in ins. Amicorum. h

1051. FERONIA. *Cal.* 5-partitus,  
planus. *Pet.* 5, oblonga. *Filam.*  
basi dilatata, villosa, disco hy-  
pogynio elevato inserta. *Bacca*  
corticosa, multilocularis: *locul.*  
carne spongiosa obvolutis.

1. *elephantum*. Roxb. corom. p. 21. t. 197.  
Correa in Act. Soc. Lin. 5. p. 224. Hab. in  
Indiae sylv. et montosis.

1052. HEISTERIA. *Cal.* 5-fidus.  
*Petala* 5. *Drupa* cal. colorato  
maximo.

1. *coccinea*. Jacq. amer. 126. t. 81. Ed.  
pict. p. 64. t. 122. Hab. in Martinicae sylv.  
ad torrentes.

1053. MURRAYA. *Cal.* 5-parti-  
tus. *Cor.* 5-petala, campanulata.  
*Nect.* germen cingens. *Bacca*  
1-sperma.

1. *exotica*. Murr. comment. goett. 9.  
p. 186. t. 1. Chalcas. Mant. p. 68. Burm. ind.  
p. 104. Lam. ill. t. 352. Rumph. 5. t. 18. f. 2.  
Hab. in India orientali. Fol. impari-pin-  
nata. h

1054. KOOKIA. *Cal.* 5-dus, infe-  
rus. *Cor.* 5-petala, aequalis,  
infera. *Pomum* 5-loculare: lo-  
culis 1-spermis.

1. *punctata*. Willd. Sp. II. 558. Jacq.  
Schoenbr. 1. p. 53. t. 101. Lam. ill. t. 354.  
Hab. in China. Arb. ramul. petiolisque ver-  
rucoso-punctatis. Panic. divaricata. Fol. pin-  
nata. h

1055. BERGERA. *Cal.* 5-partitus.  
*Cor.* 5-petala. *Stigma* turbina-  
tum. *Bacca* 2-sperma.

1. *Koenigii*. L. Roxb. Corom. 2. p. 9.  
t. 112. Rumph. 1. p. 149. t. 53. f. 1. Hab.

in India orientali. Arb. Fol. alterna, pinnatae. impari. Corymbi terminales.

1056. GÆRTNERA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala, lacero-ciliata. *Filam.* basi sub cohaerentia : unicuique reliquis longius. *Samara* monosperma, quadrialata : alis inaequalibus.

1. *racemosa*. Roxb. *Corom.* 1. p. 19. t. 18. *Molina racemosa*. Cavan. *Diss.* 9. p. 435. t. 263. *Lam. ill.* 1. 349. *Hiptage* *Jadahlota*. Gaert. *sem.* 2. p. 169. t. 116. *Banisteria benghalensis*. L. B. *unicapularis*. *Lam. enc.* 1. p. 36. *Hab.* in Ind. orient. h

1057. TRIGONIA. *Cal.* 6-partitu. *Petala* 5, inaequalia : supremum basi intus foveolatum. *Nectarium* : squamae 2, ad basin germinis. *Filam.* quaedam sterilia. *Caps.* leguminosa, trigona, 3-locularis, 3-valvis.

1. *villosa*. *Fol.* obovatis subtus tomentosis. Vahl. *Ecl. amer.* 2. *Aubl. gujan.* p. 188. t. 149. *Lam. ill.* 1. 347. *Hab.* in Cajenna.

2. *laevis*. *Fol.* oblongis utrinque glabris nitidis. Vahl. l. c. *Aubl.* p. 390. t. 150. *Hab.* in Gujana.

*Obs.* Cum Vahlis rectius ad *Monodelphium* referendum est hoc genus.

1058. ADENOSTEMUM. *Cor.* 6-petala. *Stamina* triplici serie gradatim minora. *Glandulae* 2 ad basin singuli filamenti. *Stigm.* 2-3. *Drupa* 1-locularis. *Nux* durissima, 2-3-locularis. *Nuclei* compressi.

1. *nitidum*. *Fol.* oblongo-lanceolatis nitidis. *Syst. veg.* *Flor. peruv. et chil.* p. 108. *Lucuma* Keule. *Molin. hist. chil.* p. 202. *Hab.* in R. Chil. nemorib. Arb. procera, semperflorens. *Fol.* resinosa et fruct. sapidissimi. *Lignum* ponderosum, venis pulcherrimis variegatum.

*Obs.* Auctores libri allegati hoc genus *Gomortegam* nuncupant in honorem C. Ortegae, ad quem vero planta quaedam jam a Linnæo denominata extat.

1059. GODOVIA. *Cal.* 5-phyllus, coloratus. *Nectar.* cilia in 5-series. *Anth.* poris geminis de

biscentes. *Caps.* 5-angularis. *Semina* imbricata, alata.

1. *obovata*. *Fol.* obovatis crenatis. *Godya*. *Syst. veg.* *Flor. Per. etc.* p. 101. *Cresc.* in Peruv. nemorib. Arb. pulchra, 2-ulnaris, ligno durissimo.

2. *spatulata*. *Fol.* spatulatis crenatis, floribus polyandris. L. c. p. 102. Arb. stamina 40 fere. *Lignum* variis utensilibus inservit. h

MYLIACEAE. (Gen. 1060-1066.) Dignoscuntur petalis 4-5, ungue latiusculo et stam. filamentis in urceolum, apice dentato-antheriferum (Nectarium. L.) coalitis. Genera illa hinc potius *Monodelpha*. *Stylo* simplici. *Fruct.* est vel bacca aut capsularis, quae saepe valde grandescit, multilocularis. *Fol.* simplicia, aut composita, exstipulacea.

1060. TREMANTHUS. *Cal.* campanulatus, inferus. *Petala* revoluta, punctata. *Nect.* tubulosum. *Anth.* post dehiscentiam punctis setaceo-stellatis asperæ. *Drupa* obovata. (*Foveolaria*. Ruiz et Pavon. *Strigilia*. Cavan.)

1. *cordata*. *Fol.* cordato-oratis acutis (subtus helvolis), foveolis glanduliferis. *Syst. veg.* *Flor. peruv. et chilens.* p. 99. Sub *Foveolaria* uti sequentes. *Hab.* in Peruv. nemorib. Arb. procera.

2. *ovata*. *Fol.* ovato-oblongis acuminatis glabris, foveol. minimis glanduliferis. *Syst. veg.* l. c. p. 100. Cum priore Arb. excelsa.

3. *oblonga*. *Fol.* oblongis acuminatis glabris, racem. 1-2-nis erectis. *Syst. veg.* l. c. *Arbor* 30-ulnaris.

*Obs.* *Fol.* in tribus hisce speciebus foveol. glanduliferis sunt instructa.

4. *ferruginea*. *Fol.* oblongis breviter acuminatis subtus lanuginosis glandulatis, racemis solitariis erectis. L. c. *Hab.* in nemoribus alius frigidis. *Lanugo* duplex, stellato-penisilliformis, exterior ferruginea decidua, interior alba.

*Obs.* *Strigilia racemosa*. Cav. *diss.* 7. p. 353. t. 201. Willd. *Sp.* 11. p. 351, eadem ac ultima species videtur.

1061. QUIVISIA. *Cal.* 4-5-dentatus. G g 2

*Cor.* 4-5-petala. *Nectar.* cylindricum, truncatum. *Antheræ* margini nectarii insertæ. *Caps.* 4-locularis: loculis submonospermis.

1. *racemosa*, *decandra*, fol. alternis oblongis integris utrinque attenuatis racemis axillaribus. *Gilbertia* decandra. Willd. Sp. II. p. 551. *Decandra*. Cavan. diss. 7. p. 367. t. 211. Hab. in insula Mauritiæ. h

2. *ovata*, fol. alternis obovatis obtusis integris, pedunculis unifloris axillaribus, fructibus tomentosis. Willd. Cavan. diss. 7. p. 368. t. 212. Hab. in ins. Borbonia. h

3. *heterophylla*, fol. ovatis integris aut sinuato-pinnatifidis, floribus axillaribus binis. Cav. l. c. t. 213. f. 1. 2. *Quercifolia*. Cum priore.

4. *oppositifolia*, fol. oppositis ovatis integerrimis glabris, flor. axillarib., pedunc. trifloris. Cavan. diss. 7. p. 368. t. 214. Hab. in insula Mauritiæ. h

1062. *TRICHILIA*. *Cal.* sub-5-dentatus. *Petala* 5. *Nectarium* dentatum. cylindricum, in apice dentium *Antheras* gerens. *Caps.* 3-locularis, 3-valvis. *Semina* baccata.

1. *hirta*, fol. pinnatis, foliol. pauciorib. ellipticis acuminatis glabris, racemis confertis. Swartz. obs. p. 171. Willd. Sp. II. p. 552. Sloan. hist. 2. t. 220 f. 1. Hab. in Jamaica. h

2. *spondioides*, fol. impari-pinnatis subhirsutis; foliol. numerosis, inferiorib. majoribus, racemis axillaribus. Swartz Fl. ind. occid. 2. p. 730. Jacq. Schoenb. 1. p. 54. t. 122. Sloan. hist. 2. p. 103. t. 210. Cum priore. Hab. in sylvaticis montosis Amer. calidior. h

3. *emetica*, fol. pinnatis subtus villosis, foliol. ellipticis. Vahl. symb. 1. p. 31. Hab. in montib. Arabiæ felicis. h

4. *glabra*, fol. pinnatis glabris, foliolis extimis majoribus. L. T. havanensis. Jacq. amer. 129. n. 2. t. 175. f. 38. Hab. in Havanae sylvis montosis. h

5. *pallida*, fol. impari-pinnatis membranaceis, racemis axillaribus terminalibusque, flor. octandris, caps. bivalvibus. Sw. Fl. ind. occ. 2. p. 733. *Portesia* ovata. Cav. diss. 7. p. 369. t. 215. Lam. ill. t. 302. f. 1. Hab. in fruticetis montosis Hispaniolæ. h

6. *capensis*, fol. impari-pinnatis margine undulatis, panic. axillarib. *Ekebergia capensis*. Thunb. Willd. Sp. II. p. 549. Lam. ill. t. 358. Hab. in Cap. bon. sp. h

7. *moschata*, fol. alternatum pinnatis, racemis axillaribus, florib. subdecandris monopetalis, caps. monospermis. Swartz 2. l. c. p. 735. Hab. in Jam. borealis sylvis. h

8. *spectabilis*, fol. pinnatis, foliol. obovatis, racemis axillaribus compositis. Forst. prod. n.º 188. Hab. in Nova Zeelandia. h

9. *alliacea*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis acutis, racemis axillaribus supradecompositis. Forst. prod. n.º 189. Hab. in insula Namoka. h

10. *heterophylla*, fol. pinnatis ternatisque, foliol. ovatis acuminatis, raremis axillaribus octandris. W. *Portesia mucronata*. Cavan. diss. 7. p. 370. t. 216. Lam. l. c. f. 2. Hab. in Madagascar. h

11. *trifoliata*, fol. ternatis, foliol. obovatis nitidis. Vahl. symb. 1. p. 31. Jacq. amer. 129. t. 82. Ed. pict. t. 123. Hab. in Amer. merid. h

12. *nevosa*, fol. ternatis, foliol. ovatis. Vahl. l. c. Hab. in Java. h

13? *spinosa*, fol. simplicibus ovatis emarginatis, ramis spinosis. Willd. p. 554. T. virens. Hellenius in Act. holm. 1788. p. 294. t. 10. f. 1. Hab. in India. Bacca trifolocularis. Medium tenet inter *Trichillam* et *Limoniam*. W.

1063. *TURRÆA*. *Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* longum, cylindricum, ore inter dentes *antheras* gerens. *Caps.* 5-cocca. *Semina* bina.

1. *virens*, fol. elliptico-lanceolatis emarginatis glaberrimis, calycib. fructibusque sericeo-villosis. Willd. Sp. II. p. 555. Hab. in Ind. orientali. Arb. Flor. laterales, congesti in apicem minimum. An diversa a *Quivisia decandra*? +

2. *pubescens*, fol. ovatis emarginatis subtus pubescentibus, calycibus villosis. Willd. Hellen. in Act. holm. 1788. p. 296. t. 10. f. 3. Hab. in ins. Hainam. Fructus ignotus. h

3. *maculata*, fol. ovatis acutis-glabris, calycib. ciliatis. Willd. Smith. ic. ined. 1. p. 11. t. 17. T. glabra. Cav. diss. 7. p. 360. t. 204. Hab. in Madagascar, cum a sequentibus. h

4. *sericea*, fol. ovatis obtusiuscul. utrinque tomentosis, calycib. peduncul. petalisque villosis. Willd. Smith. ic. ined. p. 12 t. 12. T. tomentosa. Cavan. l. c. p. 36t. t. 205. f. 2.

5. *lanceolata*, fol. lanceolatis utrinque rotundatis glabris, lacinii calycinis longissimis lanceolatis. Willd. Cav. l. c. t. 205. f. 1.

1064. SANDORICUM. Cal. 5-dentatus. Petala 5. Nectar. cylindricum, truncatum, ore antheras gerens. Drupa magna, nucibus 5-feta.

1. *indicum*. Cav. diss. 7. p. 357. t. 202 et 203. Lam. enc. 3. p. 69. ill. t. 350. Hab. in Philippinis et Molluccis. Arb. centro rubro. Fol. ternata. Panic. axillaris. Affine Trichiliae nervosae. W. h

1065. SWIETENIA. Cal. 5-fidus. Petala 5. Nectar. cylindricum, ore antheras gerens. Caps. 3-foenlaris, lignosa, magna, 3-5-valvis. Sem. imbricata, alata.

1. *Mahagoni*, fol. pinnatis subquadrijugis, foliol. ovato-lanceolatis basi aequalibus, paniculis axillaribus. Willd. Sp. II. p. 557. Cavan. diss. 7. p. 365. t. 209. Jacq. amer. 127. El. pictat. etc. Catesb. car. 2. p. 81. t. 81. Hab. in Amer. meridionali, in petrosis. Caps. basi dehiscens. Arb. magna, cujus lignum est illud Mahagone, s. Acajou.

2. *febrifuga*, fol. pinnatis subquadrijugis, foliol. elliptico-subrotundis emarginatis, basi inaequalibus, panicula terminali divaricata. Willd. Roxb. Corom. 1. p. 18. t. 17. In montibus Indiae orientalis. h

3. *Chloroxylon*, fol. pinnatis multijugis, foliol. dimidiato-cordatis obtusis, panicula terminali patent. Willd. Roxb. l. c. 1. p. 46. t. 64. Hab. cum priore. Caps. apice dehiscens. R. h

4? *senegalensis*, octandra, fol. abrupte pinnatis subtrijugis, fructu quadrivalvi. Desrous. in Enc. bot. 4. p. 679. Hab. in Senegal. Fruct. pomiformis, recept. centrali 4-gona. h

1066. MELIA. Cal. 5-dentatus. Petala 5. Nectar. cylindraceum, dentatum, fauce antheras gerens. Drupa nuce quinqueloculari.

1. *Azedarach*, fol. bipinnatis, foliolis laevibus ovatis dentatis. Willd. p. 558. Cav.

diss. 7. p. 363. t. 207. Lam. ill. t. 352. *Blata* in Syria, Zeylona, et Eur. austr. Pulpa fructus venenata est.

2. *sempervirens*, fol. bipinnatis, foliol. rugosiusculis subseptuatis. Swartz. Flor. 2. p. 737. Comm. hort. t. 176. Hab. ad sepes in Jamaica. Priore minor.

3. *composita*, fol. pinnatis, foliol. infimis ternatis, flor. tomentosis. Willd. Sp. II. p. 559. Hab. in Ind. Ramul. nigricantes, juniores tomentosi. Fruct. ignotus. †

4. *Asadriachta*, fol. pinnatis, foliol. lanceolatis acuminatis subtealeatis. Cav. Desf. 7. p. 364. t. 208. Burm. zeyl. t. 15. Rheed. 4. t. 52. Hab. in India. Arb. sempervirens. Flor. pallidi.

1067. MONOTROPA. Cal. 6. Petala 10, horum 5 exteriora basi excavato - mellifera. Caps. 5-valvis.

1. *Hypopithys*, florib. glabris lateralibus octandris. L. Flor. dan. t. 232. Hab. in sylvis, umbrosis, etiam in Amer., quae minor.

2. *lanuginosa*, caul. spicifloro, bract. floribusque lanuginosis. Michx. Flor. 1. p. 216. Hab. in sylv. Carol.

3. *Morisoni*, caul. elongato striato, 1-floro, squamis distantibus. Michx. l. c. Moris. s. 12. t. 16. f. 5. In Carol. sylv. umbrosis.

4. *uniflora*, maximo cernuo, squamis approximatis. Michaux. l. c. Catesb. car. 1. p. 36. t. 36. Hab. in Amer. boreali. Caul. crassus. †

1068. DIONÆA. Cal. 5-phyllus. Petala 6. Caps. 1-locularis, gibba, polysperma.

1. *Muscipula*. L. Vent. Malmais. t. 29. Hab. in Carolinae uliginosis. Folia sunt sensibilis, ut dum insectum irrepit aut insidet folio, se claudant.

ONCOPH Decandreae. (Gen. 1063-1072.)

1069. JUSSIEUA. Cal. 4-5-partitus, superus, persistens, patens. Pet. 4-5, ovata, patentia. Caps. 4-5. locularis, oblonga, angulis dehiscens, cal. coronata. Sem. numerosa minuta, receptaculo angulato centrali adnexa. (Stam. 8-10.)

1. *grandiflora*, rad. repente, caul. erectis

pendulic. calycibusque villosis, fol. integerrimis inferiorib. spathulatis superiorib. lanceolatis, flor. decandris. Michaux. Flor. t. p. 267. Hab. in Georgiae paludosis. h

2. *repens*, caul. repente, fol. spathulatis, floribus pentapetalis decandris. L. Willd. Sp. II. p. 574. Lam. enc. 3. p. 330. Rheed. 2. t. 51.  $\beta$  *adscendens*. L. Mant. p. 69. Hab. in Indiae humidis. h

3. *inclinata*, erecta glabra, flor. 4-petalis octandris pedunculatis. Lin. suppl. p. 235. Hab. in America praesertim meridionali. Priori valde affinis.

4. *tenella*, glabra, flor. pentapetalis subsessilibus, fol. oppositis lineari-lanceolatis. Burm. iud. 103. t. 34. f. 2. Hab. in Java. +

5. *linearis*, fol. linearibus sessilibus hispidis, flor. tetrapetalis octandris. Willd. p. 575. Hab. in Guinea. Caul. erectus, ramos. Rami divaricati, pilis sparsis. Fol. longissima. Germen hispidum. W.

6. *linifolia*, fol. laciniisque calycinis lineari-lanceolatis glabris, flor. sessilibus octandris. Vahl. p. 32. Hab. in Amer. merid. Caul. inferne tetragonus. Rami alterni, subfiliformes, patentissimi. V.

7. *peruviana*, erecta, flor. pentapetalis, pedunc. bracteatis, fol. oblongis utrinque attenuatis subtus pubescentibus. Willd. Few. peruv. 716. t. 9. Hab. in Lima. Fol. emollientia.

8. *hirta*, erecta hirsuta, fol. lanceolatis attenuatis subtus hirtis, flor. pedunculatis octandris. Oenothera hirta. Plum. spec. 7. ic. 174. f. 2. Hab. in America calidiore. h

9. *octovalvis*, erecta, flor. tetrapetalis octandris pedunculatis, caps. multivalvibus, fol. lanceolatis. Swartz. obs. 142. J. *octonervia*. Lam. enc. 3. p. 332. Oenothera octovalvis. Lin. Hab. in Antill. Fructus 4-valvis non 8-valvis, sed striis 8 distinctus. Lam.

10. *angustifolia*, glabra, fol. alternis lineari-lanceolatis, flor. 4-petalis, caps. longiusculis pedunculatis. Lam. enc. 3. p. 331. Herba Vitiligium. Rumph. 6. t. 21. f. 17. Hab. in ins. Java et Molucc.

11. *caryophyllaea*, glabra, fol. lanceolatis, flor. 4-petalis, caps. brevibus subsessilibus. Lam. l.c. Herm. lugd. 396. Rheed. 2. t. 4.  $\beta$ . Maderaspatana. Pluck. alm. 236. t. 203. f. 5. Hab. in India.

12. *villosa*, tomentosa, fol. lanceolatis, flor. 4-petalis, caps. longiusculis curvis ses-

silibus. Lam. l. c. J. *suffruticosa*. Lin.? Rheed. 2. t. 50 (non 49).

13. *erecta*, glabra, fol. lanceolatis, flor. tetrapetalis, caps. sursum subattenuatis sessilibus. Lam. l. c. p. 332. Gaertn. de Fr. p. 159. t. 31. Burm. amer. t. 175. f. 2. Hab. in Amer. meridion. Rad. napiformis.

14. *pubescens*, erecta villosa, florib. 5-petalis decandris sessilibus. L. Sloan. jam. 85. Cum priore. +

1070. CACUCIA. Cal. campanulatus, limbo dilatato, 5-fido, deciduo. Petala 5. Caps. subbaccata, ovata, 5-angularis, 1-locularis, 1-sperma.

1. *coccinea*. Aubl. gujan. 1. p. 450. t. 179. Gmel. Syst. p. 693. Lam. ill. t. 389. Schousloea. Willd. Hab. in Gujana. Frut. sarmientosus. Flor. spicati, bracteati.

1071. GUIERA. Cal. oblongus, gracilis, 4-dentatus. Petala 5. Stamina exserta. Caps. longa angusta, villosissima, 1-locularis, subquinqusperma.

1. *senegalensis*. Juss. gen. pl. Lam. ill. gen. t. 360. Hab. in Senegal. Fol. opposita. Flor. capitati, involacro 4-phylo cincti. h

1072. PETALOMA. Cal. urceolatus, 5-dentatus. Petala 5, calyci inserta. Stamina margin. calycis insidentia. Bacca 1-locularis, coronata.

1. *myrtilloides*, pedunc. solitariis 1-floris, fol. subsessilibus ovatis attenuatis basi obliquis. Swartz. Flor. 2. p. 833. Willd. p. 542. Sloan. hist. 2. p. 78. t. 187. f. 3. In sylvis Hispaniol. et Jamaicae. h

2. *Muriri*, pedunc. confertis axillaribus, fol. petiolatis ovatis acuminatis. Swartz. l. c. p. 836. Mouriria gujanensis. Aubl. 1. p. 453. t. 180. Lam. ill. t. 366. f. 3. In Gujanae sylvis. Bacc. 4-sperma.

1073. QUISQUALIS. Cal. 5-fidus, filiformis. Cor. tubus longissimus. Petala 5. Drupa 5-angulari.

1. *indica*, fol. ovatis.  $\beta$ . *pubescens*, fol. subcordatis pubescentibus. Burm. ind. t. 35. f. 2. Rumph. 5. t. 38. Lam. ill. t. 357. Hab. in India. h

1074. DAIS. *Involuerum* 4-5-phyl-  
lum. Cor. 4. c. 5-fida. *Stigm.*  
capitatum. *Bacca* 1-sperma.  
(Stam. etiam 8.)

1. *cotinifolia*, fol. obovatis obtusis, florib.  
quinquefidis villosis. Willd. Sp. II. p. 170.  
Lam. ill. t. 368. f. 1. Hab. ad Cap. b. spec. h

2. *disperma*, flor. octandris decandris-  
que, fol. ovato-lanceolatis enerviis. Forst.  
prod. n°. 192. Hab. in ins. Tongatabu. h

3. *octandra*, fol. ovato-lanceolatis ve-  
nosis, florib. glabris quadrifidis octandris.  
Willd. Burm. ind. t. 33. f. 2. Hab. in India. h

4. *laurifolia*, flor. decandris, fol. lan-  
ceolatis acutis. Jacq. ic. rar. 1. t. 77. Col-  
lect. 1. p. 146. Var. D. octandrae secundum.  
Willd. Hab. in India. h

\* *linifolia*. Lam. enc. 2. p. 255. Ej. ill.  
gen. t. 368. f. 3. est *Gnidia* capitata. L. vid.  
huj. lib. p. 436.

\* *madagascariensis*. Jam. l. c. p. 254.  
et ill. l. c. f. 2. *Gnidia daphnaefolia* var.  
glabra. L.

\* *pubescens*. Lam. l. c. p. 255. S. Gn.  
daphnaef.  $\beta$  hirsuta. L. Suppl. Tres hae  
*Gnidiae* L. ob involucri potius *Dalides* sunt.

1075. CERATOPETALUM. Cal. 5-  
partitus, stamiferus, persistens.  
*Petala* 5, pinnatifida. *Antherae*  
calcaratae. *Caps.* in fundo calycis  
tectae, bilocularis.

1. *gummiferum*. Smith. N. Holl. 1. p. 9.  
t. 3. Hab. in Australasia. Arbor procera.  
Fol. opposita ternata. Panic. terminalis. Pet.  
flava. W. h

MELASTOMEAE (Gen. 1076-79.) cal. hab-  
ent campanulato-tubulosum in quibusd.  
squamis cinctum persistentem, cui *Petala*  
et stamina inseria. *Filam.* 8, 10, 12,  
apice saepius bisetosa aut bicauriculata.  
*Anth.* longae, rostratae, incumbentes.  
*Fruct.* est vel bacca, vel capsula, aut  
cal. coarctato tectus, aut inferus, multi-  
locularis, polyspermus. Caul. ut plurimum  
frutescens. Fol. opposita, simplicia, ner-  
vosa. Juss.

1076. MELASTOMA. Cal. 5-fidus,  
campanulatus. *Petala* 5, calyci  
insecta. *Antherae* longae, arcuatae.  
*Bacca* 3-locularis, calyce obvo-  
luta. (Stam. etiam 8 et 13. Fol.

plerisque eleganter nervosa - ve-  
nosa.)

\* *Fol. trinerviis.*

1. *calyptrata*, fol. elliptico-lanceolatis  
attenuatis trinerviis glabris obsolete denti-  
culatis, flor. paniculatis dotecandris. Willd.  
Sp. II. p. 581. Hab. in ins. Montserrat. Flor.  
calypttrati, petala flava. V. h

2. *crenata*, hispida, fol. subcordatis ob-  
longis crenatis acuminatis, racemis axilla-  
ribus paucifloris longitudine petioli. Vahl.  
eclog. 1. p. 41. Ej. ic. ecl. ill. t. 24. Hab. in  
Amer. meridionali. h

3. *rigida*, fol. trinerviis subdenticulatis  
subcordato-ovatis rigidis, subtus scabris,  
racemis terminalibus paniculatis ferrugineo-  
hirtis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 768. Hab.  
in montibus caeruleis Jamaicae. h

4. *montana*, fol. trinerviis subdenticulat.  
glabriusculis, racemo terminali, pedunc.  
tripartito-trifidis patulis, petal. reclusis, cal.  
truncato. Swartz. l. c. p. 766. Hab. in mont.  
Jamaic. australis. h

5. *procera*, arborea, fol. trinerviis sub-  
denticulatis glabris, racemo terminali, pedunc.  
trifidis erectis, calycibus truncatis.  
Swartz. l. c. p. 764. Hab. in altis montibus  
Jamaicae. h

6. *adscendens*, fol. trinerviis denticulat.  
ovatis acutis glabris, racemo ovato termi-  
nali, racemulis floribus subsecundis, caule  
scandente. Swartz. l. c. p. 772. Hab. in sylvis  
mont. Jam. h

7. *aspera*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis trinerviis scabris, flor. terminalibus  
subcorymbosis. Willd. p. 583. L. Sp. pl. 560.  
Burm. zeyl. t. 72. Rumph. 4. t. 43. Hab. in  
India. h

8. *ledifolia*, villosa, fol. ovato-lanceo-  
latis integerrimis trinerviis, flor. axillarib.  
terminalibusque bracteatis. Lam. enc. 4.  
p. 48. Hab. in Peru. Bractae binae sub  
calyce. L. h

9. *strigosa*, fol. integerrimis trinerviis  
strigosis ovatis, flor. solitariis. Lin. suppl. 236.  
Hab. in N. Granada. Caul. strigis adpressis  
scaber. Cal. strigosus. Cor. purpurea. L. h

10. *aromatica*, fol. ovatis nitidis, subtus  
subpilosis, nervis cauleque strigosis, calycib.  
basi bract. imbricatis. Vahl. eclog. M. Ti-  
bouchina. Lam. enc. 4. p. 48. Tibouchina  
aspera. Aubl. 1. p. 445. t. 177. Hab. in  
Guiana. Fol. 5-nervia. Lam. l. c.

11. *holosericea*, fol. oblongo-ovatis in-

tegerimis subtus canis, spicis racemosis bipartitis, floribus confertis biserialibus. Vahl. eclog. 1. p. 42. L. Sp. pl. 559. Pluk. mont. 4. t. 252. f. 2. Hab. in Brasilia, Surinamo. h

12. *velutina*, fol. trinerviis integerrimis sessilibus ovatis acutis villosis-sericeis, ramis brachiatis, ramis bipartitis, caule acute quadrangulo. Willd. p. 584. Hab. in Jam. Brasilia. h

13. *sessilifolia*, fol. integerrimis trinerviis spatulatis sessilib. subtus submentosis. L. Brown. jam. 219. t. 29. Pluk. alm. 50. t. 249. f. 2. Hab. in Jamaica. h

14. *ramiflora*, fol. trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis scabrisculis, ramis floriferis, flor. pedunc. subconfertis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 775. Hab. in St.-Thomae locis paludosis. h

15. *glabra*, fol. integerrimis trinerviis oblongis acuminatis glabris, panic. terminali, calycib. circumscissis. Willd. Forst. prod. n. 194. Hab. in Societat. insulis. h

16. *involuta*, glabra, fol. ellipticis obtusiusculis serrulatis trinerviis, flor. litariis axillaribus involutis. Lam. enc. 4. p. 35. Hab. ad St.-Domingo.

17. *diffusa*, pilosa, fol. ovatis trinerviis serrulatis, flor. ad axillas ramulorum solitariis, caul. paniculato. Lam. l. c. p. 38. Hab. in Cayenne. Ramuli apice glandulosi.

18. *punctata*, fol. lanceolatis integerrimis subtus ochroleucis excavato-punctatis, panic. composita terminali. Lam. l. c. p. 50. Hab. ad St.-Domingo.

19. *cornifolia*, glabra, fol. ovato-acuminatis trinerviis integris, cal. striato infundibuliformi, panic. terminali. Lam. p. 81. Hab. in ins. Martinica. Fol. eleganter ex viridi subflavescenti.

20. *myricoides*, laeviuscula, fol. ovatis subacuminatis denticulatis trinerviis, panic. terminalibus, fructu granuloso. Enc. l. c. Hab. in Antillis. Rami nodoso-articulati.

21. *chrysophylla*, glabra, fol. ovatis acutis trinerviis integerrimis subtus aurovirentibus, panic. terminali. Lam. enc. 4. p. 50. Hab. in Madagascar. Fol. subtus flavoviridia. h

22. *quadrangularis*, fol. trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis glabris, nervis subtus coloratis, ramis tetragonis, racemo stricto terminali. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 770. Hab. in Jamaicae montib. altis. h

23. *trinervia* (*bipartita*), fol. trinerviis

absque marginali, integerrimis utrinque glabris tenuioribus, racemis terminalibus, racemulis bipartitis, flor. sessilibus. Swartz. l. c. p. 774. Cum priore.

24. *repens*, fol. obovatis glabris trinerviis, subintegerrimis, florib. solitariis terminalibus, caule repente. Lam. l. c. p. 54. illust. gen. t. 362. f. 2. M. octandra. Retz. obs. 4. p. 25. Hab. in China. T

25. *glabrata*, fol. trinerviis subdenticulatis ovatis acutis glabris coriaceis, pedunc. terminalibus solitariis unifloris, florib. octandris. Swartz. p. 801. Hab. in alpinis Jamaicae australioris. h

26. *glandulosa*, fol. trinerviis integerrimis ovatis, superne strigoso-scabris, subtus hirsuto-hispidis glandulosis, racemis terminalibus, flor. confertis octandris. Swartz. 2. p. 799. Hab. in summ. montib. Jamaic. h

27. *hirtella*, fol. trinerviis integerrimis, margine hispidopilosius, pedunc. brevissimis axillaribus trifloris, florib. octandris. Sw. 2. p. 810. Hab. cum priore. h

28. *triflora*, fol. trinerviis elliptico-lanceolatis integerrimis, ramis petiolis calycibusque strigosis, floribus axillaribus subpedunculatis ternis. Vahl. eclog. 1. p. 46. Hab. in Caribacis. h

29. *octandra* (*zeylanica*), fol. integerrimis trinerviis ovato-lanceolatis glabris, margine nervisque subtus hispidis, floribus terminalibus. Willd. Hab. in Zeylona. h

30. *divaricata*, fol. trinerviis integerrimis ovatis acutis subtus pubescentibus, panic. terminali divaricata, floribus octandris. Willd. Hab. id India orientali. Rami seniores nigricantes, juniores ferrugineotomentosi. Cal. urceolat. h

31. *tetrandra*, fol. trinerviis integerrimis oblongis basi emarginatis convexiusculis glabris, racemo erecto terminali, flor. tetrandris. Swartz. l. c. p. 795. Hab. in mont. Jamaicae australis. h

32. *fascicularis*, fol. integerrimis ovatis acutis scabris, ramis floriferis, flor. confertis pedunculatis octandris. Swartz. 2. p. 801. Hab. in mont. Jamaicae interioris. h

33. *angustifolia*, fol. trinerviis linearilanceolatis integerrimis subtus incanis, ramis virgatis, panic. terminalibus, flor. erectis octandris. Swartz. 2. p. 796. Hab. in Jamaica inque insula St.-Johannis. h

34. *purpurascens*, fol. trinerviis integerrimis oblongis acutistriatis glaberrimis,



racemis lateralibus tripartitis patulis, flor. octandris. Swartz. p. 804. Hab. in Jam. mont. excelsis.

35. *alpina*, fol. trinerviis integerrimis ovatis coriaceis glabris, panic. simpliciter trichotomis, flor. distinctis 8-andris. Swartz. l. c. p. 800. Habit. in insulae Guadeloupe muscosis.

36. *hirsuta*, fol. trinerviis subdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis hirsutis, pedunc. axillaribus divaricatis trifidis, flor. 8-andris. Swartz. Flor. p. 801. Hab. in Jamaica, ad thermas prope Bath.

37. *microphylla*, fol. trinerviis subdenticulatis ovatis obtusis superne hispidis, subus tomentosus ferrugineis, pedunc. trifidis axillaribus, flor. 8-andris. Swartz. l. c. p. 803. Hab. in Jam. australi. Priori affinis.

38. *micrantha*, fol. trinerviis-denticulatis oblongis utrinque acutis glabris, racemis axillaribus reclinatis, florib. acuminatis 8-andris. Swartz. Hab. in montib. Jamaicae occidentalis.

39. *capillaris*, fol. trinerviis subdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis glabris, pedunc. capillaribus trifloris, flor. 8-andris. Swartz. p. 808. Hab. in mont. Jam. austral.

40. *rubens*, fol. trinerviis denticulatis ovato-lanceolatis glaberrimis, ramis petiolisque coloratis, racemo terminali, flor. dioicis 8-andris. Swartz. l. c. p. 797. Hab. in alpib. Jam. australis. Purpurascens.

\*\*\* *Fol. triplinerviis.*

41. *Grossularioides*, fol. subrotundo-ovatis acuminatis denticulatis triplinerviis glabris. Willd. p. 585. Pluk. alm. t. 246. f. 4. Hab. in Surinamo. h

42. *parviflora*, fol. ovato-lanceolatis utrinque attenuatis denticulatis triplinerviis glabris, panicula terminali trichotoma. Willd. p. 586. Aubl. guj. t. p. 433. t. 171. Enc. bot. 4. p. 62. Habit. in paludosis Cajennae, Gujanae. Tincturam nigram praebet. h

43. *succosa*, fol. ellipticis acutis integerrimis triplinerviis hirsutis subus tomentosus, flor. lateralibus subsessilibus, petalis denticulatis. Willd. Aubl. guj. t. p. 418. t. 162. Hab. in sylvis Gujanae, Cajennae. h

44. *arborescens*, fol. subrotundo-ovatis acutis integerrimis triplinerviis glabris, corymbis bracteatis lateralibus, petalis biunguiculatis. Willd. Aubl. guj. t. p. 420. t. 163. Cum priore.

45. *longifolia*, fol. lanceolatis glabris trinerviis. ad summitem caulis quaternis, flor. parvis albis paniculatis, fructu parvo caeruleo. Aubl. guj. t. p. 432. t. 170. Hab. in Gujan. ad ripam amnis Galibiensis. h

46. *prasiina*, fol. triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis glabris, panic. terminali patentissima. Swartz. p. p. 777. M. laevigata. Aubl. t. p. 412. t. 159. Hab. in America boreali.

47. *trichotoma*, laeviuscula, fol. lato-ovalib. acuminatis triplinerviis integerrimis, panic. trichotomis ampliter terminalibus. Lam. enc. 4. l. c. Hab. . .

48. *staminea*, laeviuscula, fol. ovatis subacuminatis integerrimis 5-nerviis: nervis fuscis, cal. turbinato striato. Lam. p. 53. Hab. in Brasilia. Priori affinis.

49. *acuminata*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis undato-subdenticatis triplinerviis, panic. terminalibus. Lam. p. 54. Hab. Guadeloupa. Panic. bract. nullis.

50. *marginata*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis triplinerviis marginato-ciliatis, pedunc. brevibus paucifloris, cal. echinato. Lam. enc. v. 4. p. 32. Hab. in Brasilia. Cal. fructus Danci refert.

51. *multiflora*, glabra, fol. lanceolatis serratis, triplinerviis, panic. lateralibus, cal. turbinato subtruncato. Lam. l. c. p. 35. Hab. ad St.-Domingo. Panic. divaricata.

52. *amygdalina*, glabra, fol. angustolanceolatis complicatis serratis, panic. breviusculis lateralibus, cal. cylindrico. Lam. l. c. Cresc. cum priore, cui affinis.

53. *lanceolata*, fol. angustolanceolatis triplinerviis margine denticulato-serratis subus ferrugineis, panic. terminali. Lam. l. c. p. 42. Hab. ad St.-Domingo.

\*\*\* *Fol. triplinerviis.*

54. *verticillata*, fol. triplinerviis oblongis attenuatis denticulatis villosis, supra scabris, racemis axillaribus, flor. verticillatis. Vahl. eclog. t. p. 47. Hab. in Caribaeis. h

Obs. Flores in hac uti in sequentib. speciebus hujus divisionis 8-andri sunt.

55. *cinnamomifolia*, fol. subintegerrimis triplinerviis lanceolatis acuminatis. Jacq. collect. 2. p. 111. t. 6. M. *acuminata*. Vahl. Willd. p. 597? Hab. in Monserrat. h

56. *lateriflora*, fol. ovatis acuminatis setaceo-subseratis glabris, pedunc. infra-

foliaceis aggregatis unifloris. Vahl. l. c. p. 48. Hab. in mont. ins. Montserrat. h

57. *elaegnoides*, fol. triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis subtus albidotomentosis, pedunc. terminalibus trichotomis, flor. solitariis. Swartz. Fl. 2. p. 815. Hab. in ins. St. Johann. Amer. h

58. *scabrosa*, fol. triplinerviis denticulatis ovatis scabris hirsutis, flor. axillaribus aggregatis sessilib. octandris. Swartz. obs. 174. Brown. jun. 219. t. 24. f. 3. Hab. in Jam. montibus. h

59. *virgata*, fol. triplinerviis integerrimis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, ramis virgatis floriferis, racemis decussatis diffusis sparsis, flor. octandris. Swartz. 2. p. 816. Hab. in Jamaic. sylvestribus montium. h

\*\*\*\* *Fol. quintuplinerviis.* \*

60. *agrestis*, villosa, fol. ovato-lanceolatis denticulatis quintuplinerviis, corymbo terminali. Willd. p. 587. Aubl. guj. 1. p. 425. t. 166. Hab. ad ripas et in muris antiquis Cajennae. Fol. ferrugineo-villosa. h

61. *scandens*, fol. ovatis subseratis hirsutis quintuplinerviis, corymbo terminali capitato, caule scandente. Willd. Aubl. guj. 1. p. 435. t. 172. Hab. in sylvis Gujanæ. h

62. *alata*, fol. ovatis utrinque acuminatis integerrimis quintuplinerviis subtus pubescentibus, capit. paniculatis terminalibus, caul. alato. Willd. Aubl. guj. 1. p. 410. t. 158. Hab. in campestribus Cajennae, Gujanæ. h

63. *flavescens*, fol. obovato-acutis integerrimis quintuplinerviis subtus pubescentibus, corymb. bracteatis lateralibus. Willd. Aubl. guj. 1. p. 423. t. 164. Hab. in sylvis Gujanæ. h

\*\*\*\* *Fol. quinquenerviis, aut 7-g-nerviis* (ob spec. affinitatem).

64. *hirta*, fol. denticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis, caul. hispido. J. Pluk. alm. 40. t. 264, 265, f. 1. Hab. in America meridionali. Var. flor. dodecandris, bacca sexloculari. Sw.

65. *spicata*, fol. subdenticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis villosis, spicis axillaribus. Willd. p. 588. Aubl. 1. p. 423. t. 165. Hab. in pratis Gujanæ. h

66. *acnodendron*, fol. ovatis acuminatis denticulatis quinquenerviis, cymis axillarib.

Willd. Plum. ic. 142. f. 2. Hab. in Amer. calidiore. h

67. *cymosa*, fol. cordatis acuminatis quinquenerviis serrulatis pubescentibus, cyma terminali, calycinis lacinii subrotundis, staminib. quinque sterilibus. Willd. M. fol. septemnerviis. Schrad. et Wendl. sert. hannov. 18. t. 8. Hab. in Amer. meridionali. h

68. *grandiflora*, fol. cordatis acuminatis quinquenerviis serrulatis pilosis, pedunculo terminali bifido, calycinis lacinii linearisubulatis, staminibus quinque sterilibus. Willd. Vahl. symb. 3. p. 59. Aubl. guj. 1. p. 414. t. 160. Hab. in pratis Cajennae et Gujanæ. h

69. *elegans*, hispida, fol. cordatis inaequaliter crenato-dentatis, racemis dichotomiae terminalibusque paucifloris. Vahl. eclog. 1. p. 44. Aubl. guj. 1. p. 427. t. 167. Hab. in Cajenna in muris antiquis. h

70. *rufescens*, fol. cordatis crenulatis scabris subtus tomentosis, floribus terminalibus glomerato-spicatis. Willd. M. foliis crassis rugosis cordatis subtus tomentosis subsessilibus. Aubl. guj. 1. p. 408. t. 157. Hab. in locis campestribus Gujanæ. h

71. *rubra*, fol. cordatis subcrenatis subtus ferrugineo-tomentosis, flor. axillaribus et lateralibus solitariis sessilibus. Willd. Aubl. guj. 1. p. 416. t. 161. Hab. ad ripas Gujanæ. h

72. *majeta*, fol. obovatis quinquenerviis subcrenulatis pilosis: basi ad petiolum vesiculosos, flor. solitariis axillaribus sessilibus, calyce squamoso. Willd. Majeta gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 443. t. 176. Hab. in sylvis Gujanæ. Fol. alterum duplo minus. h

73. *heterophylla*, pilosa, foliis oppositis disparibus denticulatis, petiolis superne vesiculosos, panic. brevissimis lateralibus. Lam. l. c. 4. p. 34. Hab. in Peru. Fol. alterum minus, sessile cordatum vix vesica donatum. Lam. h

74. *physiphora*, fol. ovatis attenuatis denticulatis ciliatis, petiolis hispidis apice vesiculosos. Vahl. eclog. 1. p. 45. Tococa gujanensis. Aubl. guj. 1. p. 438. t. 174. Hab. ad viarum margines in Cajenna et Gujana. Racemus terminalis. h

75. *purpurea*, foliis ovato-lanceolatis acuminatis quinquenerviis pilosis subdenticulatis, ramis bifidis paniculatis terminalibus. Willd. p. 590. Aubl. guj. 1. p. 402. t. 154. Hab. ad ripas rivulorum Gujanæ. h

76. *argentea*, fol. quinquenerviis subden-

*denticulatis ovatis glabris, subtus tomentosis candidis, panic. terminalibus patentibus.* Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 770. Sloan. hist. 2. p. 84. t. 196. f. 1. Hab. ad litus Mosquito-shore Americes. *h*

77. *elata*, fol. quinquenerviis serrato-denticulatis oblongis coriaceis, subtus ferrugineo-tomentosis, panic. terminalibus patentibus, flor. sessilibus. Swartz. l. c. 2. p. 781. Hab. in montib. elevationibus Jamaicae, etc. *M. argenteae proxima. Sw.*

78. *impetiolaris*, fol. quinquenerviis denticulatis subsessilibus oblongis acuminatis coriaceis, subtus tomentoso-ferrugineis, panic. terminalib. axillaribusque erectis, flor. sessilibus. Swartz. l. c. p. 789. Hab. in India occidentali. *h*

79. *fragilis*, fol. quinquenerviis ovatis reticulatis serratis, racemis brachiatis terminalibus, pedunc. inferioribus trifidis, pedicellis subbifidis. Vahl. eclog. 1. p. 44. Lin. suppl. 236. Hab. in America australi. Fructus pisiformes, umbilico excavato; minores umbilico clauso squamis quinque. *L. h*

80. *coriacea*, fol. quinquenerviis cartilagineo-denticulatis ovatis rugosis glabris coriaceis, ramulis petiolisque strigosis, panic. ramis tetragonis, florib. subsessilibus. Sw. l. c. 2. p. 790. Hab. in summitate montis la Soufriere ins. Guadeloupe. *h*

81. *patens*, fol. quinquenerviis cordatis hirsutis subdenticulatis, racemo terminali patulo, flor. 12-andris. Swartz. p. 297. Hab. in Jam. montib. Hirsuties fusco-rubra. *S.*

82. *grossa*, fol. integerrimis quinquenerviis subcordatis scabris. Lin. suppl. 236. Hab. in N. Granada. Arb. ramis hispidis. Cal. validus, pilis strigosus. *L. h*

83. *malabathrica*, foliis integerrimis, quinquenerviis lanceolato-ovatis scabris. *L. Burin. zeyl. 155. t. 73. Lam. ill. t. 361. f. 1. Fragarius niger. Rumph. 4. t. 72. Hab. in India. Cal. squamoso-callosus. h*

*Obs.* Haec species generis nomen ansam dedit cum fructus comelentum os, uti bacc. vacc. myrtilli, atro inquinat.

84. *strigillosa*, fol. quinquenerviis subdenticulatis acuminatis, superne strigoso-pilosis subtus tomentosis, racemis axillaribus, flor. pedicellatis confertis. Sw. Fl. 2. p. 793. Hab. in Jamaica.

85. *tamonea*, fol. quinquenerviis oblongo-lanceolatis acutis integerrimis subtus tomentoso-incanis, racemis terminalibus compositis, racemulis brachiatis, pedunc. um-

bellalutis. bract. geminis. Swartz. l. c. 2. p. 781. *M. Fothergilla. Enc. bot. 4. p. 45. (3? M. dodecandra. Ej. operis. Fothergilla mirabilis. Aubl. guj. 1. p. 441. t. 175. Hab. in Amer. meridionali. h*

86. *mucronata*, fol. lato-ovalibus mucronatis 5-nerviis subtus tomentoso-ferrugineis, cal. truncato ciliato. Lam. p. 46. Hab. in Cayenne.

87. *favosa*, fol. ovatis subdenticulatis basi emarginatis 5-nerviis, subtus cellulosis, panic. terminali corymbosa. Lam. p. 47. Hab. ad St.-Domingo.

88. *Lima*, scabra, fol. ovatis serrulatis triplinerviis, bullato-tuberculosis, flor. axillarib. terminalibusque subpaniculatis. Lam. l. c. Cum priore, cum qua affinitatem habet.

89. *papillosa*, fol. ovalibus subcordatis crenulatis septemnerviis rugoso-papillois, panic. terminalib. viz bracteatis. Lam. l. c. p. 48. Hab. in Peruvia. Fol. tuberculis polygoncis aspera.

90. *latifolia*, pilosa, fol. lato-ovatis acuminatis ciliatis septemnerviis, panic. axillaribus subgeminatis fol. brevioribus. Lam. enc. 4. p. 31. Hab. in Antillis.

91. *dichotoma*, hispidula, fol. cordatis 7-9-nerviis acutis denticulatis, panic. foliosis, ramis lateralibus dichotomis. Lam. l. c. p. 41. Hab. in Brasilia.

92. *laxa*, fol. cordato-ovatis 7-nerviis serrulatis rugosis, panic. laevis foliosis terminalibus. Lam. l. c. Hab. in Peruvia.

93. *nivea*, fol. cordatis 7-nerviis acuminatis denticulatis subtus tomentoso-niveis, panic. terminali, caul. hispido. Lam. p. 42. Hab. ad St.-Domingo. Fol. uti in urtica nivea.

94. *pyramidalis*, fol. ovato-acuminatis denticulatis quinquenerviis subtus villosiusculis, panic. pyramidalis terminalibus. Enc. l. c. Hab. in Antillis.

95. *nicotianaeifolia*, fol. lato-ovatis acutis subdentatis longe petiolatis quinquenerviis, panic. brachiata terminali. Enc. l. c. Hab. ad St.-Domingo. Fol. magna 7-unc. longa, 4-lata.

96. *pauciflora*, pilosa, fol. ovatis subacuminatis crenulatis, 5-nerviis, racemulis axillarib. terminalibusque paucifloris. Lam. enc. 4. p. 39. Hab. in Brasilia.

97. *ferruginea*, fol. ovato-acutis obsolete crenatis subciliatis 5-nerviis supra glabris, panic. terminalibus. Lam. l. c. p. 42. Hab. ad St.-Domingo. Cor. albo-rosea.

98. *granulosa*, fol. ovato-lanceolatis integris quinquenerviis, supra granulosis, panic. terminalibus, caul. alato. Lam. p. 44. Hab. in Brasilia. Frut. 10-pedalis, ramis 4-gonis. Cor. magna.

99. *clavata*, fol. cordato-ovalibus sessilibus integerrimis sericeo-argenteis, panic. terminali, cal. clavato. M. *argentea*. Enc. bot. 4. p. 45. Hab. in Brasilia. Cal. forma sequat Caryophyll. aromat. flores.

100. *albicans*, fol. quinquenerviis integris ovatis acutis, supra glabris, subtus tomentosis albidis-ferrugineis, racemis terminalibus erectis, flor. confertis sessilib. Swartz. l. c. p. 786. Hab. in montib. Jamaicae inque Brasilia. h

101. *capitata*, fol. quinquenerviis lanceolatis integerrimis, capitulis terminalibus involucreatis, ramis tetragonis, filament. appendiculatis. Vahl. eclog. 1. p. 45. Hab. in India occidentali. h

102. *splendens*, fol. quinquenerviis integris oblongis acuminatis utrinque glabris, superne nitidis, panic. terminalibus erectis, flor. subumbellatis. Swartz. l. c. 2. p. 789. Plum. spec. 18. t. 140. Hab. in sylvis montium Jamaicae. h

103. *laevigata*, fol. integerrimis quinquenerviis ovato-oblongis laeviusculis acuminatis, margine laevibus. L. Habit. in America. Cfr. M. *laevigata*. Enc. bot. 4. p. 52. Racemi terminales, flor. minutis.

104. *crispata*, fol. integerrimis quinquenerviis quaternis, ramis crispatis. L. Rumph. 5. t. 35. Hab. in Amboina. † h

105. *nodosa*, fol. ellipticis serrulato-ciliatis quinquenerviis coriaceis, corymb. bracteatis, ramis nodosis. Enc. bot. 4. p. 55. Hab. in Antillis. Nigricans. Corymb. trichotomus.

106. *crocea*, fol. ovatis subserratis glabris, nervis ad petiolum barbatis, panic. terminali. Enc. l. c. Hab. in Peruvia. Stam. 14-15.

107. *racemosa*, fol. ovatis quinquenerviis glabrisculis serrulato-ciliatis, petiol. supra villosis, panic. terminali subracemosa. Enc. l. c. Aubl. 1. t. 136. M. decussata. Vahl. Willd. p. 58a.

108. *articulata*, fol. ovato-lanceolatis denticulato-ciliatis, petiol. villosis, panic. ramis dichotomis articulatis. Lam. enc. l. c. p. 56. Hab. Cayennae. Priori affinis. Rami 4-goni. Fol. nervi 2-laterales obsoleti.

109. *umbrosa*, fol. quinquenerviis late-ovatis acuminatis utrinque hirtis, ramul. floriferis, racem. dichotomis patentib. flor. 8-andris. Swartz. Flor. ind. occid. 2. p. 817. Hab. in Amer. meridion. Fol. maxima.

110. *hispida*, fol. 5-nerviis subdenticulatis ovatis acutis, superne strigoso-hirsutis, subtus reticulato-tomentosis, panic terminalibus divaricatis, flor. 8-andris. Swartz. p. 821. Hab. in Jam. montibus.

111. *sessiliflora*, villosa-subtomentosa, fol. 5-nerviis lanceolato-ovatis denticulatis subpetiolatis, flor. axillarib. subverticillatis. Vahl. eclog. 1. p. 49. Ej. ic. ecl. ill. t. 12. Hab. in Amer. meridion. h

112. *pilosa*, fol. quinquenerviis subdenticulatis oblongis acutis, nervis subtus, ramulis racemisque lateralibus piloso-hirsutis, flor. octandris. Swartz. Fl. 2. p. 819. Hab. in sylvis montium Jamaicae. M. micranthae proxima. h

113. *discolor*, fol. quinquenerviis subintegerrimis oblongis acuminatis glabris subtus flavo-incanis, racemis cymosis, flor. octandris. Swartz. obs. 178. Plum. ic. t. 42. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. h

114. *coccinea*, fol. quinquenerviis elliptico-ovatis acuminatis glabris integerrimis, thyrsis terminali, pedunc. pedicellisque nodosis hispidis. Vahl. l. c. p. 48. Ej. ic. ecl. illustr. t. 16. Hab. in ins. Montserrat. Variat flore albo. V. h

1077. *TRISTEMMA*. Cal. 5-fidus, prope linum bifariam ciliatus. *Petala* 5, unguiculata. *Bacca* ovata, compressa, subangulata, tecta, 5-locularis.

1. *mauritianum*. Juss. gen. pl. Melast. virusana. Commers. Fol. ovata. Flor. capitati. An a Melastomis, quarum habitum refert satis distinctum?

1078. *MICONIA*. Cal. 5-dentatus. *Petala* 5. *Nect.* squamæ 5. *Stamina* declinata. *Antheræ* plicatæ, calcaratæ. *Caps.* 5-locularis. *Semina* subscobiformia.

1. *pulverulenta*, fol. ovatis quinquenerviis crenatis, acum. obtuso. Flor. per. Syst. p. 104. Hab. cum sequentib. in Peruv. nemorib., Chinchao, et Cuchero, etc. Flor. plurimi 6-petali, nonnulli 7-8-petali. h

2. *triplinervis*, fol. oblongis triplinerviis acuminat. integerrim. Syst. Fl. per. p. 105. h

β. *lanuginosa*, fol. oblongis quinquenerviis integerrimis obtuse acuminatis. Syst. etc. l. c.

3. *emarginata*, fol. cordatis emarginatis quinquenerviis. L. c. p. 106.

1079. *MERIANIA*. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. *Petala* 5, calyci inserta. *Stam.* declinata. *Caps.* 5-locularis, polysperma.

1. *leucantha*, fol. oblongis nitidis, flor. bracteis geminis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 826. Willd. Sp. II. p. 600. Sw. prod. 61. Hab. in montib. Jamaicae. h

2. *purpurea*, fol. ovato-lanceolatis, flor. bracteis quaternis. L. c. p. 829. Rhexia purpurea. Swartz. prod. 61. Cum priore.

1080. *ACISANTHERA*. *Cal.* ventricosus, 5-fidus. *Petala* 5. *Anth.* sagittatae, versatiles. *Caps.* coronata, 2-locularis, polysperma.

1. *quadrata*. Rhexia Acisanthera. Lin. Willd. Sp. II. p. 303. Acisanthera ramulis quadratis, foliol. 3-nerviis ovatis crenatis oppositis, flor. (axillaribus) singularibus. Brown. jam. t. 22. f. 1. Habit. in Jamaica. Etiam famil. naturali a Rhexii differt. Vid. Juss. gen. pl.

1081. *GETONIA*. *Cal.* superus, 5-phyllus, persistens. *Filam.* alternatim latiora, 5 in calycis ore. *Sem.* crustatum, oblongum, 5-striatum, cal. coronatum.

1. *floribunda*. Roxb. Corom. p. 64. t. 87. Hab. in Coromand. sylv. Scandens. Fol. opposita, ovata. Flor. paniculati. Bract. lanceolatae. h

*Obs.* Calycopteris. Lam. ill. t. 357, alteram hujus generis speciem efficere videtur.

РНОДОРАСЯ (gen. 1083-84), *Ericis* affines, ab iis vero discrepant antheris non bicornib. et valvis fructus introflexis. Juss.

1082. *KALMIA*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis : limbo subtus quinquecorni, in quorum foveis anth. incumbunt. *Caps.* 5-locularis.

1. *latifolia*, fol. ovato-ellipticis coriaceis petiolatis ternis sparsisque, corymbis termi-

nalib. subviscosis. Ait. Kew. 2. p. 64. Willd. Sp. II. p. 600. Lam. ill. t. 363. f. 1. Trew. Ehret. t. 38. f. 1. Hab. in America boreali. Flor. vere. Frut. 4-pedalis.

2. *angustifolia*, fol. lanceolatis, corymbis lateralib. subverticillatis. L. β. oleifolia. Catesb. cor. 3. p. 17. t. 17. f. 1. Trew. Ehret. t. 38. f. 2. Habit. in Amer. boreali. Fol. subtus subferruginea.

3. *cuneata*, fol. sparsis sessilib. cuneato-oblongis, subtus pubentibus subaristatis, corymb. lateralib. paucifloris. Mich. Flor. 1. p. 257. Hab. in Carol. Cor. albidā, fundo purpureo. M.

4. *glauca*, fol. oppositis oblongis laevigatis subtus glaucis, margine revolutis, corymbis terminalibus, ramul. ancipitibus. Ait. Kew. 2. p. 64. t. 8. Hab. in Terra Nova. β ? *rosmarinifolia*. Bot. cult. 2. p. 250. Cresc. in Carolina. h

5. *hirsuta*, suffruticosa, fol. sublanceolatis revolutis alternis, flor. solitariis axillaribus. Lam. enc. 3. p. 333. Curt. bot. mag. t. 138. Hab. in Carolina meridionali. h

1083. *LEDUM*. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* plana, 5-partita. *Caps.* 5-locularis, basi dehiscens. (*Stam.* etiam 5.)

1. *palustre*, fol. linearibus margine revolutis subtus tomentosis. Ait. Kew. 2. p. 65. β. *decumbens*, spithameum decumbens. Ait. l. c. Cfr. Mich. Hab. in Europae septentrional. uliginosis, β. in sinu Hudsonis. h

2. *latifolium*, fol. ellipticis margine revolutis subtus tomentosis, florib. subpendandris. Ait. Kew. 2. p. 65. Jacq. ic. rar. 3. t. 464. Collect. 2. p. 308. Lam. ill. t. 363. L. groenlandicum. Retz. scand. ed. 2. n. 493. Hab. in uliginosis Groenlandiae et Americae.

† *LEIOPHYLLUM*. *Caps.* apice dehiscens. *Fol.* utrinque glabra.

3. *thymifolium*, fol. ovalibus obtusis utrinque glabris, umbel. terminalibus sessilibus capitato-congestis. Lam. enc. 4. p. 459. Ej. ill. t. 363. f. 2. L. buxifolium. Ait. Michaux. Flor. 1. p. 260 ? Hab. in Carol. et N. Caesarea. Facie a Ledis recedit.

1084. *RHODORA*. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* declinata. *Caps.* 5-locul.

1. *canadensis*. Herit. stirp. nov. 1. p. 141. t. 68. Lam. ill. t. 364. Hab. in Canada et Terra

Nova. Flor. terminales umbellati. A sequente genere satis diversum?

1085. RHODODENDRON. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* subinfundibuliformis, subobliqua. *Stam.* declinata. *Caps.* 5-locularis.

1. *ferrugineum*, fol. glabris subtus leprosis, corollis infundibuliformibus. Jacq. Flor. austr. t. 255. Hab. in alpinis. Petala inferiora angustiora.

2. *minus* (*punctatum*), fol. ovali-lanceolatis, subtus ferrugineo-punctatis, flor. infundibuliformibus, caps. elongatis. Mich. In montibus Carol. superioris. Flor. 1. p. 258. Rb. *punctatum*. Willd. p. 607? Vent. Cels. t. 15.

3. *dauricum*, fol. glabris punctatis nudis corollis rotatis. L. Andrews repos. t. 4. Hab. in Dauria. Cor. violaceae, fol. ampliores. h

4. *camtschaticum*, fol. ciliatis nervosis, coroll. rotatis, calycib. foliaceis. Pall. ross. 1. p. 48. 33. Hab. in Camtschatca locis montosis lutosi. h

5. *hirsutum*, fol. ellipticis acutiusculis ciliatis subtus punctatis, corollis infundibuliformibus. Willd. p. 604. Jacq. Flor. austr. t. 98. Hab. in alpinis. h

6. *Chamaecistus*, fol. ellipticis acutiusculis glanduloso-ciliatis nudis, cor. rotatis, petalis obtusis. Willd. l. c. Jacq. t. 217. Hab. in Ballo et Austria.

7. *caucasicum*, fol. scabris subtus ferrugineo-tomentosis, umb. terminalibus, cor. rotatis, petalis subrotundis. Willd. Pall. ross. 1. p. 46. t. 35. Hab. in summis alpinis Caucasi. h

8. *Chrysanthum*, fol. oblongis scabris, subtus discoloribus glabris, umbellis terminalibus, cor. rotatis, petalis obovatis irregularibus. Willd. Lin. suppl. 337. Pall. in. 3. p. 369. app. t. N. f. 1. 2. Gmel. sib. 4. p. 121. t. 54. Hab. in Sibiriae apibus, etc. Frutex parvus diffusus. Fol. venoso-reticulata. Rami squamis stipulaeformibus ferrugineis tecti. Flos luteus. L.

9. *ponticum*, fol. oblongis glabris utrinque concoloribus, corymbis terminalibus, cor. campanulato-rotatis, petalis lanceolatis. Willd. Jacq. ic. rar. t. 78. Pall. ross. 1. p. 43. t. 29. Lam. ill. t. 363. Hab. in Oriente et Gibraltariae subhumidis umbrosis.

Obs. *Cal.* lacin. brevissimae, acutae. M. Plerumque in hortis haecce species, nec sequens, colitur.

10. *maximum*, arborescens, fol. subcuneato-oblongis coriaceis glabris, cal. lacinis ovatis obtusis, cor. subcampanulata. Mich. t. p. 259. Cfr. L. et Willd. p. 607. Hab. in Amer. boreali. Fol. subtus pallidiora, laevia, juniora subtomentosa. Flor. magis congesta. Frut. tener.

11. *catabiense*, fol. brevioralib. utrinque rotundato-obtusis, cor. campanulata, cal. lacin. elongatis. Michaux. Flor. 1. p. 258. Hab. in montib. excelsis Carol. septentrion. juxta originem amnis Catawba.

ERICORDEA, s. *bicornia* Decandra. (Gen. 1086-92.)

1086. VACCINIUM. *Cal.* superius. *Cor.* urceolata aut campanulata, 4-5-fida: lacinis reflexis. *Filam.* germini inserta. *Bacca* 4-5-locularis, polysperma. (*Stam.* quibusdam 8.)

\* *Flor. subsolitariis.*

1. *Myrtillus*, pedunc. 1-floris, fol. serratis ovatis deciduis, caul. angulato. L. Engl. bot. t. 456. Hab. in ericetis, sylvaticis arenosis. Var. *bacca alba*. *Stam.* 8-10.

2. *myrtilloides*, pedunc. 1-floris, fol. lanceolatis integris, margine pubescentibus membranaceis. Michaux. 1. p. 234. Hab. in Amer. boreali. Facie praecedentis.

3. *uliginosum*, pedunc. 1-floris, fol. obovatis lanceolatisque glabris, ramis teretib. Engl. bot. t. 681. Flor. Dan. t. 231. Hab. in paludosis montosis. *Stam.* 8-10. Caul. erectus.

\* *sednense*, pedunc. 1-floris, fol. obovatis integris, caul. decumbente ramosissimo. Hab. in montosis, siccis graminosis, (in monte Danzet et de Seyne, dép. Basses-Alpes). Clavon. A V. *uliginosum* specie differre videtur. Fol. nonnulla subemarginata.

4. *cespitosum*, pusillum multicaule, flor. solitariis subsessilibus, fol. obovatis serratis. Michaux. l. c. Hab. circa sinum Hudson. Frut. 2-4-uncialis. *Stam.* 8.

5. *cereum*, pedunc. 1-floris, cor. 5-angulatis ovatis, fol. ovato-subrotund. serratis. Forst. Lin. suppl. p. 238. sub Androm. Hab. in ins. Tahiti.

6. *hirtum*, pedunc. unifloris, fol. ovatis serratis, ramis teretibus divaricatis. Hab. in Japonia. Ramosissimum. Ramuli apice villosi. Cor. campanulata.

7. *stamineum*, pedunc. solitariis nudis unifloris, antheris cor. longioribus. foliis oblongo-ovatis acutis integerrimis, subtus glaucis. Ait. Andrew. t. 263. Mich. Flor. t. p. 227. Hab. in America septentr. Fol. albicaulia ovalia. R. h

8. *album*, pedunc. simplicibus, fol. integerrimis ovatis subtus tomentosis. L. Hab. in Pennsylvania. Flor. duo vel tres ad apices ramorum. L.

9. *mucronatum*, pedunc. simplicissimis unifloris, fol. ovatis mucronatis glabris integerrimis. L. Hab. in Amer. septentr. Frut. ram. glaucis.

10. *dumosum*, fol. ovatis acutis glabris pedunc. unifloris bracteatis, cor. urceolatis. Andrew. t. 112. Hab. in America bor. Cor. subalbida.

11. *diffusum*, pedunc. solitariis nudis unifloris, fol. ovatis acutis obsolete serratis villosiusculis. Ait. Kew. 2. p. 11. Hab. in Carolin. australi. h

12. *angustifolium*, peduncul. solitariis unifloris, fol. elliptico-lanceolatis glabris obsolete serrulatis. Ait. l. c. Hab. in Terra Nova et Labrador. h

\* \* Flor. corymbosis aut racemosis.

13. *corymbosum*, flor. corymbosis ovatis fol. oblongis acuminatis integerrimis. L. V. disomorphum. Michaux. t. p. 231. et V. *amoenum*. Ait. Kew. 2. p. 22? Andr. t. 138. Hab. in America septentrionali. Fol. nervis subtus villosis. Cor. cylindraceo-ovatae, longiores quam in reliquis.

14. *bracteatum*, racem. foliatis, foliis serratis acutis. Thunb. jap. p. 156. Hab. in Japonia. Fol. margine revoluta, utrinque glabra. Cor. cylindrica alba. h

15. *ciliatum*, racem. foliatis, fol. ovatis integerrimis bispidis. Thunb. jap. 156. Cum priore. Fol. ramea hispida. Cor. rubra.

16. *fuscatum*, racem. nudiusculis, cor. cylindrico-ovatis, calycibus acutis. fol. ellipticis acutis integerrimis, venis subtus villosiusculis. Hab. in Amer.

17. *frondosum*, racem. bracteatis, pedicellis bracteolatis, cor. subcampanulatis, fol. obovato-oblongis integerrimis deciduis Andr. t. 100? Hab. in Amer. septentrion.

18. *venustum*, racem. bracteatis, pedicellis bracteolatis, cor. subcampanulatis, fol. ellipticis integerrimis deciduis glabris. Hab. in Amer. bor. h

19. *ligustrinum*, racem. nudis, caule fruticoso, fol. crenulatis oblongis. L. Hab. in Pennsylvania. Flor. in racemis, destituti bracteis. L.

20. *resinosum*, racem. bracteatis, cor. ovatis, fol. ellipticis acutiusculis integerrimis deciduis, atomis resinosis irroratis. Ait. Kew. 2. p. 12? Andromeda baccata. Wangenh. amer. 11. t. 30. f. 69. Habit. in America boreali. h

21. *glaucum*, fol. sublanceolato-cuneatis integerrimis dilute glaucis, subtus resinosis, racem. laxis, cor. globosis. Mich. Flor. t. p. 231. Lam. enc. t. p. 71. Hab. in Pennsylvania, Carolina. Affine V. *resinoso*. Bacca glauco-nigra, edulis. M. h

22. *arborescens*, fol. petiolatis obovatis mucronatis, racem. bracteatis, cor. campanulatis, anther. dorso-aristatis. Michaux. p. 230. Hab. in Amer. bor. sylv. subaridit. Arb. 15-20-pedalis. Fol. lucida, punct. glandulosi.

23. *pallidum*, racem. bracteatis, cor. cylindraceo-campanulatis, fol. ovatis acutis serrulatis glabris deciduis. Ait. Hort. 2. p. 18. Hab. in Amer. boreali. h

24. *parviflorum*, fol. lanceolatis undulatis venosis, flor. racem. pedunc. longissimis bracteatis, cor. conica striata. Andrew. t. 125. h

25. *formosum*, fol. integerrimis oblongis acutis glabris, flor. racemoso-fasciculatis subcylindraceis castatis, cal. adpressis. Andrew. t. 97. h

26. *virgatum*, fol. oblongo-ovatis serrulatis, flor. racemoso-fasciculatis axillaribus subcylindraceis, cal. apice-reflexis. Andr. t. 181. Hab. cum 2 antecedentib. in Amer. boreali. h

27. *carnosum*, fol. ovatis serratis crassiusculis, flor. subumbellatis campanulatis. Andr. t. 105. Hab. in Carol.

28. *pennsylvanicum*, fol. sessilib. ovali-lanceolatis serrulatis incisilis, flor. fasciculatis subterminalib. ovatis. Mich. p. 233. Hab. in Pensylv., Georg. Frut. ramosiss.

29. *myrsinites*, fol. sessilib. ovalibus mucronatis subserratis, subtus punctatis, flor. corymbosis sessilib. Lam. enc. t. p. 73. Mich. p. 233. Hab. in aridis Floridae. Frut. erectus, ramosiss. microphyllus. Cor. purpurea. M.

30. *tenellum*, racem. bracteatis sessilib., cor. ovato-cylindraceis, fol. oblongo-ellip-

tici subcuneiformibus serrulatis deciduis subglabris. Cfr. *V. galezans*. Mich. p. 232. Hab. in America bor. h

31. *Arctostaphylos*, flor. racemosis, fol. crenulatis ovatis acutis, caule arboreo. L. Andrew. t. 30. Tournef. it. 2. p. 223. t. 223. *β cappadocium*, maxima, mespili folio, flore variegato. Tournef. cor. 42. Hab. in Cappadocia et Madera. h

32. *meridionale*. fol. ovato-oblongis acutis serratis perennantibus planis lucidis, racem. terminalib. erectis, cor. prismaticis. Ait. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 676. Hab. in montibus caeruleis Jamaicae. Fruct. *V. Vitis idaeae* sapidus.

33. *Vitis idaea*, racemis terminalibus nutantibus, fol. obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. L. Engl. bot. t. 598. Flor. dan. t. 40. Hab. in sylvis montosis, locis petrosis. h

*Obs.* *Vaccinia* ab *Andromedis* fructu tantum differunt.

1087. *CERATOSTEMA*. *Cal.* turbinatus. 5-fidus: laciniis majusculis. *Cor.* coriacea, tubo longo, limbo recto. *Antherae* longae, erectae bipartitae s. bifurcatae. *Bacca* globosa, truncata, coronata, 5-locularis.

1. *peruvianum*, fol. sessilibus ovalibus, flor. panic. laxa. Hab. in Peru. Flor. magni. Pedunc. bracteati. Juss. h

1088. *ANDROMEDA*. *Cal.* 5-partitus, inferus. *Cor.* ovata: ore 5-fido, reflexo. *Caps.* 5-locularis, valvulis dissepimento contrariis. (Flor. quidam 8-andri.)

\* *Foliis oppositis.*

1. *tetragona*, pedunc. solitariis lateralib., cor. campanulatis, fol. oppositis imbricatis obtusis revolutis. L. Pall. ross. 2. p. 56. t. 73. f. 4. Fl. lapp. 166. t. 1. f. 4. Willd. Sp. II. p. 607. Hab. in alpinis Lapponicis, Sibiricis. h

2. *ericoides*, fol. imbricatis convexis margine setaceo-ciliatis, pedunc. solitariis axillaribus, corollis globosis. Willd. Pall. ross. 2. p. 56. t. 73. f. 3. Hab. in Camtschatca, in Sibiria, et in summis alpinis Davuriae. Caps. 4-5-locularis, 4-5-valvis. h

\*\* *Foliis sparsis.*

3. *hypnoides*, pedunc. solitariis termi-

nalibus, cor. campanulatis, fol. confertis subulatis. L. Flor. dan. t. 10. Fl. lapp. 166. t. 1. f. 3. Hab. in alpinis Lapponicis, Sibiricis. h

4. *lycopodioides*, pedunc. solitariis geminatisque lateralibus, flor. campanulatis octandris, fol. quadrifariam imbricatis. Gmel. sib. 4. t. 57. f. 1. Hab. in Camtschatcae montibus circa mare Ochot et in insula Beringii. h

5. *prostrata*, caul. fruticoso humifuso, fol. ovato-acutis glabris sparsis subserratis, pedunc. axillaribus solitariis. Cav. ic. 6. p. 43. t. 562. L. Hab. in Amer. australi.

6. *Myrsinites*, fol. minutis ovato-lanceolatis serratis sparsis, pedunc. solitariis axillaribus brevissimis unifloris. Lam. enc. ill. gen. t. 365. f. 2. *Arbutus Microphylla*. Forst. in Comm. Gotting. 9. p. 32. Willd. Sp. II. p. 699. Hab. in freti Magellanici sylvaticis, montosis. h

\*\*\* *Foliis alternis.*

7. *mariana*, pedunc. aggregatis rameis, cor. ovato-cylindricis, fol. oblongo-ovatis integerrimis deciduis. Duham. ed. nov. p. 177. t. 37. Jacq. ic. rar. 2. t. 465. Collect. 2. p. 326. *β. latifolia*. Hab. in Amer. boreali. In Europa culta ab anno 1736.

8. *ferruginea*, pedunc. aggregatis axillaribus, corollis subglobosis, fol. ellipticis integerrimis subtus squamoso-farinosis. Ait. Kew. 2. p. 67. Hab. in Amer. boreali. h

*α arborescens*, fol. confertiorib. revolutis convexis, flor. numerosis. Michaux. Flor. 1. p. 252.

*β. fruticosa*, ramis saepius flexuosis, fol. distantibus planiusculis, subtus reticulatis, flor. paucioribus. Michaux.

9. *cassinefolia*, pedunc. aggregatis, cor. campanulatis, fol. ovatis dentatis utrinque glabris. Vent. Hort. Cels. p. 60. t. 60. A. speciosa. Michaux. Flor. 1. p. 256. Hab. in Florida.

*β. pulverulenta*, pulvere albo conspersa, qui candor certe morbus est. Michaux. Bertram. it. t. 3. f. 2. Willd. p. 610.

10. *fasciculata*, pedunc. aggregatis, fol. alternis ovato-lanceolatis obtusis subcrenatis coriaceis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 836. Hab. in montib. Jamaicae australioris. h

11. *jamaicensis*, pedunc. aggregatis, cor. ovatis diaphanis, foliis alternis lanceolatis



lanceolatis obtusis interrigimis subtus cinereis. Swartz l. c. p. 538. Hab. in summis montibus Jamaicae.  $\eta$

12. *octandra*, pedunc. aggregatis, cor. cylindricis quadrifidis, fol. alternis ovato-lanceolatis integris. Swartz l. c. p. 840. Cum antecedente.  $\dagger$

13. *polifolia*, pedunc. aggregatis, cor. ovatis, fol. alternis lanceolatis revolutis. L. Fl. dan. t. 54. Duham. t. 38. Hab. in uliginosis.

$\alpha$ . *latifolia*, fol. oblongis, cor. ovatis incarnatis, laciniis calycinis patentibus ovatis albis interdum apice rubicundis. Ait. Kew. 2. p. 68. Hab. in Canada.

$\beta$ . *media*, fol. lanceolatis, cor. oblongo-ovatis rubicundis, laciniis calyc. magis erectis. Ait. Hab. in Russia, Siberia.

$\gamma$ . *angustifolia*, fol. lanceolato-linearibus, laciniis calycinis oblongis rubris. Ait. Kew. 2. p. 68. Hab. in Terra nova et lit. Labrador.  $\eta$

$\delta$ . *subulata*, fol. lineari-subulatis. Duham. p. 183. Cum priore.

14. *rhomboidalis*, ramis floriferis triquetris, fol. rhomboidatilibus lanceolatisque integerrimis cartilagineis glabris, gland. terminatis, pedunc. axillarib. aggregatis. Duham. l. c. p. 192. Hab. in Carolina et Florida.

15. *salicifolia*, racemis secundis nudis, cor. subcylindricis, fol. lanceolatis acutis integerrimis trinerviis. Lam. enc. t. p. 158. Hab. in ins. Mauriti. Fol. Lauri sassafr. fere, subtus alba, trinervia.  $\eta$

16. *buxifolia*, racemis secundis nudis, cor. subcylindricis, fol. cordato-ovatis integerrimis mucronulatis (erectis). Smith. ic. ined. t. p. 59. t. 59. Lam. l. c. Hab. in insula Bourboniae. Frut. 6-7-pedalis. Panic. pubescens.

17. *pyrifolia*, arborescens, cort. striato-sulcato, fol. ovato-acuminatis. Cresc. cum antecedente. Arb. 20-pedalis. Flor. unicolores obscure purpurei. Panic. glabra. Aubert.

18. *ilicifolia*, fol. cordatis latis coriaceis subdentatis, flor. racemoso-paniculatis. Hab. in Peruvia (mis. D. Lagasca). Fol. breviter petiolata, juniora ovata, integerrima, majora versus basin dentibus distantib. Fruct. non vidi.  $\eta$

19. *rubiginosa*, fol. ovatis coriaceis integerrimis obtusis subtus pubescentibus  $\gamma$  ju-

niorib. rubiginosis, racem. lateralib. erectis, cor. cylindricis. Hab. in ins. St.-Thomae. Fol. superne venis prominulis, quadrantenus referunt fol. Sal. Caprae.  $\eta$

20. *japonica*, racemis secundis paniculatis terminalibus, fol. lanceolato-obovatis acutis apice serrulatis. Willd. Habit. in Japonia.  $\eta$

21. *arboorea*, panic. terminalibus, cor. subpubescentibus, fol. ellipticis acuminatis denticulatis. Ait. Kew. 2. p. 69. Arb. 50-60-pedalis. Habit. in Virginia, Carolina. Var. fol. glabris et villosis. Anth. muticae.

22. *paniculata*, flor. paniculato-racemosis terminalibus pubescentibus nudiusculis, fol. ovatis-acutis integris. A. paniculata. Michaux. p. 254. et Aiton? A. parabolica. Duham. ed. nov. p. 191. Flor. conferti, parvi, subrotundi. Var. fol. subtus pubescentibus. Hab. in Virginia, Carolina. An huc A. racemosa L.? sed flor. non racemosi, uti in sequente.

23. *racemosa*, racemis secundis bracteatis simplicibus nudis, cor. gibboso-cylindricis, fol. alternis oblongis serratis. L. Michaux. p. 256. A. paniculata. Duham. l. c. Hab. in Pennsylvania et Marilandia. Cor. cercae, oblongae, ut in A. axillari fere.  $\eta$

24. *axillaris*, racemis axillaribus simplicibus, cor. oblongis, fol. ovatis acutis serrulatis. Duham. arb. ed. nov. p. 186. t. 39. A. Catesbaei. Walt. Willd. p. 613. Hab. in Virginia, Carolina.  $\eta$

25. *acuminata*, racemis axillaribus simplicibus, fol. ovato-lanceolatis acuminatis serratis integrisque, cor. cylindricis. Duham. l. c. t. 42. Ait. Kew. 2. p. 70. A. lucida. Jacq. ic. rar. t. t. 79. Collect. 1. p. 95. A. populifolia. Lam. enc. Hab. in America bor.  $\eta$

26. *marginata*, ramis triangularibus, fol. ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis marginatis nitidis, pedunc. axillarib. aggregatis simplicibus. Duham. p. 188. t. 70. A. coriacea. Ait. A. lucida. Lam. Hab. in Car. et Florida prope rivos.  $\eta$

27. *rupestris*, racemis simplicissimis bracteatis, cor. campanulatis, fol. alternis oblongis serrulatis. Forst. prod. n.º. 195. Hab. in N. Zeelandia.  $\eta$

28. *calyculata*, racemis secundis foliaceis, cor. subcylindricis, fol. alternis lanceolatis obtusis punctatis. L. Lam. ill. t. 365. f. 4. Hab. in Amer. septent.

$\beta$ . *latifolia*, cor. oblongo-cylindraceis, fol. oblongo-ovalibus obtusis. Duham. l. c. p. 189. t. 41. Cresc. in Terra nova.

$\eta$   $\eta$

*Y. angustifolia*, cor. oblongo-ovalibus, fol. oblongo-lanceolatis. Ait. Kew. 2. p. 70. Hab. in Amer. boreali inque Sibiria. h

29. *anastomosans*, fol. ovatis subseriatis, subtus anastomosibus punctatis. Lin. suppl. 27. Hab. in N. Granada. Caul. villosus. Fol. rigida, venosa.

30. *bracteata*, fol. ovato-acutis, racem. terminalibus bracteatis, caul. hirsuto. Cav. ic. 6. p. 42. t. 562. f. 1. Cum sequente in Amer. australi, in monte Chinborago. Flor. hirti.

\* *glomerata*, fol. ovato-acutis, racem. axillaribus glomeratis, cor. glabris, bract. pedunc. longiorib. Cav. l. c. Auct. in dubio est, an eadem sit ac 29. species.

31. *eriphylla*, racem. secundis terminalibus bracteatis, cor. ovatis, fol. subrotundo-ovatis utrinque tomentosis, glandul. terminatis. Vandelli Flor. Lusit. et Bras. Specim. Hab. in Brasiliæ montosis.

1089. *EPIGÆA*. *Cal.* exterior 3-phyllus: interior 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis. *Caps.* 5-locularis: *Recept.* 5-partito.

1. *repens*, fol. cordato-ovatis integerrimis reticulatis, cor. cylindricis. Willd. p. 615. Andrew. Repos. t. 102. Lam. ill. t. 367. f. 1. Hab. in Virginisæ, Canadæ pinetis. Flor. fragantes. h

2. *cordifolia*, fol. cordatis subrotundis serratis convexis hispidis rigidis, cor. ovatis. Swartz prod. 73. Fl. ind. occid. 2. p. 842. Lam. ill. t. 367. f. 2. Hab. in mont. Guadeloupæ, inque Cajenna. h

1090. *GAULTHERIA*. *Cal.* exterior

2-phyllus: interior 5-fidus. *Cor.* ovata. *Nectar.* mucronibus 10.

*Caps.* supera, 5-locularis, vestita calyce interiore baccata.

1. *procumbens*, fol. oblongo-ovatis mucronatis dentatis confertis, caule procumbente flexuoso glabro. Andrew. t. 116. Lam. ill. t. 367. Fol. Thææ succedaneum. Hab. in Canadæ sterilibus arenosis. h

2. *erecta*, fol. ovatis mucronatis, caul. erecto, flor. racemosis. Vent. Hort. Cels. p. 5. t. 5. Hab. in Peru. Viscoso-glandulosa. Fol. margine revoluta, subdenticulosa. h

3. *buxifolia*, fol. subrotundo-ovatis dentatis subtus punctato-scabris, pedunc. solitariis axillarib., ramis hirtis erectis. Willd.

in N. act. soc. Berol. 4. Hab. in summo monte Caracas, cum 2 sequentibus.

4. *scabra*, fol. ovato-cordatis acutis dentatis scabris, racem. axillarib. bracteatis. Willd. l. c. Sempervirens. Cal. baccans ater. h

5. *odorata*, fol. obovatis obtusisserrulatis subtus punctato-scabris, racem. terminalib. bracteatis. Willd. l. c. Semperv. Fol. benevolentia. h

6. *antipoda*, fol. sparsis subrotundis serrato dentatis glabris, caule fruticoso diffuso, ramis pubescentibus. Forst. prod. u<sup>o</sup>. 196. Hab. in N. Zelandia. h

1091. *ARBUTUS*. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ovata, basi pellucida. *Bacca* supera, 5-locularis.

1. *Unedo*, caule arboreo, fol. glabris obtuse serratis, panicula terminali, baccis polyspermis. Lin. Lam. ill. t. 366. f. r. Mill. dict. t. 48. f. 1. 2. *β. turbinata*, fructu turbinato. Tournef. Hab. in Europæ australis et Orientis sylvis. h

2. *laurifolia*, arborea, fol. oblongis utrinque acuminatis acute serratis glabris, racem. axillarib. secundis sessilib. solitariis. Hab. in America septentrionali. Simillima *A. Unedoni*. h

3. *Andrachne*, caul. arboreo laevi, fol. glabris integerrimis serratisq., baccis polyspermis, panicul. nuda. Lam. enc. 1. p. 236. Ehret. act. angl. vol. 67. t. 6. Hab. in Oriente. Caul. epidermide denudatus. h

4. *integrifolia*, caul. arboreo, fol. ovatis integerrimis mucronatis, racem. terminalib. foliosis. Lam. enc. 1. p. 227. *A.* folio non serrato. Bauh. Tournef. *Cor.* 41. *Andrachne* veterum. Hab. in Candia, ad montem Ida. Ram. cortice deciduo demum denudati, uti in antecedente. + h

5. *ferruginea*, arborecens, fol. oblongis obtusis glabris integerrimis, racemis terminalibus. Hab. in America. *Cor.* magis elongata fere ut in *Andromeda*.

6. *acadiensis*, caul. procumbentibus, fol. ovatis subserratis, flor. sparsis, baccis polyspermis. L. Cfr. *A. lanceolata*. Lam. l. c. Hab. in Acadia. h

7. *alpina*, caul. procumbentibus, fol. rugosis serratis. L. Fl. dan. t. 83. Lightf. Scot. t. 11. f. a. b. Hab. in alpinis petrosis. *Bac.* 9-spermae.

8. *Uva ursi*, caul. procumbentibus, fol. integrissimis. L. Fl. lapp. t. 6. f. 3. Fl. dan. t. 33. Hab. in Europa frigida, Canada. Baccæ 5-spermae. h

9. *mucronata*, caule fruticoso, fol. alternis ovatis serratis mucronatis, pedunc. axillaribus unifloris. Lam. ill. t. 366. f. 2. Hab. in Tierra del Fuego. Frut. rigidissimus. Flor. cernui. h

10. *pumila* (empetrifolia), caulib. diffusis, fol. alternis distichis oblongis integerrimis, flor. lateralibus solitariis. Lin. suppl. 239. *Andromeda empetrifolia*. Lam. Willd. p. 609. Cum priore. Forst. in Comm. goett. 9. p. 32. Fol. fere Empetri. h

11. *phyllireae-folia*, caul. ramosissimo, fol. lanceolatis acuminatis acute serratis, flor. axillaribus. Hab. in Peru. Herb. Juss. Fol. parvula. h

1093. CLETHRA. Cal. 5-partitus, persistens. Petala 5. Stylus apice 3-fidus, persistens. Caps. 3-locularis, 3-valvis, cal. cincta. (Flor. spicati.)

1. *scabra*, fol. latis obcordatis scabris, subtus villosis. Hab. in Amer. (Herb. Juss.)

2. *alnifolia*, fruticosa, fol. obovato-lanceolatis, racemis spiciformibus, calycib. acutis, bract. flor. breviorib. persistentibus. Ait. Kew. 2. p. 73. Lam. ill. t. 369. Duham. arb. 1. p. 176. t. 71. Hab. in Amer. boreali.

3. *incana*, fol. ovatis acuminatis, subtus incano-tomentosis. Ctomentosa. Lam. enc. 1. p. 46. C. alnifolia.  $\beta$ . pubescens. Ait. An tantum prioris var.?

4. *acuminata* (glauca), arborescens, fol. ovalib. aut basi cuneatis acuminatis serratis, subtus glaucis, spicis subsolariis, bract. flor. longioribus deciduis. Michaux. Flor. 1. p. 260. Hab. in Carol. montib.

5. *paniculata*, fol. lanceolato-obovatis serratis glabris, panic. angustata bracteata. Willd. Ait. Kew. 2. p. 73. Cum priore. h

6. *arborea*, arbores, fol. oblongo-lanceolatis utrinque glabris serratis racem. spiciformibus, calycib. obtusis. Kew. 2. p. 73. Ventr. Hort. Malensis. t. 40. Hab. in Madera. Frut. 6-8-pedalis.

7. *tinifolia*, arbores, fol. oblongo-lanceolatis integerrimis subtus incanis, racem. paniculatis spiciformib. tomentosis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 845. Tinus occidentalis. Lin. Brown. jam. 214. t. 21. f. 1. Sloan. hist. 2. t. 198. f. 2. Hab. in montib. Jamaic. australis. h

1093. CUELLARA. Cal. 5-partitus. Petala 5, æqualia. Stylus 3-gonus. Caps. trigona, 3-locularis. Semina imbricata, membranacea.

1. *revoluta*, fol. oblongis denticulatis, basi revolutis excavatis. Syst. veg. Flor. Per. et Chil. p. 103. Hab. in Peruv. nemorib. Arb.

2. *ferruginea*, fol. oblongis integerrimis acuminatis basi laeviter excavatis. l. c. Frut. crecens in montib. frigidis et nemorosis.

3. *obovata*, fol. obovatis rugosis denticulatis. Syst. l. c. p. 104. Arb. excelsa, ligno valde duro.

1094. PYROLA. Cal. 5-partitus. Petala 5. Caps. 5-locularis, angulis dehiscens.

1. *rotundifolia*, fol. obovalibus, staminibus ascendentibus, pistillo declinato. L. Flor. dan. t. 110. Lam. ill. t. 367. f. 1. Hab. in sylvaticis.

2. *azarifolia*, fol. reniformibus, pistillo declinato. Michaux. Flor. 1. p. 251. Hab. in Amer. boreali. Scap. squamis convolutis.

3. *minor*, floribus racemosis dispersis, staminib. pistillisque rectis. L. Flor. dan. t. 55. Engl. bot. t. 158. Hab. in sylvaticis. Priore rarior.

4. *secunda*, racemo unilaterali, pistil. recto. Gmel. sib. 4. p. 129. t. 56. f. 2. Fl. dan. t. 402. Hab. in Europæ bor. sylvis. h

5. *uniflora*, fol. suborbiculatis, scapo unifloro. L. Fl. dan. t. 8. Engl. bot. t. 146. Hab. in sylvis abietinis. Flor. odorati. h

6. *umbellata*, fol. lanceolatis, pedunculis subumbellatis. L. Lam. ill. t. 367. f. 2. Hab. in Europæ, Asiae et Amer. septentrionalis sylvis. h

7. *maculata*, fol. oppositis subpetiolatis, pedunc. bifloris. L. Pluk. mant. 157. t. 349. f. 4. Hab. in Amer. septentrion. sylvis. Fol. maculis albidiorib. picta. h

1095. STYRAX. Cal. campanulatus, subinteger, inferus. Cor. 5-7-partita: tubo brevi, cal. inserta. Drupa 1-2-sperma, coriacea. (Stam. 6-16, cor. tubo inserta. Anth. oblongæ lineares.)

1. *officinale*, fol. ovatis subtus villosis, [H h 2]

racemis simplicibus folio brevioribus. Ait. Kew. 2. p. 75. Willd. Sp. II. p. 623. Cavan. Diss. 6. p. 338. t. 182. f. 2. Lam. ill. t. 369. Hab. in Syria, Judaea, Italia. *h*

2. *grandifolium*, fol. obovatis subtus villosis, pedunc. inferioribus axillaribus solitariis unifloris. Ait. Kew. 2. p. 75. S. officinale. Walt. carol. 140. Hab. in Carolina australi. *h*

3. *Benzoin*, fol. oblongis acuminatis subtus tomentosis, racemis compositis longitudine foliorum. Dryand. in Act. angl. 77. p. 308. t. 10. Hab. in Sumatra. Ex hac arbore resina Benzoin dicta. Willd. *h*

4. *laevigatum*, fol. oblongis utrinque glabris dentatis, pedunc. axillarib. unifloris solitariis binisve. Ait. Kew. 2. p. 75. S. glabrum. l. c. 188. f. 1. S. americana. Lam. enc. 1. p. 8. f. 5. Hab. in Carolina australi. Stam. 8. *h*

#### 1096. INOCARPUS. *Cal.* bifidus.

*Cor.* infundibuliformis, lacin. lineares. *Stam.* duplici serie. *Drupa* monosperma, maxima.

1. *edulis*. Lin. suppl. 239. Forst. N. gen. n<sup>o</sup>. 33. Lam. ill. t. 362. Rumph. 1. t. 65. Hab. in India. Arb. fol. alterna subcordata. Spicae axillares, hirsutae. Flor. parvi, bracteis suffulti. L.

#### 1097. SAMYDA. *Cal.* 5-partitus, coloratus. *Cor.* nulla. *Nectar.* campanulatum, staminiferum. *Caps.* intus baccata, 4-valvis, 1-locularis. *Semina* nidulantia. (Stam. 8, 12 et plura.)

1. *nitida*, flor. octandris, fol. cordatis glabris. L. Willd. p. 624. Brown. jam. 217. t. 23. f. 3. Hab. in America. *h*

2. *macrophylla*, flor. octandris, fol. ovatis acutis glabris, axillis venarum subtus villosis, corymbo terminali. Willd. p. 625. Hab. in India orientali. Stigma pilosum. Fruct. ignotus. *h*

3. *multiflora*, flor. octandris, fol. oblongis dentatis utrinque attenuatis, subtus tomentosis, pedunc. unifloris aggregatis axillaribus. Willd. Cavan. ic. 1. p. 48. t. 67. Hab. in ins. St. Dominici. *h*

4. *villosa*, flor. decandris, fol. oblongis subterratis basi obliquis, sericeis, subtus villosis, pedunc. solitariis axillarib. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 758. Hab. in montibus Jamaicae. *h*

5. *glabrata*, flor. decandris, fol. ovato-lanceolatis integerrimis nitidis, pedunc. axillaribus unifloris. Swartz. l. c. 2. p. 760. Hab. in montib. Jamaicae australis. Cum S. nitida non confundenda. Sw. *h*

6. *spinescens*, flor. decandris terminilibus, fol. lanceolato-ovatis obtusis crenatis glabris, ramis patulis spinescentib. Swartz. l. c. 2. p. 762. Hab. in Hispaniola. *h*

7. *pubescens*, flor. dolecantris, foliis ovatis subtus tomentosis. L. Hab. in America. *h* +

8. *serrulata*, flor. dolecantris, foliis ovato-oblongis serrulatis. L. Jacq. Collect. 2. p. 328. t. 17. f. 1. Plum. gen. 4. ic. 146. f. 2. Hab. in America. *h*

9. *polyandra*, flor. polyandris. Willd. p. 626. Melastaurum distichum. Forst. gen. n<sup>o</sup>. 72. Hab. in N. Caedonia. *h* +

#### 1098. CASEARIA. *Cal.* 5-phyllus.

*Cor.* o. *Nectar.* 4-5-phyllum, cum staminibus alternans. *Caps.* intus baccata, 3-valvis, 1-locularis. *Sem.* nidulantia. (Stam. quibusdam 8.)

#### \* *Flor. octandris.*

1. *spinosa*, flor. octandris, fol. ovatis serratis glabris, pedunc. axillarib. unifloris, ramis spinosis. Willd. Sp. II. p. 626. Hab. in montosis Domingo. *h*

2. *nitida*, flor. octandris, fol. ovatis crenatis glabris, cymis pedunculatis axillarib. Willd. Jacq. amer. ed. picta. Act. helv. 8. p. 58. t. f. 4. Hab. in Carthagenae fruticetis. *h*

3. *ramiflora*, flor. octandris, fol. ellipticis serratis utrinque glabris, ramis floriferis. Iroucana gujanensis. Auhl. guj. 1. p. 329. t. 127. Lam. ill. Athenaei. Schreb. H b. in ins. St. Crucis, et ad littora maris Gujanicae, Cajennae. *h*

4. *hirta*, flor. octandris, fol. ovatis serratis subtus hirtis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 756. Hab. in pascuis sylvaticis Jamaicae. *h*

#### \*\* *Flor. decandris.*

5. *parviflora*, flor. decandris, fol. oblongis acuminatis crenulatis utrinque glabris nitidis, pedunc. conferis axillarib. unifloris. Willd. p. 627. Samyda parviflora. L. Sloan. hist. 2. p. 108. t. 211. f. 2. Hab. in fruticetis Amer. calidioris. *h*

6. *parvifolia*, flor. decandris, fol. ovatis acuminatis serratis glabris, pedunc. unifloris aggregatis lateralibus. Willd. C. decandra. Jacq. amer. 133. t. 85. Hab. in montib. sylvaticis Martinicae. Diversa a praecedente. h

7. *sylvestris*, flor. decandris, fol. ovatis acuminatis integerrimis, ramis virgatis, pedunc. axillaribus confertissimis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 754. Hab. in sylvis montosis Indiae occidentalis. h

8. *macrophylla*, flor. decandris subtomentosis, fol. elliptic. acuminatis subcrenatis. Pitumba gujanens. Aubl. guj. 2. app. 29. t. 385. Hab. in Cajenna. Rami griseo punctati. h

9. *serrulata*, flor. decandris, fol. ovato-lanceolatis obtusis serrulatis, ramul. flexuosis, pedunc. axillaribus confertissimis. Sw. Fl. ind. occid. 2. p. 754. Hab. in Indiae occidentalis insula Nevis. h

10. *elliptica*, flor. decandris, fol. elliptico-lanceolatis obtusis subseratis, juniorib. subtus pubescentibus, pedunc. axillaribus confertis. Willd. Anavinga lanceolata. Lam. enc. 1. p. 446. Ejusd. ill. gen. t. 355. f. 1. Hab. in India orientali. h

11. *Anavinga*, fol. alternis ovatis acuminatis serrulatis, baccis globosis pedunculo aequalib. Lam. 1. c. sub Anavinga. Rheed. 4. t. 49. Hab. in India orientali. Flores ocandri? h

12. *hirsuta*, flor. decandris, fol. ovatis acuminatis dentato-serratis hirtis, subtus villosis, pedunc. lateralibus confertis. Sw. Fl. ind. occid. 2. p. 755. Hab. in montibus Jamaicae et Hispaniol. c. h

1099. CRATERIA. Cal. 5-partitus. Cor. o. Nectarium crateriforme, setis 10, distinctum hirtis coronatum, et cui stamina, alterna breviora, inserta. Stigmata 3. Fruct. ...? (Pericarp. 1-loculare? exsuccum?)

1. *fasciculata*, fol. oblongis serratis acuminatis, flor. fasciculatis. Chaetocrater. Syst. veg. Flor. Peruv. et Chilens. p. 106-107. Hab. in Peru in Chincho. Arb. 4-orgyalis. Fol. subamara, col. ochraceum suppetit.

2. *capitata*, fol. oblongis serratis acuminatis, flor. capitatis. Chaetocrater capitatum. l. c. p. 109. Cum priore. Arb. triorgyalis.

Obs. A priore genere praesertim nectario, quod in hoc setis decem, nec lacinis 5-ovatis uti in *Cosearia* distinguitur, forte et fructu differt, qui nondum observatus.

1100. AQUILARIA. Cal. campanulatus, 5-fidus. Cor. o. Nectar. campanulatum. 5-fidum, interne staminiferum. Caps. 2-locularis, 2-valvis, lignosa. Sem. solitaria.

1. *ovata*. Cavan. diss. 7. p. 377. t. 224. A. malacensis. Lam. enc. 1. p. 49. \* a. p. 603. Ej. ill. gen. t. 356. Hab. in montibus Malacca. h

1101. AUGEA. Cal. 5-partitus. Cor. o. Nectar. 10-dentatum. Caps. 10-locularis.

1. *capensis*. Thunb. prod. 80. Hab. ad Cap. b. spei.

ELÆAGNEI, decandri (Gen. 1102-1105.) Flor. sunt incompleti. Cal. tubulosus, superus, cui stamina inserta. Styl. 1. Fruct. baccatus, aut drupaeus 1-spermus. Frutices vel arbores sunt, fol. plerumque alternis.

1102. BUCIDA. Cal. 5-dentatus, superus. Cor. o. Bacca 1-sperma, coronata.

1. *Buceras*, spicis elongatis, fol. cuneiformib. glabris. Vahl. eclog. 1. p. 50. Lam. ill. t. 356. Hab. in Jamaica. Fruct. saepe in cornua longa spongiosa exrescunt. h

2. *capitata*, flor. capitato-spicatis, fol. cuneiformib. margine villosa-ciliatis. Vahl. eclog. 1. p. 50. t. 8. Hab. in Montserrat. h

1103. TERMINALIA. Cal. 5-fidus, intus villosus, patens. Cor. o. Drupa infera, compressa, carinata, 1-sperma. (Flor. racemosi.)

1. *Catappa*, fol. obovatis crenulatis subtus tomentosis. Lam. enc. 1. p. 348. Rheede. 4. t. 3. et 4. Hab. in Malabar. Arb. procera, pyramidalis.

2. *moluccana*, fol. obovatis integerrimis utrinque glabris. Lam. l. c. p. 349. Catappa. Rumph. 1. t. 68. Hab. in Moluccis, Java. Arb. praecedenti affinis.

3. *mauritiana*, fol. oblongo-lanceolatis obsolete crenatis glabris, stam. calyce longioribus. Lam. l. c. Hab. in ins. Mauritii et Bourboniae, ubi inter arbor. maxima, et resinosa. Commers. *Le faux Benjoin* incolis.

4. *Benzoe*, fol. angustulo-lanceolatis subrepandis pilosis sanguineo-venosis. Lam.

1. c. *angustifolia*, Jacq. hort. vind. 3. t. 100. Croton Benzoe. Lin. Hab. in Ind. orientali. Arbusc. succum lacteum stillans, et resinam Benzoin sistens.

5? *Vernix*, fol. lanceolato-linearibus glabris. Lam. p. 350. Rumph. caul. 9. p. 259. t. 86. Hab. in montosis Chinae, Molluc. Ex hac vernix Chinensium.

6. *Chebula*, fol. ovatis integerrimis nudis, petiol. superne biglandulosi. Retz. obs. 5. p. 31. Hab. in Ind. montibus. Pedunc. racemosi, flor. verticillatis.

7. *arbuscula*, fol. ovato-lanceolatis integris pubescentibus, ramis dichotomis, racemis erectis. Swartz. prodr. p. 68. Hab. in Amer. meridion.

1104. **CHUNCHOA**. *Cal.* 5-fidus, campanulatus, superus, deciduus. *Cor.* o. *Drupa* 1-sperma, inæqualiter alata. (Cfr. Juss. gen. pl.)

1. *obovata*, fol. obovatis acuminatis, spicis pendulis, caps. 5-alatis. *Gimbernatis* obovata. Flor. Per. et Chil. Syst. p. 274. Hab. in Peruviae nemorib. Arb. 40-ulnaris, ligno durissimo.

2. *oblonga*, fol. oblongis, spicis congestis, caps. dipteris. *Gimb.* oblonga. Flor. Per. etc. p. 375. Cresc. in Poguzo nemorib.

1105. **TANIBUCA**. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, basi 1-bracteatus. Fruct. compressus orbicularis, alatus?

1. *gujanensis*. Aubl. gujan. t. 128. Juss. gen. pl. Arb. Flor. spicato-racemosi. (Vidi fructum, in Herb. ill. Juss., satis magnum, orbicularem.)

## D I G Y N I A.

1106. **ROYENA**. *Cal.* urceolatus. *Cor.* 1-petala, limbo revoluti. *Caps.* 1-locularis, 4-valvis.

1. *lucida*, fol. ovatis scabriusculis. L. Willd. Sp. II. p. 631. Lam. ill. t. 370. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequentibus. h

2. *villosa*, fol. cordatis oblongis subtus tomentosis. L. Rami villosi.

3. *pallens*, fol. oblongo-obovatis obtusis glabris. Willd.

4. *glabra*, foliis lanceolatis glabris. L. Comm. hort. 1. p. 125. t. 65.

5. *cuneata*, fol. subcuneato-oblongis pubescentibus nerviis, caul. subvillosi. Lam. enc. 6. p. 322. Hab. in India? Flor. solitarii. Cal. albidus. Cor. purpurea.

6. *hirsuta*, fol. oblongo-lanceolatis villosiusculis. Willd. Lam. ill. l. c. f. 2. Jacq. coll. suppl. 110. t. 13. f. 1. Hab. ad Cap. b. spei. h

7. *polyandra*, fol. ellipticis, flor. polyandris polygamis. Lin. suppl. 240.

8. *ambigua*, fol. obovatis villosiusculis coriaceis, flor. pedunculatis polyandris polyginis, cor. 6-7-fidae lacin. obtusis. Vent. Malma. t. 17. Flor. fulvi, lacin. reflexi.

8. *angustifolia*, fol. lanceolatis acutis subtus pilosiusculis. Willd. Cum priorib.

1107. **HYDRANGEA**. *Cal.* superus, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* 2-locularis, 2-rostris, foramine inter cornua dehiscens.

1. *vulgaris*, ( *arborescens*. L. ) fol. ovatis glabris, staminib. alternis longioribus, flor. conformibus. Smith. ic. pictae. 1. p. 12. Lam. ill. t. 370. f. 1. H. vulgaris. Michaux. Flor. 1. p. 268. Hab. in Virginia et Carolina. Nullatenus arborescit.

2. *nivea*, fol. cordatis, subtus niveo-tomentosis, flor. radiatis. Michaux. l. c. H. radiata. Willd. p. 634. Lam. l. c. f. 2. Cum priore.

1108. **CUNONIA**. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* bilocularis, acuminata, polysperma. *Styli* flore longiores.

1. *capensis*. L. Lam. ill. t. 371. Burm. afr. 259. t. 96. Hab. ad Cap. b. spei. Fol. opposita, pinnata. Racemi terminales, bini. h

1109. **TRIANTHEMA**. *Cal.* sub apice mucronatus. *Cor.* o. *Stam.* 5 s. 10-12. *Styli* 1-2. *Germen* retusum. *Caps.* circumscissa, 2-locularis: loculis 2-spermis. (Flor. axillares.)

1. *monogyna*, flor. pentandris monogynis. L. Lam. ill. t. 375. f. 1. Herm. par. 213. t. 213. Hab. in Jamaica, Curassao. ©

2. *crystallina*, flor. pentandris monogynis congestis, fol. ovalibus, caule fruticoso. Popularis. Forsk. descr. 69. Hab. in Arabia et in India orientali. h

3. *pentandra*, flor. pentandris digynis. L. Lam. ill. t. c. f. 2. Hab. in Arabia. Fol. petiolata, elliptica. Flores plures. ☉

4. *humifusa*, monogyna, fol. lanceolatis, caule frutescente tereti. Thunb. prod. 80. Hab. ad Cap. b. spec. h

5. *anceps*, monogyna, fol. lanceolatis, caule frutescente ancipiti. Thunb. prod. 80. Cum priore.

6. *decandra* (*glinoides*), flor. subdecandris digynis. L. Zalcia. Burm. ind. 110. t. 31. f. 3. Hab. in India. Statura Glini. Filam. 10, rarius 1. Fruct. in congenerebus.

1110. **CHRYSOSPLENIUM**. Cal. 4-s. 5-fidus, coloratus. Cor. o. Caps. birostris, 1-locularis, polysperma. (Flor. laterales S-andri.)

1. *alternifolium*, fol. alternis. L. Flor. dan. t. 366. Hab. in opacis humentibus, sylvis. Vere.

2. *oppositifolium*, fol. oppositis. L. Flor. dan. t. 365. Hab. ad rivulos in montosis.

1111. **SAXIFRAGA**. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Caps. 2-rostris, 1-locularis, polysperma.

\* *Fol. indivisis radicalibus, caule subnudo.*

1. *pyramidalis*, fol. radicalibus rosulatis lingulatis latioribus, obovatis serratis parulis, panic. composita recta. Lapeyrouse. Flor. d. Pyrenées. (Saxifr.) 1. p. 32. t. 41. f. 2. S. *Cotyledon*? L. Willd. Sp. II. p. 638. Flor. dan. t. 241. Lam. ill. t. 372. f. 3. Hab. in alpinis.

2. *recta*, fol. radicalibus rosulatis strictis glaucis supinis: incisuris cartilagineo-argenteis, panic. simplici. Lapeyr. l. c. p. 33. Moris. s. 12. t. 9. f. 19. fig. mala. Pluck. Phytog. t. 221. f. 1. Hab. in rupium fissuris.

3. *Aizoon*, fol. radicalibus rosulatis cartilagineo-serratis brevibus rotundatis verticalibus, flor. cymosis. Lapeyr. p. 33-34. Jacq. austr. 5. t. 438. Borel. ic. t. 1310. Hab. cum praecedentibus. Cal. glaber.

4. *longifolia*, fol. radicalibus rosulatis linearibus sublanceolatis integris longissimis, basi subteretibus, caul. paniculato nutante. Lapeyr. p. 26. t. 11. Hab. in Pyrenaeis, ad praecipitia. Caul. 1-3-petalis, multiflorus. Petal. alba punct. purpureis.

*Obs.* Quatuor hae species sub S. *Cotyledone* L. olim confundi sunt.

5. *mutata*, fol. radicalibus aggregatis lingulatis margine cartilagineis repandis, caul. racemoso folioso, calycib. glanduloso-pilosis, petalis linearibus lanceolatis. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 466. Curt. meg. 351. Hab. in alpinis. Fol. basi ciliato-plumosa. Lapeyr. S. *Cotyledoni* affinis, sed flores quadruplo majores, crocei nec albi. W.

6. *caliciflora*, fol. radicalibus rosulatis lingulatis integerrimis, petal. staminibusque intra cal. clausis. Lapeyr. l. c. p. 28. t. 12. Hab. in Pyren. saxis calcareis. S. *media*. Gouan. obs. p. 27. altitud. 3-5-uncialis. Petal. rosea rotundata, cal. breviora. L.

7. *Arettioides*, fol. radicalibus rosulatis integris, flor. capitatis, petal. linearibus obtusis crenulatis. Lapeyr. l. c. Cresc. in rupum fissuris. Caul. 1-2-unc. Petal. flava. Facie Aretiae. An huc S. *Aizoides*? L.

8. *lateopurpurea*, fol. radicalibus rosulatis integris, flor. paniculatis, cal. campanulato, petal. integris conniventibus. Lapeyr. p. 26. Hab. in saxis calcareis. Petala lutea. Cal. purpureasc. Non est hybrida.

9. *pennsylvanica*, fol. lanceolatis denticulatis, caule nudo paniculato, flor. subcapitatis. L. Hab. in Amer. boreali. Fol. caulibus articulatis tecta.

10. *hieracifolia*, fol. oblongo-lanceolatis glabris repando-dentatis, caule nudo, pedunculis unifloris aggregatis. Willd. p. 641. Waldst. et Kitaib. Plantae rar. Hungar. f. 17. t. 18. Hab. in alpih. Carpathicis, loc. uliginosis. Simillima praecedenti. Fol. tenuissima ciliata, pilis brevibus articulatis. Cal. et cor. flava patentissima. W.

11. *androsacca*, fol. lanceolatis obtusis pilosis, caule nudo bifloro. L. Jacq. austr. t. 389. S. alpina, habitu androsaces, villosa. Hall. Hab. in alpinis. W.

12. *caesia*, fol. linearibus perforato-punctatis aggregatis recurvatis, caul. multifloro. Jacq. austr. t. 374. Scop. carn. t. 15. S. recurvifolia. Lapeyr. l. c. p. 30. Hab. in alpinis. Fol. basi ciliata.

13. *burseriana*, fol. aggregatis imbricatis triquetris subulatis laevibus (glabris), caule subnudo unifloro. L. W. in Jacq. misc. 1. p. 152. t. 17. Segu. ver. 3. p. 201. t. 5. f. 2. Hab. in Taurero Rastadiensis, montib. Lessa-nensibus. Facies Sedi minoris. Caul. rufoescenti-hispidus. Fl. lactei, lincis pallidis. L.

H h 4

*P. spinosa*. R. *Burseriana*, fol. rosulatis imbricatis spinoso-ciliatis triquetris, flor. fastigiatis, petal. crispo-reflexis. Lapeyr. p. 35. t. 17. f. 1. Rarissime in Pyrenæis.

14. *tenella*, fol. lanceolatis mucronatis basi ciliatis imbricatis, caule nudiusculo paucifloro, calycibus mucronatis. Willd. p. 643. Wulfen in Jacq. Collect. 3. p. 144. t. 17. Hab. in Carinthiæ alpinis. T.

*Obs.* Accedit ad sequentem sed flor. quadruplo minores, cal. mucronatus et germ. inferum glanduloso-pilosum. Willd.

15. *bryoides*, fol. lanceolatis mucronatis margine cartilagineis ciliatis, caul. nudiusculo paucifloro, calycibus obtusis. Willd. Jacq. misc. 2. p. 49. t. 5. f. 1. Lapeyr. Saxifr. p. 35. t. 8. Hab. in alpinis. Petala flava, maculis fulvis.

16. *sedoides*, fol. aggregatis alternis oppositisque sublancoatis, flore pedunculato. L. Jacq. misc. 2. p. 134. t. 21. f. 22. S. muscoides. Allion. ped. n°. 1528. t. 61. f. 2. Hab. in alpinis. Tridentinis, Carinthiæ. T.

17. *stellaris*, fol. subrhomboidis serratis, caule nudo ramoso, petal. aequalibus acuminatis. L. Jacq. Coll. 1. p. 202. t. 13. Comosa, panicula foliacea. Fl. lapp. 175. t. 2. f. 3. Hab. in montosis alpinis ad latera rivulorum.

18. *leucanthemifolia*, hirsutissima, fol. elongatospatulatis, acute dentatis, caulibus divaricato-dichotomis, panic. capillaribus. petal. inaequalibus. Michaux. Flor. t. p. 268. Lapeyr. Saxifr. p. 49. t. 13. S. *Clusii*. Gouan. Hab. in Carol. alpinis et in Pyrenæis. Cal. reflexus.

19. *virginica*, pubens, fol. ovalibus obtusis subpetiolatis crenatis, caul. subnudo paniculato, cal. erectis. Michaux. p. 269. Pluck. t. 222. f. 5. Hab. in Amer. bor. Facie *Stellaris*. Allion. S. punctatae.

20. *crassifolia*, fol. ovalibus retusis obsolete serratis petiolatis, caule nudo, panic. conglomerata. Linn. dec. 2. p. 27. t. 14. Gmel. s. b. p. 166. t. 66. Hab. in alpinis Sibiriae. Fol. lina, palmatis, coriacea. Petala rubra. Flor. vere.

21. *nivalis*, fol. obovatis crenatis subsessilibus, caule nudo, floribus congestis. L. Flor. dan. t. 28. t. 12. Hab. in summis alpinis Spitzbergensibus, Lapponicis, Arvonicis, inque Virginia, Canada.

22. *Bellardiæ*, acaulis, fol. subrotundis repandis, flore sessili. Willd. Allion. ped.

n°. 1536. t. 88. Hab. in rupib. humidis Pedemontanis. T.

23. *davurica*, fol. cuneiformi-rhombicis apice dentatis glabris petiolatis, caule nudo. Willd. Hab. in summis alpinis Davuriæ, sub nive. T.

24. *sarmentosa*, fol. subrotundis dentatis pilosis, stolonibus reptantibus, petalis duobus elongatis. Ait. Kew. 2. p. 79. S. *stolonifera*. Jacq. ic. rar. t. 1. t. 80. Hab. in China, Japonia. Sarmenta ramosa e singulis fol. radicalium, alis copiosa radicanis propaginibus. T.

25. *punctata*, fol. subrotundis dentatis longius petiolatis, caule nudo. L. Moris. hist. 3. p. 478. s. 12. t. 9. f. 17. Hab. in Sibiria. T.

26. *umbrosa*, fol. obovatis subretusis cartilagineo-crenatis, petiol. dilatatis, caule nudo paniculato. L. Mill. ic. 141. f. 2. Lapeyr. l. c. p. 44. t. 16. Hab. in montib. apud Cantabros et in Pyrenæis. Flor. inferi, albi aut rosei, punctati. Caps. ampullaceæ. L.

27. *hirsuta*, fol. cordato-ovalibus retusis cartilagineo-crenatis, caule nudopaniculato. L. Hab. in Pyrenæis. Cal. reflexus.

28. *cuneifolia*, fol. cuneiformibus obtusissimis repandis, caule nudo paniculato fragili. L. Plant. rar. hong. p. 43. t. 44. Lapeyr. Saxifr. p. 45. Hab. in alpinis. Petiol. cartilaginei. Cal. reflexus. Petal. candida, basi macula flava. Stam. per paria eriguntur, et anth. stigmatibus applicant, polline emissio divaricantur. Pl. l. c.

29. *Ceum*, fol. reniformibus dentatis, utrinque pilosis aveniis, caule nudo paniculato. L. Lapeyr. p. 46. t. 14. Moris. f. 12. t. 9. f. 12. Gg. mala. Hab. in alpinis. Cal. reflexus.

\*\* *Fol. indivisis, caul. folioso.*

30. *caerulea* (*oppositifolia*. L.) fol. confertis ovatis ciliatis oppositis (subalternis. que) staminibus pistillisque cor. brevioribus. Lapeyr. Saxifr. p. 36. t. 16. Flor. dan. t. 34. (mediocr.) Hab. in alpinis super saxa, prope nives et gelu. In surculis sterilibus fol. alterna etiam vidi.

31. *biflora* (*rosea*), fol. obovatis omnibus oppositis distantibus, cor. pistillisque cal. duplo superantibus. Lapeyr. l. c. p. 37. t. 18. Allioni pedem. 2. t. 21. f. 1. Willd. p. 648. Cum priore. Flor. 1-3, rosei.

32. *retusa*, fol. imbricatis acutis trigonis basi ciliatis, pistil. staminibusque exsertis,



Lapeyr. p. 38. t. 18. Gouan. Obs. t. 18. f. 1. S. purpurea. Allioni. l. c. t. 21. f. 2. Hab. in Pyrenæis et alp. pedem. Petala dilate violacea.

33. *spatulata*, fol. spatulatis obtusis ciliatis, caul. prostrato, pedicell. axillarib. unifloris. Desf. atl. t. p. 342. t. 66. f. 2. Hab. in cauem. Atlantis. Cal. ciliatus. Cor. alba, obovata.

34. *aspera*, fol. caulinis lanceolatis alternis ciliatis, caulib. procumbentibus. L. Jacq. aust. 5. p. 44. app. t. 31. Hab. in alpih. Petala albida ungue luteo. ¶

35. *Hirculus*, fol. caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto. L. Flor. dan. t. 200. Gmel. sib. 4. t. 65. f. 3. Hirculus qui Chamae Cistigenus. Clus. cur. 5. Hab. in alpestribus.

36. *autumnalis*, fol. caulinis linearibus alternis ciliatis: radicalibus aggregatis. L. S. Aizoides. L. Smith. brit. t. p. 432. Hab. in humentibus Borussiae, Angliae, Helvetiae. ¶

37. *rotundifolia*, fol. caulinis reniformibus dentatis petiolatis, caule paniculato. L. Lapeyr. p. 50. t. 26. Hab. in alpih. et montosis ad lœtera rivulorum. Flor. inferi.

\*\*\* *Fol. lobatis aut partitis.*

38. *granulata*, fol. caulinis reniformib. lobatis, caule ramoso, radice granulata. L. Flor. dan. t. 514. Hab. in Europae apricis. Var. flor. plenis, culta. ¶

39. *bulbifera*, fol. palmato-lobatis: caulinis sessilibus, caule ramoso bulbifero. L. Fl. dan. t. 390. Moris. s. 12. t. 9. f. 24. Hab. in Italiae pratis saxosis, inque Norvegia.

\* *veronicaefolia*, fol. inferioribus subrotulatis cordatis crenatis, petiol. breviusculis dilatatis, caul. sessilib. inciso-dentatis acutis, cauleque simplicissimo subvillosa, flor. 2-3-subcapitatis. Hab. in Hisp. et Helv. Rad. subtuberosa. Veron. arvens. refert.

40. *cernua*, fol. caulinis palmatis petiolatis, caule simplicissimo unifloro bulbifero. Flor. dan. t. 22? Fl. lapp. 172. t. 2. f. 4. Hab. in alpih. Lapponicis.

¶ ? *retusa*. petal. retusis. Smith. Brit. 2. p. 453. Engl. bot. t. 664. An ob petala diversa?

41. *rivularis*, fol. caulinis palmatis: summo florali ovato, caule simplici subbifloro. L. Flor. dan. t. 118. Hab. ad alpih. Lapponicarum latera et rivulos. Parvula. ☉

42. *Cymbalaria*, fol. caulinis cordatis trilobis integrisque, caulib. procumbentibus. L. Buxb. cent. 2. p. 40. t. 45. f. 2. Tournef. Cor. 18. t. 32. Hab. in Oriente.

43. *hederacea*, fol. caulinis ovatis lobatis, caule filiformi flaccido. L. Hab. in Creta. ☉

44. *orientalis*, fol. subrotundis quinquelobis, caule ramosissimo procumbente. Willd. Jacq. obs. 2. p. 9. t. 34. Habit. in Oriente. An satis distincta a S. hederacea? W.

45. *cuneata*, fol. inferioribus petiolatis cuneiformibus quinquelobis, caulinis sessilibus lanceolatis, caule ascendente paniculato. Willd. p. 658. Cav. ic. 3. p. 25. t. 248. Hab. in Hispania. Petioli longi.

46. *pentadactylis*, fol. quinquelobis: lobis elongatis linearib. obtusis, stylis subulatis. Lapeyr. Fl. p. 64. t. 40. Hab. in Pyrenæis ad saxa umbrosa. Pl. duriuscula.

47. *ludaniflora*, fol. multilobis integris, petiol. compressis amplexicaulibus, flor. tubulosis, cal. conicis. Lapeyr. p. 65. S. quinquefolia. Lam. Hab. in Pyrenæis. Totala planta gummi rubescente aromatico oblecta.

¶ *minor*, fol. omnibus trifidis, scapo nudo simplici, flor. capitatis.

48. *palmata*, fol. palmatis enerviis glandulosis, petiol. basi marginatis, flor. tubulosis. Lapeyr. p. 64. t. 41. Cum priorib. ad præcipitia, locis humentibus. Priori affinis sed multo minor. Gland. argenteo-lucilae.

49. *geranioides*, fol. radicalib. reniformibus quinquelobis multifidis, petiol. simplicibus, flor. tubulosis, cal. urceolatis. Lapeyr. p. 66. t. 43. Gouan. obs. t. 18. f. 2. Hab. in alpinis ad saxa humida, ubi cespitem latum efficit.

Obs. Var. scapo simplici nudo, flor. capitatis, et fol. laevissimis, etiam viscosa et odorata ac rigidior occurrit. Lap.

50. *ajugaefolia*, fol. radicalibus palmato-tri-quinquepartitis, caulinis linearib. indivisis, caulib. ad cendentibus multifloris. L. S. scapis lateralibus adscendentib. subbifloris. Lapeyr. p. 56. t. 31. Hab. in Gallio provinciae montibus, et in Pyrenæis. Scap. 2-unc. rubescens. Fol. parva, lacin. lanceolata.

51. *sibirica*, fol. reniformibus palmatis pilosis, caule pedunculisque filiformibus. L. Hab. in Sibiria. Flos majusculus, albus, inferus.

52. *petraea*, fol. petiolatis palmato-tripartitis, laciniis subtrifidis, caule flaccido ramosissimo decumbente, pedunc. longissimis unifloris, petalis marginatis. Wulfen in Jacq. Coll. 1. p. 200. Jacq. ic. rar. 1. t. 81. *S. rupestris*. Willd. p. 653. Hab. in Carinthiae alpinis. ☉

53. *Tridactylites (annua)*, fol. caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. L. Curt. Lond. 2. t. 28. *S. annua*. Lapeyr. p. 30. Hab. in arenosis ad muros. Primo vere. Quoad loca variat. ☉

54. *adscendens*, caul. erecto firmo foliisque subcoriaceis cuneiformibus, apice tri aut quinquedentatis villosis-viscidis. Wulfen in Jacq. Collect. 1. p. 197. t. 11. et 12. f. 1. 2. Lapeyr. Flor. p. 48. t. 11. *S. petrosa*. Vahl. Willd. p. 64. *S. Scopoli*. Villars pr. Hab. in alpinis. Affinis *S. tridactyliti*, etiam viscida, sed caulis ramosissimus. Fol. lata, palmata. Cor. quadruplo majores. C.

55. *aquatica*, fol. palmato-quinquepartitis, lobis multifidis, caul. paniculato, flor. majoribus, pistill. clavatis. Lapeyr. p. 53. t. 28. *S. adscendens*. Willd. p. 653. *S. petraea*. Gouan. obs. t. 18. f. 3.  $\beta$ . caul. virgato, fol. lobis acutis subpinnatis. L. t. 29. Hab. in alpestribus, in aquosis. Caul. succulentus. Planta junior a pastoribus commeditur, etiam a pecoribus appetitur.

Obs. Nomen a Cl. Lapeyrouse huic speciei inditum, utpote loc. ejus natale optime exprimens, praefertur duxi, cum plures species sub nomine *S. adscendens* confundi sint.

56. *capitata*, caul. capitato sphaerico, pedunc. lateralibus inferis, fol. pubentibus rosulatis profunde trilobis, lobo intermedio tridentato. Lapeyr. p. 55. t. 30. Hab. in Pyrenaeis, inter carices et junco, in aquosis. Caul. 2-3-unc. longa, adscendens. Pedunc. radicalis sub fol. oriens. L.

57. *pedemontana*, caul. erecto subnudo, fol. trilobis et tridentatis, caulim. palmatis. Allioni. pedem. 1. t. 21. f. 4. Hab. in montibus pedemontanis. Distincta species. Fol. congesta. Petala ovata.

58. *tricuspidata*, fol. radicalibus congestis cuneiformibus ciliatis trienspidatis, caul. ascendentibus multifloris. Retz. scand. Ed. 2. Flor. dan. t. 976. Hab. in Groenlandia.

59. *leptophylla*, procumbens, glabra, fol. longe petiolatis trifidis quinquefidisque, laciniis linearib. divaricatis. *S. procumbens* et *hypnoides*. Herb. Juss. cit. Willd. Sp. II. p. 658. n<sup>o</sup>. 49. Hab. in alpinis. †

60. *Hypnoides (gemmifera)*, caespitosa, caul. erecto subnudo glabro, fol. confertis trifidis, fol. in surculis, apice in gemmam convolutis villosis. *S. hypnoides*. Lapeyr. p. 57. t. 32. Villars Delph. 3. p. 674. t. 45. Hab. in Pyrenaeis, Delphinatu, et in Monte aereo.

Obs. Linnaeus dicit de sua *S. hypnoides*, quod caul. procumbens et viscidus sit!

61. *globulifera* caul. bulbifero, fol. nervosis, imis spatulatis integerrimis, superiorib. palmatis 3-5-fidis, caulinis linearib. Desf. atl. 1. p. 341. t. 96. f. 1. Hab. in cacumine Atlantis. Facie *S. Hypnoides*. Caul. basi prostratus. Cor. alba.

62. *decipiens*, fol. pilosis palmatis 5-fidis trifidisque, caul. folioso paniculato, petal. subrotundis. *S. palmata*. Smith. brit. t. p. 456. Engl. bot. t. 455. *S. decipiens*. Ehrh. Hab. in Germaniae et Angliae rupibus subalpinis.

63. *nervosa*, fol. lobatis utrinque nervosis, cal. globosis, cor. patentibus, pist. subulatis. Lapeyr. p. 63. t. 30. *S. exarata*. Vill. Delph. 3. p. 674. t. 45. *S. Hypnoides*. All. pedem. t. 21. f. 4. exclus. synonym. Hab. in alpestribus inter muscos. Surc. lignosi. Caps. grandis. Nervi in fol. siccis inferiorib. distincti. Var.  $\beta$ . hirsuta.

Obs. An a priori satis diversa?

64. *intricata*, fol. rosulatis cuneato-incis nervosis, surcul. elongatis superioribus intricatis, petal. ovatis, pistil. subulatis. Lapeyr. p. 58. t. 33. Hab. in saxis altis humidis. An prioris var.? sed herbacea. L.

65. *moschata*, fol. radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque una cum caule glutinosi hirsuti (odoratis), florib. longe pedunculatis. Wulfen in Jacq. misc. 2. p. 128. t. 21. f. 21. Hab. in alpinis. Petal. elliptica, cal. longiora. Lapeyr. p. 61.

66. *groenlandica* (lasiosigma), fol. imbricatis cuneato-palmatis ciliatis, petal. rotundis, stigm. complanatis lanatis Lapeyr. p. 39. t. 10. *S. caespitosa*. Gunn. Norv. t. 7. f. 1. Hab. in alpinis. Pet. majuscula, trinervia, pallida. Styli divaricati.

67. *mixta*, fol. digitatis (trifidis) minutis nervosis subhirsutis, anth. sagittatis, stigm. pileatis reflexis, caul. subviscoso, 2-3-floro. Lap. p. 41. t. 20. *S. caespitosa*. L. All. et Villars.

$\beta$ . *elongata*, major, scapo elongato ramoso, fol. petiolatis multifidis. Flor. dan.

t. 71. Hab. cum priore. Caul. subviscosus  
2-3-florus.

68. *muscoides*, fol. subintegris linearib.  
carnosis pubescentibus, scapo filiformi  
subunifloro, petal. cal. subaequantibus. S.  
*caespitosa*. Lapeyr. p. 59. t. 34. Hall. it.  
helv. t. 1. S. muscoides. Jacq. misc. 2. p. 123.  
S. pyrenaeica. Villars. Hab. in alpinis. Flor.  
citrini. Caul. inferne rubiginosus. Var.  $\beta$ .  
surcul. erectis elongatis, fol. omnibus in-  
tegris. Lap. t. 34.

$\beta$ . *integrifolia*, fol. omnibus integris  
linearibus, surculis erectis elongatis. La-  
peyr. t. 34.

$\gamma$ . *hemispherica*, ramis congestis hemi-  
sphaericis, fol. brevibus imbricatis. La-  
peyr. t. 36.

69. *cymosa*, piloso-viscosa, caul. erecto,  
fol. ensiformib. 3-5-fidis: caul. 3-partitis,  
flor. cymosis, stylo cal. longiore. Plant. rar.  
hongar. S. caespitosa. Wulf. in Jacq. coll. 1.  
p. 290. Hall. hist. n.º 989. Hab. in Hongaria,  
in Austria, in alpinis. Cor. alba lineata.

Obs. S. *pedemontana*. All., quam cl.  
auctores huc allegant, secundum specimen  
a D. Balbis Turino benevole missum, quoad  
folia omnino differt, quae cuneata s. fla-  
belliformia.

70. *magellanica*, fol. congestis viscoso-  
pubescentibus, inferiorib. trifidis superiorib.  
simplicibus, flor. subhinnatis subsessilibus.  
Hab. ad Fretum magellanicum in alpinis.  
(Herb. Juss.) Pl. caespitosa. Petal. obovata.

Obs. Amplum hoc genus, tamen natu-  
rale, si forte excipias S. *crassifoliam* et  
*sarmentosam*, familiam plantarum, SATI-  
FRAGAE Juss., cum quatuor praecedentib.  
et duobus sequentibus generibus, nec non  
cum Henckera, Adoxa, Weinmannia et  
Hortensia? efficit, quae inter alios cha-  
racteres, capsula birostra mox diagnosci  
potest.

1112. TIARELLA. Cal. 5-partitus.  
Cor. 5-petala, calyci inserta:  
petalis integris. Caps. 1-locu-  
laris, 2-valvis: valvula altera  
majore.

1. *cordifolia*, fol. cordatis. L. Lam. ill.  
t. 353. Hab. in Amer. et Asia septentrionali.  
Petal. cal. longiora.  $\mathcal{T}$

2. *trifoliata*, fol. ternatis. L. Hab. in  
Asia boreali.

3. *bitermata*, fol. bitermatis, flor. race-  
moso-paniculatis. Vent. Malmois. t. 54. Hab.  
in Amer. septentrionali.

1113. MITELLA. Cal. 5-fidus. Cor.  
5-petala, calyci inserta: petalis  
pinnatifidis. Caps. 1-locularis,  
2-valvis: valvulis aequalibus.

1. *diphylla*, fol. cordatis subtrilob. den-  
tatis, scapo diphylo. Willd. Sp. II. p. 659.  
Lam. ill. t. 373. f. 1. Hab. in America sep-  
tentrionali.  $\mathcal{T}$

2. *cordifolia*, fol. cordatis ciliato-den-  
tatis, scapo nudo. Lam. enc. 4. p. 185. ill.  
t. 373. f. 3. Michaux Flor. 1. p. 270. Hab.  
in Canada, circa Quebec.

3. *prostrata*, fol. rotundato-cordatis,  
caul. prostratis foliosis. Mich. l. c. Hab. in  
Canad. meridion. Sublobata.

4. *nuda*, fol. reniformibus repandis ci-  
liatis, scapo nudo. Willd. Lam. l. c. ill.  
t. 373. f. 2. M. petalis fimbriatis. Gmel.  
sib. 4. p. 175. t. 63. f. 2. Hab. in Asia bo-  
reali.  $\mathcal{T}$

1114. SCLERANTHUS. Cal. 1-  
phyllus; cui Stamina inserta.  
Cor. nulla. Sem. 1-2, calyce  
inclusa.

1. *annuus*, calycibus fructus patulis. L.  
Flor. dan. t. 504. Hab. in arvis praesertim  
calcareis.

2. *perennis*, calycib. fructus clausis ob-  
tusis.  $\beta$ . cocciferus. Hab. in campis apri-  
cis arenosis. Cal. lacinae albido-margi-  
natae.  $\mathcal{T}$

3. *polycarpus*, calycib. fructus paten-  
tissimis spinosis, caule subvillos. L. Col.  
ecphr. 1. p. 295. t. 294. Hab. Mouspelii  
et in Italia.  $\odot$

CARYOPHYLLEAE. (Gen. 1115-1122.) Cal.  
in hac familia valde naturali utplurimum  
persistit. Petala ejusdem laciniis alterna,  
unguiculata, integra aut saepius incisa.  
Fructus simplex est capsularis, poly-  
spermus, receptaculo centrali libero dis-  
tinctus. Caul. utplurimum herbaceus,  
nolosus, stipulaceus aut nudus. Fol. op-  
posita, basi connata, integra. — Genera  
quaedam naturalia, in aliis species ali-  
quae ob stylosum numerum male dis-  
persae occurrunt.

1115. *GYPSOPHILA*. *Cal.* 1-phyllus, campanulatus, angulatus. *Petala* 5, ovata, sessilia. *Caps.* globosa, 1-locularis, polysperma.

1. *repens*, fol. linearibus, staminibus cor. emarginata breviorib. L. Jacq. austr. 5. p. 4. t. 407. Lam. ill. t. 375. f. 2. Hab. in Sibiria, Austria, Helvetia, Gall. meridional. Pyrenaeis.  $\overline{\text{T}}$

2. *prostrata*, fol. lanceolatis laevibus, caulib. diffusis, pistillis cor. campanulata longioribus. L. Pluk. alm. 22. t. 75. f. 2. Hab. in alpinis.

3. *paniculata*, fol. lineari-lanceolatis, inferioribus scabris, staminibus minutis, stylis cor. longioribus. Ait. Kew. 2. p. 84. Jacq. austr. p. 26. t. app. 1. Hab. in Sibiria, Tatariae desertis sabulosis.

4. *viscosa*, fol. ovato-lanceolatis laevib. basi cordatis amplexicaulibus, internodiis ramorum medio viscosis, petalis retusis. Ait. Kew. 2. p. 85. Murr. comm. goetting. 1783. p. 9. t. 3. Hab. in Oriente.  $\odot$

5. *adscendens*, fol. lanceolato-linearib., caulibus prostratis, cor. staminibus et pistillis ejusdem longitudinis. Jacq. hort. 2. t. 138. Hab. ...

6. *altissima*, fol. lanceolatis subtrinerviis, caul. rectis. L. Gmel. sib. 4. p. 443. t. 60. Boc. mus. 23. t. 5. f. 3. Habit. in Siliria.

7. *compressa*, caul. erecto hinc compresso, fol. subulato-lanceolatis striatis, pedicell. calycibusque pubescentibus. Desf. Atl. 1. p. 343. t. 97. Hab. in Barbar. arvis arenosis. Vere. Petala subtus venis violaceis variegatas.

8. *arenaria*, fol. linearibus subcarnosis glabris planis, caule corymbo o, petal. integris. Willd. Waldst. et Kitaib. pl. rar. Hung. p. 40. t. 41. Hab. in arenosis Hungariae. Cor. rarissime subemarginata. Cal. nullis squamis tectus. Caps. globosa.

9. *Struthium*, fol. linearibus carnosis: axillarib. confertis teretibus. L. Barr. rar. 64. t. 119. Rocc. mus. 2. p. t. 122. Hab. in Hispania.  $\overline{\text{T}}$

10. *fastigiata*, fol. lanceolato-linearib. obsolete triquetris laevibus obtusis secundis. L. Gmel. sib. 4. p. 144. t. 61. f. 1. Hab. in Gotlandiae, Borussiae, Helvetiae, Haryanae rupibus.

11. *perfoliata*, fol. ovato-lanceolatis semiamplexicaulibus. L. Dill. elth. 368. t. 276. f. 357.  $\beta$ . tomentosa. L. Barr. ic. t. 1002. Hab. in Hispania et Oriente. Fol. subcarnosa.

12. *muralis (agrestis)*, fol. linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. L. Lam. ill. t. 375. f. 1. Hab. ad vias, muros, et inter stipulas.

13. *rigida*, fol. linearibus planis, caule dichotomo, peluncul. bifloris, petal. emarginatis. L. Hab. Monspelii.

14? *Saxifraga*, fol. linearibus, calycibus angulatis squamis quatuor, coroll. emarginatis. L. Dianthus Saxifragus. L. Lam. enc. Hab. in Austria, Helvetia, Gallia. Calyx cinctus foliolis 4, tubo dimidio brevioribus.

1116. *SAPONARIA*. *Cal.* tubulosus, 1-phyllus, nudus. *Petala* 5, unguiculata. *Caps.* oblonga, 1-locularis.

1. *officinalis*, calycib. cylindricis, fol. ovato-lanceolatis. L. Willd. p. 667. Lam. ill. t. 376. Flor. dan. t. 543. Hab. ad vias.

2. *Vaccaria*, calycib. pyramidalis quinquangularibus, fol. ovatis acuminatis sessilibus. L. Hab. inter segetes. Petal. parva, rubra.  $\odot$

3. *cretica*, calycib. quinquangularibus striatis, caule erecto subdichotomo, foliis subulatis. L. Hab. in Creta aridis. Petala parva, integra.

4. *porrigens*, calycib. cylindricis pubescentibus, ramis divaricatis, fructub. pendulis. L. Jacq. hort. 2. p. 49. t. 109. Hab. in Oriente.

5. *illyrica*, calycibus subcylindricis, caule erecto viscido purpurascens: ramis alternis, cor. punctatis. L. Ard. spec. 2. p. 24. t. 9. Hab. in Illyria. Viscoso-pubescent. Fol. lineari-lanceolata. Pet. alba punctis 3 purpureis.

6. *Ocymoides*, calycib. cylindricis villosis, caulib. dichotomis procumbentibus, fol. ovato-lanceolatis. L. Jacq. austr. 5. p. 39. app. t. 23. Cav. ic. 2. p. 29. t. 134. Hab. in Europ. petrosis, umbrosis, et in Atlante.

7. *orientalis*, calycib. cylindricis villosis, caule dichotomo erecto patulo, fol.

linear-lanceolatis. Dill. elth. 205. t. 167. f. 204. Hab. in Oriente, Carniola.

8. *lutea*, calycib. teretib. cauleque hirtis, petal. obovatis integerrimis, flor. corymbosis, fol. linear-lanceolatis canaliculatis. Smith. spicil. bot. t. 5. Allion. pedem. t. 23. f. 1. Hab. in alpinis. Cor. flava. Stam. violacea.

9. *bellidifolia*, calycib. teretib. hirtis, caule glabro, petal. linearibus crenatis, fol. spatulatis. Smith. l. c. Rocc. mus. 2. p. 75. t. 62. f. 1. Hab. in Italiae mont. altissimis. Fol. radicalia Globulariae similima. Stam. flava.  $\frac{1}{2}$

116. DIANTHUS. Cal. cylindricus, longus coriaceus. 1-phyllus: basi squamis 4-8. Petala 5, unguiculata. Caps. cylindrica, 1-locularis, apice dehiscens.

\* *Florib. aggregatis. quibusdam involucreatis.*

1. *barbatus*, flor. (versicoloribus) aggregatis fasciculatis squamis calycinis ovato-subulatis tubum aequantibus, fol. lanceolatis. L. Willd. Sp. II. p. 671.  $\beta$ . *angustifolius*, fol. linearibus, flor. majoribus unicoloribus. rubris. Hab. in Carniola, Germania.  $\frac{1}{2}$

2. *carthusianorum*, flor. subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucreo oblongo aristato capitulo brevioribus, fol. linearibus trinerviis. Willd. Hab. in apricis sylvaticis. Sequentes 3 subpecies tantummodo sunt.

\* *collinus*, flor. bifasciculatis, squam. calyc. ovato-subulatis tubo brevioribus, fol. lanceolato-linearibus 5-nerviis scabris. Pl. hongar. p. 36. t. 38. Cresc. in Hongar. collibus et fruticetis.

\* *atrorubens*, flor. aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucreo ovato aristato longitudine capituli, fol. connatis linear-lanceolatis 5-nerviis. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 467. Segu. veron. t. 1. p. 433. t. 7. f. 2. Hab. in Italiae et Tauriae aridis apricis. Cor parva.  $\frac{1}{2}$

\* *alpestris*, flor. aggregatis subbinis, squam. calycin. 4, duabus interioribus latis, mucronatis, corol. emarginatis. Bellis in Mém. de Turin t. 1. Hab. in pascuis alpinis.

3. *ferrugineus*, flor. aggregatis, petalis bifidis: laciniis tridentatis. L. Barr. rar. 648.

t. 497. Hab. in Aprutio Italiae. Pl. fasciculati cal. communi scarioso.  $\frac{1}{2}$

4. *Armeria*, flor. aggregatis fasciculatis squamis calycinis lanceolatis villosis tubum aequantibus. L. Flor. dan. t. 230. Hab. in sterilibus.

5. *japonicus*, flor. aggregatis fasciculatis, squamis calycinis acutis ciliatis tubo brevioribus, fol. ovatis. Thunb. jap. 183. t. 23. Hab. in Japonia.

6. *spinosus*, fruticoseus procumbens, fol. rigidis subulatis spinescentibus, flor. capitatis bracteatis. Desf. in annal. de Mus. t. p. 198. t. 16. f. 1. Hab. in Persia. Petal. linearia.

7. *prolifer*, florib. aggregatis capitatis, squam. calycinis ovatis obtusis mucronatis tubum superantibus. L. Flor. dan. t. 221. Hab. in collib. et pascuis sterilibus.  $\odot$

\* *Flor. dispersi in caul. ramoso.*

8. *diminutus*, flor. solitariis, squamis calycinis octonis, flor. (cor.) superantibus. L. Hab. in Germania, Helvetia et Algeria. Cal. oblongus pallens. Var. praecedentis?

9. *Caryophyllus*, flor. solitariis, squam. calycinis subrhombicis brevissimis, petalis crenatis imberbibus, fol. linearibus subulatis canaliculatis glaucis. Smith. in Act. Soc. Lin. 7. p. 299.

10. *sylvestris*, flor. solitariis, squamis calycinis brevissimis ovatis, exterioribus acutis, interioribus obtusissimis, pet. crenatis imberbibus. Willd. p. 675. Wulf. in Jacq. Coll. t. p. 237. Jacq. ic. rar. t. 1. t. 82. Segu. veron. t. 7. f. 3. Hab. in Helvetia, Carniola, Carinthia.

11. *fruticosus*, caul. fruticoso, fol. sublinearibus crassiusculis, cal. squamis pluribus imbricatis. L. Willd. Sp. p. 684. Tournef. it. t. p. 183. t. 1. Hab. in Graecia. Col. in hortis. Cal. attenuatus.

12. *juniperinus*, caul. fruticoso multifloro, fol. subulatis pungentibus, squamis calycin. subquaternis obovatis mucronatis, tubo duplo brevioribus. Smith. in Act. Lin. 2. p. 303. An versus D. *arboreus*, fol. subulatis. Lin. Sp. pl. p. 5. c. Cresc. cum priore. Caul. inferne lignosus, tortuosus. Flor. parvuli. D. *arboreus*. Herb. Juss.

13. *pomeridianus*, flor. solitariis, squam. calycinis ovatis acutis brevissimis, tubo apice tantum striato, petal. emarginatis subintegerrimis. Smith. Act. Soc. Lin. 2. p. 300. Hab. Constantinopoli et in Palaestina. Simil.

D. Caryophyllo. Petala lateribus revoluta. Flos aperitur meridie et clauditur noctis hora decima. L.

14. *procumbens*, squamis calycinis quaternis lanceolatis subpungentibus, patulis tubo brevioribus, caule procumbente dichotomo. Vent. Hort. Cels. p. 39. t. 39. (D. monadelphus.) Hab. in Oriente. Caul. glaucus, fragilis, nonnunquam valde elongatus. Cor. alba, subtus cinerea, margine purpurascens.

15. *pungens*, flor. solitariis, caulibus paucifloris, squamis calycinis brevissimis mucronatis patentibus, tubo gibbo, petal. integris. Smith. (β. *hispanicus*, squamis calycinis ovatis, petal. linearibus integerrimis. Aaso synop. n<sup>o</sup>. 371. t. 3. Hab. in Hispaniae maritimis.

16. *virginicus*, fol. cespitosus, flor. solitariis, caulibus paucifloris, squamis calycinis brevissimis obtusissimis, binis distantibus, petalis crenatis. Smith. Jacq. aust. 5. p. 34. app. t. 15. D. rupestris. Lin. suppl. 240. Hab. in Gallia, Austria et Sibiria. Cor. rubra.

17. *attenuatus*, flor. solitariis, squamis calycinis brevibus lanceolatis acuminatis subsenis, tubo attenuato, petal. crenatis. Smith. Hab. in maritimis Galliae meridionalis. Caul. diffusi basi tortuosi ramosissimi. Fol. subulata. Flor. carnei, inodori.

18. *furcatus*, caul. bifloro, pedunc. oppositis distantibus, squamis calycin. oppositis subbinis tubo multo brevioribus. Balbis in Mém. de l'acad. de Turin. Hab. ad margines agrorum in montib. prope Tendam. Molinieri. Situ flor. mox disinguitur.

19. *purpureus*, caule subhidoro, floribus solitariis, squamis calycinis latis tubo dimidio brevioribus acutis, petal. integerrimis. Enc. bot. 4. p. 523. Lam. ill. t. 376. f. 2. Habitu recedit. Loc. natal. ignotus. †

20. *ochroleucus*, caule elongato submultifloro gracili, squamis calycin. ovato-lanceolatis ultra tubi dimidium, petal. obovato-linearibus subintegris. Hab. in Oriente. Col. in hort. Cels. Caul. subgeniculatus, fol. brevia, lineari-subulata. Flor. minuti. Cor. albidopallens.

21. *albens*, flor. solitariis, squamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, cor. emarginatis. Ant. Kew. 2. p. 90. D. floribus solitariis, squamis calycinis quaternis ovatis brevissimis, petal. integris. Thunb. prod. p. 81. Hab. ad Cap. b. spei. Petala albensia, spice utrinque violacea absque circulo purpureo. ¶

22. *crenatus*, flor. solitariis, squamis calycinis senis lanceolatis, cor. crenatis. Thunb. prod. 81. Hab. ad Cap. b. spei.

23. *chinensis*, flor. solitariis, squamis calycinis subulatis patulis foliaceis tubum aequantibus, petal. crenatis, fol. lanceolatis. Smith. l. c. Mill. ic. 81. f. 2. Hab. in China. ©

24. *deltoides*, flor. solitariis, squamis calycinis ovato-lanceolatis acutis subbinis, fol. obtusiusculis subpubescentibus, petalis crenatis. Smith. l. c. Hab. in arenosis sylvaticis.

25. *glaucus*, flor. solitariis squamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, cor. crenatis (albis). L. Hort. cliff. 164. Tunica ramosior, flore candido cum corona purpurea. Dill. elth. 400. t. 298. f. 348. Passim cum priore, cujus var. secundum cl. Smith.

26. *libanotis*, flor. subsolitariis, squamis calycinis senis lanceolatis patulis tubo brevioribus, petalis multifidis barbatis, foliis lanceolatis, caule erecto. Willd. Billard. pl. tyriae t. p. 14. t. 5. Hab. in altis montib. Libani. ¶

27. *crinitus*, flor. solitariis, squamis calycinis ovalibus mucronatis subdivergentibus, tubo triplo brevioribus, petalis multifidis imberbibus. Smith. l. c. Hab. in Oriente. Fol. angustissima. Flor. 2-4 in caul. erecto. S.

28. *monspeliacus*, flor. solitariis, squamis calycinis subulatis rectis tubo paullo brevioribus, cor. multifidis, caul. erecto. Smith. l. c. D. squamis calycinis subulatis longitudine tubi. L. Hab. Monspeli, Veronac. Flor. rubri. ¶

29. *plumarius*, flor. solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis obtusissimis muticis, cor. multifidis fauce pubescentibus. L. Tunica fol. glaucis patentibus, flor. serratis, faucibus lanuginosis. Hall. helv. n<sup>o</sup>. 897. Hab. in pascuis nemorosis. Fol. rore caesio glauca. L. ¶

\* *moschatus*, cespitosus, squamis minutis ovatis obtusis, corol. multifidis, foliis filiformibus subulatis. Gmel. S. N. L. II. p. 711. Poir. enc. bot. 4. p. 521. Col. praesertim in hortis ad areas ornandas. Flor. vere. Var. prioris?

\* *saxatilis*, cespitosus subdecumbens, caul. bi-trifloro, squamis ovatis mucrone longiusculo distinctis tubo brevioribus, pet. multifidis, fauce glabris. Hab. ad rupes, prope Clermont non infrequens. D. *plumarius* quorundam, sed fol., quae linearia

non glauca, cor. fauc. non pubescens, nec squamæ obtusæ.

30. *superbus*, flor. paniculatis subfastigiatis, squam. calycinis brevibus ovatis mucronatis, petal. ultra medium multifloro-capillarib. fauce pilosis, caul. erecto. Flor. dan. t. 578. Hab. in pratis, sylvaticis. Cal. uno latere purpurasc.

\*\*\* *Caul. 1-floro.* (Spec. parvulae subcespitosæ.)

31. *arenarius*, caulib. subunifloris, squam. calycinis ovatis obtusis, cor. multifidis, fol. linearibus. L. Hab. in Europæa frigilioris arena mobili. Pl. dubia. Pet. ultra medium disci divisa, basi macula livida et pilis purpureiscentib. adpersa. L. An sequentes 2 eadem species?

\* *Hongaricus*. D. *arenarius*, caulib. subunifloris, squam. calycinis brevissimis subrotundis acuminatis; cor. (albis) multifidis, fol. subulatis glaucis ciliatis. Townson Travels in Hungary. t. 16. Caul. adscendentes, angulati, glauci. Cal. viridis lividusque. T.

\* *gallicus*, caul. unifloro brevissimo, fol. ciliatis imbricatis, squamis cal. ovatis mucronatis, cor. dentato-submultifidis. Hab. in Gallia meridionalis arena mobili. Thore. Petala 1/3 incisa. Cal. squamæ margine tenui cinctæ.

32. *tener*, caul. unifloro, cor. simlristis, squam. calycin. tubum subæquantibus, fol. linearib. subulatis. Balbis in Mém. de Turin. t. 3. Hab. ad agrorum margines prope Tendum. Cor. rosea.

33. *serrulatus*, fol. lanceolatis serratis, pedunc. unifloris, squam. imbricatis acutis tubo brevioribus, petal. simbricatis. Desf. atl. t. p. 346. Hab. in Tuneti arenis. Cal. squamæ 7-8. Cor. duplo minor D. *plumarii*, pallide rosea. D.

34. *pulchellus*, caul. 1-floro, squam. calyc. ovatis mucronatis appressis, cor. crenatis, fol. brevibus planis linearib. acuminatis. Hab. . . . +

*Obs.* Mihi missus sub nomine D Plumieri. Forte, uti nonnullæ aliæ in hoc genere valde naturali, cultura a D. coronario ortus. Caul. palmares plures ex cespite, aut subsolitarius. Cal. purpurascens, subiurgidus. Cor. rubella.

35. *repens*, caul. unifloro, squam. calycinis binis ovatis acuminatis patulis longitudo fere tubi, petal. dentatis, radice repente. Willd. p. 681. Hab. in Sibiria.

36. *caesius*, caul. subunifloris, squam. calycinis subrotundis brevibus, petal. crenatis pubescentibus, fol. margine scabris. Smith. p. 302. engl. bot. t. 62. Dill. elth. 401. t. 268. t. 385. Hab. in montosis Angliæ, Helvetiæ. Caul. simplices quadranguli. Cal. squamæ tubo triplo breviores.

37. *cespitosus*, caul. unifloris, cor. integris, calycin. squamis quatuor lanceolatis, fol. trigonis. Thunb. prod. 81. Hab. ad Cap. b. spei, cum sequente. T

38. *scaber*, caul. unifloris, squam. calycinis quaternis lanceolatis, petal. crenatis. Thunb. prod. 81.

39. *alpinus*, caul. unifloro, petal. crenatis, squam. calycinis exterioribus foliaceis (foliiformibus) tubum æquantibus. Smith. l. c. D. caespitosus. Poir. enc. bot. 4. p. 525? Jacq. austr. t. 52. Caryophyllus sylvestris 2. Clus. hist. t. p. 283. f. r. hon. Hab. in alpestribus. Cor. magna, dentib. numerosis crenata, fauce parum villosa.

β. *glacialis*, flor. solitariis subacaulibus, squamis calycinis elongatis acuminatis tubum superantibus, fol. linearibus flore longioribus. Haenke in Jacq. Collect. 2. p. 84. Var. prioris secundum Willd. sed cor. vix prominet. Hab. in Stiria, Austria.

40. *pumilus*, caespitosus acaulis, fol. linearibus. Vahl. symb. t. p. 32. D. uniflorus. Forsk. Hab. in Arabia felici. Flor. sessiles solitarii. Pet. dentata. T

# TRIGYNIA.

1117. CUCUBALUS. Cal. inflatus, aut campanulatus. Petala 5, nungiculata, nudas coronata ad faucem. Caps. 3 locularis.

1. *Behen*, fol. ovatis, caul. dichotomo, calycib. subglobosis reticulato-venosis, caps. trilocularibus, cor. subnudis. L. Flor. dan. t. 914. Engl. bot. t. 164. Hab. in pascuis, ad vias. Fol. subovata glabra aut ciliata. T

β. *rotundifolius*, fol. rotundiorib. subvillosis aut glabris, flor. purpurascens. Allioni specim. t. 5. f. 3. γ. *angustifolius*, fol. parvulis ovato-linearibus, flor. albo. In alpibus.

2. *alpinus*, pedunc. erectis unifloris, petal. bipartitis subcoronatis, fol. lanceolatis glaucis lævibus. Lam. enc. 2. p. 220. Hab.

in albis. Flor. magni albi. Fol. non ciliata, basi connata.

3. *maritimus*, flor. paniculatis erectiusculis, petal. furcatis sub limbo dilatatis, fol. ovali-acuminatis cauleque villosis. Lam. l. c. Hab. in Galliae meridionalis maritimis. Cal. ovalis albicans, vix venosus. L.

4. *littoralis*, caul. decumbente, fol. lanceolato-linearibus, flor. subsolitariis, calyc. glabris reticulato-venosis, petal. coronatis. Smith. brit. 2. p. 468. Silene maritima. Willd. Sp. p. 700. Hab. in mariumis arenosis, etiam ad fluv. alpinos. Styl. interdum 4-5. Sm.

5. *fabarius*, fol. obovatis carnosis. L. Bocc. Mus. t. 92. Hab. in Sicilia ad littora.

6. *spergulfolius*, petal. bifidis, calyc. inflatis suturis glanduloso-scarbis, panic. secunda, fol. linearib. verticillatis. Willd. p. 690. Sub Silene. Hab. in Armenia.

7. *stellatus*, fol. quaternis ovato-lanceolatis, petal. multifidis. L. Mich. Flor. t. p. 271. Hab. N. Anglia et in montib. alleganiis. Pl. pulcherrima. Cor. patens alba.

8. *bacciferus*, cal. campanulatis, petal. distantibus, ramis divaricatis, fol. ovatis. Mill. ic. t. 112. Silene baccifera. W. Hab. in nemorosis. Caps. mollis, nigrescens.

9. *pumilio*, caul. unifloro, cal. ventricosissimo campanulato-hirsuto, fol. caespitosis linearilanceolatis. Jacq. austr. 5. app. t. 2. Lam. ill. t. 377. f. 1. Hab. in alpinis.

Obs. Ob calycem turgidum nonnullae Silenes huc quoque referri possent; aut duo haecce genera naturalia potius conjungenda. Ceteras Cucubali species cal. laud inflato distinctas, affinibus speciebus in sequente genere appropinquavi.

1118. *SILENE*. Cal. oblongus teres cylindricus aut conicus. Petala 5. unguiculata, nuda, aut coronata ad faucem. Caps. 3-locularis.

\* *Flor. spiculis aut racemosis.*

1. *anglica*, hirsuta, petal. integerrimis, flor. erectis (glabris?), fructib. reflexis pedunculatis alternis. L. Dill. elth. 477. t. 309. f. 398. Vaill. paris. 121. t. 16. f. 12. Hab. in Anglia, Gallia. Cal. non pilosi, sed angulis muricatis, aculeis reflexis vix conspicuis. L. ☉

2. *lusitanica*, hirsuta, petalis dentatis indivisis, flor. erectis, fructib. divaricato-

reflexis alternis. L. Dill. elth. t. 311. f. 402. Hab. in Lusitania. Cor. crenata, incarnata. L. ☉

3. *quinquevulnera*, hirsuta, petal. integerrimis subrotundis, fructib. erectis alternis. L. Hab. in Europ. australi et Sibiria. Petala obtusa, macula atro-purpurea. ☉

4. *ciliata*, petal. bipartitis obtusis, calycib. clavatis pubescentibus, apice ciliatis alternis erectis. Willd. p. 692. Hab. in Creta. Cal. decemstriatus. Pet. bipartita, laciniis obovatis. W. +

5. *nocturna*, florib. spicatis alternis, secundis sessilibus, petalis bifidis. L. (S) Cucubalus reflexus. L. Dill. elth. t. 310. f. 400. Morris. s. 5. t. 36. f. 7. Hab. in Hispania, Gallia et Pennsylvania. ☉

6. *gallica*, hirsuta, flor. subspicatis alternis secundis, petalis integris fructibus erectis. L. Dill. elth. t. 310. f. 399. Vaill. paris. t. 16. f. 12. Hab. in Helvetia, Gallia. Sequenti similis.

7. *cerastoides*, hirsuta, petal. emarginatis, fructificationibus erectis, calycib. subsessilibus subpilosius. L. Dill. elth. t. 309. f. 307. Hab. in Eur. australi. ☉

8. *mutabilis*, pet. bifidis, calycib. angulatis pedunculatis, fol. lanceolato-linearibus. L. Hab. in Eur. australi. Affinis Cucubalo reflexo. Lin.

9. *chlorantha*, petal. linearibus bifidis, flor. laterilibus secundis cernuis, fol. radicalib. mor. line scarbis. Willd. Ehr. Beitr. 7. p. 145. Dill. elth. t. 316. f. 408. Menz. pug. t. 2. f. 1. Hab. in Germania. ☿

10. *nutans*, petalis bifidis, florib. lateralibus secundis cernuis, panicula nutante, fol. caespitosis, lanceolatis. L. Flor. dan. t. 242. Engl. bot. t. 465. Hab. in pratis, sylvis. Var. flore rubro.

11. *amoena*, petalis bifidis, coronula sulcoannata, flor. secundis, pedunc. oppositis trifloris, ramis alternis. L. Hab. in Tataria. Caul. diffusi. ☿

12. *paradoxa*, flor. racemosis, calycib. decem-sulcatis viscidis, flor. aliis staminib. exsertis, aliis inclusis. L. Jacq. hort. vind. 3. t. 84. Smith brit. 2. p. 467. Zanon. hist. t. 109. Hab. in Italia et Anglia. Cor. noctu explicatae et odorac. Petala bifida subcrenata. L. Pet. limbus obcordatus. Sm.

13. *multiflora*, petal. bifidis, caule simplicissimo, corymb. multifloris oppositis, calycib.



cal. cili. clavatis striatis, fol. scabris, cauliculis linearib., radicalib. spatulatis. Willd. p. 687. Plant. rar. hong. p. 55. t. 56. sub Cucub. Ehr. Beytr. 7. p. 142. Hab. in Hungariae pratis. Flor. verticillati racemosi. Cal. scaber. Cor. fauc. plerumque nuda. l. c.

14. *altaica*, petalis bifidis revolutis nudis, pedunc. alternis unilobis, fol. linearilanceolatis, caule frutescente. Cucubalus fruticosus. Pall. itin. 2. app. n. 110. t. T. Willd. p. 687. sub *Cucubalo*. Hab. in montib. Altaicis Sibiriae. h

15. *caspica*, caul. basi lignescens, fol. spatulato-lanceolatis, calyc. cylindricis 10-striatis, petal. bipartito basi utrinque unidentato. S. *fruticulosa*. Bieberst. Tabl. eau etc. n. 17. Hab. passim in collib. aridis inter Kuban et Schamachiam. Aest. h

*Obs.* Habitu praecedentis s. Cucub. fruticosi Pall., sed faux coronata. Flor. ex dichotomia caulis. B. h

16. *viscosa*, flor. lateralibus undique decumbentibus, caule indiviso, fol. basi reflexis. L. sub Cucub. Tournef. it. p. 361. Hab. in Eur. australiori et Oriente. ♂

17. *tatarica*, petal. bipartitis, flor. secundis decumbentibus, pedunc. oppositis solitariis erectis, caule simplicissimo spicato. L. sub *Cucubalo*. Hab. in Tartaria, Russia. h

18. *Royeni*, racemo verticillato, pedunc. oppositis brevissimis multifloris, petal. bifidis, fol. ovato-lanceolatis subundulatis. Bieberst. l. c. n. 16. Royen. lydb. p. 448. (a Linnaeo cum? a priori allegatum.) Hab. in planit. Kumukorum. Majo. ♂ +

19. *sibirica*, petal. emarginatis subverticillatis linearibus, flor. verticillis umbellatis aphyllis. L. sub *Cucubalo*. Viscago fol. imis petiolatis ovatis. Hall. goett. 1. p. 150. ic. Hab. in desertis Tacorow. Flor. parvi. Petal. obcordata.

20. *Orites*, petal. linearib. indivisis undulatis glabris, flor. verticillato-capitatis dioicis, pedunc. glabris, caule nudo. Willd. p. 688. Flor. dan. t. 518. sub *Cucubalo*. Hab. in arenosis. Flor. parvi.

21. *parviflora*, petal. linearib. indivisis ciliatis flor. dioicis, pedunc. pubescentibus, caule paniculato. Willd. Ehrh. Beytr. 7. p. 143. sub *Cucubalo*. Hab. in Hungaria. Priori affinis.

22. *imbricata*, caul. inferne piloso, fol. lanceolatis, flor. sessilib. secundis strictis

imbricatis longe racemosis. Desf. p. 349. t. 98. Hab. in arvis prope Mascar. Petal. alba, bifida. ♂

23. *hispidula*, flor. racemosis confertis secundis, cal. hirsutissimis, petal. bifidis, caul. subsimplice. Desf. atl. 1. p. 348. Hab. in Atlante. ♂

24. *tridentata*, hirsuta, fol. angustolanceolatis, flor. racemosis distinctis sessilibus, cal. dentib. subulatis, caps. acuminatis erectis. Desf. l. c. Clas. hist. 290. ic. Hab. in Algeriae arvis, et in Hispania prope Aranguez. Thibaut. Petal. rosea, plerumque tridentata. ♂

\* \* *Caul. paniculato-dichotomo, flor. in pluribus ex dichotomia.*

25. *fruticosa*, petal. bifidis, caule fruticoso, fol. lato-lanceolatis, panic. trichotoma. L. Com. hort. t. 33. Hab. in Sicilia. Fol. mollia. h

26. *bupleuroides*, caul. virgato, petal. bifidis, flor. paniculatis oppositis bractea brevioribus, fol. lanceolatis acutis glabris. L. Desf. atl. 1. p. 351. Hab. in Persia et Atlante. Pet. inferne pallide violacea. ♂

27. *longiflora*, petal. bifidis, florib. paniculatis erectis, pedunc. oppositis bractea longioribus, calycib. longissimis glabris. Willd. Ehr. Beytr. 7. p. 144. S. juncea. Roth. catal. 1. p. 54. Cum priore saepe confunditur. Hab. in Hungaria. h

28. *longipetala*, fol. lanceolatis scabrisculis, pedunc. elongatis dichotomis, petalis bifidis retroflexis. Vent. Hort. Cels. p. 83. t. 81. Hab. circa Alep. Cor. albidolivida. ♂

29. *gigantea*, petal. bifidis, fol. radicalibus cochleariformib. obtusissimis, flor. subverticillatis. L. Walth. hort. 32. t. 221. Hab. in Africa. Fol. carnosa, pubescentia. Cal. pubescentes. Cor. virides coronula obsoleta. Flor. noctu explicati. L. ♂

30. *crassifolia*, petal. emarginatis fol. suborbiculatis carnosissimis hirsutis, racemo secundo. L. Hab. ad Cap. b. spei. Caul. firmus, hirsutus. ♂

31. *viridiflora*, petal. semibifidis, fol. ovatis scabrisculis acutis, panic. elongata subaphylla. L. Herin. parad. 199. t. 199. Hab. in Lusitania. Panic. brachiata pedunculis dichotomis, paucifloris. ♂

32. *reticulata*, glabra viscosa, fol. angustolanceolatis, caul. dichotomo, pedunc.

subtrifloris, cal. clavato (venis purpureascentibus) reticulato, petal. linearib. emarginatis. Desf. atl. t. p. 350. t. 99. Hab. in Algeria. Cor. parva, rosea.

33. *picta*, glabra, caule dichotomo, fol. linearibus, caul. subsetaceis, cal. clavato petalisque venosis nervisque rubris reticulatis. S. bicolor. Thore. Hab. prope Dax (dépt. des Landes) Nunc in hort. colitur. Spec. elegans, priori similis.

34. *rugosa*, caul. dichotomo, fol. linearilanceolatis, cal. clavati nervis crenato-rugosis subasperis. Hab. .... Herb. Juss. Facie antecedentium, sed cal. a cacteris mox distinguitur.

35. *glutinosa*, petal. bipartitis, panic. dichotoma patentissima viscosa, fol. ovatis. Cucub. glutinosus. Retz. *C. catholicens*. Lin. Jacq. hort. t. 59. Hab. in Italia, Sicilia.

36. *mollissima*, petal. semibifidis, panic. dichotoma, caul. folisque holosericeis: radicalibus spathulatis. L. sub *Cucubato*. Hab. in Italiae maritimis. An cal. inflatus?

37. *italicus*, laevis pubescens, petal. semibifidis, cal. clavatus, panic. dichotoma: ramis longis patentibus, flor. erectis, fol. lanceolatis. Willd. Sp. II. p. 686. Jacq. obs. 4. t. 79. Sub *Cucubato*. Hab. in Italia.

38. *nicænsis*, villosa-viscosa, fol. linearib. obtusis, petal. semibifidis, fruct. ovatis. Allion. pedem. 2. p. 81. t. 44. f. 2. Hab. in agro Nicæensi. Cal. 10-striatus.

39. *conoidea*, calycib. fructus globosis acuminatis striatis, fol. glabris, petal. integris. L. Lychnis, flore amplo rubello. Moris. s. 5. t. 36. f. 6. Hab. inter segetes Eur. australior. ☉

40. *conica*, calycib. fructus conicis striatis, fol. mollib. lanceol., petalis bifidis. L. Jacq. austr. t. 253. Moris. l. c. t. 21. f. 33. Hab. in agris sylvaticis. Flor. parvi rubri. Cal. striae 30. Caps. lagenaria. ☉

41. *bellidifolia*, calycib. fructus ovatis villosis, fol. lanceolatis pilosis subasperis, petal. bifidis. Murr. syst. veg. Jacq. hort. 3. t. 81. Hab. .... Racem. geminati. ☉

42. *dichotoma*, calycib. ovatis viscosopilosis erectis, petal. bifidis, racem. geminatis terminalibus secundis, flore intermedio pedunculato, fol. petiolatis ovato-lanceolatis, basi ciliatis. Willd. p. 699. Plant. rara hong. p. 28. t. 29. Ehr. Beytr. 7. p. 145. Hab. in Hungaria, non procul a Buda, in agris. Fl. albi subcrenati. ☉

43. *vespertina*, petal. bifidis, nectario connato, flor. alternis, cal. clavato pubescente. Retz. obs. 3. p. 31. Willd. p. 699. Hab. .... ☉

44? *Behen*, calyc. glabris ovatis venoso-reticulatis, caps. trilobularibus. L. Hab. in Creta. Differt a Cucub. Behen corona corollae, cor. purpureascentibus. L.

*Obs.* An cum tribus sequentibus ob calycem ad Cucubalos potius referenda?

45. *stricta*, petal. emarginatis, calycib. glabris reticulato-venosis acuminatis pedunculo longioribus, caule dichotomo stricto. L. Amoen. acad. t. p. 158. Hab. in Hispania et Tolosae.

46. *pendula*, calycib. fructiferis pendulis inflatis, angulis decem scabris. Hort. ups. 109. Hab. in Creta et Sicilia.

47. *procumbens*, calycib. ovatis inflatis erectis obsolete decemangularib., petal. subauriculat. bifidis, caul. procumbente. Murr. comm. goett. 1784 et 1785. p. 81. t. 2. Roth. catal. t. p. 55. Hab. in Sibiria. ☿

48. *noctiflora*, calycib. decemangularib. venosis, dentib. tubum aequantibus, caule dichotomo, pet. bifidis. L. Lam. ill. t. 377. f. 2. Engl. bot. t. 201. Hab. in sylvaticis arvis. Lychn. dioicae similis. Flor. paullo majores.

49. *ornata*, calycib. fructus oblongis carinatis pilosis, petal. bifidis, fol. lanceolatis pubescentibus viscosis planis, caul. viscido. Ait. Kew. 2. p. 96. Curt. mag. t. 38a. Hab. ad Cap. h. spec. Cor. sanguinea. ☿

50. *undulata*, calycib. fructus clavato-cylindricis pilosis, petal. bifidis, fol. lanceolatis pubescentibus undulatis, caule ascendente. Ait. l. c. Cum priore.

51. *laciniata*, fol. lanceolatis sessilibus, petal. quadrifidis, caps. unilobularib. Cav. ic. 6. p. 44. t. 564. Hab. in Amer. meridion. Cal. tubulosus villosus, 10-striatus. Cor. coccinea.

52. *virginica*, procumbens viscoso-pubescent, fol. oblongis margine subasperis, panic. dichotoma, petal. bifidis, genitalib. exertis. Michaux. Flor. t. p. 278. Hab. in regione Illinoensi. Cor. rubra.

*Obs.* Var. fol. lato-ovulibus, etiam caul. erecto, flor. subfasciculatis. M.

53. *pensylvanica*, humilis, viscido-pubescent, fol. cuneatis, caul. lanceolatis, petalis leviter emarginatis subcrenatis. Mich.

in Pennsylvania. Caul. subsimplex. Petal. purpurascens.

54. *antirrhina*, fol. lanceolatis subciliatis, pedunc. trifidis, petalis emarginatis, calycib. ovatis. L. Dill. elth. t. 313. f. 403. Hab. in Virginia, Carolina. ☉

55. *rubella*, erecta laevis, calycib. subglobois glabris venosis, cor. inapertis. L. Dill. elth. t. 314. f. 406. ♂ ? S. annulata. Thore. Hab. in Lusitania, Oriente. ☉

56. *sedoides*, glanduloso-pilosa, calycib. clavatis, petal. emarginatis, fol. oblongo-obovatis subcarnosis. Willd. Jacq. collect. suppl. 112. t. 14. f. 1. Hab. in Creta. ☉

57. *apetala*, calycib. ovatis pubescentibus, flor. apetalis, fol. lanceolatis pubescentibus. Willd. p. 703. Hab. . . . Cal. oblongo-ovatus decemstriatus.

58. *clandestina*, calycib. ovatis decemangulatis pubescentibus, petal. bifidis erectis cal. paullo longioribus, fol. oblongo-lanceolatis ciliatis. Willd. Jacq. coll. suppl. 111. t. 3. f. 3. Hab. ad Cap. b. spei. Similis S. apetalae.

59. *inaperta*, caule dichotomo paniculato, calycib. laevibus, petal. brevissimis emarginatis, fol. glabris lanceolatis. L. Dill. elth. t. 315. f. 407. Hab. in Eur. australi. Stam. saepe 5.

60. *portensis*, caule dichotomo paniculato, calycib. striatis, petal. bifidis, fol. linearib. L. Hab. in Lusitania. Habitus S. inapertae. Pl. spithamea, brachiata. Cal. clavati, purpurascens. L.

61. *cretica*, erecta laevis, calycib. erectis decemangularibus, petal. bifidis. L. Viscago fol. inferiorib. bellidis, superiorib. tunicae. Dill. elth. 422. t. 314. f. 401, 405. Hab. in Creta. Caulis patens, filiformis, articulis viscidis. Flor. amoene purpurei. L.

62. *bipartita*, fol. interioribus spathulatis, flor. racemosis secundis nutantibus, petal. bipartitis. Desf. atl. t. p. 352. t. 100. Cresc. in arvis Sibiac. Caul. pubescens. Pet. rosea. ☉

63. *ramosissima*, pubesc. viscosa, fol. angusto-lanceolatis, pedunc. 1-3-floris, cal. ovatis, petal. bifidis, caps. intra cal. subsessilibus. De f. p. 354. Hab. ad maris litora. Petal. alba. Flor. numerosi. D. ☿

64. *arenaria*, villosa-viscosa, fol. linearilanceolatis obtusiusculis, flor. laxo racemosis, petal. bifidis, caps. intra cal. pedic-

cellatis. Desf. l. c. Cum priore in arenis. cui affinis. Flor. pauciores. ♀

65. *arenarioides*, pubescens, fol. angusto-linearibus, pedunc. 1-3-floris, cal. 10-striatis villosis, petal. bifidis, caps. teretibus pedicellatis. Desf. l. c. p. 355. Hab. in Barbariae arvis. Cal. purpurascens.

66. *cinerea*, fol. inferioribus ovatis, flor. racemosis subsessilib. solitariis 2-ternis, cal. pubescente 10-striato, petalis bifidis. Desf. l. c. In Algeriae arvis. S. nocturnam refert. Pet. laciu. angustae. Flor. in bifurcatione solitaria.

67. *patula*, viscosa, ramis paniculato-potentibus, fol. inferiorib. longe petiolatis ovatis acuminatis, pedunc. subtrifloris, cal. elongato, petal. semibifidis. Desf. p. 356. Hab. in Barbar. arvis. Cor. alba magnit. L. dioicae. L. Fol. pubescentia. Flor. circa vesperam odorati. ☿

68. *Muscipula*, petal. bifidis, caul. dichotomo, flor. axillaribus sessilibus, fol. glabris. L. Hab. in Hispania, G. Narbonensi, et Algeria. Viscosa.

69. *polyphylla*, fol. fasciculatis setaceis, ramorum florentium oppositis. L. Willd. Delph. 3. p. 609. Hab. in Pannonia. Austria. Bohemia, et Delphinatu. Rami multiflori, subdecumb. ☿

\*\*\* Flor. terminalibus fastigiatis, passim subsolitariis.

70. *Armeria*, flor. fasciculatis fastigiatis, fol. superioribus cordatis glabris, petalis integris. L. Flor. dan. t. 559. Hab. in apricis.

71. *Atocion*, petal. bifidis, basi utrinque dentatis, fol. laevibus, interiorib. subrotundo-spathulatis, petiolis ciliatis. Ait. Kew. 2. p. 98. S. *orchidea*. Lin. suppl. 241. S. *Atocion*, cal. fructigeris clavatis, petalis semibilobis, fasciculo flor. terminali dichotomo, fol. obovatis. syst. veg. Jacq. hort. 3. p. 19. t. 32. Hab. in Oriente. Plant. pulchella. Cor. faux tantum prominens, nec coronula instructa.

72. *Pseudo-atocion*, flor. fasciculatis terminalibus, cal. clavatis, petal. linearib. integerrimis, fol. imis obovatis. Desf. atl. t. p. 353. Hab. in Atlant. Facies prioris, an ejus varietas? D. ☉

73. *aegyptiaca*, petalis emarginatis utrinque dentatis, fol. submembranosis crassiusculis obovatis. Lin. suppl. p. 241. Hab. in Aegypto. Caul. brachiatus. Cal. clavatus. Petala incarnata cal. breviora. ☉

7. *retroflexa*, Cucub. *aegyptiacus*, flor. erectis, petal. emarginatis retroflexis, utrinque denticulo notatis. L. Willd. p. 586. Fol. linearia. Cal. cylindricus, cor. aequans. L. +

74. *Catesbaei*, flor. magnis purpureo-rubris, petal. laciniatis, calycib. cylindricis, panic. subtrichotoma, fol. laevib. lato-lanceolatis. Walt. carol. 141. Catesb. carol. 2. p. 54. t. 54. Hab. in Carolina. Pet. utrinque ad latus dente instructa. T.

75. *cordifolia*, caul. simplici, fol. ovatis acutis, flor. subsessilibus terminalibus, pet. semibifidis. Allion. pedem. n°. 1581. t. 23. f. 3. Hab. in saxosis Pedemontani et Nicaeensis comitatus. T.

76. *chloraefolia*, calycib. glabris clavatis, petal. semibifidis, fol. glaucis, inferioribus ovalibus summis cordatis amplexicaulibus. Smith. ic. ined. 1. p. 13. t. 13. Hab. in Armenia. Fol. Lysim. nummul. Caul. subdichotomus. Cal. clavatus. T.

77. *alpestris*, petal. quadridentatis, caul. dichotomo, capsul. ovato-oblongis, fol. linearilanceolatis glabris erectis, peduncul. viscidis. Ait. Kew. 2. p. 98. Jacq. austr. 1. t. 96. Lychnis alpestris, pet. quadrifidis coronatis, fol. recurvis. Lin. suppl. 244. Hab. in Austriae alpinis. T.

78. *quadridentata*, petal. quadridentatis (3-4-lobis), caul. dichotomo, fol. linearib. recurvis. L. Syst. veg. sub Lychn. Jacq. austr. t. 120. Seg. suppl. t. 5. f. 1. Hab. in alpinis. Fol. margine sparsim pilosa. Styl. 4-5.

79. *rupestris*, caul. dichotomo multifloro, flor. erectis, petal. emarginatis, calycib. teretibus, fol. lanceolatis. L. Flor. dan. t. 4. Hab. in montibus, ad saxa. Gypsophylam refert. O.

80. *polygonoides*, petal. emarginatis, cal. cylindraceo 5-gono piloso, flor. capitatis, fol. ellipticis utrinque acutis. Willd. l.c. Lychnis flore albo cum circulo purpureo. Tournes. cor. 24. Hab. in ins. Naxo. Caul. decumbens. Fol. serpilli. W.

81. *dianthoides*, petal. bifidis nudis, calycib. striatis terminalibus subsessilibus; lateralibus pedunculatis. Cucub. Saxifragus. Lin. Willd. p. 689. Strehb. Dec. 9. t. 5. Hab. in Oriente. Cal. inter 2 foliola sessilis, fere ut in Diantho. L.

82. *Saxifraga*, caulib. subunifloris, pedunc. longitudine caulis, fol. glabris, flor. hermaphroditis femineisque, petal. bifidis.

L. Jacq. coll. 2. p. 37. Segu. ver. t. 6. f. 1. Hab. in montib. cretaceis. Cal. clavatus.

83. *Campanula*, caul. erecto gracili 2-3-floro, flor. subcernuis, petal. nudis, cal. infundibuliformi. Cucub. *alpestris*. Allioni, sub quo nomine benevole missa a cl. Balbis. Priori affinis. Caul. spinham. longus, subuliformis. Fol. linearia.

84. *repens*, rad. longo repente, caule simplice adscendente, cal. villosa, fol. linearibus. Habit. in Siberia prope lacum Baikal. Post meridiem flor. dormiunt, cor. involutis. Patrin.

85. *sericea*, flor. terminalib. subsolitariis peduncul., caul. basi ramoso, foliisque linearilanceolatis sericeis. S. *sericea*, fol. acuminatis succulentis hirsutis lucidis, flor. carneo. Allioni Pedem. n°. 1573. t. 79. f. 3. Hab. in maritimis sabulosis pedemontanis. Sequentem refert. Cal. clavatus, striatus.

86. *vallesia*, caulib. subunifloris decumbentibus, fol. lanceolatis tomentosis longitudine calycis. L. Allion. pedem. n°. 1524. t. 23. f. 2. Lychnis pumila saxatilis alpina, flore carneo, fol. crasso molli tomentoso. Amoen. acad. 1. p. 158. Bocc. mus. 65. t. 54. Hab. in alpinis Vallesiis, Valdensisibus. Cal. clavatus striis 10 elevatis.

87. *acaulis*, caespitosa acaulis depressa, peduncul. elongatis nudis, petal. emarginatis. L. Flor. dan. t. 21. Allion. pedem. n°. 1583. t. 79. f. 1. Habit. in alpinis. Fol. caespitosa, graminea. Alpinum ornamentum. Fruct. oblongus. A.

\* *norwegica*, fol. linearib. magis sparsis, caul. subfolioso. Hab. in Norwegia. Vahl. S. caulem nonnihil refert, sed caul. 6. pedunc. 2-phyllus. Var. ?

88. *exscapa*, caespitosa, flore sessili, fructibus subrotundis. Allion. pedem. 1584. t. 79. f. 2. Hab. in alpinis lapponicis, austriacis, pedemontanis, helveticis. Priori valde affinis. Fol. graminea.

1119. **STELLARIA**. Cal. 5-phyllus, patens, *Petala* 5, bipartita. Caps. ovata, 1-locularis, polysperma, apice 6-dentata.

1. *nemorum*, fol. cordatis petiolatis, panicula dichotoma. L. Flor. dan. t. 271. Engl. Bot. t. 93. St. cordata. Syst. veg. XV. p. 452. Hab. in nemoribus montosis. T.

2. *aquatica*, caul. diffuso, fol. cordatis flor. solitariis 4-5-gynis, fruct. pendulis

*Cerastium aquaticum*. L. Curt. t. 34. Engl. bot. t. 538. Hab. in aquosis, fossis. Priori speciei nimis affinis, ut genere disjungi possit.

3. *latifolia*, fol. inferiorib. petiolatis subcordatis, caulibus ovatis subsessilib. caul. simpliciter dichotomo, pedunc. fructiferis reflexis. St. *Cerastium*. Syst. veg. ed. XV. in nota p. 452. Hab. in Germaniae sylvaticis montosis. St. *dichotoma* quorumd.

4. *ciliata*, fol. (parvulis) cordatis acutis subpetiolatis, petiol. ciliatis. Vahl. in Herb. Juss. Hab. in Peru. Caul. ramosus diffusus?

5. *dichotoma*, fol. cordato-ovatis sessilib. (subamplexicaulibus), caule dichotomo, flor. solitariis, pedunc. fructiferis reflexis. L. Smith. ic. ined. t. p. 14. t. 14. Hab. in alpinis Sibiricis. Fol. subciliata, cordat.

6. *pubera*, pubens, fol. sessilib. ovatis ciliatis, pedicellis erectis brevisscul., petal. cal. longioribus. Michaux. Flor. 1. p. 273. Hab. in montibus sylvat. Carol. septentr. Cal. lacin. ovatae.

7. *radians*, fol. lanceolatis serrulatis, petalis quinquepartitis. L. Amm. ruth. 83. t. 10. Fol. subovato-lanceolata, sessilia, pubescentia, non manifeste serrata. Ex herb. Juss. Hab. in Sibiriae uliginosis.

8. *bulbosa*, fol. ovato-lanceolatis subtus avenis, caule subramoso, pedunc. unifloro, radice filiformi repente bulbifera. Willd. Wulf. in Jacq. collect. 3. p. 21. Jacq. ic. rar. 3. t. 468. Hab. in alpin. Carinthiae, locis umbrosis humidis. Simill. Trientali europaeae. ¶

9. *Holostea*, fol. lanceolatis serrulatis, petalis bifidis. L. Fl. dan. t. 698. Engl. bot. t. 54. Hab. in Europae nemoribus. Cal. enervius. Fl. Mayo. ¶

10. *graminea*, caul. diffusis, fol. linearibus integerrimis, flor. paniculatis divaricatis, petal. calycis longitudine. Willd. Fl. dan. t. 414. et 415. S. arvensis. Hoffm. S. Dilleniana. Moench. Hab. in agris, ad sepes. Aestate.

11. *palustris*, fol. lineari-lanceolatis integerrimis glaucis, flor. paniculatis, petalis bipartitis calyce majoribus. Retz. Fl. scand. ed. 2. n.º 548. S. glauca. Smith. brit. 2. p. 476. Hab. in paludibus. Cal. trinervis. ¶

12. *crassifolia*, fol. oblongo-lanceolatis crassiusculis glaucis, pedunc. unifloris solitariis axillaribus, petal. calyce majoribus, caul. erecto. Willd. p. 712. Ehrh. Beytr. 3.

p. 60. Hab. in pratis humidis. Fol. subundulata.

\* *β? brevifolia*, fol. lanceolatis, pedunc. solitariis axillaribus fol. longioribus, petal. ultra medium bifidis cal. subaequantibus. Schum. Flor. Zealand. p. 142. Flor. dan. t. 415. Hab. in maritimis. Fol. non 3-linearia.

13. *Alsine*, fol. oblongo-lanceolatis, pedunculis subgeminatis uni-multiflorisve, petalis calyce brevioribus, caule decumbente. A. *uliginosa*, Roth. germ. II. p. 489. S. *Alsine*. Hoffm. Willd. p. 113.

β. *hypericifolia*, fol. ovato-lanceolatis integerrimis. Allion. Hab. in paludibus, ad rivulos.

14. *undulata*, fol. oblongis undulatis, caule angulato, flor. axillaribus. Thunb. Jap. 185. Ej. ic. pl. Jap. fasc. 3. Hab. in Japonia juxta vias. Caul. decumbens herbaceus.

15. *cerastoides*, fol. oblongis pubescentibus, caule decumbente, pedunc. unifloris geminatis erectis, petalis calyce majoribus. Willd. p. 714. Flor. dan. t. 92. Smith. ic. ined. t. p. 15. t. 15. Jacq. coll. t. t. 16. *trigynum*. Vill. delph. 3. p. 645. t. 46. Cer. Hab. in alpin. Petiol. infracti. Hall. Var. styl. 4-5.

16. *multicaulis*, fol. lanceolatis glabris, simplicissimis, pedunculo subsolitario terminali, petal. calyce majoribus. Willd. S. *cerastoides*. Wulf. in Jacq. Collect. 1. p. 254. t. 19. Hab. in alpinis Carinthiae. ¶

17. *humifusa*, fol. ovatis subsecundis sessilibus, caul. procumbentibus tetragonis, pedunculis solitariis abbreviatis. Swartz. in N. Act. holm. 1799. p. 111. t. 4 f. 1. Fl. dan. t. 978. Hab. in alpinis Sueciae, Norvegiae. ☉

18? *biflora*, fol. subulatis, ramis bipartitis, petalis emarginatis, calycib. striatis. Swartz. l. c. 1788. p. 36. t. 1. f. 1. Willd. p. 715. Fl. dan. t. 12. Hab. in alpinis Lapponicis. Facie Saginae. Caul. digitales, filiformes.

Obs. Petala laeviter tantum emarginata, itaque Arenariis proxima, magnitudine calycis. Willd.

19. *groenlandica*, caul. decumbentibus subbifloris, fol. linearibus basi subciliatis, petal. emarginatis, fructib. globosis. Retz. scand. ed. 2. n.º 552. Hab. in Groenlandia. Pollicaris. Fol. subcaruosa. Flor. magni, vix emarginati.

20. *Arenaria*, fol. spatulatis, caule erecto bifido viscoso, ramis alternis, petal. emarginatis. L. Hab. in Hispania. Cerastium refert. Cal. subtrigosus. Rami alterni, divaricati, longitudine fere caulis. Cor. campanulata. L.

21. *scapigera*, acaulis, fol. lineari-lanceolatis trinerviis, pedunculis radicalibus unifloris. Willd. p. 718. Hab. .... Flos magnitudine st. gramineae. W. †

1120. ARENARIA. Cal. 5-phyllus, patens. Petala 5, integra. Caps. 1-locularis, polysperma.

\* *Fol. ovatis.*

1. *peploides*, fol. ovatis acutis carnosiss. L. Honkenya peploides. Ehrh. Beytr. 2. p. 181. Hab. ad littora maris. Glandulae in receptaculo. An diversum genus? T.

2. *tetraquetra*, fol. ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis, flor. subcapitatis. L. Allion. pedem. t. 89. f. 1. β. Gypsophila aggregata. L. Sp. pl. 2. p. 581. Hab. in Pyrenaeis, Monspelii et Turini.

3. *biflora*, fol. obovatis obtusis, caulib. procumbentibus, pedunc. bifloris lateralib. L. Allion. ped. t. 44. f. 1. et t. 64. f. 3. Jacq. ic. rar. 1. t. 99. Hab. in Eur. australis alpinis. T.

4. *lateriflora*, fol. ovatis obtusis, pedunculo laterali bifloro. L. Hab. in Sibiria. Caul. filiformis, simplicissimus.

5. *trinervia*, fol. ovatis acutis petiolatis nervosis. L. Flor. dan. t. 429. Hab. in sylvis, etiam super salices.

6. *ciliata*, fol. oblongo-obovatis subpetiolatis ciliatis, cor. calyce majoribus, cal. foliol. lanceolatis subnervosis. Wulf. Jacq. Coll. t. p. 245. t. 16. f. 2. Flor. dan. t. 346. Hab. in alpinis. Fol. tuberculis aspera.

7. *balearica*, caespitosa repens, fol. ovatis lucidis subcarnosis, caule repente, pedunculis elongatis unifloris. L. L'Herit. stirp. 1. p. 29. t. 15. A. muscosa. Medic. Hab. in insul. Balearibus. Plantula elegans, caespitem letum efficiens.

8. *multicaulis*, fol. pulposo-subcoriaceis ovato-lanceolatis sessilibus ciliatis, cor. calyce majoribus, cal. foliol. ovato-lanceolatis subnerviis. Jacq. Collect. f. p. 248. t. 17. f. 1. Hall. t. 17. Hab. in alpinis.

9. *serpillifolia*, fol. subovatis acutis sessilibus laevibus, corol. calyce brevioribus. L. Hab. in sylvis glareosis, agris.

10. *ruscifolia*, fol. (minimis) coriaceis ovatis acuminatis, flor. subpaniculatis dichotomis, cal. subcampanulatis acutis, petal. cal. longioribus. Poir. enc. p. 365. Hab. .... Quoad fol. A. serpillifoliae similis.

11. *spatulata*, caul. erecto filiformi pubescente, fol. inferioribus spatulatis, petal. obovatis cal. longioribus. Def. atl. t. p. 352. A. *cerastioides*. Poir. enc. p. 363. Hab. in Barbariae arenosis et sylvaticis. Caul. et pedunc. viscosi. Flor. axillares subpaniculati.

\*\* *Fol. linearibus.*

12. *procumbens*, fol. lineari-lanceolatis, caulib. prostratis villosis, petal. calyce subbrevioribus. Vahl. symb. 2. p. 50. t. 33. A. geniculata, fol. linearibus, flor. paniculatis pubescentibus, petal. calyce brevioribus. Poir. A. herniariaefolia. Desf. atl. p. 359. Hab. in ruderatis Tuneti inque Aegypto.

13. *polygonoides*, fol. linearibus, caulib. procumbentibus, pedunc. bifloris terminalibus erectis, calyc. subviscidis enerviis. Wulf. in Jacq. Collect. 1. p. 241. t. 15. Segueron. 3. p. 177. t. 4. f. 1. Hab. in alpinis Helvetiae, Carinthiae. ☉

14. *cerastioides*, caul. bifloro, fol. breviusculis subovatis glabris acuminatis, cal. ovato-lanceolatis, petal. ellipticis brevioribus. Hab. in Pyrenaeis. Mirb. Caespitosa, parvula. Cal. facin. subalbo-marginatis glabris.

15. *Villarsii*, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus subrigidis, caul. erecto trifloro. Balbis Miscell. bot. p. 21. A. *triflora*. Vill. Delph. 3. p. 633. t. 47. Hab. in Delphinatu et in alpin. vallis Pissii et Tendae. Molineri. An potius Stellariae species? cujus habitu est. Petal. emarginata?

16. *montana*, fol. lineari-lanceolatis, caulib. sterilibus longissimis procumbentibus. L. Vent. Hort. Cels. t. 34. β? A. *linearifolia*. Poir. enc. p. 366. Hab. in Europ. australiori montibus. Stellar. aut Cerast. refert. T.

17. *calycina*, glaberrima, fol. gramineis brevibus, pedunc. longissimis subunifloris, petal. lanceolatis hyalinis, cal. multo brevioribus. Poir. enc. p. 370. Hab. in Barbariae subhumidis. Facie Stellar. gramineae.

18. *bavarica*, fol. semicylindricis carnosiss obtusis, petal. lanceolatis, pedunc. terminalibus subulnatis. L. Saxifraga bavarica. Raj. hist. 1033. Hab. in Bavaria, Baldo, Sibiria. Caul. stipulaceus? T.

19. *gypsophiloides*, fol. linearibus: radicalibus sub. etaceis, panic. subpubescente fastigiata, pet. lanceolatis, cal. ovatis longioribus. Willd. p. 723. Hab. in Oriente. Statura *A. saxatilis*. Caul. semipedalis ascendens. Panic. brachiata, subfastigiata, pedicellis ultimis subvillosis. S.

20. *cucubaloides*, fol. linearibus margine scabris, panic. dichotoma pubescente, petal. obovatis. Smith. ic. ined. 1. p. 17. t. 17. Tournef. cor. 17. Hab. in Armenia. Cal. viscosus. Pedic. glabri? T.

21. *dianthoides*, fol. linearibus margine scabris. bracteae ventricosis pedunculos superantibus. Smith. l. c. p. 16. t. 16. Hab. in Armenia. T.

\*\*\* *Fol. lineari-subulatis.*

22. *triflora*, fol. lineari-subulatis basi ciliatis: floralibus calycibusque ovato-acuminatis subjungentibus, caul. diffuso, ramis erectis sulcatis. Cav. ic. 3. p. 26. t. 249. f. 2. Willd. p. 721. In Eur. australiori. Petal. cal. striato duplo fere longiora.

23. *saxatilis*, fol. subulatis, caulibus paniculatis, calyc. foliolis ovatis obtusis. L. A. fol. subulatis, calycinis lacinis membranaceis latiore acutis obtusis. Guett. stamp. 2. p. 281. Hab. in Europa. T. †

24. *verna*, fol. subulatis obtusiusculis nervosis, caulib. subpaniculatis elongatis, calycib. acuminatis striatis. L. Ja q. aust. 5. p. 2. t. 404. Hab. in Eur. australior. alpinis. Petal. cal. longiora?

β. *cespitosa*, caul. basi ramosissimo radicato, fol. lineari-subulatis striatis, pedunc. pubescentibus, 1-2-floris subfastigiatis, cal. foliol. ovatis striatis petal. aequantibus. A. cespitosa. Ehrh. Hab. in Hercynia, Pyrenaeis. Cal. latere purpureo. Ab *A. verna* non distincta dicitur; tamen in specimenibus sub hoc nomine in Herbariis occurrentibus, pedunc. vidi elongatos, 2-3-floros, et cor. cal. multo longiorem.

Obs. *A. flaccidaetuli. inosa* Schleicheri hujus aut *A. vernae* varietates videntur. Cal. et folia minus striata sunt.

25. *obtusa*, fol. linearib. obtusis, cal. ovato-lanceolato viscido petal. subaequantibus. Allion. l. c. p. 114. Hall. helv. 863. Hab. in pascuis saxosis alpinis. Pet. ovata. †

26. *recurva*, fol. radicalib. congestis recurvis subulatis, caul. simplicibus subtrifloris, cal. ovatis striatis. Allion. pedem. n.º. 1713. t. 89. f. 3. Wulf. in Jacq. Coll. 1. p. 244. t. 6. f. 1. Hab. in alpinibus.

27. *glabra*, suberecta multicaulis, fol. subulato-linearibus planis patulis, pedic. elongatis divaricatis, cal. foliol. ovalibus laevibus cor. brevioribus. Michaux. Flor. 1. p. 274. Hab. in rupib. Cor. septentrional. Affin. Stell. 1-florae. Walt. dicitur.

28. *stricta*, multicaulis glabra stricta, fol. subulato-linearib. erectis, cal. foliol. ovali-lanceolatis striatis cor. brevioribus. Michaux. In rupib. Amer. bor.

29. *scabra*, minuta, fol. lanceolato-acutis patentibus scabris, pedunc. paniculatis dichotomis, cal. asperis corol. brevioribus, caul. simplice brevissimi. Poir. l. c. Hab. in alpium rupibus aridis.

30. *echinata*, pumila, fol. filiformibus subulatis, flor. subpaniculatis, calycib. pedunculisque hispido-glandulosis, cor. calicem aequante. Poir. enc. 6. p. 377. Hab. in alpinibus. Fol. tantum subpubescentia.

31. *hispida*, fol. subulatis subtus hispidis. L. Hab. Monspelii. Habitus *Spergulae*. Fol. subtus pilis hispidis. Panic. primum dichotoma. L. †

32. *verticillata*, fol. subulatis spinosis floribusque verticillatis. Willd. p. 725. Tournef. cor. 18. Hab. in Armenia. Rami lignosi, nodosi. Pedunc. quadriflori subcapitati axillares. Cal. foliola pungentia. Petala lanceolata. W.

33. *austriaca*, fol. linearibus, ramis erectis, pedunc. terminalib. longissimis binis, petal. obtusis emarginatis. Willd. p. 728. Jacq. Flor. aust. 3. t. 270. Allion. t. 64. f. 2. Hab. in Austriae et Italiae alpinibus.

\* *Stellarioides*. *Stellaria biflora*, caulib. prostratis ramosissimis, ramis annuis erectis longissime bifloris, fol. linearib. acutis, calycibusque dorso trinerviis, petal. calyce longioribus crenato-bifidis. Jacq. Collect. 1. p. 251. t. 18. Var. antecedentis. Willd.

34. *grandiflora*, fol. subulatis planis striatis: radicalibus confertis, caulib. subunifloris. L. Allion. ped. t. 10. f. 1. Allion. spec. pedem. 49. t. 10. f. 1. Hab. in montib. et alpinibus. T.

35. *cherlerioides*, caespitosa, repens, fol. linearibus sulcatis imbricatis, calycinis aequalibus. Vill. Dauph. 3. p. 626. *A. lanceolata*. Allioni, Hab. in rupibus alpestris. Cor. cal. brevior. Fol. subovata.

36. *liniflora*, caulib. erectis inferne ramosis suffruticosis, fol. subulatis, flor. geminis. Lin. suppl. p. 241. Jacq. Coll. 2. p. 107. t. 3. f. 3. A. striata. Vill. delph. 3.

p. 639. t. 47. Hab. in Eur. australi. Caul. distorti. Cal. foliol. lanceolatis : striis 2. Cor. magnitudine lini. L.

*Obs.* Differt ab *A. grandiflora*, fol. non plano-gramineis, cal. foliolis non multistriatis, caule multo longiore, basi que suffruticoso. L.

37. *Gerardi*, fol. lineari-subulatis trinerviis, flor. geminis terminalibus, calycin. foliolis acuminatis margine membranaceis trinerviis. Willd. p. 729. *A. liniflora*. Jacq. aust. 5. t. 445. *Gerard.* prov. 405. t. 15. f. 1. Hab. in Austr. et Gall. alpinis.

38. *juniperina*, fol. subulatis spinosis, caulib. erectis, calycib. 5 rariis, capsulis oblongis. L. Smith. ic. ined. 1. p. 35. t. 35. Lam. ill. t. 378. f. 2. Hab. in Armenia. Flor. paniculati. Cal. oblongi, 5-nervi. Pet. lanceolata. L.

\*\*\*\* *Folii setaceis.*

39. *sibirica*, fol. caespitosis setaceis longissimis, caul. subnudo umbellato-trifloris, cal. ovato obtuso cor. multo minoribus. *A. capillaris*. Poir. in Enc. bot. 6. p. 380. Hab. in Sibiria Patrin. Pl. elegans. Pet. ovalis.

40. *capillacea*, fol. setaceis rigidis glabris, flor. erectis, petal. cal. majorib. Allion. pedem. t. 86. f. 2. Hab. in agro pedemontano. †

41. *laricifolia*, fol. setaceis, caule superne nudiusculo, calycib. subhirsutis. L. Jacq. aust. 3. p. 39. t. 272. Magnol. hort. 11. t. 11. Hab. in montosis. Cal. oblongus, lineatus, cylindricus, pubescens. L.

42. *striata*, fol. linearibus erectis appressis, calycib. oblongis striatis. L. Allion. l. c. t. 26. f. 4. Cum priore saepe confunditur. An var.? Hab. in alpinis.

43. *patula*, pubens, caul. paniculatis multifloris, fol. setaceo-subulatis subsfasciculatis patentibus, petal. submarginatis, cal. striato acuto sublongioribus. Michaux. Flor. 1. p. 273. Hab. in rupibus circa Knoxville. Facie *A. tenuifoliae*. Cal. cor. brevior.

44. *tenuifolia*, fol. oppositis subulatis setaceis solitariis, cauleque ramosissimo dichotomo glabris, cal. subulatis striatis cor. longioribus. L. Lam. ill. t. 378. f. 1. Engl. bot. t. 219. Vaill. paris. t. 3. f. 1. Hab. in agris et ad muros. Pet. subovata. Fol. glabra. Caul. non stipulaceo ab *Als. segetali* differt.

45. *viscosa*, minor erecta piloso-viscida, fl. subulatis basi dilatatis striatis, cal. acu-

minatus. Thuill. Flor. paris. p. 279. Hab. in arenosis, praesertim in sylva prope Romainville. An diversa ab *Als. viscosa*?

46. *heteromalla*, caul. ramosissimo, flor. paniculato-fastigiatis, fol. setaceis fasciculatis secundis, cal. ovato acutis margine lato albo. *A. saxatilis* auctorum. Vaill. paris. 7. t. 2. f. 3. *A. setacea*. Thuill. Hab. in rupibus et in arenosis. Caul. basi lignosus, pubescens, fusco-ruber. Fol. basi ciliata. Flor. gypsoph. prostratae, cal. subcampanulatus.

47. *fasciculata*, fol. subulatis et fasciculatis setaceis, caul. erecto stricto subsimplice, flor. fasciculatis, cal. acuminatis, petalis brevissimis. Jacq. austr. 2. t. 182. Hab. Monsipellii et in Austria. Non confundenda cum *Bufonia tenuifolia*. ☉

β. *rostrata*, caul. ramosissimo, subpaniculato, fol. setaceis internodiis subbrevioribus alternis subsfasciculatis, cal. fol. conniventibus subulatis. *A. saxatilis*. Vill. Delph. 3. p. 631. Hab. in Gallia meridionali.

*Obs.* Media quasi inter heteromallam et *A. fasciculatam*. Caul. basi decumb. subfrutescens, ram. erectis tenuibus. Cal. albidus, dorso viridis, subcylindricus, longus rostriformis. Fol. non unum latus spectant.

48. *filifolia*, caulib. suffructuosis dichotomis, fol. setaceis, pedunc. terminalibus simplicibus unifloris. Vahl. symb. 1. p. 33. t. 12. Hab. in Arabia.

SPERGULARIA. Habitu *Spergulae*. Flor. *Arenariae*. Caul. ad genicula stipulaceus (humifusus).

49. *rubra*, caul. prostratis glabris, fol. filiformibus internodio brevioribus, seminibus compresso-angulatis. *A. rubra* campestris. L. Roth. germ. 2. p. 481. Smith. brit. 2. p. 479. Hab. in agris, arenosis, subhumidis. Cal. caps. aequans.

50. *media*, caul. prostratis, fol. semicylindricis carnosissimis internodia aequantibus, seminibus compressis margine alatis. *A. media*. L. Willd. p. 722. Flor. dan. t. 740. *A. marina*. Roth. l. c.? Hab. in pascuis et arenosis maritimis. Priore multo major. Cal. caps. brevior.

51. *canadensis*, fol. linearib. carnosissimis, internodiis multo longioribus, seminibus, caps. globosa. *A. rubra*. β. Michaux. Flor. 1. p. 274. Hab. in Canada ad flum. St-Laurentii. Pedunc. reflexi. Caps. cal. longior.

52. *purpurea*, caul. erecto ? piloso ramis divaricatis, fol. subsetaceis internodiis



dimidio brevioribus. Habit. in Hispania. Thiebaut. Pl. pulchella, gracilis. Cor. amoene rubra.

*Obs.* Hae species aut *Spergulis*, ab iis enim stylorum numero tantum differre videntur, associandae, aut sub peculiari genere, cui *Alsine* segetalis L. addi posset, ab *Arenariis* separandae, cum quibus se-riem haud naturalem efficiunt.

1121. *CHERLERIA*. *Cal.* 4-phyllus. *Nectaria* 5, bifida, petaloidea. *Anther.* alternæ, steriles. *Caps.* 1 locularis, 3-valvis, trisperma. L. (polyperma. Sm.)

1. *sedoides*. L. Jacq. austr. t. 284. Lam. ill. t. 329. Smith. brit. 2. p. 483. Hab. in alpidibus. Fol. triquetra, subulata. Flor. lutescentes. Petal. 0?

1122. *DEUTZIA*. *Cal.* campanulatus, 5-fidus. *Petala* 5, obtusa, indivisa. *Filam.* trifida. *Caps.* triaristata, 3-locularis, 3-valvis, basi debiscens, polysperma.

1. *scabra*. Thunb. jap. p. 185. t. 24. Lam. ill. t. 380. Hab. in Japonis. Fol. opposita ovata scaberrima. Racemi terminales. W.

1123. *HORTENSIA*. Flor. diffformes: flor. solitarii *Cal.* 5-dentatus, minutus. *Cor.* 5-petala. Flor. cymam constituentium *Cal.* 4-5-phyllus, maximus, coloratus, petaloideus, persistens. *Cor.* minuta, subglobosa: petal. 4-5 concavis deciduis. *Fruct.* (Stam. 8, 10, 11.)

1. *speciosa*, fol. late ovatis serratis acuminatis, flor. cymosis. *Hydrangea hortensis*. Smith. ic. pict. 1. p. 12. t. 12. Willd. Sp. II. p. 633. Roib. N. bot. beytr. p. 202. H. opuloides. Lam. enc. 3. p. 136. Ej. ill. t. 380. Hab. sponie in India, nunc ornamenti causa ubique colitur.

*Obs.* Flor. primo albido-virentes, tandem amoene rossi; ob sterilitatem, fructum enim nondum perfecerrunt, longe durant, demum marcescunt. Var. flor. purpurco-violaceis. An potius *Hydrangeae* species? sed flor. trigyni. Nonnulli hoc genus, forte minus recte, ad familiam *Rhamnorum* resulerunt, forsam ob florum similitudinem cum *Viburno opulo*.

1124. *GARIDELLA*. *Cal.* 5-phyllus, petaloideus. *Nect.* 5, bilabiata, bifida. *Caps.* 3, connexæ, polyspermae.

1. *Nigellastrum*. L. Lam. ill. t. 379. G. fol. tenuissime divis. Garid. prov. 203. t. 39. Hab. in Galloprovincia. ☉

*MALPIGHIACEÆ* (Gen. 1124-1129.) præsertim dignoscuntur petal. 5-unguiculatis s. pedicellatis, cal. laciniis persistentibus alternis, et cum staminibus 10 disco hypogyno insertis. Styl. 1-3. Pericarp. est vel capsula vel baccæ, plerisque vero sam-mara s. nux alata. Fol. sunt integra subatipulacea. Fruticulosæ sunt vel ar-busculæformes. J.

1125. *MALPIGHA*. *Cal.* 5-phyllus, basi extus poris binis melliferis. *Petala* 5, subrotunda, unguicu-lata. *Filam.* basi coherentia, (aut libera.) *Drupa* 1-locularis tripyrena, nucibus monospermis.

1. *glabra*, fol. ovatis integerrimis gla-bris, pedunc. umbellatis. L. Mill. ic. t. 181. f. 2. Cav. diss. 8. p. 406. t. 234. f. 1. Willd. Sp. II. p. 731. Hab. in Amer. australi. Um-bellæ 4-floræ.

2. *biflora*, fol. ovato-lanceolatis acutiss. pedunc. bifloris. Lam. enc. 4. p. 326. M. pu-nicifolia. Cavan. l. c. p. 406. t. 234. f. 2. Hab. in sylvis Amer. calidioris. h

3. *punicifolia*, fol. ovatis integerrimis glabris, pedunc. unifloris. L. Lam. enc. l. c. Plum. gen. t. 166. f. 2. Hab. in Amer. me-ridionali. h

4. *faginea*, fol. oblongo-ovatis inter-gerrimis, subtus sericeo-nitentibus, pedunc. tripartito-umbellatis. Swartz. Fl. ind. oc-cid. 2. p. 850. Hab. in ins. Grenada Ame-ricæ. h

5. *glandulosa*, fol. ovato-ellipticis acu-minatis integerrimis glabris, basi biglan-dulosi, racem. axillaribus. Willd. p. 733. Flor. racemosis monogynis. Cav. l. c. p. 411. t. 239. f. 2.

β? *glandulifera*, fol. ovatis subinte-gerrimis, utrinque pilis decumbentib. ob-scasis, racemis axillaribus, pedicell. superne glandula truncata instructis. Jacq. ic. rar. 3. t. 469. Hab. in Antillis; β. in sylvis ad Ca-racas. h

6. *tuberculata*, fol. ovato-lanceolatis in-

tegerimis subpubescentibus, racem. lateralibus, ramis tuberculatis. Willd. Jacq. Schoenh. 1. p. 54. t. 104. Hab. ad Caracas Americes. h

7. *nitida*, fol. oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis axillaribus, floribus monogynis. Willd. Cav. p. 411. t. 239. f. 1. Hab. in Jamaicae apricis cretaceis. Monogynia. h

8. *Armeniaca*, fol. ovato-oblongis acutis integerrimis coriaceis glabris, racem. axillaribus. Willd. Cavan. p. 410. t. 239. Hab. in Peruvia. Fructus refert Prunum Armeniacum h

9? *dubia*, fol. ovato-acutis cartilagineis glabris, floribus racemosis minimis, ramis punctatis. Cavan. l. c. p. 413. t. 242. Hab. in ins. St. Dominici. Fructus ignotus. †

10. *urens*, fol. oblongo-ovatis: setis decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis. L. Mill. dict. ic. t. 181. f. 1. Cav. p. 407. t. 235. f. 1. Lam. ill. t. 381. f. 1. Hab. in Amer. calidiore.

11. *angustifolia*, fol. lineari-lanceolatis: setis utrinque decumbentibus rigidis, pedunc. umbellatis. L. Cav. p. 408. t. 236. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. h

12. *canescens*, fol. oblongis obtusis pubescentibus, racem. axillaribus compositis. Ait. Kew. 2. p. 105. Hab. in India occidentali. h

13. *crassifolia*, fol. ovatis integerrimis obtusis subtomentosis, racem. terminalibus. L. Aubl. gnj. 1. t. 182. (β? *Moureila*, fol. ovatis subtomentosis acutis? flor. luteis spicatis. Aubl. guj. 1. p. 459. t. 183. Hab. in Amer. calidiore. An β. distincta? Arb. h

\* *macrophylla*, fol. ovatis latissimis subtus ferrugineo-tomentosis. Hab. in Brasilia? (Herb. Juss.)

14. *spicata*, fol. lanceolatis subtus ferrugineis, spicis terminalibus, petalis hastatis Cav. diss. 8. p. 409. t. 237. Hab. in insula St. Dominici. Arb. 30-pedalis. Cor. flava. Var. quoad folia. h

15. *altissima*, fol. ovato-oblongis subtus tomentosis, flor. albis spicatis. Aubl. gnj. 1. p. 455. s. 181. Cav. diss. 8. p. 413. Hab. in sylvis Gujanae. Arb. 60-80-pedalis. Priori affinis. h

16. *verbascifolia*, fol. lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus. L. Aubl. 1. t. 184. Cav. 8. p. 411. t. 240. Hab. in Amer. calidiore. h

17. *lucida*, fol. obovatis cuneiformibus integerrimis aveniis nitidis, racemo terminali. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 852. Hab. in Ind. occid. h

18. *coriacea*, fol. ovatis acutis integerrimis utriusque glabris, racemis terminalibus spicatis. Swartz. l. c. 2. p. 854. Sloan. hist. 2. p. 20. t. 163. f. 1. Hab. in fruticetis mont. Jamaicae australis. h

19. *aquifolia*, fol. lanceolatis dentato-spinosis subtus hispidis. L. pl. 611. Cavan. diss. 8. p. 409. t. 236. f. 2. Plum. gen. 46. ic. 168. f. 1. Hab. in Amer. calidiore. h

20. *coccifera*, fol. subovatis dentato-spinosis. L. Cavan. 8. p. 408. t. 235. f. 2. Jacq. ic. rar. 3. t. 470. Flor. rubelli. Hab. in America. h

Obs. Planta junior profert fol. elliptica absque dentibus: vid. Lam. ill. gen. t. 381. f. 2. Willd. quae M. *microphylla* quorund.

† GALPHIMIA. Cavan. Cal. glandulis nullis. Filam. libera. Stigm. simplicia. Fruct. trilocularis. Cavan.

21. *glauca*, caul. fruticoso, fol. ovatis, flor. racemosis terminalibus. Cavan. ic. 5. p. 61. t. 489. Hab. in R. mexicano, cum sequentibus. Cor. flava. Styli rubri.

22. *hirsuta*, caul. fruticoso, fol. ovato-acutis hirsutis, racem. terminalibus. Cav. l. c. p. 62.

23. *glandulosa*, caul. fruticoso glabro, fol. lanceolatis, petiolis biglandulosis. Cav. ic. 6. p. 43. t. 563.

1126. BANISTERIA. Cal. 5-partitus, basi extus peris binis melliferis. Petala subrotunda, unguiculata. Filam. basi cohaerentia. Samarae 3, 1-spermae apice simpliciter alatae. (Arb. aut Frut. ut plurimum scandentes.)

1. *angulosa*, fol. cordatis panduriformibus angulosis, petiolis biglandulosis, umbella terminali. Willd. p. 237. Cav. diss. 9. p. 426. t. 252. Hab. in America calidiore. h

2. *palmata*, caule volubili, fol. palmatis subtus tomentosis, petiolis biglandulosis. Cavan. l. c. g. p. 430. t. 257. f. 2. Hab. in ins. St. Domingo. h

3. *sagittata*, fol. hastato-sagittatis, lobis truncatis, subtus tomentosis, petiolis biglandulosis. Willd. Cavan. diss. 9. p. 430. t. 257. f. 3. Hab. ad St. Domingo. h

4. *auriculata*, caule volubili, fol. sub-  
agitat. glabris, lobis rotundatis, floribus  
umbellatis. Cav. l. c. p. 428. t. 255. Hab. in  
Brasilia prope Rio Janeiro. h

5. *ciliata*, fol. orbiculato-cordatis ciliato  
denticulatis glabris, petiolis biglandulosis,  
umb. terminali. Willd. Lam. enc. 1. p. 364.  
Cav. diss. g. p. 427. t. 254. Hab. in Brasilia.  
Commers. h

6. *emarginata*, fol. ovatis subcordatis  
apice emarginato-cuspidatis, desuper to-  
mentosus, flor. racemoso-corymbosis. Cav.  
Hab. in America. Caul. dichotomus. W.

7. *Quapara*, fol. ovatis acutis, subtus  
tomentosis, umbella pedunculata axillari-  
Willd. Abbl. guj. 1. p. 464. t. 186. Cav. g.  
p. 425. t. 250. Hab. ad pratorum margines  
Gujanae. h

8. *sinemariensis*, fol. ovatis acuminatis  
glabris setis adpressis tectis, umb. racemosis  
axillaribus. Willd. Fol. ovatis acuminatis,  
florib. luteis corymbosis. Aubl. 1. p. 402.  
t. 185. Cav. p. 425. t. 251. Cum priore.

9. *purpurea*, fol. subrotundo-ovatis ob-  
tusis glabris, racemis axillaribus termina-  
libusque, seminibus erectis. L. Cav. diss. g.  
p. 423. t. 246. f. 1. Hab. in America meri-  
dionali. h

10. *microphylla*, fol. ellipticis utrinque  
rotundatis glabris, racemis terminalibus  
subpaniculatis. Willd. Jacq. obs. 3. p. 7.  
t. 56. Hab. in Carolina? h +

11. *chrysophylla*, fol. ovato-oblongis acu-  
tiusculis, versus apicem obsolete sinuatis,  
subtus tomentoso-nitidis aureis. Lam. enc. 1.  
p. 368. Cav. diss. g. t. 245. Jacq. Schoenh. 1.  
p. 55. t. 105. Hab. in Brasilia, et ad Ca-  
racas. h

12. *laurifolia*, fol. ovato-oblongis ri-  
gidis, racemis terminalibus. L. Hab. in  
Jamaica et Hispaniolae fruticetis mon-  
tium. h

13. *caerulea*, fol. ovatis acutis, racem.  
axillaribus brachiatis, capsulis trinis mono-  
pteris divaricatis. Lam. enc. 1. p. 367.  
Cav. diss. g. p. 421. t. 243. Hab. in Amer.  
calidiore. h

14. *nitida*, fol. ovato-oblongis integer-  
rimis subtus nitidis, panicula terminali  
foliosa. Lam. enc. 1. p. 369. Cav. t. 244.  
Hab. in Brasilia. h

15. *muricata*, fol. ovatis subtus tomen-  
tosis, racemis paniculatis terminalibus, sa-

maris aculeatis. Willd. Cavan. l. c. p. 423.  
t. 246. f. 2. Hab. in Perua. h

16. *leona*, fol. ovato-oblongis acuminatis  
coriaceis reticulato-venosis glabris, ramis  
paniculatis terminalibus. Willd. Cavan. g.  
p. 424. t. 247. Lam. ill. t. 381. Hab. in  
Sierra Leone. h

17. *sericea*, ramis ancipitibus, fol. ovatis  
subtus tomentosis, petiolis biglandulosis,  
flor. racemosis. Cavan. diss. g. p. 429. t. 258.  
Hab. in Brasilia. h

18. *ferruginea*, fol. ovatis acuminatis  
subtus ferrugineis, racemis paniculatis,  
ramulis squamosis. Willd. Cavan. t. 248.  
Hab. in Brasilia ad Rio Janeiro. An diversa  
a *B. fulgente*. L.? h +

19. *longifolia*, fol. oblongis acuminatis  
rigidis nitidis, panicula terminali, ramis  
patentissimis. Sw. Fl. ind. occid. 2. p. 856.  
Hab. in Caribaeis.

20. *macrocarpa*, fol. oblongis acumi-  
natis, florum spica composita, fruct. alis  
latissimis obliquis rotundatis. Hab. in Mar-  
tinica. (Herb. Juss.)

21. *dichotoma*, fol. ovatis, racemis di-  
chotomis. L. *Convolutifolia*, fol. ovatis  
acumine productis glabris, flor. umbellatis.  
Cav. diss. g. p. 428. t. 256? Hab. in Amer.  
calidiore. h

22. *ovata*, fol. ovato-lanceolatis subtus  
subvillosis, petiolis biglandulosis, ramis  
divaricatis, umb. terminalibus. Willd. Cav.  
t. 257. f. 1. Hab. in ins. St. Dominici. h

23. *fulgens*, fol. subovatis subtus tomen-  
tosis, racemis brachiatis, pedunc. umbel-  
latis. L. Triopteris, fructu fulgente majore  
aureo. Pluk. mant. 185. Hab. in America. h

24. *heterophylla*, fol. subtus tomentosis  
orbiculato-cordatis, ramis divaricatis sub-  
rotundis, petiolis biglandulosis, umb. ter-  
minali sessili. Willd. Cav. l. c. p. 426. t. 253.  
Sloan. hist. 2. p. 27. t. 162. f. 2. Hab. in Amer.  
meridionali.

25. *brachiata*, fol. subovatis, ramis  
brachiatis, seminibus introrsum angustio-  
ribus. L. Hab. in America.

1127. *HIRÆA*. Cal. 5-phyllus,  
absque poris melliferis. *Petala*  
subrotunda, unguiculata. *Filam.*  
basi coherentia. *Samarae* 3, 1-  
spermae bialatae.

1. *reclinata*, fol. simplicib. obovatis ob-

tusis superne pubescentibus, inferne glabris Willd. Sp. II. p. 743. Hab. Carthagenae in sylvis. *h*

2. *odorata*, fol. simplicibus ovatis acutis superne glabris, inferne tomento is. Willd. Hab. in Guinea. Fol. venosa superne atrovirens, inferne tomento flavescens villosa adpresso tecta.

3. *pinnata*, fol. impari-pinnatis, foliol. ovato-oblongis altern. utrinq. glabris. Willd. Flabellaria paniculata. Cav. diss. g. p. 436. t. 264. Hab. in Sierra Leone. *h*

*Obs.* An cum sequente genere potius coniungi debet?

1128. **TRIOPTERIS.** *Cal.* 5-partitus, basi extus pars 2-melliferis. *Petala* subrotunda, unguiculata. *Filam.* basi cohaerentia. *Stigm.* 3-6. *Samar.* 3, 1-spermae 3-angulae.

1. *jamaicensis*, fol. oblongis acuminatis venosis nitidis, racemis compositis terminalibus laxis, fructibus trialatis. Sw. obs. 183. Hab. ad sepes Jamaicae, Hispaniolae.

2. *indica*, fol. subrotundo-ovatis subcordatis acuminatis nitidis glabris, racemis compositis terminalibus, fructibus trialatis. Willd. p. 744. Hab. in India orientali. Ped. et calyces pubescentes. Samar. alae aequales venosae. *W*

3. *ovata*, fol. ovatis obtusiusculis subcordatis glabris, petiolis biglandulosis, racemis compositis terminalibus, fructibus trialatis. Willd. Cav. l. c. p. 431. t. 259. Hab. in insula St.-Dominici. *h*

4. *rigida*, fol. subrotundis acutis marginatis lineatis coriaceis, racem. compositis axillaribus, fructibus trialatis. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 859. Hab. in fructetis montosis Hispaniolae. *h*

1129. **TETRAPTERIS.** *Cal.* 5-partitus, utrinque biglandulosus. *Petala* fimbriata, unguiculata. *Fructus* quadrialatus, alis 2-inferioribus minoribus.

1. *acutifolia*, fol. ovato-lanceolatis acuminatis, floribus paniculatis terminalibus. Cav. diss. c. p. 433. t. 761. Triopteris. Willd. Sp. II. p. 744. Hab. in Cajenna. *h*

2. *mucronata*, fol. ovatis mucronatis glabris, flor. umbellatis. Cav. l. c. p. 434. t. 262. f. 2. Hab. in Cajenna. *h*

3. *buxifolia*, fol. ovatis subsessilib. parvis, flor. umbellatis terminalibus. Cav. l. c. t. 262. f. 1. Hab. in Antillis. *h*

4. *citrifolia*, fol. ovato-oblongis acutis glabris, umbellis axillaribus pedunculatis, fructibus quadrialatis, alis binis inferioribus brevioribus. Willd. p. 745. Swartz. Fl. ind. occid. 2. p. 857. sub Triopteride. T. inaequalis, fol. ovato-acutis sub cordatis glabris, flor. umbellatis, alis inferioribus brevioribus. Cav. t. 260. Hab. in sylvis montium Jamaicae. *h*

1130. **ERYTHROXYLON.** *Cal.* turbinatus. *Cor.* petalis basi squamula nectarifera emarginata. *Sam.* basi connexa. *Drupa* 1-locularis.

1. *areolatum*, fol. obovatis mucronatis, pedunculis lateralibus aggregatis flore duplo longioribus. Willd. Sp. II. p. 776. Jacq. amer. 134. t. 87. f. 1. Ed. pict. t. 129. Brown. jam. 278. t. 8 f. 2. Hab. in maritimis circa Carthagenam Amer. *h*

2. *hypericifolium*, fol. obovatis emarginatis, pedunc. lateralibus subsolitariis, flore triplo longioribus. Willd. Lam. enc. 2. p. 394. Cavan. diss. 8. p. 403. t. 230. Hab. in insula Mauriti et Bourbon. *h*

3. *buxifolium*, fol. obovatis integerrimis, nervo medio supra elevato, pedunc. axillaribus brevibus solitariis basi utriculatis. Lam. l. c. 2. p. 394. Cav. l. c. p. 403. t. 231. f. 1. Hab. in Madagascar. *h*

4. *ferrugineum*, fol. ovatis saepius emarginatis subtus ferrugineis, squamulis imbricatis, flor. solitariis. Cav. p. 404. t. 131. f. 2. Hab. cum priore.

5. *rufum*, fol. ovatis coriaceis inferne rubis, squamulis imbricatis, axillis multifloris. Cav. l. c. t. 232. Hab. in Amer. meridionali. *h*

6. *havanense*, fol. ovatis, squamulis imbricatis, flor. subsolitariis, drupa gibbosa. Cavan. t. 233. Hab. Havanae in rupetribus maritimis. *h*

7. *Coca*, fol. oblongis obtusiusculis venosis, subtus trilineatis, pedunc. lateralibus sparsis flore brevioribus. Willd. Lam. enc. 2. p. 383. Cav. 3. p. 402. t. 229. Hab. in Peru. Fol. venosa.

8. *Syderoxyloides*, fol. ovato-oblongis obtusiusculis, ramisscabris apice compressis, pedunculis subternis axillaribus. Lamarck.

enc. 2. p. 393. Cav. diss. 8. t. 228. Pluk. amalt. 187. t. 442. f. 3. Hab. in ins. Bourbon. h

9. *squamatum*, fol. elliptico-lanceolatis acuminatis obtusis, ramulis squamosis floriferis. Vahl. symb. 3. p. 60. t. 63. Swartz. Flor. 2. p. 861. Hab. in Cajenna inque Caribaeis. h

10. *macrophyllum*, fol. ellipticis acuminatis, axillis multifloris, squamis lanceolato-subulatis semisimplexicaulibus striatis. Vahl. eclog. 2. p. 33. Cavan. p. 401. t. 227. Hab. in Cajenna. h

11. *laurifolium*, fol. lato-lanceolatis, squamis acutis concavis, flor. glomeratis terminalibus. Cavan. p. 400. t. 226. Hab. in insula Mauriti. h

12. *longifolium*, fol. oblongis crassis nitidis, squamulis acutis deciduis, floribus axillaribus. Cavan. p. 399. t. 225. Lam. l. c. p. 394. Hab. in Madagascar. h

13. *monogynum*, fol. ovato-lanceolatis, flor. axillaribus monogynis. Roxb. Corom. t. 88. Hab. in India. Sigm. 3.

TETRAGYNIA.

1131. MICROPETALON. Cal. 5-phyllus. Petala (minutissima), integra, aut nulla. Caps. ovata, cal. longior, 4-valvis. (Habit. *Stellariae*, *Spergulastrum*, Mich.)

1. *lanuginosum*, pubescens, fol. lanceolatis in petiolum angustatis. flor. apetalis. *Spergulastrum*. Michaux. Flor. 1. p. 275. Hab. in meridionalibus Amer. septentrional. Pedunc. subsolitarii, longi, demum reflexi.

2. *lanceolatum*, glabrum, fol. lanceolatis utrinque angustatis. Michaux. l. c. Hab. in Amer. boreali. Petala brevissima, ovalia. Flor. paniculati.

3. *gramineum*, glaberrimum, fol. linearib. erectis. Michaux. p. 276. Hab. in Pennsylvania. Stell. gramineam exakte refert. Flor. corollati.

Obs. Hae plantae genus naturale cum *Stellariis* efficere videntur.

PENTAGYNIA.

TERRIBINACEAE *Decandra* 5-gyna (gen. 1132-37.)

1132. AVERRHUA. Cal. 5-phyllus. Petala 5; superne patentia. Stam.

annulo nectarifero inserta, alterna breviora. Bacca 5-gona, 5-locularis.

1. *Bilimbi*, fol. pinnatis: foliol. ovato-lanceolatis, fructib. oblongis obtusangulis. Willd. Sp. II. p. 749. Lam. ill. t. 385. Cav. diss. 7. p. 373. t. 219. Rumph. 1. t. 36. Hab. in India. h

2. *Carambola*, fol. pinnatis, foliol. ovatis inaequalibus acuminatis, fructibus oblongis acutangulis. Willd. Cavan. diss. 7. p. 374. t. 220. Rumph. 1. t. 35. Hab. in India.

1133. TAPIRIA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. pentacocca, unilocularis, 5-valvis, 5-sperma. Sem. arillata.

1. *guyanensis*. Aubl. guj. 1. p. 470. t. 188. Lam. ill. t. 386. Jonquetia *paniculata*. Willd. p. 750. Hab. in Gujanee sylvis. Arb. 50-petalis. Fol. impari-pinnata. Flor. parvi paniculati.

1134. SPONDIAS. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala. Drupa nucleo 5-loculari.

1. *Mombin*, fol. petiolo communi compresso. L. Willd. Sp. II. p. 750. S. *Myrobalanus*. Jacq. amer. 139. t. 88. Ed. pict. t. 88. Sloan. hist. 2. p. p. 126. t. 219. f. 3. 4. 5. Hab. in India occidentali. h

2. *Myrobalanus*, petiolis teretibus: foliolis nitidis obovatis. L. S. *Mombin*, racemis terminalibus longitudine folia aequantibus. Jacq. amer. 138. Sloan. hist. 2. p. 125. t. 219. Mer. surin. 13. t. 13. Hab. in Amer. meridionali.

3. *Mangifera*, foliolis oblongis integerrimis panicula racemosa. Willd. *Mangifera* pinnata. Lin. suppl. 156. Hab. in India.

4. *dulcis*, petiolis teretib. sexjugis, foliolis serrat. costatis. Forst. prod. n.º 198. Cytherra. Lam. enc. 4. p. 260. ill. t. 384. Sonn. it. 2. t. 123. Hab. in Societ. insulis et in ins. Mauriti. h

1135. POUPARTIA. Cal. minimus, 5-fidus. Stamina disco crenato inserta. Styli approximati. Pericarp. nuce 5-loculari.

1. *borbonica*. Fol. impari-pinnata: simplicibus nonnullis intermixtis. Flor. racemosi. Arb. *Bois de Poupart* dicta. Juss. gen. pl. Genus quoad nonnullos characteres ulterius observandum.

1136. ROBERGIA. *Cal.* 5-partitus.  
*Petala* 5. *Drupa* nucē monosperma, putamine bivalvi.

1. *frutescens*. Willd. Sp. II. p. 752. Rourea frut. Aubl. guj. 1. p. 467. t. 187. Hab. in sylvis Gujanæ. Fol. impari-pinnata. Panic. corymbosa. h

*Obs.* Discrepat caps. simplici, caeteris forsā abortivis, a sequente genere. Juss.

1137. CNESTIS. *Cal.* 5-partitus.  
*Petala* 5. *Caps.* 5, bivalves, monospermae, leguminiformes, utrinque villosae, latere dehiscentes.

1. *glabra*, fol. pinnatis, foliolis ovatis petiolatis utrinque glabris, racemulis fasciculatis brevib. et tenuib. Lam. enc. 3. p. 23. et ej. illust. t. 387. f. 1. Willd. p. 752. Hab. in insula Mauritiæ et Borbonia. h

2. *polyphylla*, fol. pinnatis, foliolis ovato-oblongis subvillosis brevissime petiolatis, racemulis tomentosis, capsulis obtusissimis. Lam. l. c. Ej. ill. gen. t. 387. f. 2. Hab. in Madagascar. h

3. *corniculata*, fol. pinnatis, foliolis oblongo-acuminatis, nervo medio villosis, capsulis oblongis acutis corniculatis tomentosis pruriētib. Lam. l. c. Hab. in Sierra Leone. h

4. *trifolia*, fol. ternatis, foliolis ovatis acuminatis superne laevibus, panic. terminali. Lam. enc. p. 24. Hab. in Africa. h

1138. COTYLEDON. (Umbellaria) *Cor.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala. *Squamæ* nectariferæ 5, ad basin germinis. *Caps.* 5.

\* *Fol. dilatatis, planis.*

1. *orbiculata*, fol. ovato-spathulatis obtusis cum acumine laevibus, flor. paniculatis. Ait. Kew. 2. p. 106. Willd. p. 753. Decan l. Pl. grass. ic. Hab. ad Cap. b. spei cum trib. sequentibus. Cor. subcampanulata pulchra, coccinea. Var. fol. orbiculatis. h

2. *paniculata*, fol. oblongo-ovatis sessilibus, flor. divaricato-paniculatis, caule fruticoso ramoso. Thunb. prod. 83.

3. *fascicularis*, fol. cuneiformibus fasciculatis terminalibus, caul. incrassato, ramis carnosus subconiciis. Ait. Kew. 2. p. 106. Burm. afr. 41. t. 19.

4. *cuneata*, fol. cuneatis carnosis hirsutis, flor. paniculatis hirsutis. Thunb. prod. 83.

5. *serrata*, fol. ovalibus crenatis, caul. spicato. L. Dill. elth. t. 95. f. 112. Hab. in Creta, Sibiria.

6. *Umbilicus*, fol. pelatis crenatis, caule subsimplici, flor. pendulis, bracteis integris. L. Lam. ill. t. 389. f. 1. Engl. bot. t. 325.

7. *pellatum*, caul. erecto maculato simplici, flor. racemosis pendulis, cor. cylindrica punctata. Wenlh. obs. 49. Hab. in Lusitania, Hispania, Anglia. Rad. tuberosa. T

7. *lutea*, fol. dentato-crenatis: infimis pelatis, caule subsimplici, flor. erectis, bract. subdentatis. Huds. Smith. brit. 2. p. 484. C. *lusitanica*. Lam. enc. 2. p. 140. Dodart. mem. 265. t. 73. Hab. in Europa australi, Oriente. T

8. *alternans*, fol. orbiculato-spathulatis integerrimis, flor. paniculatis glabris quadrifidis. Vahl. symb. 2. p. 51. C. *orbiculata*. Forsk. Hab. in Arabia. Cor. ovata, laciniis lanceolatis flavo-rubentibus. V.

9. *hemisphaerica*, fol. suborbiculatis sursum punctatis subtus convexis, flor. subsessilibus. Ait. Kew. 2. p. 107. Pl. grass. ic. Dill. elth. 112. t. 95. f. 111. Hab. in Aethiopia. h

10. *triflora*, fol. obovato-carnosis integris, flor. spicatis ternis sessilib. Thunb. prod. 85. Hab. ad Cap. b. spei.

11. *coccinea*, fol. obovatis acutis carnosis, spica foliosa terminali. Willd. Car. ic. 2. p. 54. t. 170. Hab. . . . h

12. *Malacophyllum*, fol. lanceolat. acutis carnosis, spica cylindrica terminali aphylla. Willd. p. 758. Fall. it. 3. app. tab. O. f. 1. Hab. in Davuriæ alpinis. Similis Crass. spinosae. W. ☉

13. *mamillaris*, fol. alterniteretiv-ovatis, flor. alternis subsessilibus. Lin. suppl. 242. Hab. ad Cap. b. spei. Cum præcedente ad sequentem divisionem potius pertinet?

\*\* *Fol. teretibus.*

14. *spuria*, fol. spathulato-lanceolatis carnosis, caul. fruticoso. L. Willd. p. 754. C. *teretifolia*, fol. subteretibus carnosis obtusis basi angustioribus, caul. crasso frutescente. Lam. enc. 2. p. 119? Burm. afr. t. 19. f. 2. Moris. L. 12. t. 7. f. 40. Hab. in Africa, loc. petrosis. Flor. pulchri, penduli, rubri.

15. *tuberculosa*, caul. frutescente, fol. subcylindricis lineari-oblongis acutis, flor. subpaniculatis, pedunc. calycibusque pubescentibus. Decand. Pl. grass. Lam. enc. 2. p. 139. Burm. afr. t. 20. f. 1. Ad Cap. b. sp. Flor. speciosi, subaurantiaci, tubulosi. Caul. crass. tuberculatus.

16. *ungulata*, fol. semi-cylindricis canaliculatis: apice margine calloso-purpureo. Lam. enc. 2. p. 139. Burm. afr. t. 22. f. 1. Hab. in Africa.

17. *purpurea*, fol. lineari-oblongis carnosis glabris, florib. paniculatis. Thunb. prod. 83. Hab. ad Cap. b. spei, cum 4 sequentibus.

18. *teretifolia*, fol. carnosis subteretib. hirsutis, flor. paniculatis, caule hirsuto. Thunb. prod. 83.

19. *acaloides*, fol. teretibus, florib. paniculatis, caule fruticoso. Thunb. Lin. suppl. 242. Flores lutei referunt *Cacaliam*.

20. *reticulata*, fol. teretibus, floribus reticulato-paniculatis, caule fruticoso. Th. Lin. suppl. 242. Refert *Staticem* reticulatam.

21. *papillaris*, fol. oppositis tereti-ovatis, flor. corymbosis. Lin. suppl. 242.

22. *hispanica*, fol. oblongis subteretibus, flor. tubulosis fasciculatis. Loefl. ii. t. 7. Plant. grass. ic. C. pistoria. Orteg. monogr. f. 2. Hab. in Africa, Oriente, et Hispania. Cor. infundibulif. longi, rubelli. ♂ ☉

23. *viscosa*, fol. teretibus, racem. terminalibus villos-viscosis, caule ramoso, cor. campanulata. Vahl. symb. 2. p. 51. C. Mucizonia. Orteg. Jacq. Coll. suppl. 112. t. 13. f. 2. C. hispida. Lam. enc. 2. p. 141. Plant. grass. ic. Hab. in montosis Hispaniae et in Barb. Caul. rutescens.

1139. *SEDUM. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Squamae nectariferae 5, ad basin germinis. Caps. 5.*

\* *Planifolia.*

1. *verticillatum*, fol. quaternis, lanceolatis serratis. L. Amoen. acad. 2. p. 252. t. 4. f. 14. Willd. Sp. II. p. 760. Hab. in Europa australi et in Siberia. Caul. pedalis erectus. Racemi axillares et flor. parvi.

2. *Telephium*, fol. planiusculis ovatis sparsis serratis, corymb. folioso, caul. erecto. L. Lam. ill. t. 3, o. f. 1. Decand. Pl. grass. ic. Flor. dan. t. 686. Hab. in agris petrosis sylvaticis.

\* *maximum*, fol. ovatis dentatis conjugatis, umbell. alaribus, flor. albicanibus. Hall. helv. n°. 955. Hab. in alpinis.

3. *Telephioides (americana)*, fol. planis ovatis, utrinque subcuneis dentatis, flor. corymboso-fasciculatis. Mich. Flor. 1. p. 277. Hab. in Amer. septentr. rupib. altissimis. Flor. purpurascences.

4. *Anacampteros*, fol. cuneiformib. integerrimis subsessilibus, caulib. decumbentibus, florib. corymbosis. L. Plant. grass. ic. Hab. in Gallo-provinciae rupibus, et in Suecia. Flor. purpurei.

*Obs.* Fol. hyeme decidua. Lin., persistencia secundum alios.

5. *divaricatum*, fol. cuneiformi-rhombis emarginatis petiolatis, caulib. ramosis, paniculis terminalib. divaricatis. Ait. Rew. 2. p. 108. S. Aizoides. Plant. grass. ic. 7. Hab. in Mad. ra. h

6. *Aizoon*, fol. lanceolatis serratis planis, caule erecto, cyma sessili terminali. L. Pl. grass. ic. Hab. in Siberia.

7. *hybridum*, fol. cuneiformibus concavis subdenatis aggregatis, rapis repentibus, cyma terminali. L. Gmel. sib. 4. t. 67. f. 1. Murray in comm. nov. Goett. 6. p. 35. t. 5. Hab. in Tataria.

8. *populifolium*, fol. planis cordatis dentatis petiolatis, corymbis terminalibus. Ait. Kew. 2. p. 109. Plant. grass. ic. Curt. mag. t. 118. Hab. in Siberiae alpinis.

9. *stellatum*, fol. planiusculis angulatis subrotundis, flor. lateralibus sessilibus solitariis. L. Camer. hort. p. 7. ic. 2. Hab. in Italia, Gallia, Helvetia. ☉

10. *alsinefolium*, fol. planis ovatis, caule paniculato, petalis obtusis. Hab. in umbris lapidosis Pedemontii. Fol. tenuia venosa.

11. *Cepaea*, fol. planis sublinearib., caul. ramoso, floribus paniculatis, petal. acutis. Willd. p. 763. Hab. in umbris.

\* *galioides*, caule adscendente, fol. oppositis inferioribus 3-4-nis. Allion. ped. n°. 1742. t. 65. f. 3. Hab. in agris Pedemont. Flor. rubicundi.

12. *libanoticum*, fol. radicalibus fasciculatis spatulato-lanceolatis, caule subnudo simplicissimo. L. Hab. in Palaestina. Facies semperv. montani. Racem. terminalis, longitudine caulis. L.

13. *heptapetalum*, fol. ovato-oblongis planiusculis, pedunc. subhirsutis, florib. paniculatis. Poir. enc. bot. 4. p. 630. *S. caeruleum*. L. ? Hab. ad Barbariae rupes, ad littora maris. Flor. caerulei. Habitu Sedi, sed stamina 12-15 Sempervivi.

14. *ternatum*, pumilum, repens, fol. planis rotundato-spathulatis ternis, cyma subtristachya. Michaux. Flor. 1. p. 277. Hab. in rupibus Amer. boreal. Flor. albi 8-dri : terminalis solitarius 10-ander. M.

\* *Teretifolia.*

15. *dasyphyllum*, fol. oppositis ovatis obtusis carnosius, caule infimo, flor. sparsis. L. Jacq. hort. t. 253. Pl. grass. ic. Engl. bot. 1. 656. *S.* fol. semiglobosis subovat. sessilibus quadrifariam imbricatis. Wachend. ultr. 391. Hab. in Europ. australior. rupib. Flor. albid.

Obs. Stamina 10-12 ; styli 5-6. In planta culta rami elongati, flor. sparsis : ♂ *gracile*. Decand.

16. *pulchellum*, caul. assurgentibus, fol. sparsis linearib. obtusis planiusculis, cym. polystachya, flor. sessilibus. Mich. l. c. Hab. in rupibus circa Knoxville. Spic. longae recurvatae : flor. unilaterales.

17. *reflexum*, fol. subulatis sparsis basi solutis : inferioribus recurvatis, flor. subcymosis primo recurvis. Hab. in sylvis. Cal. acutus.

18. *virens*, fol. subulatis sparsis basi solutis, flor. cymosis. Petal. calyce lanceolato sesquilongioribus. Ait. Kew. 2. p. 110. Hab. in Lusitania. †

19. *rupestre*, fol. subulatis quinquenariis confertis basi solutis, flor. cymosis. L. Engl. bot. t. 170. Pl. grass. ic. Dill. elth. t. 256. f. 333. Hab. ad rupes. Fol. glauca. Cal. obtusiusculus, rubicundus basi 1-phyllus. Sm.

20. *altissimum*, flor. suboctopetalis, fol. sparsis : inferioribus teretibus ; superiorib. depressis. Enc. bot. 4. p. 614. Plant. grass. ic. Semperviv. sediforme. Jacq. Hort. 1. t. 81. et Misc. austr. 1. p. 133. t. 5. Hab. in Europ. australi.

21. *saxatile*, fol. sparsis semiteretibus obtusis basi solutis, caule ramoso decumbente. Willd. p. 765. Allion. ped. n. 1746. t. 65. f. 6. *S.* rupestre. Flor. dan. 59. Plant. grass. ic. *S.* alpestre. Villars. Hab. in alpinis et montosis ad rupes.

22. *rubens*, fol. ovatis alternis sessilibus remotis, caule prostrato basi ramoso, flor. terminalibus subumbellatis, pedunc. simplicissimis. Haenke it. sudet. p. 114. Hoffm. Flor. germ. p. 208. Hab. in sudetis. Var. prioris secundum Willdeuow Caps. purpurea.

23. *quadrifidum*, fol. sparsis teretibus obtusis, caule simplici, florib. umbellatis tetrapetalis. Willd. Pall. it. 3. app. n. 90. t. P. f. 1. Hab. in rupibus Asiae borealis. †

24. *hispanicum*, fol. linearibus teretibus depressis sparsis, cyma patula, flor. hexapetalis. Ait. Kew. 2. p. 115. Dill. elth. t. 256. f. 332. Hab. in Hispan., Gall. et Carinthia.

25. *lineare*, fol. tereti-linearib. oppositis, cyma trifida. Thunb. jap. 187. Hab. in Japonia.

26. *caeruleum*, fol. oblongis alternis obtusis basi solutis, cyma bifida glabra. Vahl. symb. 2. p. 51. Shaw. it. f. 550. *S. anereum*. Desf. atl. Hab. in fissuris rupium ad Manuh Tuncti.

27. *album*, fol. oblongis obtusis teretiusculis sessilib. patentibus, cyma ramosa. L. Flor. dan. t. 66. Blackw. t. 428. Lam. ill. t. 390. f. 2. Hab. in muris antiquis.

28. *acre*, fol. alternis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. L. Pl. grass. ic. Curt. lond. ic. t. 32. Hab. in campis sterilissimis, ad muros antiquos. Flor. majusculi, aurei.

\* *aestivum*, fol. ovato-teretiusculis obtusis, caul. bifido, flor. luteis sessilib. Allion. Fl. Pedem. Lob. ic. 378. Hab. in saxosis. Flores inter dichotom. sessilis. Pl. acida annua. ☉

29. *sexangulari*, fol. subternis teretiusculis, adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis, cyma trifida. L. Curt. lond. ic. Hab. in campis siccis, ad muros. Fol. subtus rubentia, insipida.

30. *annuum*, caule erecto solitario annuo, fol. ovatis sessilibus gibbis alternis, cyma recurva. L. Excl. syn. Raj. Hab. in Europa boreali. Simile *S. antecedenti*, sed Fol. rubicunda. Flor. lutei. L. ☉ †

\* *Guetardi*, fol. teretibus obtusis, basi solutis acutis, calycib. teretibus, petal. lanceolatis, caul. corymboso dichotomo. Vill. Delph. 3. p. 679. t. 45. Hab. prope Estampes. Flor. albi. Forte eadem est ac *S. anglicum* aut *rubens*.

31. *anglicum*,



31. *anglicum*, fol. subovatis adnato-sessilibus gibbis subalternis, cyma ramosa bifida. Huds. Engl. bot. t. 171. Flor. dan. t. 82. Raj. synop. t. 12. f. 2. S. rubens. Lightf. Hab. in rupibus et maritimis Angliæ et Norvegiæ. Caul. basi procumbens. Petala acuminata alba & carina rubra. Sm.

32. *aristatum*, fol. teretibus utrinque acutis basi solutis radicalibus fasciculatis, petal. aristatis lanceolatis. Vill. l. c. p. 680. t. 45. Cresc. in Delph. prope Sigoyes. Flor. corymbosi, albidii. Totum glabrum? †

33. *hirsutum*, fol. ovalibus obtusis planiusculis, margine pubescentibus, caul. ramoso erecto, petal. aristatis ovatis, stam. longioribus. Allion. pedem. n.º. 1754. t. 65. f. 5. Poir. enc. 4. p. 634. Hab. in Ital. alpihus et in monte aureo. Fol. radicalia rosacea fasciculata. Caul. rubens. Pet. alba; linea purpurea, pubescentia. Cal. hirsutus. A.

34. *nicaense*, fol. subulatis sparsis basi solutis, cyma bifida, flor. longe pedunculatis. All. l. c. 1752. t. 90. f. 1. Cresc. super saxa in comitatu Nicaensi. Flor. magni, albidii, unilaterales. A. ☉

35. *atlanticum*, ramis filiformibus paniculatis villosis, fol. semiteretibus. S. *hispidum*. Dels. atl. t. p. 361. Hab. in Atlante. Cor. aurea. Stam. 10-12. D.

36. *pubescens*, fol. oblongis obtusis supra planiusculis, cyma bifida, petal. lanceolatis. Vahl. symb. 2. p. 52. Hab. in fissuris rupium Tuneti.

37. *villosum*, fol. oblongis supra planiusculis pedunculisque axillaribus subunisloris pubescentibus, petal. ovatis obtusiusculis. Vahl. symb. 2. p. 52. Fl. dan. t. 24. Engl. bot. t. 394. Pl. grass. ic. Hah. in pratis paludosis. Flor. purpurei. Stam. 7-8.

38. *palustre*, fol. brevi-linearibus, flor. cymosis. Sedum palustre subhirsutum purpureum. Bauh. pin. p. 283. Cresc. in palustrib. montosis. Sed. villosa major. Flor. purpureo-cerulei, majusculi. Fol. latiora.

38. *monregalense*, fol. verticillatis linearibus, caul. procumbente paniculato, pedunc. villosa-viscoso. Balbis Miscell. bot. p. 23. t. 6. Hab. in alpestribus ad rupes Pedemontii. Caul. plures ex radice. Flor. primo nutantes, albi.

39. *atratum*, caule erecto, flor. corymbosis fastigiatis. Jacq. aust. t. t. 8. Plant. grass. ic. Scheuchz. it. t. p. 48. t. 6. f. 34. Hab. in Helvetiæ, Galliæ et Italiæ alpihus.

Cal. atro-purpurascens. Petal. alba aut flava, ovata. Germina atro-purpurascensia.

40. *pusillum*, erectum, fol. alternis teretiusculis oblongis, flor. 8-andris alternis subpedicellatis. Michaux. Flor. 1. p. 276. Hab. in Carol. septentr. Flor. albi.

41. *nudum*, fol. sparsis oblongo-cylindraceis obtusis, caul. fruticosus ramosissimis, ramis tortuosis, cymis terminalibus. Ait. Kew. 2. p. 112. Hab. in Madera. h

Obs. In promontorio Cap. b. sp. plantarum succulentarum ceterum feraci nullæ Sedi species, quantum scio, huc usque sunt detectæ.

1140. PENTHORUM. Cal. 5-fidus. Petala nulla, aut quinque. Caps. 5-cuspidata, 5-locularis.

1. *sedoides*. L. Lam. ill. t. 390. Hab. in Amer. boreal. aquaticis. Pedunc. terminal. spicis revolutis.

1141. BERGIA. Cal. 1-phyllus, caducus, 5-dentatus. Petala 5. Caps. 1, globosa, 5-torulosa, 5-locularis, 5-valvis: valvulis petaloideis. Sem. plurima. (Bacca ovalis: cortice crasso, 1-locularis, polysperma. Roxb.)

1. *verticillata*, fol. lanceolatis apice denticulatis, flor. verticillatis. Willd. p. 770. B. *aquatica*. Roxb. Corom. 2. p. 22. t. 142. B. *capensis*. Lin. Rheed. g. t. 78. Hab. in India orientali, nec ad Cap. b. sp.

2. *glomerata*, fol. obovatis crenulatis, flor. glomeratis. Lin. suppl. 243. Thunb. prod. 82. Hab. ad Cap. b. spei.

1142. SURIANA. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Styli inserti lateri interiori germinum. Sem. 5, nuda.

1. *maritima*. L. Jacq. amer. 140. Ed. pict. p. 70. Lam. ill. t. 389. Hab. in Amer. calidioris maritimis. h

1143. GRIELUM. Cal. 5-fidus. Petala 5. Filam. persistentia. Pericarpia 5, monosperma.

1. *tenuifolium*. L. Lam. ill. t. 388. Geranium. Burm. afr. 88. t. 34. f. 1. Hab. in Aethiopia. Fol. incana multifida. Cor. lutea.

1144. *OXALIS*. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* unguibus connexa. *Stam.* inaequalia, 5-breviora, exteriora basi connata. *Caps.* angulis elasticè dehiscens, 5-gona. *Sem.* subarillata.

\* *Fol. simplicibus.*

1. *monophylla*, acaulis, scapo unifloro, fol. ellipticis obtusis, filamentis glabris. Willd. Sp. II. p. 772. Jacq. Oxal. Vien. 1794. n°. 35. p. 56. t. 79. f. 3. Thunb. Dist. de Oxal. n°. 1. p. 8. t. 1. f. 1. Fol. Bellidis. Flos O. Acetosellae.

*Obs.* Hab., paucis speciebus exceptis, quarum locus natalis indicatur, omnes fere ad *Cap. b. spei.* Fol. fere omnia, uti in Filicibus primo convoluta, et plus minusve irritabilia.

2. *lepidula*, acaulis, scapo unifloro, fol. obovatis subretusis, filamentis glanduloso-pilosis simplicibus. Willd. Jacq. L. c. p. 55. t. 21. Cor. albidula.

3. *rostrata*, acaulis, scapo unifloro, fol. obovatis retusis, filament. interiorib. apice rostratis piloso-glandulosis, antheris lateralibus. Cor. violaceo-albida. W.

\*\* *Foliis binatis.*

4. *asinina*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis lanceolatis mar. duæ cartilagineis denticulatis, petiol. alatis. W. p. 773. Jacq. p. 59. t. 24. Cor. magna flava.

5. *lanceaefolia*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis ternatisque margine cartilagineis scabris, petiolis alatis. Jacq. p. 26. t. 26. Cor. flava.

6. *leporina*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis ellipticis emarginatis, margine cartilagineis denticulatis, petiolis alatis. W. Jacq. p. 60. t. 25. Cor. alba, margine rubicunda.

7. *crispa*, acaulis, scapo unifloro, fol. binatis subrotundo-obovatis emarginatis, margine undulatis petiol. subrotundo-alatis. Jacq. p. 58. t. 23. Cor. maxima, alba.

\*\*\* *Foliis ternatis.*

† *Acaulis, scapounifloro.*

8. *fabaeifolia*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis obovatis emarginatis mucronatis, petiolis alatis. W. p. 774. Jacq. p. 63. t. 27. Cor. ampla flava.

9. *laburnifolia*, foliolo medio sublanceolato, lateralibus oblique oblongis, stylis

longissimis, filamentis denticulatis. Jacq. p. 63. t. 28. Pubescens. Petioli compressi. Cor. flava.

10. *sanguinea*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis, foliolo intermedio basi attenuato, petiolo semitereti compresso, calycibus simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 775. Jacq. p. 64. t. 29. Filam. interiora hispida.

11. *ambigua*, stylis longissimis, foliolo immaculatis planis, calycinis folioli aequalibus. Jacq. Oxal. n°. 59. p. 80. t. 43. Cor. alba fundo flavescente.

12. *undulata*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis: foliolo oblongis obtusis undulatis; intermedio cuneiformi, calycinis folioli pilosis punctatis, unico spatulato majore, stylis staminibus longioribus. W. Jacq. p. 81. t. 44. Fol. pilosiuscula. Cor. alba fundo flavo.

13. *fuscata*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis maculatis oblongis obtusis: foliolo intermedio cuneiformi-subrotundo, calycib. aequalibus interrupte biatriatis, stylis staminib. longiorib. W. p. 776. Jacq. p. 82. t. 45. Fol. subretusa maculata.

14. *glandulosa*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis: foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque glandulosis, stylis staminib. interiorib. breviorib. W. Jacq. p. 83. t. 46. Glandulae pedicellatae. Cor. alba fundo flavo.

15. *tricolor*, acaulis, scapo unifloro, fol. ternatis oblongis obtusis, foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Var. cor. interne flava. p. 84. t. 47. et alba. Jacq. p. 85. t. 48.

16. *rubro-flava*, acaulis, scapo unifloro foliis paullo longiore erecto, fol. ternatis lanceolato-oblongis retusis, foliolo intermedio cuneiformi, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 87. t. 50. Cor. flava, externe rubro-marginata.

17. *flavida*, acaulis, scapo unifloro fol. duplo longiore nutante, fol. ternatis oblongis retusis, foliolo intermedio cuneiformi, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. p. 777. Jacq. p. 88. t. 51. Cor. alba fundo flava, externe rubro-marginata.

18. *exaltata*, acaulis, scapo unifloro fol. duplo longiore stricto, fol. ternatis ellipticis emarginatis subtus villosis: foliolo intermedio cuneiformi, styl. staminib. exte-

rrioribus brevioribus. W. Jacq. p. 86. t. 49. Parvitate cor. et foliorum etiam ab antecedentibus distincta. W.

19. *sulphurea*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subrotundis, calycinis foliolis margine clavatopilosis apice reflexis, stylis staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 100. t. 63. Fol. subtus sanguinea, aureo-punctata. Cor. pallide-sulphurea.

20. *variabilis*, acaulis, scapo unifloro fol. longiore flaccido, fol. ternatis subrotundis: foliolo intermedio cuneiformi, styl. staminibus exterioribus brevioribus. Jacq. p. 89. t. 52. Rubra, flore rubro. Jacq. p. 90. t. 53. In fl. cal. foliola margine glandulosa, apice pilosa et cor. carnato-alba. In fr. cal. simpliciter pilosi et cor. rosei coloris. W. p. 778.

21. *grandiflora*, acaulis, scapo unifloro fol. brevior erecto, fol. ternatis subrotundis: foliol. intermedio cuneiformi, petal. truncatis, styl. staminibus exteriorib. brevioribus. W. p. 778. Jacq. p. 91. t. 54. Thunb. prodr. app. p. 189. Cor. candida, fundo flavescente.

22. *purpurea*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis subrotundis; petiol. teretibus, stylis staminib. interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 93. t. 56.

\* *laxula*, stylis intermediis, filamentis denticulatis, petiolis teretibus, foliol. excisis saepe subtus purpurascens. Jacq. 94. t. 57. Thunb. prodr. app. p. 190.

23. *humilis*, scap. unifloris, fol. ternatis: foliol. subrotundatis ciliatis. Thunb. prodr. app. p. 190. †

24. *breviscapa*, acaulis, scapo unifloro petiolis duplo brevior, fol. ternatis subrotundis, petiolis compresso-planis, stylis staminibus interiorib. brevioribus. W. 779. Jacq. p. 95. t. 58. Fol. subtus sanguinea punctata.

25. *speciosa*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subrotundis ciliatis, stylis staminib. interioribus longioribus. W. p. 779. Jacq. p. 97. t. 60. Thunb. prodr. app. p. 189. Ehret. pict. t. 10. f. 2.

fr. *sugillata*, stylis longissimis, foliol. adultis subius toris et supra ad oras lividis. Jacq. p. 98. t. 61. Burm. afr. p. 67. t. 27. f. 3.

\* *rigidula*, stylis longissimis, foliolis immaculatis. Jacq. p. 98. t. 59. Cor. majuscula, campanulata, purpurascens. Sügm. plumosa.

26. *Acetosella*, scapo unifloro, fol. ternatis obcordatis, radice dentata. L. Flor. dan. t. 980. Hab. in sylvis umbris, vere. fr. *caerulea*, minor subvillosa.

27. *magellanica*, scapis unifloris, foliol. subrotund. emarginatis carnosiss. Forst. comment. goett. q. p. 33. Hab. in Terra del Fuego, locis irriguis. fr.

28. *marginata*, acaulis, scapo unifloro petiolis dimidio brevior, fol. ternatis obcordatis, calycin. foliol. clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. p. 781. Jacq. p. 108. t. 68. Foliola inferne sanguinea, vividi marginata. Cor. alba fundo flavescente. W.

29. *pulchella*, acaulis, scapo unifloro petiolis triplo brevior, fol. ternatis obcordatis, calycinis foliolis clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 109. t. 69. Foliol. subtus sanguinea, aureo-punctata.

30. *obtusa*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis dense pilosis, calycinis foliol. apice rotundato-obtusis, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. p. 382. Jacq. p. 106. t. 79. f. 1. Cor. rubra. Filam. glabra. W.

31. *lanata*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis villosis, calycin. foliol. acutis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 104. t. 77. f. 2. Cor. alba. Filam. hirta.

32. *truncatula*, acaulis, scapo unifloro foliis duplo longiore, fol. ternatis foliolis triangularib. margine villosis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 99. t. 62. Foliola cuneiformia truncata. Cor. lilacina.

33. *strumosa*, acaulis, scapo foliis brevior, fol. ternatis obcordatis, stylis staminibus exteriorib. brevioribus sub apice strumosis. W. Jacq. p. 102. t. 64. Foliol. fusco-maculata. Cor. alba.

34. *punctata*, acaulis, scapo foliis longiore, fol. ternatis obcordatis punctatis, stylis staminibus exteriorib. breviorib. W. p. 781. Jacq. p. 105. t. 66. Thunb. Diss. t. 1. f. 3. Hab. in collib. arenosis.

35. *lateola*, acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis pilosis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 103. t. 65.

36. *macrogonia*, acaulis, scapo unifloro foliis brevior, fol. ternatis obcordatis ciliatis, styl. staminib. interiorib. longiorib. W.

Jacq. p. 110. t. 70. Scapi articulus ad basin longior, quam in reliquis, W.

37. *fallax*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis pilosiuscul. ciliatis, styl. staminib. interiorib. breviorib. W. p. 784. Jacq. p. 107. t. 67. Simill. praecedenti: articulus scapi brevissimus.

38. *tenella*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis glabris, styl. staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 53. t. 19. Cor. pallide violacea, fundo flavo.

39. *minuta*, acaulis, scapo foliis longiore, fol. ternatis lineari-lanceolatis acutis, stylis staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. p. 65. t. 79. f. 2. Thunb. Diss. t. 2. f. 3.

40. *pusilla*, subcaulescens, scapo unifloro longitudine foliorum, foliis ternatis lineari-cuneiformib. emarginatis, styl. staminib. interiorib. breviorib. W. p. 785. Jacq. p. 79. t. 42. Foliol. glauca. Cor. pallide incarnata.

#### ++ Scapo multifloro.

41. *compressa*, acaulis, scapo bifloro foliis longiore, fol. ternatis obcordatis, petiolis planis compressis, styl. staminib. interiorib. longiorib. W. Jacq. p. 40. t. 78. f. 3. Lin. suppl. 243. Hab. in campis arenosis humidis Cap. b. spei. ¶

42. *sericea*, acaulis, scapo umbellifero, foliis longiore, florib. nutantibus, fol. ternatis obcordatis sericis, stylis staminibus interiorib. brevioribus. Jacq. t. 77. f. 1. Lin. suppl. t. 243.

43. *articulata*, scap. umbelliferis, fol. ternatis tomentosis, calycib. apice callosis. Enc. bot. 4. p. 687. Hab. in Amer. meridion. Commers. Rod. longa, repens, nodosa.

44. *megalthiza*, acaulis, scapo umbellifero fol. brevior, flor. erectis, fol. ternatis obcordatis, radice crassa multicapite. W. p. 786. Jacq. p. 33. O. bicolor. Enc. bot. 4. p. 687. Feuille. peruv. 2. p. 734. t. 25. Hab. in Peru locis montosis. ¶

45. *virgosa*, scap. multifloris. fol. ternatis: foliol. ovatis, flor. verticillatis. Molin. chil. hist. p. 110. Enc. bot. 4. p. 685. Hab. in A. Chilesi. Omnium forte maxima. Scapi plures, 5-pedales. M. +

46. *tetraphylla*, acaulis, scapis umbelliferis, fol. ternatis et quaternatis: foliolis cordatis inferne glaucis. Cav. ic. 3. p. 19. t. 237. Hab. in Mexico. Cor. rubro-violacea. ¶

47. *violacea*, acaulis, scapo bifido umbellifero, florib. nutantibus, fol. ternatis obcordatis glabris, stylis staminib. exterioribus brevioribus. Jacq. p. 35. t. 80. f. 2. Jacq. hort. 2. p. 84. t. 180. Flos solitarius in dichotomia. Stam. hirta.

48. *caprina*, acaulis, scapo umbellifero paucifloro, flor. erectis, fol. ternatis obcordato-bilobis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. t. 76. f. 1. O. *pes caprae*. L. Burn. afr. t. 28. f. 3. Cor. violacea, fundo flavo.

49. *cernua*, acaulis, scapo umbellifero multifloro, flor. cernuis, fol. ternatis obcordato-bilobis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 37. t. 6. Thunb. diss. t. 2. f. 2.

50. *dentata*, acaulis, scapo subbifloro, fol. ternatis obcordatis, calycin. foliol. apice tridentatis, stylis staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. Oxal. n.º. 17. p. 83. t. 7. Cor. pallide incarnata.

51. *livida*, acaulis, scapo bifloro, fol. ternatis obcordato-bipartitis, styl. staminib. interioribus brevioribus. W. p. 788. Jacq. p. 39. t. 8. Cor. incarnata.

#### +++ Caulescentes, pedunculis unifloris.

52. *ciliaris*, caule erecto inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis longiore, foliis ternatis oblongis emarginatis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 66. t. 30. Cor. purpurea, fundo luteo.

53. *arcuata*, caul. decumbente inferne nudo, pedunc. unifloris petiolorum longitudine, fol. ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis ciliatis, stylis staminibus brevioribus. W. Jacq. Oxal. n.º. 46. p. 67. t. 31. Cor. violacea.

54. *linearis*, caule decumbente inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis brevior, fol. ternatis linearib. emarginatis ciliatis, styl. staminib. interioribus longioribus. Willd. p. 789. Jacq. p. 68. t. 32. Cor. violacea, fundo flavo.

55. *cuneata*, caule decumbente inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis brevior, fol. ternatis cuneiformibus emarginatis pilosis, styl. staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. p. 76. t. 40.

56. *cuneifolia*, caul. decumbente inferne nudo, pedunc. unifloro petiolis brevior, fol. ternatis lineari-cuneiformibus pilosis emarginatis, styl. staminibus exterioribus bre-

vioribus. W. Jacq. p. 77. t. 41. Dissert a priore filamentis glandulosis, interioribus inaequalib. et stylis filamentis breviorib. W.

57. *glabra*, caule inferne nudo brevissimo erecto, pedunc. unifloro fol. duplo longiore, fol. lineari-cuneiformibus emarginatis ciliatis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. Jacq. p. 78. t. 76. f. 3. Thunb. Oxal. t. 2. f. 1. Cor. purpurea, fundo flavo.

58. *bifida*, caul. inferne nudo erecto subramoso, pedunc. unifloro, fol. duplo longiore, fol. ternatis cuneiformibus emarginato-bifidis, stylis staminibus interioribus longioribus. W. p. 790. Jacq. t. 73. f. 4. Thunb. Oxal. t. 1. f. 2. Hab. ad latera fossarum montis Diaboli. Foliol. biloba. Filam. hirta.

59. *filicaulis*, caul. inferne nudo decumbente subramoso, pedunc. unifloro, fol. duplo longiore, fol. ternatis cuneiformibus emarginato-bifidis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 42. t. 205. Fol. biloba. Filamenta glabra.

60. *longiflora*, caule inferne nudo simplici, pedunc. unifloro, fol. ternatis bipartitis. Willd. p. 791. Scapo unifloro, fol. ternatis semibifidis, lobis lanceolatis. L. Hab. in Virginia. Flos unicus longus. †

61. *natans*, caule inferne nudo nutante, pedunc. unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis, styl. staminib. exterioribus brevioribus. Jacq. t. 76. f. 2. Thunb. Oxal. t. 1. f. 4. Hab. in aquis Cap. b. spei. Caul. filiformis tenuissimus, apice foliosus. Pet. alba.

62. *convexula*, caule inferne nudo decumbente, pedunc. unifloro fol. longiore, fol. ternatis subrotundis punctatis, stipulis dilatatis acuminatis, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 92. t. 55. Cor. rosea, fundo flavo.

63. *versicolor*, caul. inferne nudo declinato, pedunc. unifloro foliis longiore, fol. ternatis linearibus emarginatis, apice bipunctatis, styl. staminib. interioribus longioribus. W. p. 792. Jacq. p. 72. t. 36.

β. *sylvestris*, minor, staminib. edentulis. Jacq. t. 77. f. 4.

γ. *gracilis*, filamentis edentulis, stylis longissimis, cor. campanulatis. Jacq. p. 69. t. 31. Burm. afr. 66. t. 27. f. 2. Flor. hyeme. Cor. alba, angulis rubris. In γ. fol. paulo latiora et cor. pallide rosea.

64. *elongata*, caul. inferne nudo decli-

nato, pedunc. unifloro, fol. longiore, fol. ternatis linearibus emarginatis apice bipunctatis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. p. 793. Jacq. p. 73. t. 37.

\* *miniata*, filamentis edentulis, stylis brevissimis. Jacq. Oxal. n. 50. p. 71. t. 50.

\* *amoena*, scapis unifloris, fol. ternatis linearibus, calycib. obtusis, filamentis denticulatis inaequalib., styl. brevissimis. Jacq. hort. Schoenb. 2. p. 42. t. 206.

65. *reclinata*, caule inferne nudo subramoso reclinato, pedunc. unifloro fol. longiore, fol. ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis apice bipunctatis, calycin. foliolis adpressis, styl. staminib. interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 70. t. 34. Cor. pallide miniata.

66. *polyphylla*, caul. inferne nudo erecto subramoso, pedunc. unifloro petiolis duplo longiore, fol. ternatis linearibus emarginatis, apice bipunctatis, calycin. foliolis apice reflexis, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. Jacq. p. 75. t. 39. Icon. rar. 3. t. 473. Burm. afr. t. 27. f. 1.

67. *tenuifolia*, caul. erecto folioso, pedunc. unifloro fol. triplo longiore, fol. ternatis breve petiolatis linearibus emarginatis, styl. staminib. exterioribus brevioribus. W. p. 794. Jacq. p. 74. t. 38. Cor. alba, margine rubra.

68. *macrostylis*, caul. erecto folioso ramoso, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis sessilibus: foliol. linearibus emarginatis, cor. hypocrateriformibus, styl. staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. p. 43. t. 9. Cor. purpurea fundo flavo; unguis cohaerent, elongatae.

69. *hirta*, caule erecto folioso ramoso, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis subsessilibus, foliol. lineari-cuneiformibus retusis, cor. campanulatis, styl. staminib. interioribus longioribus. W. Jacq. p. 47. t. 13. et t. 77. f. 3. O. *sessifolia*. L.

β. *hirtella*, cor. campanulatis, stylis longissimis, filam. denticulatis inaequalibus. Jacq. 27. p. 48. t. 14.

70. *tubiflora*, caul. erecto subramoso folioso hirta, fol. ternatis subsessilib. lineari-cuneiformibus, pedunc. unifloro foliis multoties longiore, cor. hypocrateriformibus, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 44. t. 10.

β. *canescens*, cor. caryophyllacis, styl. brevissimis, filam. aequalib. Jacq. p. 45. t. 12.

71. *secunda*, caul. folioso ramoso declinato, ramis secundis, pedunc. unifloro foliorum longitudine, fol. ternatis subsessilib. lineari-cuneiformibus, cor. hypocrateriformibus, stylis staminib. interioribus brevioribus. W. p. 796. Jacq. p. 46. t. 12. Cor. lilacina. Filam. glabra.

72. *multiflora*, caule ramoso folioso erecto, pedunc. unifloris fol. multoties longioribus, fol. ternatis subsessilib. cor. campanulatis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 49. t. 15. Icon. rar. 3. t. 472.

73. *rubella*, caul. ramoso folioso erecto, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis subsessilib. lineari-cuneiformibus, cor. campanulatis obtusis, stylis staminib. interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 50. t. 16. Icon. rar. 3. t. 471. Burm. afr. t. 28. f. 2.

74. *rosacea*, caul. folioso simplici decumbente, pedunc. unifloro fol. multoties longiore, fol. ternatis subsessilib. oblongo-cuneiformibus, cor. campanulatis acutiusculis, stylis staminib. interiorib. breviorib. W. Jacq. p. 51. t. 17. Simillima precedenti. Cor. rosea.

75. *repens*, caul. folioso ramoso decumbente radicante, pedunc. subbifloro petiol. longitudine, fol. ternatis obcordatis, stylis staminibus interioribus breviorib. W. Jacq. p. 32. t. 78. f. 1. Thunb. Diss. p. 16. t. 1. f. 5. Hab. locis aquosis Cap. b. spei, Madagascariae et Zeylonae.

76. *reptatrix*, caul. folioso erecto simplici, pedunc. unifloro foliis longiore, fol. ternatis subrotundis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 54. t. 20. Cor. albidula, subincarnata.

77. *disticha*, caul. basi ramoso adscendente folioso, pedunc. unifloris foliorum longitudine, fol. ternatis obcordatis glabris, stylis staminib. interiorib. brevioribus. W. p. 798. O. cor. campanulatis, styl. intermedium, petiol. alate stipulatis. Jacq. p. 52. t. 18. Cor. pallide flava.

78. *incarnata*, caul. erecto ram. glabro folioso, pedunc. unifloris longitudine petiolorum, fol. ternatis obcordatis glabris, stylis staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 111. t. 71. Comm. hort. 1. t. 22.

+++ *Caulscentes, pedunculis multifloris.*

79. *conorhiza*, caul. erecto folioso, pe-

dunc. foliis longiore bifloro, fol. ternatis obcordatis. W. p. 799. Jacq. p. 26. Feuill. peruv. 2. t. 24. Hab. in Paraguay in planitie ad septentrion. fluminis de la Plata. ☉

80. *crenata*, caul. folioso erecto, pedunc. umbellifero foliis longiore, fol. ternatis obovatis, cor. crenatis. W. Jacq. p. 27. Feuill. l. c. 3. p. 49. t. 24. Hab. in Peru. ☉

81. *lateriflora*, caul. basi nudo subramoso adscendente, pedunc. umbellatis lateralibus, fol. ternatis: foliol. cuneiformib. emarginato-bilobis, cor. obtusis, stylis staminib. exterioribus brevioribus. W. Jacq. Schoenb. 2. p. 41. t. 204. Pedunc. longissimi. Filam. hispida.

82. *Dillenii*, caul. erecto folioso luto, pedunc. umbellifero, fol. longiore, foliis ternatis obcordatis, corollis emarginatis. W. Jacq. Oxal. p. 25. Dill. elth. 2. p. 298. t. 221. Hab. in Carolina, Guadeloupe. ☉

83. *stricta*, caul. erecto ramoso, pedunc. umbellifero, petiol. semiteretibus exstipulatis, fol. ternatis obcordatis, cor. integris, stylis longitudine staminum interiorum. W. Jacq. p. 29. t. 4. Flor. dan. t. 873. Hab. in Virginia, Jamaica, et in cultis Europae.

84. *corniculata*, caule ramoso decumbente radicante, pedunc. subumbellato, petiol. stipulatis, fol. ternatis obcordatis, petal. emarginatis crosis. Hoffm. germ. p. 210. Jacq. p. 30. t. 5. O. pusilla. Salisb. Hab. in cultis, etiam in Japonia. ☉

85. *tuberosa*, caul. ramoso, pedunc. umbelliferis fol. ternatis: foliol. ovatis, rad. tuberosa. Molin. chil. p. 109. Enc. bot. 4. p. 684. Hab. in R. Chilensi. O. corniculatae similis. Rad. Sol. tuberosi. M. +

86. *pentantha*, caul. erecto ramoso pedunc. umbellifero fol. brevior, fol. ternatis pilosis, foliol. lateralib. subrotundis emarginatis: intermedio petiolato obovato obtuso, stylis staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 21. t. 1. Hab. ad Caracas in Amer. Pedunc. quinqueflori.

87. *rhombifolia*, caul. erecto ramoso folioso, pedunc. umbellifero trifloro, fol. ternatis pubescentib. rhombico-ovatis: foliol. sessilib. styl. staminib. interiorib. longioribus. W. p. 802. Jacq. p. 22. t. 2. Hab. cum priore. Filam. interiora hispida.

88. *rosea (chilensis)*, caule erecto, foliol. obverse cordatis, pedunc. divisis racemosis. Jacq. p. 25. Feuill. peruv. 2. p. 733.

t. 23. *O. racemosa*. Savigny in Enc. bot. 4. p. 684. Hab. in Chili locis humidis.

89. *Plumieri*, caul. erecto fruticoso folioso, pedunc. umbellifero quadrifloro folior. longitudine, fol. ternatis ovatis: foliolo intermedio longe petiolato. Willd. *O. frutescens*. L. Thunb. Diss. n°. 22. Enc. bot. 4. p. 684. Plum. spec. 2. ic. 213. f. 1. Hab. in Amer. meridionali. Flor. lutei, penduli.

90. *Barrelieri*, caule erecto fruticoso ramoso folioso, pedunc. longitudine folior. bifido ramoso, fol. ternatis ovato-lanceolatis: foliol. intermedio petiolato, styl. longitudine staminum interiorum. W. Jacq. p. 24. t. 3. Enc. bot. 4. p. 684. Barr. rar. 64. t. 1139. Bocc. mus. 2. p. 63. t. 51. Hab. in Gujana, Brasilia et ad Caracas. Priorem refert. Flor. parvi. Cor. albo-incarnata, petal. 3 superiorib. basi flavo-maculatis. W.

\*\*\* *Foliis digitatis, quinatis, 5. multifidis.*

91. *Burmanni*, acaulis, scapo umbellifero, fol. digitatis. W. p. 803. Jacq. p. 41. *O. bulbosa pentaphylla*, et hexaphylla flor. magnis luteis copiosis. Burm. afr. 74. t. 29. Hab. ad Cap. b. spci, cum 6 sequentibus.

92. *tomentosa*, acaulis, scapo unifloro petiolor. longitudine, fol. digitatis: foliol. lanceolato-cuneiformibus emarginatis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 119. t. 81. Pluk. amalb. t. 350. f. 3. Fol. tomentosa, foliola tomentosa, 12-20.

93. *lupinifolia*, acaulis, fol. digitatis lanceolatis acutiusculis, petiol. compressis, scapo longitudine petiolor. unifloro, stylis staminib. exteriorib. brevioribus. W. Jacq. p. 115. t. 72. Filam. glandulosa.

94. *pectinata*, acaulis, scapo unifloro longitudine petiolor., fol. digitatis linearilanceolatis obtusis, calyc. foliolis aequalib. adpressis, styl. staminib. interiorib. longioribus. W. Jacq. p. 118. t. 75.

95. *Abellifolia*, acaulis, scapo unifloro petiolis longiore, fol. digitatis linearibus emarginatis, calyc. foliolis apice reflexis: unico majore spatulato, stylis staminibus interiorib. brevioribus. W. Jacq. p. 117. t. 74. Cor. flava.

96. *flava*, acaulis, scapo unifloro folior. longitudine, fol. digitatis linearibus canaliculatis acutis, styl. staminibus exterioribus brevioribus. W. Jacq. p. 116. t. 73. Burm. afr. 68. t. 27. f. 4. Hab. inter montem Leonis et Disboli. T.

97. *cuneaphylla*, scapis unifloris, petiol. cuneaphyllis: foliol. cuneatis bifidis. Cav. ic. 5. p. 7. t. 411. Hab. in ins. Maclov. et Falklandi. Cor. rosea, lineis lutescentibus Rad. s. stirps repens squam. roseis imbricata.

98. *laciniata*, scapis unifloris, fol. subduodecim partitis: lacin. linearibus. Cav. l. c. t. 412. Hab. in Amer. meridion. Cor. violacea. Rad. s. stirps repens squam. albicantibus tecta.

99. *mallobolba*, acaulis, scapis unifloris: medio bract. 2-subulatis, foliol. 5-ovatis, bulbis lanatis. Cav. ic. 4. p. 64. t. 393. f. 2. Hab. in Amer. merid. Bulb. piperis magnitudine lana rufa densissima textili obducta. Fol. minuta.

100. *Commerstoni*. *O. sexenata*, caul. pluribus foliosis: fol. 6 tomentosis, foliol. obovatis integrissimis. Savigny. Enc. bot. 4. p. 687. Hab. in Montevideo. Commer. Tomentoso-incana.

101. *quinata*, caulescens, fol. digitatis quinatis birtis: fol. subemarginatis cuneiformibus. Enc. bot. 4. p. 688. Hab. ad Cap. b. sp. Caul. apice foliosus. Cor. campanul. limbo rubello, tubo flavo. †

\*\*\*\* *Fol. pinnatis.*

102. *sensitiva*, scapo umbellifero, fol. pinnatis. L. Jacq. p. 42. t. 78. f. 4. Rumph. 5. t. 104. f. 2. Rheed. 9. t. 19. Hab. in India orientali. Fol. valde irritabilia. Affinitatem habet cum Mimosis.

CARYOPHYLLÆ *Decandrae pentagynae.*  
(Gen. 1145-48.)

1145. AGROSTEMMA. *Cal.* 1-phyllus, coriaceus. *Petala* 5, unguiculata: limbo obtuso, indiviso. *Caps.* 1-locularis.

\* *Githago*. *Cal.* apice 5-phyllus. *Cor.* nuda.

1. *Githago*, hirsuta, calycib. cor. subaequantibus, petal. integris nudis. L. Flor. dan. t. 576. *Githago* segetum. Desf. atl. 1. p. 363. Hab. inter segetes. ☉

\* *nicaeensis*, calycib. cor. multo longioribus, petal. albis. Willd. Alio. Hab. in agro Nicaeensi.

\*\* *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* fauce coronata. *Petala* emarginata.

2. *Coronaria*, tomentosa, fol. ovato-lanceolatis, pedunc. elongatis 1-floris, pe-

k k 4

talīs emarginatis coronatis serratis. L. Curt. mag. t. 24. Enc. bot. 3. p. 643. sub Lychn. Hab. in Italia, Helvetiis. Canescens. ♂

3. *Flos jovis*, tomentosa, flor. umbellato-capitatis, petal. emarginatis. L. Bocc. mus. t. 42. Hab. in Helvetia, Palatinatu, et Gall. australi. Pedunc. breves, subramosi.

4. *Coeli rosa*, glabra, fol. lineari-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis. L. Moris. f. 5. t. 22. f. 32. Bocc. sicul. t. 14. f. 2. Hab. in Sicilia, Barbaria et Oriente. ☉

1146. **LYCHNIS.** *Cal.* 1-phyllus, oblongus, lævis. *Petala* 5, unguiculata: limbo subbifido. *Caps.* 1-5-locularis.

1. *chalconica*, flor. fasciculatis fastigiatis. L. Hab. in Russia. In hortis colitur. Var. quoad col. florum.

2. *Flos cuculi*, petal. laciniatis, caps. 1-loculari subrotunda. L. Flor. dan. t. 590. Lam. ill. t. 391. Hab. in pratis et humidis. Var. flor. pleno et albo. ♀

3. *coronata*, glabra, flor. axillarib. terminalibusque solitariis, petal. laciniatis. Thunb. jap. 187. L. grandiflora. Jacq. ic. rar. 1. t. 84. Coll. 1. p. 149. Hab. in China, Japonis. Flor. coccinei, pulchri.

4. *Viscaria*, caul. geniculis viscoso, petalis integris, caps. 5-loculari. Flor. dan. t. 1032. Hab. in pratis siccis, ad rupes. An genus distinctum?

5. *alpina*, glabra, flor. densis umbellato-capitatis, petal. bifidis. Lam. enc. 3. p. 640. Flor. dan. t. 65. Hall. helv. 1. 376. t. 7. Hab. in alpib. Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Pyrenæicis. Pet. incoronata. Flor. rubelli. Styli quatuor.

6. *dioica (alba)*, caps. conicis 1-locularibus. Flor. dan. t. 792. ♂. *rubra*, hirsuta, flor. dioicis, caps. subrotundis. Hab. in pratis, sylvaticis; ad sepes.

*Obs.* Flos solitariis inter dichotomiam in individuis foemineis tantum observatur. Flor. in V. alba nocte suaveolent. Spec. distinctæ?

7. *laeta*, petal. bifidis, flor. solitariis, fol. lineari-lanceolis glabris, calycibus decemcarinatis. An. Kew. 2. p. 118. Hab. in Lusitania. ☉

8. *sibirica*, pet. bifidis, caul. dichotomo, fol. subhirsutis. L. Hab. in Sibiria. Statura *Silenes rupestris*. ♀

9. *magellanica*, subvillosa, fol. linearibus gramineis, petal. apice bifidis calyce campanulato vix longiorib. Lam. 1. c. enc. 3. p. 641. Hab. in freto Magellanico. Cucub. refert.

10. *apetala*, cal. inflato, cor. calyce brevior, caul. subunifloro. L. Cucub. caule simplicissimo unifloro, cor. inclusa. Fl. lapp. 181. t. 12. f. 1. Hab. in alpib. Lapponicis, Sibiricis. ♀

*Obs.* Hoc genus omnium minus naturale ex pluribus compositum, quæ tantum styliorum numero conveniunt.

1147. **CERASTIUM.** *Cal.* 5-phyllus. *Petala* bifida, aut emarginata, passim integra. *Caps.* 1-locularis, apice dentatim decussens. (Stam. etiam 4-5.)

\* *Capsulis oblongis.*

1. *perfoliatum*, glaberrimum, ol. con-natis. Willd. Sp. II. p. 811. Gmel. sib. 4. t. 62. f. 1. Dill. elib. 295. t. 217. f. 284. Hab. in Graecia, Sibiria, et in Barbariae arenosis.

2. *sylvaticum*, diffusum repens, fol. inferiorib. ovatis, reliquis ovato-lanceolatis, cor. bifida cal. duplo longiore. Plant. rar. Hongar. p. 100. t. 97. Hab. in vallibus humidis et sylvaticis. Aest. Caps. cal. longior.

3. *vulgatum*, hirsutum subdiffusum, fol. sublanecolatis: infimis linearib. flor. subfasciculatis, cor. cal. subaequante. C. vulgatum. Curt. Lond. 2. t. 34. Vaill. Par. t. 34. f. 1. C. viscosum. Smith. brit. 2. p. 497. Hab. in pratis, ruderalis et sylvis. Non est viscosum. Caul. plerumque fusco-purpurascens. ♀

4. *diffusum*, caul. ramosissimo villosopaco diffuso, fol. ovato-lanceolatis tomentosis, flor. paniculato-dichotomis. Hab. in Scotia? Thiebaut. Cor. integra? cum caps. cal. aequans. †

5. *brachypetalum*, caul. erecto tomentoso dichotomo, fol. ovatis infimis rosaceis, flor. paniculatis, cal. villosa cor. longiore. Hab. in agris prope Cenomanum (Mans) et alibi. Desportes. Caul. basi subpurpurascens, nec viscosus.

6. *spatulatum*, can. simplice subviloso, fol. hirsutis: inferiorib. obovato-spatulatis petiolatis, caul. sessilib. subovatis,



flor. glomeratis. Hab. ad St.-Domingo. Subparvum. Caps. cal. duplo fere longior.

7. *ovale*, subviscoso-hirsutum, caul. basi ramosissimo. fol. caulinis ovalib. majoribus, flor. glomeratis. *C. vulgatum*. Smith. brit. l. c. et Lin. ? *C. glomeratum*. Thuill. Fl. paris. p. 225. Vaill. t. 30. f. 3. *C. viscosum*. Curt. Hab. in pratis, graminosis.  $\beta$  ? flor. subpaniculatis.  $\odot$

8. *viscosum*, hirsuto-viscosum, caule ramoso (divaricato), flor. paniculatis demum reflexis, petal. apice bifidis cal. subaequantib. *C. viscosum*. Curt. et plur. auctorum. Hab. in apricis, pratis. Arentulis aut terra ob viscositatem inquinatum. Cal. marginē et bractea apice membrana alba cincta.

\* *Alsinoides*, caul. diffuso subviscoso, fol. ovatis: summis subrotundis, pedunc. elongatis unifloris, petal. emarginatis, cal. aequantibus. Hab. circa Bordeaux. Loiseleur. (Herb. Clarion.) Alsinem refert, sed caps. omnino differt, quae cal. paullo major. An var. prioris ?

9. *semidecandrum*, parvulum cespitosum, caul. subviscoso, fol. erectis ovato-oblongis, flor. subglomeratis pentandris, cor. emarginata cal. aequante. Vaill. paris. t. 30. f. 2. Raj. syn. t. 15. f. 1. Hab. in apricis, graminosis. Vere. Caul. biuncialis pallescens. Cal. apice purpurascens, margine albidomitens. Parum viscosum. Flos solitarius elongatus.

10. *anomalum*, erectum piloso-viscosum, fol. linearibus, petal. cal. longioribus, flor. trigynis. Willd. p. 812. Hab. in Hungaria, in pratis siccis. Petala bifida. Caps. sexdentata.

11. *pentandrum*, flor. pentandris, pet. integris acutis, cal. brevioribus. L. Hab. in Hispania. Planta minima, similis *C. semidecandro*. L.  $\dagger$

12. *arvense*, fol. lineari-lanceolatis pubescentibus, cor. calyce duplo majoribus. L. Flor. dan. t. 626. Vaill. paris. 131. t. 30. f. 4. Hab. in versuris agrorum, ad sepes. Cor. magna. Fol. basi ciliata.

13. *lineare*, fol. lineari-lanceolatis acutis pubescentibus, pedunc. subunifloris tomentosus, petal. cal. majoribus acutis bifidis. Willd. p. 814. Allion. pedem. 2. app. p. 365. t. 88. f. 4. Hab. in rupibus subhumidis alpinum. Pedunc. apice lanati.

14. *dichotomum*, fol. lanceolatis, caule

dichotomo, caps. erectis cal. duplo longioribus. Willd. Desf. atl. 1. p. 306. Alsine corniculata. Clus. hist. 2. p. 184. Hab. inter segetes Hispaniae et Algeriae. Caps. longissima.

15. *longifolium*, fol. lineari-lanceolatis, caule dichotomo, pedunc. fructiferis horizontalibus, caps. longitudine calycis. Willd. Hab. in Armenia. Caul. piloso-viscosus. Cal. hirtus. Caps. calycis longitudine. W.

16. *alpinum*, fol. ovato-lanceolatis, panic. dichotoma pauciflora, caps. oblongis recurvis. Smith. brit. 2. p. 500. Flor. dan. t. 6. Engl. bot. t. 472. C. latifol. Ligthf. t. 10. Raj. syn. 3. p. 349. t. 15. f. 2.  $\beta$ . glabrum. Flor. den. t. 979. Hab. in alpihus.  $\beta$ . in humidis ?

17. *latifolium*, fol. ellipticis scabris, pedunc. terminalib. simplicibus subulatis, caps. ovata (turgida). Smith. brit. 2. p. 501. Engl. bot. t. 473. Jacq. Coll. 1. p. 256. t. 20. Hab. in alpih. et montib. elvis. Caespitosa. Fol. subovata, pilis brevib. rigidis, articulatis scabra. S.

18. *lanatum*, fol. ovato-subrotundis dense incano-lanatis, caps. rectis angulatis, caulic. brevissimis subbifloris. Lam. enc. 1. p. 680. Lapeyr. Flor. d. Pyrén. p. 18. Hall. helv. n<sup>o</sup>. 887. Hab. in alpihus. Pusillum, albidicans. Fol. subrotunda, minuta, duriuscula. Lap.

19. *suffruticosum*, caul. cespitosis nodosis perennantibus, fol. lineari-subulatis rigidis, cal. striato glabro, caps. oblongis subcurvis. Lam. enc. 1. pp. 681. Hab. in Galloprovincia, in monte Ste.-Victoire.  $\beta$ . *camphorataefolia*. Tournef. Cor. 18. Circa Smyrnam. Facie Ar. juniperinae. Fol. subfasciculata. Lam. An h. l. *C. laricifolium*. Vill. Delph. 3. p. 644 ?

\*\* *Capsulis subrotundis.*

20. *repens*, fol. lanceolatis, peduncul. ramosis, caps. subrotundis. L. C. caule perenni procumbente, fol. lanceolatis tomentosus. Roy. lugdb. 450 ? Lam. ill. t. 392. f. 2. Col. phytob. 115. t. 31. Hab. in Gallia, Italia, Carniola. Fol. glabra.  $\dagger$

21. *strictum*, fol. linearib. acuminatis glabris, pedunc. bifloris, calycibusque tomentosus, caps. globosis. L. Jacq. Coll. 2. p. 65. Scop. carn. t. 19. f. 1. Hab. in alpih. Pedunc. unif.-biflorus, in medio bracteis duabus lanceolatis.

*Obs.* In *C. stricto* Allioni, caul. simpli

citer dichotomus, 2-3-florus, caps. cylindrica, pedunc. apice pilis brunneis tomentosi: an diversum?

22. *maximum*, fol. lanceolatis scabris, petal. crenatis, capsul. globosis. Gmel. sib. 4. p. 150. n.º. 51. t. 62. f. 2. Hab. in Sibiria.

23. *dioicum*, hirtum viscidum, fol. lanceolatis, flor. dioicis, petal. calyce triplo longioribus. Ait. Kew. 2. p. 120. Hab. in Hispania.  $\overline{\text{L}}$

24. *tomentosum*, fol. oblongis tomentosis, pedunc. ramosis, caps. globosis. L. Willd. p. 817. Hab. in Granada. Lin.  $\dagger$

*Obs.* Secundum cl. Lamark Enc. 1. p. 680. caps. cylindrica est, an forte diversa species? quae etiam in Italia et in alpinis provenit. Sed. caps. *immatura* in puribus globosae.

25. *manticum*, glabrum, caule elongato stricto, fol. lanceolatis, pedunc. longissimis, caps. globosis. L. Plant. long. p. 60. t. 66. Hab. in Hungaria, Veronae, et in Helvetia. Facie differt Stellariae.

1148. SPERGULA. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, integra. *Caps.* ovata, 1-locularis, 5-valvis. (Stam. etiam 5.)

\* *Fol. verticillatis, caule stipulaceo.*

1. *arvensis*, diffusa, fol. verticillatis, flor. decandris. L. Lam. ill. t. 392. f. 1. Flor. dan. t. 1033. Hab. in Europae agris. Var. *stam. numero*. Sem. reniformia, nec alata.

2. *pentandra*, fol. verticillatis, flor. subpentandris, seminib. margine albo-membraceis. Lam. ill. l. c. f. 2. Hab. in sylvaticis. Vere. Var. *stam. 5, 7 et 10.*

3. *geniculata*, glabra, caul. elongato, ramis folisque ad nodos verticillatis. Singularis haec species prope Montpellier observata est a cl. Thiebaud. Caul. ultra pedalis, geniculatus, ad nodos quasi viviparus. Pedunc. dichotomi, multiflori: flor. parvulis. An forte prioris var. *luxurians*?  $\text{h}$ ?

4. *grandis*, fol. verticillatis internodiis longioribus, pedunc. dichotomis, flor. secundis. Hab. in Monte-Video (Herb. Juss.). Caul. pedalis, crassus.

5. *villosa*, caul. folisque villosopubescentibus. Hab. cum priore.

\*\* *Foliis oppositis. Caul. exstipulaceus.* (Saginae?)

6. *nodosa* (palustris), fol. oppositis subulatis laevibus: infimis late vaginantibus. caulib. simplicibus. Flor. dan. t. 66. Hab. in paludosis et in campis humenibus.

*ps. brevifolia*, caul. simplicissimo: nodis plus approximatis, fol. caulinis brevissimis. In campis subaridis. Flor. majusculi. *Y. maritima*, fol. carnosulis incurvo-petulis. Ad maris littora.

7. *laricina*, decumb., fol. oppositis subulatis ciliatis fasciculatis. L. Smith. ic. ined. t. p. 18. t. 18. Lam. ill. t. 392. f. 3. Gmel. sib. 4. p. 155. n.º. 61. Hab. in Sibiria. Flor. magni.

8. *saginoides*, fol. oppositis linearibus laevibus, pedunc. solitarii longiss., flor. pentandris, caul. repente. Sw. in Act. nov. holm. 1789. p. 83. t. 1. f. 2. Willd. p. 820. S. *laricina*. Wulf. ? S. subulata. Smith. brit. 2. p. 504? Hab. in alpidibus. Fol. ad genicula fasciculata. (Var. *Saginae procumb.*?)

9. *subulata*, fol. oppositis subsecundis lineari-subulatis carinatis ciliatis, flor. decandris. Swartz. l. c. 1789. p. 39. t. 1. f. 3. Sperg. *saginoides*. Curt. lond. Hab. in pascuis subalpinis.

*ps. glabra*, fol. oppositis fasciculatis filiformib. glabris, flor. decandris, petal. cal. majoribus. Willd. p. 821. Sperg. *saginoides*. Allion. pedem. n.º. 1735. t. 64. f. 1. Hab. in in pascuis umbrosis alpium Valdensium.  $\overline{\text{L}}$

## DECAGYNIA.

1149. NEURADA. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Caps.* infera, orbicularis, 10-locularis, 10-sperma, aculeata. Sem. solitaria.

1. *procumbens*. L. Lam. ill. t. 393. Hab. in Aegypto, Arabia et Barbaria. Alician. Fol. alternata, sinuata, tomentosa. Flor. axillares.  $\odot$

*Obs.* Semen germinans capsul. perforat, annuæ ad instar in collo radicis, etiam in planta adulta, persistit.

1150. PHYTOLACCA. *Cal.* 6. *Petala* 5, calycina. *Bacca* supers., 10-locularis, 10-sperma. (Flor. 5-7-8-10-gyni et 7-8-20-andri.)

1. *octandra*, flor. octandris octogynis. L. Willd. elth. 218. t. 239. 308. Lam. ill. t. 393.

f. 2. Kaempf. amoen. t. 89. Hab. in Mexico. Cor. alba, plana.  $\overline{\text{T}}$

2. *stricta*, flor. octandris heptagynis, fol. lanceolatis mucronatis. Hoffm. Comment. goett. 12. p. 27. t. 3. P. heptandra, flor. heptandris hexagynis, fol. lanceolatis. Retz. obs. 6. p. 29. Hab. in America.  $\overline{\text{T}}$

3. *abyssinica*, flor. decandris pentagyn. Hoffm. l. c. p. 28. t. 2. P. dodecandra. P'Herit. stirp. 1. 141. t. 69. Hab. in Abyssinia.  $\overline{\text{h}}$

4. *decandra*, flor. decandris decagynis.

L. Lam. ill. t. 393. f. 1. Dill. elsh. 318. t. 339. f. 399. Hab. in Virginia, Barbaria, et in Helvetia.

5. *icosandra*, flor. icosandris decagynis. L. Mill. ic. 138. t. 207. Hab. in India orientali. Caul. tripedatis, herbaceus, subdivisus. Fol. strictiora. Flor. albi.  $\overline{\text{T}}$

6. *dioica*, frutescens, flor. dioicis. L. P'Herit. stirp. 1. p. 145. t. 70. Hab. in America australi. Fol. Populi nigrae, longius petiolata. Flor. dioici polyandri. L.

### M O N O G Y N I A.

Asclepiadeae quaedam et Gerania plura. Conocarpus racemosa. Mangifera axillaris. Rhexiae et Osbeckiae quaedam. Gnidia daphnaefolia. Cupheae plures species. Grislea tomentosa. Portulaca pilosa et oleracea. Gomphia jabotapita. Sideroxylon decandrum. Icica decandra. Erithalis fruticosa. Combretum purpureum, alternifolium, decandrum. Bocconia frutescens. Stellera chamaejasme. Laurus Borbonia. Viburnum? scandens. Chlora perfoliata, Var.  $\beta$ . Litsea chinensis.

### T R I G Y N I A.

Tamarix Germanica. Polygonum Bistorta. Brunichia cirrhosa. Cerastium anomalum.

### T E T R A G Y N I A.

Silene aegyptiaca et (Lychnis. L.) quadridentata. Lychnis alpina. Reseda undata.

### P E N T A G Y N I A.

Adoxa moscatellina. Gerania quaedam. Drosera lusitanica. Portulaca oleracea. Rhodiola rosea. Cotiaria myrsifolia. Phytolacca abyssinica. .

*Sequentes plantæ LINNÆANÆ, omissæ addantur.*

Pag. 6. *BLITUM chenopodioides*, capitellis verticillatis exsuccis. Liu. Mant. p. 170. Hab. in Tartaria. ☉

Pag. 124. *ASTRULUA calabrica* (*sætida*), fol. oppositis lineari-lanceolatis, caul. fruticoso. Lin. suppl. p. 120. Willd. Sp. I. p. 577. L'Her. Stirp. t. p. 65. t. 32. Scherardia foetida. Lam. ill. gen. p. 267. Cyrill. charact. t. 3. f. 7. Hab. in Calabria, Atlante et in Syriae montibus. Cor. rubella. Suffrutescens.

*Obs.* Hæc species, de cujus loco auctores ambigunt, non male proprium genus tum ab stigmata, tum ab fructum constituere posset secundum characteres sequentes:

**PUTORIA.** *Cal.* 4-dentatus, persistens, demum baccans. *Cor.* tubuloso-infundibuliformis: limbo 4-fido. *Stylus* bifidus acutus. *Bacca* subcompressa. *Semina* 2, oblonga.

Pag. 265. *ALLAMANDA*. Contorta.

*Caps.* lentiformis, echinata, 1-locularis, 2-valvis, polysperma.

1. *cathartica*. Lin. Willd. Sp. I. p. 1231. Sert. Hannov. Fasc. 4. p. 8. t. 24. Orelia grandiflora. Aubl. Guj. t. p. 271. t. 106. Hab. juxta fluvios in Guiana et Surinamo. Fol. 4-na, ovato-oblonga subrepanda. Cor. magna, flava. h

Pag. 414. *BURSERA*. *Cal.* 3-4-fida. *Petala* 4, ovata. *Caps* subcarnosa, 3-locularis, 3-valvis. *Semina* solitaria.

1. *gummifera*, fol. pinnatis ovatis acuminatis, flor. racemosis polygamis. B. gummifera. Lin. syst. veg. Swartz. obs. bot. p. 130. Hab. in Amer. occident. campis. Flor. hermaphroditii 6-andri; masculi stamina 5-8-10. Sw.

2. *balsamifera*, fol. ovatis oblongis acuminatis, flor. paniculatis, pedicellis breviusculis oppositis. Hedwigia balsamifera. Swartz. Flor., cfr. huj. libri p. 414. Flor. conformes cum priore.

## CORRIGENDA ET ADDENDA.

- Pag. 12. *Veronica latifolia*. Ait. n<sup>o</sup>. 47. eadem est ac *V. Teucrium*. Roth. N. Bot. Beytr. p. 69. seu *V. Pseudochamedrys*. Jacq. Econtrario *V. urticaefolia*. Ait. est vera *V. latifolia*. Lin. Syst. pl. ed Reich. p. 34.
15. in columna I. lin. 23. loc. *longo* leg. *longa*, in colum. 2. lin. 15. dele *Hab*
28. *Salvia foetida* Desf. eadem ac *tingitana*, n<sup>o</sup>. 86.
34. lin. 29. loc. *scirpae* l. *scirpae* s. *scirpoideae*.
39. post *Röhrria petioliflora* add., Willd. Sp. I. p. 186.
61. *Cyper. pygmaeus*. Cav. est *Scirp. michelianus*?
90. n<sup>o</sup>. 28. *Poa sudetica* var.  $\beta$ . non diversa a *P. trinervata*.
94. in col. 2da lin. ultima, leg. *divaricata*.
96. n<sup>o</sup>. 23. loc. *retusa* leg. *retusus*.
107. lin. 28. in col. 1. leg. *Collodea* (Cav.)
110. colum. 1. lin. 18. loc. *speculare* l. *peculiare*.
129. *Ad Vallantian cordatam* add. Lam. ill. gen. t. 843. f. 3. et ad *V. cucullatam*. Lam. l. c. f. 2.
139. *Plantago microcephala*. Poir. vix diversa a *Pl. villosa* Roth. n<sup>o</sup>. 13.
143. col. 1. lin. ultima loc. 28. leg. 30.
145. *Ludwigia Jussiaeoides* Mich. potius est *Jussiaeae* spec.; *J. brachysperma*. Lam. enc. 3. p. 331?
150. in col. 1. lin. 15. post *Stam.* add. 1 s. unicum.
153. *Sagina cerastoides* nunc *Cerast. tetrandrum*. Smith. brit. 2. p. 498.
161. ad *Symphytum* var.  $\gamma$  dele ( $\alpha$  et  $\beta$ ) post *Habit.* collocandum.
179. *C. Jalapa* (*Ipomaea*!) eadem ac *Ipomaea Macrorhiza* Mich.
180. n<sup>o</sup>. 90. ad *Conv. evolvuloides* Desf. add. *C. undulatus*. Cav. ic. 3. p. 39. t. 277. f. 2.
200. in col. 1. in lin. 12 et 35. post *stigma* pone *punctum* s. leg. *stigmat.*  
— in col. 2. lin. 21. leg. *Nyctanthi*.
208. *Coffea* leg. *cal. crescens*.
225. n<sup>o</sup>. 70. dele synonym. *Lamarckii*, quod ad n<sup>o</sup>. 62. pertinet.
232. *Lycium barbatum* n<sup>o</sup> 16. nunc *Serissa capensis*. Thunb. Prod. suppl.
234. Genera *Beckea* et *Imbricaria* (quae tamen pentandra est secundum Gaertnerum) ad classem octavam amandanda.
238. lin. *RAMNEIS* leg. *RAMNEI*.
244. loc. 1. lin. 23. leg. *saccata*, *fornicata*.
258. *Achyr. halimifolia*. Lam. non diversa ab *Illecebro frutescente* L'Her., quod idem ac *J. alsinefolium* Scop.?
267. col. 2. lin. 15. l. *capitatum* leg. *capitulum*.
281. col. 2. lin. 6. loc. *alato* leg. *alato*.
285. col. 2. var.  $\beta$ ? et  $\gamma$  sub n<sup>o</sup>. 30. ponendas.
290. col. 1. leg. *Linconia alopecuroidea*.

Pag.

310. *Atham. sibirica* n°. 2. crescit quoque in Hungaria, vid. Pl. rar. Hong.  
p. 60. t. 60.  
311. *Cactr. microcarpos*. n°. 5. eadem videtur ac *C. taurica*.  
320. *Anthriscus* n°. 2 et 3. leg. *nodosus* et *trichospermus*.  
327. *Cassine laevigata* Lam. est *Celastrus lucidus* L'Herit.  
330. *Alsine viscosa* forte numero staminum ab *Arenaria viscosa* tantum  
diversa.  
366. *Scilla præcox* n°. 13. est var. *S. bifolia*.  
368. *Phalangium Adenanthera* Forst. non differre dicitur a *Dianella nemorosa*.  
417. col. 2. l. *Apolifolium* l. *Opatifolium*.  
442. in col. 2. lin. 3. ab inferiore dele \*\* *Caps. ovatis* et pone ante *Paulliniam curassavicum*.  
453. in col. prima. lin. 3. loco nervillo leg. vexillo.  
467. in col. 1. lin. 15. leg. 5-partitus, loc. 6-partitus.  
503. n°. 21. *Arenaria dianthoides*, post scabris add. flor. capitatis. — Spec. 23.  
delenda.

*Obs.* Vitia typographica, ob litteras minutas correctu difficillima, præcipua hic sunt adnotata, ea quæ minoris momenti sunt, quisque facile corriget.

## I N D E X

*Generum, subgenerum, nominum Familiæ plantarum et  
synonymorum generum præcipuorum.*

A.	Pag.		Pag.
Abronia. . . . .	<u>126</u>	Aidia. . . . .	<u>214</u>
Acæna. . . . .	<u>141</u>	Aira. . . . .	<u>76</u>
Acer. . . . .	<u>417</u>	<i>Ajovea</i> vid. <i>Laurus</i> .	
Achras. . . . .	<u>235</u>	Albuca. . . . .	361
Achyranthes. . . . .	<u>258</u>	Alchemilla. . . . .	<u>149</u>
Acisanthera. . . . .	<u>477</u>	Aldea. . . . .	<u>168</u>
Acorus. . . . .	<u>382</u>	Aldrovanda. . . . .	<u>336</u>
<i>Acronychia</i> vid. <i>Lau-</i>		Aletris. . . . .	<u>377</u>
sonia.		Alisma. . . . .	<u>400</u>
Actinophyllum. . . . .	404	Allamanda. vid. add.	<u>524</u>
Adenanthra. . . . .	<u>461</u>	Allionia. . . . .	<u>122</u>
Adenostemum. . . . .	<u>467</u>	Allium. . . . .	<u>355</u>
Adoxa. . . . .	<u>446</u>	<i>Allophylus</i> vid. <i>Orni-</i>	
Aechmea. . . . .	<u>345</u>	tropie.	
Aegiceras. . . . .	<u>249</u>	Aloe . . . . .	378
Aegilops. . . . .	<u>107</u>	Alopecurus. . . . .	<u>79</u>
Aegiphila. . . . .	132	Alpinia. . . . .	<u>3</u>
Aegopodium. . . . .	324	Alsine. . . . .	330
Aesculus. . . . .	403	Alstroemeria. . . . .	380
Aethusa. . . . .	318	<i>Alternanthera</i> v. <i>Achy-</i>	
Azelia. . . . .	<u>455</u>	ranth. . . . .	
Agave. . . . .	379	Amaryllis. . . . .	<u>352</u>
<i>Aglæa</i> . . . . .	<u>46</u>	Amethystea. . . . .	24
Agrostemma. . . . .	519	Ammannia . . . . .	<u>146</u>
Agrostis. . . . .	<u>74</u>	Ammi. . . . .	307

	Pag.		Pag.
Amomum. . . . .	<u>2</u>	Aralia. . . . .	<u>331</u>
Amyris. . . . .	<u>414</u>	Arbutus. . . . .	
Amzonia. . . . .	<u>269</u>	Arctopus. . . . .	301
Anabasis. . . . .	<u>297</u>	Ardisia. . . . .	<u>232</u>
Anacardium. . . . .	<u>450</u>	<i>Arduina</i> vid. Carissa	
Anagallis. . . . .	<u>173</u>	Arenaria. . . . .	502
Anagyris. . . . .	<u>454</u>	Aretia. . . . .	<u>168</u>
Anassera. . . . .	<u>265</u>	<i>Argolasia</i> vid. Lanaria.	
<i>Anavinga</i> vid. Casearia.		Argophyllum. . . . .	<u>175</u>
Anchusa. . . . .	<u>150</u>	Ariona. . . . .	212
Ancistrum. . . . .	<u>30</u>	Aristea. . . . .	<u>41</u>
Andromeda. . . . .	<u>480</u>	Aristida. . . . .	<u>98</u>
Andropogon. . . . .	103	Artedia. . . . .	308
Androsace. . . . .	<u>169</u>	Aruna. . . . .	<u>30</u>
Anethum. . . . .	<u>323</u>	Arundo. . . . .	<u>102</u>
Angelica. . . . .	<u>315</u>	<i>Arundinaria</i> vid. Miegia.	
<i>Anguillaria</i> vid. Ardisia.		Asclepias. . . . .	<u>275</u>
Anredera. . . . .	297	Asparagus. . . . .	<u>370</u>
Anthericum. . . . .	369	<i>Asperifoliae</i> . . . . .	<u>155</u>
Anthistiria. . . . .	<u>106</u>	Asperugo. . . . .	<u>162</u>
Antholyza. . . . .	<u>42</u>	Asperula. . . . .	124
Anthoxanthum. . . . .	<u>30</u>	Asphodelus. . . . .	367
Anthriscus. . . . .	320	Astrantia. . . . .	304
Antichorus. . . . .	<u>418</u>	Astranthus. . . . .	403
<i>Antirhea</i> vid. Melanea.		Athamanta. . . . .	310
Anychia. . . . .	<u>261</u>	Atraphaxis. . . . .	394
<i>Apalatoa</i> vid. Crudia		Atriplex. . . . .	292
Aphanes. . . . .	<u>150</u>	<i>Atriplicina</i> . . . . .	292
Aphyllantes. . . . .	<u>386</u>	Atropa. . . . .	<u>218</u>
Apium. . . . .	324	Avena. . . . .	<u>99</u>
Apluda. . . . .	105	Averrhoa. . . . .	<u>509</u>
<i>Apocynæ</i> . . . . .	<u>264</u>	Ayenia. . . . .	263
Apocynum. . . . .	<u>274</u>	Azalea. . . . .	212
Aponogeton. . . . .	<u>400</u>	Azima. . . . .	145
Aquartia. . . . .	<u>133</u>	Azorella. . . . .	<u>303</u>
Aquilaria. . . . .	<u>485</u>		
<i>Aquilicia</i> vid. Leea.		B.	
		Bacopa. . . . .	<u>173</u>
			Beckea.



	Pag.		Pag.
Bæa. . . . .	15	Brunia. . . . .	246
Beckea. . . . .	234	Brunichia. . . . .	442
Bæobotrys. . . . .	175	Bubon. . . . .	317
Bambos. . . . .	393	<i>Buena</i> vid. Gonzalea.	
Banisteria. . . . .	506	Buginvillæa. . . . .	418
Banksia . . . . .	113	Bucida. . . . .	
Barreria. . . . .	250	Buddleia. . . . .	135
Bartonia. . . . .	141	Buffonia. . . . .	150
Basella. . . . .	331	<i>Buglossum</i> . . . . .	159
<i>Bassia</i> vid. Salsola.		<i>Bulliarda</i> vid. Tillæa.	
Bassovia. . . . .	173	Bumalda. . . . .	290
Batschia . . . . .	158	Buttneria. . . . .	262
Bauhinia. . . . .	454	Bulbocodium. . . . .	355
Bellonia. . . . .	210	Bumelia. . . . .	237
Bergera. . . . .	466	Bunium. . . . .	308
<i>Belemcanda</i> . . . . .	48	Bupleurum. . . . .	304
Berberis . . . . .	387	Burmannia. . . . .	346
Bergia. . . . .	513	Bursaria. . . . .	248
Bertiera . . . . .	203	Bursera vid. addenda.	
Beta, . . . . .	295	Butomus. . . . .	451
<i>Billardiera</i> ... . . . .	249		
Blackburnia. . . . .	145		C.
Bladbia. . . . .	233	<i>Caballeria</i> vid. Manglilla.	
Blæria. . . . .	135	Cachrys. . . . .	311
Blitum. . . . .	6	Cacucia. . . . .	470
Boerhaavia. . . . .	36	Cadia. . . . .	461
Borago. . . . .	162	Cæsalpinia. . . . .	460
<i>Boragineæ</i> . . . . .	145	<i>Calamagrostis</i> vid.	
Bororia. . . . .	419	Agrostis. . . . .	
Boscia. . . . .	151	Calamus. . . . .	383
Bosea. . . . .	297	Calanchœe. . . . .	445
Bowlesia. . . . .	303	<i>Calboa</i> vid. Macrostema.	
Brahejum. . . . .	117	Calceolaria. . . . .	15
Briza. . . . .	92	Callicarpa. . . . .	133
Bromelia. . . . .	343	<i>Callicocca</i> vid. Cephælis.	
Bromus. . . . .	06	Callisia. . . . .	56
Brossæa. . . . .	175	Callitriche. . . . .	5

	Pag.		Pag.
Callixene. . . . .	373	Cedrela. . . . .	248
Callodendrum. . . . .	248	Cedrota. . . . .	415
Calymenia . . . . .	36	Celastrus. . . . .	241
<i>Calyxhymenia</i> vid. Calymenia.		Celosia. . . . .	256
Camax . . . . .	249	Celtis. . . . .	291
Cameraria. . . . .	268	Cenchrus. . . . .	71
<i>Campanulacææ</i> . . . . .	187	<i>Centaurella</i> vid. Centaur.	
Camphorosma. . . . .	149	Centaurium. . . . .	137
Canarina. . . . .	392	Centunculus. . . . .	141
Canephora. . . . .	202	Cephælis. . . . .	202
Canna. . . . .	1	Cephalanthus. . . . .	119
Canthium. . . . .	200	Cerdana. . . . .	168
Cansiera. . . . .	148	<i>Ceranthus</i> v. Chionanth.	
Cantua. . . . .	187	Cerastium. . . . .	520
<i>Caprifoliæ</i> . . . . .	213	<i>Ceratia</i> . . . . .	287
<i>Caprifolium</i> . . . . .	210	Ceratostema. . . . .	480
Capsicum. . . . .	220	Ceratocephalus. . . . .	341
Capura. . . . .	388	Ceratopetalum. . . . .	471
Cardiospermum. . . . .	444	Cerbera. . . . .	266
Carissa. . . . .	266	Cercis. . . . .	454
Carmona. . . . .	290	Cerithe. . . . .	161
Carapa. . . . .	416	Ceropegia. . . . .	277
<i>Caroxylon</i> vid. Salsola.		<i>Cerophyllum</i> . . . . .	320
Carphalea. . . . .	125	Cervantesia. . . . .	235
Carpodetus. . . . .	246	Cestrum. . . . .	230
Carum. . . . .	323	Chærophyllum. . . . .	320
<i>Caryophilleæ</i> . . . . .	491	<i>Chalca</i> vid. Murraya.	
Casearia. . . . .	484	Chamærops. . . . .	399
Cassia. . . . .	456	Chenopodium. . . . .	294
Cassine. . . . .	327	<i>Chenolea</i> vid. Salsola.	
Cassyta. . . . .	450	Cherleria. . . . .	505
Catesbæa. . . . .	130	Chimarrhis. . . . .	210
<i>Catha</i> vid. Celastrus.		Chiococca. . . . .	209
Caucalis. . . . .	306	Chionanthus. . . . .	9
Caulophyllum. . . . .	387	Chironia. . . . .	282
Ceanothus. . . . .	244	Chloa. . . . .	418
		Chloranthus. . . . .	148

	Pag.		Pag.
Chloris. . . . .	<u>87</u>	<i>Conchium</i> vid. <i>Hakea</i> .	
Chomelia. . . . .	131	<i>Condalia</i> . . . . .	<u>241</u>
Chrysitrix. . . . .	<u>71</u>	<i>Condalia</i> vid. <i>Coccocyps</i> .	
Chrysophyllum. . . . .	236	Conium. . . . .	308
Chrysosplenium. . . . .	<u>487</u>	Conocarpus. . . . .	211
Chrysurus. . . . .	<u>80</u>	Conospermum. . . . .	116
Chunchoa. . . . .	<u>486</u>	Convallaria. . . . .	372
Cicuta. . . . .	318	Convolvulus. . . . .	177
Cinna. . . . .	6	<i>Convolvulacei</i> . . . . .	176
Cinchona. . . . .	196	Copaifera. . . . .	462
<i>Cipura</i> vid. <i>Marica</i> .	<u>487</u>	Coprosma. . . . .	298
Circæa. . . . .	<u>10</u>	Cordia. . . . .	166
Cissus. . . . .	<u>142</u>	Cordyline. . . . .	372
Claytonia. . . . .	<u>253</u>	Coriandrum. . . . .	319
Cleome. . . . .	390	Coris. . . . .	171
Clethra. . . . .	<u>483</u>	Corispermum. . . . .	5
Cneorum. . . . .	39	Cornidia. . . . .	445
Cnestis. . . . .	510	Cornucopiæ. . . . .	71
Cobæa. . . . .	<u>185</u>	Cornus. . . . .	143
Coccoloba. . . . .	<u>442</u>	Correa. . . . .	419
Coccocypsilum. . . . .	132	Corrigiola. . . . .	330
Codia. . . . .	<u>438</u>	Cortesia. . . . .	249
Codon. . . . .	<u>465</u>	Cortusa. . . . .	170
Codonum. . . . .	136	Corynocarpus. . . . .	233
Coffea. . . . .	<u>208</u>	Corypha. . . . .	382
Colchicum. . . . .	398	Cosmibuena. . . . .	197
Coldeuia. . . . .	<u>153</u>	Cossinia. . . . .	388
Colladea. . . . .	<u>107</u>	Costus. . . . .	2
Colletia. . . . .	<u>244</u>	Cotyledon. . . . .	510
Collinsonia. . . . .	29	Contarea. . . . .	392
Columellia. . . . .	<u>13</u>	Coutoubea. . . . .	137
Combretum. . . . .	<u>411</u>	Crassula. . . . .	337
Cometes. . . . .	<u>147</u>	Cressa. . . . .	288
Commelina. . . . .	<u>55</u>	Crinum. . . . .	352
Commersonia. . . . .	<u>340</u>	Crithmum. . . . .	311
Comocladia. . . . .	39	Crocus. . . . .	41
Conanthera. . . . .	370	Crowea. . . . .	465

	Pag.		Pag.
Crudia. . . . .	<u>462</u>	Dentella. . . . .	205
Cruzita. . . . .	<u>150</u>	Detarium. . . . .	<u>462</u>
Cryptandra. . . . .	250	Deutzia. . . . .	505
Cryptospermum. . . . .	<u>122</u>	Dialium. . . . .	9
Cryptostomum. . . . .	232	Dianella. . . . .	312
<i>Cubæa</i> vid. <i>Tachia</i> .		<i>Dianthera</i> vid. <i>Insticia</i> .	
Cucubalus. . . . .	<u>495</u>	Dianthus. . . . .	493
Cucullaria. . . . .	<u>4</u>	Diapensia. . . . .	185
<i>Cupia</i> . . . . .	<u>200</u>	Dichondra. . . . .	288
<i>Cunninghamia</i> vid. <i>Me-</i>		Dichromena. . . . .	57
lanca.		Dictamnus. . . . .	<u>464</u>
Curculigo. . . . .	<u>362</u>	Diervilla. . . . .	214
Cuminum. . . . .	<u>318</u>	Digitaria. . . . .	84
Cunonia. . . . .	<u>486</u>	Dilatris. . . . .	54
Cupania. . . . .	<u>413</u>	<i>Dilepyrum</i> vid. <i>Muh-</i>	
Curcuma. . . . .	<u>4</u>	lenbergia.	
Cuscuta. . . . .	239	<i>Dimocarpus</i> vid. <i>Eu-</i>	
Cussonia. . . . .	<u>298</u>	phoria.	
Cyanella. . . . .	<u>366</u>	Diodia. . . . .	124
Cyclamen. . . . .	171	Dionæa. . . . .	469
Cynanchum. . . . .	272	Diosma. . . . .	246
Cynodon. . . . .	<u>85</u>	Diphylleia. . . . .	387
Cynoglossum. . . . .	<u>159</u>	Diplasia. . . . .	70
Cynometra. . . . .	<u>456</u>	Dipsacus. . . . .	119
Cynosurus. . . . .	<u>86</u>	Dirca. . . . .	435
Cyperus. . . . .	<u>60</u>	Disandra. . . . .	402
Cyrilla. . . . .	<u>175</u>	Disodea. . . . .	210
Cyrthanthus. . . . .	352	Dodecatheon. . . . .	170
		Dodonæa. . . . .	415
D.		Donatia. . . . .	111
Dactylis. . . . .	<u>88</u>	Doræna. . . . .	173
Dais. . . . .	<u>471</u>	Dracæna. . . . .	371
Danais. . . . .	<u>198</u>	Drapetes. . . . .	148
Daphne. . . . .	<u>434</u>	Drimia. . . . .	374
Datura. . . . .	<u>216</u>	Drosera. . . . .	336
Daucus. . . . .	306	Drypis. . . . .	331
Davisia. . . . .	<u>454</u>	Dulichium. . . . .	65

	Pag.		Pag.
<i>Duroia</i> vid. <i>Genipa</i> .		<i>Ernodea</i> ...	<u>131</u>
<i>Dubamelia</i> ...	<u>203</u>	<i>Erycibe</i> ...	<u>250</u>
E.		<i>Eryngium</i> ...	<u>299</u>
<i>Echinophora</i> ...	301	<i>Erythraea</i> ...	<u>283</u>
<i>Echites</i> ...	<u>270</u>	<i>Erythronium</i> ...	360
<i>Echium</i> ...	<u>163</u>	<i>Erythroxyton</i> ...	<u>508</u>
<i>Echiochilon</i> ...	<u>164</u>	<i>Escallonia</i> ...	<u>234</u>
<i>Ehretia</i> ...	<u>166</u>	<i>Eucomis</i> ...	359
<i>Ehrharta</i> ...	<u>393</u>	<i>Euparea</i> ...	<u>249</u>
<i>Ekbergia</i> vid. <i>Trichilia</i> .		<i>Euphoria</i> ...	<u>413</u>
<i>Elæagnus</i> ...	<u>148</u>	<i>Euridicea</i> ...	48
<i>Elæodendrum</i> ...	241	<i>Eustephia</i> ...	<u>352</u>
<i>Elatine</i> ...	<u>446</u>	<i>Evea</i> ...	<u>122</u>
<i>Elaphrium</i> vid. <i>Fagara</i> .		<i>Evodia</i> vid. <i>Fagara</i>	
<i>Eleusine</i> ...	87	<i>Evolvulus</i> ...	<u>288</u>
<i>Ellisia</i> ...	<u>168</u>	<i>Evonymus</i> ...	243
<i>Elymus</i> ...	<u>107</u>	<i>Exacum</i> ...	<u>136</u>
<i>Elytraria</i> ...	23	<i>Exoacantha</i> ...	301
<i>Embothrium</i> ...	<u>117</u>	<i>Exostema</i> ...	<u>196</u>
<i>Empleurum</i> ...	<u>149</u>	F.	
<i>Endrachium</i> ...	<u>176</u>	<i>Fabiana</i> ...	<u>176</u>
<i>Epacris</i> ...	<u>173</u>	<i>Fagara</i> ...	<u>144</u>
<i>Eperua</i> ...	462	<i>Fagonia</i> ...	<u>463</u>
<i>Ephielis</i> ...	<u>413</u>	<i>Fagraea</i> ...	<u>212</u>
<i>Epigaea</i> ...	482	<i>Falkia</i> ...	<u>287</u>
<i>Epilobium</i> ...	410	<i>Fedia</i> ...	<u>38</u>
<i>Epimedium</i> ...	<u>143</u>	<i>Fernelia</i> vid. <i>Coccocyps</i> .	
<i>Eranthemum</i> ...	10	<i>Feronia</i> ...	<u>466</u>
<i>Erianthus</i> ...	103	<i>Ferraria</i> ...	<u>50</u>
<i>Erica</i> ...	420	<i>Ferula</i> ...	311
<i>Eriocaulon</i> ...	<u>110</u>	<i>Festuca</i> ...	<u>92</u>
<i>Eriogonum</i> ...	<u>450</u>	<i>Fissilia</i> ...	<u>41</u>
<i>Eriophorum</i> ...	70	<i>Flagellaria</i> ...	396
<i>Eriospermum</i> ...	<u>363</u>	<i>Floerkea</i> ...	393
<i>Eriostemon</i> ...	<u>468</u>	<i>Floscopa</i> ...	374
<i>Erithalis</i> ...	<u>200</u>	<i>Fontanesia</i> ...	10

	Pag.		Pag.
Forgesia. . . . .	194	<i>Ginannia</i> vid. <i>Palovea</i> .	
<i>Foveolaria</i> v. <i>Tremanth.</i>		<i>Gisekia</i> . . . . .	337
Fragrosa. . . . .	303	<i>Gladolus</i> . . . . .	44
Francoa. . . . .	445	<i>Glaux</i> . . . . .	262
Frankenia. . . . .	392	<i>Globba</i> . . . . .	3
Frasera. . . . .	137	<i>Globularia</i> . . . . .	118
Fritillaria. . . . .	358	<i>Globifera</i> . . . . .	14
Frœlichia. . . . .	130	<i>Gloriosa</i> . . . . .	360
Fuchsia. . . . .	410	<i>Glossoma</i> . . . . .	144
Fuirena. . . . .	70	<i>Glossopetalum</i> . . . . .	332
<i>Furcræa</i> . . . . .	380	<i>Gluta</i> . . . . .	263
Fusanus. . . . .	144	<i>Gnidia</i> . . . . .	436
G.		<i>Godovia</i> . . . . .	467
<i>Gærtnera</i> . . . . .	467	<i>Gomortega</i> vid. <i>Adenos-</i>	
<i>Gahnia</i> . . . . .	393	temum.	
<i>Galanthus</i> . . . . .	349	<i>Gomozia</i> vid. <i>Nerteria</i> .	
<i>Galax</i> . . . . .	250	<i>Gomphia</i> . . . . .	465
<i>Galaxia</i> . . . . .	41	<i>Gomphrena</i> . . . . .	257
<i>Galenia</i> . . . . .	438	<i>Gonolobium</i> . . . . .	274
<i>Galium</i> . . . . .	126	<i>Gonzalea</i> . . . . .	132
<i>Galipea</i> . . . . .	8	<i>Goodenia</i> . . . . .	195
<i>Galopina</i> . . . . .	150	<i>Gouania</i> . . . . .	248
<i>Galphimia</i> . . . . .	506	<i>Goupia</i> vid. <i>Glossope-</i>	
<i>Galvesia</i> . . . . .	393	talum.	
<i>Gardenia</i> . . . . .	198	<i>Gratiola</i> . . . . .	14
<i>Garidella</i> . . . . .	505	<i>Grielum</i> . . . . .	513
<i>Gaura</i> . . . . .	409	<i>Gronovia</i> . . . . .	257
<i>Gelsemium</i> . . . . .	267	<i>Grossularia</i> . . . . .	232
<i>Genipa</i> . . . . .	198	<i>Grubbia</i> . . . . .	434
<i>Gentiana</i> . . . . .	284	<i>Guajacum</i> . . . . .	462
<i>Geutianæ</i> . . . . .	280	<i>Gaultheria</i> . . . . .	482
<i>Gethyllis</i> . . . . .	362	<i>Guarea</i> . . . . .	416
<i>Getonia</i> . . . . .	477	<i>Guiera</i> . . . . .	470
<i>Githago</i> . . . . .	519	<i>Gnettarda</i> . . . . .	200
<i>Gilibertia</i> . . . . .	424	<i>Guevina</i> . . . . .	118
<i>Gillia</i> . . . . .	187	<i>Guilandina</i> . . . . .	461
		<i>Gumillea</i> . . . . .	290



	Pag.		Pag.
Gunnera. . . . .	30	Herreria. . . . .	374
Guzmannia. . . . .	344	Heucheria. . . . .	290
Gymnocarpon. . . . .	262	Heteranthera. . . . .	56
Gynopogon. . . . .	266	Higgensia. . . . .	133
Gypsophila. . . . .	492	Hillia. . . . .	391
Gyrocarpus. . . . .	145	Hippocratea. . . . .	40
II.		Hippotis. . . . .	210
Hæmanthus. . . . .	348	Hippuris. . . . .	5
Hæmatoxylon. . . . .	462	Hinæa. . . . .	507
Hagea. . . . .	262	Hirtella. . . . .	250
Hagenia. . . . .	416	Hoffmannia. . . . .	131
Hakea. . . . .	117	Hoffmanseggia. . . . .	460
Hamellia. . . . .	203	Hoitzia. . . . .	187
Hænkea. . . . .	241	Holcus. . . . .	78
Haloragis. . . . .	446	Holosteum. . . . .	111
Hamamelis. . . . .	150	Honckenia. . . . .	416
Hartogia. . . . .	145	Hordeum. . . . .	108
Hasselquistia. . . . .	313	Hornstedtia. . . . .	2
Hebea. . . . .	44	Hortensia. . . . .	505
Hedera. . . . .	252	Hostea vid. Matelia.	
Hedwigia. . . . .	414	Hottonia. . . . .	171
Hedychium. . . . .	2	Houstonia. . . . .	125
Hedycia vid. Licania.		Hovenia. . . . .	244
Hedyotis. . . . .	122	Huanaca. . . . .	317
Heisteria. . . . .	466	Huertea. . . . .	248
Helianthera vid. Helicia.		Humboldtia. . . . .	248
Helicia. . . . .	214	Hyacinthus. . . . .	374
Heliconia. . . . .	263	Hydrangea. . . . .	486
Heliotropium. . . . .	155	Hydrogeton. . . . .	400
Hellenia. . . . .	1	Hydrocotyle. . . . .	301
Helonias. . . . .	398	Hydrolea. . . . .	289
Hemerocallis. . . . .	382	Hydrophyllum. . . . .	168
Heracleum. . . . .	314	Hydrophylax. . . . .	125
Heritiera vid. Dilatris.		Hymenæa. . . . .	455
Hermas. . . . .	305	Hyoscyamus. . . . .	217
Herniaria. . . . .	292	Hypecoum. . . . .	150
		Hypolytrum. . . . .	70

	Pag.		Pag.
<i>Hyperanthera</i> vid. <i>Moringa</i> .		<i>Justicia</i> . . . . .	19
<i>Hypoxis</i> . . . . .	362	<i>Ixia</i> . . . . .	46
		<i>Ixora</i> . . . . .	130
<b>L.</b>	<b>J.</b>		<b>K.</b>
<i>Jaborosa</i> . . . . .	218	<i>Kampheria</i> . . . . .	4
<i>Jacquinia</i> . . . . .	234	<i>Kalmia</i> . . . . .	477
<i>Jambolifera</i> . . . . .	416	<i>Kochia</i> . . . . .	297
<i>Jarava</i> . . . . .	6	<i>Koelreuteria</i> . . . . .	413
<i>Jasminum</i> . . . . .	7	<i>Koeleria</i> . . . . .	97
<i>Jeffersonia</i> . . . . .	418	<i>Koenigia</i> . . . . .	111
<i>Icica</i> . . . . .	414	<i>Knautia</i> . . . . .	121
<i>Ignatia</i> . . . . .	264	<i>Knuxia</i> . . . . .	125
<i>Ilex</i> . . . . .	151	<i>Kookia</i> . . . . .	466
<i>Illecebrum</i> . . . . .	160	<i>Krameria</i> . . . . .	141
<i>Imbricaria</i> . . . . .	234	<i>Kuhnia</i> . . . . .	257
<i>Impatiens</i> . . . . .	256	<i>Kyllinga</i> . . . . .	57
<i>Imperatoria</i> . . . . .	321		<b>L.</b>
<i>Imperata</i> . . . . .	103	<i>Labatia</i> . . . . .	134
<i>Ionesia</i> . . . . .	406	<i>Lachenalia</i> . . . . .	375
<i>Ionia</i> . . . . .	256	<i>Lachnæa</i> . . . . .	538
<i>Ionidium</i> . . . . .	256	<i>Lacistema</i> . . . . .	5
<i>Jovellana</i> . . . . .	15	<i>Lagetta</i> . . . . .	434
<i>Joncquetia</i> vid. <i>Tapiria</i> .		<i>Lagoecia</i> . . . . .	253
<i>Inocarpus</i> . . . . .	584	<i>Lagurus</i> . . . . .	98
<i>Ipomæa</i> . . . . .	182	<i>Lamarkea</i> . . . . .	218
<i>Iria</i> . . . . .	65	<i>Lambertia</i> . . . . .	116
<i>Irideæ</i> . . . . .	41	<i>Lanaria</i> . . . . .	377
<i>Iridrogalvia</i> v. <i>Tofieldia</i> .		<i>Lapageria</i> . . . . .	373
<i>Iris</i> . . . . .	50	<i>Lappago</i> . . . . .	85
<i>Ischæmum</i> . . . . .	105	<i>Lappula</i> . . . . .	157
<i>Isertia</i> . . . . .	392	<i>Larochea</i> . . . . .	337
<i>Isnardia</i> . . . . .	146	<i>Larrea</i> . . . . .	464
<i>Itea</i> . . . . .	175	<i>Laserpitium</i> . . . . .	312
<i>Juncus</i> . . . . .	383	<i>Lasiopetalum</i> . . . . .	250
<i>Jussieua</i> . . . . .	469		





	Pag.		Pag.
Massopia. . . . .	<u>348</u>	Milla. . . . .	<u>355</u>
<i>Mataiba</i> vid. Ephielis.		Mimusops. . . . .	<u>416</u>
Matelea. . . . .	<u>267</u>	<i>Mindium</i> vid. Michauxia.	
Mathiola. . . . .		Minuartia. . . . .	<u>112</u>
Matrella. . . . .	73	Mirabilis. . . . .	<u>112</u>
Mattuschkæa. . . . .	<u>130</u>	Mirabilis. . . . .	<u>176</u>
<i>Mayaca</i> vid. Syena.		Mitchella. . . . .	232
<i>Maytenus</i> vid. Celastrus.		Mitella. . . . .	<u>491</u>
Medeola. . . . .	398	Mnasion. . . . .	<u>6</u>
Melanea. . . . .	131	Mœringia. . . . .	438
Melanthium. . . . .	397	Mœnchia. . . . .	<u>153</u>
Melastoma. . . . .	<u>471</u>	<i>Mogorium</i> v. Jasminum.	
<i>Melastomeæ</i> . . . . .	<u>471</u>	Mollugo. . . . .	<u>112</u>
Melia. . . . .	<u>469</u>	Monarda. . . . .	<u>24</u>
<i>Meliaceæ</i> . . . . .	<u>467</u>	Monotropa. . . . .	469
Melica. . . . .	<u>76</u>	<i>Moutabea</i> vid. Crypto-	
Melicocca. . . . .	<u>413</u>	stomum.	
Melicope. . . . .	<u>416</u>	Montia. . . . .	111
Melodinus. . . . .	<u>265</u>	Moræa. . . . .	<u>49</u>
Memecylon. . . . .	411	Morina. . . . .	30
Menais. . . . .	<u>167</u>	Morinda. . . . .	<u>201</u>
Menyanthes. . . . .	<u>171</u>	<i>Mouriria</i> vid. Petaloma.	
Menziezia. . . . .	<u>419</u>	Muhlenbergia. . . . .	73
Merendera. . . . .	<u>398</u>	Mulinum. . . . .	309
Meriania. . . . .	<u>477</u>	Murraya. . . . .	<u>466</u>
<i>Mertensia</i> . . . . .	<u>161</u>	Musa. . . . .	<u>343</u>
Messerschmidia. . . . .	<u>164</u>	<i>Muscari</i> . . . . .	<u>345</u>
Meum. . . . .	319	Mussaenda. . . . .	<u>199</u>
Michauxia. . . . .	<u>418</u>	Myginda. . . . .	<u>151</u>
Miconia. . . . .	<u>476</u>	Myonima. . . . .	<u>131</u>
<i>Micranthemum</i> vid. Glo-		Myosotis. . . . .	<u>156</u>
bifera.		Myoschilos. . . . .	<u>235</u>
<i>Micranthus</i> . . . . .	<u>465</u>	Myosurus. . . . .	341
Micropetalon. . . . .	<u>509</u>	Myrmecia. . . . .	<u>134</u>
Microtea. . . . .	298	Myrosma. . . . .	<u>3</u>
Miegea. . . . .	<u>101</u>	Myrospermum. . . . .	472
Milium. . . . .	73	Myroxylon. . . . .	<u>432</u>

*Moringa* — 461.

	Pag.		Pag.
Myrrhis. . . . .	319	Oenoptia. . . . .	240
Myrsine. . . . .	233	Oenothera. . . . .	407
N.		Olax. . . . .	39
<i>Nacibea</i> vid. <i>Manettia</i> .		Oldenlandia. . . . .	146
Neea. . . . .	418	Olea. . . . .	8
Nama. . . . .	289	Oliveria. . . . .	319
Nandina. . . . .	388	<i>Onagræ</i> . . . . .	407
Narcissus. . . . .	349	Oncus. . . . .	374
Narthecium. . . . .	370	Onosma. . . . .	161
Nardus. . . . .	72	Onosmodium. . . . .	162
<i>Nastus</i> vid. <i>Bambos</i> .		Opelia. . . . .	241
Nauclea. . . . .	201	Opercularia. . . . .	122
Navarretia. . . . .	187	Ophira. . . . .	434
Nectris. . . . .	394	Ophiorhiza. . . . .	281
Nerium. . . . .	239	Ophioxylon. . . . .	268
Nerteria. . . . .	150	<i>Oribasia</i> vid. <i>Nonatelia</i> .	
Neurada. . . . .	522	<i>Orixa</i> vid. <i>Othera</i> .	
Nierenbergia. . . . .	176	Ornithogalum. . . . .	363
Nicandra. . . . .	219	Ornithrophe. . . . .	412
Nicotiana. . . . .	217	Ornus. . . . .	9
<i>Nigrina</i> vid. <i>Chloranthus</i> .		Orontium. . . . .	382
Niota. . . . .	416	Ortegia. . . . .	40
Nitraria. . . . .		Oryza. . . . .	314
Nolana. . . . .	168	Oryzopsis. . . . .	73
Nolinea. . . . .	399	Osbeckia. . . . .	406
Nonatelia. . . . .	204	Othera. . . . .	145
Nuxia. . . . .	132	Ottelia. . . . .	400
Nyctanthes. . . . .	7	Outea. . . . .	39
O.		Oxalis. . . . .	514
<i>Ochrosia</i> vid. <i>Ophyoxylon</i> .		<i>Oxybaphus</i> vid. <i>Calymentia</i> .	
Oenanthe. . . . .	318	Oxycoccus. . . . .	415
		P.	
		<i>Pæderia</i> . . . . .	210
		<i>Pædorata</i> . . . . .	13

	Pag.		Pag.
Pagamea. . . . .	150	Petiveria. . . . .	401
<i>Paliurus</i> . . . . .	241	Petiveria. . . . .	402
Palovea. . . . .	450	Petrocarya. . . . .	403
Panax. . . . .	298	Petunia. . . . .	218
Pancratium. . . . .	351	Peucedanum. . . . .	310
Panicum. . . . .	80	<i>Petromarula</i> . . . . .	194
<i>Panke</i> vid. Gunnera.		<i>Peyrousia</i> . . . . .	46
<i>Panzeria</i> vid. Eperua.		Phacelia. . . . .	168
Paris. . . . .	446	Phalangium. . . . .	367
Parkinsonia. . . . .	459	Phalaris. . . . .	79
Parnassia. . . . .	331	Pharnaceum. . . . .	330
Paspalum. . . . .	85	Phellandrium. . . . .	318
Passerina. . . . .	436	Philesia. . . . .	374
<i>Palicuria</i> . . . . .	208	Phillyrea. . . . .	8
<i>Paronychia</i> vid. Illecebr.		Pblegoriza. . . . .	450
Pappophorum. . . . .	98	Phleum. . . . .	79
Paspalum. . . . .	85	Phlox. . . . .	186
Pastinaca. . . . .	322	Phrynium. . . . .	4
Pancovia. . . . .	403	Phormium. . . . .	375
Patagonula. . . . .	166	Phylla. . . . .	245
<i>Paulletia</i> vid. Bauhinia.		Phylidrum. . . . .	4
Paullinia. . . . .	442	Phyllis. . . . .	298
Pavetta. . . . .	131	Phyllactis. . . . .	39
<i>Pavia</i> . . . . .	403	Physalis. . . . .	219
<i>Paypayrola</i> . v. Wibelia.		Phyteuma. . . . .	193
<i>Payrola</i> vid. Wibelia.		Phytolacca. . . . .	522
Penea. . . . .	134	<i>Picrium</i> vid. Vohiria.	
Pennisetum. . . . .	72	Pilocarpus. . . . .	243
Penthorum. . . . .		Pimelea. . . . .	10
Peplis. . . . .	393	Pimpinella. . . . .	323
<i>Perama</i> vid. Mathuskea.		Pinguicula. . . . .	17
Pergularia. . . . .	271	Pinknea. . . . .	197
<i>Peperomia</i> . . . . .	34	Piper. . . . .	31
Perotis. . . . .	103	Pisonia. . . . .	402
Persoonia. . . . .	118	Pitcarnia. . . . .	344
Petaloma. . . . .	470	Pittospermum. . . . .	248
Petitia. . . . .	131	Placoma. . . . .	210

	Pag.		Pag.
Plaea. . . . .	<u>451</u>	Pothos. . . . .	<u>147</u>
Planera. . . . .	<u>291</u>	<i>Potima</i> . . . . .	<u>209</u>
Plantago. . . . .	<u>137</u>	Poupartia. . . . .	<u>509</u>
Plectronia. . . . .	<u>246</u>	<i>Pourretia</i> vid. <i>Pitcarnia</i> .	
Plumbago. . . . .	<u>175</u>	Primula. . . . .	<u>169</u>
Plumeria. . . . .	<u>267</u>	Prinos. . . . .	<u>387</u>
Poa. . . . .	<u>88</u>	<i>Prismatocarpus</i> v. <i>Cam-</i>	
Podalyria. . . . .	<u>453</u>	panula.	
Pogonia. . . . .	<u>232</u>	Proserpinaca. . . . .	<u>111</u>
<i>Poinciana</i> v. <i>Cæsalpinia</i> .		Prosopis . . . . .	<u>461</u>
Poiretia. . . . .	<u>173</u>	Protea. . . . .	<u>113</u>
<i>Polemonideæ</i> . . . . .	<u>185</u>	Psathura. . . . .	<u>392</u>
Polemonium. . . . .	<u>185</u>	Psychotria. . . . .	<u>205</u>
Pollia. . . . .	<u>347</u>	<i>Psyllium</i> . . . . .	<u>140</u>
Pollichia. . . . .	<u>4</u>	Ptelea. . . . .	<u>145</u>
Polyanthes. . . . .	<u>374</u>	Pteranthus. . . . .	<u>149</u>
Polycardia. . . . .	<u>243</u>	<i>Ptilium</i> . . . . .	<u>359</u>
Polycarpon. . . . .	<u>111</u>	Pulmonaria. . . . .	<u>453</u>
<i>Polycarpia</i> vid. <i>Hagea</i> .		Pultenæa. . . . .	<u>453</u>
Polycnemum. . . . .	<u>40</u>	Putoria vid. add. . . . .	<u>524</u>
Polypogon. . . . .	<u>30</u>	Pyrola. . . . .	<u>483</u>
<i>Polygonatum</i> . . . . .	<u>373</u>	Pyrostria. . . . .	<u>131</u>
<i>Polygonææ</i> . . . . .	<u>438</u>	Pyxidanthera. . . . .	<u>175</u>
Polygonum. . . . .	<u>439</u>		
Polypremum. . . . .	<u>134</u>		
Pomaria. . . . .	<u>460</u>		
Pommereulla. . . . .	<u>106</u>		
Pontederia. . . . .	<u>347</u>		
<i>Pongatium</i> vid. <i>Sphenoclea</i> .			
Porana. . . . .	<u>176</u>		
Porliera. . . . .	<u>445</u>		
<i>Portesia</i> vid. <i>Trichilia</i> .			
Portlandia. . . . .	<u>197</u>		
Portulacaria. . . . .	<u>331</u>		
Potamogetou. . . . .	<u>152</u>		
Potalia. . . . .	<u>466</u>		

## Q.

Qualea. . . . .	<u>4</u>
<i>Quadria</i> vid. <i>Guevina</i> .	
Queria. . . . .	<u>112</u>
<i>Quirivela</i> . . . . .	<u>275</u>
Quassia. . . . .	<u>465</u>
Queria. . . . .	<u>112</u>
Quinchamalium. . . . .	<u>212</u>
Quisqualis . . . . .	<u>470</u>
Quivisia. . . . .	<u>467</u>

## R.

Radiola. . . . .	<u>153</u>
------------------	------------

	Pag.		Pag.
Randia. . . . .	<u>199</u>	Roussea. . . . .	<u>130</u>
Ramonda. . . . .	216	Royena. . . . .	<u>486</u>
<i>Rapatea</i> vid. <i>Mnasium</i> .		Roxburgia. . . . .	<u>412</u>
Rauwolfia. . . . .	265	Rubia. . . . .	<u>130</u>
<i>Ravenala</i> vid. <i>Urania</i> .		<i>Rubiaceæ</i> . . . . .	195
Reichelia. . . . .	329	Rumex. . . . .	<u>394</u>
Remirea. . . . .	<u>57</u>	Rumphia. . . . .	39
Renealmia. . . . .	2	Rupala. . . . .	<u>117</u>
Retzia. . . . .	<u>176</u>	Ruppia. . . . .	152
Rheum. . . . .	451	<i>Russelia</i> vid. <i>Vahlia</i> .	
<i>Rhamnei</i> . . . . .	<u>238</u>	Ruta. . . . .	<u>464</u>
Rhamnus. . . . .	238	<i>Rutaceæ</i> . . . . .	462
Rhexia. . . . .	406	Ruyschia. . . . .	<u>249</u>
<i>Rhodoraceæ</i> . . . . .	<u>477</u>		S.
Rhodora. . . . .	<u>477</u>	Sabal. . . . .	399
Rhododendrum. . . . .	<u>478</u>	Sabicea. . . . .	203
Rhus. . . . .	324	Saccharum. . . . .	102
Ribes. . . . .	251	Sagina. . . . .	153
Richardia. . . . .	392	Salicornia. . . . .	5
Rinorea. . . . .		Salmasia. . . . .	349
Ripogonum. . . . .	<u>374</u>	Salsola. . . . .	295
Riqueria. . . . .	152	Salvadora. . . . .	129
Rivina. . . . .	<u>149</u>	Salvia. . . . .	24
Robergia. . . . .	<u>518</u>	Samara. . . . .	144
Rochefortia. . . . .	290	Sambucus. . . . .	328
Roella. . . . .	193	Samolus. . . . .	172
<i>Rohria</i> . vid. <i>Tapura</i> .		Samyda. . . . .	484
<i>Romulea</i> . . . . .	<u>46</u>	Sanchezia. . . . .	24
<i>Ronabea</i> vid. <i>Psychotr</i> .		Sandoricum. . . . .	469
Rondeletia. . . . .	203	Sanguisorba. . . . .	141
Roridula. . . . .	253	Sanicula. . . . .	303
<i>Rosmarinus</i> . . . . .	<u>24</u>	Sansevieria. . . . .	372
<i>Rouhamon</i> vid. <i>Lasio-</i>		Santalum. . . . .	148
stoma.		Sapindus. . . . .	444
<i>Rourea</i> vid. <i>Robergia</i> .		<i>Sapindi</i> . . . . .	412
Rotala. . . . .	40	<i>Saponaria</i> . . . . .	492
Rottbœllia. . . . .	<u>106</u>		



	Pag.		Pag.
<i>Saracha</i> . . . . .	219	<i>Senacia</i> . . . . .	241
<i>Sarothra</i> . . . . .	331	<i>Septas</i> . . . . .	403
<i>Sarmienta</i> . . . . .	13	<i>Serissa</i> . . . . .	444
<i>Sauvagesia</i> . . . . .	253	<i>Seseli</i> . . . . .	321
<i>Saururus</i> . . . . .	403	<i>Sesleria</i> . . . . .	72
<i>Saxifraga</i> . . . . .	487	<i>Sherardia</i> . . . . .	124
<i>Saxifragæ</i> . . . . .	491	<i>Sessea</i> . . . . .	231
<i>Scabiosa</i> . . . . .	119	<i>Sibbaldia</i> . . . . .	540
<i>Scabrita</i> vid. <i>Nyctanth.</i>		<i>Sickingia</i> . . . . .	234
<i>Scævola</i> . . . . .	195	<i>Sideroxylon</i> . . . . .	236
<i>Scandix</i> . . . . .	319	<i>Siderodendrum</i> . . . . .	131
<i>Scolosantus</i> . . . . .	130	<i>Silene</i> . . . . .	496
<i>Scheffera</i> . . . . .	341	<i>Simaba</i> . . . . .	465
<i>Scheuchzeria</i> . . . . .	396	<i>Sipanea</i> . . . . .	205
<i>Schmidelia</i> vid. <i>Orni-</i>		<i>Siphonanthus</i> . . . . .	130
<i>trophe.</i>		<i>Sirium</i> vid. <i>Santalum.</i>	
<i>Scheffeldia</i> vid. <i>Samolus.</i>		<i>Sison</i> . . . . .	317
<i>Schrebera</i> . . . . .	7	<i>Sisyrinchium</i> . . . . .	49
<i>Scollera</i> vid. <i>Oxycoccus.</i>	462	<i>Sium</i> . . . . .	316
<i>Scotia</i> . . . . .	462	<i>Skimmia</i> . . . . .	145
<i>Schradera</i> . . . . .	201	<i>Smyrnium</i> . . . . .	322
<i>Schoenus</i> . . . . .	58	<i>Solanaceæ</i> . . . . .	214
<i>Schwenkfeld.</i> v. <i>Sabicea.</i>		<i>Solandra</i> . . . . .	218
<i>Scilla</i> . . . . .	365	<i>Solanum</i> . . . . .	220
<i>Scirpoidei</i> . . . . .	56	<i>Saldanella</i> . . . . .	170
<i>Scirpus</i> . . . . .	65	<i>Sophora</i> . . . . .	452
<i>Sciuris</i> . . . . .	30	<i>Sorghum</i> . . . . .	101
<i>Scleranthus</i> . . . . .	491	<i>Souroubea</i> vid. <i>Ruyschia.</i>	
<i>Scopolia</i> vid. <i>Toddalia.</i>		<i>Sowerbea</i> . . . . .	355
<i>Scoparia</i> . . . . .	141	<i>Spananthe</i> . . . . .	303
<i>Scotia</i> . . . . .	462	<i>Spartina</i> vid. <i>Limnetis.</i>	
<i>Secale</i> . . . . .	108	<i>Spathelia</i> . . . . .	328
<i>Sedum</i> . . . . .	511	<i>Spermacoce</i> . . . . .	123
<i>Segetella</i> . . . . .	330	<i>Spergula</i> . . . . .	522
<i>Selinum</i> . . . . .	308	<i>Spergularia</i> . . . . .	504
<i>Sellieria</i> vid. <i>Goodenia.</i>		<i>Sphenoclea</i> . . . . .	173
<i>Semecarpus</i> . . . . .	324	<i>Spielmannia</i> . . . . .	141

	Pag.		Pag.
Spigelia. . . . .	281	Symphytum. . . . .	161
Spinifex. . . . .	110	Syringa. . . . .	9
Spondias. . . . .	509		
<i>Sprengelia</i> vid. Poiretia.			T.
Staaavia. . . . .	246		
Stapelia. . . . .	277	Tabernæmontana. . . . .	268
Staphylea. . . . .	328	Tacca. . . . .	382
Statice. . . . .	332	<i>Tachibota</i> vid. Salmasia.	
Stellaria. . . . .	500	Tachia. . . . .	459
Stellera. . . . .	436	<i>Tachigali</i> vid. Tachia.	
Stephania. . . . .	391	Tanibuca. . . . .	486
<i>Stereoxylon</i> vid. Escal-		Tamarix. . . . .	328
lonia.		<i>Tapeina</i> vid. Witsena.	
<i>Steris</i> vid. Hydrolea.		Tapiria. . . . .	509
Stevensia. . . . .	392	Tapura. . . . .	39
Stipa. . . . .	99	Tectona. . . . .	238
<i>Stipulicida</i> vid. Poly-		Telephium. . . . .	329
carpon.		Terminalia. . . . .	485
<i>Strigilia</i> vid. Treman-		Tetrapteris. . . . .	508
thus.		Tetratheca. . . . .	419
Strelitzia. . . . .	263	Thalia. . . . .	4
<i>Streptopus</i> . . . . .	360	Thapsia. . . . .	322
Stroemia. . . . .	210	Theophrasta. . . . .	265
Strophanthus. . . . .	269	Thesium. . . . .	211
Strumaria. . . . .	349	Thouinia. . . . .	413
Struthiola. . . . .	148	Thrinax. . . . .	382
Strychnos. . . . .	264	Triopteris. . . . .	508
Sturmia. . . . .	76	Thryalis. . . . .	465
Styrax. . . . .	483	Thuarea. . . . .	110
Styphelia. . . . .	174	<i>Thymeleæ</i> . . . . .	434
<i>Suæda</i> vid. Salsola.		Tiarella. . . . .	491
Suriana. . . . .		Tigridia. . . . .	50
Swertia. . . . .	287	Tillæa. . . . .	153
Swietenia. . . . .	469	Tillandsia. . . . .	345
Syena. . . . .	56	<i>Tinus</i> vid. Clethra.	
<i>Symphoricarpus</i> ( <i>Sym-</i>		Tiquila. . . . .	157
<i>phoria</i> ). . . . .	214	<i>Tocoyena</i> vid. Ucriana.	
		Toddalia.	



	Pag.		Pag.
Toddalia . . . . .	249	Tulipa . . . . .	360
Tofieldia . . . . .	399	Turnera . . . . .	329
Toluifera . . . . .	462	Turræa . . . . .	<u>468</u>
Tonsella . . . . .	<u>41</u>		
Toutanea . . . . .	<u>134</u>	U.	
Tordylium . . . . .	<u>314</u>	Ucriana . . . . .	205
<i>Touchiroa</i> vid. <i>Crudia</i> .		Ulloa . . . . .	218
Tournefortia . . . . .	<u>165</u>	Ulmus . . . . .	290
Tovaria . . . . .	402	Uniola . . . . .	92
<i>Tozettia</i> vid. <i>Alopecurus</i> .		Urania . . . . .	343
Trachelium . . . . .	<u>194</u>	<i>Umbellatæ</i> . . . . .	<u>298</u>
Trachys . . . . .	<u>85</u>	Urceola . . . . .	<u>269</u>
<i>Trachinotia</i> vid. <i>Lim-</i>		<i>Urceolaria</i> v. <i>Sarmienta</i> .	
netis.		Utricularia . . . . .	<u>18</u>
Tradescantia . . . . .	<u>346</u>	Uvularia . . . . .	<u>360</u>
Trapa . . . . .	<u>147</u>		
Tremanthus . . . . .	<u>467</u>	V.	
Trianthema . . . . .	<u>486</u>	Vaccinium . . . . .	<u>478</u>
Tribulus . . . . .	<u>464</u>	Vaginaria . . . . .	70
Trichilia . . . . .	<u>468</u>	Vahlia . . . . .	<u>290</u>
Trichophorum . . . . .	<u>69</u>	Valantia . . . . .	<u>129</u>
Trichodium . . . . .	73	Valentinia . . . . .	<u>415</u>
Trichoon . . . . .	<u>102</u>	Valeriana . . . . .	37
Tricycla . . . . .	210	Vallesia . . . . .	<u>265</u>
Trientalis . . . . .	<u>402</u>	Vanguira . . . . .	205
Triglochin . . . . .	396	Varronia . . . . .	<u>167</u>
Trigonia . . . . .	<u>467</u>	Velezia . . . . .	<u>290</u>
Triguera . . . . .	<u>218</u>	Veltheimia . . . . .	<u>377</u>
Trillium . . . . .	398	<i>Ventenatia</i> v. <i>Stephelia</i> .	
Triopteris . . . . .	508	Ventilago . . . . .	250
Triosteum . . . . .	<u>214</u>	Veratrum . . . . .	<u>397</u>
Tripterella . . . . .	39	Verbascum . . . . .	214
Trisetum . . . . .	<u>97</u>	Veronica . . . . .	<u>10</u>
Tristemma . . . . .	<u>476</u>	Viburnum . . . . .	326
Triticum . . . . .	<u>109</u>	Vinca . . . . .	<u>267</u>
Tropæolum . . . . .	405	<i>Vincetoxicum</i> . . . . .	<u>274</u>
Tulbachia . . . . .	349	Viola . . . . .	253

	Pag.		Pag.
<i>Vereia</i> vid. <i>Callinchœ</i> .		<i>Wulfenia</i> .	14
<i>Virecta</i> .	232	<i>Wurmbea</i> .	396
<i>Virgilia</i> .	403		X.
<i>Visnaga</i> .	307	<i>Xanthorea</i> .	370
<i>Visnaga</i> vid. <i>Ammi</i> .		<i>Xerophyllum</i> .	399
<i>Vitis</i> .	252	<i>Xerophyta</i> .	346
<i>Vitmannia</i> .	412	<i>Ximenia</i> .	415
<i>Vogelia</i> .	210	<i>Xiphium</i> .	54
<i>Vohiria</i> .	283	<i>Xuaresia</i> .	176
<i>Votomita</i> vid. <i>Glossoma</i> .		<i>Xylocarpus</i> .	416
		<i>Xylosteon</i> .	213
		<i>Xyris</i> .	56
			Y.
W.		<i>Yucca</i> .	378
<i>Wachendorphia</i> .	54		Z.
<i>Walkera</i> .	250	<i>Zanonia</i> .	347
<i>Wallenia</i> .	133	<i>Zanthoriza</i> .	341
<i>Watsonia</i> .	70	<i>Zigadenus</i> .	398
<i>Webera</i> vid. <i>Canthium</i> .		<i>Zoydia</i> .	73
<i>Weigelia</i> .	176	<i>Zizyphus</i> .	240
<i>Wendlandia</i> .	400	<i>Zuccagnia</i> .	461
<i>Weinmannia</i> .	438	<i>Zygophyllum</i> .	463
<i>Wibelia</i> .	210		
<i>Willichia</i> .	40		
<i>Witheringia</i> .	133		
<i>Witsena</i> .	42		

*Finis Partis primæ.*





**A 594141**

**UNIVERSITY OF MICHIGAN**



**3 9015 06646 1057**



